



FONDO PIZZOFALCONE



NAZIONALE

B. Prov.

BIBLIOTECA

XVI

186

NAPOLI

VITT. EM. II

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armatto

XXIII



Num.° d'ordine 38

Palchetto

B

B Prov.
XVI
186

ENCYCLOPÉDIE METHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIERES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout
l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT,
premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.*



ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

MÉDECINE.

CONTENANT :

- | | |
|--|---|
| 1°. L'HYGIÈNE. | 6°. LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. |
| 2°. LA PATHOLOGIE. | 7°. LA MÉDECINE LÉGALE. |
| 3°. LA SÉMÉIOTIQUE & LA
NOSOLOGIE. | 8°. LA JURISPRUDENCE de la
MÉDECINE & de la PHARMACIE. |
| 4°. LA THÉRAPEUTIQUE ou
MATIÈRE MÉDICALE. | 9°. LA BIOGRAPHIE MÉDICALE,
c'est-à-dire, les vies des Médecins célèbres,
avec des notices de leurs ouvrages. |
| 5°. LA MÉDECINE MILITAIRE. | |

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS.

*MISE en ordre, publiée par VICQ-D'AZYR, et continuée par M. MOREAU
(de la Sarthe).*

TOME DIXIÈME.



A PARIS,

Chez M^{me}. veuve AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, n°. 6.

M. DCCCXXI.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

L'OUVRAGE dont nous publions aujourd'hui le dixième volume, fut commencé à la fin du siècle dernier (1).

L'éditeur, l'un des savans les plus distingués du dix-huitième siècle (2), et ses principaux collaborateurs (3), qui tous, ou presque tous, appartenoient à la Société royale de médecine, n'ont pas vu la fin de cette entreprise, que les calamités générales de la France et nos malheurs particuliers ont retardée jusqu'à ce jour.

Plusieurs Dictionnaires de médecine ont été entrepris et terminés depuis cette époque. Il sera facile de s'apercevoir, avec un peu de réflexion, qu'ils diffèrent sous plusieurs rapports de celui que nous publions. On se persuadera aisément aussi, qu'il étoit utile, ou même nécessaire, pour une classe nombreuse de lecteurs, dans laquelle la plupart de nos souscripteurs se trouvent placés, d'achever la partie médicale de l'*Encyclopédie*, où l'on a si souvent puisé, sans la citer, et sans en reconnoître l'esprit, l'objet particulier, qui la feront toujours rechercher par les hommes éclairés de toutes les classes de la société.

Celui qui se trouve aujourd'hui chargé de terminer ce grand monument littéraire, a dû se demander quelle étoit la tâche qui lui étoit assignée pour coordonner son travail avec celui de ses prédécesseurs : ce qui devenoit d'une extrême difficulté, les sciences médicales ayant éprouvé de grands changemens, dans une période de trente années, sous le rapport des progrès réels qui les ont enrichies, et sous le point de vue des révolutions diverses qui se sont opérées dans les opinions et les doctrines des médecins les plus célèbres.

Il ne lui importoit pas moins de s'élever à quelques vues générales, et de savoir quel étoit l'objet en général d'un Dictionnaire de médecine, ou d'un Dictionnaire de sciences quelconque; quel étoit l'esprit en particulier d'un Dic-

(1) Le premier volume parut en 1787.

(2) Vicq-d'Azyr, membre de l'Académie des sciences, secrétaire perpétuel de la Société royale de médecine, etc.

(3) Fourcroy, Mauduyt, Thouret, Doublet, Mahon, Goulin.

tionnaire de médecine, destiné à faire partie d'une *Encyclopédie*, et quelle route il falloit suivre pour donner à ce dernier un genre d'intérêt et un caractère d'utilité qui pût aisément le faire distinguer des ouvrages avec lesquels on seroit tenté de le confondre.

Ces différentes questions se sont nécessairement présentées à notre esprit, en acceptant la rédaction du *Dictionnaire de médecine de l'Encyclopédie méthodique*, avec plus de zèle que de prudence, mais sans ignorer cependant les difficultés de tous genres que nous devons rencontrer dans une pareille entreprise.

Le plan que nous nous proposons de suivre pour terminer, le plus promptement et le plus utilement qu'il nous sera possible, un ouvrage aussi important, s'est formé et s'est développé insensiblement dans notre esprit, en donnant à ces différentes questions, toute l'attention qu'elles méritent.

Ce plan doit évidemment se rapporter aux conditions générales des Dictionnaires d'arts ou de sciences, et aux conditions particulières du Dictionnaire faisant partie de l'*Encyclopédie méthodique*; il doit être modifié par le genre de travail que l'on peut exiger de nous, soit pour remplir quelques lacunes qui se trouvent dans les volumes précédens, soit pour rapprocher l'ensemble de l'ouvrage, de l'état présent des connoissances, en revenant par des reprises et des renvois sur des articles qui s'en éloignent, et qu'il sera cependant toujours nécessaire de consulter, ne fût-ce que pour connoître la situation de la science à l'époque où ils ont été rédigés.

Un Dictionnaire a pour objet d'offrir, sous un grand nombre de titres, et par ordre alphabétique, les notions éparses, de l'art ou de la science, à laquelle ce recueil est consacré.

Les ouvrages de ce genre, entièrement inconnus aux Anciens, se sont multipliés sous toutes les formes, chez les Modernes, depuis la découverte de l'imprimerie. On chercheroit en vain dans les traités de littérature les plus complets, quelques traits concernant la poétique de ces sortes d'écrits. Il ne faut pas croire cependant que tout se borne, dans la confection d'un Dictionnaire, à réunir les détails et les principes généraux d'une science comme au hasard, et sans avoir d'autre guide qu'une nomenclature ou un vocabulaire.

Les auteurs qui se consacrent à un semblable travail, doivent être dans la classe moyenne des esprits, suivant une réflexion fort judicieuse de Diderot, et n'avoir pour but que d'exposer clairement l'état des connoissances à l'époque où ils écrivent. Dans une situation plus élevée, ils ne seroient point

à la portée du plus grand nombre des lecteurs, et dans une position trop inférieure, ils s'abandonneroient à des détails ou à des développemens par trop élémentaires, et qui feroient perdre un temps précieux aux bons esprits.

Il y a deux classes d'hommes qu'il faut également négliger, relativement à un Dictionnaire, ajoute le philosophe que nous venons de citer, les hommes de génie, les esprits transcendans, et les esprits par trop vulgaires, qui n'ont besoin de maîtres, ni les uns ni les autres.

La première condition qu'il faut d'ailleurs remplir dans la confection d'un Dictionnaire, c'est de réunir tous les mots qui forment la langue ou le Vocabulaire d'une science; savoir, les mots de cette science qui appartiennent à la langue commune ou générale, les mots particuliers, et les termes techniques, sans en excepter les plus bizarres, ni même ceux qui sont entièrement tombés en désuétude, parce que, d'une part, on ne consulte souvent un Dictionnaire que pour connoître la signification de ces termes techniques, et que, d'une autre part, l'étymologie de ces dénominations, et leurs acceptions diverses, se rattachent quelquefois à des points curieux et intéressans de l'histoire littéraire.

Cette condition générale, de n'oublier aucun des mots qui font partie du Vocabulaire d'une science, s'applique d'une manière particulière à un Dictionnaire de médecine, cette partie des sciences naturelles ayant un grand nombre de termes scientifiques, dont la plupart ne sont plus en usage à la vérité, mais qui ont été employés dans plusieurs ouvrages estimés, et que l'on ne peut d'ailleurs expliquer avec un peu de détail, sans développer plusieurs points de doctrine utiles à connoître, ou sans rappeler certaines découvertes, certaines opinions qui n'ont pas été sans intérêt ou sans influence.

D'après ces remarques, nous n'avons rien négligé pour faire entrer dans la portion du *Dictionnaire de médecine* qui nous reste à terminer, tous les mots anciens ou nouveaux du Vocabulaire des sciences médicales, depuis la syllabe MED jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet.

Notre savant prédécesseur avoit apporté le même soin à cette partie de son travail; et trouvant la nomenclature de l'ancienne *Encyclopédie*, pour ce qui concerne la médecine, très-incomplète, il fit, pour y suppléer, des recherches très-étendues. Plusieurs mots lui ont cependant échappé, et un grand nombre de termes techniques ont d'ailleurs été introduits dans la langue des sciences médicales, depuis l'époque où Vicq-d'Azyr a écrit; de telle sorte, que le Vocabulaire qu'il parvint à former, avec autant de discernement que de zèle, est bien loin d'être complet dans l'état actuel des connoissances; ce qui nous a forcés à l'augmenter d'un grand nombre de dénominations nouvelles, sans oublier

quelques lacunes qui se trouvent dans les volumes déjà publiés, et que nous tâcherons de remplir, en revenant sur les objets omis, ou négligés, dans de certains articles qui n'ont point encore trouvé leur place dans cet ouvrage (1).

La collection des faits ou des opinions qui peuvent se ranger sous un aussi grand nombre de mots, cette collection développée suivant de justes proportions, présente nécessairement beaucoup d'étendue, et surpasse, sous ce rapport, les traités généraux, quelque complets qu'on puisse les supposer (2). Un semblable travail sembleroit, au premier coup d'œil, n'exiger que des efforts et du zèle : il demande cependant des habitudes d'esprit beaucoup plus élevées, et présente certaines difficultés, auxquelles, peut-être, on n'a point fait assez d'attention : difficultés que nous avons recherchées avec soin ; persuadés que leur examen étoit le seul moyen de triompher, au moins de quelques-unes, et d'éviter ainsi plusieurs fautes que des savans estimables ont commises, et qu'ils auraient aisément évitées, avec un peu de réflexion.

L'auteur, ou les auteurs d'un Dictionnaire d'arts ou de sciences, se trouvent nécessairement placés entre deux extrêmes, l'excès du laconisme ou de la précision, dans la crainte de se livrer à des développemens trop étendus ; et l'abondance, la profusion des détails, en multipliant les doubles emplois et les répétitions, dans un grand nombre d'articles.

La destinée d'un Dictionnaire est d'être consulté, pour les besoins du moment, et d'après l'impulsion passagère de la curiosité. Tout en présentant l'universalité de l'art ou de la science qui en est l'objet, on doit donc offrir à chaque mot, sous chaque titre, les renseignemens que l'on desire obtenir dans l'article que l'on consulte, lors même qu'il auroit très-peu d'étendue ou d'importance. S'il en étoit autrement, si des articles de Vocabulaire étoient souvent substitués à des articles de Dictionnaire, la patience du lecteur seroit bientôt fatiguée par la multiplicité des renvois et par l'insuffisance des définitions³.

(1) Comparer dans ce Dictionnaire l'article MÉDECINE et MALADIES MENTALES, avec l'article ALIÉNATION ; les articles MIA (hommes de), MEMBRANES MUQUEUSES, MÉSÉNTÉRIQUE (atrophie), MÉNINGO-GASTRIQUE (fièvre), PHLEGMASIES, PYREXIE, SYPHILIS (maladies), avec les articles MARINS, CATARRHES, CARREAU, FIÈVRE BILIEUSE, INFLAMMATIONS, FIÈVRE, APOPLEXIE, etc.

(2) M. Pariset, auquel nous empruntons cette remarque, sans en tirer les mêmes conséquences, observe avec beaucoup de raison, que des Dictionnaires de médecine bien faits, sont particulièrement plus complets que les traités systématiques, surtout pour une infinité d'objets très-élévés, qui ne sauraient entrer dans ces traités, ou qui n'y sont jamais suffisamment développés, telles que les *épidémies*, les *contagions*, les *maladies héréditaires*, les *conversions des maladies*, etc. etc. Voyez le *Prospectus du Dictionnaire des Sciences médicales*, pag. viij et xix.

On a cité à ce sujet un trait qui nous paroît assez remarquable. Un honnête bourgeois, habituellement tourmenté par des crampes, acheta la traduction du *Dictionnaire de médecine*, de James : il n'eut rien de plus pressé que de lire l'article *Crampes*. Il trouve ce mot ; à la vérité, avec un renvoi à *Convulsions* ; il recourt à *convulsions*, d'où il est renvoyé à *muscles* ; d'où il est renvoyé à *spasmes*, où il ne trouve rien sur la *crampe*.

Les articles fondamentaux plus étendus deviendroient aisément des traités ou des dissertations, si on leur donnoit tout le développement dont ils sont susceptibles ; et cet inconvénient sera presque inévitable, lorsque les auteurs de ces articles ne seront pas animés d'un même esprit, ni pénétrés du désir de rapporter à un même but, la nature de leurs connoissances ou la direction particulière de leurs travaux. Chacun en général regarde trop son genre d'études ou de savoir comme une espèce de centre auquel il rattache tous les objets. Alors on juge bien moins les choses par elles-mêmes, ou dans l'intérêt, et suivant le goût du plus grand nombre des lecteurs, que d'après sa manière de voir ou de sentir : espèce d'égoïsme ou de personnalité inséparable chez les savans, de la préférence qu'ils ont accordée à certains genres de travaux ou de connoissances.

Je me souviens, disoit à ce sujet le philosophe Diderot, qu'un artiste à qui je croyois avoir exposé assez clairement ce qu'il avoit à faire pour *son art*, m'apporta, sur la manière de *tapisser en papier*, qui demandoit à peine un feuillet d'écriture et une demi-planche de dessin, trois cahiers épais, d'un caractère fort menu, propres à fournir deux volumes in-12 (1).

On doit être continuellement en garde contre de pareilles méprises ; pour les éviter, un travail immense et le plus grand zèle ne suffisent pas ; il importe en outre de connoître les hommes, au moins autant que les livres, et de se diriger d'après cette connoissance.

Cette science du cœur humain, et les vues de l'esprit le plus philosophique, sont plus particulièrement indispensables pour la combinaison des articles de détail, avec les grands articles, pour la juste proportion de ceux-ci, et la manière de faire usage des renvois, qui laissent découvrir à chaque instant de nouveaux rapports entre les différentes parties du travail, et qui servent, par cela même, à répandre sur l'ensemble de l'ouvrage, une lumière continuellement fournie par tous les points de la carrière, que l'on parcourt avec plus ou moins de rapidité.

(1) Voyez l'article *ENCYCLOPÉDIE*, dans l'édition de Genève, in-4°, pag. 363.

Les renvois sont pour les mots, ou pour les choses.

Les renvois des mots, les plus fréquens, ont lieu pour les termes de la science dont on s'occupe, et qui appartiennent en même temps, soit à la langue d'une science, soit à la langue vulgaire, comme on le voit par les mots AIR, ATMOSPHERE, GAZ, LUMIÈRE, etc., qui se rapportent également à la médecine et à la physique, ou pour les mots ABATTEMENS, AFFECTIONS MORALES, DÉLIRE, FOLIE, MÉMOIRE, PASSIONS, faisant partie du Vocabulaire général, et qui sont employés par les médecins, dans une acception particulière.

Une autre formule non moins fréquente, est celle qui fait renvoyer continuellement de ces mots communs ou généraux, à une dénomination technique correspondante, d'ABATTEMENT, par exemple, à PROSTRATION, de DÉLIRE à PARAPHROSYNE, de FOLIE à VÉSANIE, de FIÈVRE à PYREXIE, d'INFLAMMATION à PHLEGMASIE, de GALE à PSORIQUE (*affection*).

On place encore également très-souvent des renvois pour toutes les dénominations dont la racine, ou les racines sont les mêmes que ceux d'un autre mot, qui doit fournir un article très-étendu; les renvois, par exemple, d'ACCOUCHEUR, d'ACCOUCHEMENT, de MONSTRE à MONSTROSITÉS, d'ADOLESCENT à ADOLESCENCE, etc. Enfin, une autre sorte de renvoi est mise en usage pour les mots qui, sans être synonymes, ont une certaine analogie, tels que ABLACTATION et SEVRAGE, ABSTINENCE et JEUNE, ACTÈS et PAROXISMES, ACCOUCHEES et FEMMES EN COUCHES, etc.

Du reste, les renvois pour les mots ne se bornent pas à une question purement grammaticale; l'art de les employer avec habileté, et dans les vues d'un esprit suffisamment étendu, donne sans cesse l'occasion de faire apercevoir toutes les nuances, toutes les variétés que peuvent offrir les faits ou les opinions qui appartiennent à une science.

Ces mêmes renvois ont aussi l'avantage de faire continuellement remarquer les liaisons qui existent entre tous les faits, toutes les vérités d'un genre de connoissances, et de faire revenir, à mesure que la science avance, sur des articles qui ne seroient plus au niveau de cette science. Lorsqu'on sera arrivé aux dernières lettres de l'alphabet, à l'aide de ces renvois, on doit aussi ajourner, ou recaler, avec une prévoyance philosophique, certains articles que l'état présent des connoissances rendroit trop incomplets ou trop difficiles, ce qui permet de jeter ainsi un grand nombre de pierres d'attente dans un Dictionnaire : méthode féconde et vraiment *Baconnienne*, d'après laquelle on laisse entrevoir les destinées ultérieures, les progrès espérés et probables de la science, tandis que d'une autre part, on reporte, sur l'espace déjà parcouru, une portion des lumières plus récemment acquises.

Dans l'emploi le plus habituel des renvois pour les choses, on va alternativement des objets de détail, aux parties les plus considérables de la science, et de ceux-ci aux objets de détail les moins susceptibles de développement. On s'attache surtout à montrer la liaison prochaine, ou la liaison plus éloignée de toutes ces choses, et les rapports du sujet que l'on traite avec ceux qui l'ont précédé, ou qui doivent le suivre; ce qui a fait dire sans doute à Diderot, et avec raison, que les renvois formoient la partie la plus importante d'un Dictionnaire, puisqu'ils servoient à la coordination de tous les articles.

Les renvois ont d'ailleurs plusieurs autres objets, qu'il importe de distinguer et de soumettre à la plus scrupuleuse analyse. Plusieurs, par exemple, ne sont mis en usage que pour éviter les doubles emplois et les répétitions, ainsi qu'on le doit faire, par exemple, pour les articles AIR, ATMOSPHÈRE, CLIMAT, ALIMENT, ALIMENTATION, NUTRITION, NOURRITURE. D'autres, que l'on pourroit appeler des renvois de *confirmation* ou de *développement*, ont pour objet de traiter de nouveau, et sous un titre plus avancé dans l'ordre alphabétique, un sujet qui d'abord n'avoit pas été examiné avec assez de soin; ni avec un nombre suffisant de données et de connoissances: enfin, une autre sorte de renvoi pour les choses, que l'on pourroit appeler renvoi d'*élégation* ou plutôt d'*élimination*, permet aux auteurs d'un Dictionnaire, de retrancher, dans un article trop étendu, plusieurs objets de détail, qui doivent être examinés sous différens titres particuliers, et dans un grand nombre d'articles; c'est ainsi que dans les articles FIÈVRE ou INFLAMMATION, on se borne à l'exposition de ce qui appartient en commun et en général à toutes les inflammations, et que l'on renvoie pour les détails aux différens genres ou aux différentes espèces de fièvres ou de phlegmasies, telles que les FIÈVRES BILIEUSES, les FIÈVRES INFLAMMATOIRES, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les PÉRITONITES, la PLEURÉSIE, la PÉRIPNEUMONIE, etc.

On devroit peut-être ajouter aux renvois que nous venons d'indiquer, les renvois de classification, ou de distribution, au moyen desquels on assigne, au commencement de chaque article, la place ou le rang de la matière qui en est le sujet, dans l'ordre de la science: classification qui n'a été indiquée régulièrement jusqu'à ce jour dans le *Dictionnaire de médecine de l'Encyclopédie*, que pour ce qui concerne l'hygiène, et que nous nous proposons d'appliquer par la suite à toutes les parties des sciences médicales.

Ces renvois de toutes espèces deviennent de plus en plus importants, à mesure que l'on avance dans l'exécution d'un Dictionnaire, parce que, d'une part, les rapports que l'on veut saisir sont plus variés, plus nombreux, et que la lumière que l'on cherche à reporter sur l'espace déjà parcouru, se fortifie de plus en

plus, et acquiert d'autant plus d'éclat, que l'on est plus rapproché du terme de son travail, et de l'état le plus récent des connoissances.

Du reste, l'art de placer habilement les renvois est une opération de l'esprit très-délicate et très-difficile. Il exige beaucoup de méthode, beaucoup de réserve; c'est là surtout que les auteurs d'un Dictionnaire doivent montrer autant de sagacité que de goût, et autant de discernement que de savoir et d'érudition, pour ne dire que ce qu'il faut dire, pour se resserrer ou s'étendre au besoin, et pour revenir avec adresse sur des choses énoncées, et qui pourroient avoir déjà vieilli, lorsque l'on seroit arrivé aux dernières parties de l'ouvrage; la perfection de tous les articles dans un semblable travail ne pouvant manquer d'être subordonnée à toutes les chances d'un ordre alphabétique.

Les différentes conditions que nous venons de passer rapidement en revue, et qui se rattachent à des notions assez élevées de philosophie générale, doivent être remplies, autant qu'il est possible, dans l'exécution des différens Dictionnaires d'art ou de science.

Ces mêmes Dictionnaires, lorsqu'ils sont destinés à faire partie d'un système universel des connoissances humaines, se trouvent nécessairement soumis à toutes ces lois, mais avec des modifications assez nombreuses, et qui méritent toute notre attention.

Un Dictionnaire de médecine, par exemple, considéré comme une portion d'un système encyclopédique, s'éloigne nécessairement, sous plusieurs points de vue, des Dictionnaires spécialement et séparément consacrés aux sciences médicales.

En effet, les auteurs d'un *Dictionnaire de médecine de l'Encyclopédie méthodique* ne s'adressent pas aux médecins en particulier, mais à tous les sçavans en général, ou même à l'universalité des hommes d'un esprit cultivé, dans tous les rangs et dans toutes les classes de la société.

La méthode d'exposition dans un Dictionnaire particulier de médecine, est nécessairement dogmatique ou technique, sans rejeter entièrement les spécialités et les détails relatifs à la profession; cette méthode d'exposition doit être plutôt historique que technique dans un *Dictionnaire de médecine encyclopédique*, sans avoir rien de commun d'ailleurs avec les ouvrages insignifiants, et souvent nuisibles, que l'on a publiés sous les titres de *Médecine usuelle*, *Médecine familiale*, *Médecine domestique*.

Les auteurs d'un semblable Dictionnaire doivent avoir toujours présent à la
pensée,

pensée, que leur but particulier est de placer sous les yeux de leurs lecteurs un compte rendu de la science, et de faire connoître, avec beaucoup de réserve et de précision, le caractère, la marche de cette science, son état présent, ses vérités les moins contestées et ses applications les plus utiles; d'une autre part, il importe également à ces auteurs de présenter avec une sorte de développement, les parties élevées de cette même science, tout ce qui se rattache à sa philosophie ou à son histoire, et même les objets de détail qui peuvent inspirer un intérêt général, et qui se rapprochent davantage de l'éducation commune à tous les hommes instruits : considération qui nous a engagés, d'après l'exemple de nos plus savans prédécesseurs, à donner, toutes choses égales d'ailleurs, une place très-étendue à tout ce qui concerne la biographie des médecins les plus célèbres, les annales et les institutions de la médecine, la médecine légale, l'hygiène publique, la philosophie médicale, et le nouveau genre de connoissances que nous avons cru devoir établir sous le titre de MÉDECINE MENTALE et de MÉDECINE MORALE, qui se trouve confirmé aujourd'hui par l'établissement de la chaire dont il est l'objet, dans la Faculté de médecine de Paris.

Les auteurs d'un Dictionnaire, modifié, calculé dans l'ordre encyclopédique, soit pour la médecine, soit pour toute autre partie des sciences naturelles, s'attachieront donc nécessairement à ces objets d'un intérêt général, et aux régions supérieures de la science, dont ils exposent les notions éparses : ils doivent rappeler d'ailleurs, malgré les *brisemens* continuels de connexions qui résultent de l'ordre alphabétique, la liaison de ces notions, soit entre-elles, soit avec plusieurs autres parties d'un autre genre de connoissances : combinaison d'après laquelle on réalise, dans la méthode d'un semblable travail, l'idée de cette chaîne emblématique de Bacon, qui, repliée dans tous les sens, se porteroit alternativement des principes, du tronc d'une doctrine ou d'un art, à leurs conséquences et à leurs ramifications les plus éloignées, sans négliger le plus léger rapport, ni méconnoître aucun point de rapprochement ou de communication (1).

(1) Cette opinion sur le caractère particulier d'un Dictionnaire de médecine, faisant partie d'une Encyclopédie, expliquera aisément l'étendue et l'importance que nous avons données dans la première partie de ce volume, et dans la seconde du volume précédent, aux articles MÉDECINE MORALE, MÉDECINE NAVALE, MÉDECINE PUBLIQUE, MÉDECINS (existence civile des), MÉDECINS ANCIENS et MÉDECINS MODERNES, MÉDECINS EXPERTS ou MÉDECINS JURÉS, MÉDICO-LÉGAL, MEMBRANES, MÈRE (hommes de), MÉSMÉRISME, MÉTHODES (médicales), MÉTHODISTES (secte des), MÉTIERS (influence des), MILITAIRE (médecine), MOMIE, MONSTRES et MONSTRUOSITÉS, MONTPELLIER (Faculté de), MORAL (rapport du physique et du), MORT, etc. etc.

Les sciences médicales présentent d'ailleurs beaucoup moins d'étendue dans un Dictionnaire spécial ou particulier de médecine. Elles appartiennent alors à cette troisième division des sciences naturelles, que M. Cuvier a désignée sous le titre de *Science d'application* (1), et embrassent plusieurs genres principaux de doctrines pour la médecine de l'homme, ou pour celle des animaux domestiques, savoir, I^o. l'histoire de la science et des institutions médicales et sanitaires; II^o. la pathologie, qui comprend la pathologie générale, la pathologie spéciale (2) et les arts qui s'y rapportent (3); III^o. la thérapeutique; IV^o. l'hygiène; V^o. la médecine légale, etc.

La chirurgie elle-même, qui ne doit être regardée que comme une grande division de la thérapeutique, mais dont les détails sont de la plus grande importance, a été séparée de l'ensemble des sciences médicales, et exposée dans un Dictionnaire particulier (*le Dictionnaire de Chirurgie de l'Encyclopédie méthodique*), sur plusieurs articles duquel nous ne craignons pas d'ailleurs de revenir, pour tout ce qui se rattache, soit à l'histoire de la science, soit à la thérapeutique ou à la pathologie générale.

Plusieurs branches des sciences naturelles; qui appartiennent bien moins à la médecine qu'à la chirurgie, font cependant partie de son enseignement; telles sont l'anatomie, l'histoire naturelle médicale, la chimie et la pharmacie, qui occupent une place distincte dans l'ordre encyclopédique, et qui ont été exposées dans plusieurs Dictionnaires particuliers et séparés de l'Encyclopédie méthodique; en conséquence nous ne nous arrêterons à aucun des articles relatifs à ces connoissances, nous réservant toutefois de faire une exception, pour un petit nombre d'objets qui se rapportent d'une manière trop directe à l'art de guérir, pour être entièrement omis dans son exposition ou dans son histoire; ce qu'il sera facile de voir pour les mots MORPHINE, NARCOTINE, NARCOTIQUES, NOIX VOMIQUE, OPIUM, QUINQUINA (ou écorce du Pérou), STRYCHNINE, etc., etc.

D'après ces réflexions sur le caractère particulier et la physionomie bien prononcée du *Dictionnaire de Médecine de l'Encyclopédie*, nous nous proposons

(1) Les sciences naturelles d'application sont ramenées par M. Cuvier à quatre titres principaux, savoir, 1^o. la médecine de l'homme, 2^o. l'art vétérinaire, 3^o. l'agriculture, 4^o. la technologie.

(2) La médecine naturelle, la médecine des femmes et des enfans, l'*Obstétrique* ou l'art des accouchemens.

(3) Les arts de l'oculiste, du dentiste, du bandagiste, de l'orthopédiste.

de ne rien négliger pour rappeler cet ouvrage à sa forme primitive et spéciale, indiquée par Vicq-d'Azyr, en ne le considérant pas comme un répertoire isolé des sciences médicales, mais comme une partie aussi étendue qu'importante d'une exposition générale des connoissances humaines.

Dans cette manière de considérer les sciences médicales, nous attacherons un grand prix à les présenter, d'après l'état le plus récent de leurs progrès, pour les articles qui nous sont confiés. Plusieurs de ces articles seront en outre rédigés dans l'intention particulière de faire revivre, sur ce qui les précède, quelques traits, quelques rayons des connoissances actuelles, afin d'être toujours au niveau de ces connoissances : ce que la marche de l'esprit humain rendra d'ailleurs bien difficile, et souvent impossible : de telle sorte que dans le moment où nous croirons présenter, sur un point quelconqué des doctrines médicales, leur état présent, elles se trouveront sur le point de subir une révolution, ou de s'agrandir ou de changer de forme par de nouveaux progrès.

Cette impossibilité de n'être pas devancés, pendant l'exécution d'un Dictionnaire, par la marche rapide des connoissances ; cette impossibilité si décourageante, et les inégalités, les disparates qui en résultent, sont la suite inévitable de la nature de l'esprit humain, qui ne peut jamais demeurer stationnaire. Entraînée dans cette commune destinée, chaque partie des sciences varie, s'étend, s'agrandit, change au moins de direction ou de théorie, dans un espace de temps assez court ; et vainement on voudroit espérer qu'un Dictionnaire qui lui est consacré, ne soit pas, au moment où il se termine, un ouvrage déjà fort ancien, ou très-arriéré, au moins pour ses premières parties.

Les opinions vieillissent et changent comme les mots d'une langue qui se forme successivement ; certaines théories, qui avoient obtenu un grand crédit, sont modifiées dans plusieurs points, et perdent une grande partie de leur influence : l'intérêt que l'on prend même à certaines découvertes, plus singulières que fécondes, s'affaiblit et diminue de jour en jour.

« Qu'un homme consume une partie de sa vie à la description des arts, dit
 » le philosophe auquel nous empruntons ces remarques ; que cet homme,
 » dégoûté de cet ouvrage fatigant, se laisse entraîner à des occupations plus
 » amusantes et moins utiles, et que son premier ouvrage demeure enfermé dans
 » ses porte-feuilles, il ne s'écoulera pas vingt ans, qu'à la place de choses nouvelles et curieuses, piquantes par leur singularité, intéressantes par leurs
 » usages, par le goût dominant, par une importance momentanée, il ne retron-

» vera que des notions incorrectes, des manœuvres surannées, des machines
 » ou imparfaites ou abandonnées. Dans les nombreux volumes qu'il aura com-
 » posés, il n'y aura pas une page qu'il ne faille retoucher; et dans la multi-
 » tude des planches qu'il aura fait graver, presque pas une figure qu'il ne faille
 » redessiner. Ce sont des portraits dont les originaux ne subsistent plus. Le
 » luxe, ce père des arts, est comme le Saturne de la Fable, qui se plaisoit à
 » détruire ses enfans.

» La révolution peut être moins forte et moins sensible dans les sciences et
 » dans les arts libéraux, que dans les arts mécaniques : mais il s'y en fait une.
 » Qu'on ouvre les Dictionnaires du siècle passé, on n'y trouvera à *ABERRA-*
 » *TRON*, rien de ce que nos astronomes entendent par ce terme; à peine y aura-
 » t-il sur *L'ÉLECTRICITÉ*, ce phénomène si fécond, quelques lignes qui ne seront
 » encore que des notions fausses et de vieux préjugés. Combien de termes de
 » *minéralogie* et d'*histoire naturelle* dont on en peut dire autant! Si notre
 » Dictionnaire eût été plus avancé, nous aurions été exposés à répéter sur la
 » *nielle*, sur les maladies des grains, et sur leur commerce, les erreurs des
 » siècles passés, parce que les découvertes de M. Tillet et le système de M. Her-
 » bert sont récents.

» Quand on traite des êtres de la nature, que peut-on faire de plus que de
 » rassembler avec scrupule toutes leurs propriétés connues dans le moment où
 » l'on écrit? Mais l'observation et la physique expérimentale multipliant sans
 » cesse les phénomènes et les faits, et la philosophie rationnelle les comparant
 » entr'eux et les combinant, étendent ou resserrent sans cesse les limites de
 » nos connoissances, font en conséquence varier les acceptions des mots in-
 » titués, rendent les définitions qu'on en a données inexactes, fausses, im-
 » complètes, et déterminent à en instituer de nouveaux. »

Ces changemens continuels, ces variations que rien ne peut arrêter, ces ef-
 fets inévitables de la marche de l'esprit humain, qui n'est jamais station-
 naire, ont été beaucoup plus marqués pour la médecine que pour aucune
 autre partie des sciences naturelles, dans la période qui s'est écoulée depuis
 la publication des premiers volumes de la partie médicale de l'*Encyclo-*
pédie.

Les hommes les plus célèbres de cette époque; et en particulier Vicq-d'Azyr,
 et les premiers rédacteurs de l'ouvrage que nous devons terminer, ne furent pas
 sans doute étrangers à la révolution qui s'est opérée dans cette période (A).
 Mais ils n'ont pu la devancer, et un grand nombre de leurs articles a dû se

trouver et se trouve, en effet, à une grande distance de l'état des connoissances, vers lequel cette révolution a entraîné bien plus qu'elle n'a conduit les esprits, dans l'espace de quelques années.

La réforme, ou plutôt, la fondation sur de nouvelles bases des écoles de médecine de France; la réunion, dans l'enseignement, de la médecine proprement dite et de la chirurgie (B); l'esprit philosophique qui s'est introduit dans les écoles, et qui, après avoir dissipé les derniers vestiges de la philosophie scolastique, s'est opposé à l'esprit de système (C) et à l'invasion des théories tirées des sciences plus ou moins étrangères à l'art de guérir (D) (les mathématiques, la physique, la chimie et la philosophie spéculative); cette direction imprimée à tous les genres de travaux ou d'études; l'importance attachée aux institutions cliniques, et les chances pour les découvertes de détail, que le nombre et l'activité de ces institutions ont multipliées (E); le nouveau caractère et les progrès rapides de la physiologie, qui est devenue une science de fait, une étude expérimentale; une disposition semblable dans ce qu'on appeloit autrefois la *pathologie*, dont plusieurs branches ont été enrichies ou perfectionnées (F); l'anatomie générale, fondée, développée sous nos yeux par BICHAT, et qui s'est associée à cette physiologie et à cette pathologie; l'étude des lésions organiques, dont cette même anatomie générale a changé la forme; cette dernière qui, après avoir été un simple recueil d'observations, s'est élevée au rang des sciences, et s'est placée parmi les doctrines, en même temps qu'elle s'est enrichie par un grand nombre de découvertes; les applications de cette dernière, non-seulement à la physiologie, mais à la théorie des maladies et des *médications*, qui n'a plus ressemblé en rien à ce que l'on désignoit autrefois sous le nom de *pathologie* et de *thérapeutique* (G); ces applications, une culture plus rationnelle et plus étendue de la médecine légale (H); enfin des vues entièrement nouvelles sur la nature ou le traitement des maladies mentales (I), et sur les rapports du physique et du moral de l'homme; tels ont été les points les plus saillans du nouvel état de choses qui s'est établi pour les sciences médicales, au commencement du dix-neuvième siècle, et dont nos prédécesseurs n'ont pu prévoir ni devancer le développement et les conséquences.

Par un effet nécessaire de ces grandes variations, plusieurs articles ont dû être et ont été réellement traités d'une manière incomplète, ou même oubliés; dans les volumes antérieurs à celui dont nous publions aujourd'hui la première partie. Tels sont, et pour ne citer qu'un petit nombre d'exemples, les articles ADHÉRENCES MORBIDES, AGONIE, ALIÉNATION MENTALE, et même ALIMENT et ANATOMIE PATHOLOGIQUE, malgré leur étendue, ANÉMIE, ANÉVRYSME INTERNE, ANÉVRYSME EXTERNE, ANÉVRYSME SPONTANÉ, ANGINE DE

POITRINE, ARTÈRES (maladie des), ASTHME, AUSCULTATION MÉDIATE, BLESSURES (sous le point de vue de la médecine légale), CAL, CANCER, CHLO-ROSE, CICATRICE, CICATRISATION, CORPS FIBREUX de l'utérus, CROUP, DARTRES, DÉLIRE, DÉMENCE, DIABÈTES SUCRÉ, DOCIMASIE pulmonaire, DYSSENTERIE, EAUX MINÉRALES NATURELLES ET ARTIFICIELLES, EGROUELLES, ÉLÉPHANTIASIS des Grecs et des Arabes, EMBRYOLOGIE (sous le rapport de la médecine légale), EMPHYSÈME, ENTÉRITE, ÉPILEPSIE, EXHALATION, FACE (sous le rapport de la sémiotique), FIÈVRES INTERMITTENTES en général, FIÈVRES BILIEUSES, FIÈVRES INFLAMMATOIRES, FIÈVRE PUERPÉRALE, FLUXIONS, GALVANISME, GANGRÈNE en général, GANGRÈNE HUMIDE des hôpitaux, GOÛTRE, GYMNASTIQUE, HALLUCINATION, HÉMORRAGIE, HÉMORRÔIDES, HYDATIDES, HYDROCÉPHALE INTERNE, ILES, INFLAMMATION, LÈPRE, LÉSIONS ORGANIQUES, etc., etc.

Nous reviendrons autant qu'il nous sera possible, et au moins d'une manière historique, en profitant de toutes les ressources que peut offrir l'ordre alphabétique, sur ces différents articles, qui ont été omis, ou qui sont trop éloignés de l'état présent des connoissances : espèces de corrections ou de supplément dont la portion du volume que nous publions aujourd'hui, et la deuxième moitié du volume précédent, ont déjà présenté plusieurs exemples (1).

Telles sont les réflexions auxquelles nous avons pensé qu'il falloit d'abord nous arrêter, dans ces vues préliminaires, avec le dessein de nous faire une idée exacte de la nature du travail qui nous étoit confié.

Nous terminerons ici les réflexions qu'il nous a paru nécessaire de placer

(1) *Conférer* pour ces exemples dans les volumes cités, les articles MÉDECINS MODERNES, MÉDECINS ARCHIÂTRES, avec ANCIENS MÉDECINS et ARCHIÂTRES; MEXICO-GASTRIQUE (fièvre), avec FIÈVRE BILIEUSE; MÉDECINS JURÉS ou MÉDECINS EXPERTS, avec MÉDECINE LÉGALE, dont l'auteur s'étoit borné à quelques lieux communs, et n'avait pas conservé l'article de Lafosse dans la grande Encyclopédie, oubliant ou ignorant sans doute, que les rédacteurs de l'Encyclopédie méthodique, pour la médecine, avaient contracté l'engagement de prendre pour base de leur travail les articles publiés dans l'ancien, ainsi qu'ils le déclarent dans l'avertissement que nous avons déjà cité. *Conférer* aussi MÉDICALLES (sciences médicales), avec MÉDECINE EN GÉNÉRAL; MÉLÈNA, avec MALADIE NOIRE; MEMBRANES, avec plusieurs articles de détail, qui se rattachent à la considération pathologique des différents systèmes d'organes, telles que ADHÉRENCES, FAUSSES MEMBRANES, PORTES (membranes du), CADUQUE (membrane caduque), ÉPICHORION, de M. le professeur Chaussier, membranes *dividua*, de Hunter, MIA (eau et bains de), avec BAINS DE BAIN DE MER; MÉSÉNTÈRE, MÉSÉNTÉRIQUE (atrophie mésentérique), avec CARREAU; MINÉRALES (eaux), avec EAUX MINÉRALES.

au commencement de ce dixième volume du *Dictionnaire de Médecine de l'Encyclopédie méthodique*.

Si notre but a été atteint, ces réflexions feront évidemment connoître que ce Dictionnaire, dont la terminaison et le complément nous ont été confiés, présente un caractère scientifique et un genre d'utilité qui lui sont propres; ce qui explique comment un grand nombre d'articles, à peine indiqués dans les autres Dictionnaires de médecine (1), sont très-développés dans la partie médicale de l'*Encyclopédie*, tandis que l'on a omis, dans cette dernière, on présenté d'une manière très-abrégée, plusieurs autres articles qui occupent une grande étendue dans ces mêmes Dictionnaires (2).

Nous ne changerons rien d'ailleurs à l'esprit, aux intentions de notre illustre prédécesseur. Secondés comme lui par la collaboration de plusieurs hommes aussi laborieux qu'éclairés (3), nous espérons terminer, enfin, et d'une

(1) Plusieurs des articles que nous avons déjà indiqués, et qui se rapportent aux considérations les plus élevées des sciences médicales, et aux parties de ces sciences les plus remarquables par l'universalité de leur intérêt, ou la fécondité de leurs applications (un grand nombre d'articles d'hygiène, AFFECTIONS DE L'ÂME, par exemple, AIR, ALIÈNES, AFRIQUE, EUROPE, etc., le mot HYGIÈNE lui-même, plusieurs articles d'histoire de la médecine, ou de philosophie médicale, de médecine mentale, de médecine légale; MYTHES (méthodes médicales), SCIENCES (sciences médicales), MONTPELLIER, MÉDECINS modernes, comparés aux anciens, MÉTHODISTES, MENTALE; MORAL, MÉDECINS jurés ou experts, MONSTRES, etc.).

(2) Ces mêmes réflexions, si elles sont convenablement appréciées, préviendront la remarque de certains détracteurs, qui voudraient faire penser que, par cela même qu'il existe plusieurs Dictionnaires de médecine, l'achèvement de la partie médicale de l'*Encyclopédie* serait devenu inutile ou superflu, ou que les auteurs d'un pareil ouvrage ne peuvent manquer de mériter le reproche d'avoir mis à contribution, pour leur travail, les Dictionnaires de médecine les plus estimés.

(3) MM. BRESCHET, docteur en médecine, chef des travaux anatomiques de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie royale de médecine (plusieurs articles d'ANATOMIE PATHOLOGIQUE).

CHAMBERET, docteur en médecine, professeur à l'hôpital de Lille (différens articles de la MÉDECINE PRATIQUE, la MÉDECINE MILITAIRE).

COLTANCAU, membre de l'Académie royale de médecine (plusieurs articles de MÉDECINE PROPREMENT DITE et d'HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES).

DÉSORMEAUX, professeur de la Faculté de Paris, membre de l'Académie royale de médecine (quelques articles de la MÉDECINE DES FEMMES).

DESPLAS et GROONIER (la MÉDECINE VÉTÉRINAIRE).

LOUYER-VILLERMAU, docteur en médecine (quelques articles de MÉDECINE PRATIQUE).

manière utile, le monument dont il a jeté les bases, et qu'il eût sans doute achevé d'une manière glorieuse, si une mort prématurée ne l'avoit enlevé aux sciences médicales, au moment où une nouvelle époque alloit commencer pour elles, sous l'influence de son génie, et par les travaux de ses contemporains les plus célèbres.

MAGENDIE, membre de l'Académie royale de médecine (divers articles sur la PATHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE et la THÉRAPEUTIQUE).

THILLAYE (Auguste), médecin attaché à la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris (la DIRECTION TYPOGRAPHIQUE, et quelques articles de BIOGRAPHIE MÉDICALE).

VILLERMÉ, docteur en médecine (quelques articles concernant l'HYGIÈNE PUBLIQUE et la PATHOLOGIE).

NOTES ET ADDITIONS.

A.

Page xij. *Ne furent pas étrangers à la révolution qu'on s'est opérée dans cette période.*

Les principaux membres de l'Académie de chirurgie, plusieurs médecins de l'ancienne Faculté de Montpellier, de la Société royale de médecine de Paris, peuvent être regardés comme les promoteurs des changements qui se rattachent à la révolution dont nous parlons.

La nouvelle impulsion donnée à la pathologie positive, par l'Académie de chirurgie, le plan de constitution pour la médecine en France, présenté par la Société royale à l'assemblée constituante, les efforts de Dumas de Rochefort, de Delaune, de M. Corvisart, pour établir à Paris les institutions cliniques, à l'exemple de celles de Leyde, de Vienne, de Paris, etc. ; le point de vue philosophique sous lequel Vieussens présente l'anatomie et retravailla l'histoire des sciences médicales, dans les biographies des médecins les plus célèbres du dix-huitième siècle, contribuèrent plus particulièrement à cette même révolution, qui n'eut d'ailleurs tout son développement qu'après la fondation des nouvelles écoles de médecine, par la loi du 14 frimaire an III.

B.

Page xij. *La réunion dans l'enseignement, de la médecine proprement dite et de la chirurgie.*

Cette réunion et l'unité de l'art de guérir, établies, consacrées par l'exemple et par l'autorité des Anciens et de quelques hommes distingués qui apparurent à la fin du moyen âge, avaient été mises hors de doute par une longue suite de discussions relatives à ce point de philosophie médicale, et que LAMARTINIÈRE, QUÉVENAY, A. FÉRET, traitèrent d'une manière si convaincante et si lumineuse. Depuis cette époque, la nécessité de s'opposer à toute espèce de division des médecins par catégories distinctes ou séparées, n'a plus été mise en question, sous le rapport de l'enseignement de la science ou de l'exercice de la profession, que par des hommes incapables d'avoir une opinion sur un pareil sujet, et dirigés par des vues entièrement étrangères aux intérêts de la science et de l'humanité. Il n'en a pas été ainsi de la séparation de la médecine proprement dite et de la chirurgie, envisagée sous le point de vue des travaux académiques.

L'Académie royale de médecine, récemment établie, a même été partagée en trois sections particulières, la section de médecine proprement dite, celle de chirurgie et celle de pharmacie. Plusieurs hommes éclairés qui ont contribué à cette séparation, et dont l'opinion fait sans doute autorité dans les sciences, ont pensé que cette même division, beaucoup plus tranchée, beaucoup plus prononcée, aurait de grands avantages, et qu'il serait utile de faire travailler à part, dans une communauté plus intime d'intérêt et d'occupation, les savans qui se sont consacrés à une branche particulière des sciences médicales. (Voyez le Rapport sur un projet d'ordonnance, relatif à l'Académie royale de médecine, présenté dans sa séance du 4 mai 1821, par une commission chargée de la rédaction de son règlement, et composée de MM. POUJOL, président d'honneur

perpétuel, HALLÉ, PETIT, LEROUX, DALMAS, AZIBERT, RICHARD, DUBOIS, ROBINET, CADET DE GAMBICOURT et ROSTER-COLLARD, rapporteur.

D'après l'opinion que nous rappelons ici, et que nous n'avons pas craint de combattre dans quelques remarques adressées à l'Académie, des objections très-graves peuvent être opposées aux partisans de l'unité ou de la réunion de l'art de guérir, sous le rapport des travaux académiques.

Suivant l'auteur du rapport que nous venons de citer, si tous les objets de la science étoient discutés en commun, c'est-à-dire, si les différentes parties des sciences médicales étoient réunies dans une seule Académie, comme elles le sont aujourd'hui dans les écoles les plus célèbres de l'Europe, il faudroit n'admettre dans cette Académie que des hommes capables de prendre part à ces sortes de discussions; et cette condition ne pourroit être remplie, parce que la science est trop vaste et trop étendue.

La réunion des médecins d'un esprit assez étendu pour embrasser l'universalité de la science, avec les médecins qui se sont le plus spécialement occupés de chacune de ses parties, présenteroit d'autres inconvénients. On ne pourroit point en former un tout homogène, et les sujets qui seroient traités dans les séances d'une compagnie savante ainsi composée, n'intéresseroient qu'un très-petit nombre de personnes à la fois. Les mémoires, les observations, n'attireroient point assez l'attention générale, l'émulation ne pourroit être excitée; enfin, les séances seroient vides et désertes, parce qu'il est dans la nature de l'esprit humain, de ne se remuer que pour ce qui touche à ses intérêts et à ses habitudes.

Ces arguments, en faveur de la séparation des grandes sections des sciences médicales; et des savans qui les cultivent, perdent sans doute beaucoup à se trouver réduits à leur plus simple expression, et privés de la dialectique serrée et pressante avec laquelle leur auteur les a présentés. En les produisant avec un pareil secours, sont-ils aussi convaincans, aussi décisifs que l'on pourroit d'abord le croire? Nous ne le pensons pas, surtout en nous rappelant, qu'avec un peu d'expérience des choses humaines, on doit savoir que l'emploi le plus habile du raisonnement, et l'usage le plus savant des paroles, ne se sont pas toujours trouvés d'accord avec la force des preuves que l'on fait valoir, ou la bonté de la cause que l'on veut défendre.

Sans doute, tous les hommes ne sont pas également disposés, par l'universalité de leur savoir et l'étendue de leur expérience, à s'occuper avec le même succès, et pour les perfectionner, des différentes parties des sciences médicales; mais tous, ou du moins presque tous, d'après l'état actuel de l'enseignement (1), doivent écouter avec intérêt, et comprendre tout ce qui concerne ces mêmes connoissances. Ils fréquentent une Académie qui leur est consacrée, avec d'autant plus d'empres-

(1) Les différentes parties de la médecine se tiennent, et ne forment qu'une seule science, qu'un seul et même art; lorsqu'on les considère, soit dans leur objet (l'étude, la connoissance très-étendue de l'organisation de l'homme, et de ses étrangetés), soit dans leur but (le soulagement et la guérison des malades). Elles sont réunies aujourd'hui dans un seul et même enseignement, non-seulement en France, mais encore dans la plupart des autres écoles de l'Europe, à Edimbourg, Vienne, Göttingue, Berlin, Pavie, etc. etc.

Il est même digne de remarque que, dans la Faculté de Göttingue, une seule chaire de clinique est consacrée à la médecine et à la chirurgie; disposition qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de ce qui existe dans l'école de Paris, pour la clinique de perfectionnement, occupée avec tant d'attention par M. le professeur Dubois, qui donne également son attention et ses conseils dans les consultations attachées à cette clinique, pour les maladies dites chirurgicales, et pour les maladies internes, surtout les maladies étran-

étaient, qu'ils seront plus assurés d'y trouver des objets plus variés ou plus nombreux d'entretien et de discussion : disposition d'esprit qui s'observe même dans la société, où chacun apporte continuellement, et pour l'instruction de tous, les résultats de méditations et de recherches sur différents les uns des autres.

Placé dans une autre situation, resserré dans un domaine particulier de la science, chaque médecin serait nécessairement privé d'une émulation suffisante et d'un désir bien entendu de renommée ; il craindrait, avec raison, de ne trouver parmi ses auditeurs que des confrères qui auroient déjà été trop long-temps occupés des objets dont il vient les entretenir, pour ne pas l'écouter le plus souvent avec tiédeur, prévention et même jalousie.

Un savant professeur qui partage notre opinion, M. Roux, a dit à ce sujet, et d'une manière très-ingénieuse, que les comédiens ne joueraient pas bien la comédie, s'ils avoient seulement des *compagnons pour spectateurs*. Cette remarque s'applique à toutes les professions. Les hommes valent mieux, font mieux quand on les regarde, et ils ne sont bien regardés que quand les spectateurs sont nombreux, variés, et un peu disposés à la curiosité ou à la surprise.

Si de cette manière de raisonner, qui porte sur la nature des choses, et qui s'éloigne autant qu'il est possible de la sévérité des doctrines ou de l'abstraction des théories, nous passons à l'expérience des compagnies savantes qui nous ont précédés, nous y trouverons des preuves non moins fortes en faveur de l'opinion que nous avons adoptée.

Ainsi l'Académie de chirurgie, qui n'étoit pas seulement une Académie de chirurgie, et qui se trouvoit, dans la réalité des choses, une Académie générale de médecine, embrassa dans ses travaux ; au moins en grande partie, l'universalité des sciences médicales, comme on peut s'en convaincre en parcourant ses Mémoires, et les volumes de prix qu'elle a publiés : recueil dans lequel on trouve non-seulement plusieurs Mémoires qui appartiennent ou à la thérapeutique ou à la pathologie générale, mais aussi, et en très-grand nombre, des travaux qui se rapportent à des sujets relatifs à la médecine proprement dite, tels que les *métastases*, l'*engorgement inflammatoire*, l'*action du sublimé corrosif*, l'*inoculation*, le caractère des maladies *scrophuleuses*, etc. etc. (1).

La Société royale, sans avoir entièrement négligé la chirurgie proprement dite et la pharmacie, ne leur a peut-être pas donné assez d'étendue dans les Mémoires qu'elle a publiés ; mais elle desiroit faire beaucoup mieux dans la suite, en exécutant, ainsi qu'elle le proposoit à l'Assemblée constituante, le projet de faire correspondre, dans l'intérêt de la science, tous les chirurgiens, les médecins, les pharmaciens français, et de former ainsi de tous les citoyens qui aiment et qui cultivent la médecine, un grand corps, animé du même esprit dans toutes ses parties, et toujours gouverné par les principes du bien public et de la raison (2).

(1) Nous n'indiquons à dessein, dans cette énumération, que les questions ou les sujets qui ont été traités dans les mémoires ou dans les prix de l'Académie de chirurgie, et qui se rapportent à la médecine proprement dite. Il auroit été également facile de faire erreur, dans cette situation, les excellentes remarques de J. L. Petit, sur les auteurs de la médecine de son temps, que l'on pourroit confondre avec les sujets du jour ; les mémoires de Boerhaave, sur la structure et les maladies de la langue ; l'examen de la question de savoir si l'annon du feu n'a pas été employée par les anciens, ou non employée par les Modernes ; enfin plusieurs recherches et plusieurs observations du même genre, par Morgagni, Minin, Foubert, Lapeyronie, Quereau, David, sur divers points d'anatomie pathologique, ou de pathologie générale.

(2) Voyez le nouveau plan de constitution de la médecine en France, par la Société royale, page 143.

La Société de médecine du département de la Seine, la Société de médecine de la Faculté de Paris, la Société médicale d'émulation, ont cherché à se rapprocher autant qu'il étoit possible de ce noble but; elles ont compris, embrassé toutes les parties de la médecine dans une seule Académie, et si elles ont laissé beaucoup à désirer à la Société qui vient d'être instituée, celle-ci ne pourroit, sans injustice et sans mécompte, refuser de s'éclairer par leur exemple et par leurs traditions.

Si des Sociétés de médecine nous passons à d'autres Académies, nous verrons, sans prendre nos exemples chez les étrangers, l'ancienne Académie des sciences, la section des sciences naturelles de l'Institut, la Société philomatique, s'occuper en même temps de connaissances beaucoup plus étendues que les différentes parties de la médecine, et un seul secrétaire perpétuel préparer les séances de la compagnie, exposer ses travaux, et payer à la mémoire des membres qu'elle a perdus, un juste tribut d'éloges (1).

On nous pardonnera sans doute cette digression, motivée par un intérêt du moment, qui ne sera pas sans influence sur les destinées ultérieures de la science : digression qui d'ailleurs se rattache à une question assez neuve, la question de savoir s'il est utile ou nuisible de séparer ou de réunir les différentes parties de la médecine, sous le point de vue des travaux académiques, entièrement différent du point de vue de l'enseignement et de la pratique, sur lequel il ne reste plus rien à dire, après les auteurs que nous avons cités, et après les savans (2) qui s'en sont occupés de nouveau dans ces derniers temps, et à l'occasion de l'attaque si injustement et si indécemment dirigée contre les nouvelles écoles de France. Voyez, pour plus de détails, les remarques que nous avons citées, et qui ont été lues le 22 mai 1821, à la Société royale; voyez aussi le rapport de la commission, contre lequel ces attaques ont été dirigées (de la page 15 à la page 17).

C.

Page xiiij. *Après avoir dissipé les derniers vestiges de la philosophie scolastique.*

Nous faisons ici allusion aux vestiges de la philosophie scolastique, qui se sont conservés dans quelques Universités, où l'on n'a point encore abandonné l'argumentation latine et l'usage des thèses, qu'il ne faut pas confondre avec les dissertations inaugurales : usage qui, pour le dire en passant, avoit été si justement et si judicieusement attaqué par Ramus, dans le seizième siècle.

D.

Page xiiij. *Des théories fondées sur une application prématurée des sciences physiques ou chimiques ; à la médecine.*

On sait que les systèmes des animistes, des iatro-mécaniciens, des iatro-chimistes, se sont disputés pendant long-temps l'empire de la médecine; qu'ils ont détourné ceux qui la cultivent, de l'esprit

(1) L'ancienne Académie des sciences en particulier, a compté parmi ses membres la plupart des médecins et des chirurgiens célèbres du dix-huitième siècle, qui n'y furent jamais témoins avec distraction ou négligence. Ainsi TAVUT, DONATI, FOURCAT, DELAFAYE, FAGON, MARTELLI, LIGUORI, DUBOIS, etc., qui furent reçus dans cette Académie, se faisoient écouter avec intérêt par leurs plus savants collègues, et même par les gens du monde d'un esprit cultivé, comme on le voit en particulier pour DUBOIS, qui fut admis à parler d'anatomie devant le duc de Montpensier, le frère de Meaux, le duc de Nemours, le duc de Choiseul, etc. etc.

(2) MM. Prouelle, Richeland, Pelloux, etc.

d'observation qui avait dirigé les médecins les plus célèbres de l'antiquité; on sait aussi que la postérité a fait justice de ces vaines hypothèses.

Des nouvelles tentatives ont été faites cependant, dans les temps modernes, pour appeler les médecins dans les voies toujours si fréquentes de l'erreur et des spéculations; ainsi qu'il seroit facile de le prouver, en citant seulement la doctrine de Brown, quelques explications de Fourcroy sur l'action des médicaments, la Nosographie de M. Beumes, le système de pathologie que l'on a voulu établir en Allemagne, sous l'influence des chefs des sectes modernes les plus fameuses, tels que Richter et le célèbre auteur de la *Nouvelle Philosophie* ou de la *Critique de la raison pure*.

L'histoire des sciences médicales rappellera sans doute ces vains et derniers efforts de l'esprit du système, mais elle ajoutera qu'ils ont eu peu de durée et d'influence.

Les médecins ont en général aujourd'hui une sorte d'apathie pour ces jeux d'esprit, qui furent si sérieux dans le dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième. Ils ne repoussent pas avec dédain les lumières qui peuvent leur être offertes par toutes les parties des sciences naturelles; mais ils se rendent plus difficiles pour les explications que l'on voudroit tirer de ces sources un peu étrangères, et s'ils n'acceptent pas une pareille invasion, ils s'empresent d'une autre part d'adopter la marche de ces mêmes sciences, et de chercher, dans leurs communications avec les hommes qui les cultivent, un esprit plus sévère et une raison plus forte et plus étendue.

E.

Page xij. *Les chances pour les découvertes de détail, que le nombre et l'activité de ces institutions (les institutions cliniques) ont multipliées.*

Plusieurs Traités, mais surtout un grand nombre de monographies, de dissertations, de mémoires, peuvent être justement attribués aux institutions cliniques; et sans parler des grands ouvrages de Stoltz, de J. FRANK, ainsi que de plusieurs travaux moins étendus qui ont été publiés dans le cours d'un demi-siècle, en Italie, en Allemagne et en Angleterre; sans parler, dis-je, de ces travaux, et en nous bornant à ce qui concerne la France, nous citerons le Journal et les Œuvres chirurgicales de DRAULT, son Traité des maladies des voies urinaires; le Traité des maladies organiques du cœur, de M. le professeur COVISAAT, son savant Commentaire sur la dissertation de AVENBRUGER sur la percussion de la poitrine, considérée sous le rapport de la séméiotique; le Traité de la phthisie de BAYLE, son Mémoire sur l'œdème de la glotte, ses Observations sur le cancer; l'exposition orale d'une Histoire et d'une Doctrine des lésions organiques, par M. le professeur DUPUYTREN, qui a été recueillie et qui doit être publiée par M. BARETET; le Traité des phlegmasies chroniques de M. BROUSSAIS; la Dissertation classique de MARANDI, sur les irritations; le Traité de l'auscultation médiate de M. LAENNEC, son Mémoire sur les tubercules; les Observations de MM. BAYLE, FOUQUIER, RIONÉ et ROCROUX sur l'apoplexie, et un grand nombre d'écrits du même genre, publiés dans les Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, le Journal de médecine de M. COVISAAT, BORY de SAINT-VINCENT, les Mémoires et le Journal de la Société médicale d'émulation, le Dictionnaire des sciences médicales, son Journal complémentaire, etc. etc.

F.

Page xij. *Ce qu'on appeloit autrefois la pathologie, etc. etc.*

La pathologie, qui fut long-temps enseignée dans les écoles et dans un grand nombre d'é-

vrages, parmi lesquels on distinguera toujours le *Traité de Gaubius*, se bornoit à une suite de lieux communs et de distinctions subtiles, qui n'avoient le plus souvent aucun rapport avec la pratique, et qui ne se rattachent le plus souvent que par des liens imperceptibles, à l'anatomie physiologique. Les choses commencèrent à être considérées sous un autre point de vue, dans plusieurs Mémoires de l'Académie de chirurgie; mais cette révolution ne se répandit pas dans les écoles; on peut même dire que ce n'est que de nos jours, et sous l'influence de l'anatomie générale et de l'anatomie pathologique, que la pathologie a été enfin présentée aux étudiants comme une science de faits, comme une introduction aux études cliniques: introduction dont l'esprit de système, qui ne ment jamais, a voulu s'emparer un moment, avec une apparence d'éclat et de succès.

Les branches de la pathologie qui ont été le plus enrichies et perfectionnées, sont la Nosologie, que M. le professeur PINEL a établie sur des bases nouvelles, et la *Séméiotique*, qui a été redoublée d'un grand nombre de détails, à la percussion de la poitrine et de l'abdomen, à l'auscultation médiate, à l'emploi ingénieux du *Stéthoscope*, de M. Laennec, et à la découverte du *speculum uteri*, pour quelques cas particuliers de maladies du rectum et de l'utérus, etc.

L'anatomie pathologique, que l'on pourroit regarder comme une branche de la pathologie, a surtout fait d'immenses progrès, et sous le rapport des faits qui ont été découverts ou mieux observés, et sous le rapport de leur exposition et de leur coordination, pour lesquelles M. Dupuytren a rendu de si grands services aux sciences médicales.

C.

Page xiiij. Ce que l'on appelloit autrefois la *pathologie* et la *thérapeutique*, etc.

Voies, pour la pathologie, la note précédente. Quant à ce qui concerne la pathologie, considérée comme la science des indications et l'exposition dogmatique ou scientifique des phénomènes constants qui résultent de l'action des médicaments, en faisant abstraction de leur effet causal, qui n'est que la conséquence éloignée et souvent problématique, *voies*, dans ce Dictionnaire, MÉTAPHYSIQUES, MÉTACRITIQUES, MÉTACRITIQUES.

H.

Page xiiij. Une culture plus rationnelle et plus étendue de la médecine légale.

Cette application si importante et si délicate de la médecine, à des intérêts souvent plus chers que la propriété ou la vie, fut entièrement inconnue aux Anciens. On a voulu la faire remonter, chez les Modernes, jusqu'aux sages de Jérusalem et à l'institution des chirurgiens du Châtelet, dans le quinzième siècle. Quoi qu'il en soit, après avoir reçu une première et utile impulsion de PARÉ, de SEVERUS PISCAU, de PICQUET, etc., elle fut cultivée en France, avec distinction, dans le dix-huitième siècle; savoir, par LAROUSSE, dans le supplément de l'Encyclopédie, et d'une autre part, à l'occasion de plusieurs procès célèbres, par ANT. PETIT, LORRE, mais surtout par LUGNAT, dont il est impossible de prononcer le nom sans se rappeler avec une profonde reconnaissance l'intérêt et les lumières qu'il répandit sur les malheurs de Calas, de Mont-Bailly, de Sirven, et de plusieurs autres victimes de l'ignorance et des vices sans nombre de la législation criminelle de cette époque.

Cette même médecine légale, sur laquelle les Allemands ont beaucoup écrit, se trouve enseignée aujourd'hui dans l'école de Paris, avec beaucoup de distinction, par M. ORFÈRE. Son avantage d'être cultivée, dans l'état présent des connoissances, d'une manière plus rationnelle et plus étendue, doit être plus particulièrement attribué à M. le professeur CHAUSSEUR, qui n'est si judi-

cieusement attaché à mouvoir, et par ses préceptes et par ses exemples, comment la médecine légale, considérée comme une véritable expertise, devoit être traitée par les médecins, pour l'honneur de la science et dans le plus grand intérêt de la société. (Voyez, dans cet ouvrage, MÉDECINS JURÉS.)

I.

Page xijj. Sur le traitement des maladies mentales, et sur les rapports du physique et du moral de l'homme.

Plusieurs médecins, entraînés par un goût particulier, ou dirigés par le sentiment de leurs devoirs et par le désir de faire contribuer aux progrès des sciences les emplois qui leur sont confiés, se sont plus particulièrement occupés de cette belle partie de la médecine, que nous désignons indifféremment sous les noms de *médecine morale* et de *médecine mentale*. M. Pinel et J. G. Cabanis ont été en France les promoteurs des études qui répandaient tant d'intérêt et de savoir sur cette branche de la médecine pratique, dont l'état présent n'a plus rien de commun avec ce qu'il pouvoit être à l'époque des premières publications de l'*Encyclopédie méthodique*.

On distingue parmi leurs continuateurs, ou parmi leurs disciples les plus célèbres, MM. Esquirol, PARISOT; ROYER-COLLARD, médecins des principaux établissemens publics, pour le traitement des aliénés; M. DUVESNOY, directeur d'un établissement particulier, et M. ITARD, auquel on doit des observations si judicieuses sur le *Sauvage de l'Aveyron*, et sur le développement gradué du sens de l'ouïe chez certains sourds et muets, auxquels l'audition a été rendue par ce développement. Nous devons rappeler aussi dans cette espèce de commémoration, et sans affecter les dehors d'une fausse modestie, nos propres travaux sur les mêmes objets, mais principalement les ouvrages dans lesquels nous nous sommes proposé d'examiner les différentes questions de médecine mentale, qui se rapportent à la médecine pratique générale (toutes celles qui concernent le délire dans les maladies aiguës, les rêves et la somnambulisme, l'ivresse, les différentes espèces de narcotisme, l'effet des passions, ou de certaines impressions sur les différens organes, et les rapports du physique et du moral, pendant la durée d'un grand nombre de maladies). (Voyez dans ce Dictionnaire, MÉDECINE MORALE et MÉDECINE MENTALE.)





MÉSANGE. (Hygiène.) Paris.

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. *Alimenta*.

Section II. *Animalia*.

On donne le nom de *mésange* à des petits oiseaux très-jolis, qui chantent très-agréablement, & dont on connoît différentes espèces qui sont décrites dans les ouvrages d'histoire naturelle. Sa tête est remarquable par ses belles couleurs noires, jaunes & rouges. La femelle pond jusqu'à neuf œufs, d'un blanc-cendré, parsemé de points rougeâtres.

La chair de la *mésange* n'a rien d'agréable ni de très-succulent; cependant, quand elle est bien grassée, elle donne un aliment sain, & il y a des pays où l'on en mange beaucoup, comme dans la ci-devant Lorraine, où le peuple fait ses délices de la prendre à la glu.

On a cru que la poudre de *mésange* avoit beaucoup de vertus, qu'elle pouvoit guérir l'épilepsie & les maladies des voies urinaires. C'est perdre du temps que de s'occuper de ces futilités.

(MACQUART.)

MÉSARAIQUE, *mesaricus*, du mot grec *mesaios*, *milieu*. Qualification sous laquelle on désigne certaines parties qui appartiennent au système, les veines, les artères mésaraiques. (Voyez ces mots dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.) (L. J. M.)

MESCLERIE. Ce mot est employé dans la même acception que ceux d'éléphantiasis, de ladrerie, &c., que l'on donne à une maladie de la peau & des téguments sous-cutanés, qui est caractérisée par des tubercules, sans altération, un gonflement des téguments que l'on comparoit aux rides & aux plicatures de la peau de l'éléphant. Les nosologistes ont distingué avec soin l'éléphantiasis des Grecs de l'éléphantiasis des Arabes. Plusieurs notions importantes qui devoient se trouver dans les articles LÈPRE ou ÉLÉPHANTIASIS, ayant été omises à ces articles, nous croyons devoir remplir ici cette lacune.

L'éléphantiasis des Grecs constitue ce que l'on a appelé la *lepre tuberculeuse*, lepro qui n'a bien été décrite chez les Anciens que par Arétée, dont la description peut être rapprochée aujourd'hui de plusieurs observations authentiques recueillies par les voyageurs sur les lèpres africaines ou asiatiques, auxquelles on rapporte le mal rouge de Cayenne, l'yaws ou le pau, la ladrerie de Java, &c. (Voyez le mot LÈPRE; voyez aussi ROUGE (Mal) de Cayenne & PIAN.)

MÉDECINE. Tome A.

L'éléphantiasis des Arabes, que l'on appelle aussi la *maladie glandulaire de Barbade*, quoique son siège soit plutôt dans la peau & le tissu cellulaire sous-cutané que dans les glandes, paroît avoir été observée par Rhazès en Asie & en Afrique; mais elle n'a été décrite avec exactitude & détail que chez les Modernes, principalement par les Anglais, & en particulier par Hendy, dont l'ouvrage a été traduit en français par M. Alard, avec un volumineux commentaire.

Plusieurs observations importantes ont été recueillies dans cet ouvrage.

Le sujet de l'une d'elles éprouva les premières atteintes de la maladie dès l'âge de sept ans. Il ressentit d'abord, à la suite de frissons, un engorgement inflammatoire de la cuisse. Ce gonflement augmenta dans la suite, mais sans inflammation, & par accès, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, époque à laquelle la grosseur du membre étoit très-incommode.

Une femme que M. Alard a observée, & dont il a décrit la situation, est à la jambe un gonflement semblable, avec inflammation, qui, dans les dernières années, s'étendit à l'abdomen & au sein, du même côté, sans altération dans l'état général de la santé. Cet engorgement dur, rénitent, n'offroit aucune altération dans la couleur de la peau, excepté vers le bas de la jambe, où l'on apercevoit des rugosités très-sensibles. Cette partie avoit onze pouces de circonférence; le mollet, un pied six pouces; le genou, un pied cinq pouces; le bas de la cuisse, un pied six pouces cinq lignes. La maladie avoit ainsi augmenté graduellement & par accès. A l'époque où elle fut décrite par M. Alard, la maladie étoit en proie à cette pénible infirmité depuis neuf ans, & chaque accès étoit précédé d'une soif inextinguible depuis quatre ans seulement.

Cette maladie que les Arabes ont connue, ainsi que nous l'avons remarqué, règne plus particulièrement en Egypte, dans l'île de Ceylan, au Japon, sur la côte du Malabar, dans l'île de Barbade, &c. On n'a vu quelquefois en Europe, & M. Alard l'a observée & décrite d'après des exemples qu'il a eus sous les yeux.

On aperçoit dans son invasion, dans son développement, beaucoup d'analogie avec la marche que suit la pelagie. Voici la description générale que M. le professeur Picoi en a tracée dans sa *Néographie philosophique*.

L'invasion de l'éléphantiasis est brusque & inattendue; elle n'est ordinairement annoncée par aucune disposition particulière; cependant, après une durée de plusieurs années, une soif inextinguible

A

guible à lieu quelques jours avant leur accés, & leur sert de prélude. On ressent d'abord une douleur plus ou moins vive dans une glande ou sur le trajet des principaux troncs des lymphatiques; presque toujours une corde dure, noueuse & tendue, ressemblant tantôt à un amas de petites phlyctènes, tantôt à un chapellet de petites glandes tuméfies, suit la même direction que les douleurs. Quelquefois cette corde est formée d'une trace rouge qui a la largeur d'un ruban de fil, & d'autres fois elle n'est sensible qu'au toucher. La partie affectée rougit, se gonfle, & prend une apparence érythémateuse, & dans certains cas, phlegmoneuse; l'articulation voisine est maintenant roide, & fléchie par la contraction des muscles fléchisseurs; & si le bas-ventre est le siège du mal, cette contraction produit un sentiment d'étéouffement. La fièvre concomitante doit surtout fixer notre attention; elle présente un frisson prolongé qui a le singulier caractère de redoubler au moindre mouvement; ce frisson est accompagné de nausées & de vomissemens dont il semble inséparable, surtout dans les accès un peu marqués: s'il cesse, on les voit s'arrêter tout-à-coup; s'il recommence, ils reprennent en même temps que lui. Ils ne font rejeter que les boissons qui se trouvent déjà dans l'estomac, ou si, malheureusement, ce viscère ne conteste rien, leur violence fait quelquefois rendre du sang. La bile ne vient qu'en petite quantité & après des efforts réitérés; son passage dans la bouche laisse un goût d'amertume, quoique la langue soit d'une belle couleur. Les nausées fatiguent beaucoup les malades; ils sentent le besoin de vomir, quoiqu'ils ne rendent que de l'eau ou de la tisaie; & lorsqu'ils y parviennent après de violents efforts, leur malaise & leur anxiété diminuent. Le délire survient quelquefois. Les malades sont presque toujours tourmentés d'une soif très-grande, & dans quelques cas, inextinguible: la chaleur qui succède est intense. Les sueurs sont tellement copieuses, qu'elles traversent des linges pliés en plusieurs doubles: elles sont tantôt générales, tantôt partielles, & souvent l'un & l'autre tour à tour. Cette chaleur & ces sueurs ne sont pas séparées du frisson de manière qu'ils ne puissent jamais se confondre. On peut voir cette réaction toutes les fois que le malade se remue pendant le second stade de l'accès; car les douleurs, le frisson, le vomissement, qui étoient un peu apaisés, se renouvellent aussitôt, & ces symptômes se réunissent alors avec une chaleur intense de la peau, & une sueur qui ruiselle du front & de tout le corps. Après une durée qui varie suivant les sujets, cette forte de fièvre laisse dans la partie affectée un gonflement & une inflammation qui continuent pendant plusieurs jours. L'inflammation se dissipe, mais le gonflement, quoiqu'il diminue d'abord avec elle, augmente bientôt de jour en jour dans les deux ou trois mois qui suivent. Au commen-

cement de la maladie, la tumeur paroît édemateuse; mais dans la suite elle devient très-dure, & ne cède pas à l'impression du doigt. Lorsqu'une glande lymphatique a été engorgée, elle reste quelquefois dure & comme squirrheuse, ou bien tombe en suppuration, si le mal a trop d'intensité: cette dernière circonstance peut entraîner la gangrène, ou former dans la tumeur cellulaire des abcès qui donnent lieu à des suppurations abondantes ou à des ulcères très-rebelles. De pareils accidens n'arrivent pas toujours; assez souvent, au contraire, il n'y a qu'une légère rougeur érythémateuse, un simple engorgement oedémateux; la partie n'enfle pas à mesure, & la santé n'est presque pas altérée.

» Cette maladie peut se porter sur toutes nos parties indifféremment; mais elle se fixe de préférence sur quelques-unes. Lorsqu'elle attaque l'intérieur de la tête, l'engorgement qui en résulte se dissipe plus facilement que dans les extrémités inférieures, & il arrive alors un engorgement par le nez, par les yeux ou par la bouche; ou bien il paroît sur la poitrine une éruption de boutons d'une nature particulière, qui rendent sans douleur une sérosité lymphatique. Quelquefois nous l'avons vue fixée à la face, & produire une tuméfaction permanente des paupières, des joues, du nez & des lèvres, ou d'un seul côté de la figure; ce qui donnoit un aspect difforme. Si elle se présente à la langue, elle la tuméfie horriblement, & peut devenir funeste en produisant la suffocation; elle peut aussi causer l'hémiplégie & la mort si elle pénètre dans l'intérieur du crâne. La poitrine & le cou n'en sont pas exempts: elle y est pourtant assez rare, quoiqu'on l'y ait vue donner naissance à des tumeurs épaisses à la nuque, ou bien à un sentiment de pesanteur sur le diaphragme qui gênoit la respiration & indiquoit un épanchement, rendu bientôt plus manifeste par un hydrocèle ou l'œdème des pieds, dont l'apparition soulageoit la poitrine. Cette maladie donne au sein un tel volume, qu'il faut le soutenir avec des bandages passés derrière le cou, & qu'il devient quelquefois le siège de plusieurs duretés squirrheuses, de plusieurs petits ulcères qui tiennent de la nature du cancer & restent incurables. Elle cause sur le bas-ventre des accidens variés & tout-à-fait bizarres: aux douleurs vives, aux anxiétés qu'elle produit d'abord, succèdent une énorme tuméfaction du ventre qui simule l'hydrocèle, ou des grossesses considérables à la marge de l'anus & aux grandes lèvres, ou des engorgemens du scrotum, quelquefois enfin des déjections & un vomissement copieux d'une matière tantôt visqueuse, tantôt séreuse. Quand elle se fixe au scrotum, les douleurs sont très-vives; l'inflammation peut se propager au testicule; & si on ne dirige le traitement de manière à modifier les accidens, elle peut donner lieu à un squirrhe de cet organe; mais la suite la plus or-

dinaire est un épanchement qui donne à la partie un volume monstrueux. Son voisinage fait parfois éprouver à la verge les mêmes accidents : elle peut devenir d'une grandeur démesurée & tout-à-fait extraordinaire. C'est sur les membres que le mal se fixe le plus volontiers ; mais quoiqu'il ait occasionné dans les bras des gonflemens prodigieux, c'est aux membres inférieurs qu'il s'attache de préférence : il leur donne une forme si bizarre & une dimension tellement disproportionnée avec les autres parties, qu'il est impossible de s'en faire une idée sans en avoir vu ; ou du moins sans consulter les dessins que nous avons recueillis. Il fait naître quelquefois autour des malloles de petits ulcères qui deviennent fistuleux, dégorgeant la tumeur en laissant couler une grande quantité de sérosité, & diminuant beaucoup l'incommodité de son poids. Il est rare qu'il attaque les deux jambes à la fois : il se fixe le plus souvent sur un seul côté.

Les moyens de traitement que l'on a employés avec le plus de succès pour rendre plus supportable l'horrible difformité que nous venons de décrire, sont la compression soutenue & seule, ou aidée de quelques sédatifs ou de quelques répercussifs (l'acétate de plomb, le sulfate de zinc). On a cherché surtout à rompre le mouvement périodique de la maladie, soit avec le quinquina seul, soit avec le quinquina associé aux narcotiques.

Les nausées, la tendance au vomissement, qui se manifestent surtout pendant les accès, sont presque toujours symptomatiques & dépendent d'une irritation convulsive. On les calme avec les sédatifs, mais surtout avec l'oxide de zinc.

Les ganglions & les vaisseaux lymphatiques sous-cutanés peuvent être plus ou moins développés, plus ou moins altérés, dans la singulière déformation que présente l'éclipsantisme des Arabes, porté à son dernier période ; mais le siège de la maladie parait se trouver plus particulièrement dans le tissu lymphatique ou cellulaire, dont la dégradation profonde & la dégénérescence consummée peuvent être regardées comme les symptômes caractéristiques de la cruelle infirmité que nous venons de décrire.

Du reste, lorsque cette maladie, que l'on doit placer parmi les affections constitutionnelles ou générales, s'est concentrée sur un membre, vainement on chercherait à borner ses progrès par l'amputation ; la maladie ne tarderait point à se déclarer de nouveau dans une autre partie, & même avec plus de gravité ou de danger que dans la première invasion. (L. J. M.)

MÉSENTÈRE, ou plutôt **MÉSÉNTÈRES**, *mesenterium*, du grec *μεσην*, qui est au milieu, & de *τερον*, intestin. Dénomination sous laquelle on désigne l'expansion membraneuse, les vaisseaux & les ganglions lymphatiques qui se trouvent placés

entre les gros intestins & les intestins grêles, en laissant à leurs différentes portions la liberté suffisante pour exécuter les mouvemens & les ondulatoires nécessaires à leurs fonctions. La partie de ce repli membraneux qui appartient à l'intestin grêle, constitue le mésentère proprement dit.

Le mésentère est un appareil organique très-composé & très-important par la nature de ses fonctions & la gravité des maladies dont il peut être le siège. (Voyez *MÉSÉNTÈRE* dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.) Les maladies des mésentères sont variées & nombreuses.

Les auteurs ont décrit dans différents recueils d'observations, plusieurs exemples de blessures accidentelles du mésentère qui sont toujours de la plus funeste gravité, non-seulement par elles-mêmes, mais par leur complication avec des plaies également dangereuses des autres viscères de l'abdomen.

L'inflammation des mésentères est désignée sous le nom de *mesenterite*. (Voyez ce mot & l'article *ENTÉRO-MÉSÉNTÈRE* qui le suit.)

Les adhérences, les abcès du mésentère, sont des suites souvent inévitables de son inflammation. Les abcès parcourent leurs différents périodes d'une manière plus ou moins rapide, & leur ouverture, qui se fait le plus souvent d'une manière foudroyante, & à la suite d'un effort un peu violent, détermine une mort subite, ainsi que l'on a eu l'occasion de l'observer en plusieurs circonstances. Du reste, dans le cas de ces abcès, les ganglions lymphatiques sont quelquefois dans un état de suppuration, & d'autres fois le tissu lymphatique est le siège de la maladie. Le pronostic de ces abcès se peut être que très-fâcheux, ainsi que celui de la gangrène du mésentère, qui manque rarement de s'étendre à l'intestin. Les tubercules qui ne se développent pas seulement dans le tissu du poulmon, ainsi qu'on l'a vu pendant long-temps, ont été rencontrés plusieurs fois dans les mésentères. Le squirrhe des mêmes organes a beaucoup d'analogie, au moins dans le trouble morbide qui en dépend, avec le carreau ou l'atrophie mésentérique. (Voyez *MÉSÉNTÈRE* dans l'*Atrophie*.) Son développement se fait toujours d'une manière latente & obscure, de telle sorte qu'il est déjà fort avancé lorsqu'on commence à le reconnoître. Morgagni a décrit plusieurs exemples d'une dégénérescence organique aussi redoutable.

Ces squirrhes peuvent occasionner la mort, lorsque, parvenus à leur dernier terme, ils déterminent les accidents les plus graves par leur compression. Il n'est pas sans exemple qu'ils occasionnent la mort avant cette époque, & par les effets d'une dégénérescence véritablement cancéreuse. Il n'est pas également sans exemple de rencontrer dans le mésentère, chez les personnes qui ont succombé à des maladies chroniques, des hydatides, des tumeurs enkystées & des con-

érations calculeuses. Les pestiférés dont le corps présente, après leur mort, ces différentes altérations organiques, succombent ordinairement à des maladies très-longues & très-doulourennes, dont le diagnostic est souvent incertain; maladies que l'on a souvent aggravées par des traitemens peu convenables, & qui sont accompagnées, dans leur dernier période, de marasme, de fièvre lente & de tous les signes d'une altération profonde dans la nutrition. Un reste, ces maladies ont le plus ordinairement commencé par un désordre dans les digestions, par des vomissemens, des nausées, de l'inappétence; lorsque l'on n'a pu les avancer, elles amènent la dureté, le gonflement de l'abdomen & l'amaigrissement des extrémités inférieures.

(L. J. M.)

MESENTEREMPHRAXIS, du grec *mesenterion*, *mesentère*, & du verbe *phrazo*, *j'offense*, *je m'ennuie*. Dénomination sous laquelle quelques auteurs ont désigné l'engorgement du mésentère. (Voyez MÉSÉTERE.) (L. J. M.)

MÉSÉTERIQUE (Atrophie), vulgairement **CARREAU** (*tabes infantium*, *contabescientia infantilis*). On a désigné sous ces différens noms l'engorgement des ganglions lymphatiques chez les sujets scrophuleux dont l'enfance a été négligée, qui ont été nourris avec des alimens grossiers, indigestes, ou exposés à un air froid & humide, &c.

On a remarqué aussi que cette maladie n'étoit pas sans quelque connexion avec les suites de la rougeole, de la scarlatine, ou de la rétro-pulsion d'affections cutanées. Le plus souvent le mal commence par une phlegmasie entéro-mésentérique latente & négligée; l'abdomen des petits malades devient tout-à-coup plus volumineux, la digestion se dérange, & bientôt la nutrition s'altère; il survient des dévoiemens fréquens, des vomissemens glaireux, des urines lactescentes, une débilité progressive, une intumescence toujours croissante du bas-ventre, avec des indurations isolées & sensibles au toucher. Il n'est pas rare de voir les glandes, les ganglions lymphatiques du cou s'engorger dans la première & la deuxième période de cette maladie.

Dans la troisième période, la désorganisation du mésentère augmente de plus en plus, & avec elle l'altération des fonctions nutritives. Il survient une fièvre lente de la nature de celles que l'on a désignées sous le nom de *fièvres héctiques*. L'amaigrissement suit continuellement des progrès, & la maladie se termine, soit par le plus haut degré de marasme & de consomption, soit par une hydropisie ascite. Il n'est pas rare, à l'ouverture du corps, de rencontrer des tubercules suppurés ou non suppurés dans les mésentères, & les ganglions lymphatiques de ces mêmes mésentères beaucoup plus développés que dans l'état

naturel, & offrant tous les signes d'une phlegmasie chronique.

Les enfans les plus exposés à cette maladie sont nés ordinairement de parens scrophuleux ou rachitiques, on d'une mère dont la constitution a été long-temps exposée, pendant la grossesse, à un concours d'altères de causes débilitantes, telles que la misère, une nourriture malsaine ou insuffisante, l'humidité, le découragement & le chagrin inséparable d'une pareille situation.

Une nourrice malsaine, un lait qui n'est point assez abondant ni assez nutritif, une habitation obscure & humide pendant la première enfance, doivent aussi être placés au premier rang parmi les causes du carreau ou de l'atrophie méésentérique. On trouvera plusieurs exemples de cette maladie assez bien exposés dans un Mémoire de M. Baumes, sur un sujet de prix proposé en 1787 par la Société royale de médecine. On doit craindre & soupçonner ces premiers développemens chez les sujets qui, dans l'état de foetus ou pendant la première enfance, ont été exposés à quelques-unes des causes de débilitation que nous avons indiquées, dont les digestions se trouvent habituellement difficiles & irrégulières, avec des retours fréquens de colique, de diarrhée; chez les enfans qui ont le ventre gros, souvent douloureux, qui paroissent plus disposés que les autres enfans, à l'abattement, à la tristesse, mais surtout à une sombre & profonde jalousie. Qui se manifestent chez ces petits malades par une réaction intérieure du physique sur le moral dans leur pénible situation.

Dans certaines circonstances, le carreau, sans avoir été précédé de causes débilitantes, peut devenir la suite d'une péritonite latente, dont les symptômes n'échappent point à des yeux exercés, & que le gros des praticiens, ou plutôt des routiniers, exaspère par une administration indiscriminée de toniques sous les noms de *fondans*, de *dépuratifs*, qu'ils n'ont jamais mérités.

L'application de quelques sangsues à l'anus, une nourriture moins abondante, un régime plus doux, l'emploi d'un émoussatoire, s'il est indiqué, peuvent arrêter une maladie aussi désastreuse, si on les administre à temps, ainsi que je pourrais le prouver par quelques observations prises au hasard dans mon *Mémoire clinique*.

Un reste, quoique le carreau soit placé avec raison parmi les maladies des enfans, on le rencontre parfois chez les adultes, mais surtout chez les femmes d'une complexion scrophuleuse, & dont la santé a été préalablement altérée par des écarts de régime tournés en habitudes, & l'impression soutenue d'un chagrin profond ou d'une grande inquiétude.

Il est bien rare que, dans cette occurrence, l'atrophie méésentérique ne soit pas précédée & occasionnée par une phlegmasie latente qui est méconnue, & que l'on aggrave de la manière la plus rapide par un traitement peu convenable.

Madame D'... , dont mes soins n'ont pu qu'adoucir les derniers momens, s'étoit trouvée dans cette situation. A la suite de plusieurs malheurs & d'affections morales très-pénibles, sa santé s'étoit altérée, sans exciter suffisamment son attention. Elle éprouva pendant long-temps des douleurs vives dans différens points du bas-ventre, mais principalement à la région ombilicale; ses digestions étoient laborieuses, incomplètes, accompagnées le plus souvent de diarrées, de vomissemens, d'insomnie & d'une petite toux symptomatique, &c. Un ulcère scrophuleux qui se manifesta à l'avant-bras, fit prodigier, sous le nom d'*antiscorbutiques*, d'*antiscurbeux*, les excitans les plus énergiques : à la maladie principale, ainsi développée, ne tarda point à se compliquer d'une atrophie mésentérique qui ne laissa plus aucune chance de salut & de guérison.

Madame D'... étoit dans cet état lorsque je la vis pour la première fois à la fin de l'année 1818; d'js elle étoit presque arrivée au dernier terme du marasme. La plaie scrophuleuse de l'avant-bras faisoit tous les jours de nouveaux progrès, & se trouvoit parfois très-douloureuse. La fièvre étoit continue avec des redoublemens nocturnes caractérisés par des accès de chaleur intolérables, commençant par les pieds : symptôme qui augmenta jusqu'au dernier moment de la vie. La langue étoit sèche, la bouche chaude, irritée, douloureuse, au point de rendre la parole difficile. On étoit frappé à la première vue d'une petite toux symptomatique, d'une maigreur extrême, de la coloration ardente des joues, de l'éclat & parfois de l'expression douloureuse des yeux, qui seuls annonçait fuffi pour annoncer un aussi haut degré d'altération & de souffrance.

Les moyens les plus doux, & même des applications répétées de sangsues à l'anus, l'emploi des demi-bains, des émolliens, celui des quarts de lavement mucilagineux & opiacés pour modérer la diarrhée & les douleurs abdominales, apportèrent beaucoup de soulagement, beaucoup de calme, mais ne purent rétablir dans les parties les plus essentielles de la vie une organisation qu'elles avoient perdue; & madame D'... succomba à une maladie qu'il eût été facile d'arrêter dans son invasion, & c'est-à-dire, lorsque l'atrophie mésentérique ne s'étoit pas encore jointe à la péritonite chronique, dont elle devint la suite fâcheuse & la terminaison funeste. (L. J. M.)

MÉSENTÉRIQUE (Fièvre entéro-). On a désigné d'une manière assez peu convenable, sous ce nom, une phlegmasie qui présente d'ailleurs dans son développement une marche & un ensemble de symptômes qui n'avoient pas été observés avec assez de soin avant M.M. Petit, de l'Hôtel-Dieu, & Serres, qui s'en sont occupés d'une manière spéciale. Cette affection ne se distingue, que par des nuances délicates, de plusieurs autres maladies, avec

lesquelles il est aussi dangereux que facile de les confondre (les fièvres adynamiques). On a été redevable de la connaissance exacte de cette maladie, à l'attention avec laquelle on examine depuis quelques années, à l'Hôtel-Dieu, les trois cavités des cadavres, dans les recherches qui sont faites à la suite des maladies aiguës. Dans cette fièvre, les premiers symptômes de lésion se manifestent du côté du canal intestinal. La plupart des malades dont la fièvre entéro-mésentérique s'est développée à l'Hôtel-Dieu de Paris, avoient été progressivement amenés à la nécessité de suspendre leurs occupations par un sentiment général de faiblesse; ils avoient eu de l'inappétence, des mouvemens irréguliers de fièvre & du dévoiement plus ou moins fréquent. Dans presque tous les cas, les symptômes avoient sensiblement été aggravés par les vomitifs, les purgatifs, les sautes graves dans le régime; à leur arrivée, on remarquait leur physiologie adynamique, une expression générale d'accablement, la fécérèssé, l'aspérité de la peau, l'engourdissement des facultés intellectuelles sans délire. La fièvre presque nulle ou très-obscurse se développoit vers le soir sans augmentation de froid ou de chaleur, mais avec un peu de délire. La langue étoit superficiellement recouverte d'un enduit grisâtre & sombre; les sécrétions assez variables ne pouvoient motiver la prostration générale des forces; on occasionnoit une douleur assez marquée, en comprimant l'abdomen à la partie inférieure, surtout vers la droite, entre la crête de l'os des îles & l'ombilic, douleur qui se manifestoit par une rétraction spasmodique des fibres & des ailes du nez; ainsi que par une expression générale de souffrance. A ce degré la maladie cessait quelquefois terminée favorablement; lorsqu'au contraire elle continuait de faire des progrès, tous les symptômes acquéroient plus d'intensité, surtout l'expression adynamique, l'engourdissement, la fièvre & les douleurs abdominales, l'écouit de la langue étoit presque toujours pulvérulent, mais presque jamais noir & épais. A cette époque & auparavant, si la température étoit douce & sèche, & si les forces vitales pouvoient encore être ranimées par un mode de traitement convenable, un peu d'amélioration ne tardoit point à se manifester: il étoit progressif comme la marche des symptômes. On a remarqué surtout que l'appétit reparoissoit dès les premières apparences d'amélioration, & qu'une sueur chaude, abondante, & des urines diploant à plusieurs reprises un sédiment grisâtre & pulvérulent, pouvoient être regardés comme des sécrétions critiques. L'impression du froid, le défaut de régime, une prolongation mal entendue des vésicatoires, troubloient ou arrêtoient la convalescence. Dans les cas mortels, les fonctions du cerveau s'embarassoient de plus en plus, l'œil se trouvoit tourné en haut & comme immobile dans cette direction; la langue tremblante ne pouvoit sortir de la bouche, qui exhaloit

une odeur infecte, &c. Dans les ouvertures de corps, le canal intestinal ne présentait rien de remarquable jusqu'au-delà de l'iléon. A partir de ce point, on apercevoit des taches de couleur vineuse, dont le nombre augmentait en approchant du cæcum. L'intestin, dans toute l'étendue occupée par ces taches, paroissoit avoir plus d'épaisseur. A l'intérieur, & dans cette même étendue, on observoit des plaques plus nombreuses, plus larges, plus remarquables par leur couleur & leur saillie, lorsqu'on les examinoit près de la valvule iléo-séciale. M.M. Petit & Scarro ont fait dessiner ces traces d'altération. Ils remarquent qu'elles étoient formées par un léger boursofflement de la membrane des intestins, & que dans le lieu où elles étoient plus développées, elles se trouvoient saillantes & enfoncées accumulées, au point d'obstruer presque entièrement la cavité de l'intestin. Sur ces mêmes observateurs, les glandes du mésentère correspondantes aux tuméfactions dont nous venons de parler, étoient gonflées, injectées, déformées. Le pærochyme de ces mêmes glandes, moins altéré, a offert aussi beaucoup d'analogie dans sa consistance & dans sa couleur, avec la substance du rein. Toutes les altérations organiques d'ailleurs étoient beaucoup moins sensibles lorsque la maladie avoit marché rapidement vers une terminaison mortelle.

Le traitement employé dans cette maladie doit avoir pour but d'entretenir, d'exciter les forces par des vésicatoires volans, ou toute autre irritation passagère de la peau, ainsi que par les excitans généraux, mais choisis & dirigés de manière à ce qu'ils agissent point au-delà de l'ellomae & des parties voisines. D'après ces vues, on a fait usage avec beaucoup de succès à l'Hôtel-Dieu, de la kina en teinture vineuse ou en infusion aqueuse; de l'éther, de l'esprit de Mindererus, des frictions alcooliques, des sinapismes, des vésicatoires, &c.

Il est évident que la maladie que nous venons de décrire ne doit pas être regardée comme une fièvre essentielle ou primitive, & qu'elle appartient à cette classe de phlegmasies obscures & latentes, dont les effets causatifs ou symptomatiques sont plus évidens que les phénomènes primitifs, dont la connoissance peut seule néanmoins faire assigner d'une part la place de cette maladie dans le cadre nosologique, & fourdir d'une autre part les indications sur lesquelles doit reposer le mode de traitement le plus convenable & le plus efficace.

Les lavans oléagineux que nous venons de citer seront sans doute frappés, comme nous de la justesse de cette remarque, & ne pourront manquer d'en déduire des conséquences sur la nécessité de changer, malgré l'apparence d'une espèce de succès, le mode de traitement qu'ils avoient d'abord adopté (1). (L. J. M.)

(1) *Cassalica M. Gouvier-Lapugne, Dissertation sur le danger des stimulations & des toniques dans le traitement de la fièvre entéro-mésentérique. Thèse de Paris, tome IV, page 109, année 1813.*

MÉSENTERITE. La mésentérite, dans l'état présent des connoissances, consiste bien moins dans une inflammation primitive & immédiate des glandes du mésentère, que dans la phlegmasie du péritoine, dont les duplicatures constituent les replis mésentériques; phlegmasie qui commence d'ailleurs le plus souvent par une entérite aiguë ou chronique, & dont les premiers développemens ne se laissent pas toujours apercevoir par les observateurs les plus exercés.

La mésentérite n'est pas toujours annoncée par des phénomènes, des symptômes bien prononcés pendant la vie. Elle est ordinairement précédée d'une suite de défordres dans les fonctions digestives, mais principalement chez les sujets scrophuleux, & qui par concours de circonstances malheureuses s'éloignent sensiblement du régime & du mode de traitement que leur situation a rendu indispensable. Lorsque la phlegmasie est déclarée, les malades, quel que soit leur âge, ressentent une douleur grave à l'ombilic; ils rendent quelquefois des matières chymées, soit par le vomissement, soit par des évacuations alvines; le pouls est serré & très-fréquent, symptôme qu'il seroit bien difficile de ne pas confondre avec ceux d'une péritonite quelconque. La mésentérite peut se terminer sans doute, & se termine quelquefois par résolution, mais le plus ordinairement par des abcès ou des engorgemens qui deviennent l'origine d'une longue série d'infirmités chroniques.

A l'ouverture du corps des personnes qui succombent à cette maladie, on découvre dans l'abdomen plusieurs altérations organiques plus ou moins étendues, mais principalement des adhérences, des fausses membranes, différens points des mésentères en suppuration, l'endurcissement de certaines portions de ces organes & le gonflement plus ou moins considérable des ganglions lymphatiques renfermés dans leur plicature.

La trophie mésentérique, ou vulgairement le carreau, se développe rarement sans avoir été précédée d'une mésentérite ou d'une inflammation cotéro-mésentérique, ou coïncide avec cette inflammation de telle sorte qu'elle exige le même traitement.

• Lorsque la mésentérite est devenue une affection chronique ou invétérée, ou si elle s'est terminée par différens lésions organiques, on voudroit en vain lui opposer des moyens efficaces de traitement. Avant cette époque, on peut combattre utilement cette maladie par des saignées locales & dérivatives (1), par les fomentations sur l'abdomen, par les moyens les plus propres à rétablir la perspiration cutanée, le repos, le calme des organes de la digestion, & le régime le plus convenable.

Les toniques & les excitans que l'on oppose le

(1) Les venouses scarifiées sur l'abdomen, l'application des sangsues à l'anus.

plus ordinairement à ces maladies, sous le nom de *fondans*, de *purgatifs*, &c., sont presque toujours dangereux, & ne pourroient convenir que dans le cas où la mésentérie étant complètement terminée, auroit laissé dans quelques points du tissu cellulaire des congestions ou des engorgemens contre lesquels un certain degré de stimulation pourroit se trouver indiqué. Dans ces cas, les eaux hydro-sulfureuses d'Enghien, de Barèges, de Canterets, les préparations pharmaceutiques dans lesquelles on combine le savon, de l'acide ammoniac, l'extrait de ciguë, de pissenlit, avec les hydro-sulfures de soude & de potasse, sont les médicaments que l'on peut employer avec le plus d'avantage. On ajostera d'ailleurs beaucoup à leur effet, si l'on peut remplacer un genre d'existence pénible par un genre de vie plus doux, plus salubre, de mauvais alimens par une nourriture bien choisie, & surtout par une diète animale & l'usage des hoifs-fous fermentés. (Voyez *PIASTOTIS*, *MISÉRISME*, *MISÉRISME* (Atrophie).) (L. J. M.)

MESMÉRISME. L'auteur de l'article *MAOVI-TISME* universel, dans ce Dictionnaire, a laissé bien peu de chose à désirer sur les opinions & les pratiques que l'on désignoit alors, & que l'on a continué de désigner sous le nom de *mesmérisme*; c'est dans cet excellent article, que la nouveauté de cette prétendue doctrine se trouve attaquée avec le plus d'avantage, & qu'il est mis hors de doute que le mesmérisme n'a pas même le mérite de l'initiative dans les erreurs de l'esprit humain. Toutefois cette opinion d'un magnétisme universel n'est pas une idée renouvelée des Grecs; remontant à une source beaucoup moins pure & moins éloignée, elle se rattache d'une manière directe à la philosophie du quinième & du seizième siècle; à ces temps d'un demi-savoir, où les systèmes des pythagoriciens ou des platoniciens modernes, s'étant montrés en Europe à la fin du moyen âge, donnèrent une nouvelle forme à la magie, & firent naître tant d'opinions absurdes, sur les rapports sympathiques, les génies, les archées, l'alchimie, l'astrologie, & enfin l'idée d'un magnétisme universel.

Le magnétisme, dans les systèmes de cette époque, étoit conçu comme l'âme du monde, l'esprit de l'univers, un fluide émané de l'étoile polaire, se répandant des astres jusqu'à nous, dans tous les sens, dans toutes les directions, pour donner à différens corps, & principalement à ceux des êtres vivans, des forces d'attraction & de répulsion qui expliquent tous leurs phénomènes. On se borna d'abord à reconnaître seulement ce principe d'action dans les opérations de la nature; on se flatta ensuite de pouvoir en disposer, de l'accumuler, de le diriger à son gré, d'en pénétrer certaines poudres ou certains fluides, de l'appliquer avec succès au principe vital & au système nerveux, avec lesquels on lui supposoit la plus grande analogie.

Mesmer, en rappelant ces idées d'une manière de guérir par irradiation & par influence, vers la fin du dix-huitième siècle, les rallia, les modifia & les produisit dans le grand monde avec les formes les plus favorables à leurs succès. Le magnétisme ne fut plus alors une opinion exposée dans quelques ouvrages, il devint le sujet d'un intérêt général; paroissoit ensuite avec toute l'importance d'une révolution politique ou d'une querelle religieuse, il bronna les amis, divisa les familles, & donna à toutes les discussions dont il fut l'objet, une vivacité & une chaleur qui souvent excitèrent des ressentimens implacables.

Le calme succéda à la fin du siècle à cette agitation; cependant cette opinion du magnétisme ne fut point abandonnée. Depuis quelque temps elle semble même vouloir reparaitre dans le monde avec éclat, & compte aujourd'hui un assez grand nombre de partisans, parmi lesquels on trouve, comme en 1780, quelques personnes recommandables par leur profession, leur rang, leur mérite personnel & la pureté de leurs intentions. Le système du fluide universel inspire d'ailleurs toujours le même zèle & le même enthousiasme aux personnes qui s'en occupent.

Dans l'état présent des connoissances, le magnétisme animal n'est guère regardé, au moins par les savaus de profession, que comme une sorte d'hérésie ou de superstition dans les sciences, qui d'abord a regardé sur un grand nombre de personnes oisives & frivoles, & qui dans la suite s'est porté plusieurs fois sur des hommes d'un esprit plus cultivé. Cette opinion a prévalu dans le monde savant, depuis la publication de l'article que nous venons d'indiquer, & le rapport des commissaires réunis de l'Académie des sciences & de la Faculté de Paris. Lors même qu'on l'adopterait sans restriction, on ne peut refuser d'avouer que le magnétisme présente plusieurs détails qu'il est important de connoître, & que ce qui concerne l'idée que s'en font ses partisans, leurs procédés plus ou moins compliqués, les phénomènes qu'ils lui attribuent, & qu'ils ont observés ou cru observer, doivent au moins être indiqués dans cet ouvrage.

Eloignant à dessein toute espèce de discussion polémique, dans nos recherches sur ce point si curieux de l'histoire de l'esprit humain, nous considérerons d'abord le mesmérisme comme une partie de la médecine mentale, & nous tracerons ensuite d'une manière rapide & générale les principaux faits de son histoire depuis un demi-siècle.

1^{re} PARTIE. Du mesmérisme envisagé comme une partie de la médecine mentale.

Il y a près d'un demi-siècle qu'on s'occupe en France avec activité du *magnétisme animal*, & dans cette période un grand nombre d'ouvrages ont été publiés sur ce système; des recherches, des expériences variées ont été faites; des phé-

nomènes très-complicqués ont été provoqués. L'action nerveuse, la sensibilité animale, tout ce qu'il y a de mobile & d'excitable dans l'organisation, ont été vivement ébranlés par les effets, les influences qu'ont exercés les uns sur les autres, dans leur rapprochement, leur communication physique & morale, un grand nombre d'individus apportant dans les modifications infinies de cette réaction toutes les différences de leur tempérament, de leurs maladies, de leurs passions. Ces faits dépendant du rapprochement & de l'influence réciproque des magnétiseurs & des magnétisés, soit qu'on les considère comme accessoires ou comme essentiels dans le magnétisme, appartiennent à la médecine morale & à la physiologie. Il existe donc dans le magnétisme un point de vue particulier & relatif aux effets de médecine morale dont il a été l'occasion; c'est à ce point de vue, qui a été si bien fait, si bien exposé dans le rapport des commissaires de l'Académie des sciences, que nous nous proposons de nous attacher dans cette première partie. Nous n'examinerons pas d'ailleurs de nouveau la question qui attribue au seul pouvoir de l'imagination & de l'imitation les effets du magnétisme. Il nous suffira, pour les rapporter à notre objet, que plusieurs de ces effets aient présenté avec une grande variété & une grande complication, des phénomènes dépendans de cette réaction dont nous avons parlé, & des exemples aussi curieux que bien constatés de l'influence puissante & soutenue qu'exercent sur les différens organes, & dans le traitement des maladies, l'imitation & les impressions extérieures, une attention forte & intéressée, l'attente d'un grand événement, les mouvemens réunis du désir & de l'imagination.

Le magnétisme, dit M. Bailly (1), n'aura pas été tout-à-fait inutile à la philosophie qui le condamne; c'est un fait de plus à consigner dans l'histoire de l'esprit humain, & une grande expérience sur le pouvoir de l'imagination. Ses résultats les plus frappans concernent l'imitation & l'imagination, deux de nos plus étonnantes facultés; ce sont des faits pour une science encore neuve, celle de l'influence du moral sur le physique.

Considéré sous ce point de vue de la médecine morale, science bien neuve en elle-même, le magnétisme animal présente une suite de phénomènes que le philosophe & le médecin font également intéressés à bien connaître. Le rapport des commissaires de l'Académie des sciences & de la Faculté de médecine réunis, dans lequel ces faits sont démontés & analysés avec une si grande facilité, appartient d'ailleurs bien plus particulièrement à la médecine morale que les autres ouvrages

dont le magnétisme a été l'objet. Avant ce rapport, on n'avait pas encore fait en France une application aussi ingénieuse de la philosophie à la médecine, & de la connoissance approfondie du cœur humain à la recherche des phénomènes les plus déliés & les plus compliqués de l'organisation: recherches que les Galanis, les Pinel & plusieurs de leurs disciples ont faites depuis avec autant de méthode que de détail, & en reculant, de ce côté, les limites des sciences médicales.

Ces savans commissaires, parmi lesquels on doit distinguer MM. Bailly, Franklin, Lavoisier, Darcet, Leroy, suivirent la marche la plus rigoureuse dans cet examen. Leur rapport, quelle que soit l'opinion que l'on adopte relativement à ses conclusions, peut être regardé comme un modèle de logique expérimentale & de recherche de la vérité, dans les circonstances délicates & difficiles où elle parait alternativement le cacher & le montrer, au milieu des ténèbres & des fautes lueurs dont l'environnent les prétentions de la théorie & les espérances de l'imagination. Ils cherchèrent d'abord à connoître les idées fondamentales du magnétisme, & les différens principes de l'appareil employé dans les expériences. Ils remarquèrent que plusieurs de ses malades avoient des mouvemens précipités & involontaires de tous les membres & du corps entier; qu'ils étoient agités & tourmentés de convulsions extraordinaires par leur nombre ou par leur durée; que ces convulsions étoient caractérisées par le trouble, l'égarement des yeux, par des cris perçans, des hoquets, des pleurs, des rires incoordonnés, ce qui étoit précédé ou suivi de larmes, de rêveries, d'une sorte d'abattement & même d'assoupissement. Le moindre bruit imprévu, disaient-ils, cause des treilllemens; & l'on a remarqué que le changement de ton & de mesure dans les airs joués sur le piano-forte influoit sur les malades; en sorte qu'un mouvement plus vif les agitoit davantage, & renouveauit la vivacité de leurs convulsions.

Il y a, disent MM. les commissaires, une salle matelassée & dessinée primitivement aux malades tourmentés de ces convulsions: une salle nommée des crises; mais M. Desluz ne juge pas à propos d'en faire usage; & tous les malades, quels que soient leurs accidens, sont également réunis dans les salles du traitement public.

Les commissaires ajoutent, d'après ce qu'ils ont vu, que chez plusieurs malades l'unus au magnétisme, des accidens variés se répètent, des sympathies s'établissent, & qu'on ne peut méconnoître en eux l'effet d'une grande puissance, dont le magnétisme semble être dépositaire. Ces situations forment ce que l'on appelle, d'une manière assez peu exacte, une crise; c'est-à-dire, un état ou de convulsion, ou d'assoupissement en quelque sorte léthargique, produit par les procédés du magnétisme animal.

La cause présumée de ces effets, le magnétisme, avoit-il

(1) Voyez l'Exposé des expériences faites pour l'examen du magnétisme animal, in par Bailly, en son nom & au nom de MM. Franklin, Leroy, de Bory, Lavoisier, le 4 septembre 1784, pag. 11 & 15.

avoit-il une existence réelle & accessible à la portée des sens & de l'expérience ? Telle fut la question qui occupa ensuite MM. les commissaires. Ils reconnurent d'abord par diverses tentatives, & même par la déclaration de M. Desfont, que le fluide magnétique ne pouvoit être connu par le témoignage des sens. L'odeur qu'on lui attribuoit, les émanations, qui, suivant quelques partisans du magnétisme, deviennent visibles lorsqu'on promène le doigt devant le visage & sur la main, appartiennent à des causes naturelles & connues, indiquées par la commission. Les effets salutaires du magnétisme dans le traitement des maladies, étoient une autre preuve de son existence, que MM. les commissaires ont défendue avec toute la sévérité de l'analyse médicale & du doute philosophique. Ils rappellent à cette occasion, que dans le plus grand nombre des maladies, les guérisons sont spontanées, & que la médecine, plus souvent exaltante qu'agissante, se borne le plus ordinairement à observer la nature, & n'emploie, que dans des circonstances assez rares, des secours puissants & des remèdes énergiques. L'action d'un médicament introduit dans le corps humain, disent-ils, est une force nouvelle combinée avec la force qui fait la vie. Si le remède fait les mêmes voies que cette force a déjà ouvertes pour l'expulsion des maux, il est utile, il est salutaire ; s'il tend à ouvrir des routes contraires & à détourner cette action intérieure, il est nuisible. Mais combien il est difficile de reconnaître & de constater cette efficacité ! N'a-t-on pas vu les régimes les plus opposés conduire à une merveilleuse longévité, & les remèdes les plus contraires produire en apparence la guérison des mêmes maladies ? L'expérience médicale offre donc un grand nombre de circonstances, & surtout, pour le vulgaire, quelque incertitude ; & lorsqu'il s'agit du magnétisme, ajoutent MM. les commissaires, il y a une incertitude de plus : c'est celle de son existence. Or, comment s'assurer par le traitement des maladies, de l'action d'un agent dont l'existence est contestée, lorsqu'on peut douter de l'effet des médicaments, dont l'existence n'est pas un problème ? Les commissaires appliquent ces réflexions à la cure d'un M. le baron de, que l'on cite le plus dans le temps, en faveur du magnétisme ; & rejetant ce moyen d'épreuve, ils rappellent qu'en cela ils font de l'avis de Mefme, qui répondit à un membre de l'Académie des sciences, par qui elle étoit propagée, que c'étoit une erreur de croire que cette espèce de preuve fût sans réplique ; rien, ajoutoit-il, ne prouve démonstrativement que le médecin ou la médecine guérissent les maladies.

Il restoit, pour démontrer le magnétisme, une classe de preuves purement physiques, c'est-à-dire, les effets momentanés de ce fluide sur le corps animal dégagé de toute autre influence. Plusieurs expériences ont été faites pour constater ces preuves,

MÉDECINE. Tome X.

sur les commissaires eux-mêmes, & sur plusieurs malades, dont sept furent magnétisés à Polly, chez M. Franklin, en présence de M. Desfont, & de tous les membres de la commission. Il ne résulta de ces expériences que trois effets seulement qui parurent appartenir au magnétisme, savoir, l'un produit sur la femme Charpentier, l'autre sur François Grenet, & le troisième sur Joseph Ennuyé.

La femme Charpentier, qui déclara avoir deux descentes & une sensibilité de ventre si grande qu'elle ne pouvoit supporter les cordons de ses jupons, assura, lorsqu'elle fut magnétisée par l'application & la pression des doigts, qu'elle éprouvoit de la douleur. Le doigt étant placé devant le visage, elle a dit qu'elle perdoit la respiration. Au mouvement réitéré du doigt du haut en bas, elle avoit des mouvements précipités de la tête & des épaules, comme dans une furieuse mêlée de frayeur, & semblable à ceux d'une personne à qui on jetait quelques gontes d'eau sur le visage. Il sembloit qu'elle éprouvoit les mêmes mouvements ayant les yeux fermés. On lui a porté les doigts sur le nez en lui faisant fermer, & elle a dit qu'elle se trouveroit mal si on continuoit.

Joseph Ennuyé a éprouvé des effets du même genre, mais moins marqués.

François Grenet, qui avoit les deux yeux malades, ent de la douleur & du larmolement quand on magnétisa l'œil gauche qui étoit le moins malade, & ne sentit rien à l'œil droit pendant la même opération.

MM. les commissaires croient pouvoir attribuer à la pression de l'estomac, & à une action morale, mais principalement à l'effet de la surprise, de l'espérance, de l'attention vivement intéressée, ce qui s'est passé chez la femme Charpentier. Ils remarquent aussi, qu'en disant qu'elle éprouvoit des effets, elle croyoit satisfaire davantage les spectateurs.

Quant à François Grenet, les commissaires pensent que la douleur à l'œil gauche & le larmolement qu'il a éprouvé, ont été occasionnés parce qu'on a approché le pouce trop près de cet œil.

MM. les commissaires ont fait ensuite une nouvelle série d'expériences, dans le dessein de déterminer jusqu'à quel point l'imagination peut influer sur nos sensations, & constater si elle peut être en tout ou en partie la cause des effets attribués au magnétisme. En se soumettant eux-mêmes aux expériences, ils avoient déjà remarqué qu'il leur importoit de se dispenser de toute influence morale, ce ne s'observant pas avec trop d'intérêt, & que l'attention qui ne semble qu'une suite de volontés dirigées constamment & sans interruption vers le même objet, peut modifier une partie intérieure du corps dont elle s'occupe, exciter de légers mouvements, y porter de la chaleur, en changer l'état adnel & y produire de nouvelles sensations. Si le magnétisme est une cause réelle & puissante, disoient-ils, elle n'a pas besoin qu'on y

B

penſe pour agir & ſe manifefter ; elle doit pour aînſi dire forcer l'attention , & ſe faire apercevoir d'un eſprit diſtrait même à deſſein. En effet , la devife *croix & peulles* , adoptée par les partiſans du magnétiſme , ne convient guère qu'aux perſonnes qui , cherchant des effets extraordinaires ou des ſenſations nouvelles au milieu des prodiges , aiment mieux ſe laiſſer perſuader par des opinions incertaines qui leur plaiſent , que d'être convaincus par la force de l'expérience & de la vérité , qui ſemble ne pouvoir éclairer leur raifon fans flétrir leur imagination ou affliger leur ſenſibilité.

Conduits par des idées différentes , MM. les commiſſaires ont ſoumis de nouveau onze perſonnes aux expériences magnétiques , ſous la direction de M. Jumelin : une ſeule de ces perſonnes , & c'étoit une femme , a paru ſenſible à l'eſſet magnétique ; mais pour n'avoir aucun doute ſur la réalité de cet effet , on a écarté M. Jumelin & bandé les yeux à cette femme , à laquelle on a fait accraire alors qu'elle étoit magnétiſée. Les effets ont été les mêmes ; elle a ſenti la même chaleur , la même douleur dans les yeux & dans les oreilles , où elle venoit déjà d'en éprouver. Au bout d'un quart d'heure on a fait ſigne à M. Jumelin de la magnéſier à l'eſtomac , où elle n'a rien éprouvé. Les ſenſations ont diminué au lieu d'augmenter. On a pu remarquer en outre que quand cette femme y voyoit , elle plaçoit ſes ſenſations précifément à l'endroit magnétiſé , & que quand elle n'y voyoit pas , elle les plaçoit au haſard & dans des parties très-éloignées. Il étoit donc évident que l'imagination ſeule déterminoit ſes ſenſations.

MM. les commiſſaires ont obtenu le même réſultat de pluſieurs autres obſervations ; & ils reconnoſſent qu'il ſeroit inutile d'objeéter que la manière de magnéſier de M. Jumelin étoit mauvaiſe , ſiſqu'on ne ſe propoſoit pas alors d'éprouver le magnétiſme , mais l'imagination. Dans toutes leurs expériences & leurs épreuves , ils n'ont vu d'autre différence que celle des imaginations plus ou moins ſenſibles.

Un jeune homme d'une conſtitution mobile , & que M. Deſſon lui-même avoit indiqué , fut ſuccéſſivement conduit , les yeux bandés , à quatre arbres non magnétiſés qu'il embralla , & dont le contact lui fit éprouver différens effets , tels qu'une ſueur conſidérable , de la toux , de la douleur de tête , des convulſions , & enfin un évanouiſſement au quatrième arbre , quoique cet arbre , ainſi que les trois autres , ſe trouvoit à une aſſez grande diſtance d'un ſpectateur bien iſolé , que M. Deſſon avoit magnétiſé avec le ſon grand ſuin.

Il ſeroit inutile de rapporter ici pluſieurs autres épreuves qui ſeroient faites par MM. les commiſſaires dans la même intention , & dont ils obtinrent conſamment les mêmes réſultats. Nous citerons cependant le ſuit ſuivant , qui ſemble prou-

ver , ſuivant leurs réflexions , que l'imagination répond à tous les ſens , & que ſa réaction doit être proportionnée au nombre des ſens & à celui des ſenſations.

M. Jumelin avoit parlé aux commiſſaires d'une demoſſelle âgée de vingt ans , à qui il a fait perdre la parole , par le pouvoir du magnétiſme ; les commiſſaires ont répété cette expérience chez lui , la demoſſelle ayant conſenti à ſ'y prêter & à ſe laiſſer hanter les yeux.

On a d'abord tâché d'obtenir le même effet ſans la magnéſier ; mais quoiqu'elle ait ſenti , on n'a ſenti les effets du magnétiſme , on n'a pu parvenir à ſtrapper aſſez ſon imagination pour que l'expérience réuſſit. Quand on l'a magnétiſée réellement , en lui laiſſant les yeux bandés , on n'a pas en plus de ſuccès , on lui a débandé les yeux ; alors l'imagination a été ébranlée à la fois par la vue & par l'ouïe , les effets ont été plus marqués ; mais quoiqu'elle ſe ſentit commença à ſ'appraſentir , quoiqu'elle ſentit de l'embarras à la racine du nez , & une grande partie des ſymptômes qu'elle avoit éprouvés la première fois , cependant la parole ne ſe perdoit pas. Elle a obſervé elle-même , qu'il ſalloit que la main qui la magnétiſoit au front deſcendît vis-à-vis du nez , ſe ſoulevant que la main étoit ainſi placée lorsqu'elle a perdu la voix. On a fait ce qu'elle demandoit , & en trois quarts de minute elle eſt devenue muette ; on n'entendoit plus que quelques ſons inarticulés & ſourds , malgré les efforts viſibles du goſier pour pouſſer le ſon , & ceux de la langue & des lèvres pour l'articuler. Cet état a duré ſeulement une minute : on voit que ſe trouvant précifément dans les mêmes circonſtances , la ſéduction de l'eſprit & ſon effet ſur les organes de la voix ont été les mêmes. Mais ce n'étoit pas aſſez que la parole l'averait qu'elle étoit magnétiſée , il a fallu que la vue lui portât un témoignage plus fort & plus capable de l'ébranler ; il a fallu encore qu'un geſte déjà connu réveillât ſes idées. Il ſemble que cette expérience montre merveilleuſement comment l'imagination agit , ſe monte par degrés , & a beſoin de plus de ſecours extérieurs pour être plus efficacement ébranlée.

Cette conſclusion de MM. les commiſſaires eſt-elle bien fondée , & conforme aux phénomènes qu'elle paroît expliquer ? Il ſeroit difficile peut-être de l'admettre ſans d'énator , à ſorcer de l'étendre , l'influence de l'imagination. Loin de dépendre de cette opération active de l'eſprit , le ſait corieux que nous venons de rapporter n'appartiendrait-il pas plutôt à la claſſe aſſez nombreuſe des dérangemens nerveux qui ſont occasionnés par une liaiſon automatique & involontaire de pluſieurs mouvements organiques morbides , tels que le frifſon , le vomifſement & différens tic , avec certaines idées ou certaines ſenſations particulières ? mode de léſion que l'on ne parvient à guérir qu'en faiſant adroitement cefſer cette aſſociation vicieuſe. Dans une complexion plus mobile , une ſeule des trois

impressions dont parlent les commissaires, auroit produit le mutisme, qui n'a pu avoir lieu chez la demoiselle de *** qu'au moment où la sensation des doigts du magnétisme qui l'avoit touchée au front & à la racine du nez, rappelle que la main étoit ainsi placée lorsqu'elle perdit la voix pour la première fois.

Dans un rapport secret & rédigé pour le Roi, les commissaires présentèrent des remarques qui appartenaient également à la physiologie & à la médecine morale, en considérant le magnétisme dans ses rapports avec les mœurs, & la complication avec les impressions qui pouvoient dépendre de la différence des sexes. Donnant peut-être trop d'importance à cette cause, ils en exigèrent les effets, & se laissèrent aller involontairement, dans l'excès de leur sévérité, au plaisir de tracer des travaux agréables. On en jugera par les citations suivantes : « La grande mobilité des nerfs fait que les femmes sont plus disposées à l'imitation : il n'est pas d'en mettre une en mouvement, toutes les autres le partagent ; c'est ce que les commissaires ont observé plusieurs fois : dès qu'une femme tombe en crise, les autres ne tardent pas d'y tomber. Cette organisation fait comprendre pourquoi les femmes ont des crises plus fréquentes, plus longues, plus violentes que les hommes ; & c'est à leur sensibilité des nerfs qu'est dû le plus grand nombre des crises : il en est quelques-unes qui appartiennent à une cause cachée, mais naturelle, à une cause certaine des émotions dont toutes les femmes sont plus ou moins susceptibles, & qui, par une influence éloignée, en accumulant ces émotions, en les portant au plus haut degré, peut contribuer à produire un état convulsif qu'on confond avec les autres crises ; cette cause est l'empire que la nature a donné à un sexe sur l'autre pour l'attacher & l'entraîner. Ce sont toujours les hommes qui magnétisent les femmes ; les relations alors établies ne sont sans doute que celles d'une maladie à l'égard de son médecin ; mais ce médecin est un homme ; quel que soit l'état de la maladie, il ne nous dépouille point de notre sexe, il ne nous dérobe pas entièrement au pouvoir de l'autre ; la maladie en peut affaiblir les impressions sans jamais les anéantir. D'ailleurs, la plupart des femmes qui vont au magnétisme ne sont pas réellement malades ; beaucoup y viennent par curiosité & par amusement ; d'autres qui ont quelques inconvénients n'en conservent pas moins leur fraîcheur & leur force : leurs sens sont tout entiers, leur jeunesse à toute sa sensibilité. Elles ont assez de charmes pour agir sur le médecin ; elles ont assez de santé pour que le médecin agisse sur elles. »

Ces remarques & d'autres détails plus vifs, plus animés, dans lesquels entrent les commissaires, contiennent peut-être aux faits dont ils furent témoins, mais on ne peut les rappeler aujourd'hui

pour en conclure d'une manière générale que le magnétisme seroit dangereux pour les mœurs. Les partisans du magnétisme auroient le droit de se plaindre de cet excès de sévérité, qui seroit une véritable injustice, & pourroient opposer à cette vigoureuse conclusion, qu'une femme fust pour magnétiser une autre femme ; que l'âge, les maladies, la situation morale du plus grand nombre des femmes qui se font magnétiser, les mettent à l'abri de l'influence dont parlent les commissaires, ou qu'enfin la moralité si vére & délicate des partisans les plus connus du magnétisme ne permet pas de les soupçonner de chercher à mêler un effet étranger aux intentions bienveillantes qui les dirigent.

II^e. PARTIE. De l'état présent du magnétisme ou mesmérisme, & de son histoire depuis le fin du dix-huitième siècle.

Dans l'état présent des connaissances, le magnétisme animal n'est guère regardé, au moins parmi les savans de profession, que comme une sorte d'hérésie ou de superstition dans les sciences ; comme une maladie qui d'abord a régné sur un grand nombre de personnes oisives ou frivoles, & qui ensuite a attaqué parfois plusieurs hommes recommandables par la culture de leur esprit & la gravité de leur profession : cette opinion a prévalu dans le monde savant, depuis le rapport des commissaires réunis de l'Académie des Sciences & de la Faculté de médecine de Paris. Lors même qu'un l'adoperoit sans restriction, on ne peut refuser d'avouer que le magnétisme présente plusieurs détails qu'il est important de connaître, & que ce qui concerne l'idée que s'en font ses partisans, leurs procédés plus ou moins compliqués, les phénomènes qu'ils lui attribuent & qu'ils ont observés ou cru observer, doivent au moins être indiqués dans l'histoire de la physiologie.

Le magnétisme ne se borne pas, comme plusieurs autres systèmes, à des spéculations scientifiques, à des conclusions littéraires ou philosophiques ; il excite en outre ses partisans à l'action, au mouvement ; il a fait faire un grand nombre d'essais, d'expériences. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (1), il a mis en rapport, en communication sympathique un grand nombre de personnes, & les a fait agir & réagir les unes sur les autres avec toute la variété & la complication que pouvoit occasionner dans ces phénomènes la différence de leurs tempéramens ou de leurs maladies. Les discussions que le magnétisme a provoquées, ont fait en outre examiner plusieurs questions très-importantes ; elles ont forcé en quelque sorte la physiologie à considérer & analyser dans toutes leurs circonstances, & malgré leur complication,

(1) Voyez le *Mémorial* du 21 avril 1813, pag. 30.

plusieurs phénomènes, soit constants, soit accidentels & particuliers des fonctions cérébrales ou du système nerveux, ainsi que l'influence si variée des sensations & des fonctions intellectuelles & morales sur l'état de l'organisation.

Un médecin philosophe a cherché à démontrer dans une dissertation académique, que les erreurs en médecine n'ont pas été sans utilité; que les hypothèses les plus téméraires, les fautes les plus graves, ont quelquefois conduit à des résultats dont la science s'est enrichie (1).

La théorie & les systèmes du général troublent à la vérité le calme & la paix, qui doivent régner dans l'empire des sciences; mais ils y portent l'activité, l'intérêt, le mouvement des grandes passions, & souvent ils ont contribué sous plusieurs rapports au progrès de l'esprit humain. Nous ajouterons que les hommes à imagination vive, à sensibilité exaltée, découvrent parfois des faits curieux, en faisant des recherches & des expériences que des esprits plus sages n'auraient pas même tentées. Ces hommes pourroient être comparés à des instrumens de physique si délicats, qui se dérangeant facilement, mais dont la finesse, la grande susceptibilité, sont faire des observations qui auroient été impossibles avec des instrumens plus sûrs, mais moins sensibles.

Ces réflexions nous avoient engagés à lire avec attention les principaux ouvrages sur le magnétisme depuis 1784, dans le dessein d'en retirer ce qui nous paroitroit devoir appartenir plus particulièrement à l'histoire des sciences médicales en France, & principalement à la section de cette histoire relative à la médecine morale & à la physiologie (2).

L'ouvrage que M. Delenxe vient de publier nous a paru offrir d'une manière à la fois plus méthodique & plus complète ce que nous cherchions dans ces nombreux écrits, dont le magnétisme a été l'objet à la fin du dix-huitième siècle & au commencement du dix-neuvième. Nous nous sommes dès-lors attachés à la lecture de cet ouvrage, & le consultant dans ses rapports avec notre travail, nous lui avons consacré cette notice historique, dans laquelle nous nous permettons de loin en loin quelques réflexions avec tous les égards & la réserve que commandent la moralité distinguée de l'auteur, le mérite de ses ouvrages antérieurs & la pureté de ses intentions.

Son ouvrage n'est pas, comme il l'appelle, une histoire critique, mais une apologie raisonnée, une exposition complète, ou, si l'on veut, un traité théorique & pratique du magnétisme; on voit évi-

demment que l'auteur se plaît à donner & à justifier sa profession de foi dans cet ouvrage. Écrivain élégant & sage, il cherche autant qu'il lui est possible à paraître impartial, & à se défendre d'un schisme indiscret, & de cette chaleur que l'on reproche en général aux membres des nouvelles sectes & aux partisans des nouveaux systèmes. Dans tout le cours de son ouvrage, M. Delenxe paroît très-éloigné d'une semblable disposition d'esprit; il montre moins l'enthousiasme d'une foi nouvelle, que le calme & la sécurité d'une croyance ancienne bien éprouvée & tout-à-fait inébranlable. Une introduction écrite avec élégance & simplicité fait connoître son objet & ses intentions. En venant un peu tard, il s'est proposé d'apprendre ce qu'il faut croire, d'être un témoin de plus, de payer son tribut, comme il le dit lui-même, de dire ce qu'il a vu, de rapporter ce qu'ont vu des hommes dignes de foi, de montrer l'accord de toutes les expériences, d'examiner les objections & d'y répondre, afin d'analyser les ouvrages qui ont précédé le sien, & de critiquer les auteurs que l'excès de leur zèle a portés trop loin.

M. Delenxe annonce aussi qu'il a désiré donner quelques avis aux magnétiseurs, sur la conduite qu'ils doivent tenir envers ceux qui demandent à être éclairés, & envers les incrédules: intention à laquelle il joint le projet de parler de l'utilité & des inconvéniens du magnétisme, ainsi que de ce qu'il faut penser sur une association avec les doctrines mystiques.

M. Delenxe ne s'est point dissimulé le genre d'inconvéniens & de dangers auxquels il s'expose en publiant son ouvrage, sans avoir rien à gagner ni pour sa réputation, ni pour aucun des avantages qu'on recherche dans le monde.

Ce qu'il dit dans cette même introduction des préjugés des savans & de leur opposition aux doctrines nouvelles, nous doit exciter quelques remarques. « J'ai eu l'avantage, dit M. Delenxe, de vivre avec les savans, & j'ai appris à respecter le caractère moral de ceux qui s'occupent de la recherche de la vérité, & qui, loin des passions du monde, cultivent les sciences dans la retraite; mais j'ai reconnu que s'ils sont exempts des préjugés des autres hommes, ils ont quelquefois des préjugés particuliers qui naissent du trop d'étendue qu'ils donnent à certains principes, & de la répugnance qu'ils éprouvent à faire abstraction des opinions reçues pour examiner des opinions nouvelles. » Bergasse, avant M. Delenxe, avoit observé, & d'une manière plus générale, que l'esprit à ses habitudes comme le cœur, & que les habitudes de l'esprit sont ses opinions plus ou moins profondes, selon qu'elles sont plus ou moins travaillées. Il ajoutoit que les savans travaillent plus en général leurs opinions que les autres hommes. « L'esprit, disoit-il, a donc des habitudes plus profondes, plus difficiles à détruire. À l'apparition d'un système nouveau,

(1) Voyez la Dissertation de Vandooveren, publiée sous le titre: *Sermo de erroribus medicorum sed utilitate non carentibus*, in-4°.

(2) Voyez pour l'annonce de ce travail, le n° 282 du *Moniteur*, année 1812.

» ils ont, pour l'adopter, plus de préjugés à vaincre.
 » Il en est peu parmi eux qui n'opèrent sur la vérité qui leur est présentée avec toutes leurs habilités, c'est-à-dire, avec tout ce qu'il faudroit abandonner pour bien voir & bien connoître : peu qui ne portent comme involontairement leur opinion dominante dans l'examen auquel ils se livrent, à peu près comme on mêle son caractère partout & jusque dans les actions de la vie où il devoit se montrer le moins.

Pour affaiblir d'ailleurs l'autorité des savans & relever Mesmer par des rapprochemens honorables, Bergasse rappeloit à la suite de ces réflexions les persécutions dirigées à différentes époques par Christophe Colomb, Copernic, Harvée, Kepler, Descartes, Galilée, &c.

Ces remarques peuvent, jusqu'à un certain point, expliquer la résistance que les savans opposent d'abord à un nouveau système, on même à une découverte, surtout lorsqu'elle leur est présentée avec l'apparence du merveilleux, & par des hommes qui, comme la plupart des partisans du magnétisme, paroissent tout-à-fait étrangers à la culture des sciences & à l'observation éclairée & attentive de la nature. Mais lorsque cette même opposition se soutient pendant près d'un demi-siècle, & qu'avec le temps elle semble plutôt se fortifier que s'affaiblir, elle ne peut plus s'expliquer par ces préjugés, par ces habiudes d'esprit que l'on suppose aux savans; elle devient une des présomptions les plus fortes contre les doctrines ou les systèmes qu'elle défavoue. C'est du moins ce qu'on apprend par une étude attentive & approfondie de l'histoire des sciences aux époques les plus remarquables de leurs progrès, & dans les circonstances où d'importantes découvertes viennent tout-à-coup en reculer les limites : ainsi la découverte de la circulation, repoussée d'abord avec violence par le plus grand nombre des médecins, ne tarda point à compter parmi ses partisans des savans du premier ordre, tels que Roger Bask, Hignior, Wallena Pecquet, &c., qui la soutinrent & la firent prévaloir malgré la résistance de Riolan de Primercio, de Liceti, &c., même avant l'époque un peu plus récente où Bartholin & Vanhorne l'introduisirent dans les écoles. De nos jours, le galvanisme & la vaccine, qui dans leur commencement durent paroître aussi extraordinaires que les effets du magnétisme, ont été accueillis avec le plus grand empressement par tous les physiciens, & ont été depuis ce jour l'objet constant de leurs recherches & de leurs observations. Le magnétisme, au contraire, n'a compté, au moins en France, depuis près d'un demi-siècle, parmi les partisans, que des hommes presque tous étrangers à l'étude des sciences; & cette circonstance vraiment défavorable ne peut être atténuée par l'observation de Bergasse & de M. Deleuze, sur la cause de l'espèce de résistance que les savans opposent aux opinions nouvelles.

Quoi qu'il en soit, les opinions des magnétiseurs, le développement de ces opinions, les procédés qu'ils emploient, ce qu'ils croient, ce qu'ils pratiquent, ce qu'il y a peut-être de réel, & à leur sujet, dans leurs expériences, &c. &c., est exposé dans l'ouvrage de M. Deleuze, beaucoup mieux du moins que dans les nombreux écrits qui l'ont précédé, & qui furent principalement publiés à l'époque & à l'occasion du rapport des commissaires réunis de l'Académie des sciences & de la Faculté de médecine de Paris.

L'auteur commence par donner quelques détails historiques sur le magnétisme. Suivant lui, on employa avant Mesmer le magnétisme sans savoir ce qu'on faisoit, sans distinguer ce qui lui étoit dû, de ce qui dépend de circonstances étrangères, sans annoncer aux hommes qu'ils pouvoient le diriger de manière à le faire servir au soulagement & à la guérison des maladies. Les observations de Mesmer, dit-il, le conduisirent à ce résultat, & c'est vraiment à lui que l'on doit la connoissance du magnétisme (1). M. Deleuze nous le montre au milieu de ce premier siècle, qui augmenta ses forces; il avoit cru reconnoître d'abord dans l'homme la faculté d'agir sur les organes de ses semblables par des moyens fort simples en eux-mêmes, mais dont l'efficacité, suivant lui, dépendoit de la volonté de celui qui les emploie. Il lia ses observations à une théorie qu'il avoit peut-être imaginée, & crut alors qu'en dirigeant d'après ses procédés l'agent universel de la nature qu'il avoit découvert, il guérirait tous les maux, & pourroit même exercer une grande influence sur la société.

M. Deleuze ne dissimule point ce qu'il peut y avoir de faux ou d'exagéré dans ces idées, & dans les premiers effets attribués au magnétisme, accompagnés de pratiques puériles & dangereuses, & associés à une philosophie occulte qui, dans ce qu'on en pouvoit connoître, le montrait contraire aux principes d'une saine physique. Ce fut alors que le gouvernement crut devoir soumettre le magnétisme à la sollicitude & à l'examen des savans. M. Deleuze rappelle cette circonstance, ainsi que le rapport des Académies, qui condamnèrent le magnétisme, & l'espèce de mouvement & d'intérêt que cet événement imprima dès-lors à son histoire. Ce fut dans ces circonstances difficiles pour Mesmer que s'ouvrit la fameuse souscription qui fut remplie, & qui fit verser, à ce qu'on assure, entre ses mains une somme de plus de 100,000 écus pour exposer sa doctrine. M. Deleuze fait connoître ces détails,

(1) Nous avons, dans un article précédent, énoncé une opinion différente sur l'ancienneté du magnétisme. Nous croyons inutile de la rappeler. Nous ajoutons seulement que, dès l'année 1761, il fut soutenu à la Faculté de médecine de Paris, sous la présidence de Péloux, une thèse sous ce titre : *An morborum duntaxat curatio magnetica*, & dont la conclusion étoit : *Non ergo duntaxat morborum curatio magnetica*.

la formation des sociétés d'harmonie chargées de propager le magnétisme ; la querelle qui s'engagea entre Mesmer & plusieurs de ses élèves, qui attaquèrent leur maître de la manière la plus violente ; l'abaissement général, au milieu de ces dissensions sur les effets du magnétisme, & tous les moyens de le produire ; enfin, la cessation de toute cette polémique au moment de la découverte, de ce que les parisiens du magnétisme appellent le *fonnambulisme*.

M. Deleuze, qui s'est d'abord montré hésitant, devint ensuite, & sans s'en apercevoir, un apologiste du magnétisme, d'autant plus zélé qu'il veut faire triompher une doctrine qui lui parait le lien de toutes parts aux plus grands intérêts du magnétisme. Suivant lui, le nombre des témoins favorables au magnétisme, dont les attestations sont imprimées, va au-delà de mille, & plus de trois cents personnes, à la connaissance, s'occupent comme lui du magnétisme, & en ont ressenti plus ou moins les effets.

Il rappelle ensuite, pour les détruire, les rapprochemens qu'on a voulu établir entre Mesmer & Cagliostro, & annonce qu'il faut rapporter au magnétisme plusieurs des phénomènes qui eurent lieu jadis à Saint-Médard, sur le tombeau du diacre Paris ; il ajoute que le magnétisme, quoique suivi avec moins d'ardeur, n'a jamais été abandonné ; qu'un grand nombre d'hommes s'en occupent silencieusement & en silence, & qu'il s'est formé dans plusieurs villes de l'Europe des sociétés consacrées à sa propagation & à ses progrès.

Telle est l'exposition abrégée des détails que M. Deleuze fait connoître, & qui font des matériaux pour l'histoire du magnétisme. On y vaudrait peut-être plus d'exatituda & de développement pour ce qui concerne le rapport des Académies. Les lecteurs, dont l'auteur ambitionne le plus le suffrage, lui reprocheront aussi d'avoir appelé Mesmer un homme de génie, un homme extraordinaire, & d'avoir parlé avec trop d'indulgence de sa conduite à l'époque de la fameuse souscription, lorsqu'après avoir fait payer fort cher la révélation d'une vaine théorie, il se plaigait qu'on publiât ses principes, voulant garder à la fois ses découvertes & l'argent de ses souscripteurs.

L'auteur de l'article *Magnétisme* de l'Encyclopédie méthodique a rappelé quelques circonstances relatives au motif & aux premiers essais de Mesmer, persuadé que c'est surtout dans ses premiers é tâmens qu'il est plus fur, plus facile de juger un système, & que c'est dans les premiers pas que les intentions d'un auteur sont à découvrir. Nous aurions désiré que M. Deleuze eût rappelé, ne fût-ce que pour le réfuter, ce que l'on rapporte dans cet article sur la croyance de Mesmer à l'influence des astres, sur la thèse soutenue en conséquence de cette opinion en 1766 ; sur l'emploi qu'il fit d'abord des aimans, que le P. Hell avait mis en usage avant lui, ainsi que sur l'intention marquée

de tirer parti de la disposition où Gassner avoit trouvé les esprits en Allemagne, & le rapprochement entre les exorcismes, les procédés de ce Gassner & le principes du magnétisme (1).

Nous aurions voulu encore que M. Deleuze, en parlant du rapport des commissaires de l'Académie, ne leur eût point supposé l'arrière-pensée, le motif de détonner les esprits d'un agent qui avoit trop d'inconvénients, & de laisser se cultiver lentement & en silence une prétendue découverte dont ils avoient si positivement nié la réalité. Cette politique subalterne, cette conduite timide & anormale de voir aussi peu philosophique ne peuvent sûrement pas être attribuées à des hommes qui s'appeloient Bailly, Franklun, Lavoisier, &c.

Après avoir exposé les détails que nous venons de rappeler, M. Deleuze, qui porte dans son sujet toutes les ressources d'un esprit cultivé, applique au magnétisme les principes de la critique historique, indique les expériences à faire pour se convaincre, les procédés, les pratiques les plus convenables, l'emploi médical du magnétisme & le phénomène du *fonnambulisme*. Suivant les témoignages qu'il réunit & les faits qu'il compare, il ne craint pas d'avancer que tout homme de bon sens qui en aura pris connoissance, sera convaincu qu'il existe dans le magnétisme quelque chose de réel, & qui ne peut être produit par aucune autre cause. Laisant d'ailleurs tous les raisonnemens, toutes les opinions, toutes les théories, il veut que l'on fasse soi-même les expériences magnétiques, & que dans le dessein de réussir plus promptement, on se retire à la campagne ; que l'on s'exerce point l'imagination des personnes mises en expérience ; que l'on touche chaque jour, en continuant pendant une semaine, deux malades que l'on aura choisis, sans jamais oublier les conditions suivantes, qui sont indispensables :

*Volonté active vers le bien ;
Croyance ferme en sa puissance ;
La volonté dépend de vous ;*

formules qui paroîtront peut-être extraordinaires ; cependant M. Deleuze remarque que la foi dont on a tant parlé n'est point essentielle au magnétisme ; & il ajoute dans ses avis aux magnétiseurs : *soyez calmes & patients ; ne détonnez point votre attention ; pensez à ce que vous faites, sans vous inquiéter de ce qui résultera ; imaginez qu'il est en votre pouvoir de prendre le mal avec la main & de le jeter de côté.*

Il ne conseille point du reste d'avoir recours à la chaîne, au baquet, aux autres moyens employés par Mesmer, & assure que sur un nombre dénombré de personnes bien portantes, les neuf

(1) Voyez *Encyclopédie méthodique, Dictionnaire de médecine*, tom. 1, 2^e part. pag. 479 & suiv.

disièmes font peu ou point sensibles au magnétisme. Il décrit plusieurs des phénomènes présentés par les personnes magnétiques, & principalement les sensations irrégulières de chaleur ou de froid, d'accablissement des pieds, d'assoupissement, du mouvement d'un fluide qui coule sur eux comme de l'eau, &c. Il peult qu'on a le droit de regarder comme des visionnaires tous les magnétiseurs, si l'on n'obtient aucun effet après avoir passé six semaines à faire des expériences, en remplissant exactement les conditions qu'il a prescrites. Il donne ensuite des conseils sur la conduite que les personnes convaincues doivent tenir avec les incrédules, après avoir remarqué que ce n'est pas croyez & veuillez qu'il faut dire, mais veuillez & croyez, & qu'en dernière analyse les préceptes sur le magnétisme peuvent se réduire à celui-ci : touchez attentivement des malades, avec la volonté de leur faire du bien, & que cette volonté ne soit distraite par aucun autre idée.

M. Delenze, qui d'abord avait refusé de s'engager dans toute discussion théorique, se voit obligé d'admettre un fluide magnétique, ainsi que les moyens de le communiquer, de l'accumuler, de le diriger. Ignorant sans doute que les changements morbides dans l'action nerveuse qui ont le plus de rapport avec ce que la physiologie peut décrire de réel dans les effets du magnétisme, occasionnent un grand nombre de perceptions fausses & de sensations erronées, il est arrivé à cette singulière idée d'un fluide particulier, parle témoignage des somnambules, qui disent voir un fluide lumineux & brillant sortir avec force de la tête & des mains de la plupart des magnétisés.

Ce qui suit fait connaître les procédés employés dans le magnétisme; on y apprend qu'il se partage déjà en trois écoles, celle de Mesmer, celle de M. Puységur & celle des spiritualistes. On y apprend en outre ce qu'il faut entendre en langue magnétique par des passes, mettre en rapport, magnétiser à grand courant, ainsi que plusieurs pratiques & plusieurs objets de détail pour lesquels nous renvoyons à l'ouvrage même, que nous ne devons considérer dans cette notice que d'une manière générale, & sous un point de vue historique.

Dans toute cette partie de son ouvrage, M. Delenze montre avec tout le zèle du prosélytisme le désir de convaincre les personnes qui refusent de croire au magnétisme par leur propre expérience & par des observations qu'il les engage à faire elles-mêmes sans appareil & en silence; c'est dans ce dessein qu'en pratiquant ensemble il décrit tout ce qu'il faut pour magnétiser relativement à l'attitude du magnétiseur & du magnétisé, au mode du contact, à l'application des mains, à la direction des mouvements & des gestes qu'il faut toujours faire de haut en bas, & en écartant les mains lorsque l'on revient vers la tête. L'auteur donne en outre les renseignements les plus étendus sur

plusieurs particularités que sa pratique lui a apprises, sur l'étendue des passes, l'illumination des mains, la direction des doigts qui doivent être légèrement courbés, & l'état de l'esprit, mais principalement la volonté, la confiance, & l'attention inébranlable & soutenue qui résulte de ces dispositions.

M. Delenze parle aussi de la chaise & du baquet, de leur utilité & de leurs inconvénients, des arbres magnétiques, de la musique, de la voix du magnétiseur, des forces & de l'instrument dont il joue.

Ce qu'il dit de l'eau magnétisée & de ses propriétés médicales paroît un peu extraordinaire, & l'on sera même surpris qu'un homme comme M. Delenze, qui a donné dans d'autres circonstances des preuves de savoir & même d'esprit philosophique, ait laissé subjurer à ce point sa raison & peut-être ses sensations par des préventions systématiques. Les explications dans lesquelles il entre sur l'influence de la volonté & de la foi dans les phénomènes du magnétisme, sont d'une certaine importance, relativement au point de vue historique qui nous occupe. Suivant M. Delenze, la foi est nécessaire au magnétiseur, mais point à celui qu'on magnétise; & le celui-ci n'éprouve des effets qu'autant qu'il est persuadé d'avance qu'il va en éprouver, on pourroit attribuer ces effets à l'imagination. Il assure avoir magnétisé des personnes tout-à-fait incrédules, qui éprouvèrent constamment des effets. Il eroit que la volonté active vers le bien, qu'il subordonne à la foi & à la conviction, est nécessaire, parce qu'il fustit d'observer que si la volonté tendoit au mal de celui sur lequel on veut agir, elle seroit repoussée par lui si tôt qu'il en sentiroit l'action. Du reste, il ajoute que la volonté est indispensable, puisque l'on ne fait usage de ses facultés qu'autant qu'on le veut; l'incrédulité pourroit toutefois empêcher on affaiblir le magnétisme, soit de la part du magnétiseur, soit de la part du magnétisé, en s'opposant à l'attention, & à la concentration des forces, ce qui sert à expliquer comment, en général, les savans deviennent plus difficilement magnétisables que les hommes moins habitués à s'élever à de hautes connoissances, & à ne se livrer à ces sentimens qu'après avoir vu des effets indubitables.

M. Delenze est forcé d'avouer que cette disposition d'esprit est défavorable au succès des expériences magnétiques; mais alors le moral & le physique d'une manière un peu singulière, il conclut que la croyance au magnétisme ne peut se répandre comme les connoissances sur le galvanisme & la vaccine; il faut, dit-il, que la conviction générale soit amenée par une foule d'individus, qui successivement & en divers lieux chercheront en silence à opérer le bien, & trouveront dans la satisfaction qu'ils auront de l'avoir opéré, des motifs suffisans pour engager d'autres personnes à tenter les mêmes moyens.

Les idées de M. Deleuze sur les effets qui dépendent, dans le magnétisme, de la force de la volonté, de la capacité d'attention, de la direction de la volonté, de la croyance & de la confiance en sa puissance, lui servent à expliquer la différence de force entre les magnétiseurs; c'est aussi par une suite de ces mêmes idées que M. Deleuze admet & conçoit comment, dans les premiers traitements magnétiques, on trouve des guérisons qui tiennent du prodige par la promptitude & l'intensité des effets: « L'enthousiasme, dit-il, étoit alors » excessif; il donna une confiance sans bornes, » une foi vive, & les magnétiseurs firent sans » aucun effort usage de toutes leurs facultés, de » toute leur puissance; ils furent également » condamnés par les sujets qui se livraient à eux avec » un entier abandon. Ils réussirent, parce qu'ils » croyoient qu'ils voulaient, & que rien ne leur » paroissoit difficile; aujourd'hui, cette foi, cette » confiance, sont bien plus rares. La plupart de » ceux qui magnétisent ont une forte de crainte » de ne pas réussir: je l'ai cent fois éprouvé moi-même. Je suis bien convaincu de la réalité de » l'agent, mais malgré moi je doute de ma puissance, & ce doute affoiblit mon action. Il y a » des jours où j'agis plus fortement, & c'est tous » jours lorsque je magnétise avec la plus d'abandon » & de confiance. Je m'aperçois aussi que ma » force augmente lorsque j'ai produit un effet favorable. La diminution de confiance n'empêche » point qu'on ne fasse du bien, mais on en fait » moins; & il est essentiel d'en avertir, pour qu'on » ne soit pas étonné de ne pas produire d'abord » des effets semblables à ceux dont on trouve » dans les livres des écrits bien constatés. »

M. Deleuze avoue tout-à-fait que dans tous les temps les bons magnétiseurs sont rares, & que l'on en trouve peu comme MM. Mesmer, Puyfégur, le P. Hervier. Il n'admet pas, avec Mesmer, qu'il y ait des hommes dont la présence puisse détruire l'effet du magnétisme; opinion que l'on regarderoit sans doute comme destinée à servir d'excuse dans le cas où ces expériences ne réussiroient pas. Il fait le portrait suivant du meilleur magnétiseur. « C'est celui qui a un tempérament robuste, un caractère à la fois ferme & tranquille, » le germe des passions vives, sans être subjugué » par elles, une volonté forte sans enthousiasme; » de l'activité réunie à la patience, la faculté de » concentrer son attention sans efforts; & qui, en » magnétisant, s'occupe de ce qu'il fait. »

À la suite de ces détails, M. Deleuze traite, d'après ses propres expériences, des effets généraux du magnétisme considérés comme des effets physiques qui produisent une action, & comme des moyens que l'on peut appliquer à la guérison des maladies. Le somnambulisme, auquel il consacre un article particulier, a été présenté rarement à son observation, & il avoue que pour plus de trois cents personnes qu'il a magnétisées, il n'a

guère rencontré qu'une douzaine de somnambules qui lui aient offert des phénomènes curieux. Les symptômes, les sensations qu'éprouvent les malades soumis au magnétisme, sont très-variables; les plus remarquables dans les circonstances indiquées par M. Deleuze, sont une sensation de chaleur ou de froid, plus souvent de chaleur semblable à celle d'un fer chaud qui passe devant le visage, l'assoupissement, les yeux appesantis, la tête lourde, l'engourdissement des jambes, l'impression d'un poids sur l'estomac par l'application de la main; le pouls plus élevé, plus vif, plus régulier; quelquefois une transpiration augmentée aux pieds & aux mains; un léger sommeil, de la difficulté à ouvrir les yeux, un sommeil plus profond qui a lieu subitement, & qui dure une heure ou plus, des spasmes qu'il est nécessaire de calmer, le retour d'une douleur ancienne, &c.

M. Deleuze dit avoir traité des équinancies par le magnétisme, dont l'application, qu'il croit plus particulièrement indiquée dans les maladies inflammatoires, lui paroît convenir comme moyen auxiliaire dans la fièvre bilieuse, la fièvre adynamique, la fièvre ataxique, &c.

Il croit avoir guéri ou vu guérir trois hydropiques jngés à peu près incurables par d'habiles médecins, plusieurs fièvres d'accès, des maux d'yeux, des maux de dents, des maux d'oreilles, un catarrhe qui s'étoit annoncé d'une manière très-grave, & qui céda dans une seule séance, des suppressions menstruelles plus ou moins anciennes, des saits répandus, des sciatiques, des rhumatismes, des panaris & autres maux d'aventure, des migraines violentes & périodiques. Il pense en outre que de nombreuses expériences prouvent les bons effets du magnétisme dans le traitement de l'épilepsie. D'après les saits qu'il rapporte, le même moyen pourroit être employé pour soulager ou consoler dans les maladies incurables ou mortelles, & servir ainsi à l'art si peu avancé, si négligé, de rendre la mort douce, à cette euthanasie sur laquelle le chancelier Bacon appeloit avec tant d'éloquence l'attention des véritables amis de la philosophie & de l'humanité. Nous ne craignons pas d'avancer que les remarques si ingénieuses & si sages des commissaires réunis de l'Académie des sciences & de la Faculté de médecine, sur l'expérience médicale, s'appliquent d'une manière particulière à tout ce que rapporte M. Deleuze en parlant de l'application du magnétisme, à la guérison des maladies (1). Nous lui

(1) Voyez le *Moniteur* du 31 avril 1813, page 431. Les commissaires réunis de l'Académie des sciences & de la Faculté de Paris, dont nous avons parlé dans cet article, les vues générales sur l'importance du plus grand nombre des expériences en médecine, s'appuyent aussi d'observations particulières. Ils ont cité entre autres une observation curieuse de M. Bougluot de la Morhe, alors médecin de charité de Saint-Sulpice. Les saits de cette observation étoient reprochés

reprochant en outre d'avoir cité inutilement M. Corvisart, pour dire que l'hydropisie est souvent la suite d'une maladie organique, d'admettre des faits répandus, & de montrer en général, en parlant des effets salutaires du magnétisme, une confiance que l'on pourroit à peine avoir dans les médicamenteux les mieux connus, confiance d'ailleurs bien contraire à ce dogme philosophique qui domine une longue pratique de la médecine & une étude approfondie des phénomènes si variables de la vitalité.

Ce qu'il y a d'extraordinaire, d'incroyable dans le phénomène appelé *somnambulisme*, par les magnétiseurs, a engagé M. Delcuse à en faire le sujet d'un article particulier. Suivant ce qu'il rapporte, il y a dans cet état une foule de nuances, &c.

« Le somnambule, dit-il, a les yeux fermés, & ne voit pas par les yeux ; il n'entend point par les oreilles ; il ne voit, n'entend que ceux avec lesquels il est en rapport, & ne regarde que les objets sur lesquels on attire son attention ; il est soumis à la volonté du magnétiseur pour tout ce qui ne peut lui nuire, & pour tout ce qui ne contraste point en lui les idées de justice & de vérité ;

« Il sent la volonté du magnétiseur ;

« Il aperçoit le fluide magnétique ;

« Il voit, ou plutôt il sent l'intérieur de son corps & celui des autres ; mais il n'y remarque ordinairement que les parties qui ne sont pas dans l'état naturel & qui en troublent l'harmonie ;

« Il retrouve dans sa mémoire le souvenir des choses qu'il a oubliées pendant la veille ;

« Il y a des *prévisions* & des *pressentiments*, qui peuvent être erronés dans plusieurs circonstances, & qui sont limités dans leur étendue ;

« Il venoit avec une facilité surprenante ;

« Il n'est point exempt de vanité ;

« Il se perfectionne de lui-même pendant un certain temps, s'il est conduit avec sagesse ;

« Il s'égare et se dément souvent ;

« Lorsqu'il retourne dans l'état naturel, il perd absolument le souvenir de toutes les sensations, & de toutes les idées qu'il a eues dans l'état de somnambulisme ; tellement que ces deux états sont aussi étrangers l'un à l'autre, que si le som-

nambule & l'homme éveillé étoient deux êtres différens : »

Cet oubli complet de ce qui s'est passé dans l'état du somnambulisme est un phénomène régulier, constant, tandis que les autres circonstances du même état sont très-variables & très-irrégulières. M. Delcuse assure même qu'on a vu quelquefois des somnambules parler d'eux-mêmes, comme si leur individu, dans l'état de veille, & leur individu, dans l'état de somnambulisme, étoient deux êtres différens. Une M^{lle}. N... , qu'il cite, étoit devenue malade, & somnambule, dans le moment où la perte de sa fortune l'avoit portée à prendre la résolution de se faire astringe ; elle manifestoit, pendant son somnambulisme, des vœux entièrement opposés à cette résolution : « Pourquoi donc voulez-vous entrer au théâtre, lui disoit son magnétiseur ? — Ce n'est pas moi, c'est elle, répondit la somnambule. — Mais pourquoi ne l'en déterminez-vous pas ? — Que voulez-vous que je lui dise ? c'est une folle. »

M. Delcuse, qui rapporte ce fait, ne craint pas d'avancer qu'au lieu de recevoir les sensations par l'action de la lumière sur les yeux, & celle des vibrations sonores sur l'ouïe, les somnambules les reçoivent immédiatement par l'action du fluide magnétique. Il pense d'ailleurs qu'il s'est allégué prouvé que dans le somnambulisme on a des connaissances qu'on n'avoit point dans l'état de veille ; il croit que les individus magnétisés ont seulement alors des sensations plus délicates, ne souvenir distinct de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont senti, une grande facilité à faire des combinaisons ; enfin, toutes les facultés de l'homme éveillé, plus libres, plus étendues. Un somnambule *susceptible de son magnétiseur*, il exécute une chose qui lui est demandée mentalement, & sans prononcer une parole. Ce qui suppose qu'il ne se fait pas un mouvement dans le cerveau du magnétiseur, sans que ce mouvement ne se répète ou ne soit senti chez le somnambule.

Les somnambules reconnoissent & préviennent le développement d'une maladie, non-seulement chez eux-mêmes, mais encore dans un individu avec lequel ils sont en rapport. Ils font quelquefois des dissertations de médecine, de métaphysique, de psychologie, &c. Une demoiselle de seize ans, que M. Delcuse a vue en état de somnambulisme, lui disoit de petits traités sur quelques maladies qu'elle avoit éprouvées, ou dont elle avoit entendu parler. La faculté qu'ont les somnambules de voir les objets quand ils sont très-éloignés, lui paroît un phénomène si surprenant, qu'il ne demande à personne d'y croire sans l'avoir vu. L'idée qu'il se fait du fluide magnétique lui paroît quelquefois propre à diminuer ce qu'on aperçoit d'abord de prodigieux & inconvenable dans cette faculté.

Les rapprochemens que M. Delcuse veut établir

C

une femme très-pauvre du Gros-Cailou, qui, atteinte, en 1779, d'une fièvre maligne très-dur et très-étendue, résista tout secours ; & resta, pendant tout le cours de la maladie, tranquille sur la paille qui lui servoit de lit, buvant de l'eau tout le jour, & ne faisant rien autre chose. La maladie passa successivement par ses diverses périodes, & se termina par une guérison complète. On trouve aussi dans le même rapport, l'observation d'une demoiselle qui, portant au sein droit une glande susceptible de résolution, guérit spontanément au moment d'être d'un prétendu épileptique appelé l'œil de pierre, avant qu'on eût rapporté cette cure merveilleuse, & la malade en eût essayé l'usage seulement pendant quelques jours.

— MÉDECINE. Tome X.

tienfe, le répandent avec une activité que les systèmes, scientifiques ne peuvent jamais avoir; qu'elles contribuent, comme l'a prouvé Perfect pour les méthodistes anglais, à peupler les maisons d'aliénés, & qu'elles se mêlent à la pratique de la vie, & même aux choses humaines qui leur font les plus étrangères; avec toute l'audace & l'imprudence de la folie.

Ce que dit M. Deleuze, des miracles opérés à l'intercession de M. de Paris, & du livre de Carré de Mongeroy sur ces miracles, n'appartient guère plus à son sujet que la digression sur les doctrines mystiques. La saine critique, malgré tous les raisonnemens de M. Deleuze & l'authenticité, le nombre des témoignages, porte à ne point admettre la plupart de ces prodiges, auxquels s'appuient les réflexions que Hume a développées dans sa dissertation sur les miracles. La physiologie ne voit dans ceux de ces mêmes prodiges qui paraissent consistés que les effets de l'extase, ou des concentrations intérieures de l'action nerveuse, qui altèrent ou suspendent même le développement extérieur de la sensibilité: phénomènes dont il est facile de trouver des exemples dans l'histoire des mariys de toutes les religions.

M. Deleuze a d'autres idées: sa tolérance d'abord va jusqu'au point de respecter l'opinion de ceux qui accordent une espèce de pouvoir aux prières. Trouvant ensuite que les faits rapportés par M. de Mongeroy sont revêtus de toutes les preuves imaginables; & que si on les rejette, on ébranle les fondemens de la physique & de l'histoire, il refuse de penfer avec Hume, que l'on peut opposer à cette suite de preuves & de témoignages, l'impossibilité absolue, c'est-à-dire, la nature miraculeuse des événemens qu'ils attestent. Les phénomènes opérés dans le cimetière de Saint-Médard ne lui paraissent point excéder les ressources de la nature; & pour le dispenser d'en douter, pour ne pas ébranler les fondemens de la physique & de l'histoire, il conçoit, il explique par la doctrine du magnétisme, les guérisons opérées sur le tombeau du diacre Paris. Toutes les conditions pour magnétiser & pour être magnétisé se trouvent réunies dans ces circonstances: *Pos vive & volente forte, abandon & confiance, &c. &c.*

Le magnétisme ayant d'ailleurs agi sur le tombeau du diacre Paris, l'insin de ceux qui l'employaient, a dû être mal dirigé, a dû exister chez certains individus des crises nerveuses, des convulsions. La science

*De parte Roi, defenfo à Dieu
D'opérer miracles en ce lieu,*

ne patoit pas à M. Deleuze la véritable cause qui attire ces effets extraordinaires, attribués à l'intercession de M. de Paris. L'intercession de Saint, dit-il, n'aurait pas été moins efficace quand on l'aurait invoqué loin de son tombeau. M. De-

leuze pense que l'on pourroit expliquer de la même manière plusieurs guérisons surprenantes, rapportées chez les historiens, telles, par exemple, que celles d'un aveugle & d'un percus par Vespasien, lorsqu'il étoit à Alexandrie.

L'extension de la doctrine du magnétisme, que M. Deleuze porte bien loin, l'engage à vouloir l'appuyer par des faits ou des considérations tirés des systèmes, des théories des philosophes, ou des observations de plus célèbres médecins. Il rappelle dans cette intention l'opinion d'Artée, que dans les maladies nerveuses, & surtout aux approches de la mort, il se manifeste quelquefois une prévision étonnante. Il cite dans le même dessein les dissertations de Queluzat (1), de Janitich (2), d'Alberti (3), qui admettent, que les malades connoissent plusieurs jours d'avance les crises qu'ils doivent avoir, & les remèdes qui leur conviennent. Il croit pouvoir encore placer dans la même classe, plusieurs phénomènes cités par Cebelin, ainsi que l'opinion de Deserb (4), qui regarde comme incontestable, que lorsque certaines maladies augmentent l'action du cerveau, il s'y forme non-seulement des images nouvelles, mais encore des idées qui représentent l'avenir; & qui n'arrive guère que dans l'extase, la frénésie & l'apoplexie idiopathique.

On doit savoir gré à M. Deleuze de cette érudition, de ces recherches utiles, & même de ces rapprochemens qui se présentent aussi aux physiologistes: mais sous un point de vue moins favorable aux partisans du magnétisme, on est d'ailleurs affligé de le voir, dans cette digression, si près, & sans le aborder, de plusieurs vérités dont il est tout-à-coup éloigné par sa croyance à un fluide magnétique, croyance qui lui fait admettre certaines visions à des distances très-éloignées; certaines prévisions, sans craindre d'ébranler l'opinion suivante.

« Nous pouvons aujourd'hui déterminer les cas dans lesquels la prévision a lieu, & les limites dans lesquelles elle est renfermée. Elle ne se manifeste que dans un état de crise nerveuse; elle ne s'étend point au-delà de ce que l'intelligence peut conjecturer d'après la connaissance des causes actuelles; elle est, le plus ordinairement, un développement de l'instinct, dont nous sommes doués pour notre conservation. Elle suppose, sans doute, que les nerfs ont acquis une irritabilité qui les rend sensibles à des impressions imperceptibles dans l'état ordinaire; mais pour l'expliquer, on n'a pas besoin de recourir à un ordre de choses étranger à l'ordre naturel.

(1) *De divinationibus medicis*. Freib., 1723.

(2) *De somniis medicis*. Argentorati, 1729.

(3) *De vocationis agnoscant*. Hal., 1724.

(4) *Recherches sur la sensibilité*. Montpellier, 1786, in 8°.

« Si, comme le prétend Mesmer, un fluide se répand dans la nature établit une communication entre les êtres, & pénétre tous les corps; si, lorsque les sens extérieurs sont assourdis, ce fluide continue d'agir sur nos nerfs & devient le seul véhicule des sensations; il n'y a rien d'étonnant qu'une personne dont les nerfs sont dans une irritabilité excessive, dont la faculté de sentir s'est retirée des organes extérieurs, pour se concentrer (soit dans un point du cerveau, soit à l'épigastre), puisse avoir la conscience de ce qui se passe dans un lieu éloigné, comme nous avons celle de l'ébranlement des corps sonores. »

Où peut bien que le *démon familier* de Socrate doit revenir, à l'occasion de cette doctrine, que M. Deleuze emploie en effet, de manière à faire croire, que ce mot de *démon* indique un principe d'inspiration, & jussive, ainsi l'homme le plus sage de l'antiquité, d'un *soupiran* qui a répandu des nuages sur son caractère.

Plotin, dans le troisième siècle, Paracelse, dans le seizième, auroient été, suivant M. Deleuze, dans le même cas que Socrate. On fera sûrement fort étourdi de voir ce principe d'inspiration; le démon de ces hommes célèbres, comparé par M. Deleuze à l'état fort singulier de maladie dans laquelle se trouva une moiselle le F..., maladie dont l'observation a été consignée dans le Bulletin de la Société des sciences médicales d'Orléans; & pour laquelle nous avons nous-mêmes été consultés avec M. Pinel, il y a quelques années.

L'ouvrage de M. Deleuze, si on en considère le fond, les idées principales, les motifs, diffère très-peu de plusieurs autres écrits publiés sur le même sujet; mais il se recommande par la clarté du style, l'authenticité des renseignements qu'il fournit sur le magnétisme, les intentions philanthropiques de l'auteur, son érudition, la variété de ses connaissances, les anecdotes piquantes qu'il raconte, les phénomènes plus ou moins extraordinaires qu'il rapproche, ainsi que par les faits de détail qu'il rapporte, & qui, sans prouver son système, n'en font pas moins du plus haut degré d'intérêt pour le physiologiste.

Nous avouons avec reconnaissance que nous avons trouvé dans cet ouvrage, ainsi que nous l'avons énoncé à notre première lecture, tout ce que nous désirions faire connaître sur le magnétisme dans notre session de l'histoire de la médecine, spécialement consacrée à la médecine morale.

Les réflexions que nous avons placées dans les différentes parties de cette notice, & la nature des faits, ou des opinions que nous avons fait connaître, prouvent assez qu'il nous semble que le magnétisme appartient plutôt à l'histoire des erreurs de l'esprit humain, qu'à un tableau de ses progrès, & qu'il ne peut pas être véritablement regardé comme l'effet d'un fluide particulier, comme

une découverte dans les sciences, comme l'objet particulier d'une science ou d'un art, ainsi que le voudrait M. Deleuze, dont nous approuvons d'ailleurs les excellentes intentions. Cependant nous avouons que le magnétisme nous parait devoir intéresser le physiologiste, sous plusieurs rapports. Parmi les phénomènes cités par M. Deleuze, & dans quelques effets de magnétisme dont nous avons nous-mêmes été témoins, il y a des circonstances qui, sans devoir être expliquées par un fluide particulier, ne peuvent être exclusivement rapportées aux causes morales, dont les commissaires réunis de l'Académie des sciences & de la faculté ont si bien apprécié l'influence. Ces circonstances qui, dans les effets attribués au magnétisme, ne dépendraient pas de l'imagination, d'une attention forte, & vivement intéressée, auroient quelque ressemblance avec ce que l'on a observé dans certaines affections nerveuses, dans certaines maladies extraordinaires, ou de délire, le dérangement de l'esprit se montrant moins comme une altération, que comme une augmentation, un excès des facultés morales; situations dans lesquelles il se formerait tout-à-coup, ainsi que nous l'avons remarqué, des volitions, des appétits, des instincts accidentels, comme si des sens nouveaux s'étoient subitement développés dans l'intérieur de l'organisation.

Quelques-uns de ces phénomènes que citent les partisans du magnétisme, ne peuvent guère être révoqués en doute; on pourroit même les concevoir, les expliquer jusqu'à un certain point, en les attribuant à l'effet dont nous avons déjà parlé, & qui se produit par la communication de deux systèmes nerveux différents, dans des conditions déterminées de rapprochement, de position, d'attitude des sujets mis en expérience. Dans leurs différentes recherches, les partisans du magnétisme ont dû faire à leur insu un grand nombre de ces épreuves. Ce que M. Deleuze dit lui-même des illuminés, leur est tout-à-fait applicable. Ils auroient agi par une suite, ou même par une influence de l'erreur qui les dirigeoit, & des sentiments exaltés qu'elle auroit fait naître. Une semblable situation morale ne doit pas être sans rapport avec cette réaction de deux systèmes nerveux, & nécessairement elle a fait rencontrer les chances les plus favorables aux développemens de cette réaction.

Suivant cette conjecture, ce qu'il y auroit de particulier & de vraiment nouveau dans le magnétisme, ne dépendrait pas d'un agent universel, d'une action générale de la nature, mais bien d'une qualité individuelle, d'une particularité de constitution ou de tempérament, subordonnée à un état de maladie chez quelques individus, & qu'il faudroit peut-être classer parmi ces *anomalies*, ces *irregularités*, que les médecins appellent *idiosyncrasies*, de trois mots grecs qui dési-

puent ce qu'il y a de propre & de spécifique dans la complexité de chaque personne. Alors les partisans du magnétisme, comme les alchimistes, anéantissent tout ce qu'ils ne cherchoient pas, des petits faits de détail, au lieu de phénomènes généraux ; & à la place d'une loi, les effets d'une exception ; que l'ignorance, le Pétrif du système, ou même la mauvaise foi & la prévention, dans quelques circonstances, auroient dénaturés & surchargés par le prestige du mensonge, les mérites de la crédulité, ou l'inexactitude de l'observation. On n'en seroit pas moins redevable aux partisans du magnétisme éclairés & de bonne foi, de quelques observations physiologiques, sur un mode d'excitement, dont l'effet a pu être utile dans quelques circonstances ; tandis que dans d'autres, il a dû provoquer des altérations de système nouvelles jusqu'alors inconnues, des maladies véritablement nouvelles, qui sont aussi pour la médecine, des richesses, des découvertes, puisqu'elles tendent & augmentent pour elle le champ de l'expérience & de l'observation.

C'est peut-être accorder beaucoup au magnétisme, que de s'arrêter à ces doutes & à ces conjectures. Ses partisans n'en seront pas satisfaits, mais doute ; peut-être même en seront-ils blessés, & se plaindront-ils de voir leur doctrine rapportée suivant une fautive érudition, à certains systèmes du fin du moyen âge, dont les progrès des sciences naturelles auroient effacé toutes les traces, s'il ne se rencontrait pas toujours à toutes les époques de la civilisation, des hommes étrangers ou même opposés aux lumières de leur siècle, & dont les opinions rappellent une époque antérieure & moins avancée de l'esprit humain.

D'un autre côté, la plupart des savans, sévères dans leurs décisions, inflexibles dans leurs jugemens, pourroient-ils admettre qu'une certaine latitude de croyance, semble justifiée par la variété infinie de la nature ? consentiroient-ils à ce que l'on fit de nouveau un examen sérieux du magnétisme animal, ou que la philosophie pût encore s'occuper d'une opinion dont on a tant abusé, & qui a été discréditée par le charlatanisme & la ridicule entousiasme de plusieurs de ses partisans ? ne répondroient-ils pas, même avec l'expression du mépris, les aperçus, les conjectures des physiologistes qui soupçonneroient, d'après quelques observations, que, dans certaines circonstances, les systèmes nerveux de deux individus peuvent avoir l'un sur l'autre une influence (1), & que,

dans quelques maladies extraordinaires, on entrevoit qu'il se forme des voix intérieures, des appétits, des volitions, des instigations accidentelles & spontanées, comme si tout-à-coup des sens nouveaux s'étoient développés dans l'intérieur de l'organisation ?

Des faits de ce genre, des phénomènes qui se rattachent à une physiologie transcendante, aussi que la doctrine des sympathies, de l'association ou de l'imitation, expliquent comment des hommes éclairés, des médecins, des naturalistes, ont pu accorder quelque confiance au magnétisme & prendre place parmi ses partisans. C'est surtout en Allemagne, & plus particulièrement en Prusse, que cette opinion, si généralement répandue en France par les savans de profession, a été adoptée par plusieurs hommes d'un esprit cultivé, & connus par l'importance de leurs emplois ou par leurs dignités académiques.

M. Friedländer paroît cependant avoir une autre idée de ses compatriotes, & d'après une note insérée par lui dans la *Gazette de Jante*, pour l'année 1817, on seroit porté à croire qu'en Prusse, comme en France, le magnétisme compte très-peu de partisans parmi les hommes instruits, & que les effets qu'on lui attribue, sont rapportés par les savans au pouvoir de l'imagination. M. le docteur Oppert, qui paroît beaucoup mieux connaître la disposition des esprits en Prusse, que M. Friedländer, attaque son opinion. Les notes qu'il en a publiées à ce sujet, sont connues non seulement les procédés, les appareils d'un M. Wolf, le magnétiseur le plus en crédit de Berlin, elles nous apprennent en outre que MM. Hufeland, Heim, Formey, &c. ; montrent quelque confiance dans ses procédés, que le gouvernement les favorise, au point d'avoir nommé leur promoteur, professeur ordinaire de la Faculté pour une clinique magnétique. Le même auteur nous fait savoir qu'à Vienne, l'arrêt prohibitif contre le magnétisme a été rapporté par un décret du gouvernement, & par les ordres des empereurs d'Autriche, de Russie, le roi de Suède. Des médecins ont visité l'Institut de M. Wolf, avec le dessein d'en rapporter des connaissances utiles dans leur patrie (2).

Et ceux qui prétendent les animaux, ne permettent guère de douter que la proximité de deux corps animés, dans certaines positions & avec certains mouvemens, n'ait un effet quel qu'il soit, participation de l'imagination de l'un des deux. Il paroît assez clairement aussi que les effets sont dus à une communication quelconque qui s'établit entre leurs systèmes nerveux.

(1) Ces deux médecins sont MM. Steinfeld pour la Russie, Mallard pour le duc de Vienne, & M. Cederfeld pour le Suède. M. le comte de Locwenhielm, qui cite un médecin dans la lettre à M. Oppert, assure dans cette même lettre, que le roi de Prusse a fondé un hôpital de cent lits pour des blessés que l'on doit traiter exclusivement avec le magnétisme.

(1) Il faut avouer, dit M. Cuvier, au sujet de cette loi, que de cette relation, qu'il est très-évidente, dans les expériences, de distinguer l'effet de l'imagination de la personne souffrante, d'avec l'effet physique produit par la personne qui agit sur elle, &c. le problème se trouve souvent très-composé. Cependant les effets obtenus sur les personnes dites sans connaissance avant que l'opération commençât, ceux qui ont lieu sur les autres personnes, après que l'opération même leur a fait perdre connaissance,

M. Deleuze, depuis la publication de l'ouvrage dont l'extrait compose la plus grande partie de cet article, a donné un nouvel écrit sous le titre de : *Réponse aux objections contre le magnétisme*. Ces objections, qu'il prétend réfuter, sont au nombre de neuf. Aucune d'elles ne porte sur le fond du système ou de la doctrine du magnétisme; tout s'y rapporte, ainsi que dans la réponse, aux inconvénients, aux avantages, à l'effet curatif & à la partie morale du magnétisme; on y trouve, par exemple, cette objection: le magnétisme est dangereux pour les mœurs; un traitement magnétique prolongé, surtout lorsqu'il est accompagné de somnambulisme, donne au magnétiseur une influence morale sur le caractère, les opinions, les inclinations de la personne magnétisée, &c. Il seroit tout-à-fait inutile de s'arrêter à démontrer que l'examen de questions semblables, est entièrement étranger à l'histoire des sciences, & que le danger ou les avantages d'un système ne peuvent l'attaquer ni l'appuyer, en démontrant l'erreur, ou le rendre plus ou moins vrai, plus ou moins vraisemblable. (L. J. M.)

MÉSOCÉPHALE, de *mes*, milieu, & *céphale*, tête. Dans la langue anatomique de M. Chaussier, on désigne sous ce nom la protubérance annulaire située au milieu du cerveau, à la partie inférieure & postérieure. Ce s'est point une partie détachée de l'encéphale, & on pourroit la regarder comme l'origine du prolongement rachidien, si toutefois les différentes divisions du système nerveux n'avoient pas existé spontanément & devoient jamais être enragées sous ce rapport, d'origine, de productions, les unes à l'égard des autres.

Les objets les plus remarquables que l'on aperçoit à la moelle allongée, après l'avoir renversée, ainsi que le cerveau & le cervelet, sont: 1°. les deux éminences mamillaires (éminences pyriformes de Chaussier); 2°. les jantes antérieures (péduncules du cerveau de Chaussier); 3°. la protubérance annulaire (mésocéphale de Chaussier).

Les observateurs ont rapporté un assez grand nombre d'exemples des lésions organiques diverses de la moelle allongée. Ainsi on a trouvé par différentes recherches anatomiques, dans cette partie du cerveau, des indurations, un état squirrheux, des traces d'inflammation, de gangrène, &c.

MÉSOCRANÉ. M. Portal assure avoir rencontré plusieurs fois la surface du pont de Varole sensiblement endurcie, à la suite de la manie & des lièvres ataxiques.

Suivant la même observation, on reconnoît la même disposition dans toute la moelle allongée, chez une jeune femme qui étoit devenue sourde à sa première couche, & qui, affectée de tétieid dans la seconde, périt quelque temps après d'apoplexie.

Il n'est pas aussi sans exemple que l'on ait dé-

couvert sur le corps des personnes qui étoient venues mourir à une certaine époque de la vie, que la moelle allongée étoit sensiblement altérée du côté opposé à celui du corps qui avoit été affecté. (Voy. Névrose (système, appareil), Mémorial (centre).) Le *mésocéphale*, que l'on appelle aussi *le pont de Varole*, a appelé de nouveau l'attention des anatomistes dans ces derniers temps. M. Gall a donné surtout une grande importance à cette partie du cerveau, dont il a voulu expliquer la formation par ses idées sur les fibres convergentes, avec lesquelles il a essayé de faire concevoir le développement de la commissure en réunion, que l'on parvient à distinguer en différents points de l'encéphale; application que Tiedemann a rejetée, d'après de bonnes observations sur l'évolution du cerveau, dans le fœtus.

Le *mésocéphale* n'est pas d'ailleurs une partie constante dans le cerveau des différentes espèces de vertébrés. Il manque dans les poissons, les reptiles, même les oiseaux, & s'est autant développé dans aucun mammifère que dans l'homme. (Voy. ce mot dans le Dictionnaire d'Anatomie.)

(L. J. M.)

MÉSOCÉPHALIQUE, qui se rapporte au *mésocéphale*. Dénomination sous laquelle M. le professeur Chaussier a désigné le tronc basilaire formé par la réunion de deux vertébrales. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire d'Anatomie.)

MÉSÔCHONDRIQUE. Boerhaave a donné ce nom à deux plans musculaires qui séparent les cartilages de la trachée-artière.

MÉSOCŒCUM. (Voyez Mésentère.)

(L. J. M.)

MÉSOCOLON, de *mes*, & de *colon*. Expansion du péritoine, dont la duplicature comprend le colon. (L. J. M.)

MÉSOCRANE. Le milieu de la tête ou le vertex, dans la nouvelle langue anatomique.

(L. J. M.)

MÉSOGLOSSE, mot à mot, milieu de la langue. Dénomination sous laquelle on désigneroit, avec quelques anatomistes, les muscles glosso-glosses.

(h. J. M.)

MÉSLOBE, de *mes*, milieu, & *lobes*, fobe. Dénomination que M. Chaussier a substituée à celle de *corps calleux*.

Le *corps calleux* ou le *méslobe* est un moment une certaine importance, lorsque certaines faiseurs de théories eurent assez d'audace dans les sciences pour le faire regarder comme le siège de l'âme, ou les épanchemens purulents ou san-

guins qu'ils y avoient trouvés à la suite de l'apoplexie, d'un assoupissement léthargique, *défordu* qui n'est rien moins que constant, ainsi que le prouveait un grand nombre d'observations. Tiedemann, que nous avons déjà cité, s'est assuré, par des recherches très-délicates et très-difficiles sur le cerveau de l'embryon, du mode de développement des *corps calleux*, & il a *réfuté*, par la seule puissance des faits, les systèmes de Gall & de Reil, pour expliquer ce développement. (Voyez le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

(L. J. M.)

MÉSOPHIE, vne moyenne, f. f., de *μῆς*, moyen, *medius*, & de *ὥς*, *oculus*, *visus*. Cette espèce de vue appartient aux personnes qui, à l'instar des vus courtes, se peuvent embrasser un vaste horizon, comme le sont les presbytes, mais qui conservent la faculté de percevoir les objets à portée de leur main, sans avoir besoin de les regarder d'aussi près que les myopes. Ainsi la mésopie se compose de la privation de ces derniers, quant à l'étendue de l'horizon où à la perception des objets éloignés, & de la portée de la vue ordinaire aux longues vus, pour saisir les objets voisins à une distance commode.

Il est des individus qui, par une conformation également naturelle, ont un œil myope & l'autre presbyte; & ceux qui les aille, quand ils ont besoin de lunettes, à ajuster à chaque œil un verre différent. (R. CAMBERG.)

MÉSORECTUM. Expansion du péritoine, qui répond à l'intestin testum dans la partie supérieure. (Voyez *MIXOTESTES*.)

MÉSOTHÉNAR. On appelle ainsi le *muscle* qui rapproche le pouce de la paume de la main. (Voyez *moi* dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

MÉSUE (Jean), fils d'un apothicaire, naquit à Nisibour, ville capitale de la Syrie. Il étoit chrétien, de la secte de Nestorin. Plein de goût pour les sciences, il se livra surtout à celle de la médecine, & devint médecin de l'hôpital de sa ville natale. De-là il passa à Bagdad, où il s'acquies une si grande réputation, que le calife Auron-al-Raschid, ayant donné à son fils Ebulach, surnommé Almansour, le gouvernement de la province du Khorasan, jeta les yeux sur lui pour accompagner le jeune prince & rester constamment auprès de sa personne. Mésue en profita pour instruire Almansour le goût des sciences; & en effet, le prince fut-il parvenu au califat, qu'il ordonna que l'on fit la recherche de tous les ouvrages des anciens qui n'avoient pas encore été traduits en arabe. Mésue fut chargé de revoir les versions des auteurs grecs qu'on avoit apportées de différentes contrées de l'Asie; & l'on donna alors, pour la

première fois, les livres de médecine de Galien, & les ouvrages d'Aristote en langue arabe.

On met communément la mort de Mésue à 819, à la 80^e année de son âge; mais le docteur Freind la renvoie à l'an 845. Ce même historien conteste que la plus grande partie des ouvrages attribués à ce médecin soient réellement de lui. Il appuie son opinion sur des preuves assez convaincantes; voici cependant ceux qu'on lui attribue.

Opera omnia tempore de medicamentorum purgantium delatu & cistigitione, libri duo, quorum priorem canones universales, posteriorum de simplicibus vocant, &c. Venetis, 1538, in-fol.; ibid. 1561, in-fol.

Canones universales de consolatione medicinarum simplicium, ex arabico in latinum translatis. Venet., 1471, in-fol. Mueloi., 1479, in-fol. Venet., 1484, in-fol.

Canones liber de simplicibus & antidotarium, Jacobo Sylvio interprete. Paris, 1543 & 1543, in-fol., en français, avec les commentaires de Tagault. Paris, in-8°. (R. GROSSEAU.)

Mésue, que l'auteur de l'article précédent a oublié de désigner sous le nom de *Mesueh Fancien*, porte, chez les Arabes, le nom de Jahiah-Ebn-Masawaih. Sprengel, qui paroit avoir pénétré dans l'histoire littéraire de la nation de ce médecin, beaucoup plus avant & avec beaucoup plus de philosophie que Freind, ne lui attribue point les traductions arabes du grec, que cite M. Geoffroy. Il remarque que nous ne possédons de cet auteur que quelques fragments, qui sont épars dans les œuvres de Rhazès.

Le disciple de Mésue, Ithomain-Ebn-Israk, est l'auteur laborieux des traductions dont on a fait aussi honneur à son maître; il étoit chrétien comme lui, & comme lui aussi attaché à la secte des nestoriens. Il fut porté au grade on degré de maître, d'après l'usage des degrés académiques, apporté chez les Arabes par les savans, dont ils partageoient la doctrine religieuse. Ithomain possédoit à fond la langue grecque; il la traduisoit, non pas sur des versions syriaques, mais sur des textes grecs, Hippocrate, Galien, Ptolémée, Paul d'Egine. On lui attribue aussi une introduction à la médecine, d'après les principes de Galien, dans laquelle il cherche à expliquer les fonctions des corps vivans, d'après les qualités élémentaires & les forces occultes, avec cette subtilité scolastique qui s'opposoit si long-temps à la saine physiologie & à la médecine d'observation.

Du reste on pourroit, jusqu'à un certain point, regarder Mésue l'ancêtre, Ithomain & leurs disciples, comme une école ou une famille de médecins de la même secte & de la même nation, qui auroit beaucoup contribué à répandre la connaissance de la médecine grecque parmi les Arabes. (L. J. M.)

Méris le jeune.

Méris le jeune, fils de Hamec, disciple d'Avicenne, vécut au Caire, auprès du calife Allaken. Ses ouvrages sur la matière médicale & la médecine-pratique servirent de texte pour les leçons dans les écoles européennes jusque dans le seizième siècle. On les a publiés avec de nombreux commentaires à cette époque (1).

Ce Méris a beaucoup mieux connu que ses prédécesseurs, les propriétés directes ou immédiates de certains médicaments, le rapport de ces propriétés avec la nature du sol dans lequel croissent les plantes, la préparation des extraits & le traitement rationnel de plusieurs maladies.

Voyez SARRANIS (Médecine des), dans lequel ce qui concerne les Méris & les Ithonnais, sera rappelé dans un article suffisamment étendu, pour renfermer des détails historiques qui auroient dû se trouver à l'article ARABES (Médecine des).

(L. J. M.).

MESURES. (Thérapeutique.) Elles sont généralement employées pour les liquides, & cependant quelquefois aussi elles servent pour les matières sèches. Les mesures médicales varient, non-seulement suivant les différents pays, mais même encore dans les différentes provinces du même pays. C'est à ce défaut d'unité qu'il faut attribuer le peu de rapport qu'on remarque dans les doses des substances qui entrent dans la composition de quelques médicaments décrits dans plusieurs pharmacopées étrangères, & l'incertitude dans laquelle se trouvent les médecins lorsqu'ils veulent prescrire ces sortes de médicaments. Pour prouver combien peu se ressemblent les mesures médicales usitées dans différents pays, il suffira de citer quelques exemples. Observons d'abord que la plupart des mesures se rapportent presque toujours à des poids déterminés.

A Londres, la livre oil, pour les solides, partagée en douze onces, l'once en huit gros ou drachmes, le gros en trois scrupules, le scrupule en vingt grains; mais pour les liquides, la même livre oil divisée en seize onces, l'once en huit gros, & le reste comme on vient de le dire à l'égard des solides.

Il faut remarquer de plus que les liquides se mesurent toujours dans des vaisseaux divisés de cette manière avec une livre d'eau.

La livre d'Edimbourg se partage, tant pour les solides que pour les liquides, de la même manière que nous venons de diviser celle de Londres pour les solides.

C'est la livre de douze onces, employée à Londres pour les solides, dont on se sert encore pour la médecine dans beaucoup d'endroits; à Paris & dans quelques départements, la livre oil de seize

onces, l'once de huit gros, le gros de trois scrupules ou vingt-quatre grains, & le grain représenté, à peu d'chose près, la pelanteur d'un grain d'orge de moyenne grosseur.

La pinte de liquide, à Londres, à Edimbourg & à Paris, est de trente-deux onces.

Le conge des Anglais, qu'ils appellent *gallon*, est de huit livres.

Il est bon aussi de dire quelque chose des poids & des mesures des Anciens, afin de n'être pas embarrassé quand on voudra lire les auteurs.

L'ercel *aneulus chalcus* des Grecs, étoit deux grains.

La *filique*, la *ceratron*, le *kiss* des Arabes, quatre grains.

Le *danich* des Arabes, huit grains.

L'*obole*, l'*onobolus* des Arabes, huit grains.

Le *denier*, confondu par les Romains avec le drachme, est la septième partie d'une once suivant quelques médecins, & la huitième suivant d'autres.

Aureus, *eragium*, *sextula solidum*, mêmes poids qui faisoient chacun quatre scrupules.

Silius ou *affarius*, deux gros.

Duell, huit scrupules.

Dupondum, demi-once ou quatre gros.

Sesunc, *sejuncia*, une once & demie.

Sextans, deux onces.

Triens, trois onces.

Quadrans, quatre onces.

Quincunx, cinq onces.

Sextans, six onces.

Septunx, sept onces.

Octunx, huit onces; aussi des & *hess*.

Dostrans, neuf onces.

Dextans, dix onces.

Deunx, deux onces.

Les mesures des Anciens étoient le *conge*, dix livres.

Le *diconge*, vingt livres, &c.

Le *chus*, huit livres de vin ou sept livres & un quart d'huile.

Le *chenix*, quarante-quatre onces de vin ou quarante onces d'huile.

Le *sextier* ou sixième partie du *conge*.

Le *chiff* des Arabes, une livre & huit onces de vin, ou une livre six onces d'huile.

L'*hemine cotyla hemiiston*, la demi-septier.

Le *grand mystre*, trois onces & huit scrupules de vin ou huit onces d'huile.

L'*acétable*, deux onces & demie de vin ou deux onces & deux gros d'huile.

La *quartans*, deux acétables.

Le *cyathe*, une once cinq gros & un scrupule de vin ou une once & demie d'huile.

Le *chene*, deux petites cuillerées.

L'*urne*, quarante livres de vin ou environ trente-cinq livres d'huile.

L'*amphure*, deux onces.

(1) *Mesura Opera que extant omnia*. Edm. Ma. Vesalio, 1522, 12 jul.

Le *cade*, le *ceanion* des Grecs, le *metrates*, trois onces.

Le *culeus*, quarante onces, &c. &c.

La comparaison de toutes ces mesures peut seule faire connoître le rapport qu'elles ont entre elles; mais cette comparaison est longue, difficile & embarrassante: c'est aussi pour cela, sans doute, que de tout temps on a feint de quelle utilité il seroit de s'avoir qu'un seul poids & qu'une seule mesure.

Grâces au gouvernement français, toutes les difficultés que présentait l'exécution du travail qu'il s'agissoit de faire pour arriver à ce but, semblent être levées; aussi a-t-on lieu d'espérer qu'avant peu le nouveau système qu'il a proposé pour les poids & mesures sera généralement adopté, & qu'on aura d'autant moins de répugnance à s'y conformer, qu'il est fondé sur des bases solides & favorables.

Les mesures & les poids médicaux étant, par ce moyen, assujettis aux mêmes règles que toutes les mesures & les poids employés pour les usages ordinaires, n'offriront plus d'incertitudes aux médecins, & il ne leur restera plus d'autre soin que de fixer d'une manière précise la dose des médicaments qu'ils auront à prescrire. (Voyez les mots *Doses* & *Pharmacologie*.)

MÉTABOLOGIE. (*Pathologie générale.*) Mot formé du grec *μετα*, *metan*, multatio, & *λογος*, *logos*, forme. C'est une partie de la pathologie qui traite de la conversion des maladies les unes dans les autres, & des diverses apparences qu'elles peuvent alors offrir dans une pareille circonstance. La métabologie offre nombre de faits de la plus grande importance dans la pathologie, tant médicale que chirurgicale, mais dont l'ensemble a pu être considéré par les praticiens, quoiqu'il mérité sans contredit de former doctrine dans l'enseignement. En effet, pour bien connoître, disoient-je dans mes institutions, de médecine, la nature intime des maladies & le genre de guérison qui leur convient, il ne suffit pas de donner toute son attention à leurs différences, leurs symptômes, leurs causes & leurs signes, il faut encore prévoir, comme le dit Hippocrate, *quæcumque sunt morborum vicissitudines & ex quibus in quos succedant*. En effet, la considération de ces changements est de la plus grande importance; car, comme l'observe Baglivi: *Morborum naturam & causas tenens, ex hoc sanæ aliquid vel potius multum; at eorum successiones quo se illi vertunt veluti à speculâ providere profectò est artificis fulguris, utentis arte, sine infra se positis prægnantibus suis*. Pour se enivrer de la vérité de ceci, il suffit de considérer ce que sont les maladies en elles-mêmes, quand, abandonnées à leur propre cours, elles ne sont nullement dérangées par l'opération d'aucun remède. L'observation fait voir que bien qu'elles paroissent le résultat

d'un désordre apparent, elles n'en sont pas moins le produit d'une cause première, dont l'influence est réglée sur les lois de l'organisme, & qui agit également de la même manière chez les divers individus, en les supposant tous dans les mêmes circonstances. Mais ce principe simple de maladies, cette cause morbifique identique, contrariée souvent dans ses opérations, occasionne des actions ou apparences irréguilières, & dans lesquelles cependant on aperçoit de la régularité pour peu qu'on les étudie, ici, lorsque tout paroît aller selon le type de la maladie, une nouvelle scène se présente tout-à-coup, des symptômes nouveaux, il faut tenir une toute autre conduite dans le traitement, & encore la terminaison n'en est-elle pas moins funeste. Là, au milieu du combat de la nature contre la cause morbifique, lorsque les espérances sont encore incertaines, une autre suite de phénomènes vient se mêler à ceux déjà existans, & sont une maladie qui complique la première. Ailleurs, lorsque tout paroît être dans le plus favorable état, nait un rayon d'espérance, que vient apporter un symptôme qui se manifeste souvent bien loin du lieu primitivement affecté, & dans le moment où l'on s'y attendoit le moins. Chaque circonstance alors est accompagnée de signes qui indiquent ce qu'on a lieu de craindre, & ce qu'on peut espérer. L'observation qui a délaissé sur tous ces faits, a donné lieu de les ranger sous trois dénominations différentes; savoir: *l'épigénèse*, la *métaplasie* & la *metastase*. Nous traiterons ici de la première, réservant les autres à leurs articles particuliers.

De l'épigénèse.

L'épigénèse est une affection morbifique, qui survient à une autre affection déjà formée, & qui en change plus ou moins la nature; on peut la regarder en quelque façon comme une gresse morbifique, en la comparant avec ce qui a lieu dans l'économie végétale, lorsque ou entre une tige sur un tronc d'espèce différente. La même coalition a lieu ici, avec néanmoins cette différence, que les phénomènes restent toujours les mêmes qu'ils étoient avant dans les gresses végétales, au lieu qu'ils deviennent communs dans les gresses morbifiques. Entr'autres exemples propres à éclaircir cette matière, nous nous en tiendrons à un que l'on trouve dans la seconde partie du *Ratio medendi* de Boileau. Une petite fille eut une péripneumonie qui, passée elle-même, passa le dixième jour à la suppuration. A cette époque parurent au visage de l'enfant des efflorescences, qui avoient un grand rapport avec la scarlatine. Quatre jours après, la fièvre devint très-forte; elle épiit accompagnée d'un flux dysentérique, & d'une éruption scarlatine très-copieuse, au milieu de laquelle on découvrit, avec la loupe, de petites élevations qui étoient le millet linaire. Ainsi, cette petite inflammation éprouvée en

même temps quatre maladies très-graves, la sup-
puration du poulmon, la dysenterie, la scarlatine
& la miliaire. Mais bientôt vint s'en joindre une
cinquième, c'étoit la petite-vérole, dont les pul-
sates bien caractéristiques couvrirent, le lendemain,
le visage, le cou & les bras; mais l'enfant ne pouvant
suffire à ce déchaînement de maux, y succomba.

L'épiginésie peut avoir lieu dans les maladies
aiguës & dans les maladies chroniques; elle est
même pour beaucoup de celles-ci, le moyen de
guérison auquel on a peu pensé, & qui cependant
méritoit beaucoup de considération. Hippocrate,
notre modèle en pratique, n'a point été aussi indis-
cret sur ce point : on trouve dans nombre de
ses aphorismes une mention expresse de l'épiginé-
sise, envisagée comme signes dans les maladies
aiguës & chroniques; ainsi, dans la sixième sec-
tion, il dit :

*Longo alvi pressuris detento sponte accedens
vomitus, alvi profusum solvit.*

*Morbo laterali aut pulmonum inflammatione
constituta, succedens alvi profusum, malum.*

*Quibus ad præcordia dulores citra inflammationem
oriuntur, iis febri succedens, dolorem
solvit.* Ce qui s'est offert au père de la médecine
s'est également présenté à d'autres, & ici l'observa-
tion a peut-être plus fait que les raisonnemens
les plus profonds. On a vu des enfans atteints
d'épilepsie, de gourmes, de maux d'yeux & de
tintemens d'oreilles, être guéris par une fièvre
continue, par l'éruption de la rougeole, de la
petite-vérole. En falloit-il davantage pour exciter
l'attention des praticiens sur les conversions &
changemens formés dans l'organisme par ces ma-
ladies nouvelles, que l'augmentation des symp-
tômes qu'on en aieudont faisoit regretter ? Cen-
dant peu s'en soit occupés d'une manière par-
ticulière, excepté Prosper Alpin, dont le livre
de *varis Morborum mutationibus* est perdu. Le
docteur Lorry, dans un petit ouvrage posthume,
intitulé *de præcipuis Morborum mutationibus
& conversionibus*, a rapporté dissimulément tout
ce qu'on peut dire sur cette importante matière;
aussi nous y avons puisé nos principaux points
de division.

L'épiginésie nait de la maladie, en sorte qu'elle
ce peut être regardée comme la continuation; ou
elle provient de circonstances extérieures non
précises, & qui, par cette raison, ne pouvoient
être évitées. Considérons chacune séparément,
pour avoir une notion plus parfaite.

Art. I. De l'épiginésie qui provient du caractère de la maladie.

Ce genre d'épiginésie dérive tellement du carac-
tère de la maladie, qu'on peut, d'après l'intime
connaissance de la cause, le prévoir, & même
l'éviter d'une manière assez certaine: telle est l'ô-
dématie qui survient aux hémorrhagies qui se ré-

poient souvent; la paralysie de la liogee qui
succède à l'apoplexie; l'amaurose, la cophose,
le bombement d'oreille qui se manifestent dans la
frénésie, le coma, & la péripneumonie qui sur-
vient à l'angine. L'épiginésie provient le plus sou-
vent d'un développement de la cause morbifique,
soit qu'elle parcoure les routes de la circulation,
mêlée à la masse des humeurs, ou que, fixée dans
le tissu des solides, elle en augmente en éner-
gie les forces. Les acrimonies ou crudités étant alors
en excès dans l'organisme, & surpassant de plus
les efforts qui cherchent à les expulser, elles font
naître des mouvemens qui n'ont aucun rapport
à eux, & que l'on peut, par cette raison, regarder
comme autant d'actions contre nature ou symptô-
mes de complication. En effet, la coction est
fondée sur les lois de l'assimilation immorale;
trop de forces, comme point assez, lui font éga-
lement contraires: dans le premier cas, les hu-
meurs, trop agitées, passent bientôt à un point
d'assimilation voisin de l'acrimonie. Plus tran-
quilles dans le second, elles cherchent, en se
combinant, à former des mixtions qui répugnent
aux opérations de l'économie; & qui, dans l'un
comme dans l'autre, tendent à devenir cause de
complication morbifique.

Ce qui a lieu en santé arrive également en
maladie, avec une différence néanmoins dans
la nature de l'assimilation qui cherche à se dévelop-
per. Si elle est du genre inflammatoire, l'épi-
ginésie parait plutôt sous cette forme que sous
toute autre, ainsi qu'on l'observe dans l'inflam-
mation du pharynx ou du larynx, qui survient sou-
vent aux fièvres inflammatoires dont sont atta-
qués les jeunes gens. On en a également un exem-
ple dans les éruptions des parotides, des bubons,
des charbons, des phléitiques, du pourpre, des
dépôts & érysièles gangréneux, qui, survenant
les uns ou les autres dans le cours d'une fièvre
aiguë, forment autant de symptômes ou signes
secondaires qui indiquent un caractère prochain
de malignité. La fièvre disparaît pour l'ordinaire,
& avec elle tous les symptômes dont elle étoit ac-
compagnée; mais le foyer inflammatoire, une
fois mis en activité, continue toujours & devient
par lui-même une maladie nouvelle qui semble
ne rien tenir du caractère de la première. C'est
le contraire quand elle est par congestion; l'épi-
ginésie se présente alors sous une forme chro-
nique qui est d'autant plus rebelle aux remèdes,
que la maladie première est plus difficile à com-
battre: telles sont l'hydropisie qui succède à l'en-
gorgement du foie; l'atrophie, la paralysie, qui
surviennent à la rachitisme. L'épiginésie parait
de préférence sur les parties faibles & sur celles qui
ont déjà souffert après quelques maladies; elle survient
également sur les parties qui ont été affectées
les premières, même sur celles dont la texture n'est
pas fort vasculaire; ainsi, lorsque la suite de la
céphalite, la stase a été portée au plus haut point

oh elle puisse aller, sans occasionner le sphacèle, les tords vauissans étant si affoibli que les racines voisines des nerfs ne sont plus émissibles, il succède une *fatuité* que l'on peut regarder comme épigraïse, & qui, quelquefois, cesse avec le temps. On peut considérer comme autant d'épigraïses, les accès d'épilepsie chez les enfans qui ont eu la frénésie, les douleurs de poitrine qui succèdent à la guérison de la péripneumonie, les palpitations qui succèdent aux fortes convulsions, nombre d'engorgemens du bas-ventre qui terminent les fièvres intermittentes, & la tympanite qui s'ente sur l'hépatite.

L'épizéotie à quelquelors la cause dans le trop grand tou de la fièvre, ainsi qu'on a lien de l'observer chez les hommes rigoureux qui ont atteint le milieu de la vie , & de-là s'enfuit une convalescence longue & souvent pleine de danger. Un effet, lorsqu'à cet âge-on est pris de quelque maladie inflammatoire, le chaleur convertit le sang en une coëueuse dense & comme résineuse; les fibres du lien primitivement affaiblis, n'y a quelques maladies locales, deviennent plus solides & les vases se rétrécissent & même obtolirent, d'où s'enfuit une immobilité plus grande, qui, par un méisme diffèrent, de celui qui vient d'être considéré, occasionne des engorgemens & des squirrhes dont les suites sont très-richesseus quand ils occupent les pmons, le foie, le cerveau & autres viscères intéressés pour la vie; de-là la raison pourquoi les journaliers, les soldats & tous ceux qui vivent de travaux forcés relèvent si difficilement des maladies inflammatoires, lorsqu'elles sont portées au certain point. L'épizéotie qui a lieu chez les vieillards a des suites encore plus opiniâtres & plus difficiles à vaincre; & rend en général leurs maladies moins curables que celles des enfans & des adultes. C'est ce qu'avait déjà observé Celse, qui, en parlant des maladies auxquelles ils sont sujets, dit que *somne est eus, lenta est accedens, astoria natura, ita etiam convalescentiam summo diffieilem & labore plenam efficit*. Mais comme, dans le cas d'une plus grande force de la fièvre, on a plus à craindre la séparation, on aura dans ce cas-ci, par une raison contraire, beaucoup plus à redouter l'émétisme & le squirrhe; car-ici la fièvre se fait lentement, l'engorgement se forme dans des viscères doués de sensibilité, d'où surviennent des maladies d'un tout autre caractère, & que l'on peut perdre pour autant d'épizéoties.

Art. II. De l'épigenèse qui provient des causes accidentelles non prévues.

Ces causes sont extérieures, & conséquemment étrangères à l'organisme tant qu'elles n'ont point été fournies à son action ; elles dérivent la plupart de l'influence des six choses non naturelles ; & plus

encore de la manière d'agir des médicaments donnés dans l'intention de remplir une indication quelconque. Les six choses sont naturelles agissant, par elles-mêmes, sur le corps en santé, de manière à en déranger le mécanisme, peuvent à plus forte raison, dans l'état de maladie, occasionner des changements qui ont leur point d'entrée dans le plan de la nature. Leur influence s'ajoute alors au caractère primitif de la maladie, beaucoup de qualités qui lui sont étrangères, & selon la manière dont elle se dirige, elle augmente la maladie radicale en ajoutant à sa cause, comme aussi à l'organe qui est en souffrance; ainsi une fièvre épidémique offre, selon la différence des temps, des variétés qui annoncent tantôt une métastase & tantôt une simple épigénèse; ainsi une même syncope païde prend le caractère de pleurésie, d'écou, & celui d'une dysenterie; l'automne, ou l'été ou l'automne gangrène au printemps; & ces épigénèses fourmillent & disparaissent, quoique la maladie première continue. Souvent encore, en certaines saisons opposées, comme l'été & l'hiver, une maladie épidémique s'apaise pour reprendre une force nouvelle le printemps & l'automne; & changeant seulement de type, elle offre, le même caractère & les mêmes indications, comme Sydenham l'a observé, & comme on l'observe encore journellement dans la pratique.

La chaleur, ainsi que le fond de l'atmosphère, sont avec raison regardés comme une des causes les plus ordinaires de l'épidémie. Le froid paraît évidemment ajouté à l'irritation de la cause morbifique, une certaine crispation qui s'oppose au travail de la nature, & agit à la déperdition qu'elle tente dans ces circonstances si peu favorables; aussi voit-on les acrimonies morbides intestinales, empêchées dans leurs actions pendant l'hiver, paraître au dehors pendant le printemps, & couvrir le corps de boutons, d'érysiplés & de furoncles, par un mécanisme qu'on a justement comparé à celui de l'ébullition. Sydenham en offre nombre d'exemples dans *l'Histoire de ses constitutions*. La chaleur paroît avoir moins de puissance, mais ses effets n'en sont pas moins réels; elle donne aux épidémies un caractère d'alealecton, qui les fait facilement passer à la putridité; ainsi l'on voit des petites véroles; d'abord bénignes, passer, par cette seule cause, à une peste épidémique, & à diverses épidémies, tels que des flux diarrhéiques, hémorrhoides, le développement, lesquels disparaissent, par le seul usage d'un air frais convenablement administré, l'éruption revient à son état premier. Les accès, les convulsions, les vomissemens, l'éruption qui accompagnent certaines maladies, le diffèrent ou s'appauvrissent également beaucoup par ce simple moyen. Les autres qualités de l'atmosphère, dont il a été fait mention comme causes morbifiques, peuvent également contribuer à faire naître l'épidémie, & avec d'autant plus ou moins d'intensité, que ces qualités sont plus ou moins malfaisantes.

Mais, de toutes les causes extérieures qui peuvent la favoriser, il n'en est point qui soient généralement plus évidentes que le défaut dans le régime ou la nourriture. Hippocrate avoit observé qu'il y a long-temps que l'élément est un poids ajouté aux forces du corps, mais qui doit leur être proportionné, en sorte qu'il puisse être digéré sans trouble, sans peine & même sans sentimens quelconques. Or, ce poids ou cette matière étrangère, en demandant des organes occupés ailleurs, une élaboration qui est au-dessus de leurs forces, non-seulement les détournent, mais même souvent les ôte toute leur action. Aussi Hippocrate, pour ne point déranger la nature dans les affections les plus graves, recommandoit-il la diète la plus légère, & avoit-il soin de se reposer dans les moindres maladies, proportionnellement au surcroît survenu de force, jusqu'à ce que, convenablement rétabli, le corps fût revenu à la vigueur première. Les trop grandes veilles, comme le sommeil trop profond, favorisent également l'épigénèse, soit par eux-mêmes, soit par les excrétions qu'ils accélèrent ou ralentissent, notamment quand celles-ci tiennent à quelque chose de douloureux. Tant que ces excrétions se font convenablement, rien n'a à craindre pour la réchute; mais pour peu que quelques-unes des conditions favorables à leur mécanisme viennent à manquer, la cause morbifique reparoit avec tous ses phénomènes, & c'est ce qu'on voit fréquemment dans les affections catarrhales, les fleurs blanches & autres cas avec excrétion morbifique. Enfin, les passions de l'âme, les excitantes comme les déprimantes, font également naître beaucoup d'épigénèses qui paroissent aussi inopinément que les causes qui les occasionnent; ainsi l'on a vu la convulsion, & la suite d'un accès de colère, s'écarter sur la fièvre intermittente; & lorsque l'émotion étoit apaisée, la somnolence & la catalepsie lui succéder, comme il en est des exemples dans quelques observations insérées dans les *Mémoires de l'Académie des sciences*.

La mauvaise administration des remèdes est sans contredit la cause qui produit le plus souvent & le plus promptement, les épigénèses : on pêche communément sur ce point, pour n'avoir point assez combiné la quantité & la qualité proportionnelle qui doivent être entre les médicaments & les maladies auxquelles ils doivent remédier, ou pour les avoir données dans un temps peu convenable, & peu propre à en favoriser les bons effets. La pratique, combinée à la théorie, donne une telle certitude sur cette maladie, que ce qui étoit possible pour l'homme sans principes & sans expérience, devient vérité pour celui qui réunit ces deux qualités. Il faut, en effet, changer l'état malade du corps, mais il faut aussi que ce changement soit proportionné à la cause qui l'a occasionné. Le remède ne doit donc point être supérieur à cette cause, sinon la matière ennemie & étrangère du remède, pour parler le langage

d'Hippocrate, surpasseroit toujours son effet, & ne pourroit par elle-même qu'agir en mal, comme il arrive dans l'usage inconsidéré du quinquina, de l'opium, du mercure & de tous les autres remèdes qu'on appelle communément *hérétiques*.

Art. III. De l'épigénèse occasionnée par le développement du virus.

Telles saïnes que paroissent nos humeurs, considérées dans toute leur masse, elles ne contiennent pas moins quelquefois des principes de virulence, qui, cachés, attendent les circonstances favorables à leur développement. Ces principes ne se manifestent point par eux-mêmes, mais bien par leurs effets, qui varient à raison de la nature différente des virus. Ces principes semblent avoir une singulière affinité avec la lympe coagulable, ou du moins on peut le penser des virus vénériens, scorbutiques, phtoriques & catarrhiques; cependant le virus vénérien paroît, quand il est ancien, se porter de préférence sur le système des solides; il peut même tellement se combiner à eux, qu'il ne donne aucun signe de la présence; il est en quelque sorte neutralisé & incapable, sous cette nouvelle forme, d'aucune action quelconque. Les maladies inflammatoires ont la singulière propriété de développer les virus, surtout quand elles se jugent par un dépôt ou une suppuration locale. Le mouvement alors imprimé à tout le système, donne une activité nouvelle aux principes de virulence, & les contraint en quelque sorte à se porter avec toute leur force vers le lieu où l'irruption s'est faite; mais souvent aussi ils se portent dans l'idiotisme substance des os, & y produisent de grands désordres évidens, qu'il n'est pas possible de se refuser à en reconnaître la cause; ainsi l'on voit souvent les bubons secondaires, les exostoses, les caries, les ulcères vénériens de la gorge paroître comme spontanément, vers la fin des fièvres qui ont duré un certain temps; une dissolution scorbutique décidée succéder à la pyrexie monome chronique, les vieillards, & être atteints par des éruptions érysipélateuses, livides, & par des taches cuticulaires répandues çà & là sur la peau. On a observé que ces changements étoient ordinaires, vers le Nord, chez ceux qui avoient été long-temps tourmentés de la fièvre Sydnaham, qui avoit déjà fait la même remarque, pensant que la cause en étoit le long usage du quinquina; mais une observation plus attentive l'a fait reporter à une certaine constitution du corps propre à la favoriser. On ne fait point encore quelle est la nature du virus scorbutique; quelques-uns vont même jusqu'à nier son existence, & conséquemment la possibilité de sa communication; & les expériences qui appuient leurs sentimens semblent si concluantes, que l'on peut regarder comme fautive l'opinion où étoit Boerhaave, que le scorbut, dans son dernier état, étoit contagieux; *contagium ceteris*.

Mais si un virus, quelle que soit la manière dont il se développe, peut perdurer par lui-même un genre d'épizéotie, la germination apparente des effets qu'il produit, peut en occasionner d'autres dont la nature ne sera bien connue qu'à celui qui persévérera soigneusement toutes les circonstances précédentes, avec celles qui existent actuellement. Il arrive assez souvent, par exemple, que des éruptions pectorales ou dartreuses disparaissent dans le cours d'une fièvre inflammatoire; le virus se jetant alors sur les pommoux, y excite un éréthisme qui s'effuie de la toux & autres symptômes apparents de la pleurésie, & ces symptômes persistent jusqu'à ce que le virus revienne occuper son premier siège avec la même apparence. Les maux de gorge, l'asthme, les ophthalmies surviennent aussi vers la fin des fièvres éruptives, & persistent jusqu'à ce que cette dernière affection soit radicalement guérie : c'est le propre de tous les virus, de ne donner aucun signe d'eux tant que la maladie aiguë qui leur survient continue, & de épanouir vers la fin, plus ou moins ouvertement, selon l'activité de la force qui leur reste encore.

Les maladies inflammatoires, celles qui sont générales ou fébriles, qui durent un certain temps, & dans lesquelles le développement des germes d'une fépécie manifeste, ont une grande influence dans la destruction des virus causés; ainsi des dartres anciennes ont été guéries par des synoches putrides, telles que celles qui régnoient ordinairement entre les tropiques; après les pluies chaudes qui ont duré long-temps. Ces faits, confirmés par une expérience & celle de quelques autres voyageurs, pourroient avoir leur utilité dans les affections hépatiques anciennes, s'il étoit possible de tenter une guérison pareille dans les cas qui, par eux-mêmes, ne sont pas sans danger. Quelques praticiens ont eu l'occasion de faire la même remarque à l'égard du virus arthritique, & peut-être que si l'on observoit mieux, on la trouveroit applicable à d'autres virus. On sait que le virus scrophuleux, quand il n'est point enraciné, est un des plus dociles aux efforts de la nature; ceux qui ont lieu à l'âge de puberté, pour porter les organes à leur plus grande perfection, suffisent souvent pour opérer une crise favorable & en produire l'expulsion.

(PETIT-RADEL.)

MÉTACARPE, de *meta* & de *carpe*. Dénomination sous laquelle on désigne la portion de la main qui se trouve entre le poignet & les doigts, essentiellement formée de cinq os qui s'unissent par leur partie supérieure avec le carpe, dont les osselets présentent le mode d'articulation le plus favorable pour rompre les chocs dans les divers mouvements d'exploration, ou même de percussion & de résistance. On a composé sur ce mot plusieurs dénominations très-significatives dans la nouvelle nomenclature anatomique, telles que celles de *métacarpophalangien* & *phalangien* qui, mé-

carpophalangien du poignet, *métacarpophalangien* latéro-palmaires (muscle interosseux internes de la main), *métacarpophalangien* latéro-fuspalmaires (muscle interosseux externes), &c.

MÉTACHORESE, de *meta* & *chore*, je passe d'un endroit dans un autre. Dénomination sous laquelle on a indiqué la translocation fopposée de la maladie d'un lieu qu'elle occupoit d'abord, dans un autre qu'elle viendroit occuper ensuite, par une espèce de déplacement ou de révolution. (Voyez MÉTASTASE.)

MÉTAL, MÉTAUX, substances métalliques.

Ce que l'on a appelé pendant long-temps & dans un sens générique le *regne minéral*.

Dans l'état présent de la médecine, plusieurs métaux & leurs différentes préparations sont employés & consistent même les moyens les plus efficaces de la thérapeutique.

Des substances du même genre furent aussi employées par les Anciens; ainsi, d'après l'observation de Leclerc, déjà au temps d'Hippocrate, on que l'on appelloit le *plomb brûlé*, la *céruse*, le *vert-de-gris*, l'*oxyde d'antimoine*, le *cinabre*, la *litharge*, le *pompholyx*, entroient dans certains emplâtres, dans certains collyres, & dans plusieurs autres préparations médicamenteuses extérieures.

Long-temps avant Dioscoride on donna aussi des substances métalliques, intérieurement, & dans certaines vues thérapeutiques (1); mais cet emploi des métaux par les médecins anciens étoit en général très-borné, ce ne fut que dans le moyen âge, mais surtout dans le quinzième & le seizième siècle, que la matière médicale minérale prit tout-à-coup une très-grande étendue; on lui fit alors établir, en opposition avec la médecine galecnique, la médecine chimique, ou pythagorique, qui trouva une résistance si violente dans l'esprit de corps & dans ce respect pour les Anciens, d'après lequel on regardoit le degré de savoir auquel ils étoient arrivés dans tous les genres, comme le *non plus ultra* où le dernier terme des connaissances humaines. (Voyez MÉDICINE (Matière).) (L. J. M.)

MÉTALLIQUE (Colique). On donne ce nom générique en la particuliarisant, à la maladie des ouvriers qui sont exposés, dans l'exercice de leurs métiers, à l'action délétère du plomb, tels que les peintres, les faïenciers, les plombiers, les potiers de terre, les broyeurs de couleur, &c.

(1) La rouille de fer, les eaux minérales, &c. que l'on appeloit la *ruille*, l'*écaille d'airain*, le *chalcitis*, le *cinabre*, plusieurs espèces de terre, plusieurs sels, principalement le sel arthritique, qui, au rapport de Pline, le prépaient dans l'Ombre.

(Voyez FIOMA (oblique de), maladie sur laquelle M. le Docteur Mérot a publié, dans ces derniers temps, une excellente monographie.)

MÉTAPHOROPHÏSE. Cette dénomination, qui tient à l'ancien système d'Asclépiade sur la formation des corps, s'étoit conservée dans la pathologie scolastique, où elle avoit la même signification que le nom également pédautesque de *métaphrasie*, qui indique d'une manière générale tout changement dans la manière d'être & de se combiner de leurs molécules constitutives. (Voyez MÉTASTASIS, de *metastasis*, *translatio*.)

MÉTAPTOSE. (*Pathologie générale.*) Mot emprunté du grec *μετατροπή*, en latin *degeneratio*, pour désigner toute conversion d'une maladie en une autre si dissimilable, qu'il n'est plus possible de reconnaître la première.

(PETIT-RABEL.)

Le mot *métaptose* s'emploie ordinairement dans un sens beaucoup moins étendu que celui qui paraîtrait devoir résulter de l'acception étymologique. Il se borne à indiquer la conversion d'une maladie qui ne change point de place, mais de nature, & en se montrant avec des symptômes qui font la conséquence ou la suite d'un état antérieur de maladie. C'est ainsi que le passage de la péripneumonie à la pleurésie, celui d'une pleurésie à l'induration, & aux diverses affections chroniques qui peuvent résulter de ce mode d'altération, sont des changements ou des successions de maladie par métaptose. Ils diffèrent de l'épigénèse, autre mode de changement dans lequel des symptômes nouveaux viennent se joindre à une maladie déjà existante, qui n'en continue pas moins son cours avec cette complication. (L. J. M.)

MÉTAPTOSE. (*Médecine pratique.*) Ce mot est emprunté du grec *μετατροπή*, qui signifie transition d'une espèce en une autre. On l'a vu en médecine pour indiquer cette suite d'actions particulières qui, changeant le mode morbifique d'une maladie première, produit une suite de phénomènes étrangers à son caractère primitif de l'affection première; une péripneumonie qui, dans son premier temps, se convertit en pleurésie; la repercussion d'une gale qui est suivie d'un empyème, d'une ascite, d'une maie, une ophthalmie à la suite d'une suppression de la blennorrhagie. Comme il en est un nombre d'exemples chez les observateurs, on peut bien ici fixer l'esprit sur les phénomènes que nous cherchons à développer. Mais, pour mieux encore faire connoître la chose, entrons dans quelques détails à ce sujet. L'observation, disoit-je dans mes *Institutions de médecine*, prouve que, quoique les maladies semblent être le résultat d'un désordre apparent, elles n'en

sont pas moins le produit d'une cause première dont l'influence est réglée sur la loi de l'organisme, & qui agitroit généralement de la même manière chez les divers individus, en les supposant tous dans les mêmes circonstances. Mais ce principe simple de maladie, ce morigène identique, contrarié souvent dans ses opérations, à raison de l'idiosyncrasie & autres circonstances souvent éventuelles, occasionne des actions ou apparences disparates, & dans lesquelles cependant on aperçoit encore de la régularité, pour peu qu'on les étudie avec quelque attention. Ici, lorsque tout paroitroit altérer le type de la maladie, une nouvelle scène se présente tout-à-coup, les symptômes prennent toute autre apparence; il faut alors tenir une conduite différente dans le traitement, & encore souvent la même raison n'en est elle pas moins suivie: c'est ce que démontre souvent, dit Lorry dans son *Traité du Prognostic*, la succession des symptômes que présentent les maladies quand elles menacent de se terminer par la mort. Dans quelques-unes, c'est un délire frénétique, dans d'autres une affection soporeuse, quelquefois des mouvements épileptiques qui caractérisent la funeste influence sur le cerveau ou les méninges; d'autres fois, c'est en point de côté très-douloureux, une grande difficulté de respirer, qui annoncent une action nouvelle fixée sur les poumons ou sur la plèvre, ou méfiorisme du bas-ventre, une tumeur douloureuse qui affecte telle ou telle partie de cette capacité. La métaptose diffère de l'épigénèse, dit Lorry dans son *livre de Morborum conversionibus*, en ce que, dans l'épigénèse, une maladie est ajoutée à une autre; une cause nouvelle est entrée sur une ancienne & lui allie ses propres symptômes; au lieu que dans la métaptose, la maladie première change & prend un caractère absolument dissimilable du premier; ainsi, lorsque cette dernière est régulièrement traitée, arrive-t-il souvent que la santé est entièrement rétablie par le nouveau travail que comporte la maladie secondaire; c'est ce qui a lieu dans les cas où des spasmes remplacent une intermittente, où une syncope succède à la repercussion d'une tumeur dartsaue fixée à l'extérieure; mais ces sortes de métaptoles sont ordinairement beaucoup plus fâcheuses. Schenckius, dans ses *Observations médicales*, parle d'une femme qui, après la rentrée d'une teigne, souffrit long-temps d'une céphalée qui lui fut insupportable. A l'ouverture de son crâne on trouva une portion du cerveau sphacelée, avec une collision de fibres d'un jaune-citron. Bailion, dans ses *Constitutiones medicæ*, cite aussi un diabète qui survint à la suppression des fleurs blanches.

La métaptose s'observe souvent dans le cours des affections syphilitiques & récentes; elle est alors d'une gravité d'autant plus grande, que l'organe affecté en second est doué d'une sensibilité plus vive. L'organe de la vie, celui de l'ouïe,

l'arrière-bouche, les articulations font les parties où le mal débute souvent avec une telle violence, qu'il faut toute la sagacité du praticien pour lui opposer des bornes (Voyez, pour de plus grands détails, les articles *OPHTALMIE* & *STRAUSSE*, & tout ce que j'ai dit sur cette matière au premier volume de mon *Cours de maladies syphilitiques*.)
(M. PÉRIE-RADÉL.)

Les maladies où l'on a occasion d'observer les métastases les plus fâcheuses, sont celles qui dérivent d'un héritage rhumatismal, arthritique ou psorique, qui s'établissent depuis plus ou moins de temps, sont répétées d'une manière subite sur l'estomac ou les entrailles, & y excitent des douleurs les plus violentes. La pratique journalière offre des cas de ce genre, & les observateurs n'ont point passé sous silence les symptômes, dont l'application à l'intérieur peut être suivie d'un favorable succès.

MÉTASTÉMATISME. Dénomination scolastique tout-à-fait tombée en désuétude, que l'on employoit pour désigner de la manière la plus générale la terminaison d'une maladie par une autre maladie, qui lui succédoit d'une manière plus ou moins heureuse & plus ou moins favorable, de *transformation*, & de la préposition *meta*, qui marque un changement.

Certaines dénominations ont été employées pour indiquer les principales variétés dont ce genre de terminaison est susceptible; ainsi, le mot *diastase*, *succession*, indiquoit une espèce de conversion dans une maladie nouvelle, & le mot *metastase*, le passage d'une maladie du lieu qu'elle occupoit d'abord, dans une autre partie de l'organisation; du verbe *mutare*, je transforme.

On a aussi employé le mot *metastase* pour indiquer cette translation d'une manière plus générale, afin de prendre le *metastase* dans un sens délayable, c'est-à-dire, pour tout changement qui se fait d'une manière fâcheuse; restriction dont l'usage n'a pas été conservé. (Voyez *METASTASE* & *METASTASE*.) (L. J. M.)

METASTASES. (*Pathologie générale.*) Métastase, dans le sens étymologique & littéral; déplacement, transport d'une maladie quelconque, du lieu qu'elle occupoit, dans une autre partie de l'organisation plus ou moins éloignée. La pratique de la médecine a fait reconnaître un grand nombre de ces déplacements ou translations de maladies, qui ont été, qui sont encore mal compris par les gros médecins, comme par les garde-malades, & sur lesquels il reste beaucoup de connaissances à acquérir, malgré les progrès de l'anatomie physiologique & médicale.

Tantôt ces translations s'opèrent de telle sorte que la maladie, ou plutôt les symptômes les plus apparents d'un état morbide, quittent tout-à-

coup une région quelconque d'un système d'organes pour occuper une autre région du même système; déplacement dont il existe des exemples nombreux. Ainsi, il n'est pas rare de voir l'ophthalmie succéder tout-à-coup à la gonorrhée syphilitique, le catarrhe paléopneumonique au catarrhe des fosses nasales, le mécomatisme paléopneumonique au catarrhe intestinal au catarrhe utérin (seins blanches), &c.

On voit également, dans certains cas, l'inflammation aiguë ou chronique de l'arachnoïde se déplacer tout-à-coup en pleurésie latente; & une sorte de névralgie des nerfs du cœur, du diaphragme ou de l'estomac, survenir subitement, & sous la forme d'une goutte rumante; à la suite d'une attaque de goutte, artificiellement ou spontanément interrompue; enfin, des déplacements du même genre ont encore plus souvent lieu dans le tissu cellulaire. Dans toutes ces circonstances on peut, jusqu'à un certain point, expliquer ces déplacements ou métastases par l'apologie de structure & de propriété des parties engagées, leur capacité de solidité, la facilité avec laquelle elles qui sont plus folles ou plus sensibles peuvent être affectées, soit par sympathie, soit parce que l'irritation est interrompue ou lentement épuisée dans la partie qui d'abord avoit été le siège de la maladie.

Dans plusieurs autres cas, les déplacements métastatiques sont beaucoup plus compliqués; certains mélanges, différents névroses abdominales ou cérébrales le montrent tout-à-coup après les affections cutanées; l'inflammation suppuratoire des parotides, après certaines fièvres malignes; l'apoplexie, l'apoplexie même après la guérison imprudente d'ulcères chroniques, à l'exclusion desquels il est quelquefois raisonnable d'attribuer la conservation de la vie & de la santé.

Dans ces occurrences il est bien plus important de chercher à connaître les faits que de les expliquer d'une manière hypothétique. On doit en faire le plus grand nombre possible, faire leur développement, les analyser dans leurs moindres circonstances, en oublier jamais qu'une coïncidence ou une succession d'événements, n'est pas toujours une relation de causes & d'effets; qu'enfin, ce que l'on a désigné sous le nom de *metastase*, comprend souvent des phénomènes très-différents les uns des autres; ajoutons que les médecins ont quelquefois regardé comme de véritables métastases, des périodes plus avancées d'une même maladie, qui, après avoir occupé certains organes, s'étendent ensuite en se portant à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qu'il sera facile de concevoir par des exemples, en parcourant l'histoire des scrophules & des maladies goutteuses (1), ou le

(1) Il n'est pas rare de voir l'inflammation tuberculeuse du psoas succéder, dans la jeunesse, à des affections scrophuleuses du cou ou du visage.

Il n'est pas rare aussi de rencontrer, chez des personnes

qui devierent dans la suite beaucoup plus clair, beaucoup plus susceptible d'applications pratiques, lorsque l'on aura mieux étudié & mieux connu, par de bonnes observations, le développement des conditions morbides.

Quoi qu'il en soit, l'auteur de l'article MÉTASTASE de l'ancienne Encyclopédie, dans lequel on trouve à chaque ligne la manière originale & le cachet indélébile de Boerhaave, nous paroit mériter encore aujourd'hui l'attention des médecins les plus éclairés. Nous avons cru ce conséquenter, & dans l'intérêt de nos lecteurs, devoir reprendre & conserver cet article sans y rien changer, & en nous bornant à y placer, de loin en loin, quelques notes, lorsque les opinions de l'auteur s'éloignent par trop de l'état présent des connaissances, ou s'en rapprochent, mais avec des formes de langage qui pourroient empêcher d'appréhender cette concordance.

MÉTASTASE. Ce mot est entièrement grec (*metastasis*), dérivé & formé de *metasthai*, qui signifie transporter, changer de place. Il désigne, suivant le sens littéral & le plus reçu en médecine, un transport quelconque d'une maladie, d'une partie dans une autre, soit qu'il se fasse du dehors en dedans, soit au contraire qu'il aille du dedans au dehors. Quelque auteurs relèguent la signification de *metastasis* au changement qui se fait eu mal, lorsque la maladie passe dans une partie plus noble que celle où elle étoit auparavant; ils en font une espèce de métaplasie (*metaploia*), qui, suivant eux, est le mot générique, qui signifie tout changement en mal ou en bien, doctant le nom de *diathesis*, au transport salutaire, qui arrive, lorsque la maladie va d'une partie noble à une autre qui l'est moins; mais le nom de métastase est le plus usité; il est pris indifféremment dans presque tous les ouvrages de médecine, pour exprimer un changement quelconque fait dans le siège d'une maladie. Galien dit explicitement, que la métastase est le transport d'une maladie d'une partie dans une autre (*Comment. in Aphor. 7. lib. V.*), & Hippocrate, dans cet Aphorisme, s'en sert pour marquer un changement salutaire ou même une certaine dissolution, lorsqu'il dit que les affections épileptiques, survenues avant l'âge de puberté, soulèvent une métastase, mais que celles qui viennent à l'âge de vingt-cinq ans, ne le guérissent jamais.

Les symptômes qui accompagnent la métastase varient extrêmement, suivant l'espèce, la gravité de la maladie, l'état, la disposition, la situation,

l'usage des organes que la maladie abandonne, les parties où elle va se déposer, &c. le dérangement qu'elle y occasionne. Si la métastase se fait du dedans en dehors, les symptômes de la maladie primitive cessent, les fonctions des viscères affectés se rétablissent, & l'on aperçoit à l'extérieur, des abcès, ulcères, éruptions cutanées, tumeurs, &c. (1).

On voit souvent des maladies métastées de position, se terminer par des tumeurs aux testicules, par des abcès aux jambes, des évacuations de pus par les urines; des migraines, des coliques néphrétiques se changer en goutte (2); à la métastase succèdent quelquefois des éruptions cutanées; des parotides jugent des lèvres malignes, &c. Lorsque au contraire la métastase se fait du dehors en dedans; les tumeurs disparaissent, s'éteignent entièrement, les ulcères se ferment, les éruptions rentrent, les abcès se dissilent, la goutte ramonte, &c. Mais à l'instant on voit succéder des symptômes très-multiples, & pour l'ordinaire très-pessans. Il y a beaucoup d'observations, qui font voir qu'en pareil cas, les métastases ont déterminé des attaques d'apoplexie, d'épilepsie, des gouttes seréines, des toux opiniâtres, des asthmes suffocans, des dépôts dans la tête, la poitrine, le bas-ventre, l'hydropisie, l'ictère, la cachexie, le marasme, &c. Il est incontestable avec quelle rapidité ces métastases font suivre des accidens les plus graves, & de la mort même. J'ai vu un homme qui avoit un vieil ulcère à la jambe; peu satisfait de quelques applications indifférentes que je lui conseillois, & qui entretenoient toujours l'écoulement de l'ulcère, il s'adressa à un chirurgien qui lui promit des secours plus efficaces; il résulta en effet à cicatrifier l'ulcère; mais la peine eut-il cessé de couler, que le malade tombe comme apoplectique, avec une respiration stertoreuse; les forces paroissent épuisées, le pouls est petit, faible, fuyant sous le doigt; appelé de nouveau pour voir ce malade, je fais à l'instant ouvrir l'ulcère, appliquer un caustique puissant sur les deux jambes,

(1) Cette idée d'un déplacement de dedans en dehors, quoiqu'elle porte sur des faits pratiques, sur des résultats d'observations, a quelque chose de trop vague dans son exposition. La manière dont elle est énoncée par Boerhaave sera beaucoup mieux conçue, si l'on se rappelle les rapports qui existent les membranes intérieures avec la peau, & la liaison non moins intime de cette lambeaux au cellulaire, qui contribue au parenchyme des viscères, avec le tissu lambeaux sous-cutané, plus ou moins abondant dans l'épaisseur des membranes.

(2) Les migraines, les coliques néphrétiques, ne se changent pas en gouttes, mais ont plutôt une complexion goutteuse, présente dans les premiers développemens des migraines, qui ne font autre chose que des névralgies temporales, primitives ou consécutives, ou une néphrite calculuse, & dans leurs développemens plus avancés, une fluxion inflammatoire sur les articulations. Ce n'est pas alors une maladie qui remplace une autre maladie; mais deux périodes d'une affection de même nature qui y succèdent à des époques très-distinctes.

dans la complexion est éminemment caractéristique par une disposition goutteuse, des névralgies temporales ou gâtiques, formant pendant long-temps les périodes ou la première période d'un état goutteux, qui se montre plus tard, en se joignant avec plus ou moins de violence sur les articulations.

mais en vain; le malade mourut deux heures après. A l'ouverture du cadavre, nous trouvâmes le pœmon rempli d'une matière purulente (1).

» La manière dont ces métastases s'opèrent est assez surprenante & assez obscure, pour fournir matière à bien des disputes & des discussions. Elle a beaucoup exercé les esprits des médecins dissortateurs; la plupart, suivant par habitude la théorie vulgaire, qu'ils ont la paresse de ne pas approfondir, ont cru bonnement qu'il y avait toujours un transport réel de la matière, qui avait excité premièrement la maladie dans la partie où elle étoit établie son nouveau siège; & qu'ainsi une tumeur extérieure disparaissant, le sang coagulé qui la fermoit, étoit porté dans la poitrine, par exemple, & excitoit dans les pœmons une semblable tumeur. Ils ont avancé que ce transport étoit opéré par un remplacement de cette matière morbifique, par les vaisseaux absorbans qui la transmettoient aux vaisseaux sanguins, d'où elle étoit portée par le torrent de la circulation aux différentes parties du corps; & qu'en chemin faisant, elle s'arrêtoit dans la partie la plus disposée à la recevoir. D'autres, frappés de la promptitude de cette opération, plus instruits des véritables lois de l'économie animale, moins embarrassés pour en expliquer les phénomènes, n'ont pu goûter un transport inutile, un remplacement gratuit & souvent impossible; ils ont fait jouer aux nerfs tout le mécanisme de cette action: ainsi le transport d'un abcès, d'une partie du corps à l'autre, leur a paru opéré par un simple changement dans la direction du spasme suppuratoire (2).

» Il est très-certain que, pendant que la suppu-

ration se forme, il y a dans toute la machine, & surtout dans la partie affectée, un état de gêne, d'irritation, de constriction qui est très-bien peinte dans le pœmon, où l'on observe alors une roideur & une vibratilité très-marquées. La constriction spasmodique qui détermine dans la partie eurgorgée la suppuration, est formée & entretenue par un spasme particulier du diaphragme, qui changeant, & de place & de direction, produit le même effet dans une autre partie, & fait ainsi échanger un abcès de place.

» Ce changement est beaucoup plus simple dans les maladies sans matière, qui font exactement nerveuses. Cette idée isolée & prise séparément est ici dénuée des preuves qui résultent de l'ensemble de toutes les parties de l'innéux système, que son auteur a proposé dans l'aide de l'homme physique & moral, & dans les *Institutiones ex nova medicina conspectu*. Elle pourra paroître par cela même vraisemblable; mais pour en apercevoir mieux la liaison & la justesse, le lecteur peut consulter les ouvrages cités. Je ne dissimulerai cependant pas qu'elle ne peut guère s'appliquer à une observation faite à l'hôpital de Moutpellier. Un malade avoit un abcès bien formé au bras; on apercevoit une fluctuation profonde, éleuse; on négligea cependant de donner issue au pus: dans la nuit, le malade tombe dans un délire violent; il meurt le matin; on l'ouvre, on trouve le cerveau inondé de pus; on dissèque le bras où l'on avoit aperçu l'abcès, on n'y voit qu'un vide assez considérable entre les muscles & l'os du bras. Il paroît par-là qu'il y a eu un transport réel de matière, mais rien n'empêche que les nerfs n'y aient concouru; la manière dont ils l'ont fait est fort difficile à déterminer. On voit aussi quelque chose de fort analogue dans les vomiques qui se voient entièrement par les urines; mais ce qui favorise encore l'idée que nous venons d'exposer, c'est une espèce d'uniformité qu'on observe dans quelques métastases, qui a donné naissance aux mots vagues de sympathie, si souvent employés, si rarement définis & jamais expliqués; ainsi des douleurs néphrétiques se changent communément en goûte; des dartres répêcutées portent fur la poitrine; une gale rentrée de dans lieu de des bydropiques; un abcès à la poitrine se vide par les jambes; une tumeur aux testicules, survenant à la tour, la dissipe & disparaît à son tour, quand la teux survient. Il y a bien d'autres exemples semblables qui mériteroient d'être examinés; & ce seroit au point d'une grande importance en médecine que de bien constater & classer la correspondance mutuelle des parties.

» Les métastases qui se font du dedans au dehors, sent des espèces de crises, ouvrages de la nature; les causes qui les déterminent & leur manière d'agir sont tout-à-fait inconnues. On voit un peu plus clair fur les métas-

(1) On ne peut se refuser à croire que, dans certains cas, la disparition de différents ulcères, l'affaiblissement de différentes tumeurs, passioient occasionner des lésions intestinales très-graves de l'estomac ou des organes principaux de la poitrine & du bas-ventre; mais en faisant cette concession, il est nécessaire d'observer que, dans beaucoup de circonstances, ces mêmes affections extérieures ne disparaissent que par l'effet même de la maladie, que l'on attribue à leur déplacement: ce qui est évident pour les ulcères, les cancers ou les végétations, dont la suppuration diminue ou est suspendue, soit qu'elle approche, soit au début d'une maladie aiguë. Il est évident que, dans ces circonstances, on prend le cours elle-même pour l'effet, en négligeant d'apercevoir qu'une inflammation chronique, faisant fondre d'immortels, n'est pas en présence contre l'apoplexie, la pleurésie, ou toute autre maladie grave, & que si une de ces affections morbides vient à se manifester, elle doit suspendre le mouvement périodique des forces vitales, & faire cesser ainsi, tout-à-coup, certaines maladies externes, habituelles & chroniques, dont la disparition est prise alors pour la cause du phénomène, qui l'a directement & positivement occasionnée.

(2) Cette idée d'un spasme suppuratoire s'éloigne bien moins pour le mode que pour la forme, de l'état présent des connaissances sur cette question de pathologie. Substituée à ce mot, celui d'irritation suppuratoire, employé & compris dans les idées de l'ingénieur auteur de l'article AGUELLOU de ce Dictionnaire; vous énonceriez un fait, au lieu d'avancer une hypothèse.

tales qui se font des parties extérieures à l'intérieur ; ou fait qu'elles se font la suite de l'application imprudente des répercussifs, du froid, des remèdes qui empêchent l'écoulement d'un ulcère, la formation des exanthèmes ; elles sont aussi quelquefois excitées par des cardialgies, par des faiblesses, par des défaillances, par des remèdes internes qui changent la direction du spasme, d'où dépendent ces affections extérieures, par un excès dans le manger, qui, en augmentant le ton de l'estomac, produit les mêmes effets, &c. &c. (1).

» On peut déduire de-là quelques canons pratiques sur les métastases :

» I. Qu'il faut seconder, autant qu'il est possible, celles qui se font au dehors ; il est même des occasions où il faut tâcher de les déterminer. Pour en venir plus sûrement à bout, il faudroit connaître la manière de faire changer de direction aux forces phréatiques, & les détourner vers l'organe extérieur, ou vers quelque couloir approprié ; au défaut de cette connoissance, nous sommes obligés d'aller à tâtons, guidés par un empirisme aveugle, souvent insuffisant. Dans les maladies de la tête, la métastase la plus heureuse est celle qui se fait par les selles ; les purgatifs sont les plus propres à remplir cet objet : dans celles qui attaquent la poitrine, surtout les chroniques, la voie des urines & les abcès aux jambes sont les plus salutaires ; on peut par les diurétiques, & surtout par les vésicatoires, remplir la première vue, & imiter, par l'application des caustères, l'abcès aux jambes. Dans les affections du bas-ventre, le flux hémorroïdal est le plus avantageux ; on peut le procurer par les fondans hémorroïdants, aloétiques : dans quelques cas, les maladies éruptives ont été une heureuse métastase. Ici, le hasard ou la nature peuvent plus que les remèdes.

» II. Dans toutes les affections extérieures qui dépendent d'une cause externe, il faut éviter les remèdes répercussifs, ou autres qui puissent empêcher la formation & l'étendue de la maladie ; & si, par quelque cause impérieuse, la maladie souffre une métastase toujours dangereuse, il faut aussitôt tâcher de la rappeler.

» 1°. Et attaquant, s'il y a lieu, la cause qui l'a excitée ; la faiblesse, par les cordiaux ; les excrétions opposées, par les astringens appropriés ; le poids des alimens dans l'estomac, par l'émétique.

» 2°. Par des remèdes topiques qui puissent renouveler l'affection locale ; ainsi on rappelle la goutte par des applications chaudes, par des épispastiques & les vésicatoires ; si un ulcère fermé a

donné lieu à la métastase, il ne faut que le rouvrir par un cautère mêlé avec du suppuratif ; l'application des ventouses peut faire revenir une humeur, un abcès répercuté ; les bains & les sudorifiques conviennent dans les maladies exanthématiques rentrées : pour ce qui regarde la gale, l'expérience m'a appris qu'il n'y avoit pas de meilleur remède que de la faire reproduire.

Une jeune fille qui, à la suite d'une gale rentrée, étoit devenue hydrolique, fut par ce moyen guérie en peu de jours ; il est très-facile de reprendre la gale en couchant avec une personne qui en est atteinte : le même expédient pourroit, j'imagine, réussir dans les cas semblables de dartres, qui étant répercutées, sont à l'intérieur beaucoup de ravages ; personne n'ignore avec quelle facilité elles se commuoquent en couchant ensemble.

Pour traiter la grande question des métastases, avec plus de détail on de méthode que ne l'a fait l'auteur de cet article, il faudroit y faire rentrer, presque en totalité, les questions les plus compliquées de la médecine pratique & de la physiologie médicale. Il importeroit d'abord d'établir, d'une manière positive, ce qui constitue une métastase bien caractérisée, & distincte d'une simple déliéece ou d'une résolution, ainsi que de l'espèce de révolution qui s'opère dans un individu affecté d'une maladie chronique qui, s'aggravant tout-à-coup au milieu d'une maladie aiguë, se termine alors d'une manière fâcheuse. Il n'est pas moins nécessaire de reconnaître & d'assigner les maladies les plus exposées aux métastases, celles dont il est même difficile de suspendre les principaux symptômes, sans s'exposer à une révolution métastatique. Enfin, on doit réunir aussi tous les moyens de l'observation clinique & de l'analyse médicale, pour apercevoir comment s'opèrent les métastases, & quelles sont les causes de celles qui sont le plus à craindre dans le cours des maladies.

On ne doit donc se fier qu'il existe véritablement une métastase, que dans le cas où une maladie se porte d'un lieu à un autre sans être terminée, & en suivant une marche telle, que l'on ne puisse pas supposer que c'est une maladie nouvelle qui succède à une maladie antérieure, ou le redoublement, l'exaspération d'une affection chronique, qui de latente ou d'effluve qu'elle étoit, devient tout-à-coup plus vive, plus évidente, & qui ne peut se présenter avec les apparences d'une maladie nouvelle, qu'aux regards d'un praticien qui n'est point assez familiarisé avec l'habitude de l'analyse & l'esprit d'observation.

On ne regardera donc point, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, comme une métastase, l'apparition d'une maladie aiguë quelconque, telle que la pleurésie, l'apoplexie, une fièvre d'accès, &c., qui succède à une dartre, à un ulcère, à une maladie externe quelconque qui, se suspendant tout-à-coup, & par l'effet même de son nouvel état

(1) La lecture de ce paragraphe conduit mieux qu'aucune autre considération, à l'idée qu'une maladie comprend le plus souvent un certain ensemble de phénomènes, d'événemens, qui se succèdent dans un ordre déterminé, & qu'il suffit d'en troubler, d'en déranger quelques-uns dans plusieurs circonstances, pour occasionner une terminaison fâcheuse.

morbide, ne peut en paroître la cause, qu'à des observations très-pen éclairées. On sera également éloigné de prendre pour une métastase, le développement plus marqué, l'extension subite dans le cours d'une maladie aiguë, d'une phlegmasie latente quelconque, ou d'une lésion organique du cœur ou des gros vaisseaux, qui exilloit avant cette maladie, & qui en paroît la suite ou la terminaison, si l'on ne comprend que la situation actuelle du malade, dans ses observations.

Toutes choses égales d'ailleurs, les métastases ne se manifestent pas également dans toutes les maladies, & n'ont même ordinairement lieu, que pour les affections dont la cause paroît dépendre d'un principe d'irritation, inconnu & mobile, comme celui de la goutte, du rhumatisme goutteux, &c., & d'un grand nombre de maladies aiguës, & attribuées à des causes d'irritation intérieures & toujours très-complicées. Ainsi, on ne cite aucun exemple de la métastase d'une pneumonie, ou d'une hépatite, occasionnée par une blessure, tandis qu'il n'est pas sans exemple, qu'une phlegmasie, à la vérité moins intolérable, & avec une lésion organique moins forte, vienne à cesser tout-coup, du quatrième au cinquième jour, pour faire place à une autre phlegmasie plus ou moins forte, ou même à une simple irritation que l'on dit être alors la crise de la maladie.

Il ne faut donc pas être étonné si les fièvres éruptives, les exanthèmes, les fluxions douloureuses, les rhumatismes, la goutte, les névralgies, &c., présentent plus souvent que les autres maladies, des exemples de métastases. La plus légère imprudence, la perturbation, en apparence la plus insensible, suffisoit, comme on sait, pour troubler la marche de ces maladies, les interrompre brusquement, les déplacer, & leur faire abandonner un siège, qu'elles pouvoient occuper impunément, pour les porter vers des parties plus essentielles à la vie, & qu'elles ne peuvent envahir sans offrir toutes les chances d'une terminaison funelle.

Plusieurs maladies chroniques, & dont la durée est indéterminée, sont aussi le plus souvent remplacées par des maladies beaucoup plus graves, si on interrompt brusquement leur cours par une modification perturbatrice ou résolutive. Telles sont le plupart des maladies, qu'un savant médecin du dix-huitième siècle a réunies sous un même point de vue, dans un traité particulier, sous le titre de *Maladies qui s'il est dangereux de guérir*, avec cette épigraphe :

Egrégiaque medicina !...

maladies parmi lesquelles il comprend non-seulement plusieurs affections bien déterminées, telles que les dartres, les teignes, la goutte, certaines fièvres d'accès, mais en outre, de simples indispositions, des sueurs fébriles, certaines perspi-

raisons locales très-abondantes, les ulcérations cutanées, &c. &c.

Les annales de la médecine pratique sont remplies d'exemples qui sembleroient appuyer cette idée, & d'après lesquels on voit que des affections très-graves & souvent funelles ont succédé tout-à-coup à des infirmités, à des indispositions que l'habitude avoit rendues presque indifférentes ou du moins plus supportables. Ainsi, la suspension d'une hémorragie nasale, ou d'hémorroïdes, dont les retours périodiques s'étoient convertis en habitude, ou qui remontoient même à des dispositions héréditaires, ont donné lieu à des affections beaucoup plus graves, & par une révolution véritablement métastatique.

Des sueurs partielles très-abondantes, la perspiration odorante de quelques parties, une irritation herpétique quelconque, la douleur ou la tumescence goutteuse d'une ou de plusieurs articulations, &c. &c., sont également suivies d'accidens quelquefois très-dangereux, si l'on n'apporte pas dans leur traitement les attentions les plus délicates, & les moyens les plus éloignés de toute espèce de révulsion & de perturbation. Ajoutons qu'il n'est pas sans exemple, qu'une de ces légères indispositions, telle que la transpiration fébrile de quelques parties, succède aussi, & d'une manière métastatique, à des maladies beaucoup plus graves & qui pouvoient devenir funelles. Tel fut le changement heureux qui s'opéra insensiblement dans la situation de M. D***, auquel je donnois depuis long-temps des soins pour le traitement d'une névrose abdominale qui avoit donné lieu à une irritation consécutive & sympathique très-grave de la poitrine.

Les symptômes principaux de cette maladie, dont la manifestation se suspendoit quelquefois pendant quelques heures, étoient l'intermittence du pouls, des pulsations très-fortes dans la région épigastrique, des palpitations fréquentes, des accès d'oppression ou même de suffocation, une propension imminente à la syncope, correspondant à l'intermittence du pouls, surtout lorsque celle-ci étoit très-marquée, paroissant dépendre de la faiblesse du cœur.

Les toniques les plus doux & les antispasmodiques, qui sembloient indiqués dans le traitement de cette maladie, furent inutilement essayés sous toutes les formes, & parurent même occasionner plutôt une sorte d'exaspération dans les symptômes les plus incommodes, qu'un soulagement véritable.

On fut obligé de se borner aux émolliens les plus doux, aux bains & aux demi-bains, à la suspension ou à la diminution des stimulaux domestiques, méthode de traitement qui fut combinée avec les avantages d'une habitation à la campagne, & d'un genre de vie beaucoup plus actif & moins sédentaire.

Dans ce concours de circonstances, l'état de

& a

M. D** s'améliora promptement de jour en jour : d'abord les palpitations, la tendance aux syncopes diminuèrent ou s'éteignirent ; l'intermittence du pouls & les palpitations épileptiques s'affaiblirent également, & bientôt il ne resta plus de l'ensemble de la maladie, que la mobilité nerveuse qui l'avait précédée, & qu'on n'aurait pu en regarder comme le prélude & le premier degré ; mais alors il se manifesta un symptôme bien digne d'attention ; M. D** dont les cheveux n'avoient jamais eu aucune odeur remarquable, s'aperçut tout-à-coup qu'ils en avoient une très-fétide, & que les cosmétiques les plus forts parvenaient à peine à la masquer ; cette exaltation dans la perspiration cutanée se soutint pendant plusieurs mois, parut même quelquefois augmenter ou diminuer, suivant l'état des forces & de la santé, & nous ne balançons pas à la regarder comme l'effet d'un genre de métastase, dont il ne seroit pas impossible de trouver d'autres exemples dans les recueils d'observations.

Il importe toutefois de remarquer que l'histoire de ces différentes révolutions morbides n'a pas toujours été écrite par des hommes suffisamment éclairés, & avec cet esprit de critique, cet emploi philosophique qui, distinguant la vérité du doute, du merveilleux, la réalité, des apparences, reconnoît que des événements qui se succèdent ne sont pas nécessairement liés par des rapports de causes & d'effets : rapports que l'on a si souvent confondus avec la coïncidence ou la succession pure & simple de ces phénomènes.

Dans le cours des maladies aiguës, les métastases ont le plus ordinairement lieu vers le moment de la coction ou de la crise, ou même lorsque ces phénomènes ont déjà commencé à se manifester, comme au moment d'une apparition érysipélateuse, ou du genre d'éruption propre à la scarlatine & à la rougeole. Parmi les causes qui peuvent contribuer davantage à une pareille révolution, les unes sont inhérentes au siège, à la nature même de la maladie, à la constitution du sujet qui l'éprouve, tandis que les autres sont évidemment occasionnelles, & dépendent surtout du mode de traitement.

Les causes de métastases que l'on peut rapporter à un abus, à un emploi intempestif des moyens thérapeutiques, sont les plus évidentes & les plus directes. Ainsi, il n'est pas sans exemple de voir les effets les plus funestes succéder, dans une attaque de goutte, à des applications émollientes ou révulsives, qui avoient interrompu subitement l'irritation & la douleur d'une articulation.

De bonnes observations consignées dans plusieurs ouvrages de médecine pratique, ont également fait reconnoître que l'abus de la saignée, dans plusieurs angines inflammatoires, leur avoit fait succéder, après les avoir dissipés, des péripneumonies qui enlevèrent les malades, du sixième au septième jour. Van-Swieten a vu & décrit plusieurs exemples de métastases du même genre ; mais

c'est principalement dans la rougeole, dans la fièvre scarlatine, dans l'érysipèle, dans l'œdème ou les fluxions rhumatismales des nouvelles accouchées, que l'on rencontre de pareilles métastases, si l'on s'écarte dans le traitement, d'une sage expectation, ou d'une action rationnelle & motivée d'après les données les plus positives & les plus évidentes de la médecine pratique. (Voyez, pour plus de détails, les articles CHAIRES, COCTIONS, MUTATIONS, PERSPIRATIONS CRITIQUES, SÉCRÉTIONS, TERMINAISON DES MALADIES, &c.)

(MOREAU DE LA SARTRE.)

METASYNCRISE. (*Thérapeutique.*) Mot adopté par les méthodistes pour désigner les procédés par lesquels, lorsqu'une maladie résistait aux procédés ordinaires qu'ils avoient adoptés, ils cherchoient, à l'aide d'autres, à opérer une diversion, effet qu'ils nommoient *incorporation*. Le succès de cette pratique étoit entièrement fondé sur la philosophie corpusculaire établie par Démocrite, & fort en vogue dans les premiers siècles de la médecine. Tous les mouvements intérieurs, chez les êtres organisés, étoient alors fondés sur la correspondance des atomes avec les pores ou espaces vides ; les maladies qui étoient autant de déviations de cette juste correspondance, ne pouvoient se dissiper d'après cette doctrine, qu'en établissant la réciprocité entre les atomes & la porosité qui devoit les admettre. Cette philosophie corpusculaire, appliquée au corps humain, présente des difficultés insurmontables dans l'état actuel où sont portées nos connoissances, & seroit en continué conflit avec nos principes, si l'on vouloit encore la faire revivre. Son application avoit lieu dans les maladies aiguës comme dans les chroniques, mais particulièrement dans celles-ci ; ils y préparoient alors les malades par une suite de procédés qu'ils appeloient *cycle analeptique* ou *résumptif*. On s'occupoit, dans ce cycle, à régler la nourriture du malade ; on lui en donnoit peu d'abord, puis on la lui retranchoit entièrement ; on prescrivait, au deuxième jour, un exercice léger, des frictions avec de l'huile, puis on lui accordoit un tiers de ses aliments, qui consistoient en pain bien levé, en soupe, œufs, légumes légers, poisson & viandes blanches ; ce régime se continuoit pendant deux ou trois jours, époque à laquelle on ajoutoit un tiers de plus ; on lui prescrivait alors du poulet & divers oiseaux pris à la chasse. Après trois ou quatre jours, la nourriture étoit encore plus forte, tel que lièvre rôti & autres sortes viandes. C'étoit lorsque le malade avoit été ainsi disposé, qu'on passoit à la grande opération de la métasyncrise ; elle consistoit à revenir sur la diète, puis aux exercices, aux onctions, aux bains ; on entremêtoit la nourriture, qui consistoit en viandes salées & rôties, assaisonnées avec les câpres, la mentarde, les olives ; on donnoit le vin à dose modérée. Trois jours après, on augmentoit du

double la dose d'alimens, qui d'abord avoit été donnée à un tiers, & trois jours après le dernier. On prescrivait les frictions, qui se pratiquoient tous les jours. Ce premier cycle fini, on en prescrivait un autre qui commençoit par les vomitifs tirés du raifort, & pour en modérer les effets, on prescrivait le sommeil. On accordoit une grande confiance, pour opérer directement la métasynergie, à la moutarde, au poivre, à l'oignon de scilles & autres irritans. Dans les maladies chroniques, notamment l'hydropsie, on insiloit sur les rubéfians appliqués extérieurement, la cendre chaude; dans les maladies aiguës, on avoit recours aux bains, aux douches, aux ventouses, à un topique irritant, *cerotarium*. On peut voir dans Corliu's Aurelianus & Paul d'Egine, qui ont traité de la méthode métasynergique, combien toutes ces idées de la médecine ancienne sont hasardées, & combien non-seulement elles seroient d'une difficile, mais encore d'une dangereuse application au siècle où nous sommes, siècle où les médecins méticuleux vantent tant les avantages de la médecine expédiente. (PETIT-RADEL.)

MÉTASYNERGIQUE, de *metasynergia*. On donneoit en nom, d'après les idées de la secte des méthodistes, à certains médicamens auxquels on supposoit la propriété particulière d'opérer la réparation ou la régénération du corps vivant, ou de ses différentes parties, soit dans un cas de maigrir extrême, de véritable marasme, soit à la suite des plaies ou mutilations, avec une perte de substance très-considérable.

La cycle métasynergique étoit, d'après cette singulière pathologie, un cours, une succession continue d'actions médicamenteuses, pour arrêter ou faire rétrograder une destruction commencée, & rétablir les parties du corps dans l'ordre & le nombre qui constituent la santé. (L. J. M.)

MÉTATARSE, de *meta*, après, & de *tarsus*, la tarse, mot à mot, après la tarse. On indique sous ce nom, la partie du pied qui se trouve entre la tarse & les orteils, & qui est essentiellement composée de cinq petits os, désignés par leurs noms numériques, le 1^{er}, le 2^e, le 3^e, le 4^e, & le 5^e, en commençant par la côté externe. On a combiné ce mot avec plusieurs autres dans la nouvelle nomenclature anatomique, pour en former des noms plus ou moins composés, & qui indiquent très-bien la position & les rapports des parties auxquelles on les a données; tels sont les mots *metatarso-phalangiens* en général, *metatarso-phalangiens* du petit doigt & du pouce, *metatarso-phalangiens latéraux*, *metatarso-phalangiens*, &c. (Voyez ces mots dans le Dictionnaire d'Anatomie.) (L. J. M.)

MÉTATHÈSE, l'opposé de *métastase*. Cette expression s'emploie pour désigner la transposition d'une cause matérielle de maladie, d'un lieu où

elle se trouvoit, en occasionnant un dérangement plus ou moins grave, dans un lieu où la présence est moins nuisible.

MÉTÈL. (*Hygiène*.) C'est un arbrisseau qui croît abondamment au Mexique, que l'on plante & cultive à peu près de la même manière que la vigne. Les feuilles, suivant leur âge, servent à différens usages: très-jeunes, on les consuit, puis on en fait du papier, des étoffes, des nattes, des foulards, des cordes, du vin, du vinaigre, de l'eau-de-vie, & même des scies propres à scier du bois, tant leurs épines sont fortes.

Lorsque la plante a six ans, on en ôte les feuilles du milieu de la tige; il se forme un creux, où l'on recueille chaque jour, de grand matin, une liqueur douce comme le miel, dont on tire une espèce de vin nommé *puleru* ou *pouleru*, dont les Indiens boivent avec excès. (MACQUART.)

MÉTÉORES, f. m.; *meteora*; du grec *meteo*, haut, élevé, dérivé de *meta*, au-dessus, & de *ain*, élever. Corps qui s'élèvent dans l'air; ou, en d'autres termes, phénomènes qui se développent, soit dans les régions supérieures de l'atmosphère, soit même au-delà de ses limites.

Les anciens physiciens distinguoient quatre sortes de météores: 1^o. les météores lumineux; 2^o. les météores aqueux; 3^o. les météores aériens; 4^o. les météores ignés. Sous le nom de *météores lumineux*, ils rangeoient l'arc-en-ciel, les halos ou couronnes que l'on aperçoit quelquefois autour du soleil & de la lune, les *parhélies*, les *parasélènes*, la *lumière zodiacale* & les *aurores boréales*. Ils nommoient *météores aqueux*, ceux dans lesquels l'eau paroît être le principal agent: de ce nombre étoient la *rosée*, le *seren*, la *grêle blanche*, les *nuages*, les *brouillards*, la *pluie*, la *neige* & la *grêle*; les *vents* & les *troubles* étoient pour eux des météores aériens. Enfin, ils appeloient *météores ignés*, les comètes, les bolides ou globes du feu, les étoiles tombantes ou filantes, le tonnerre, le feu Saint-Elme & les feux follets.

Cette classification, uniquement basée sur les apparences sous lesquelles la manifestent les météores & sur les effets qu'ils produisent, est généralement adoptée par les Modernes; seulement il est bien reconnu que parmi ces nombreux phénomènes atmosphériques, il s'en trouve quelques-uns dont l'étude n'appartient point à la météorologie: tels sont, par exemple, la plupart de ceux que les Anciens rapportoient à la classe des météores ignés. Nous lavons en effet, aujourd'hui, que les comètes se meuvent autour du soleil, à l'instar des planètes, en décrivant des orbites dont l'excentricité est considérable; que les bolides eux-mêmes paroissent avoir une origine étrangère à notre atmosphère, & qu'enfin ce sont des masses solides, animées d'un mouvement de translation très-rapide, qui s'enflamment en traversant l'air, & tombent à la surface de la terre.

après avoir consummé la vitesse dont elles étoient animées. Les feux follets paroissent évidemment dus à la combustion du gaz hydrogène, & l'on peut croire que leur inflammation spontanée dépend, soit du phosphore que le gaz tient en dissolution, soit d'une influence électrique; & d'ailleurs, les lieux dans lesquels ou les aperçoit ordinairement, les époques de l'année où ils sont plus fréquents, & les apparences sous lesquelles ils se manifestent, ne laissent aucun doute à cet égard. Maintenant, si quelques physiciens ont rangé les *étoiles filantes* ou *tombeaux*, au nombre des phénomènes électriques; si d'autres, enfin, les ont attribuées à des combustions qui se développent au sein de l'atmosphère, « il faut avouer que ces différentes assertions font toutes également hasardées, & que les diverses circonstances qui accompagnent la plupart de ces effets atmosphériques, ne font point si clairement expliquées, qu'on ne puisse conserver encore quelque incertitude, sur ce qu'on pourroit nommer leur théorie. »

Après cette énumération rapide des principaux phénomènes connus sous le nom de *météores*, il nous paroit convenable de jeter un coup d'œil sur chacun d'eux en particulier.

Des météores lumineux. De simples notions d'optique suffisent pour expliquer la plupart de ces effets; aussi devons-nous regarder l'arc-en-ciel, les halos, les parhélies, les parasélènes, la lumière zodiacale & les aurores boréales, comme des résultats dont, à l'aide du calcul, on peut aisément se rendre compte, en se fondant sur les lois auxquelles obéit l'agent des phénomènes lumineux.

Pendant long-temps on avoit cru que la lumière zodiacale étoit produite par l'atmosphère du soleil. M. Laplace vient de lever tous les doutes à ce sujet, en prouvant tout récemment, que cette supposition ne s'accorde pas avec la forme que présente ordinairement ce météore; d'où il résulte que nous pouvons, jusqu'à un certain point, l'observer sans le même aspect que les autres météores lumineux; d'ailleurs, quelle que puisse être la cause qui produit la lumière zodiacale, il est certain que les effets qu'elle détermine, ne peuvent exercer sur notre atmosphère aucune influence appréciable. (Voyez LOMIAX ZODIACALE.)

Les phénomènes impoants que présentent les aurores boréales, paroissent tous aussi difficiles à expliquer que ceux de la lumière zodiacale; & si les voyageurs qui ont parcouru les contrées voisines du pôle austral, nous ont laissé de brillantes descriptions de ces météores, nous devons avouer qu'il regne encore aujourd'hui une grande incertitude relativement à la cause qui les produit. Néanmoins tout porte à croire qu'il existe des relations plus ou moins éloignées, entre ce phénomène & le magnétisme du globe terrestre. Des physiciens recommandables, parmi lesquels nous citons MM. Dalton & Robison, ont observé, sur cet effet, que le sommet de l'arc lumineux de

l'aurore boréale étoit entièrement dirigé dans le plan du méridien magnétique. Plusieurs observations consignées dans l'ouvrage de M. de Maillet, semblent confirmer cette supposition; & dans ces derniers temps encore (le 1^{er} février 1817), M. Arago a reconnu l'exactitude de ces résultats; dès-lors, il paroît probable, suivant la remarque de ce physicien, que ce météore est un phénomène de position. Espérons que de nouvelles observations pourront donner un plus grand degré de probabilité à ce premier aperçu.

Nous ignorons encore la région de l'atmosphère où se développent les aurores boréales; ce qu'il y a de très-certain, c'est que ces phénomènes atmosphériques ne font point particuliers à notre hémisphère, comme on le croyoit autrefois; car les voyageurs qui ont le plus approché du pôle austral, ont eu l'occasion de remarquer, vers cette partie de notre globe, des effets très-analogues à ceux que l'on aperçoit vers le pôle opposé. Quelquefois, dans nos climats, on a observé la même chose vers le nord & vers le sud.

Les aurores boréales ne se montrent néanmoins dans toute leur splendeur, que près du cercle polaire ou même au-delà; & lorsque, par hasard, on en voit paroître dans les climats tempérés, elles sont toujours bien inférieures, tant pour leur durée que pour leur éclat, à celles que l'on a coutume d'observer en Laponie, en Sibirie ou aux îles de Shetland.

On assure que, vers ces régions glacées, les aurores boréales ne se bornent point à simples apparences lumineuses, & que souvent, au rapport des navigateurs, elles sont accompagnées d'un fort sifflement ou d'un bruit particulier & effrayant, que lorsqu'il surprend les chasseurs sur les confins de la mer Glaciale, les chiens se couchent par terre, & restent dans le morveau, jusqu'à ce que le bruit ait cessé. Un très-petit nombre d'observateurs font mention de ce sifflement singulier; quelques-uns, cependant, prétendent l'avoir entendu. Dans tous les cas, cet effet, s'il est vrai, peut être regardé, sinon comme la portion du phénomène la plus difficile à expliquer, de moins comme le plus extraordinaire de ceux qui accompagnent ces météores. (Voyez Aurores boréales.)

Des météores aqueux. La foudre, la rosée, la gelée blanche, les brouillards, les neiges, la pluie, la neige & la grêle forment, comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'ensemble des phénomènes que l'on range ordinairement sous ce titre; ces différentes modifications atmosphériques sont d'autant plus importantes à connaître, qu'elles jouent un très-grand rôle dans la nature, & qu'elles ont une influence directe sur la santé des hommes; sous ce dernier rapport, les météores aqueux ont toujours dû exciter notre attention. Comme nous ne pouvons en parler ici que d'une manière très-succincte, nous renverrons le lecteur à ces différents articles, qui ont été traités avec

tout le détail & tente l'exaltitude dont ils étoient susceptibles. (*Voyez GELÉE BLANCHE, ROSÉE, SERAÏN, &c. &c.*)

De la rosée, du serain & de la gelée blanche. La rosée, le plus fréquent & le plus simple, en apparence, des météores aqueux, n'est rien autre chose que des vapeurs légères qui, s'étant formées durant la chaleur du jour, se condensent plus ou moins rapidement, pour venir ensuite se déposer à la surface de la terre, lorsque, vers le coucher du soleil, celle-ci se refroidit. Un air pur, un ciel calme & sans nuages, paroissent être les conditions les plus favorables à la formation de ce météore, qui, vers le soir, prend le nom de *serain*, & celui de *rosée* lorsque le phénomène se continue jusqu'au matin. Si le refroidissement descend jusqu'à un ou deux degrés au-dessous de zéro, l'eau précipitée se solidifie, & confine ce que les physiciens ont appelé *GELÉE BLANCHE*. (*Voyez ce mot.*)

Les anciens philosophes avoient bien reconnu & observé les conditions les plus convenables au développement de la rosée. Cependant nous ne possédons encore aucune explication satisfaisante de ce météore. Un médecin anglais, le docteur Wells, vient, dans ces derniers temps, de nous en faire entrevoir la véritable théorie, & il attribue ce phénomène atmosphérique, aux actions qui développent le calorique. On peut lire, à cet égard, son ouvrage ayant pour titre : *Essai sur la rosée*, qui fut publié & traduit en français, en 1814; on y trouvera non-seulement des notions précises sur ce sujet, mais encore une série d'observations aussi exactes que démonstratives.

Ces différents météores ne paroissent avoir d'influence sensible que sur les végétaux; au reste, si nous voulons les considérer sous un point de vue médical, nous dirons que leurs effets sur l'homme doivent être ceux d'une humidité excessive: c'est principalement dans les pays chauds, & dans les circonstances où la précipitation de la vapeur est la plus abondante, que se font sentir les influences malsaines du *serain* & de la *rosée*. Il est hors de doute que, dans ce cas, l'extrême différence entre la température du jour & celle de la nuit doit agir d'une manière générale sur toute notre organisation, & très-probablement aussi d'une façon toute spéciale sur quelques-uns de nos organes.

Des brouillards. Les phénomènes dont il s'agit ici, sont formés par une portion d'eau imparfaitement dissoute, qui ne s'élève dans l'air qu'à une certaine hauteur, & s'étend uniformément dans la partie basse de l'atmosphère, en troublant d'une manière plus ou moins sensible sa transparence. M. de Saussure, pour expliquer cette espèce de suspension, avoit cru nécessaire d'admettre des vapeurs *visqueuses*, qui dennoient à l'eau une légèreté spécifique suffisante pour l'élever dans l'air; mais la théorie admise par ce physicien est peu probable, & les nouvelles connaissances que nous

avons acquises sur l'évaporation, nous dispensent de recourir à un mécanisme aussi peu vraisemblable, & surtout aussi difficile à concevoir.

C'est particulièrement durant l'hiver des contrées voisines de la mer, que les brouillards se montrent en plus grande abondance: ces météores se manifestent assez ordinairement vers le lever ou un peu avant le coucher du soleil; ils durent deux ou trois heures, au bout duquel temps l'atmosphère reprend sa transparence ordinaire. On a vu quelquefois, dans nos climats, le brouillard durer toute la journée; c'est surtout en Angleterre & en Hollande, que l'on a été plus à même de faire cette remarque. (*Voyez BROUILLARD.*)

Les brouillards sont plus ou moins nuisibles, selon que les lieux où l'on est soumis à leur influence sont bas ou humides, ou que ces météores sont mêlés avec des exhalaisons de mauvaise nature. L'odeur infecte qu'ils portent avec eux la plupart du temps, annéant en effet qu'ils doivent contenir autre chose que de l'eau vaporisée.

On a souvent en l'occasion d'observer que les brouillards froids & glacés de l'hiver étoient presque toujours préjudiciables à la santé; chacun sait que lorsque l'on s'expose pendant un certain temps à leur influence, on éprouve un sentiment de froid qui, en diminuant ou en supprimant la transpiration insensible, produit des accidents que l'on a cru devoir rapporter, pendant long-temps, aux qualités malsaines de ces météores.

Mais est-il donc nécessaire d'attribuer ce dérangement dans nos fonctions, à une cause différente de celle que nous venons d'énoncer, & faut-il regarder certains brouillards comme le véhicule de substances malsaines?

Des nuages. On appelle *nuages* en *nudes*, un amas assez considérable de vapeurs qui se tiennent à des hauteurs plus ou moins grandes au-dessus de la surface de la terre, & dont la formation & l'accroissement paroissent entièrement dus à un abaissement sensible dans la température; les couleurs & les formes infiniment variées qu'ils présentent, sont des conséquences, l'une de leur épaisseur plus ou moins considérable, & du rapprochement de leurs particules; l'autre de l'extrême mobilité dont jouissent nécessairement les différentes portions d'une masse de vapeurs légères.

Transportés par les vents dans toutes les directions, les nuages, en se condensant sur le sommet des plus hautes montagnes, deviennent ainsi l'origine de toutes les eaux qui coulent à la surface de la terre; ils interceptent les rayons du soleil, & préservent, par conséquent, le globe de ses atteintes trop vives, & en garantissant de cette manière le sol d'un prompt dessèchement, ils répandent d'une manière à peu près uniforme, une humidité salutaire qui favorise la végétation.

Quelle influence les nuages proprement dits peuvent-ils exercer sur nous? Cette question est encore à résoudre. Quoi qu'il en soit, si ces nuages

teurs sont susceptibles d'agir sur nos organes ; ce n'est que lorsqu'ils sont chargés d'électricité, ou qu'ils se changent en pluie plus ou moins abondante. On peut leur rapporter alors toutes les affections qui se manifestent lorsqu'il règne une atmosphère chaude & humide.

De la pluie. Lorsque les molécules aqueuses disséminées dans l'atmosphère se rapprochent, elles deviennent trop pesantes pour rester suspendues dans l'air ; elles forment alors des petites sphères ou gouttes d'eau, qui tombent, en raison d'une pesanteur spécifique plus grande que celle du milieu qui les environne, & c'est ce phénomène que les physiciens ont nommé *pluie*. Les vents paroissent être la principale cause de la pluie, & soit qu'on les considère comme véhicule de l'humidité, soit enfin qu'on les regarde comme des agens destinés à produire des changemens de température, il est incontestable que dans l'un ou l'autre cas, ils jouent un rôle très-important dans les phénomènes que nous offre ce météore.

La pluie a une influence bien manifeste sur notre économie : lorsque elle dure long-temps, on éprouve comme une espèce d'ennoi, de torpeur dont il est difficile de se rendre compte ; avec les forces on perd la gaieté, souvent même l'abattement est général. Plusieurs auteurs ont regardé la pluie comme le fléau des armées : on sait, en effet, que les militaires immobilisés pendant plusieurs jours, perdent bientôt l'énergie nécessaire pour supporter les fatigues attachées à leur état ; alors régissent les dysenteries, le scorbut, les diarrhées, & généralement toutes les maladies qui appartiennent à une constitution atmosphérique constamment humide.

Malgré les désavantages des pluies prolongées, elles ne sont pas sans produire quelques bons effets ; non-seulement elles modèrent la chaleur du jour, mais encore elles purifient l'atmosphère en la dépouillant d'une foule de substances étrangères qui en altèrent la salubrité. Après la pluie, l'air nous paroît plus léger ; il semble que l'on respire avec une plus grande facilité.

De la grêle & de la neige. Nous ne nous proposons point de donner ici l'histoire de ces deux météores ; ces développemens appartiennent exclusivement aux mois (*GRÊLE & NEIGE*) : seulement nous dirons que l'idée la plus simple que l'on puisse s'en former, consiste à les regarder comme de la vapeur gelée, à raison de la température peu élevée qui règne pendant l'hiver dans les hautes régions de l'atmosphère : en effet, lorsque les molécules aqueuses qui s'étoient élevées dans l'air en forme de vapeurs, retombent en brume ou en pluie, il arrive souvent que le froid est assez considérable pour les geler ; alors elles se changent en grêle ou en neige : en grêle, si les particules d'eau ont le temps de se joindre avant que d'être prises en gelée (*voyez GRÊLE*) ; en neige, si la congélation les saisit avant qu'elles se soient réunies en gouttes. (*Voyez NEIGE*.)

Ce dernier météore tombe drainièrement sur la terre en petits flocons fort rares, très-légers, & qui sont d'autant moins larges que le froid est plus intense ; car si l'air devient plus chaud & que le temps se radoucit, ces flocons font alors plus gros, quelquefois même ils tombent en même temps que la pluie. La neige devient tellement abondante à mesure que l'on se rapproche des cercles polaires, que, dans l'intervalle d'une nuit, il en tombe quelquefois assez pour recouvrir & cacher entièrement des habitations.

La neige contribue singulièrement à l'accroissement d'un grand nombre de végétaux, & selon quelques physiciens, les années dans lesquelles il en tombe une grande quantité ne sont jamais stériles ; on fait que les montagnes qui en sont continuellement recouvertes, sont chargées à leur base, sur leur adossement & dans les prairies, de plantes les plus vertes & les mieux nourries : ce que d'ailleurs on pourroit considérer soit comme le résultat de l'abondante humidité que la neige répand à la surface du globe, soit comme une conséquence de l'influence qu'elle exerce, en le préservant d'un abaissement trop considérable de température.

Autant la neige est favorable à la végétation, autant sa trop grande quantité influe sur la santé des hommes. Elle est, suivant quelques médecins, la principale cause de cette difformité connue sous le nom de *goitre*, qui règne d'une manière endémique dans plusieurs des vallées comprises dans les longues chaînes de montagnes du Tyrol, de la Suisse & de la Savoie. Les alimens grossiers dont les habitans de ces contrées se nourrissent, les eaux provenant de la fonte des neiges, qui leur servent de boisson, doivent, d'après ces auteurs, contribuer à faire naître cette singulière maladie.

Quoique plusieurs personnes recommandables à plus d'un titre, aient voulu expliquer de cette manière le développement & l'endémicité du goitre, nous sommes bien loin aujourd'hui d'avoir les mêmes idées à cet égard. Les observations faites par de Saussure (*Voyage dans les Alpes*), les remarques de Cullen, & surtout les preuves accumulées par M. Fodéré (*Traité du goitre & du cretinisme*), sont plus que suffisantes pour prouver que l'opinion émise par ces auteurs, à ce sujet, est entièrement fautive & doit être abandonnée. Certaines contrées, il est vrai, sont favorables à cette maladie, mais le goitre est connu partout : on rencontre des goitreux en Bavière, en Espagne, au Tyliet, dans certaines provinces de la France, & c'est aux qualités de l'air environnant que tout le monde attribue aujourd'hui l'endémicité des goitres : « d'ailleurs, » les observations les plus exactes & les plus multipliées, les expériences hygrométriques & thermométriques ont constaté, sans exception, l'extrême fréquence de cette difformité, sous l'influence d'un air à la fois chaud & humide. » (*Dict. des Sciences méd.*, article *Goitre*.)

Lorsque

Lorsque la neige séjourne long-temps sur la terre, ce qui arrive le plus ordinairement en Laponie ou en Sibérie, elle réfléchit une lumière si vive, que les habitants de ces froides contrées en supportent difficilement l'éclat : ils paraissent néanmoins à cet inconvénient, en plaçant devant leurs yeux des pupilles artificielles.

Appliquée à l'extérieur, la neige est un spécifique, dont les peuples du Nord font souvent usage pour rappeler la chaleur & la vie dans les membres gelés. Nous avons plus d'une fois reconnu l'efficacité de ce moyen, & c'est sous forme de frictions que son emploi nous a paru le plus avantageux.

Des météores aériens, des vents & des trombes.
Les mouvements dont l'atmosphère est susceptible, occasionnent les phénomènes connus sous le nom de vents. Quelle peut être la cause de ces développemens si rapides, & qui s'étendent quelquefois à des distances si considérables ? Les physiciens n'ont point encore réussi à en rendre raison, & ce qu'il y a de plus probable, c'est que les vents dépendent des changemens de température qui arrivent brusquement, & rompent l'équilibre atmosphérique. Nous ne chercherons point néanmoins à discuter jusqu'à quel point on peut, dans cette hypothèse, satisfaire à toutes les conditions des résultats fournis par l'observation.

Les dénominations sous lesquelles les Anciens indiquaient les différentes espèces de vents, étoient peu nombreuses. Les Grecs n'admettent d'abord que quatre directions, répondant à ce que nous nommons aujourd'hui les *points cardinaux* ; puis tard ils en formèrent quatre intermédiaires, qui répondoient aux directions suivant lesquelles se lève & se couche le soleil à l'époque des solstices ; & lorsque, pour satisfaire au besoin d'une navigation plus étendue, les Romains se virent forcés de multiplier ces sortes d'indications, ils comptèrent jusqu'à vingt-quatre *rumbs* ou aires de vents. Ce n'est que dans les temps les plus modernes que leur nombre a été porté jusqu'à trente-deux. (Voyez BOUSSOLE, ROSE DE VENTS.)

Il est facile de prévoir quelles sont les modifications auxquelles peut donner naissance le mouvement de translation de l'atmosphère. Empêcher la stagnation de l'air, entretenir par conséquent la salubrité ; répandre uniformément l'eau à la surface de la terre : tels sont les avantages les plus apparens dont nous sommes redevables à ces météores.

Considérée sous le point de vue médical, l'étude des vents exigeroit pour elle seule un traité particulier ; dès-lors on conçoit que les détails dans lesquels nous serions obligés d'entrer, deviendroient beaucoup trop longs pour cet article : nous dirons seulement ici, en thèse générale, que l'action des vents sur notre économie, est toujours relative à la qualité de l'air mis en mouvement, & que ces météores agissent sur nos organes d'une manière différente, selon qu'ils sont froids ou chauds, secs

MÉTÉORES. Tome X.

ou humides, ou plus ou moins altérés par des exhalaisons qu'ils enlèvent du sol sur lequel ils passent. On fait en effet que les vents qui traversent les marais à l'époque où le dégagement des effluves marécageux, acquièrent les qualités les plus funestes, & qu'ils ont souvent été, dans des pays éloignés, les causes des maladies les plus déplorables.

Les vents sont une source continuelle de vicissitudes atmosphériques, dont les effets varient suivant un grand nombre de circonstances, & l'hygiène nous apprend tous les jours qu'il existe entre ces météores des qualités différentes, suivant les points ou les lieux d'où ils ont coutume de souffler. Le vent du nord, par exemple, lorsqu'il est continu, nous donne de la vigueur & de l'activité ; celui du midi produit de l'accablement & de la faiblesse ; les vents d'est donnent de la gaieté & de la légèreté, tandis que celui du couchant produit des effets entièrement opposés.

Quant à l'influence que certains vents exercent sur le moral, elle est généralement reconnue de tout le monde. On fait en effet que le *sirocco* plonge les habitants de Messine dans un abattement général, & qu'en Angleterre le suicide est plus commun en hiver, particulièrement lorsque le vent du nord vient à souffler. On n'a point été sans remarquer que, quand le vent d'est règne en Andalousie pendant l'automne, il cause une frénésie qui rend les assassins plus fréquens. (Bourgois, Voy. en Esp. tom. II, pag. 264.) Nous revenons au mot VENTS tout ce qui a rapport à des notions plus étendues, sur leurs divisions, leur intensité, leur durée, leur directions &c.

Des trombes. Ces météores ont de tous les temps exercé l'attention des physiciens ; nous n'avons néanmoins sur la manière dont ils se développent, que des renseignemens très-inexactes ; on les attribue le plus généralement à l'action simultanée des vents qui, venant à se mouvoir en sens contraire, produisent des tourbillons, dans l'intérieur desquels l'eau de la mer & même des corps solides s'élèvent en décrivant une sorte d'hélice. Ces espèces de colonnes mobiles, dont le diamètre varie avant que la vitélle, sont animées d'un mouvement de translation & de rotations tel, qu'il est souvent difficile de se garantir de leurs terribles effets. En général, les trombes sont presque toujours accompagnées de grêle & de tonnerre, & lorsqu'elles crèvent, elles répandent une énorme quantité d'eau, circonstance qui avoient d'autant engagé quelques physiciens à les mettre au nombre des météores aqueux.

Les trombes sont plus fréquentes sur terre que partout ailleurs ; on en a cependant quelquefois observé sur les lacs, les rivières, & même sur terre : dans ce dernier cas elles sont *arides*, & constituent ce que nous appelons en physique *tourbillons*. (Voyez TROUS.)

Des météores ignés. Nous avons déjà fait sentir, en parlant de la division des météores en général, combien peu nombreux devoient être

F

les météores ignés; & si des faits multipliés peuvent nous engager à regarder le fluide électrique comme la cause principale des vicissitudes atmosphériques, le tonnerre doit sans doute être placé au premier rang; ne seroit-ce qu'en égard à l'intensité des effets qu'il produit, & aux modifications qu'il imprime à l'atmosphère? Si nous ne savons pas tout ce qui est relatif au développement de cet agent, il est du moins fort probable que l'évaporation en est la principale source; c'est au reste ce que semblent annoncer les conditions atmosphériques dans lesquelles on voit se développer ce météore; ainsi un temps sec & chaud provoque une évaporation rapide, qui est alors ordinairement suivie de tonnerre.

Naturellement répandue autour de nous, l'électricité doit nécessairement faire partie des influences auxquelles nous sommes exposés; ses effets, comme tous ceux des grands-météores qui en imposent par les phénomènes qu'ils présentent, paroissent se porter sur le système nerveux. En général, le tonnerre imprime une sorte de crainte & de terreur dont certaines personnes ont peine à se défendre. « Quelques-unes, dit M. Hallé, sont assaillies long-temps avant les orages, & les préviennent par le malaise qu'elles éprouvent; d'autres, plus sensibles, sont dans un état violent, & dans ces altérations possibles on reconnoît aisément l'effet des *atmosphères électriques*. » Nous pourrions entrer ici dans une foule de considérations auxquelles l'électricité atmosphérique peut donner lieu; mais nous croyons devoir nous en abstenir, pour éviter l'inconvénient des répétitions; d'ailleurs, de semblables développemens appartiennent plus particulièrement aux mots *Air*, *Atmosphère*, *Électricité* & *Galanisme*, auxquels nous renvoyons le lecteur.

Des détails plus étendus sur l'histoire des météores, & sur les effets qu'ils produisent, seroient une sorte d'anticipation relativement à des considérations plus générales & plus importantes qui ont naturellement dû trouver leur place au mot *Climat*, & qui se présenteront encore sous un nouveau point de vue, lorsqu'il sera question des *topographies médicales*; & si, en parlant des météores, nous n'avons pas eu besoin de nous borner à une simple énumération, il nous a au moins paru convenable de ne point nous abandonner à des discussions qui appartiennent de droit au *Dictionnaire de Physique* de l'Encyclopédie.

(*Aug^e. THILLAY.*)

MÉTÉORISATION (*Refluxions critiques sur la Météorisation*; s. m. f. (*Art vétérinaire*.) J'entends par *météorisme*, une accumulation extraordinaire de différents airs de gaz, ou d'un seul, qui se dégagent dans les premières voies, pendant la digestion vicieuse des aliments, chez les animaux ruminans ou non ruminans, lesquels vivent de végétaux secs ou verts; ces derniers en fournissent beaucoup plus que les aliments secs.

Cette opération ne peut avoir lieu que pendant la digestion; car, sans aliments fournis dans les premières voies à une décomposition chimique, il ne sauroit y avoir de dégagement de gaz.

Il y a donc toujours une indigestion dans toute explosion vériciforme des premières voies; l'ane o' exsille jamais sans l'autre.

Les gaz se dégagent quelquefois en si grande quantité & si promptement, surtout chez les animaux ruminans, qu'ils leur donnent la mort en peu de temps, si l'on n'emploie assez tôt les moyens indiqués par l'art, pour leur donner une issue à l'extérieur.

Je ne puis adopter l'assertion de M. Huzard (*voyez article INDIGESTION, pathologie vétérinaire*), qui nous assure que l'on distingue par le tact, la météorisation méphitique simple, dans la météorisation méphitique compliquée de la dureté de la panse. J'ai déjà posé en principe qu'il n'y a point de météorisation sans aliments dans la panse; ainsi, dans tous les cas, on doit sentir en pressant, d'abord l'air qui s'en dégage, puis en pressant un peu plus fort, on trouve les aliments couteaux dans la panse, que l'on reconnoît à la résistance qu'ils opposent. Ces deux indigestions ne diffèrent que par la quantité des aliments, qui font gonfler la panse du côté gauche; or, le tact peut nous induire en erreur.

Ce savant artiste a divisé en cinq classes ou espèces, les digestions. La seconde, qu'il nomme *météorisation méphitique*, compliquée de la dureté de la panse, avec la quatrième, qu'il appelle *indigestion putride*, accompagnée de la dureté de la panse, ou voit qu'elles se ressemblent beaucoup par leurs signes & par leurs effets, de sorte qu'il étoit inutile d'en faire deux espèces, car on ne peut les distinguer l'une de l'autre.

Le même artiste vient de donner au public une troisième édition de l'*Instruction pour les bergers*, par M. Daubenton, à laquelle il a ajouté des notes très-judicieuses. M. Daubenton, en rapportant les différentes causes qui peut périr les agneaux, nous dit que certains meurent, parce que étant leur mère, ils lui arrachent la laine qu'elle a autour du pis. Cette laide qu'ils avoient, forme, avec le temps, des boules dans la caillotte, que les bergers appellent des *gobbers*; elles bouchent l'entrée des intestins, & arrêtent le cours des aliments, ce qui les fait mourir. Il me semble que cette mortalité des agneaux devroit former une sixième classe d'indigestion. Je suis surpris que M. Huzard n'y ait pas fait attention. Il s'est occupé à traiter les indigestions de la vaille; quoique son traitement n'ait pas eu tous les succès qu'il en attendoit, son zèle n'est pas moins louable. L'on doit désirer qu'il cherche à le perfectionner, car ces animaux font l'une grande utilité. Il me semble que s'il eût employé l'eau tiède aiguillée de quelques gouttes d'essence-de-vie, il eût mieux réussi qu'avec l'eau ferrée. Cette dernière étoit un stimulant trop actif dans cette cir-

confiance; elle agissoit trop vivement contre les parois du jabot déjà trop distendu, & mis en spasme par le grain dont l'animal s'étoit gorgé. L'incision qu'il a faite au jabot en ligne perpendiculaire, suivant la direction des fibres, étoit une idée lumineuse.

Quoique les traitemens & les opérations chirurgicales que l'auteur propose, soit pour dissiper les météorismes, soit pour délivrer les estomacs des alimens qui les surchargent, soient puisés dans les vrais principes de l'art vétérinaire, ils doivent néanmoins opérer rarement des effets salutaires. Les ouvertures des cadavres qu'il rapporte, en fournissent la preuve; elles nous montrent partout les plus grands désordres dans les viscères les plus essentiels à la vie; partout on découvre des traces d'inflammation ou de gangrène. Comment seroit-il possible de remédier à des maux aussi graves par les secours de l'art?

Les eaux stagnantes, car il ne peut y en avoir d'autres, chargées de cadavres dissous des mouches cantharides, sont un poison corrosif des plus violens, contre lequel il n'y a point de remède, l'animal n'en eût-il bu qu'un verre. Le lait en abondance, les délayans mucilagineux, proposés dans ce cas par l'auteur, font certainement les meilleurs remèdes que l'art vétérinaire puisse employer; malheureusement ils sont insuffisans lorsque la dose de cantharides est considérable.

Il réduit à deux espèces les indigestions des animaux herbivores non ruminans. Il compte parmi ces derniers, le cheval, l'âne & le mulet. Le cheval y est le plus sujet, parce qu'il est moins sobre.

1^{re}. L'indigestion accompagnée de météorisation de l'estomac & des intestins. Il la combat de trois manières; par les remèdes qui empêchent le dégagement des gaz, par ceux qui les neutralisent lorsqu'ils sont dégagés, & enfin par ceux qui peuvent en faciliter l'évacuation. Si les deux premières espèces de remèdes sont insuffisantes, il conseille d'avoir recours à la ponction des gros intestins.

2^{re}. L'indigestion accompagnée de la dureté ou de l'amplitude de l'estomac & des intestins, doit être traitée comme il suit :

Par les infusions amères, aromatiques, purgatives, les spiritueux, l'exercice au pas, le bouillonnement sous le ventre, les lavemens émoulliens, la vidange du rectum, le caustique, le nios, &c. Tous ces remèdes peuvent trouver leur application. Il me paroît surprenant qu'il n'y eût conseillé la ponction, comme pour la première espèce d'indigestion.

Suivant M. Vétel, dont j'adopte l'opinion, la saignée est préférable, en même temps que l'on vide le rectum de l'animal, & qu'en lui donne des lavemens avec la fumée de tabac.

L'indigestion vertigineuse ou chronique est encore, selon M. Huzard, une maladie particulière au cheval; elle est quelquefois une épidémie meurtrière, qu'il distingue du vertige essentiel. Ses accès sont périodiques. Elle se forme peu à

pen & par gradation; elle produit sur le cerveau les effets de l'apoplexie & du vertige, elle est accompagnée de constipation.

Il est bien singulier que l'auteur appelle l'indigestion chronique, une maladie qui tue l'animal quelquefois dans vingt-quatre heures, & dont la plus longue durée est de cinq ou six jours. N'est-ce point dénaturer la signification des mots? surtout quand on prouve, par l'ouverture des cadavres, que cette maladie est inflammatoire au plus haut degré, puisqu'elle se termine quelquefois par le sphacèle.

La digestion des alimens dans l'estomac du cheval, ainsi que dans ceux des animaux ruminans, s'opère de la même manière que dans l'homme; c'est une opération chimique. Que M. Huzard consulte les bons auteurs de son temps, sur le mécanisme de la digestion, il verra qu'il s'est trompé lorsqu'il a dit : « qui ne fait pas, en effet, que les nerfs jouent le plus grand rôle dans les phénomènes de la digestion? qui ne connoît point l'influence de la nature des esprits animaux sur la dissolution & la clarification des alimens? » Qu'il consulte la physiologie de Callen, il y trouvera que les fonctions des nerfs se réduisent à entretenir la sensibilité & l'irritabilité de l'estomac & du canal alimentaire; c'est par cette dernière que le mouvement péristaltique s'exécute.

Quant aux esprits animaux, leur existence est révoquée en doute par des auteurs célèbres. Ceux qui les admettent, annoncent que leur nature est inconnue, ainsi que leur manière d'agir.

Pour guérir l'animal, il faut nettoyer les premières voies; pour y réussir, en conseille le tartre antimonial. On a cependant dit, quelques lignes auparavant, que le cheval ne pouvoit point vomir; c'est sans doute comme purgatif qu'on l'ordonne.

La saignée soulage l'indigestion dans l'homme, ajoute-t-on; elle est mortelle au contraire au cheval, parce que la structure de son estomac s'oppose au vomissement. Néanmoins si les yeux sont enflammés, si les vaisseaux extérieurs de la tête & du cou sont gonflés, il faut pour lors saigner.

Lorsque les signes extérieurs indiquent que le sang s'est porté à la tête, il faut certainement avoir recours à la saignée; mais en suivant cette indication, on diminue le ton de l'estomac, & l'on rend l'évacuation des premières voies plus difficile.

L'indigestion, chez les animaux carnivores & omnivores, tels que le chien, le chat, le cochon, &c., se guérit par le vomissement, qu'on excite facilement par la boisson de l'eau chaude pure ou sucrée avec le tartre bibulé.

Si ces animaux conservent l'habitude de vomir peu après avoir mangé, ou la fera cesser par la saignée, la diète, l'usage du peülait, des boissons émoullientes & des lavemens de même espèce.

Nota. Je erois que la saignée est nuisible au cochon, dont la fibre est lâche.

Dans l'indigestion symptomatique, dans toutes

les maladies inflammatoires des bêtes à cornes & des chevaux, les fonctions des estomacs & du canal alimentaire sont viciées ou suspendues.

L'indigestion accompagne aussi les maladies nerveuses, convulsives, les chutes, les corps violents, les efforts, &c.

Il faut, dans tous ces cas, commencer par nettoyer les premières voies par les boillons abondants & les lavemens émolliens.

Ces derniers règles de clinique sont très-sages, elles sont imitées de la thérapeutique humaine. Il y a cependant des cas où les émetiques & les purgatifs seroient nuisibles au commencement.

En rendant compte de la manière dont la ponction doit être faite au cheval, dans l'indigestion accompagnée de météorisation, M. Huzard a fait des observations qu'il n'est pas possible de passer sous silence. « Lorsque pratique cette

opération la nuit, ou dans une écurie sombre, il faut éloigner la lumière au moment de l'opération; le gaz des aliments est souvent inflammable; la déflagration vive & subite peut être suivie de dangers, non-seulement pour l'artiste vétérinaire & pour ceux qui l'aident, mais encore pour l'animal lui-même; l'inflammation se termine quelquefois jusque dans l'intérieur par la canule; on trouve dans les animaux morts dans ce cas, les intestins enflammés noirs & gangrénés. Les bords de la plaie faite par le trocart, le sont toujours, & elle est difficile & longue à guérir. D'ailleurs encore cette déflagration peut, en se portant jusqu'aux corps combustibles environnans, y mettre le feu & incendier ainsi le bâtiment. »

Voulez donc trois sortes de dangers qui peuvent être les suites de cette opération : 1°. L'opérateur ou ses aides peuvent être brûlés & suffoqués par le gaz inflammable, que la lumière, trop rapprochée de l'explosion, peut allumer. Ce cas est dans l'ordre des chances possibles; je doute néanmoins qu'il soit arrivé, attendu le nombre de circonstances qui doivent être réunies. Il faut qu'il sorte du gaz inflammable, que la lumière soit assez près pour l'enflammer, ce qui est très-difficile, car le courant d'air doit l'éteindre avant qu'elle ait pu enflammer le gaz. Il faut d'ailleurs que l'opérateur, que l'on doit supposer un peu instruit, soit bien maladroit s'il s'expose à respirer le gaz ou à l'enflammer en approchant de trop près la lumière.

2°. L'auteur suppose que le gaz inflammable étant enflammé, va brûler l'intérieur de l'animal météorisé en pénétrant par la canule; il prétend le prouver par l'inflammation que l'on découvre à l'ouverture des cadavres. Il a donc oublié que toutes les ouvertures de cadavres qu'il rapporte, montrent des traces d'inflammation, sans que le gaz inflammable les ait occasionnées. L'inflammation ne peut donc point servir de preuve pour l'introduction du gaz enflammé.

3°. La combustion des corps combustibles environnans, & l'incendie du bâtiment où se fait

l'opération, par le gaz inflammable, me paroît une exagération qu'aucun chimiste un peu instruit n'auroit osé hasarder. On voit chaque jour de semblables explosions dans les laboratoires de chimie, sans qu'il y arrive d'incendie.

4°. Il seroit à souhaiter que quelque habile médecin clinique voulût appliquer nos connaissances chimiques actuelles à la pratique de la médecine humaine, & nous donner un traité de pneumatologie qui nous manque; pour lors la médecine vétérinaire pourroit en former un, dont elle puisseroit les éléments dans ce premier ouvrage. Elle seroit en état d'expliquer la météorisation des animaux par le spasme ou l'atonie du canal alimentaire, ou par les différens gaz que les aliments fournissent pendant la digestion. (BAIZEUX.)

MÉTÉORISME. On désigne sous ce nom l'élévation, la distension gazeuse de l'abdomen, considérée comme un symptôme plus ou moins grave dans les maladies aiguës, & principalement dans les fièvres putrides ou adynamiques.

Le météorisme se manifeste aussi dans certaines affections chroniques, & principalement dans l'hystérie & l'hypochondrie.

Dans certains accès hystériques, il acquiert surtout un développement très-considérable; tout l'abdomen se distend soudain, comme si l'intestin, privé de son élasticité & de sa contractilité, perdait de pouvoir expulser ou de pouvoir comprimer suffisamment les différens gaz qu'il contient dans une proportion plus ou moins considérable. Cette espèce de distension fait desirer ordinairement une compression extérieure, dont l'emploi occasionne un soulagement, un bien-être manifeste. C'estoit pour l'obtenir, & en se laissant d'ailleurs subjugué par les idées les plus folles & les plus superstitieuses, que certaines femmes vaporeuses ou hystériques venoient réclamer sur le tombeau du diacre Paris, ce que l'on appelloit, dans le langage mystique, les *grands secours*, c'est-à-dire, les coups de bûche, les coups de pied, le marcher de plusieurs hommes sur le bas-ventre, ou toute autre espèce de choc ou de commotion qui faisoit crier au miracle. Ce genre de météorisme est ordinairement désigné sous la dénomination particulière de *tympanite*, qui, dans un cas de gravité extrême, s'accroît d'une manière progressive, en effaçant tous les autres symptômes de la maladie, & en se terminant d'une manière foudroyante. (VOYEZ TYMPANITE.)

Une distension non moins foudroyante se manifeste chez les animaux herbivores pendant la première digestion, soit à l'occasion & par un effet de la section des nerfs pneumogastriques, soit par le gaz acide carbonique qui se dégage d'une trop grande quantité de substances végétales en fermentation. (VOYEZ MÉTÉORISATION DES ANIMAUX.)

Les différentes espèces de météorisme qui attirent le plus l'attention des médecins, arrivent

dans les fièvres essentielles & dans les inflammations.

La fièvre gastrique compliquée d'adynamie ou d'ataxie, la fièvre putride & la fièvre maligne, présentent le plus souvent ce redoutable symptôme, qui survient d'une manière encore plus constante & plus essentielle dans les phlegmasies abdominales. Dans cette dernière circonstance, il est probable que l'intestin grêle est le siège principal du météorisme : le gaz, dont l'accumulation s'effectue, se trouvant alors compris, & comme renfermé entre la valvule du cœcum & le pylore.

Lorsque le ventre est météorisé, il est distendu d'une manière uniforme, élastique, rénitent, n'annonçant comme un tambour, & quelquefois sensible au toucher.

Il n'est pas sans exemple de rencontrer une sorte de météorisme avec atonie des intestins, sans fièvre, sans inflammation, sans irritation spasmodique, & quo l'on combat avec avantage par la compression, un régime sec & tonique, & l'emploi d'un genre particulier d'excitants dissolvables, quo l'on suppose plus particulièrement appropriés à cet usage (1).

On rencontre aussi, dans le cours de certaines fièvres essentiellement putrides ou adynamiques, un météorisme atonique, indolent, tout-à-fait étranger à une irritation quelconque, directe ou indirecte, & ne pouvant être combattue avec efficacité que par des médications assez énergiques.

Dans le météorisme inflammatoire ou phlegmatique, la contractilité de l'intestin n'est pas diminuée, mais son développement est comme suspendu, & loin de se rétablir par des irritants, ne s'exécute, ne reprend son cours que par une heureuse combinaison d'émollients & d'antispasmodiques : tel est le météorisme qui survient quelquefois à la suite de l'opération de la taille (météorisme des taillés), & dans lequel on emploie avec tant d'avantage le camphre à hautes doses dans un liniment.

Dans certains cas d'effluviés de météorisme, surtout à la suite de différentes blessures, lorsque les médications rationnelles ou empiriques les plus propres à les combattre avoient été épuisées (2), on a proposé d'avoir recours à l'acupuncture de l'intestin, qui a été mis assez souvent en usage, pour les animaux ; dans l'espèce de tympanite dont nous avons parlé, Ambroise Paré semble avoir eu le premier, ou l'un des premiers, une idée aussi hardie, relativement au météorisme qui survient à la suite de certaines plaies pénétrantes de l'abdomen ; il assure du moins avoir piqué plusieurs fois les intestins avec une aiguille, pour en expul-

ser l'air qui occasionnoit une distension dangereuse. Des expériences assez récentes de M. le professeur Beclard, sur la possibilité de traverser impunément avec une aiguille la plupart des viscères des animaux & même le cerveau, portent naturellement à penser qu'il ne seroit pas impossible d'employer utilement l'acupuncture dans le météorisme tubéride ou inflammatoire, porté au plus haut degré, & pouvant avoir alors les suites les plus funelles.

Dans l'état présent des connoissances, il reste plusieurs questions à décider & plusieurs doutes à éclaircir, pour se faire des idées exactes du météorisme & de la nature & de la formation des différents états des gaz qui contiennent les intestins. Quels sont ces fluides élastiques, comment parviennent-ils à se former, quelles on sont leurs sources principales, les différents modes de production & de dégagement, &c. ? N'existeroit-il pas dans certains cas, & par une irritation, un développement convulsif, une insensibilité spasmodique, sans distensions gazeuses ? ce que paroiroient prouver quelques observations recueillies par les pathologistes.

Des recherches récemment faites par MM. Magendie & Chevreul, sur le corps de quatre suppliciés, immédiatement après la mort, nous ont appris que l'on trouve ordinairement du gaz oxygène dans l'estomac, de l'azote & de l'acide carbonique dans toute l'étendue du canal intestinal, & seulement du gaz hydrogène sulfuré ou carboné dans les gros intestins. On paroît s'accorder pour reconnaître que les gaz des intestins ne proviennent pas seulement des aliments, mais qu'une portion d'air assez considérable s'introduit par la déglutition. On a voulu aussi admettre une fermentation, un dégagement de gaz dans l'économie animale, par une sorte de sécrétion (1) ou d'exhalation, d'après un appareil de recherches, dont les résultats sont en ce moment, de la part d'un savant chimiste, le sujet d'un nouvel examen & de nouvelles expériences, qui n'ont pas encore été publiées, & quo nous nous empressons de faire connoître dans les articles *PHRÉNOLÓGIE* & *TYMPANITE* (2).

En nous bornant à ce qui concerne la pratique, nous pensons que l'on doit attacher quelque importance aux considérations qui précèdent & aux résultats d'expériences médicales qui se trouvent consignés dans les principaux recueils d'observations (3). (L. J. M.)

(1) Les carminatifs, tels que les stémées aromatiques d'œuf étoilé, la coriandre, le cumin, presque toutes les plantes de la famille des labiées.

(2) Les émollients émoulliens, les demi-bains, l'application des ventouses & des sangsues, mais surtout l'application des sangsues à l'anus.

(1) Cette opinion a été soutenue en 1813 par M. Gaspard, dans une dissertation inaugurale présentée à la Faculté de médecine de Paris. On doit consulter aussi une dissertation inaugurale de M. Auguste Gérardin, sur les gaz intestinaux, n.º 15, ann. 1814.

(2) M. Chevreul, *essai sur des mines à la Montpel.*

(3) On peut consulter sur la tympanite considérée sous le rapport de la pratique médicale, plusieurs dissertations estimées, principalement celles de SACCHI, élève de Richter, de *tympanite*, Götting. 1793 ; KAPLAN, *tympanites pathologicae*,

MÉTÉOROLOGIE, f. f.; *meteorologia*; du grec *meteo*, *météore*, *au-dessus*, *discussio*, *discours*, Partie de la physique qui s'occupe de toutes les modifications que peut éprouver l'atmosphère, dans sa poids, sa température, sa fécheresse, son humidité, son état électrique & dans ses mouvements, soit que l'on considère dans ceux-ci leur intensité, leur direction ou leur durée. (A. T.)

MÉTÉOROLOGIQUE, adj.; *meteorologicus*. Qui concerne les météores, & en général tous les changemens & altérations qui arrivent dans l'atmosphère. Cet adjectif a été aussi employé pour désigner les instrumens & les observations de météorologie; ainsi l'on dit, *des instrumens, des observations météorologiques*.

Instrumens météorologiques. On appelle *instrumens météorologiques*, ceux qui sont destinés à faire connoître les variations atmosphériques, notamment celles qui sont relatives à la pesanteur, à l'humidité, à la température de l'air, à la quantité d'eau tombée à la surface de la terre, &c. &c. Dans cette classe sont compris les baromètres, eudiomètres, hygromètres, thermomètres, udomètres, &c.

On a inventé, dans ces derniers temps, une seule d'instrumens de météorologie; tels sont, par exemple, les *anémoscopes*, qui servent à faire connoître la force & la direction des vents; le *pluviométrigraphe* ou *udomètre*, au moyen duquel il est facile d'apprécier la quantité d'eau tombée dans un temps donné. Nous renvoyons le lecteur, pour ces différens mots, à tous les Traités de physique modernes; il y trouvera les diverses améliorations que ces nouveaux instrumens ont subies, d'après les modifications nécessitées par les progrès que les sciences physiques font tous les jours. (Voyez dans ces différens ouvrages, *ANÉMOSCOPE*, *BAROMÈTRE*, *HYGROMÈTRE*, *THERMOMÈTRE*, *UDOMÈTRE*, &c.)

Observations météorologiques. On appelle encore *observations météorologiques*, toutes celles que l'on fait journellement sur les différens espèces de météores, tels que l'arc-en-ciel, la pluie, la neige, la grêle, les brouillards, les vents, le tonnerre, &c. Ces sortes de recherches constituent la météorologie proprement dite, & leur importance est telle, que nous croyons devoir entrer ici dans quelques détails sur leur utilité & la manière de les recueillir. La marche que nous allons suivre sera relative aux divers propriétés de l'atmosphère, considérée d'après sa pesanteur, sa température, son humidité, les mouvemens de trauslation, &c. &c.

Pesanteur de l'air. L'invention du baromètre, dont l'histoire & la construction ont été déjà

développés en parlant de cet instrument (*voyez BAROMÈTRE*), est entièrement due à Torricelli; & si Galilée soupçonna, ou pour mieux dire découvrit la pesanteur de l'air, ce fut encore Torricelli qui, en 1643, mit cette propriété en évidence, & nous fit connoître que le poids de l'atmosphère étoit variable. Une semblable découverte dut nécessairement exciter l'émulation parmi les physiciens; aussi, dès cet instant, chacun chercha à se rendre compte de ces différens modifications atmosphériques, & sous la dénomination d'*observations barométriques*, on rangea l'ensemble des faits qui servirent à constater ces sortes de changemens. Bien que les tentatives des observations aient donné naissance à des inventions plus ou moins ingénieuses, nous nous abstenons d'en parler dans cet article: on trouvera dans l'ouvrage de Deluc (*Recherches sur les modifications de l'atmosphère*) & dans celui du P. Cotte (*Traité de Météorologie*), la description exacte de tous les instrumens qui furent successivement imaginés.

Le simple tube de Torricelli, lorsqu'il a été convenablement disposé, paroît être néanmoins le seul appareil propre à faire des observations rigoureuses; & si l'on se rappelle que la colonne de mercure éprouve deux sortes de variations, l'une dont la cause est constante, & que l'on nomme *influence honore*, l'autre qui dépend de modifications accidentelles, on verra qu'il est toujours nécessaire d'observer le baromètre à des heures fixes; à cet égard l'heure de midi paroît être la plus convenable, surtout lorsque, par des circonstances particulières, il a été impossible de faire plus d'une observation barométrique en un jour. Si l'on vouloit, à la rigueur, une grande précision, il faudroit corriger la hauteur barométrique observée, de manière à faire disparaître l'influence capillaire que peut exercer le tube, & celle qui résulte de l'influence de température. Ces sortes de considérations n'ont point été oubliées à l'article AIR de ce Dictionnaire, lorsqu'il a été question de l'emploi que l'on pouvoit faire du baromètre pour mesurer la hauteur des montagnes.

La forme de tableau est la plus convenable de toutes celles que l'on peut employer pour recueillir des observations de météorologie; elle donne la facilité de conclure les pressions moyennes répondantes à une période quelconque, soit, par exemple, à un mois, à une saison, à une année; néanmoins il est quelquefois plus avantageux d'avoir recours à un *tracé graphique*, qui permet de faire, au premier aspect, la diversité des variations atmosphériques, qui peuvent simultanément se manifester dans des lieux plus ou moins distans. Nous ne décrirons point ici la série des opérations qu'il faut exécuter pour obtenir de semblables résultats; on fera facilement ces diverses indications, en jetant un coup d'œil sur les tableaux météorologiques publiés chaque mois d'après les observations faites à l'Observatoire de Paris. Leur rédaction, qui est

Lippie, 1772; *sympanindia therapia*, 1793; consultez aussi un très-bon Mémoire de M. Marc, dans le Recueil de la Société médicale d'émulation, tome VI, page 342.

conforme à la méthode adoptée par les physiciens les plus exacts, nous paroit renfermer l'ensemble des considérations dont l'étude peut contribuer à perfectionner la physique de l'atmosphère.

Observations thermométriques. Les changements de température le mesurent ordinairement au moyen d'un instrument dont la découverte paroit avoir été simultanément faite par Sanctorius & Drebbel, environ vingt-cinq ans avant celle du baromètre, & dont l'invention remonte au commencement du dix-septième siècle. Nous passons à dessein sous silence tout ce qui est relatif à sa construction (voyez *THERMOMÈTRE*); seulement nous croyons devoir observer que cet instrument, lors de son invention, étoit loin de fournir des résultats sur l'exactitude desquels on pût compter, mais que successivement perfectionné, il paroit avoir atteint aujourd'hui la plus grande précision.

Les observations thermométriques peuvent avoir deux buts différents : ou de constater la rapidité des changements qui surviennent dans un laps de temps donné, ou bien elles peuvent être destinées à fournir des indications sur l'intensité variable de la température dans différents lieux de la terre. Sous le premier rapport il suffit de comparer l'indication thermométrique à diverses époques plus ou moins rapprochées; dans le second cas on est obligé de prendre une moyenne, qui est d'autant plus exacte qu'elle résulte d'un plus grand nombre d'observations, & c'est, à proprement parler, cette dernière évaluation qui constitue le climat, envisagé en égard à la température. Les conséquences définitives auxquelles on est déjà parvenu, ont fait en outre que la latitude des lieux n'étoit qu'un des éléments de leur température, & qu'une foule de circonstances accessoires pouvoient modifier les effets que sembloit devoir produire l'influence solaire : telles seroient, par exemple, la situation d'un lac au milieu des terres, la proximité de masses d'eau plus ou moins considérables, la nature du sol, &c. &c.

Observations hygrométriques. Une multitude d'indications nous ont de bonne heure appris que l'atmosphère étoit tantôt plus, tantôt moins humide, & de toutes les modifications dont elle est susceptible, l'un *hygrométrie* est peut-être celle qui doit plus particulièrement nous intéresser. Il est hors de doute, en effet, qu'un degré plus ou moins grand de chaleur ou d'humidité, modifie singulièrement la manière dont s'exécute la transpiration, & que certains états atmosphériques influent d'une manière particulière sur toutes les fonctions qui sont en rapport avec elle : dès-lors on ne sera point étonné si les premières notions hygrométriques ont été recueillies par un médecin recommandable à plus d'un titre. Leroy, de Montpellier, est au effet celui qui démontra le premier l'influence que peut exercer une température variable de l'atmosphère, sur ce qu'il nommoit la *faculté dissolvante de l'air*.

La théorie qu'il avoit établie à cet égard, fut

long-temps adoptée par les physiciens, & elle le seroit peut-être encore, si les expériences de MM. Deluc & de Saussure ne nous avoient appris que le passage de l'eau à l'état de vapeur dépendoit uniquement de l'action du calorique.

Parmi les nombreux hygromètres que l'on a successivement inventés, deux seulement méritent de fixer l'attention des observateurs : ils ont été imaginés par MM. de Saussure & Deluc. Les principes sur lesquels sont établis ces instruments, la manière dont on doit interpréter les résultats qu'ils indiquent, appartenant aux mots *HYGROMÈTRE* & *VAPOURS* (voyez ces deux mots), nous croyons inutile de les rappeler ici.

Les observations dont sont susceptibles les phénomènes que l'on a particulièrement désignés sous le nom de *météores aqueux*, & dont nous avons donné l'énumération au mot *MÉTÉORES*, se réduisent à déterminer le nombre de jours de pluie & la quantité d'eau tombée, soit durant chacune des mois de l'année, soit durant une année entière. Les résultats auxquels on est parvenu, montrent d'une manière évidente que si, à partir de l'équateur jusqu'aux pôles, le nombre de jours de pluie, pendant une année, va toujours en augmentant, la quantité d'eau tombée suit une marche inverse, c'est-à-dire, qu'elle est très-grande dans les régions équatoriales, & diminue à mesure que l'on approche des pôles. (Voyez, pour plus de détails, l'article *EUXÈTE*.)

On estime ordinairement la quantité d'eau tombée du ciel (quelle que soit d'ailleurs la forme sous laquelle elle le précipite), au moyen d'un appareil connu sous le nom d'*anémomètre* ou *pluviométrique*; la construction est dirigée de manière à pouvoir faire connoître la quantité d'eau qui tombe sur différents points de la terre. (Voyez *PLUVIOMÈTRE*.)

Ce qui est relatif aux *météores aériens*, se rapporte seulement à la force & à la direction dans laquelle les vents soufflent : ce que l'on exprime en indiquant de quelle partie de l'horizon le vent paroit souffler. (Voyez *ANÉMOMÈTRE*, *ANÉMOCOPE*, *ROSE DE VENTS*.) Quant aux observations magnétiques, elles font en général trop délicates pour pouvoir être faites par toutes les classes d'observateurs; il n'y a guère que ceux qui en font une étude particulière, qui puissent avec succès recueillir ces sortes d'indications, & aux mots *AIMANT* & *BOUSSOLE*, on a donné les renseignements qui peuvent intéresser, soit en égard à la déclinaison ou à l'inclinaison de l'aiguille aimantée.

De tous temps on a recueilli des observations de météorologie, & si l'on remonte jusqu'à l'origine de cette science, on voit que les anciens physiciens encourageaient par de pompeux éloges ces recherches importantes, qu'ils regardoient comme une découverte précieuse & un moyen infaillible d'étendre la sphère des sciences naturelles. Dès 1666, on s'occupa de ce genre d'observations; en 1668, l'Académie des sciences entreprit de leur donner

une forme régulière, & quelques autres associations non moins distinguées suivront bientôt son exemple. On prévoit d'avance combien ces premières observations faites avec des instrumens construits sans règles & sans méthode, durent être variables & défectueuses; elles furent néanmoins telles jusqu'en 1750, époque à laquelle Réaumur imagina le thermomètre, instrument qui, fait d'après un même procédé, devoit donner les mêmes résultats dans toutes les températures semblables, & mettoit les savans à portée de comparer toutes les observations faites dans tous les points du globe. Ce ne fut donc que vers la fin du dernier siècle & au commencement de celui-ci, que l'on put retirer de ces sortes d'expériences des résultats aussi exacts qu'avantageux. Dès-lors le goût pour les observations météorologiques devint général : les uns voulant se rendre compte des vicissitudes que l'atmosphère éprouve, cherchant, à l'aide de ces observations, à découvrir la cause des météores; d'autres voulurent en tirer parti pour la navigation; les cultivateurs y eurent recours pour perfectionner la théorie de l'agriculture; les médecins enfin, à l'exemple d'Hippocrate, de Baillon, d'Huxham, de Sydenham, qui déjà avoient fait attention aux constitutions atmosphériques, voulurent aussi les mettre à profit pour concourir au bien & au salut de l'humanité. Ce fut en effet Malouin, de l'Académie des sciences, qui, en 1746, appliqua le premier la météorologie à la médecine, & compara les effets des variations de l'air dans les différentes maladies. Déjà, en 1741, Duhamel avoit fait entrevoir les avantages que peut présenter cette science, à l'agriculture.

Un grand nombre d'observateurs se sont livrés à ce genre de recherches, & les médecins nous ont toujours fourni les observations les plus propres à donner des renseignemens utiles sur les diverses modifications atmosphériques qui faisant partie de toutes les expéditions lointaines, & ne devant être étrangers à aucune branche de la physique, ils peuvent multiplier à l'infini les observations météorologiques; & le passage d'une saison à une autre, une grande humidité qui succède à une grande sécheresse, le pesanteur de l'air que nous respirons, deviennent alors pour eux le sujet de quelques réflexions. Placé dans des circonstances favorables, le médecin vraiment observateur tient compte des plus légères variations atmosphériques; à l'aide de bons instrumens, il entre dans tous les détails que nécessitent des recherches d'autant plus importantes qu'elles s'appliquent à l'art de guérir; & s'il fait attention à l'extrême sensibilité de certaines organisations, s'il considère enfin l'effet que peut produire la continuité ou l'interruption fréquente d'une influence légère, il obtient des résultats satisfaisans, & hâte, par ce moyen, les progrès de la médecine d'observation.

L'utilité des observations météorologiques n'est donc plus un problème aujourd'hui; & si elles offrent de grands avantages à la médecine & à

l'agriculture, elles ne sont pas moins importantes pour la navigation, par les notions exactes qu'elles nous donnent sur la force & la direction des vents & sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée.

On ne sauroit donc trop multiplier ces sortes d'observations; elles intéressent d'ailleurs toutes les classes de la société, & ce motif seul doit engager les physiciens à se livrer avec zèle à ce grand travail, qui exige dans la méthode de la rédaction autant de patience que d'exactitude. (ACQ^{te}. THILLAT.)

METHEMERINE (ANPHEMERIN). Dénomination sous laquelle les Anciens, après Galien, désignaient une fièvre dont les accès revenaient chaque jour.

METHODES. Littéralement, dans l'acception étymologique & primitive, l'action d'aller par voies, par chemins réguliers, de *pari*, à *travers*, & de *diis*, *chemin*. En effet, la méthode a pour objet de tracer la route qui conduit le plus promptement & le plus sûrement au but, dans les différentes actions ou les différentes opérations de l'esprit humain.

De la diverse manière de considérer les objets, dans le dessein de les connaître, résultent les différentes méthodes analytiques, synthétiques, & les méthodes de classification, qui prennent le titre de classification botanique, zoologique, minéralogique, nosologique ou oncopologique. (Voyez pour cette dernière, dans ce Dictionnaire, les articles Nosographie & Nosologie, dans lesquels nous nous proposons d'établir, d'après l'état présent de la saine philosophie, les principes suivant lesquels on doit comparer, & rapporter à un petit nombre de titres ou de divisions, les nombreux phénomènes des maladies.)

MAXIMON (d'étude). *Methodus studii medicæ*. C'est la méthode appliquée en particulier aux études nombreuses & difficiles que doit embrasser l'instruction du médecin. Elle consiste en ce que l'on appelle antécédens, dans les écoles, la *PROLEGOMATIQUE* (voyez ce mot), & n'a pas seulement pour but de faire acquérir des connaissances, mais de les faire acquérir dans un certain ordre qui en rend la possession plus assurée & l'application moins difficile; initiation véritablement médicale, qui devoit ouvrir la carrière aux élèves, y rendre leur marche plus rapide, moins incertaine, de telle sorte qu'en la parcourant, leur courage fuu s'entienne, leur jugement se forme, leur mémoire s'enrichit, leur raison s'étend & se fortifie.

Cette direction des études, cet enseignement normal, appliqué à l'éducation du médecin, nous les avons présentés avec une certaine étendue & comme l'objet d'un enseignement particulier, sous le titre de *Philosophie* & de *Littérature médicales*, dans les leçons que nous sommes chargés de faire chaque

chaque année à la Faculté, sur l'histoire littéraire & l'histoire générale de la médecine.

Nous allons retracer ici, mais d'une manière rapide, le but & les motifs, le plan & les principales divisions de cet enseignement, que quelques auteurs ont voulu désigner sous le nom de *methodologia* : dénomination à laquelle nous avons préféré le titre de *philosophie & de littérature médicales*, qui indique mieux son étendue & ses rapports les plus directs avec la philosophie de l'esprit humain.

Le mot *philosophie* réunit à son acception générale d'amour de la sagesse ou de la vérité, plusieurs sens particuliers, suivant les qualifications qui y sont jointes, comme on le voit dans les locutions *philosophie universelle*, *philosophie générale*, *philosophie de l'esprit humain*, *philosophie morale*, *philosophie documentaire* ou *normale*.

Cette dernière, dont la philosophie médicale n'est qu'une division particulière, se place naturellement à l'entrée des sciences, pour en tracer rapidement l'histoire, en montrer les routes, & en donner l'itinéraire à ceux qui veulent se livrer à leur étude. Nul autre genre de connaissance n'exige plus que la médecine une semblable introduction, cette méthode de travail, ce choix d'instrumens & de secours, sans lesquels les progrès des étudiants ne peuvent manquer d'être moins assurés & plus difficiles.

Cet heureux emploi de la philosophie, pour former le dépôt des connaissances & le transmettre ensuite, par la voie de l'enseignement, peut sans doute être regardé comme l'un des usages auxquels on doit le plus s'attacher, depuis que Bacon nous a appris, que ce qui est propre au philosophe, c'est d'être comme un guide qui connoît toutes les routes de l'esprit humain, & qui compte parmi ses principaux devoirs, le soin de ceux qui veulent s'instruire. Les leçons & les exemples de cette philosophie générale & documentaire, ses considérations les plus élevées, se trouvent sans doute dans les ouvrages de Bacon, dans ceux de Hobbes son élève, de Dugald-Stewart en Angleterre, de Fontenelle, de Buffon, de Condillac & de d'Alembert en France; nous à jamais illustres, auxquels nous devons ajouter ceux de Bailly, Lavoisier, Vicq-d'Azyr, & plus près de nous, les noms également historiques de M. Delambre, ainsi que de M. Cuvier, dont nous aurons si souvent occasion de rappeler les éloges historiques & le tableau du progrès des sciences naturelles, depuis la fin du dix-huitième siècle, jusques & y compris le commencement du dix-neuvième.

Pour embrasser dans toute son étendue un cours de littérature & de philosophie médicales, on doit porter d'abord son attention sur les prolégomènes ou les généralités de la médecine : ce qui com-

prend une première idée de cette science, de son but, du sujet dont elle s'occupe; du caractère d'une semblable étude, de sa place dans le tableau des connaissances humaines, de sa nécessité ou du moins de son utilité chez tous les peuples civilisés, de son degré de probabilité, & des objections ou des attaques qu'on a si souvent dirigées contre la médecine aux différentes époques de son histoire. (*VOY. SCIENCES MÉDICALES & PROLÉGOMÈNES DE MÉDECINE.*) Nous appelons ensuite l'attention des jeunes médecins sur l'introduction particulière & spéciale à cette même étude, sur ce qui constitue essentiellement le *methodus studii medici*. Nous indiquons alors l'ensemble des préceptes qui ont pour but de diriger les travaux scolaires, d'en marquer l'époque & l'étendue, dans la période de l'instruction; de tracer la manière d'étudier en général, de donner la méthode qui convient le mieux pour suivre les cours des différens professeurs avec un grand avantage, & d'indiquer pour chaque partie des connaissances médicales, le petit nombre d'ouvrages classiques, dont la lecture doit marcher de front avec l'instruction orale & la rendre plus solide & plus étendue.

Tels sont, au premier aperçu, les différens objets qui appartiennent à un cours de philosophie médicale. Nous pensons qu'il importe d'y joindre quelques vues générales sur diverses questions qui se rapportent à la médecine, considérée comme art ou comme profession, mais principalement sur les devoirs du médecin, sa méthode, les principes qui le dirigent dans le genre d'observations qui lui est propre. Nous croyons même qu'il conviendrait de faire également entrer dans la philosophie médicale, quelques vues sur l'expérience propre au médecin, sa morale pratique, sa logique, & cette politique médicale si délicate, si délicate, qui n'est pas un coupable charlatanisme, un art de tromper les hommes, mais un moyen de les aider à souffrir & même à mourir; de prévenir continuellement, de calmer les effets toujours si funestes de l'imagination ou de la crainte; conduite bien difficile sans doute, & qui exige, pour y parvenir, les qualités, les dispositions qui sont en apparence le plus incompatibles; la sensibilité & l'habitude de voir souffrir, la commiseration la plus douce & le sang-froid le plus imperturbable, l'adresse de l'esprit le plus fin & la droiture de l'âme la plus austère, l'amour des hommes, & la connaissance approfondie du cœur humain.

La table synoptique ci-jointe présente dans un résumé méthodique, & d'une manière toute intuitive, ces différentes séries de préceptes & de réflexions, qui nous paroissent appartenir à la philosophie médicale.

TABLE SYNOPTIQUE

DE LA LITTÉRATURE ET DE LA PHILOSOPHIE MÉDICALES, ET DE LEURS DIFFÉRENTES DIVISIONS.

LA LITTÉRATURE	ou	LA PHILOSOPHIE	MÉDICALES	Compris dans l'ouvrage, et appliqués à la direction des études, ont pour objet deux points de vue principaux ; savoir :
1 ^{re} . LA MÉTHODE confidite comme SCIENCE.	1 ^{re} . Introduction gé- nérale ayant pour ob- jet	2 ^{re} . Introduction particu- lière qui comprend .	1 ^{re} . La fin, le but de la médecine. 2 ^{re} . Ses divisions & son rang parmi les connaissances humaines. 3 ^{re} . Sa méthode. 4 ^{re} . Son genre de certitude. 5 ^{re} . Les objections de ses adversaires.	2 ^{re} . La direction spéciale des études du médecin dans l'ordre suivant .
2 ^{re} . LA MÉTHODE confidite comme PROFESSEUR.	Les habitudes pratiques,	Etudes, instruction clinique.	1 ^{re} . Qualités & caractère du médecin. 2 ^{re} . Ses devoirs. 3 ^{re} . La politique médicale ou la médecine morale pratique.	1 ^{re} . Préparations, études préliminaires. 2 ^{re} . Classification, gradation des études. 3 ^{re} . Manière d'apprendre, de lire en général, de profiter de l'instruction orale & des lectures. 4 ^{re} . Philologie & littérature de la médecine (<i>Annuaire d'Érudition des sciences médicales</i>). 5 ^{re} . Anatomie et physiologie. 6 ^{re} . Histoire naturelle médicale. 7 ^{re} . Clinique animale. 8 ^{re} . Pathologie générale, <i>nosologie externe & interne, nosologie pathologique</i> , &c. 9 ^{re} . Thérapeutique, divisée en trois sections principales, la thérapeutique proprement dite, la manière médicale & la chirurgie. 10 ^{re} . Hygiène. 11 ^{re} . Médecine légale. 12 ^{re} . Histoire de la médecine (<i>Complément des études médicales</i>).

Les méthodes d'études sur lesquelles on a publié seulement quelques dissertations, n'ont pas été considérées comme un sujet particulier d'enseignement & de connoissances, avant la fin dix-huitième siècle.

Le Traité de Boerhaave, développé par Haller, sous le nom de *Methodus studii medici*, est bien moins un système raisonné des connoissances médicales, & l'indication des habitudes d'esprit & des différents travaux auxquels il faut se livrer pour s'occuper de leur étude, qu'un catalogue volumineux d'ouvrages de médecine, par ordre de matières ou de doctrine. L'auteur n'a pas même ouvert, dans ce catalogue, un compte particulier aux auteurs qui se sont occupés de philosophie médicale en général, ou de méthodographie en particulier. Il n'a cependant pas oublié les écrits de ces auteurs, mais il les a confondus avec ceux dont l'histoire littéraire de la médecine a été l'objet.

Parmi les anciens qui se sont occupés de la manière d'étudier ou d'exercer la médecine, & qui sont cités par Haller, se trouvent principalement Galien & Hippocrate : Galien pour plusieurs des Traités que Chartier a réunis sous le titre d'*Ulogogæ*, & Hippocrate pour le *livre du Serment*, que plusieurs commentateurs ne regardent pas comme un de ses ouvrages légitimes ou authentiques.

Ce traité, quel qu'en soit l'auteur, est peut-être le seul monument littéraire de l'antiquité parvenu jusqu'à nous, qui appartienne directement à la méthodographie ou à la propédeutique, & dans lequel on trouve d'ailleurs à la fois des documens historiques sur la manière d'apprendre la médecine chez les Anciens, & des conseils sur son étude & son exercice, qui se rapportent dans tous les temps aux parties les plus élevées de la philosophie médicale. Il est évident, d'après ce Traité, que chez les Anciens, dans les collèges des Asclépiades de Guide & de Cos, l'étude de la médecine se bornait à un apprentissage purement domestique, fondé sur la tradition ou sur l'imitation, en tout semblable à ce qui se pratique encore aujourd'hui pour les arts mécaniques. La conduite d'Hippocrate, qui se trouve conforme aux préceptes renfermés dans ce livre du serment, présente elle-même, soit dans la biographie, soit dans ses propres écrits, plusieurs traits qui mériteroient d'être rappelés dans une histoire des études médicales, & qui en caractérisent la première époque, c'est-à-dire, la transmission des connoissances médicales par apprentissage & par tradition ; ce qui n'a point échappé à l'ingénieux auteur du *Voyage de Jeune Anacharsis*.

Une seconde époque est caractérisée par l'influence des sectes médicales sur l'étude de la médecine, dans les écoles d'Alexandrie, d'Athènes, de Laodicée, mais principalement dans les écoles des Nestoriens, dans le sixième & le septième siècle.

Quelques ouvrages de cette époque, & surtout

dans les premiers temps, ont en pour objet les généralités les plus élevées de la médecine. Telle est principalement la belle préface de Celse. Nul autre ouvrage, parmi ceux des Anciens, n'a offert dans un si petit nombre de pages, avec autant d'éloquence que de concision, les prolégomènes les plus intéressans de la médecine. Cette préface de Celse, si justement, si souvent citée, & principalement pour objet de retracer à grands traits l'origine, les premiers développemens de cette partie des connoissances, les principaux systèmes, les différentes sectes qui ont été alternativement utiles ou contraires à la progrès. Rien de plus éloquent que cette vue générale des situations diverses de la médecine.

L'auteur, partant de l'origine des choses, considère d'abord la médecine chez les peuples qui, dans l'état presque sauvage, emploient quelques plantes ou des secons quelquefois contraires blessures & les maladies accidentelles ; il la montre ensuite chez les premiers Grecs, simple & bornée, toujours plus étendue & plus variée dans ses moyens & dans ses sujets d'observation chez les Grecs & les Romains, à mesure que les arts & le luxe font des progrès. Les premiers noms qui se trouvent dans cette esquisse de la médecine, sont ceux des philosophes dont l'histoire de cette science réclame les noms, tels que Pythagore, Empédocle, Démocrite, viennent ensuite Dioclès de Caliste, Chrysippe, Praxagore, Erophile, & avant eux Hippocrate de Cos le premier parmi les plus mémorables, dit « Celse, le plus distingué par l'éloquence & la pratique, & qui le premier sépara la médecine de la philosophie. »

Arrivé à cette époque, Celse rapporte comment la médecine fut alors divisée en *chirurgie*, *pharmacie*, *diététique* ; il dit aussi comment elle se partagea en deux sectes, les méthodiques & les empiriques, dont il examine & balance les motifs d'opinion, en concluant avec l'élévation d'un esprit supérieur, que tous les argumens pour ou contre sont assez inutiles ; que si l'expérience est le fondement de la médecine, l'étude de la nature, & les sciences, qui sont distinctes de la médecine, disposent à l'exercer avec plus d'habileté & de distinction, surtout dans plusieurs circonstances qui ne se rencontrent pas dans la pratique ordinaire, & qui exigent toutes les ressources du raisonnement & de l'expérience. On pourroit encore rapporter à la philosophie & à la littérature médicales, la préface particulière du septième livre de Celse, dans laquelle il parle de la chirurgie en général, des hommes distingués qui se sont livrés à cette partie de la médecine, & principalement des devoirs, des qualités de cette classe de médecins. Nous devons rappeler aussi, & d'après la remarque de l'un de nos plus sages compatriotes, que Celse aurait employé le premier le mot *chirurgie* dans l'acception que nous lui donnons aujourd'hui, le détournant de sa signification pri-

mitive & étymologique, *œuvre de la main*, qui le faisoit employer plus particulièrement pour les artistes, tels que les peintres, les statuaires, ceux qui pratiquoient un art quelconque.

Les Traités de Galien que nous avons déjà indiqués, se rapportent, comme la préface de Celse, à la seconde des époques, que l'on peut saisir dans le progrès & les révolutions des études médicales; ils font du reste d'un genre mixte, & appartiennent le plus souvent à l'histoire littéraire, tout en contenant des préceptes, des remarques sur la manière d'étudier, ce qu'aucun auteur n'avoit fait, avant Galien, avec le même soin & le même détail.

Ces écrits sont indiqués dans l'ordre suivant par Haller.

1°. Le livre, qu'un très-bon médecin doit être philosophe (*quod optimus medicus sit quoque philosophus*), publié séparément. Paris, 1541, in-4°.

2°. Le livre de la meilleure doctrine (*de optimâ doctrinâ*).

3°. Le livre du meilleur mode d'enseignement, avec les discours sur les beaux-arts (*de optimo docendi genere, cum exhortatione ad bonas artes*), *ab Erasmo interprete*. Bâle, édit. 1526, in-8°.

4°. Le livre de la constitution de l'art médical (*de medicâ artis constitutione*, cum Fc. Valeriolæ commentario). Genève, 1577, in-8°.

5°. Définitions de la médecine (*definitiones medicæ*), espèce de Vocabulaire dont il a paru une édition à Paris, en 1528.

6°. L'introduction ou le médecin (*introductio seu Medicus*), ouvrage qui n'est pas authentique, & qui forme une espèce de *compendium*, publié à Bâle en 1537, in-8°.

7°. L'explication des mots inusités dans Hippocrate (*explicatio linguarum obsoletarum Hippocratis*), ouvrage dont Henri Estienne a donné une édition en le réunissant au Vocabulaire d'Erotien. 1564, in-8° (1).

8°. Le livre sur ses propres ouvrages (*liber propriis libris*), dans lequel Galien, déjà très-avancé en âge, se plaît à faire le catalogue de ses propres écrits, indique les occasions qu'il a eues de les composer, & se rappelle plusieurs autres circonstances de sa vie. Ce Traité a été publié par Caius, avec un autre ouvrage du même auteur, sur l'arrangement de ses livres.

9°. Le Traité de *sectis*, *ad eos qui introducuntur*, &c., & celui de *subfiguratione empiricâ*, dans lesquels, comme dans celui de la meilleure doctrine, l'auteur rapporte & réfute les opinions des empiriques & des méthodistes.

(1) On a réuni dans une même édition, les livres: *Oratio ad artes*, &c.... *Quod optimus medicus philosophus, de sectis, de optimâ sectâ*, &c. Lond. 1650, in-4°. d'après la traduction & la révision de Georges Gouillon.

On regarde comme supposés, les livres de *paribus artis medicinae* & de *ponderibus & mensuris*.

10°. Les neuf livres sur Hippocrate & sur Platon (*de Hippocratis & Platonis decretis*), qui contiennent plusieurs choses importantes sur les opinions des anciens philosophes.

11°. Des fragmens de commentaires sur le Timée de Platon.

On regarde comme supposé, le livre de l'histoire philosophique (*Historia philosophica*) (1).

L'enseignement de la médecine dans les écoles arabes constitue une troisième époque des études médicales, qui diffère très-peu, sous ce rapport, de l'organisation & de la discipline, de la manière d'étudier dans l'époque précédente, mais qui se trouve caractérisée par l'état des connoissances en général, & de la médecine en particulier, sous l'empire & dans les écoles des Arabes.

Du reste, si l'on excepte quelques fragmens de Rhazès (2), & l'*Sofage* de Johannitus, sur l'origine de la médecine & la division de ses différentes parties, aucun ouvrage relatif à la manière d'étudier ne fut publié dans le cours de cette époque.

L'époque suivante, celle de la fondation des premières universités, à laquelle se rattache, dans l'histoire de la médecine, une période qui s'étend jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, nous offre un assez grand nombre d'écrits sur la propédeutique, la direction, mais surtout la réforme des études médicales. Aussi, dès la fin du quinzième siècle, Gabriel Zerbus, à l'exemple de quelques Arabes, demandoit que l'on fit entrer la pratique de l'art dans l'enseignement. Placotomus & Castellani faisoient les mêmes réclamations, & Memmius s'adressant aux magistrats d'Utrecht, pour en obtenir des réformes importantes dans la médecine, les exhorte à faire établir des études, des exercices cliniques, comme un complément nécessaire dans l'instruction (3).

D'autres médecins proposèrent également, dans le dix-septième & dans le dix-huitième siècle, de voyager, de visiter les hôpitaux, & de porter davantage l'attention des étudiants vers la pratique de l'art, qui leur étoit presque entièrement étrangère pendant toute la cours de leurs études (4).

Thurianus, de Gênes, qui écrivait au commencement du dix-septième siècle, exposa des vues du même genre, mais d'une manière particulière : non-seulement il indiqua, dans ses réclamations, la nécessité de se former à la pratique dans la première instruction, avant de s'abandonner à son expérience personnelle, mais il entre en outre dans les détails les plus intéressans pour analyser ses vues. « Je voudrais, dit-il, qu'il y eût, pour préparer les jeunes méde-

(1) Haller, *Op. citatum*, pag. 96r.

(2) *Caustela medicorum*. Padoue, 1499.

(3) *De rebus medicis usq.*

(4) Rhodius, Thomas Bartholin, &c. &c.

eins à l'exercice de leur profession, dans les grandes villes, un hôpital & une académie, où tout seroit disposé pour cet usage. A l'académie, les disciples (*tyrones*) reprendroient, dans leurs conférences, & sous la direction de quelques professeurs, les parties les plus importantes de leur instruction médicale; ils s'exerceroient en même temps à consulter, d'après l'expérience journalière, & à suivre dans un hôpital un petit nombre de malades choisis par le professeur, comme des modèles & des sujets d'observation. Ces exercices, ajoute l'auteur, devroient recevoir la sanction du prince, & aucun médecin ne pourroit obtenir le droit d'exercer, sans les avoir suivis. Privés de tels établissemens, nous conseillons aux élèves de se réunir, de consulter entre eux, & de chercher toutes les occasions de voir des malades, & de se livrer à des observations cliniques. *

Des conseils aussi utiles, l'exemple d'un véritable enseignement clinique, donné en 1643, par Guillaume Sirates, à Utrecht, le même enseignement repris avec éclat par Sylvius, vers le milieu du dix-septième siècle; à Leyde, par Boerhaave, au commencement du dix-huitième, & à Rome par Lancisi, demeurèrent sans influence sur la forme des anciennes écoles, dont, il faut l'avouer, la constitution ne pouvoit s'améliorer ni se placer à cette époque au niveau des connoissances, sans être entièrement refondue & débarrassée des entraves de la scholastique. On voit même que dans tout le cours de cette époque, tous les bons esprits se plaignent plus que jamais de l'insuffisance de l'instruction & de sa presque nullité pour tout ce qui concerne la pratique; & ces bons esprits, ce sont Sydenham en Angleterre, Baglivi en Italie, le janséniste Hamon, Lefrançois & plusieurs autres en France; le premier a décrit d'une manière aussi naïve que piquante (1) l'embarras dans lequel il se trouva lorsque, chargé de belles connoissances qu'il avoit acquises à Oxford, il commença à exercer la médecine à Londres. Rien ne peut égaler la surprise & le mécompte qu'il éprouva & qu'il exprime par cette phrase :

Manusculæ artes, hæc rectius perdiscendum esse, quam ab ipsis artis exercitio & usu.

Baglivi, qui a fait à peu près les mêmes remarques, ne s'est pas élevé avec moins de force contre l'état des études de son temps, & ne parvint à y suppléer pour son propre usage, qu'en s'attachant, dans les hôpitaux, à observer comme des types ou des modèles un certain nombre de maladies, et qui lui fit faire en peu de temps des progrès dont il fut lui-même étonné (2).

Les réclamations de Lefrançois ont beaucoup plus d'étendue, & on ne pourroit, sans injustice, leur refuser d'avoir donné en France la première im-

pulsion, les premières idées qui ont contribué à des projets de réforme plus étendus, & à une organisation des études entièrement nouvelle.

Avant cette organisation, plusieurs ouvrages ont été publiés dans le dessein de la provoquer, de diriger les études où les lectures des élèves, ou de traiter des points quelconques de philosophie médicale. Parmi les ouvrages de ce genre, nous trouvons, dès le seizième siècle, un discours d'Erasme en l'honneur de la médecine; le traité intitulé *Doctus verus*, de Jean Cornarius; la dissertation de Gualpard Pencer, sur la dignité de la médecine; d'autres dissertations d'Honoré Castet, de Placotomus, &c... Déjà nous avons en l'occasion de citer quelques-uns de ces écrits, relativement à l'impulsion que leurs auteurs voulurent donner aux études pratiques & cliniques.

Un des plus remarquables, celui de Mercurialis, contient en outre différents préceptes sur le genre d'instruction qui convient au véritable médecin. L'auteur recommande en particulier de ne choisir dans la foule des ouvrages, que les écrits les plus estimés & les plus constamment feuilletés par les hommes éclairés de tous les temps (*probantissimi & per multa sæcula à vins doctis pertriti*....).

Il veut qu'on les lise sans leurs commentaires, qui ne font qu'embarrasser le jugement & rendre les esprits moins actifs dans la recherche de la vérité.

Il engage en outre à fuir, à regarder comme très-dangereux les compendium & les abrégés, au moyen desquels certains auteurs promettent une instruction prompt & facile.

Thomas Bartholin ne donna pas des avis moins sages à ses enfans, sur la manière de voyager, & de faire tourner leur voyage au profit de leur instruction médicale (*de peregrinatione medici*, 1672).

Kyber, dans une instruction plus étendue & plus importante, a fait connoître le premier enseignement clinique complet & régulier, composé de la visite des malades dans un hospice, & d'une séance ou conférence publique sur les objets que cette visite a présentés à l'observation du maître & des disciples (*medicinam discendi & exercendi methodus*).

La préface de Baglivi, que nous avons citée, se trouve aussi au premier rang parmi les ouvrages qui appartiennent à la philosophie médicale.

On doit porter le même jugement sur l'introduction à la pratique de la médecine par Boerhaave, & sur son discours concernant l'étude d'Hippocrate (*de commendando studio Hippocratis*), ainsi que sur les remarques d'Hoffmann, sur la difficulté que présente l'étude de la médecine (*de difficult. in medic. addisc.*), & sur un excellent discours de Lancisi pour l'inauguration d'un enseignement clinique à Rome, dans le vaste hôpital du Saint-Esprit, consacré à cet usage avec la plus grande munificence.

(1) Sydenham, *Epistola dedicatoria*.

(2) *Praxis medica*, Préfat.

L'auteur de ce dernier écrit, Lancisi, avoit été élevé à cet emploi après quarante années de méditations & d'expériences. Son discours porta tout entier sur la nécessité d'étudier la médecine au lit des malades, dans les hôpitaux, pendant la jeunesse, & avec le dessein de recueillir une suite d'observations particulières sur toutes les maladies. L'esprit philosophique dicta évidemment les vues & les conseils qu'il y ajoute sur l'érudition & le choix des livres ou des connaissances, blâmant leur trop grand nombre & leur étude, parce que, dit-il, plus nous entassons de connaissances, moins nos idées sont claires ou distinctes, moins on est propre à les appliquer aux choses usuelles & pratiques, l'esprit se trouvant embarrasé par une multitude de notions différentes.

On doit aussi à Lancisi un discours sur la manière de philosopher & de conduire la raison dans l'étude de la médecine (1).

En parcourant le catalogue nombreux de Haller, où ces différents ouvrages se trouvent cités, il est difficile de n'y pas remarquer encore les titres de quelques écrits du même genre, de Heister, Nenter, Samuel Carl, disciples de Stahl, de Stahl lui-même, &c....

Les petits traités de Heister ont pour objet l'erreur & le danger des hypothèses en médecine (2), que certains découvrent dans les sciences physiques ont fait naître (3).

On doit aussi au même auteur une bonne dissertation sur la réunion indispensable de la médecine & de la chirurgie (4).

On a formé à différentes époques des réunions de plusieurs de ces écrits, dont les auteurs ont eu pour objet de diriger les élèves dans leurs travaux.

La première de ces collections fut publiée en 1607, par Schenckius, dans l'intention d'éclairer l'autorité publique, qui s'occupoit alors de quelque réforme dans les études médicales. Cette collection a pour titre : *Enchiridion de formatibus studiis medicis & scholâ medicâ instituendâ*.

Les auteurs de la plupart des écrits contenus dans ce recueil, n'indiquent aucune amélioration importante dans les études. Ils prennent ordinairement pour texte ce passage du livre du médecin, attribué à Hippocrate, dans lequel il exige, pour l'étude & l'exercice de l'art de guérir, des dispositions naturelles, un esprit cultivé, des mœurs pures, de la jeunesse, beaucoup de temps, & l'amour du travail.

Développant les mêmes lieux communs, le

même fond d'idées, ces auteurs commentent d'abord le texte. Ils donnent ensuite quelques vues générales sur la manière de profiter des leçons ou des lectures, conseillant tous, pour chaque partie, un certain nombre d'écrits regardés comme classiques, tandis que quelques-uns surchargent cette liste sans mesure, & donnent plutôt un index bibliographique, que des préceptes sur le choix & la direction des lectures.

L'étoile de Haller s'est arrêtée sur cette collection de Schenckius, estimée aussi par Kestner, & qui contient principalement les traités de Jacob Sylvius, de Placotomus, d'Honoré Casell, de Wimpinius, &c. &c....

Un autre recueil du même genre a été publié par Schellhammer, en 1687, & ensuite par H. Maun, en 1726, avec une édition très-souignée de l'*Introduction générale & particulière à l'étude de la médecine*, par Conringius.

A l'époque où cette introduction parut, mais surtout lorsque le savant commentaire de Haller, sur le *Methodus studii medici* de Boerhaave fut publié, les sciences naturelles, mais principalement la botanique, la zoologie, l'anatomie, étoient cultivées avec une grande activité, & attiroient l'attention des médecins les plus célèbres de cette époque, qui contribuèrent tous & presque tous à leurs progrès.

Les ouvrages sur la manière d'étudier, qui furent publiés dans cette circonstance, annoncent évidemment cette disposition des esprits. La médecine n'y est point présentée comme un art, comme une science dont il importe plutôt de circonferire les limites que d'étendre les rapports avec les connaissances humaines.

Les auteurs de ces écrits, sans en excepter Haller, dont le *Methodus studii* ne répond point à son titre, & appartient plutôt à l'érudition médicale qu'à une direction élémentaire des études, surchargent leur plan d'instruction, & semblent demander au médecin une connaissance approfondie de toutes les branches de la physique particulière. « Se plaçant dans un point de vue illusoire & tout-à-fait contraire à l'objet qu'ils se proposent, ils font moins considérer la médecine, dit M. Braté, comme une science propre, qui peut avec succès emprunter de plusieurs autres, que comme un composé de ces autres sciences, qu'il faut que la médecine embrasse & approfondisse au-delà des forces réunies de plusieurs savans; manière de voir bien funeste, qui expose la médecine à n'avoir dans son sein que des anatomistes, des physiologistes, des chimistes, des botanistes, des mathématiciens, & très-peu de médecins. »

Quelques ouvrages du même genre, mais plus élémentaires, ont été publiés dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, & se bornent également à de simples indications bibliographiques. On doit distinguer parmi ces écrits, celui de

(1) *Del modo di filosofar nell' arte medica.*

(2) *De med. falsis & pernicios.*

(3) *De diffinitione veritatis juremendi in physice. & medicis.*

1707, p. 1710.

(4) *De chirurgiâ cum medicâ necessariâ conjungendâ, 1722.*

Blumenbach, ayant pour titre : *Introductio in historiam medicinarum literariam*. Götting., 1746.

Parmi les ouvrages de la même époque, dans lesquels on s'est occupé de l'origine, des progrès des connaissances & de l'application de la philosophie aux sciences en général, & à la médecine en particulier, nous devons plus particulièrement remarquer les vues générales, les savans préambules de Bacon, Fontenelle, Buffon, d'Alembert, &c., & quelques écrits ou moins remarquables sur les principes de l'observation & de l'expérience, & la réforme des études médicales.

Dans ce genre d'ouvrages qui appartiennent d'une manière directe à la philosophie médicale, nous devons placer au premier rang l'excellent *Traité de Zimmerman sur l'expérience*, la Préface de l'Académie de chirurgie, par Quesnay, son Mémoire sur la réunion de la médecine proprement dite & de la chirurgie, plusieurs passages de Bordeu, les éloges historiques de Vicq-d'Azyr, &c. &c.

Nous placerons sur la même ligne les observations de Clifton sur l'état des études en Angleterre, les vues, les projets de réforme par Lefrançois, l'Essai de Tissot, sur les moyens de perfectionner les études, & l'ouvrage plus étendu de Thiery, sur une nouvelle organisation de la médecine en France, & la réforme des abus qui s'étoient insensiblement introduits dans son enseignement & dans son exercice, depuis la fondation des universités.

Ces différens écrits, qui tous avoient plutôt pour objet de faire introduire des réformes devenues indispensables dans la médecine, que de diriger les premiers travaux des étudiants d'après une saine logique & des vues tirées de la connaissance pratique de l'esprit humain, préparèrent d'ailleurs un degré plus avancé de ces mêmes études; leur cinquième époque caractérisée par l'extension de l'enseignement académique, & par sa réunion aux institutions cliniques.

L'ouvrage le plus important qui ait jamais été publié sur la méthode & le système des connaissances médicales, dans le cours de cette dernière époque, nous est offert dans le plan de constitution, pour la médecine en France, proposé à l'Assemblée constituante par la Société royale.

C'est dans ces ouvrages que l'on présente pour la première fois la direction des études & le choix des lectures pour le médecin, comme le sujet d'un cours particulier, & d'après des vues qui ont ensuite été réalisées dans l'enseignement qui nous est confié.

Thouret & Cabanis rappellent & développent dans la suite ces vues de la Société royale, & ces deux hommes si regrettables proposèrent en conséquence des réflexions & des idées d'un grand intérêt, sur la nécessité de présenter aux élèves, dans la première partie de leurs études,

un art d'apprendre suffisamment étendu pour les diriger & les familiariser de bonne heure avec les parties les plus élevées & les plus importantes de la philosophie médicale.

La dissertation de l'un de ces écrivains, sur le degré ou plutôt sur le genre de certitude de la médecine, appartient éminemment à cette philosophie médicale, ainsi que les discours de M. Cailliot, de Strasbourg, sur les rapports de la médecine avec le développement des facultés intellectuelles & morales de l'homme, & les réflexions de M. Prunelle, de Montpellier, concernant l'influence de la médecine sur la renaissance des lettres. Nous placerons encore dans la même classe, plusieurs dissertations inaugurales des Ecoles de Paris, de Montpellier, mais principalement celle de M. Guyon sur l'analyse, &c., &c.; l'Essai de M. Rigolo sur les méthodes, d'après des vues, des idées, fournies en grande partie par M. le professeur Duméril; l'exposition historique des institutions cliniques, par M. Bruté; d'utiles réflexions de Bayle, sur la nosographie; travaux des disciples, qu'il seroit injuste de citer sans rappeler en même temps à la mémoire & à la reconnaissance quelques écrits du même genre, publiés par de savans professeurs, mais principalement par Fouquet (1), Barthes (2), Pinel (3), MM. Prunelle (4), Duméril (5), Royer-Collard (6), & l'auteur de ces réflexions (7).

MÉTHODE THÉRAPEUTIQUE, MÉTHODE DE TRAITEMENT, *ratio medendi*. On devroit désigner sous ce titre les différentes manières de traiter les diverses maladies, rapportées à un petit nombre de chefs ou de divisions, ou même le plan que l'on a suivi pendant un temps donné, dans la conduite médicale, ce qui répond au titre de *ratio medendi*, admis par Stoll, pour l'exposition de cette conduite, tracée par trimestre clinique.

Les différentes méthodes de traitement, considérées sous le point de vue le plus général, se rapportent naturellement à deux titres :

La médecine du symptôme, ou la médecine palliative.

La médecine de la maladie, ou la médecine curative.

-
- (1) *Discours sur la clinique*. Montpellier, 1803, in-4°.
 (2) *Discours sur le génie d'Hippocrate*, prononcé pour l'inauguration de son buste dans l'école de Montpellier, 1818, in-4°.
 (3) *Méthode d'étudier en médecine*, servant de transcript à la nosographie philosophique, 10-8°.
 (4) *Les influences exercées par la médecine sur la renaissance des lettres*. Montpellier, 1809, in-4°.
 — *Des vices du médecin, de leur connexion & de leur méthodologie*. Montpellier, 1816, in-8°.
 (5) Duméril; Séance publique de la Faculté de Paris, pour l'ouverture des cours. Paris, 1816, in-4°.
 (6) *Idem*. Paris, 1818, in-4°.
 (7) Voyez l'article MÉTHODES CLINIQUES, dans ce Dictionnaire.

La médecine du symptôme, ainsi que son nom l'indique, a pour objet d'arrêter ou de calmer quelques symptômes graves ou incommodes, sans rien changer aux phénomènes principaux & primitifs de la maladie : telles sont les différentes méthodes thérapeutiques que l'on oppose pendant une phibisie tuberculeuse, ou pendant une pneumonie ou une pleurésie latente ou chronique, à une toux opiniâtre, qui aggrave ces affections sans en faire essentiellement partie. Tels sont aussi les modes de médication que l'on oppose au ténisme dans la dysenterie, à la douleur dans les maladies cancéreuses, &c.... Quelles sont, de reste, les données principales auxquelles il faut s'attacher dans la médecine du symptôme ? dans quels cas cette médecine doit-elle être employée ? quelles sont ses indications générales & les contre-indications, ses avantages & ses inconvénients ? Ces questions seroient examinées à l'article SYMPTÔME (Médecine du), d'après un excellent Mémoire de M. Royer-Collard, & d'après nos réflexions & le résultat de notre expérience particulière sur cette partie importante de la thérapeutique.

Quant aux méthodes curatives ou aux différents modes de traitemens dirigés contre les phénomènes principaux des maladies, elles ont directement pour but d'arrêter ou de faire se terminer de la manière la plus heureuse, les maladies qui, abandonnées à elles-mêmes, auroient le plus souvent une terminaison fâcheuse.

Les saignées répétées, l'application des sangsues ou des ventouses scarifiées, le concours d'une abstinence absolue, l'obscurité, le silence, en un mot, la réunion de ce que nous avons appelé *sédations spoliatives*, sont les méthodes curatives de traitement d'une maladie aiguë, ou d'une péripneumonie, d'une hépatite, &c.... On peut regarder aussi comme une méthode curative, le traitement d'une fièvre pernicieuse par le quinquina, ou celui d'une maladie syphilitique, par l'emploi rationnel & méthodique du mercure.

En s'attachant à des notions abstraites, en considérant les choses comme elles devraient être, plutôt que comme elles sont ou comme elles ont été, l'école moderne de Montpellier (1), soit illustre chef, le savant Barthez, a rapporté à trois chefs principaux de division, les différentes méthodes de traitement ; savoir :

1°. Les méthodes naturelles.

2°. Les méthodes analytiques.

3°. Les méthodes empiriques.

« Ces dénominations, dit l'auteur, seroient insignifiantes, si elles se bornoient à désigner les méthodes de traitement qui opèrent la guérison

par les mouvemens de la nature ; celles qui embrassent & comparent les indications, présentent les élémens de chaque maladie, & celles qui emploient des remèdes dont les vertus sont connues par l'expérience : car il n'est pas de méthode de traitement qui ne réunisse ces trois caractères, & sous ce rapport on pourroit croire que toutes les méthodes de traitement sont pareillement naturelles, analytiques & empiriques.

« Mais cette distinction des trois classes générales, dans lesquelles je dis qu'il faut placer toutes les méthodes du traitement des maladies, devient une distinction réelle & utile, en tant qu'elle fait connoître que chacune de ces méthodes doit être rapportée directement à l'un des trois chefs ou objets essentiels que je vais indiquer.

« 1°. Les méthodes *naturelles* du traitement d'une maladie ont pour objet direct, de préparer, de faciliter & de fortifier les mouvemens spontanés de la nature, qui tendent à opérer la guérison de cette maladie. Ces méthodes sont généralement indiquées dans les maladies où la nature a une tendance manifeste à accélérer une marche réglée & salutaire.

« 2°. Les méthodes *analytiques* de traitement d'une maladie sont celles où, après l'avoir décomposée dans les affections essentielles dont elle est le produit, ou dans les maladies plus simples qui s'y compliquent, on attaque directement ces élémens de la maladie par des moyens proportionnés à leurs rapports de force & d'influence.

« Ces méthodes sont d'autant plus indiquées, qu'il existe une plus grande complication dans les élémens d'une maladie (1).

(1) Au sujet de la complication des élémens d'une maladie, Barthez remarque avec raison dans une note, & contre l'opinion de Hunter, que l'existence des maladies compliquées ne peut être mise en doute ; mais la coïncidence, l'association de deux maladies dans un même sujet, considérées comme des élémens morbides, qui présentent des indications séparées de traitement, sont des circonstances pathologiques assez rares ; le plus ordinairement même, dans ces circonstances, l'état morbifique qui détermine la complication, doit être plutôt regardé comme une complication, comme un tempérament morbide, que comme une véritable maladie ; telles sont, par exemple, les dispositions gonorrhéiques, scrophuleuses, syphilitiques, dans un certain nombre de sujets qui se trouvent affectés tout-à-coup de syphilis, ou même d'une maladie aiguë plus ou moins grave. On ne traite pas dans ces cas les deux maladies, mais on modifie le traitement de celle qui présente le plus d'urgence, d'après les notions acquises sur la complication morbide individuelle, & d'après des vues semblables à celles qui seroient prises en considération le tempérament sanguin, ou le tempérament lymphatique, dans la curation des mêmes maladies.

Si des réflexions aussi simples & qui ne demandent qu'un sens droit, s'étoient présentées, soit à Barthez, soit à Damas ou à leurs disciples, ils se seroient épargné beaucoup d'efforts, & un emploi véritablement distingué de réflexions & de méditations dans leur doctrine des maladies chroniques.

« Dans

(1) Voyez la préface de la dissertation ayant pour titre : *Nova doctrina de functionibus nervi humani*, 1774. Consultez aussi la préface du *Traité des maladies gonorrhéiques*, tom. I, pag. 8 & suivantes.

« Dans la méthode analytique qui est propre à chaque complication, il faut faire dominer le traitement qui convient à chacune des affections ou maladies composantes, à proportion de ce qu'elle a plus d'importance respective. Cette importance doit être estimée suivant qu'elle est plus urgente, ou d'un danger plus pressant, & suivant son influence sur les autres affections ou maladies combinées.

« Dans les méthodes empiriques du traitement d'une maladie, on s'attache directement à en changer la forme entière, par des remèdes qu'indique le raisonnement, fondé sur l'expérience de leur utilité dans des cas analogues.

« Ces méthodes conviennent surtout aux maladies dans lesquelles ou à lieu de craindre que les mouvements (spontanés de la nature, ne soient impuissans pour opérer la guérison, & dans celles qu'on ne peut décomposer en des élémens bien déterminés, dont on puisse être sûr de remplir les indications.

« Il est absolument nécessaire d'y avoir recours, dans ces maladies que la nature seule ne guérit point, comme sont la fièvre intermittente maligne, & la maladie vénérienne portée à un haut degré.

« L'auteur de ces divisions abstraites, que la force de son esprit pouvoit sans doute appliquer aux détails pratiques avec une facilité, une promptitude de discernement, & de conception que l'on ne doit pas exiger dans le plus grand nombre des médecins, a très-bien senti que les méthodes empiriques offroient de grandes différences entr'elles, & les a rapportées en conséquence à trois chefs de division; savoir :

1°. Les méthodes empiriques perturbatrices.

2°. Les méthodes empiriques imitatives.

3°. Les méthodes empiriques spécifiques.

« Dans les méthodes perturbatrices, suivant Barthez, on tend à substituer aux affections constitutives d'une maladie, d'autres affections fortes, qu'on espère qui peuvent les dissiper; tels que les modes de traitement que l'on a employés quelquefois dans les maladies syphilitiques, ou la crénation de certaines fièvres intermittentes d'automne, en provoquant, avant l'accès, des sueurs ou des déjections : mode de médication dont Sydenham & Boerhaave ont présenté des exemples.

Dans les méthodes empiriques imitatives, on se propose de provoquer des phénomènes, des nouveautés analogues à ceux que l'on a vu se produire spontanément & avec avantage, dans des maladies semblables.

Les méthodes empiriques spécifiques consistent, suivant le même auteur, dans l'emploi de procédés & de médicamens dont l'effet est constant, mais inconnu dans ses circonstances physiologiques, & caractérisé par une disposition antinomique ou antidotique, qui ne se rattache, dans l'état présent des connoissances, à aucune loi de l'organisation.

MÉDECINE. Tome X.

Cette division des méthodes thérapeutiques, qui a excité une espèce d'enthousiasme parmi les principaux disciples de Barthez, & que quelques-uns ont même regardée comme la base de la médecine pratique (1); cette classification permettoit sans doute à nos têtes forte & dogmatique de réunir, sous un petit nombre de chefs, plusieurs notions éparses de médecine pratique & de pathologie théorique, à une époque où les données physiologiques & une manière de philosopher moins scholastique, n'avoient pas encore associé les esprits à des comparaisons & à des rapprochemens plus naturels & plus faciles. Il étoit d'ailleurs de notre devoir de la faire connoître, au moins sous un point de vue historique, en plaçant à la suite de son exposition, les doutes, les réflexions qu'elle nous a fait naître, & les divisions qui nous paroissent plus claires & plus rapprochées des habitudes de la pratique, que ces formules abstraites & subtiles de classification.

Les méthodes naturelles nous offrent d'abord, dans leur nomenclature, une impropriété de sens & de termes qui doit frapper tous les bons esprits. En effet, toutes les méthodes ne sont-elles pas naturelles, & peut-on sérieusement en qualifier ainsi quelques-unes, en supposant qu'elles ont essentiellement pour but d'agir en concurrence avec la nature *personnifiée*, & à laquelle on suppose des *mouvements spontanés*, des *opérations*, &c. ?

Ces prétendues méthodes naturelles de traitement ne sont rien autre chose que ce que les praticiens entendent d'une manière moins savante & moins pédantesque, sous le titre de *médecine expectante*, & d'après les idées que Voltaire a justement attachées à cette dénomination, dans son Mémoire couronné par la Société royale de médecine (2). Toute autre manière de se concevoir ne s'accorde point avec l'état présent des connoissances, à une grande distance duquel le passage suivant de M. Lordat se trouve véritablement placé.

« Les méthodes naturelles sont celles qui ont pour objet de favoriser, d'accélérer ou de régulariser la marche des maladies qui tendent spontanément à une solution heureuse. Leur nom fait allusion au but qu'on s'y propose, de seconder la nature & de rendre les opérations plus sûres, soit en les retardant, soit en les hâtant, soit en changeant la proportion des actes élémentaires dont elles se com-

(1) Cette doctrine (celle des méthodes thérapeutiques), cette doctrine, dit M. Lordat, qui est un des grands services rendus à la médecine dans les temps modernes, & l'un des plus beaux fleurons de la couronne de Barthez, commence à être assez généralement connue pour qu'il suffise ici d'en rappeler les idées principales. (Exposition de la doctrine de Barthez, pag. 293.)

(2) Voyez, pour le précis de ce Mémoire, le mot *Expectativa* (médecine), par Vicq-d'Azyr, & les réflexions de M. Pinel dans la Médecine clinique.

posent. Elles sont préférées par les praticiens prudents, dans tous les cas où la tendance à une terminaison naturelle n'offre pas des inconvénients graves, lorsqu'il est évident que d'autres méthodes donneraient l'espérance de plus de succès dans la cure; parce qu'il est rare que ces dernières inspirent la même sécurité; & ne soient pas plus pénibles pour les malades: ils ne se faisoient pas aller, par exemple, au plaisir d'égorger une *fièvre synoque* dès son premier début, au moyen d'une saignée perturbatrice, malgré les succès que Galien obtint de cette méthode, parce que cette maladie, contenue dans certaines bornes, n'a pas plus de chances d'favorables que l'affaiblissement introduit par le remède. Ils ne déploient pas de grands moyens pour s'opposer à la suppuration, des phtisiques, qui n'intéressent point les organes essentiels; ils tâchent seulement, quand la nature est impuissante, ou quand elle agit avec trop d'impétuosité, de maintenir la maladie dans un degré modéré qui prévienne les dégénéralions dont elle est susceptible; mais les méthodes naturelles sont de rigueur, lorsque la maladie peut être considérée comme une fonction destinée à combattre une cause morbifique qu'il n'est pas en notre pouvoir de détruire, à moins que cette fonction, par son anomalie, ne risque de devenir nuisible pour les forces.

L'idée des méthodes analytiques se rattache plus particulièrement aux notions qui servent de base à la doctrine pathologique de Barthez, & doit par cela même exciter beaucoup plus d'attention. L'auteur, d'après le plus savant de ses biographes, ne se contente pas de distinguer, comme l'ont prescrit Galien, Fernel, Holsmann, tous les *institutes*, & presque tous les praticiens anciens & modernes, les maladies complètes qui peuvent se trouver réunies en plus ou moins grand nombre dans tel exemple, qui fait le sujet d'un problème clinique; il va plus loin.

D'abord il ne veut pas que le médecin enfonde la simple coïncidence de deux maladies qui marchent concurremment, sans exercer l'une sur l'autre une influence réciproque, avec la réunion intime & la presque confusion, qui fait que l'une de ces maladies a une correspondance constante d'accroissement, d'état de déclin, avec l'autre, & que tous les phénomènes des deux sont en rapport comme s'ils appartenaient à une seule. Il ne faut pas glisser légèrement sur ces deux cas de co-existence; la seconde seule mérite le nom de complication. La présence simultanée du scorbute & de la syphilis constitutionnelle dans le même individu, fournit souvent l'occasion de constater cette différence: tantôt ces deux maladies restent indépendantes l'une de l'autre, ont leurs symptômes bien distincts, suivent chacune leur marche, cèdent séparément aux traitements respectifs qu'on leur oppose,

à moins que les variations de l'une influent sur l'autre; tantôt elles s'unissent pour marcher ensemble, au point qu'il n'est plus possible de les guérir isolément, & que chacune retient au rappelle l'autre quand on l'attaque seule. La complication proprement dite est d'autant plus digne d'attention, qu'elle embarrasse singulièrement la marche des maladies connues, comme les fièvres périodiques doubles, triples, en offrent la preuve journalière.

Pour donner un exemple de la décomposition d'une maladie dans la plupart des catarrhes, & particulièrement dans ceux qui reviennent périodiquement, Barthez trouve:

- 1°. Surabondance d'humeurs séreuses.
- 2°. Mouvement fluxionnaire qui les porte spécialement sur les membranes muqueuses du nez ou des poumons.
- 3°. Modification de l'action vitale de ces membranes, qui les met en harmonie avec les autres actes élémentaires & les fait concourir au même but (c'est-à-dire, à l'exercice des fonctions redoublées), mais qui peut dégénérer en une irritation excessive ou en atonie.

Cette décomposition est l'idée pour laquelle on met le plus de répugnance, ceux qui se représentent tous les symptômes d'une maladie comme les effets nécessaires d'un dérangement de la constitution du corps, ou bien de l'excitation ou de l'affaiblissement d'une faculté vitale, comme de l'irritabilité, de la sensibilité, de l'excitabilité; en un mot, comme les résultats co-existants indispensables d'une cause unique. Mais ce préjugé ne tient pas contre l'examen comparatif de l'universalité des faits.

Nous ne soumettrons pas tout ce passage à une critique détaillée; mais pour le faire apprécier à nos lecteurs, pour former leur opinion sur les idées de l'auteur concernant la pathologie en général & les méthodes thérapeutiques en particulier, il nous suffira de remarquer que Barthez & M. Lardet, préençipés par leur idée de puissance vitale, produisant des actes qui s'enchaînent par les liens de la synergie, perdent de vue le changement, l'altération des organes & de leurs fonctions, l'observation & l'analyse de laquelle il faut nécessairement s'attacher pour se faire des notions exactes d'une maladie.

Quant à la surabondance d'humeur séreuse & au mouvement fluxionnaire, &c., on ne peut entendre un disciple de Senart, de Schneider, ou du moins un physiologiste qui, dominé par d'anciennes habitudes d'élprit, publie que la surabondance d'humeur séreuse n'est point une cause, mais un effet, & que elle dépend toujours d'une activité augmentée dans les organes qui sécrètent cette humeur, & que cette activité morbide, cette irritation sécrétaire, forment la cause principale de la maladie.

Du reste, les méthodes analytiques, on ad-

mettant cette dénomination, devraient avoir essentiellement pour but de soumettre un mode de traitement quelconque à l'investigation attentive, à l'étude véritablement analytique de l'organisation, dans un état quelconque de maladie, afin de distinguer les phénomènes purement sympathiques ou symptomatiques, des phénomènes essentiels ou primitifs, & qui seuls peuvent fournir les indications d'une médication curative, comme il est facile de le voir dans plusieurs phlegmasies de cerveau, des rois, de l'intestin, qui occasionnent de la toux, des palpitations, des nausées, des vomissements, avant qu'on ait pu apercevoir d'une manière directe le genre de trouble ou de lésion qui leur est propre.

Les méthodes empiriques absolues, rentrent toutes dans la sous-division que Barthez désigne sous le titre de *méthodes empiriques spécifiques*. La curation directe, évidente de la maladie, par un changement de l'organisation qui n'avoit pu le prévoir, & qui demeurait inexpliqué, même dans l'état présent des connaissances, est le seul & unique phénomène que l'on provoque dans l'emploi de ces méthodes, dont plusieurs le sont conférées par des traditions populaires, & sont encore parties aujourd'hui d'un fonds de connaissances ou de notions que l'on retrouve chez les peuplades sauvages & dans les dernières classes de la société.

Les méthodes de traitement, moins éloignées des idées physiologiques & de la manière de voir de la plupart des médecins, peuvent être rapportées à un petit nombre de divisions beaucoup plus simples & plus rapprochées de la pratique médicale :

Ces méthodes peuvent être rapportées à deux modes principaux de médecine ou de médications ; savoir :

- 1^o. La médecine expectante. (Voyez ce mot.)
- 2^o. La médecine agissante.

La médecine agissante le partage à son tour en deux classes de méthodes thérapeutiques, que nous avons déjà indiquées ; savoir :

- 1^o. La médecine de symptôme ou la médecine palliative.
- 2^o. La médecine de la maladie, ou la médecine curative.

Les méthodes que comprend cette dernière classe, & qui méritent plus particulièrement le nom de *thérapeutique*, peuvent être rangées sans effort sous deux principaux titres :

- 1^o. Les méthodes scientifiques ou dogmatiques.
- 2^o. Les méthodes empiriques.

1^o. MÉTHODES SCIENTIFIQUES OU DOGMATIQUES.

Toutes les maladies, ou du moins presque toutes les maladies que nous connaissons, se rapportent à une très-longue & très-ancienneté d'expérience de l'humanité ; elles ont été observées, reconnues,

traitées long-temps avant l'époque, où la connaissance de l'organisation étoit assez avancée pour faire découvrir *a priori*, & par une induction transcendante ou scientifique, les moyens les plus propres à les combattre. Ainsi donc, quoique la plupart des méthodes de traitement aujourd'hui en usage ne soient pas purement empiriques, & que l'on puisse même en expliquer quelques-unes par une application judicieuse de certaines données physiologiques, les méthodes dogmatiques sont nécessairement en très-petit nombre, surtout si on n'accorde ce nom qu'à celles que l'on a trouvées *a priori*, & en le faisant une idée exacte de l'alération vitale & du changement organique qui en réclame l'usage.

Nous citerons pour exemple de ces méthodes, le traitement général de plusieurs phlegmasies latentes & chroniques, long-temps confondues avec des fièvres essentielles ; le traitement particulier de plusieurs irritations cérébrales, par la combinaison de l'application de la glace sur la tête ; avec les dérivatifs les plus énergiques ; le traitement également particulier de l'apoplexie, du cramp, de la gravelle, d'après des inductions physiologiques & anatomiques ; l'emploi de l'extrait de noix vomique dans certaines paralysies, celui de l'acide prulique dans la plupart des toux sympathiques & convulsives, &c. &c.

2^o. MÉTHODES EMPIRIQUES.

Les méthodes empiriques sont le fondement de du moins la partie la plus étendue de la pratique médicale ; nous les réunirons sous deux chefs, savoir :

1^o. Les méthodes empiriques rationnelles ou philosophiques.

2^o. Les méthodes empiriques absolues ou populaires, que nous devons à la tradition, & que les médecins éclairés emploient sans doute avec plus de discernement que les charlatans ou les médicastres, mais sans être plus instruits sur le mode d'action des moyens que l'on met en usage dans ces méthodes.

Si l'on vouloit traiter des méthodes thérapeutiques avec plus de détail ; & dans le dessein d'y rattacher des vues de pratique médicale & des notions suffisamment étendues de thérapeutique, il faudroit reprendre sous ce point de vue les différentes espèces de médications que nous avons établies, en faisant abstraction de l'effet indirect ou curatif des médicaments, & dont chacune, si on l'envisage sous ce dernier rapport, peut être regardée comme une méthode thérapeutique qui présente ses indications particulières, & dont l'application exige souvent le concours de plusieurs circonstances, dont il importe de faire concevoir l'influence & la combinaison.

En s'attachant à ces idées de détail ou de pratique, on passeroit successivement au revue les

lédations spoliatives, mais principalement l'usage des saignées locales ou générales, les excitations phlegmatiques internes ou externes, les excitations non sécrétoires et purement toniques, les excitations sécrétoires en général, les médications vomitives & purgatives en particulier; enfin, les excitations antidiétiques ou révulsives, soit spécifiques ou déterminées, qui répondoient en grande partie à l'emploi des médicaments qui font l'objet des méthodes perturbatrices & spécifiques de Barthez. (Voyez, dans le volume précédent, notre article MÉNSTRUATIONS, p. 575.) (J. L. M.)

MÉTHODIQUES (Secte, Ecole des).

Le nom de *médecin méthodique* ne rappelle guère aux esprits superficiels & presque étrangers à la marche que l'esprit humain a suivie dans les sciences médicales, que l'idée du raffinement & du relâchement, *strictum & laxum*, considérés comme deux manières d'être générales du corps humain, auxquelles on pourroit rapporter en dernière analyse, les diverses manières d'être malade & les différentes méthodes thérapeutiques.

Cependant cette hypothèse constitue bien moins le dogmatisme des méthodistes, si on le considère avec un peu plus d'attention, que la manière de philosopher des médecins de cette secte. Ce qui les caractérise, c'est la force d'esprit avec laquelle ils sentent le besoin de rejeter dans les théories médicales, les puissances surnaturelles, les forces occultes des péripatéticiens, les causes finales, les causes éloignées, sans doute pour le rapprocher davantage de la pratique, pour tenir un juste milieu entre les empiriques & les dogmatistes, & pour s'attacher aux causes directes & prochaines qu'ils auroient dû seulement considérer d'une manière moins générale.

Du reste, en désignant la secte de ces médecins, sous le nom de *methodistes*, on fit beaucoup moins attention à leurs dogmes qu'à leur pratique, au mode de traitement, au régime qu'ils suivoient jour par jour dans les maladies, avec une constance & une rigueur qui leur étoient propres; d'où ce nom de *methodistes* qui leur fut donné (1).

Calius d'Aurélius est le seul médecin méthodique dont les ouvrages soient arrivés jusqu'à nous dans toute leur intégrité, & d'après lesquels nous puissions connaître d'une manière positive la théorie & la pratique de cette secte médicale.

Themison & Theasale sont regardés généralement comme ses fondateurs; mais on peut en découvrir le point de départ & l'origine dans la première application de la philosophie corporelle à la médecine, dans l'idée vraiment philosophique de négliger, dans les maladies, les causes occultes,

pour s'attacher aux causes prochaines, aux changements physiques & matériels des maladies; idée que l'on fait remonter à Asclépiade, dont les opinions étoient elles-mêmes formées d'après le système d'Epicure: comme s'il avoit été dans la destinée de l'esprit humain, que chaque système dominant de philosophie eût dû subjuguer & détourner la médecine de son véritable but, aux différentes époques de son histoire?

Déjà & long-temps avant Epicure, l'école éléatique avoit cru expliquer le monde par des atomes invisibles, dont la rencontre & le mélange faisoient naître tous les corps de la nature, secondés dans la suite d'ailleurs dans leurs mouvements par des génies, des esprits, une chaleur intégrante.

Epicure s'attacha exclusivement à la rencontre fortuite, au mélange spontané des atomes, sans admettre l'idée des causes finales; ce qui le porta à négliger la dialectique, pour donner toute son attention aux causes véritablement agissantes & aux résultats de son expérience. Tout parut le concevoir & s'expliquer suivant Asclépiade dans la structure & les fonctions du corps humain, dans l'état de santé & de maladie, par le mouvement régulier & le mouvement irrégulier de ces atomes, n'admettant ni force primitive dans l'organisation, ni opérations salutaires de la nature, ni sympathie entre les organes (1).

Du reste, Asclépiade n'admettoit comme une âme, que le souffle & le pneuma, ou les atomes les plus déliés, les plus subtils, dont il supposoit la source, soit dans les aliments, soit dans l'air atmosphérique.

La digestion, les sécrétions, la sensibilité, lui paroissoient également s'expliquer par la même hypothèse, dont les applications lui étoient d'autant plus faciles qu'il n'étoit point embarrassé dans leur usage par des notions exactes d'anatomie & de physiologie, que Galien lui reproche d'avoir négligées (a).

Suivant la déduction tirée du même principe, toutes les maladies devoient se produire par le changement des rapports qui existent naturellement entre les atomes & leurs pores ou viscères, ce qui conduisit à jeter les bases du solidisme, & à ne regarder l'altération des humeurs que comme la cause occasionnelle & éloignée des maladies, n'admettant dans les mêmes vues ni les mouvements, ni les jours critiques, ni les mouvements salutaires de la nature.

Il paroîtroit, d'après le témoignage de Calius

(1) Voyez Galien; *passim* Calius Aurelianus, l. c., pag. 42, mais surtout Sprengel, traduction française, tom. II, pag. 9.

(2) Asclépiade & son école méconnoissoient la véritable différence qui existe entre les artères & les veines. Il croyoit, ainsi que la plupart des médecins de l'antiquité, que l'air pénétre du poulmon dans le cœur, & confondoit les artères avec les ligaments.

(3) Cette méthode uniforme & rigoureuse de régime & de traitement forme ce que l'on a appelé dans l'histoire de la médecine, le *cyclo analogique des Grecs*, *κύκλος αναλογιστικός*; *circularis analogicus* des Latins.

Aurelianus, qu'Afclepiade étoit le premier diftingué les maladies aiguës des maladies chroniques, & l'hydropifie aiguë ou fébrile en particulier, de l'hydropifie chronique ou apyrexique (1).

Du refte, fuivant les auteurs anciens qui nous ont fait connoître Afclepiade, ce médecin auroit fait quelques obfervations importantes fur les fièvres doubles-tièrces de Rome, fur la laxation spontanée du fécum (2), fur des méthodes de traitement plus douces & plus rationnelles, fur un emploi plus reftraint, plus modéré des vomitifs & des purgatifs, enfin fur l'ufage affez fréquent de la faignée, modifiée d'ailleurs d'après la connoiffance du tempérament & du climat (3).

Les différens moyens, les divers procédés de l'hygiène, mais principalement les douches, qu'il paroît avoir employées le premier, les bains froids, différens exercices, & même la déclamaion, le chant, la mufique, &c., faifoient partie de la médecine d'Afclepiade.

Afclepiade compta plusieurs hommes célèbres parmi fes partifans & fes difciples, entr'autres Nicom d'Agrigente, dont Cæfien a cité le livre fur la polyphagie Artorius, ami & médecin d'Augufte, qui mourut dans un naufrage, peu de temps après la bataille d'Actium (4).

Les médecins qui fuivirent cette carrière ouverte par Afclepiade & par fes difciples, & que l'on a plus particulièrement déignés fous le nom de *médicins de l'école méthodique*, font principalement Themifon de Laodicée, Theffale de Tralles, regardés comme les fondateurs de cette feéte; leurs nombreux difciples (5) Soranus d'Ephèfe, qui fe livra à l'anatomie; Mofchion, jufte ment célèbre par fes recherches fur les maladies des femmes & l'éducation phyfique, & Cælius Aurelianus, que fes ouvrages, malgré l'imperfection & la négligence du ftyl, ont placé au premier rang parmi les médecins les plus célèbres de l'antiquité. Tels font les principaux médecins que l'on comprend fous le nom collectif ou générique de *médicins de la feéte méthodique*. Galien, qui fousvent a parlé fans impartialité, leur reproche très-injuftement d'avoir négligé l'anatomie, plusieurs d'entr'eux

s'étant occupés avec diftinction de fon étude & de fes progrès (1). Toutefois les méthodifles, qui s'attachoient principalement à découvrir des indications générales, ne donnoient pas autant d'importance que les dogmatifles, à l'étude détaillée de l'organisation. Suivant leur doctrine, on devoit regarder la fanté comme l'état naturel ou habituel des organes; & la maladie, comme le trouble ou le dérordre des fonctions.

L'étiologie ou la connoiffance des caufes, paroiffoit fuperflue dans les opinions de cette feéte. Les caufes occasionnelles, telles que l'impreffion fubite du froid, & même les poifons, fuivant la même théorie, ne fournisfoient les indications principales du traitement, que dans la circonftance où leur effet prolongé exigerait leur expulfion; comme dans le cas d'un corps étranger ou de certaines fubftances vénéneufes; autrement la caufe prochaine, c'eft-à-dire, le mode d'al téracion ou de changement d'où réfulte la maladie, & qui ne cefle que lorsque la fanté eft rétablie, doit feule occuper le médecin & fervir de bafe à une méthode rationnelle de régime & de traitement. Nous venons de voir qu'Afclepiade avoit effayé de déterminer *comment*, ces caufes prochaines des maladies, d'après le fyftème d'Héraclide & d'Epicure, & par des changemens dans les rapports des atomes avec leurs vaneoles, & des obftacles à la circulation.

Themifon, voulant donner plus de précision à cette théorie, & s'attacher à des difpofitions plus faciles à reconnoître, crut pouvoir rapporter en dernière analyfe les nombreuses altérations dont le corps de l'homme eft fufceptible, à deux modes principaux de lésions : un excès de force ou de tenfion, & un défaut d'énergie, le *strictum* & le *laxum*, dont li fousvent on a parlé fans avoir approfondi l'efprit & les intentions de la feéte, qui en avoit fait un des principes de fa doctrine.

Theffale, en adoptant ces idées du *strictum* & du *laxum*, revint d'une manière marquée aux opinions d'Afclepiade, & chercha, au défaut du *refserment* ou du *relâchement*, une indication qui avoit pour objet de rétablir le rapport naturel des pores & des atomes, ce qui fut déigné fous le nom de *métapyricrife*, qui répond à la *métapyropoïfe* de Galien & à la récorporation (*recorporatio*) de Cælius Aurelianus. Du refte les méthodifles, en donnant ainfi une généralité fans limite à leurs notions des grandes analogies & des caufes prochaines de la maladie, attachoient peu d'importance aux affections locales, & méconnoiffoient l'effet particulier de la plupart des médicaments.

Quelques-uns croyoient principalement apercevoir dans la fuppreffion ou la diminution des évacuations, des fignes du *strictum*, & dans leur augmentation, dans leur abondance, des fignes

(1) Cælius Aurelianus, *Chron.* lib. III, c. 8, § 14.

(2) Nicetas, *Scriptores chirurgici*, page 154.

(3) Afclepiade, dans l'angine violente, faignoit des deux bras.

(4) On lui attribue du livre fur l'hydropifie, & on ajoute fur la longévité.

(5) On cite parmi les difciples de Themifon, Antonius Musa, affaifné & médecin d'Augufte, un certain Euodius & Vedius Valens, &c., l'un par fes intrigues amoureufes avec une belle-fille de Tibère, & l'autre par un commerce du même genre avec la fameufe Méfaline, Charron de Marfelles, qui, à l'exemple d'Antonius Musa, fit un grand ufage des bains froids dans fa pratique; enfin, Mergès de Sidon, qui s'occupoit plus particulièrement de la chirurgie.

Les principaux élèves de Theffale font : Apollonia de Chypre, Philomachus, à qui l'on doit de bonnes obfervations cliniques.

(1) Principalement Soranus, Mofchion, Cælius Aurelianus, &c.

du *larum*; l'augmentation ou la diminution de volume des parties avoient la même signification pour quelques autres; mais on ne peut guère douter d'ailleurs que le détail de la pratique, qui ne leur étoit pas étranger, ne leur ait fait reconnaître des rapports plus variés, plus étendus, entre les dispositions générales ou intérieures des parties, le *strictum* ou le *larum*, & la physiologie des maladies ou les symptômes, les phénomènes extérieurs des maladies.

Ajoutons que lorsque les indications générales manquoient aux méthodistes, ils s'attachoient alors aux indications chirurgicales, qu'ils rapportoient à des corps étrangers ou hostiles, ou à des changements morbides dans le volume & la situation des parties. Les médecins de la même secte s'occupèrent séparément des maladies mentales, que l'un d'eux a beaucoup mieux connues que tous les médecins qui l'avoient précédé (1); ils donnèrent beaucoup d'importance au rapport sympathique des différens organes, & en firent souvent d'heureuses applications à l'étude & au traitement des maladies. Ce traitement, ainsi que nous l'avons déjà énoncé d'une manière générale, consistoit dans certains médicaments, & dans un régime dont l'usage étoit déterminé rigoureusement par le jour ou les périodes des maladies, & surtout des maladies aiguës. Ainsi, dans le premier période de l'une de ces maladies, on suspendoit l'usage des alimens, ou du moins on ne permettoit que des alimens très-légers.

Dans la période suivant (*l'aignement*, l'état de la maladie), on s'attachoit d'une manière plus particulière aux indications tirées du *strictum* ou du *larum*; plus tard, on employoit les calmans ou quelques légers toniques, & plus tard encore, c'est-à-dire, dans le *décès*, on rendoit les alimens aux malades.

Les médecins de la secte méthodique perfectionnèrent évidemment la doctrine des indications (2); ils employèrent utilement les saignées, les narcotiques, & plusieurs préparations toniques & stimulantes. On poura du reste se faire une idée beaucoup plus exacte de leur méthode thérapeutique, en lisant dans Celsus Aurelianus la description & le traitement de quelques maladies particulières, aiguës ou chroniques, telles que la péripneumonie & l'hydrotique, que Sprengel a judicieusement choisies pour exemple. (*Voyez* Sprengel, traduction française, tome II, pages 44 & 45.) (MORAU DE LA SARTHE.)

MÉTHODISME, MÉTHODISTES. On a donné ce nom, en Angleterre, à une secte religieuse ca-

raïtéifiée par l'exagération avec laquelle elle s'attache à la févérité déjà outrée de la religion anglicane & aux pratiques les plus minutieuses du culte. Cette secte a fait plus particulièrement des progrès dans la dernière classe de la société, & ce n'est pas sans raison que quelques philosophes, quelques médecins, l'ont accusée d'avoir contribué plus qu'aucune autre cause, à l'augmentation du nombre des aliénés en Angleterre, depuis un demi-siècle. (*Voyez*, dans ce Dictionnaire, l'article MÉNÉGE MORALE, page 416 & suivantes.) (J. L. M.)

NETIERS (Insalubrité des). (*Hygiène publique*.) Les magistrats chargés de la couvverture de la santé publique doivent compter au nombre de leurs plus importants devoirs, les soins relatifs à la rarefaction de l'atmosphère, à la salubrité des villes & des campagnes; ils doivent prendre toutes les mesures pour que les citoyens ne se nuisent pas mutuellement dans l'exercice de leurs droits respectifs. Je parcourrai rapidement cette matière intéressante, mais je ne ferai qu'indiquer les précautions convenables, renvoyant aux ouvrages *ex-professo* qu'il est toujours nécessaire & utile de consulter : tels sont les excellents articles d'hygiène renfermés dans ce Dictionnaire, & dont on doit le travail au savant professeur Hallé; tel est le bon *Traité de police médicale* du docteur Frank, dont il seroit si avantageux d'avoir une traduction française; tel est l'intéressant *Traité de médecine légale* du docteur Fodéré. J'emprunterai de ces derniers savans jusqu'à leurs expressions : les rédacteurs d'un ouvrage encyclopédique devant, à mon avis, s'occuper moins de fournir de leur propre fonds, que de présenter aux lecteurs le résumé ou l'analyse raisonnée de ce qui a été le mieux écrit & le plus profondément pensé, sur les diverses parties de la science dont ils sont chargés de tracer le tableau.

L'homme, en s'écartant de l'état de nature, a-t-il gagné ou changé ? C'est une question difficile à résoudre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a acheté les bienfaits de la civilisation au prix de sa santé & de son repos. Les arts qui sont le charme de la vie, on abrégé la durée; les métiers devenus nécessaires à l'homme pour son logement, son vêtement, la préparation de ses alimens, pour tous ses besoins & toutes ses jouissances, ne s'exercent qu'au détriment de la santé des individus consacrés à de pénibles travaux; & souvent même nuisent à ceux dans le voisinage desquels ces travaux se préparent, s'achèvent & se perfectionnent. C'est dans ce dernier cas que les lois de police médicale doivent déterminer les lieux destinés à l'exercice de certaines professions, en éloignant des villes, des hameaux, des habitations réunies, toutes celles qui peuvent devenir nuisibles à la santé publique. C'est le plus souvent par la viciation de l'air atmosphérique, ou par son imprégnation de substances délétères,

(1) Celsus Aurelianus. (*Voyez* dans le volume précédent notre article MÉNÉGE MORALE, pag. 393 et suiv.)

(2) Ils avoient dénommé la méthode, la science des indications générales qui tombent sous les sens, celle qui a pour objet de guérir les maladies.

que les métiers deviennent préjudiciables à la santé des citoyens qui habitent le voisinage des ateliers, des usines, des manufactures; c'est par la nature non respirable de certaines substances gazeuses, ou par les qualités malfaisantes de certaines émanations, que se produisent la plupart des accidents.

Examinons donc ce qui se passe dans l'exercice des métiers, dans lesquels on prépare ou travaille les diverses substances fournies par les deux règnes organique & inorganique. Parcourons les usines défilantes à la fonte des métaux, les laboratoires où s'opèrent en grand les décompositions & les recompositions chimiques; les ateliers des manufactures & des arts, les fabriques de verre, de poteries, de soufre, des acides & des sels, des savons, du tabac, les raffineries de sucre; portons-nous vers les marais, les lacs, les amas d'eaux stagnantes, les marcs où pourrissent les fumiers, où rouillent les chanvres, où se macèrent les substances végétales ou animales; recherchons les causes d'insalubrité des métiers où l'on prépare les matières diverses, les fabriques de chandelles, d'amidon, les boucheries, les tanneries; les mégisseries; reconnaissons l'influence pernicieuse du voisinage des cimetières, des voiries, des amoncellements de fumiers dans les campagnes & des boies dans les villes; réunissons enfin, dans le cadre le plus serré, tous les cas où l'intervention des lois & les réglemens de police médicale se trouvent nécessaires. Je n'ai point à parler ici du danger de l'exercice des arts & des métiers en ce qui concerne les artistes & les ouvriers eux-mêmes. Le médecin Ramazzini a traité cette matière avec autant d'intérêt que d'exactitude & de vérité. Fontenroy a traduit, dans sa jeunesse, cet ouvrage, & y a ajouté d'excellentes notes. Il eût été à désirer que les occupations de ce professeur célèbre lui eussent permis de donner une nouvelle édition de son travail; il l'aurait sans doute enrichi des brillantes découvertes de la chimie & de la physique modernes. Un ouvrage de cette nature, pour être bien traité, demande un auteur également versé dans toutes les parties des sciences naturelles.

Mines & travaux du métallurgiste. Les mines où s'exécutent les travaux du métallurgiste, & particulièrement les fontes de métaux, peuvent être préjudiciables à la santé de ceux qui occupent les habitations voisines, soit par la trop grande quantité de gaz acide carbonique qui se mêle à l'atmosphère, en raison de la consommation plus ou moins considérable du charbon, soit par la volatilisation des matières métalliques qui y sont traitées. Il est donc important d'isoler les usines où les métaux se traitent en grand par le fen, & particulièrement les laboratoires où se préparent les sels mercuriels, le muriate mercuriel doux, le muriate farouge de mercure, la calcination du cobalt pour l'évaporation de l'arsenic, &c. &c.

Soufre acide sulfureux. Les procédés néces-

saires à l'extraction du soufre, des pyrites qui la contiennent, la sublimation du soufre, la fabrication de l'acide sulfureux, celle des sulfates de fer, de cuivre & de zinc, la composition de différens sels par l'intermède des sulfates métalliques, tels sont les travaux en grand dans lesquels le gaz acide sulfureux se dégage en quantité plus ou moins considérable. Les vapeurs de cette nature qui se répandent dans l'atmosphère, peuvent devenir, en passant dans l'économie animale, par la respiration, très-dangereuses aux habitans des lieux voisins de ces ateliers. Ramazzini rapporte l'histoire d'un procès intenté à un fabricant en grand de sublimé corrosif, par un citoyen qui habitoit une maison voisine du laboratoire; la demande, en partie, tendoit à faire transférer la fabrique hors de l'enceinte de la ville, attendu que les vapeurs du vitriol en combustion incommodoient tout le voisinage; on prouvoit que la mortalité étoit devenue plus grande, depuis l'époque de cet établissement, & que les maladies de poitrine étoient très-communes dans tous les lieux voisins dont l'atmosphère pouvoit contenir des émanations sulfureuses. Le jugement rendu, maintint le fabricant dans son établissement; Ramazzini s'élève avec raison contre cet arrêt. Des pareilles manufactures, dit M. Fodéré, doivent être éloignées des habitations communes, & lorsque l'on veut en établir de nouvelles, les magistrats doivent, avant de le permettre, faire faire, par des médecins instruits, des informations exactes de *commodo & incommodo*.

Ferment. L'air atmosphérique peut être également altéré dans sa composition par la quantité de gaz acide carbonique qui se dégage des matières combustibles ou des substances salino-terreuses, dans la vitrification de la silice par la potasse ou la soude. Si l'on fabrique en grand des verres colorés ou achromatiques, le voisinage a de plus à craindre la volatilisation des matières métalliques en fusion qui sont nécessaires à cette espèce de verre. Les fabriques de poteries pourroient devenir dangereuses, leurs convertes étant composées de plomb & d'étain fondus ensemble & réciproquement oxydés, si ces travaux étoient assez considérables pour qu'il y eût une grande & abondante volatilisation de ces substances métalliques.

Savonnerie. Les émanations qui se dégagent des matières propres à la fabrication des savons, peuvent devenir très-préjudiciables à la santé des individus qui sont exposés à respirer les miasmes avec l'air atmosphérique. Ce sont des vapeurs fixielles très-fétides, résultats du mélange de la soude avec la chaux vive délayée dans l'eau; des molécules huileuses, volatilisées par la chaleur pendant la combustion du savon, devenues très-emphyreumatiques par la même action du fen, répandant au sein de l'atmosphère une odeur tout-à-fait rebuante & us-

flabonde, & des vapeurs très-acres, qui donnent de grands maux de tête & altèrent très-facilement les poitrines délicates.

Raffineries de sucre. La raffinerie du sucre consiste à le faire bouillir dans de l'eau de chaux avec du sang de bœuf. Cette opération en grand donne lieu à des exhalaisons dans l'atmosphère environnante, de substances gazeuses très-délicieuses, qui paroissent provenir de la volatilisation de l'acide pyro-muqueux mêlé aux produits que peut fournir le mélange de la chaux, du sang de bœuf & de l'eau. Ces fabriques doivent donc, autant qu'il est possible, être éloignées du sein des villes & des habitations réunies; & toutes les fois que des plaintes sont portées à ce sujet, des informations doivent être exactement faites, & les magistrats doivent appeler à la rédaction des rapports & procès-verbaux, à cette occasion, des médecins instruits dans la théorie & dans la pratique des sciences & des arts chimiques.

Fabriques de suif. Le suif fondu exhale des émanations qui révoltent l'odorat & le goût, se portent rapidement sur le système nerveux, soulèvent le cœur, peuvent exciter des vomissemens, des défaillances & plusieurs autres accidens. L'air qui est imprégné de ces molécules huileuses ne peut se respirer impunément. L'atmosphère intérieure des ateliers de ces fabriques n'est, pour ainsi dire, qu'un air empué par une vapeur grasse, âcre & puante. On voit combien il seroit dangereux que l'air extérieur que respirent les individus occupant les habitations voisines, fût imprégné de ces vapeurs que l'habitude fait à peine supporter aux ouvriers de cette profession. Ces considérations puissantes déterminèrent, en 1780, le lieutenant-général de police de Saint-Germain-en-Laye, à proscrire les fonderies de suif du sein de la ville, & à ordonner à tous bouchers, épiciers, chandeliers & autres particuliers fondant le suif en branches, de transporter leurs ateliers hors de la ville, & des lieux assez éloignés des autres habitations, 1°. pour éviter le malheur de l'incendie, qui n'est que trop commun dans la conflagration des graisses; 2°. pour préserver le voisinage de la respiration de cet air insalubre. Cette sentence fut homologuée par le parlement de Paris. (Voyez la *Collection des causes célèbres*, vol. XXIII, 199. casse.) Qui croiroit que des médecins ont dernièrement proposé la respiration habituelle de l'atmosphère des fonderies de suif pour la guérison des maladies de poitrine?

Fabrique de cordes à boyaux; tanneries, &c. Il convient également d'écarter du sein des villes les fonderies, les fabriques de cordes à boyaux, les ateliers des tanneurs, des corroyeurs, des mégisiers, & toutes manufactures où l'on emploie des matières animales dans un état de décomposition plus ou moins avancée. L'odorat en est d'abord affecté d'agréablement les communications ner-

veufes entre les organes intérieurs & ceux de l'odorat & du goût ne tardent pas à faire éprouver des accidens de toute espèce. Il faut lire l'élégante dissertation de Plainer, professeur en médecine à Leipzig, sur les maladies produites par les immondices & les émanations insalubres. A Rome, les ateliers, les manufactures, les laboratoires de toutes les professions dont l'exercice & les travaux pouvoient préjudicier à la santé publique, étoient situés au-delà du Tibre. Ce n'étoient pas des citoyens romains qui exerçoient ces professions préjudiciables à la santé publique, c'étoient des Juifs, des esclaves, des peuples vaincus. (Voyez la *Topographie de Rome*, par Marliani, & l'ouvrage d'Alexandre Donatus sur le même sujet.)

Il n'est pas moins essentiel à la salubrité publique, d'éloigner du sein des habitations des campagnes, les mares, les eaux croupissantes, les étangs artificiels & les flaques d'eau stagnantes destinées au rouissage des lins & des chanvres, les fosses des tanneurs & des chamoiseurs, &c.; de tous ces lieux s'élèvent des émanations dangereuses, lorsque surtout leur action délétère est mise en activité par la chaleur & l'humidité de l'atmosphère.

Boues & immondices. L'enlèvement des boues & des immondices dans les villes n'est pas un objet de moindre importance. On se rappelle avec douleur les temps où les maladies épidémiques renaissoient tous les ans par ces causes. Les rues de Paris n'ont été pavées que dans le douzième siècle. Philippe-Auguste fut excité à ordonner cette opération, par l'horrible puanteur qui s'exhalait d'un poubier sous ses yeux; mais cette précaution sage ne fut réellement mise à exécution que dans le quatorzième siècle. Un règlement de police du 6 novembre 1778 ordonna aux particuliers de faire balayer tous les jours le devant de leurs maisons. (Voyez le *Dictionnaire de police de Delamarre*, articles *Boues*, *Nettoisement*, &c.)

Fosses d'aisance. L'établissement des fosses d'aisance en France est très-moderne, & la plupart des villes du Midi donnent encore à cet égard l'exemple de la malpropreté la plus préjudiciable à la santé publique. Une ordonnance de François I^{er} en 1559, confirmée par Henri II en 1550, renouvelée par un arrêt du parlement de Paris en 1605, enjoit à tous les propriétaires de pratiquer des fosses d'aisance dans leurs maisons, & de faire calaver les matières fécales aux heures de la nuit & en des lieux éloignés des villes, & d'où les émanations ne peuvent être portées dans les cités par les vents les plus ordinaires de canton.... La négligence de ces mesures & de ces précautions a plus d'une fois donné occasion au développement des maladies putrides les plus dangereuses; car on fait que le gaz azote, le gaz hydrogène, l'hydrogène sulfuré, sont tous de nature fétide & propres à la production des fièvres du plus mauvais caractère.

Inhumations des citoyens. La rélegation des cimetières

cimetières hors des villes, qui n'a commencé à avoir lieu en France qu'en 1776, ensuite de la déclaration du Roi, du 10 mars de la même année, est une des mesures les plus importantes d'hygiène publique. Il y a lieu de s'étonner qu'une précaution si sage & si utile ait été prise si tard; depuis long-temps elle étoit sollicitée par tous les bons esprits: il a fallu des exemples terribles pour déterminer d'une manière sérieuse & efficace, cette utile translation. Il faut avoir le soin de les placer de manière à ce que les vents dominans du pays ne portent pas fur la ville les émanations cadavéreuses qui peuvent s'élever dans l'atmosphère. Il est avantageux de faire des plantations à l'entour, parce que ces grands végétaux absorbent le gaz azote, en débarrassent l'atmosphère & y répandent des torrens de gaz oxygène. Les cadavres doivent être enfoncés à une certaine profondeur, & dans les temps des maladies épidémiques, lorsque les inhumations sont nombreuses, il est nécessaire de répandre dans les fosses une quantité suffisante de chaux.

Voies. Des précautions analogues doivent être prises pour les voies. Depuis long-temps des réglemens de police, très-sages, ont été rendus: leur exécution est nulle. Dans la plupart des lieux, les voies sont à l'air libre; les gaz que laissent exhaler les substances animales à l'état de décomposition, se répandent dans l'atmosphère qui leur sert de véhicule pour les porter dans les lieux voisins, jusqu'à ce que leur dissémination soit opérée; les animaux s'emparent des membres épars des cadavres, les tracent çà & là, & répandent au loin une odeur infecte. On ne sauroit croire à quel point ces immondices peuvent préjudicier à la santé des êtres qui en respirent les miasmes, ou qui se trouvent dans la sphère de leur activité. (GILBERT.)

Nota. L'article qui précède, & que nous avons trouvé dans les archives de l'*Encyclopédie méthodique* pour la partie médicale, renferme plusieurs réflexions & plusieurs observations utiles; mais la question qui vient d'être traitée, ne s'y trouvant pas considérée avec assez d'étendue, & sous les points de vue divers que l'on doit y découvrir, nous avons cru devoir y joindre les réflexions suivantes, dans une espèce d'appendice ou de supplément.

MÉTIER (Considération physiologique & médicale des).

MÉTIER, de *ministerium*, exprime, dans un sens détourné de l'acception étymologique & primitive, l'exercice d'une profession quelconque, & plus ordinairement des professions & des arts mécaniques.

Les métiers, considérés relativement à la médecine & à la physiologie, présentent deux objets principaux de recherches & d'observations; savoir:

1°. Les effets des professions ou des métiers sur l'organisation, les caractères extérieurs, la phy-

MÉDECINE. Tome X.

sionomie propre aux différentes classes de la société qui les exercent, le mode de complexion ou de tempérament qui résulte de cet exercice. (Considérations physiologiques.)

2°. Le danger, l'insalubrité de plusieurs professions, les maladies qui sont comme attachées à leur exercice, & contre lesquelles il n'est pas toujours impossible d'employer des moyens préventifs & une prophylactique spéciale. (Considérations médicales.)

I. CONSIDÉRATION PHYSIOLOGIQUE.

§. 1^{er}. *Idee générale de l'influence des métiers & des professions, considérée comme une cause principale d'inégalité & de variété parmi les hommes.*

L'exercice varié des métiers nombreux dans lesquels se déploie la vie laborieuse & active de l'homme en société, modifie sensiblement l'extérieur du corps, & produit à la longue, dans l'organisation, des diversités assez prononcées, assez profondément établies, pour devenir des caractères de race, & se communiquer par une transmission héréditaire. Cette circonstance doit être regardée comme la cause la plus énergique & la plus forte, de ces grandes inégalités & des grandes différences parmi les hommes, chez les nations policées.

En général, on peut regarder tout métier, toute profession, comme une condition particulière de la vie, qui fait dominer, ou qui du moins rend permanentes certaines habitudes physiques ou morales, certaines directions de l'esprit, dont l'expression profonde & sans cesse renouvelée, donne à tous les hommes d'un même état un air de famille.

Si la profession & le métier sont exercés en commun, il se joint à leur effet la puissance incalculable de l'imitation, une sorte d'action sympathique de l'homme sur l'homme.

Rien, en général, ne tend plus fortement à donner à la physiologie & à l'esprit un caractère uniforme & commun, costume d'être sous le même joug, de porter les mêmes fers, de travailler & de vivre ensemble dans une même atmosphère, dans un espace resserré, dans une usine, dans un bague, sur un vaisseau, dans un cloître, dans un atelier, dans une manufacture.

Godwin, dans le roman de Fleetwood, a très-bien décrit cette uniformité de physiologie, dépendant d'un métier exercé dans le même local, par un grand nombre de personnes.

Un personnage épisodique de son roman, Rastigny, est frappé de cet effet profond & général de la même occupation, dans une filature de soie à Lyon: « Là, dit-il, toutes les physiologies des hommes, des femmes & des enfans occupés à la filature, avoient la même expression, c'est-à-dire, l'air d'une attention stupide, d'une contrainte dou-

loureuse, d'un emploi machinal & monotone de leurs forces, & d'une intelligence peu développée.

Cet effet du rapprochement, qui favorise si puissamment les tendances sympathiques & la faculté d'imitation, se montre encore d'une manière plus remarquable dans la physionomie des moines des différents Ordres, & surtout des Chartreux, des Carmélites, &c.

L'influence d'une même occupation & d'une réaction continuelle des physionomies, est si puissante qu'elle ne laisse presque plus de physionomie individuelle. Le caractère particulier est en quelque sorte masqué & enveloppé par le caractère général de la profession. C'est sans doute par un effet de la même cause, que les habitants d'un village ou d'une petite ville, ont un air de famille bien plus marqué que les habitants des grandes villes, où, indépendamment de la diversité des exercices & des passions, le principe de l'imitation agit avec moins de force.

Une profession exercée pendant long-temps, & que l'on abandonne ensuite, laisse souvent un caractère *indélébile*, un certain air, une habitude du corps, une tournure particulière, qui n'échappent point à l'œil pénétrant & exercé d'un observateur habile.

Un de mes amis qui voyageoit en Italie, à l'époque où un grand nombre de moines scénaristes s'y trouvoient, manquoit rarement de les reconnoître, non-seulement à cette physionomie d'uniforme que l'on remarque particulièrement chez les moines des différents Ordres, mais à une certaine manière de se tenir & de marcher, déterminée par l'habitude de porter la robe longue.

M. Deffut de Tracy, qui réunit à un esprit éminemment philosophique, une grande délicatesse de tact & d'observation, m'a dit qu'étant colonel au régiment de Penthièvre, il reconnoissoit à la première vue, si un homme qui se présentoit pour s'engager avoit déjà servi, quel que fût d'ailleurs son costume, & dans le cas même où cet homme auroit quitté le service depuis long-temps. Plusieurs détachés furent reconnus de cette manière & forcés d'avouer leur désertion. Un de ces hommes se présenta un jour au moment d'une parade. M. de Tracy le reconnut aussitôt & fit part de son observation au major du régiment; celui-ci répondit qu'en effet il étoit évident que cet homme avoit déjà servi, mais qu'en outre il fortoit des galères. Un mouvement habituel de la paupière, dont les galériens contractent l'habitude en travaillant au soleil avec un simple bonnet, avoit fait une aussi redoutable révélation au clairvoyant major.

L'homme qui vouloit s'enrôler, confirma par ses aveux les soupçons des deux officiers anxieux il s'étoit adressé, & dont l'art de deviner lui donna autant d'effroi que de surprise.

Plusieurs métiers, plusieurs professions ne laissent pas d'ailleurs, comme on fait, leur influence à des changements dans les traits du visage. Les diffé-

rentes attitudes que plusieurs de ces professions exigent, l'emploi inégal des forces de la vie, dans leur exercice, la manière dont les organes extérieurs sont modifiés dans cet emploi, l'éducation, le développement, l'augmentation du volume des uns; l'oisiveté, la faiblesse, l'appauvrissement des autres; tous les changements de forme, d'allure, de physionomie, de caractère qui dépendent de ces différences, occasionnent dans l'espèce humaine des variétés & presque des races particulières d'hommes, que l'observateur philosophe le plait à remarquer & à reconnoître au milieu d'une grande population, comme celle de Londres ou de Paris.

Des effets aussi remarquables pourroient être étudiés sous plusieurs points de vue très-importants; savoir :

1°. L'examen des organes des différentes parties du corps, des divers genres de facultés qui sont le plus employés dans l'exercice de chaque profession.

2°. La considération des localités & des milieux où certaines classes d'artisans sont obligés de travailler dans un état d'isolement ou de société.

3°. L'idée générale du genre d'industrie, des mœurs & des passions particulières qui paraissent inséparables de plusieurs métiers, & qui ajoutent à leur influence & à leur expression.

Les différentes portions de la société, si on les considéroit sous ces différents rapports, donneroient nécessairement lieu à un grand nombre de remarques aussi utiles que curieuses, & de semblables observations deviendroient bientôt la partie la plus riche & la plus attachante du genre de connoissances que l'on a commencé à cultiver en Allemagne, dans ces derniers temps, avec autant de zèle que de succès, sous le nom d'*Anthropologie*, ou d'*Histoire naturelle des facultés physiques & morales de l'humanité*. Ce seroit là une carrière nouvelle que nous apercevons, mais sans oser tenter de la parcourir. Tout en reconnoissant son importance, son étendue, nous nous bornerons à un petit nombre de remarques, qui seront présentées avec le dessein d'appeler l'attention des incertains philosophes sur ce genre d'observations, & de faire apercevoir combien l'étude comparative des variétés de l'espèce humaine qui sont sous nos yeux, & que produisent & reproduisent sans cesse les différentes habitudes de la vie sociale, pourroient étendre le domaine de la physiologie.

On a bien observé & bien décrit les grandes variétés de l'espèce humaine; il ne seroit pas moins curieux & moins utile d'étudier les variétés de détail, qui sont si nombreuses, & qui dépendent de la diversité des conditions chez les peuples policés. L'organisation humaine, soumise chez ces peuples à tant de cultures différentes, ployée à tant d'usages divers, appliquée à une si grande multitude de services & d'emplois, & changée, altérée ou perfectionnée par toutes ces causes de modification, doit présenter & présente en effet une

toale de variétés de formes & de physionomies, qui seroient encore bien plus remarquables & plus profondes, sans le changement perpétuel & le croisement de toutes les conditions.

Un naturaliste philosophe a souvent remarqué combien la puissance de l'homme apportoit de variété dans l'histoire de la nature. Et en effet, les animaux, les plantes, ennoblis, subjugués par la toute-puissance de l'homme, ont éprouvé des transformations continuelles. Les animaux domestiques entraînés, pour ainsi dire, par les révolutions & les vicissitudes humaines, ont changé de forme en changeant de climat, de nourriture, d'habitudes; quelques-uns, plus particulièrement tourmentés & travaillés sans cesse par l'homme, ont perdu entièrement leur caractère original; des déformations éventuelles, des empreintes profondes de servitude, des stigmates de douleur & d'altération se sont transmis par hérédité; & après avoir été des changements individuels, sont devenus des dispositions propres à l'espèce, comme on le voit par le cochon domestique, la chèvre d'Angora & le chameau.

L'homme n'a pas exercé une moindre influence sur lui-même, par la variété de ses occupations, à mesure que la civilisation a fait des progrès; & si, chez les peuples modernes, les professions étoient héréditaires, comme dans l'antique Egypte, on conçoit aisément qu'il se formeroit un milieu des grandes villes, des races d'hommes qui différencieraient les unes des autres, de manière à ce qu'il fût impossible de les méconnoître.

Chaque métier, chaque profession doit être regardé en général comme une éducation spéciale prolongée & de toute la vie, qui développe, qui exerce, qui fortifie quelques organes, & établit un rapport particulier de l'homme avec la nature.

Que de différences & de variétés dans les effets de cette éducation ! Ici c'est l'œil qui domine & qui est parvenu à un degré de justesse, de finesse & d'activité inconcevables; ici ce sont l'oreille & toutes les actions, toutes les combinaisons de mouvement & d'idées qui s'ajoutent à ce sens; dans d'autres cas, ce sont le doigt, la main, le bras, le tronc, les jambes, le larynx; chez d'autres, enfin, le cerveau, qui lui sert de base à tant de cultures & de modifications différentes dans les phénomènes de la mémoire, de l'observation, du calcul, de la méditation, de l'imagination, &c. &c.

C'est de toutes ces diversités, dans l'emploi de l'organisation & la direction de la vie, que résultent nécessairement parmi les hommes tant d'inégalités, de dissimilitudes. De grands avantages, certains genres de supériorité paroissent résulter de ces cultures inégales & diverses; mais ces espèces de perfectionnement sont tout-à-fait illusoires, & du moins partielles & incomplètes.

C'en est même qu'aux dépens des autres organes, que la partie du corps ou le genre de facultés le plus employé, acquiert une prédominance marquée.

Dans la petite économie vivante de l'individu, comme dans la grande organisation sociale, l'empire ne s'acquiert que par des sacrifices; & le luxe, la force, la richesse de certaines parties, produisent l'appauvrissement & la débilité générale: on diroit qu'il n'y a pour toute l'organisation, qu'une quantité donnée de force vitale, & qu'éduquer plus particulièrement & perfectionner par l'apprentissage & l'exercice d'une profession quelconque, n'est autre qu'organiser & de facultés, c'est affaiblir les autres en accumulant, par une sorte d'usurpation, les puissances de la vie dans quelques régions privilégiées de l'organisation. Ne va-t-on pas même quelquefois jusqu'à sacrifier des organes, pour en perfectionner d'autres? & c'est ainsi que l'on mutilé les hommes pour les faire mieux chanter, & que l'on dénature les plantes pour avoir des fleurs doubles, aux dépens des organes de la reproduction.

Si l'on vouloir trouver la véritable cause de l'inégalité parmi les hommes, il faudroit la chercher dans cette diversité d'emplois & d'usages, auxquels les progrès de l'art social ont insensiblement façonné l'organisation.

Les conditions, les professions dans lesquelles les forces de la vie se dirigent plus particulièrement du côté de l'organe intellectuel, sont en affaiblissant l'organisation, doivent faire obtenir les premiers rangs; ils sont annoncés par les signes de noblesse les moins équivoques, par une physionomie morale bien marquée, & par tous les signes du développement & de l'empire de la vie intellectuelle, aux dépens de la vie animale.

Les conditions, les professions qui n'exigent que des facultés physiques, & qui laissent à la vie animale toute son activité, marquent nécessairement les dernières places; & entre ces deux extrêmes, se trouvent distribués les autres professions & métiers, où les forces physiques sont combinées avec un développement intellectuel qui augmente insensiblement, depuis les arts & métiers les plus simples, jusqu'aux beaux-arts, dont l'exercice exige à la fois un esprit cultivé & une éducation particulière des sens & de la main.

§. II. Des principales variétés de l'organisation qui dépendent de l'influence physique ou de l'exercice mécanique des métiers ou des professions.

Chaque métier, chaque profession a une influence bien marquée, non-seulement sur la physionomie, mais sur la forme du corps & sur l'ensemble de l'organisation. Lichtenberg, dans son Commentaire curieux & piquant de l'œuvre de Hogarth, a très-bien remarqué que le célèbre peintre des vices & des ridicules, a donné l'air d'un cordonnier au tailleur, qui se trouve dans l'une de ses gravures, dont la série présente dans

ses différentes époques & ses différentes révolutions, la vie du libertin.

Parmi les arts & métiers, ou les professions qui ont une influence physique aussi remarquable, les uns agissent sur l'ensemble du corps, d'autres sur quelques-unes de ses parties, dont l'altération & le perfectionnement entraînent ensuite des variétés générales.

Les métiers qui agissent plus particulièrement sur l'ensemble du corps, sont ceux du soldat, de tireur d'armes, &c. Les soldats ont en outre la poitrine saillante, le sternum sensiblement élevé, les muscles pectoraux volumineux, & les épaules reculées & rapprochées l'une de l'autre en arrière.

D'autres habitudes de métiers donnent plus de force & de volume à la partie postérieure du corps, & l'emploi d'une manière prédominante; d'autres augmentent le volume, l'énergie, la flexibilité des jambes & des cuisses, des bras & des avant-bras, des hanches & des omoplates.

Tous les hommes qui portent des fardeaux, sont en général faciles à distinguer par leur dos un peu voûté, la largeur de leurs épaules, la force & la masse de tout l'appareil musculaire dorsal & lombaire, & le rétrécissement de la poitrine. Les vignerons, les cultivateurs, dans tous les pays où l'on travaille à la houe, se courbent avant l'âge, & plutôt par la nature que par le nombre de leurs travaux.

Les faiseurs de tours, & principalement les danseurs de cordon, n'ont pas les muscles des jambes & des cuisses aussi développés que les danseurs & les courtiers. L'éducation particulière qu'ils donnent à leurs muscles, a constamment pour objet, surtout chez les danseurs de corde, de maintenir le centre de gravité dans les positions les plus difficiles, ce qui doit donner & ce qui donne en effet, aux muscles des lombes, du bassin & de la cuisse, une force & une flexibilité caractéristiques. Dans ces professions & dans toutes celles qui s'en rapprochent, la colonne dorsale acquiert une souplesse & une extensibilité que l'on conçoit à peine.

L'habitude des réveries & des inflexions que multiplie une politesse sans mesure & sans vérité, donne aussi, à la longue, une mollesse & une docilité de corps qui sont caractère, & à l'occasion desquelles un satyrique a dit avec beaucoup d'esprit, qu'il falloit ranger certains courtisans parmi les animaux sans vertèbres. Les danseurs sont facilement reconnaissables à l'étendue des mouvements de la cuisse sur le bassin, à leur corps toujours sensiblement porté en arrière, à leurs pieds tournés en dehors; enfin, au volume & à la force de tous les muscles extenseurs des extrémités inférieures.

Les maîtres à danser, qu'il ne faut pas confondre avec les danseurs, ont ordinairement quelque chose de gêné dans les manières, d'affecté, d'académique, tourné en ridicule par Hogarth,

& sur lequel Diderot revient souvent dans ses observations.

Les tailleurs ont au peu les pieds tournés comme ceux des danseurs; leur poitrine est étroite, enfoncée; l'air commun de leurs attitudes & de leurs mouvements les font aisément reconnaître, même à travers le costume souvent élégant, dont quelques-uns affectent de se parer.

Les cordonniers ont encore à un degré plus marqué, ce réserrement de la poitrine que l'on observe chez les tailleurs, & sont bien signalés par ces attitudes roides & ces mouvements qui ne sont jamais déçus aux membres qu'ils exécutent, ces lignes onduyantes, propres aux évolutions & aux attitudes gracieuses & distinguées.

Une semblable physionomie, de profession ne peut guère se méconnoître, & il falloit sans doute toute l'expérience du la jeune fille dont parle la Bruyère, pour regarder comme un amant tout prêt à lui faire une déclaration d'amour, l'homme habillé du noir, qui se mit à ses pieds pour en prendre la mesure.

Ramazini, qui a publié un excellent ouvrage sur les maladies des artisans, a attribué une influence beaucoup plus déformatrice aux métiers de tailleur & de cordonnier. Suivant cet observateur, les cordonniers (*jutons*) & les tailleurs (*fascinators*), ainsi que les ouvriers & toutes les ouvrières qui travaillent à l'aiguille, sont exposés à se courber avant l'âge, & ont une démarche gauche, embarrassée; c'est un spectacle vraiment curieux, ajoute Ramazini, que de voir, à certaines fêtes de l'année, les communautés de cordonniers, de tailleurs, aller en procession, en bon ordre, deux à deux, ou bien assister au convoi de quelques-uns de leurs confrères.

Les cordonniers ont en outre, dans l'expression morale & la physionomie, quelque chose du caractéristique, des traits, un certain air, que Lavater avoit décrits dans l'édition allemande de son ouvrage, ce qui lui attira des remontrances assez sévères de son gouvernement.

La manière de marcher des marins & leur attitude habituelle ne sont pas moins caractéristiques que toutes les variétés qui viennent d'être indiquées. Les hommes de cette profession se tiennent & marchent toujours les jambes très-écartées, & les pieds tournés en dedans; posture qu'ils ont évidemment prise par l'habitude des mouvements nécessaires pour maintenir leur équilibre au milieu des oscillations du vaisseau.

Le métier de tisserand, auquel Montaigne a attribué une influence si singulière (1), & dont les effets ont d'ailleurs été pris en considération par les médecins qui ont écrit sur les maladies des artisans, ne paroît pas modifier l'extérieur du

(1) Montaigne attribue à cette influence une disposition plus marquée aux plaisirs de l'amour, mais d'après des motifs qui ne paroissent pas appuyés sur l'observation.

corps assez fortement pour former un caractère de profession. Les cavaliers ont dans la forme des jambes, une tournure particulière, une configuration qui les fait aisément reconnoître, comme on peut le remarquer en observant avec attention les courriers & les postillons.

Les métiers qui exercent plus particulièrement les extrémités supérieures, & dont on reconnoît l'influence au développement des bras, sont ceux de boulanger, de tanneur & de batelier, &c.

Si je voulois peindre Caren, dit Hogarth, je lui donnerois des jambes grêles & de larges épaules, dussé-je ne pas avoir pour moi l'autorité du plus petit bas-relief.

Il y a des métiers & des professions paisibles & sédentaires, qui, sans changer en aucune manière la forme du torse ou des membres, se manifestent par des altérations du visage.

Ainsi, par exemple, l'habitude de fumer rend la lèvre inférieure un peu plus grosse & pendante, ce que l'on peut aisément remarquer chez les personnes qui font usage de la pipe.

Les souffleurs en verre, les musiciens qui donnent du cor, de la trompette, ont, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, les joues plus volumineuses, par un effort nécessaire de l'extension forcée & souvent renouvelée des muscles buccinateurs. Les joueurs de flûte, de hautbois, de clarinette, ont au contraire le milieu des joues serré & un peu creux, par une suite nécessaire de la contraction fréquente & vive des muscles buccinateurs.

Les horlogers, & en général tous les ouvriers en petits objets, les naturalistes, mais principalement les botanistes & les faiseurs d'observations microscopiques, ont, toutes choses égales d'ailleurs, le front inégalement ridé, & des rides rayonnantes plus marquées à l'angle externe de l'œil gauche, qu'à l'autre, & habituellement fermées.

La profondeur & l'étendue des rides inter-siciliennes annoncent l'habitude de la méditation. On pourroit remarquer que le même chiffre physiognomique est quelquefois gravé par d'autres habitudes étrangères à la pensée, comme chez les ouvriers employés à la fondure.

Chez les forgerons, les ferronniers, les verriers, les émailleurs, & tous les artisans qui sont constamment exposés à une chaleur rayonnante, on aperçoit assez ordinairement, & d'une manière plus sensible que chez les autres hommes, des rides autour de chaque œil, ce qui dépend de la contraction habituelle de l'orbiculaire des paupières.

Ces emplois si différents de la force musculaire, qui s'annoncent ainsi par des caractères extérieurs & par des variétés dans la forme humaine, produisent dans la force musculaire, comparée chez un grand nombre d'individus, des diversités & des variations qui ont beaucoup moins de latitude dans le genre de vie uniforme des sauvages.

Voici, à ce sujet, les résultats aussi curieux

qu'intéressants de quelques expériences faites avec le dynamomètre de Régnier, par Péron, chez plusieurs peuplades très-peu avancées dans l'état social.

A la terre de Diemen, dont les habitants sont encore dans le premier âge de la civilisation, aucun sauvage n'a pu faire, par la pression des mains, qu'un effort égal à soixante myriagrammes, & indiqué par le degré 60.

A l'île Maria, Péron fit usage du même instrument devant plusieurs habitants, pour les engager à l'imiter; aucun d'eux ne put porter l'aiguille aussi loin que lui; mais l'un de ces sauvages, humilié par cette différence, fit les plus grands efforts pour avoir plus de succès & irrité par son impuissance, & voulant donner un démenti à l'instrument, il s'avança fur Péron & saisit fortement son poignet avec les deux mains, en le défilant de se dégager.

Quoique troublé par le ton de colère du sauvage, Péron lui fit bientôt lâcher prise, & le laissant à son tour, il résista à tous ses efforts, en prouvant ainsi que l'instrument avoit raison.

A la Nouvelle-Hollande, où la civilisation est un peu plus avancée, il y eut un sauvage qui fit marcher l'aiguille jusqu'au soixante-deuxième degré.

À Ymer & chez les Malais, l'aiguille fut portée un peu plus loin, mais toujours beaucoup moins que par les Français & les Anglais, soit par la pression avec les mains, soit par la force des lombes. Ce qui est d'ailleurs plus remarquable dans ces expériences, c'est le caractère de leur résultat d'uniformité & de rigueur chez les sauvages, opposé aux variations & aux diversités de ces mêmes résultats chez les Européens, ce qui ne peut dépendre que de l'inegalité des conditions, des différences & des modifications sans nombre de l'organe musculaire, par les métiers & les professions.

Si nous voulions suivre l'organisation humaine à travers tous les changements que lui impriment l'apprentissage & l'exercice des arts & métiers, nous verrions que plusieurs de ces changements ne se bornent pas à l'extérieur du corps & à des variations dans les formes.

Plusieurs de ces conditions de la vie ont une influence profondément nuisible, & agissent en dérangeant la santé & en altérant sensiblement l'organisation.

Les professions dangereuses, souvent mortelles, sont malheureusement trop nombreuses, & les gens du monde qui jouissent en paix des avantages d'une haute civilisation, sont loin de savoir à combien de maux & de dangers sont exposés les hommes qui leur procurent une partie de ces avantages.

Des recherches sur un pareil sujet sont bien affligeantes; elles ne portent pas sans doute à calomnier les sciences, ou à se plaindre avec Péro-

quent philosophe du Genève, des progrès de l'art social, mais elles jettent involontairement dans une mélancolie philanthropique, qui dispose à porter sur les derniers rangs de la société un coup d'œil moins indifférent. Elle engage surtout à s'occuper avec le zèle d'une humanité plus fervente & plus généreuse, des moyens & des ressources les plus propres à diminuer le nombre des maux & des dangers attachés à un si grand nombre de conditions.

Les signes les plus apparens de ces métiers insalubres & dangereux, sont des altérations des traits & de la couleur du visage, qui appartiennent plutôt à une histoire des maladies qu'à un traité de physiognomie.

Qui pourroit analyser & signaler toutes ces altérations, & la multitude des dégénérescences de la carnation naturelle que présente la teinte jaunâtre & rembrunie, ou les divers degrés d'étiollement du grand nombre d'artisans qui exercent leur métier au milieu des entours les plus insalubres, à l'ombre & à l'humidité, &c. ?

Il y a quelques années, tous les ouvriers d'une galerie de charbon, près Valenciennes, furent atteints d'une maladie dont plusieurs moururent, & qui parut assez grave & assez extraordinaire pour exciter l'attention & la sollicitude du gouvernement, au point de l'engager à faire envoyer à Paris, dans l'hospice de l'école de médecine, quatre de ces malades. J'ai examiné plusieurs fois, avec le sentiment d'une vive commisération, les malheureuses victimes d'une profession aussi insalubre. Leur physiognomie, toute l'habitude extérieure de leur corps, laisoient voir aisément l'étendue & la profondeur du dérangement de leur organisation.

La décoloration de la peau étoit universelle, & non-seulement leur teint étoit blafard & jaunâtre, mais la conjonctive, le revers des paupières, l'intérieur de la bouche, & jusqu'à la langue, étoient également privés de leur couleur naturelle. Le visage étoit boursif & d'un jaune blafard, non pas comme dans la jaunisse, mais de ce jaune que présente la cire blanche quand elle a été gâchée.

Cette altération de la couleur peut être regardée comme un degré extrême, dont le rapprochement, par une suite de nuances plus ou moins fortes, d'autres altérations également produites par les arts & métiers; de tels signes annoncent bien évidemment un dérangement intérieur, dépendant du milieu dans lequel l'artisan travaille, ou des fatigues qu'il subit; une influence profonde, qui a occasionné de véritables dégénérescences de l'espèce humaine; altérations dont on ne trouvera malheureusement que trop d'exemples, si se contentant à l'observation particulière des dernières classes du peuple, avec cet esprit qui conduisit le vertueux Hogarth dans les prisons & dans les hô-

pitaux, on visistoit avec soin les mines, les fosses, les réduits, les laboratoires, les ateliers insalubres, où tant d'ouvriers & d'artisans sont renfermés & passent souvent une grande partie de leur vie, sans éprouver l'action vivifiante de la lumière.

§. III. *De certaines variétés qui sont produites dans l'homme par l'influence morale des métiers & des professions.*

L'exercice des différens métiers fait dominer dans le caractère de celui qui s'y livre, certaines facultés intellectuelles ou certaines passions dont l'expression habituelle d'anné nécessairement à la physiognomie quelque chose de caractéristique.

Cette influence morale des diverses conditions de la vie n'est pas toujours, il faut l'avouer, aussi marquée que l'influence physique de la même cause; souvent même cette influence morale est si délicate, si légère, que le physiognomiste le plus habile a peine à la soupçonner ou du moins à la reconnaître.

Les physiognomies des métiers & des professions les plus faciles à reconnaître, sont d'ailleurs celles qui dépendent, soit d'une passion modérée, mais continue & en quelque sorte absorbante & cachée; soit de passions & d'émotions plus variées, mais violentes, cruelles & déformatrices.

Dans les diverses physiognomies qui résultent de la profession ou d'une habitude dominante quelconque, on reconnoît ou ne sentibilité très-exercée & un empire bien marqué, une direction particulière de la vie intellectuelle, ou une sensibilité morale très-obscur & une prépondérance désagréable de la vie animale. C'est à ce dernier genre de physiognomie qu'appartiennent les physiognomies qui se trouvent multipliées dans l'œuvre d'Hogarth, & dont la rencontre dans quelque rue écartée, ou sur un grand chemin, ne pourroit manquer de nous être infiniment désagréable.

Parmi les physiognomies remarquables par l'empire de la vie intellectuelle & la direction particulière des idées & des sensations, suivant la profession & la condition sociale, il y en a quelques-unes bien caractéristiques, dont un peintre habile peut combiner avec plus ou moins d'effet les éléments. Nous citerons comme exemples, les gens d'affaires dans les caricatures d'Hogarth, & ceux du médecin & du notaire dans le tableau d'Euclidès, par le Poussin, si toutefois on peut rapprocher les noms d'Hogarth & du Poussin sans blasphème.

Il y a des types de profession presque convenus, arrêtés & non moins d'uniforme que l'habit, la décoration ou la livrée de certaines conditions. Pourroit-on nier, par exemple, qu'il n'y ait pas des physiognomies ministérielles, diplomatiques, militaires, sacerdotales, médicales, académiques, &c. ?

Un léger mouvement, une simple grimace, peut

faire la révélation la plus terrible, comme nous l'avons vu dans l'exemple du galérien qui, après avoir fait son temps, se présentait à M. de Tracy pour servir dans son régiment.

J'ai entendu dire plusieurs fois à un observateur plein de sagacité, que les chirurgiens habiles & très-exercés, ont dans la physionomie un trait particulier & dominant, qui dépend du mouvement habituel d'élévation de la tête supérieure, que l'on peut attribuer à l'effort qu'ils font sur eux-mêmes, pour résister à l'impression que tend à leur faire éprouver le spectacle de la souffrance & de la douleur qu'ils ont sous les yeux pendant les grandes opérations.

L'attention de l'homme qui écoute, ne modifie pas la physionomie comme celle de l'homme qui regarde & il faudrait être bien peu observateur pour ne pas avoir été frappé souvent du genre de physionomies propres aux sourds-muets & aux aveugles.

Un semblable sujet de recherches seroit inépuisable; il nous offre non-seulement de grands traits, des indications bien marquées, mais aussi des nuances très-déliées & des variations que l'observateur le plus exercé peut seul reconnoître. Un même genre de physionomie est souvent susceptible de plusieurs modifications. Le type sacerdotal est dans ce cas il y a des physionomies *sacerdotales subalternes, populaires*, & des physionomies *pontificales*.

Les physionomies sacerdotales d'une classe inférieure sont remarquables, en général, par quelque chose de rigide, de calme, qui annonce un esprit borné, croyant à l'expression dans laquelle ou donneoit autrefois trop souvent des signes de dissimulation; d'une modestie affectée & d'une humilité qui est moins dans l'âme que dans les manières.

Les physionomies sacerdotales d'un ordre plus élevé, s'annoncent à l'observateur exercé, par des marques d'un effort plus soutenu & d'une dissimulation plus raffinée. Elles rentrent dans les physionomies diplomatiques. Ce sont des visages froids & imperturbables, des masques qu'une volonté ferme & éclairée & de grands intérêts opposent comme une barrière, à l'effet extérieur des mouvements de l'âme & des orages des passions. Nous trouvons des exemples de ce genre de physionomies dans les portraits de Xénocrate, Léon X, Loyola, Bossuet, Jules II, &c. Quelques physionomies sacerdotales sont remarquables par un certain air de sanctissime non équivoque, nôté à la sévérité cruelle & à l'entêtement opiniâtre d'un esprit borné; tel est le caractère que l'observateur le plus superficiel ne peut guère s'empêcher de remarquer dans les différents portraits du Pape Letellier, gravés par Nanteuil.

Les prêtres de chaque nation réunissent au type sacerdotal quelque chose de particulier qu'il est plus facile d'apercevoir que de décrire. Cette observation a déjà été faite par Lavater pour les

prêtres bérnards; elle s'applique encore peut-être plus directement aux prêtres italiens; & par exemple, qui pourroit ne pas reconnoître un air de parenté entre les deux prêtres peints il y a plus de deux siècles par Raphaël, dans le tableau de Léon X, & les ecclésiastiques qui formoient le cortège du pape Pie VII pendant son séjour à Paris?

Les moines des différents Ordres ont leurs physionomies particulières presque aussi prononcées que celle d'un peuple isolé & formant une grande variété de l'espèce humaine. On a dû faire souvent cette réflexion, en admirant les tableaux de Lesueur: comme ces moines qu'il a peints sont bien caractérisés! comme toutes ces physionomies montrent bien, & avec la plus grande propriété d'expression, l'âme de ces pieux solitaires! Il y a dans ces figures quelque chose de calme, de reposé, d'étranger à la terre, qui se reproduit sous mille formes, sans fatiguer par l'uniformité. Si les solitaires de la Thébaïde, les Bénédictins, les Cordeliers, les Capucins, avoient eu un Lefneur pour les peindre, nous ne serions pas moins frappés du caractère particulier de leur physionomie, & du double effet produit sur les traits du visage de ces hommes rassemblés par le pouvoir de l'imitation & l'action sans cesse renouvelée d'habitudes & de pensées semblables.

Dans la société, les physionomies que l'on reconnoît le plus aisément sont celles des marchands en détail, des gens d'affaires. Les petites passions, & principalement l'avarice & toutes les modifications, donnent à presque tous les hommes qui exercent ces professions, quelque chose de mesquin, de resserré, de commun & d'antipathique pour tout homme accoutumé à de grandes pensées & à de généreux sentimens; le savant, l'homme de lettres, le philosophe, qui se rencontrent par hasard dans un tel monde, s'y trouvent à l'étroit, & dans un état de gêne & d'oppression.

En général, les différentes professions s'annoncent, ou par l'état du front & de l'œil, ou par l'état & les traits des ailes du nez & de la bouche, suivant que, dans l'exercice de ces professions, dominent les hautes méditations, l'observation, les sentimens profonds & durables, ou l'attention superficielle, les perceptions rapides, & les petites passions des gens du monde.

Il est à remarquer surtout que les gens du monde, les courtisans, tous les hommes qui calibrent beaucoup leur extérieur, qui font métier d'être aimables, ont une mobilité très-remarquable dans les ailes du nez & dans la tête supérieure, dont il est évident que l'appareil musculaire est plus développé que chez les autres hommes.

Les gens de lettres diffèrent entr'eux, suivant le genre de vie & d'étude qu'ils ont adopté, suivant qu'ils vivent dans la solitude ou qu'ils se répandent dans la société.

Il est à remarquer que Virgile & Racine, les

deux poètes les plus corrects & les plus élégans, avoient un très-beau profil, & quelque chose même d'idéal dans la physionomie.

Il est impossible de ne pas entrevoir quelque liaison entre la profession, le talent, le caractère de plusieurs grands-hommes, & les traits de leur visage. J'ai fait souvent cette réflexion en contemplant avec une admiration religieuse un grand nombre de portraits de savans, de poètes, d'artistes du premier ordre, mais principalement deux profils rapidement esquissés de l'Aristote & d'Annibal Carracci, qui font partie de la belle collection de gravures & de dessins que M. Lebreton avoit rassemblée pour servir à un grand travail sur l'état des arts en France.

Il est impossible de ne pas apercevoir la même liaison dans le buste de Molière, par Houdon; dans les beaux portraits de Ducis & de Corvisart; par Gérard; dans celui de Fox, par Reynolds; dans les têtes de Buffon, Montesquieu, Raynal, Franklin, Diderot, &c.....

II. CONSIDÉRATION MÉDICALE.

La position la plus heureuse de l'homme dans l'état de société, la plus favorable à la santé, est celle où tous les organes, toutes les facultés & les puissances de la vie sont également employés. Quelques professions & quelques conditions se rapprochent d'une situation aussi désirable; tout ce qui s'en éloigne, est plus ou moins contraire à la plénitude de la vie & à la conservation de la santé. Tout métier, toute profession qui tend à exercer plutôt un ordre particulier d'organes & de facultés, est nuisible, indépendamment de la salubrité ou de l'insalubrité du lien où il s'exerce.

On a traité des maladies des gens de lettres, des gens du monde; il faudroit également traiter des maladies des agriculteurs, des porte-faix, des hommes de peine de toutes les classes, des artisans en général: c'est ce que Ramazzini a essayé de faire au commencement du dernier siècle.

On se trompe, on s'abuse, en général; pour ménager la sensibilité & la charité, lorsque l'on suppose une grande mesure de force, de santé & de longévité aux gens du peuple. Buffon a attaqué cette erreur & en a fait sentir les conséquences. C'est assurément en connaissant les usages du peuple dans toute leur étendue, que l'on peut désirer davantage de les soulager, & ce n'est pas à la science qu'il convient de partager & de répandre des préjugés & des erreurs propres à enconcrer l'insouciance dédaigneuse de l'insensibilité.

La richesse, la grande aisance, dont on abuse souvent pour abrégier la vie & détruire la santé, ne devoient être & ne se trouvent le plus souvent, lorsque l'un fait en faire usage, que des moyens de conservation & de bonheur qu'il est impossible de méconnoître. Un grand seigneur très-avancé en âge, & que l'un de mes plus estimables con-

frères soignoit dans ses dernières années, lui fit souvent l'aveu de tout ce qu'il croyoit devoir à son heureuse situation, & combien elle avoit contribué à lui donner une vieillesse sans infirmités.

Plus on s'éloigne de cette situation heureuse où la richesse permet de se placer, pour tirer le plus grand parti de la vie & réunir tous les moyens de longévité, plus on voit se multiplier les accidens ou les causes d'insalubrité, d'où résulte une vieillesse précoce ou une mort prématurée. Malheureusement le plus grand nombre des professions & des métiers ne se borne pas à nuire à la santé par un emploi forcé, ou par une distribution inégale des forces de la vie; plusieurs font en outre accompagnés, dans leur exercice, de causes d'insalubrité très-actives, & de dangers qui apportent de grandes différences dans le bonheur, la santé & la durée moyenne de l'existence; ces inconvéniens, inséparables de la société, ne provient sûrement pas plus contre elle, que les volcans & les tempêtes contre la nature. Mais tout en faisant cette réflexion, comment ne pas s'affliger des maux réels & nombreux, attachés à la pratique de plusieurs arts & de plusieurs métiers qui empoisonnent ou abrègent la vie des hommes qui les exercent? Comment ne pas former des vœux sincères pour améliorer la condition de ces artisans, & en retirer au moins tout ce que l'indifférence, l'ignorance & les préjugés y laissent d'inconvéniens & de dangers?

Les métiers & les professions, considérés sous le rapport de leur danger & de leur insalubrité, peuvent être rapportés d'abord à deux grandes classes ou divisions; savoir :

1°. Les métiers ou les professions dont l'exercice n'est accompagné qu'accidentellement de dangers ou de circonstances nuisibles, qu'il est souvent possible d'éviter, au moins pour quelques-unes de ces professions : (le métier ou la profession de marin, de soldat, de pompier, de maçon, de couvreur, &c. &c. Voyez ces mots.)

2°. Les métiers ou les professions dont l'exercice est constamment ou habituellement accompagné d'un certain danger & de causes permanentes d'insalubrité. Ce sont principalement les professions & les métiers de cette classe qui modifient sensiblement la santé, & ont fait naître parmi ceux qui les exercent, des maladies particulières. Elles se rangent naturellement dans deux grandes sections; savoir :

1°. Les métiers ou professions qui exercent inégalement nos différens organes, qui peuvent en déformer, en affaiblir quelques-uns & déranger sensiblement l'ordre des fonctions : tels sont les arts mécaniques, ceux de jardinier, de vigneron, de coureur, de danseur, de tailleur, de cordonnier (1), dont Ramazzini a très-bien signalé les principaux dangers.

(1) Voir Scall, tom. I, pag. 231.

Telles sont aussi plusieurs parties des beaux-arts ou des professions libérales, celles d'orateur, de prédicateur (*voyez ces mots*), de comédien, de chanteur (1), la situation des gens de lettres, des gens du monde (2).

Du reste, il est facile de rapporter au petit nombre de titres suivans ces différentes professions :

1^{re}. Les **PROFESSEURS** qui demandent un exercice immodéré, ou un emploi continu des *membres supérieurs ou thoraciques*.

(Les métiers de rambur, de boulanger, de boucher, de tissier, de cordonnier, de tailleur, &c.)

2^{re}. Les **MÉTIER**s qui demandent un emploi disproportionné des *membres inférieurs ou abdominaux*.

(Les métiers de frotteur, de tourneur, des professions de danseur, de coreur, de chasseur, &c.)

3^{re}. Les **PROFESSEURS** dans lesquelles on fait principalement usage des *organes de la voix*.

(Les professions de chanteur, d'orateur, de prédicateur, de crieur de journaux, &c.)

4^{re}. Les **PROFESSEURS** dans l'exercice desquelles on fait un usage continu, & souvent forcé, du *sens de la vue*.

(Les ouvriers en petits objets, mais principalement les horlogers, les peintres en miniature, les graveurs, surtout les graveurs sur pierres fines.)

5^{re}. Les **PROFESSEURS** qui exigent un emploi immodéré ou du moins trop long-temps continué, du *cerveau considéré comme organe de facultés intellectuelles*.

(Les professions d'homme de lettres, de savant, d'artiste, des gens du monde, des gens d'affaires, &c.)

On pourrait admettre un sixième genre de professions, caractérisé par la disposition opposée à celle des professions du genre précédent, c'est-à-dire, par le défaut d'exercice, la nullité des facultés mentales, d'où résulte nécessairement un état très-voisin de la démence sénile, ou qui dispose à cette démence dans un âge encore très-avancé.

(L'état de berger, d'ouvriers employés aux machines, &c.)

Les métiers ou professions qui s'exercent dans une atmosphère nuisible, au milieu des matières pulvéreuses & très-divisées, ou de gaz & de vapeurs insalubres.

Ces professions, comme les précédentes, se rangent naturellement sous un petit nombre de titres, d'après des caractères tirés des différences du milieu où on les exerce; différences que nous rapportons aux articles suivans :

I. **OUVRIERS** qui travaillent au milieu des matières pulvéreuses plus ou moins irritantes, mais non vénéneuses.

(Les plâtriers, les chauxonniers, les lapidaires, les graveurs sur verre, les tailleurs & scieurs de pierre, les charbonniers, les meuniers, les amidonniers, les cardiers de laine, les plâtriers (1).)

II. **OUVRIERS** qui travaillent dans une atmosphère nuisible par son humidité.

(Les pêcheurs, les marins, les bateliers, les déchargeurs de bois, les blanchisseurs.)

III. **OUVRIERS** qui travaillent dans une atmosphère nuisible par un excès de chaleur rayonnante ou latente.

(Les forgerons, les maréchaux-ferrans, les verriers, les chauxonniers, les émailleurs, les faïenciers, plusieurs des artisans employés dans les ateliers de porcelaine, les baigneurs, les confiseurs, les distillateurs, les moissonneurs.)

Les effets d'une chaleur excessive, mais surtout d'une chaleur latente, à laquelle plusieurs ouvriers sont exposés, doivent être à la longue, & par habitude, beaucoup moins incommodes, surtout pour certains individus; ils peuvent même devenir, avec le temps, la condition d'une existence meilleure & d'une santé plus parfaite. En voici un exemple tiré de mon journal de médecine pratique.

Un homme d'environ quarante ans, me fut adressé dans le mois de juillet 1811, par M. Lebreton, alors secrétaire de la quatrième classe de l'Institut. C'était un ouvrier en apparent très-robuste, & dont l'état d'indisposition ou de maladie ne parut mériter toute son attention. Cet homme était foible, abattu; rien ne pouvoit le réchauffer ou le ranimer, & l'on avoit dit qu'il avoit constamment une fièvre de frisson fébrile, quoique son pouls donnât à peine cinquante-six ou cinquante-huit pulsations par minute. Cet homme passoit toutes les parties de la journée à chercher les lieux les plus exposés au soleil; & lorsqu'il se trouvoit à l'ombre ou dans une température au-dessous de 18 à 20 degrés, il éprouvoit une sensation de froid qui se manifestoit par le tremblement de tous ses membres. Un changement très-brusque & très-considérable dans la manière d'exister, me parut la véritable cause d'un état de maladie aussi extraordinaire.

Cet ouvrier s'étoit trouvé le seul sur quinze à vingt, que l'on avoit successivement éprouvés, qui pût résister sans aucune espèce d'effort ou de souffrance à la température de plus de 50 degrés, d'un atelier dans lequel on préparoit un vernis imperméable, dont l'usage & les applications sont

(1) Diemerbroeck s'est occupé en particulier des maladies des tailleurs de pierre, & des espèces d'inscriptions pierreuses que l'on trouve dans leurs gommages. Les maladies des ouvriers employés dans les carrières de Fontainebleau ont donné lieu aussi à quelques observations.

(1) Voyez Miquet.

(2) Voyez, dans l'art. MÉDECINE NATURELLE, nos observations sur les effets de la contention d'esprit.

Voyez aussi *passim*, l'article MORDES (Gens du).

aujourd'hui très-répondus. Il resta exposé pendant plusieurs mois, presque sans jamais sortir, à cette température, que l'habitude lui rendit à la longue presque nécessaire. La préparation de ce même vernis ayant été suspendue, cet ouvrier se trouva contraint de sortir de son espèce d'étuve, & quoiqu'il fit alors très-chaud, cette transition devint évidemment pour lui une cause de maladie.

Les boudiers rendus sudorifiques & toniques avec l'ammoniaque & l'usage de quelques stimulans diffusiles, qui furent employés pendant huit à dix jours, changèrent très-peu cette situation.

L'emploi successif d'un vomitif & de quelques purgatifs alloués aux toniques, qui paroissoient indiqués par un embarras gastrique & intestinal, eut sur elle en apparence beaucoup plus d'efficacité. Plus tard, l'état naturel fut à peu près rétabli, sans doute par l'effet d'une nouvelle habitude, & peut-être aussi par l'usage suivi & prolongé du quinquina que j'administrai dans cette circonstance, avec l'intention de rappeler à son mode d'action le développement des propriétés vitales, qui me parurent chez cet ouvrier dans un état habituel de décréation & d'obscuration.

IV. OUVRIERS qui travaillent dans un milieu rempli de vapeurs ou de molécules vénéneuses, soit arides, soit alcalines, soit végétales, minérales ou animales.

Ouvriers qui sont exposés aux vapeurs mercurielles, les doreurs au feu & sur métaux, les chapeliers, les émailleurs de glaces.

Les ouvriers qui manient les préparations de plomb, les plombiers, les broyeurs de couleur, les artisans qui sont exposés à des vapeurs acides, nitriques, sulfuriques, hydrochloriques, les fabricans d'acides, les blanchisseurs, les pharmaciens, les chimistes, les ouvriers employés dans les manufactures de lainage.

V. Les OUVRIERS qui travaillent dans un milieu où ils peuvent respirer des gaz délétères.

(Les mineurs, les brasseurs, les vidangeurs, &c.)

Nous avons déjà observé dans un de nos précédens articles (Tauxage de mercure), combien il étoit important d'appliquer au perfectionnement de certains métiers, dans l'intérêt de ceux qui les exercent & avec le sentiment de la plus sacrée philanthropie, les résultats & les données de tous les récents & les plus pénétrés des sciences naturelles.

Il ne seroit pas entièrement impossible d'opérer, au moins en partie, des moyens de secours ou de protection non moins efficaces, à plusieurs métiers ou professions qui se placent naturellement dans la même situation que celle des doreurs, des moineurs en œuvre, & en général de tous les ouvriers qui sont le plus exposés aux vapeurs mercurielles.

Un jeune médecin, M. Goffe, de Genève, s'est occupé avec autant de zèle que de succès, de cette partie importante de l'hygiène des professions.

Avant observé long-temps les différens appareils que l'on a proposés pour les enviers les plus exposés à des émanations irritantes ou vénéneuses, il s'est décidé pour un masque composé avec le tissu réticulaire élastique des éponges sèches (*spongia usitata*), aussi peu dispendieux qu'il est facile à mettre en usage.

Cet appareil spongieux doit se rapprocher de la forme conoïde, & se trouver assez large à sa base pour recouvrir le sommet du nez, la bouche & même le menton. Il importe qu'il soit appliqué de la manière la plus directe à toutes les parties du visage, ce que l'on obtient avec deux longs rubans de fil attachés en dehors sur les côtés de l'éponge, & qui, après s'être croisés derrière la tête, sont ramenés & liés au-devant de la bouche.

Dans les professions qui s'exercent au milieu de matières pulvérisées, il suffit d'humecter l'éponge avec de l'eau pure.

Les métiers de la même section, contre le danger de lesquels l'appareil de M. Goffe peut également s'employer avec avantage, présentent deux sous-divisions; savoir :

1°. Les métiers que l'on exerce dans un air d'une température trop basse ou trop élevée.

2°. Les métiers qui exposent les ouvriers à des gaz ou à des vapeurs délétères.

Dans la première sous-division nous trouvons tous les métiers, toutes les professions qui exposent constamment au froid ou à l'humidité, & celles qui forcent à supporter la chaleur des étuves, ou la réverbération d'un foyer ardent : (les doreurs au feu & sur métaux, les émailleurs de glaces, les laveurs de cendres, les constructeurs de baromètres, les verriers, les essayeurs, les fondeurs, les émailleurs, &c. &c.)

Dans la deuxième sous-division, on range aisément les fabricans d'acide nitrique, hydrochlorique, de chlore, d'eau de javelle, les blanchisseurs, les graveurs à l'eau-forte, les chimistes, les anatomistes, les fossioyeurs, les vidangeurs, &c.

Le même appareil convient dans tous ces cas. On substitue à l'eau une dissolution de carbonate de potasse, dans le cas de vapeurs acides, & l'eau acidulée dans le cas de vapeurs ammoniacales ou hydro-sulfurées. La dissolution d'acétate de plomb dans la proportion d'une once & demie pour deux livres d'eau, anroit des avantages particuliers, pour les vidangeurs.

M. Goffe propose en outre des montures de lunettes en éponge, pour se défendre contre le danger des professions qui attaquent d'une manière particulière les organes de la vue.

Ce jeune médecin, aussi courageux que savant, n'a pas craint de faire sur lui-même les expériences nécessaires pour le convier de l'avantage de ces différens appareils. Placé volontairement, pendant deux heures, dans le réduit insalubre de l'un des ouvriers que l'on désigne sous le nom de *faisleur de galls* (galleux), il put, à l'aide de ses lunettes &

de son masque d'éponge, voir, respirer sans aucune souffrance, au milieu de la poussière épaisse & irritante qui remplissoit cette misérable habitation, & dont le contact, lorsqu'il en ôté cet appareil pendant un seul instant, déterminoit aussitôt l'inflammation des fosses nasales & de l'arrière-bouche.

Il a trouvé ses expériences non moins concluantes, non moins positives, au milieu des vapeurs mercurielles, sulfureuses, &c.

Le masque d'éponge imbibé d'une solution d'acétate de plomb, & les lunettes d'éponge, le défendirent victorieusement dans une autre circonstance, contre les foudroyantes émanations du plomb, dans une fosse d'aisance; où il eut le courage de descendre au moment où deux ouvriers venoient d'en reconnoître le méphitisme.

Une seconde épreuve semblable, faillit lui pen plus tard, devenir funeste à ce courageux physicien; le préservatif dont il s'étoit muni, s'étant détaché au milieu du plus grand danger, & n'ayant pu être remplacé d'une manière assez exacte.

M. Goussier, dans cette circonstance vraiment périlleuse, éprouva tout-à-coup un léger vertige, ne put crier ni s'enfuir, & tomba asphyxié. Heureusement pour les sciences & pour l'humanité, qu'il fut retiré à temps de cet abîme, & reprit connoissance à l'air libre. La fosse d'aisance où il fit cette redoutable épreuve, étoit au troisième jour de la vidange, & lorsque l'y descendit, trois ouvriers venoient d'en être retirés, au moyen du bridage, dans un commencement d'asphyxie.

Les molécules du plomb, dont le terrible effet occasionne, provoque la maladie particulière que l'on a désignée sous le nom de *colique saturnine* ou *colique des peintres*, paroissent s'introduire dans quelques circonstances par les voies pulmonaires, & l'on pourroit alors s'en préserver au moyen des appareils de M. Goussier; mais le plus souvent ces molécules sont avalées: car les ouvriers qui manient les maîtres de plomb, perient souvent, par distraction, à leur bouche ou à leurs narines, leurs doigts ou tout autre objet pénétrés de ces molécules. (Foyez PLOMB (Colique de).) (L. J. M.)

MÉTIS. (*Anthropologie*.) De l'espagnol *mezcla*, venant lui-même du latin *mixtus*. Dénomination qui devoit appartenir à tout produit du croisement des races dans l'homme ou dans les animaux, & qui s'applique d'une manière plus particulière aux individus nés d'un Européen & d'une Indienne, ou d'un Indien & d'une Européenne.

L'anthropologie, ou l'histoire du genre humain, ne possède pas encore, dans l'état présent des connoissances, un ensemble d'observations & de recherches suffisamment étendu, sur les variétés, les qualités nouvelles d'organisation qui peuvent résulter du croisement des races, & fournir des données positives pour s'occuper quelque jour du perfectionnement physique de l'homme.

Quelles que soient du reste nos espérances à ce sujet, & dans la supposition du développement le plus étendu de la perfectibilité de l'homme, il est bien constaté, dans l'état présent des connoissances, que non-seulement les races diverses, mais aussi les différentes nations, les diverses castes ou familles ne peuvent être arrachées avec trop de soin, relativement au mariage, à l'isolement, que le préjugé ou l'habitude voudroient maintenir, & que l'extension toujours croissante des lumières & du commerce doit faire cesser entièrement.

Quant au croisement de ces nombreuses divisions & sous-divisions de la grande famille humaine, il offrira des résultats que l'on peut prévoir jusqu'à un certain point, d'après quelques faits déjà recueillis dans l'histoire des animaux domestiques, & même dans l'histoire de l'homme & dans la physiologie végétale.

Ainsi chacun des sexes, contribuant à la manière à la génération, devra exercer une influence différente sur de pareils résultats. Les produits des bœufs mérinos d'Espagne, par exemple, si on les accouple avec des brebis faucones, sont convertis d'une laine très-longue & très-fine; ce qui n'a pas lieu sur le produit du mélange des bœufs de Saède avec les brebis de race espagnole.

On a aussi observé que les lapins mâles, de couleur cendrée, avoient une progéniture du même poil, si on les accouple avec des femelles blanches ou tachetées de noir: observation qui, réunie à plusieurs faits analogues, avoit fait penser à Buffon que la couleur du pelage, chez les mâles, se transmettoit constamment par génération, ainsi que les formes & les dispositions extérieures.

Les belles recherches de Linné sur les plantes hybrides, paroissent étendre & confirmer cette loi de la nature vivante. En effet, ce célèbre naturaliste a reconnu & confirmé, par plusieurs expériences, que ces plantes qui naissent constamment de leur mère pour les organes du premier ordre, reçoivent de l'influence masculine les attributs moins essentiels, la forme, la couleur des fleurs & du feuillage ou des autres parties extérieures. On fait de plus que la dégradation des espèces commence à s'effectuer particulièrement par les femelles; que, parmi les maladies héréditaires, celles qui sont plus dangereuses & plus finesses paroissent se transmettre par la mère, & qu'enfin, dans les bêtes & dans toutes les circonstances où l'on cherche à perfectionner une espèce quelconque, le mâle est particulièrement chargé de donner la beauté du poil, la perfection des formes, la force & le ressort dans toutes les parties, l'activité & l'heureuse conformation des sens externes; en un mot, toutes les qualités qu'il se rapportent à l'extérieure & à la vie de relation.

Dans l'espèce humaine, les pères paroissent également influer davantage sur les mêmes qualités, sur la beauté, sur l'élégance de toutes les parties, tandis que la mère donne le tempérament,

la constitution physique, les penchans, les passions & tous les attributs qui émanent de la disposition des organes intérieurs & des principaux foyers de la vitalité.

Ces influences diverses sont en outre soumises à une foule de modifications, & varient peut-être suivant les circonstances dans lesquelles se trouvent les êtres pendant les instans rapides de leur union. Les causes de ces différences dans le cas où plusieurs femelles d'animaux sont tyranniquement livrées à un seul époux, n'ont point échappé à Buffon, qui les a regardées comme nuisibles à la vigueur & à la perfection des espèces. « C'est peut-être, comme le remarque cet illustre naturaliste, c'est peut-être par cette raison qu'il se trouve plus de monstres dans les animaux domestiques que dans les animaux sauvages, où le nombre des mâles qui concourent à la génération est aussi grand que celui des femelles; d'ailleurs, lorsqu'il n'y a qu'un mâle pour un grand nombre de femelles, elles n'ont pas la liberté de consulter leur goût; la gaieté, les plaisirs libres, les douces émotions leur sont enlevés; il ne reste rien de piquant dans leurs amours; elles souffrent de leurs larmes; elles languissent en attendant les froides approches d'un mâle qu'elles n'ont pas choisi, qui souvent ne leur convient pas, & qui toujours les flatte moins qu'un autre qui se seroit fait préférer; de ces tristes amours, de ces accouplemens sans goût, doivent naître des productions aussi tristes, des êtres aussi insipides, qui n'auront jamais le contour, ni la fertilité, ni la force que la nature n'a pu propager dans chaque espèce qu'en laissant à tous les individus les facultés tout entières, & surtout la liberté du choix, & même le hasard des rencontres (1). »

Ces diversités qui résultent d'un plaisir plus ou moins vif, & de la destruction d'un amour sans énergie, doivent avoir une influence encore plus marquée & plus sensible chez les mâles. En effet, l'emploi des organes masculins étant une sécrétion, ses résultats, comme tous ceux des opérations du même genre, dépendent nécessairement de la sensibilité des filtres actifs & animés, qui les effectuent; & si la salive est plus pénétrante, lorsque la saim ou la présence d'un aliment désiré en détermine une plus abondante sécrétion; si les larmes sont brillantes lorsqu'une douleur très-vive ou une irritation mécanique les fait couler; si plusieurs autres sécrétions s'excellent ou changent de nature, lorsque les organes font plus vivement excités, pourroit-on se refuser à penser que l'élaboration de la semence n'est pas soumise aux mêmes lois? que la liqueur prolifique qui est formée & versée pendant l'émotion rapide d'une volupté sans énergie, jouit des mêmes propriétés & exercera la même influence sur le germe, que celle qui s'élabore & qui est lancée dans les circonstances d'une ir-

ritation vive, d'une ardeur sans bornes & d'un ineffable plaisir? La quantité de matière que fournit le mâle, paroît aussi devoir apporter quelque différence dans l'influence paternelle, seroit-elle en supposant que la liqueur séminale agisse à la fois comme aliment & comme stimulant (1); & si, après avoir confirmé le résultat des expériences de Kohlreuter, on pense qu'il est possible de l'étendre à la génération de l'homme & des animaux (2).

(L. J. M.)

MÉTONOMASIE, f. f., de *μετα*, préposition qui indique le changement, & d'*ονμα*, nom, changement de nom. Plusieurs médecins du dix-septième siècle se livrèrent, comme les autres savans, à la métonomasie, & changèrent ou dénaturèrent leur nom, pour lui donner une apparence plus scientifique: c'est ainsi que Dubois appela *Sylvius*, Dumeslière, *Querquetanus*. Les membres de la Société des Curieux de la Nature portèrent beaucoup plus loin cette folie pédantesque, & substituèrent à leur nom propre, des noms anciens qui avoient plus ou moins d'analogie avec la direction de leurs travaux ou de leurs connoissances. (L. J. M.)

MÉTOPE, f. f., du grec *μετα*, au-dessus, & de *οψη*, oïl. La partie supérieure du visage, composée de parties osseuses ou immobiles, & de parties molles, savoir, des muscles & de la peau, dont les mouvemens, les rides, les plissures, les lignes, se rattachent à la physiologie en général, & à la physiologie médicale en particulier.

MÉTOSCOPIE, de *μετα*, devant, front, & de *σκοπος*, je regarde. On a désigné ainsi l'art prétendu de connoître les hommes & leur tempérament, par la conformation, les traits, les différens aspects du front, dans un temps où l'on portoit, dans ce genre d'observations, toutes les superstitions & les absurdités du mysticisme & de la philosophie corporelle. (L. J. M.)

MÉTOSCOPIE, f. f., *metoscopies*, de *μετα*, devant, front, & de *σκοπος*, je regarde. L'art de connoître le caractère des personnes par les différens aspects du front, que l'on prend souvent alors, & d'une manière figurée, pour l'ensemble du visage, comme dans ces vers :

Faut-il que sur le front d'un profane adulateur
Brille de la verve le sacré caractère?

Ou dans ces deux vers :

Qui goguant dans le crime une tranquille paix,
Qui se fait faire un front qui ne rougit jamais.

(1) Bonnet & le professeur Chaussier ont admis cette opinion.

(2) Kohlreuter a forcé ou diminué les ressemblances paternelles dans les plantes hybrides, en augmentant la quantité de la poussière fécondante.

(1) Buffon, Discours sur la génération des animaux.

L'étude physiognomique du front, à laquelle on s'est livré sous ce nom technique de *métoscopie*, avait bien moins pour objet d'ailleurs de reconnaître, par l'observation, les véritables rapports des altérations ou des changements quelconques de cette partie du visage, avec les maladies ou avec la prédominance de certaines affections morales, que la connexion chimérique de la configuration, de ses plis, du nombre & de la direction de ses lignes, avec la longévité & les événemens heureux ou malheureux que l'on vouloit rattacher à ces indications trompeuses. (Voyez MÉTÉOROLOGIE.)

Lavater lui-même, qui ne fut pas toujours respecter les limites de l'expérience ou de l'observation, convient qu'il y auroit de la folie à vouloir prédire, par les linéaments du front, les maladies & les mariages, l'amitié & la haine, ou les événemens les plus éloignés; tout en rapprochant du reste à Buffon, d'avoir confondu la physiognomie avec la métoscopie.

La disposition générale du front, sa structure, l'emploi de ses muscles dans l'expression de certaines passions, & son altération; les changemens dans plusieurs maladies, tels pourroient être les différens objets dont il faudroit successivement s'occuper dans une métoscopie pulsive ou physiologique. (L. J. M.)

MÉTOSE, f. f., *metosis*. Les oculistes ont désigné sous ce nom le premier degré de la constriction spasmodique de l'iris, qui augmentant progressivement, finit par s'opposer à l'accès des rayons lumineux. (M.)

MÉTRALGIE, f. f., *metralgia*, du grec *μητρα*, matrice, & de *αλγος*, douleur. Baldinger, qui le premier a fait usage de cette expression, l'emploie pour désigner indistinctement toute espèce de douleur de l'utérus, dans les différentes maladies qui peuvent attaquer cet organe, ou même dans l'exercice trop laborieux de ses fonctions.

Les douleurs qui se font ressentir à différens degrés dans ce dernier cas, suivent à l'époque des règles, pendant la grossesse, au moment & à la suite de l'accouchement. Pendant les règles, ces douleurs, que les femmes désignent souvent sous le nom de *coliques*, sont quelquefois très-vives, & donnent lieu à différens phénomènes sympathiques. Lorsqu'elles ne dépendent pas d'une pleurésie chronique, ou d'une autre maladie de l'utérus quelconque, ces douleurs cèdent presque toujours au repos, à la position horizontale, à des applications émollientes sur l'abdomen, mais surtout à l'emploi de lavemens par quart, avec de l'eau simple, à chaque verre un à chaque tasse de laquelle on ajoute, soit une demi-once de sirop de guaiacum soit dix à douze gouttes de laudanum, ou une grain d'extrait gommeux d'opium. J'ai, va souvent, dans ma pratique, ces mêmes douleurs prévenues ou sensiblement diminuées,

tantôt par l'application de huit à douze sangsues sur la région des lombes, tantôt par une saignée du bras d'une ou deux palettes, quatre ou cinq jours avant l'époque des règles.

Les douleurs pendant le travail de l'accouchement, qui sont évidemment le résultat des contractions de l'utérus, n'ont point reçu de nom particulier; on appelle *tranchées*, celles que les femmes éprouvent pour l'expulsion du placenta, & qui sont en général beaucoup plus vives dans une fausse couche que dans un accouchement.

Dans les cas de maladies, les douleurs de l'utérus ont différens caractères, différens degrés d'intensité dont l'expression fait partie des symptômes de ces maladies, comme on peut le voir aux mots HYSTÉRIE, MÉTRITE AIGUE, MÉTRITE CHRONIQUE & NÉVROSE, &c.

Dans certains cas d'hystérie, surtout à l'époque des règles, la métralgie acquiert souvent une grande intensité, & paroit dépendre d'une contraction vive & fondaine de l'utérus, qui s'étend au rectum, à la vessie & au canal de l'urètre; plusieurs femmes disent alors qu'elles éprouvent une grande difficulté pour uriner, & qu'elles ont du tenesme; elles croient sentir une action, un mouvement comme pour accoucher, ce qui est éprouvé aussi dans la métrite.

Dans un plus grand nombre de cas, la douleur qui semble dépendre d'un corps étranger, d'une boule qui descendroit ou comprimerait fortement l'utérus, remonte, soit sous la gorge, soit vers la poitrine, & semble faire étendre l'étranglement on la suffocation.

On a cru pouvoir être dirigé par la douleur, pour distinguer dans certains cas la métrite chronique de l'utérus avec ulcération, du squirrhe ou du cancer; distinctions d'ailleurs bien difficiles, & qui ne peuvent acquiescer une certaine valeur que lorsqu'elles sont confirmées par le toucher.

Dans l'état présent des connaissances, on devoit peut-être se borner à employer seulement cette dénomination pour désigner une réunion de symptômes qu'il seroit possible d'attribuer à une véritable métralgie utérine.

Quelques observations que j'ai recueillies dans ma pratique particulièrement me portent à penser que cette névralgie, qu'il ne faut pas confondre avec une névrose partielle de l'utérus, n'est pas sans exemple, & que les phénomènes qui en dépendent dans un petit nombre de circonstances, auroient sans doute été attribués à d'autres maladies. Nous appelons l'attention des médecins qui s'occupent spécialement de la médecine des femmes, sur ce point difficile & délicat de pratique, dont la discussion pourroit conduire sans doute à des résultats très-utiles. Du reste, parmi les femmes tourmentées de symptômes *métralgiques* indéterminés, toutes ne pourroient pas également être supposées atteintes de névralgie utérine; mais bien celles

qui ont éprouvé des affections rhumatismales chroniques, quelques accès de goutte, une sciaticque ou un tic douloureux, & dont les parens ont été cruellement tourmentés par des affections gouteuses.

Celui qui fait ces remarques, a rencontré dans sa pratique plusieurs de ces symptômes chez des femmes de complexion évidemment gouteuses, nées de parens affectés de rhumatismes constitutionnels ou de dispositions arthritiques, ou qui avoient éprouvé elles-mêmes antérieurement quelques atteintes de névralgie extérieure ou de rhumatisme. Madame la comtesse de ***, née d'un père d'une complexion profondément altérée par des maladies syphilitiques, ainsi que par des traitemens mercuriels répétés, & dont les autres enfans avoient succombé avant le temps à différentes affections organiques, avoit éprouvé au côté droit du bas-ventre, & à la partie inférieure, & à plusieurs reprises, une inflammation du tissu cellulaire sous-cutané, s'étendant jusqu'au péritoine, avec une violence qui rendoit toujours l'emploi des saignées indispensables. De reste, après la guérison, le côté étoit demeuré beaucoup plus sensible, plus irritabile, & paroissoit même le plus souvent dans un état de phlegmasie chronique, qui étoit au motif continuel de précaution de tout genre & des plus vives sollicitudes. Madame *** avoit alors à peine vingt-deux ans. Ayant quitté la France pour habiter un pays très-éloigné & beaucoup plus froid, sa complexion éprouva de grands changemens; le rhumatisme chronique survint dans cet état de choses; il se porta successivement d'abord sur plusieurs parties, & finit par se fixer sur l'épaule gauche, avec des alternatives d'impotences, simulant la paralysie, & de douleur très-vive, avec élanement, formation, & plutôt névralgique que rhumatismal.

Cette affection ayant disparu tout-à-coup & momentanément, madame *** ne tarda point à éprouver des douleurs très-vives à l'intérieur, plus fortes au moment des règles, sans écoulement, & toujours avec des exacerbations périodiques. Cette espèce d'irritation se calma dans la suite, mais il y succéda une impotence, une foiblesse telle, dans les ligamens suspenseurs de la matrice, que cet organe le trouva sensiblement abaissé au point de rendre tout exercice, mais surtout la station, impossible, ou du moins très-pénible. Madame *** étant revenue alors en France, le trouva de nouveau consisté à mes soins; l'abaissement de l'utérus & la foiblesse de ses ligamens étoient alors au point d'exiger, pour soutenir cet organe, l'emploi d'une éponge; mais ce moyen devint bientôt inutile, lorsqu'après un traitement convenable, dont les douches ascendantes avec l'eau de Barèges furent la partie principale, les organes dont l'impotence devoit être attribuée à l'affection névralgique ou rhumatismale, eurent recouvré toute leur force, & de telle façon que l'utérus se

trouva replacé & maintenu dans sa position naturelle. Dès ce moment toutes les inquiétudes que l'on avoit pu avoir de ce côté, se dissipèrent; mais l'ancienne affection rhumatismale revint, en alternant avec une céphalalgie frontale, dont la nature étoit évidemment névralgique. J'ai observé dans beaucoup d'autres cas, plusieurs symptômes de souffrances qui, sans pouvoir être attribués à une névrose locale de l'utérus, sembloient dépendre d'une illuxion rapide & douloureuse sur les nerfs de cet organe, éminemment liée à une affection chronique ou à une complication morbide de nature gouteuse; illuxion dont je ne suis jamais parvenu à éloigner ou à abrégier les retours presque toujours périodiques, que par les moyens de traitement qui ont été employés avec le plus d'avantage contre les névralgies externes (la lecture alcoolique de stramonium, les pilules d'aconit mercuriel, mais surtout les pilules dites de *Mégnin*, composées d'extract de jusquiame noire, de fleur de zinc & d'extract de valériane). (L. J. M.)

MÉTREMTHRAXIS, f. m., de *metra*, matrice, & du verbe *thraxo*, s'obstrue. Engorgement, obstruction de l'utérus, & principalement de son col, le plus ordinairement par un état squirrhieux, qui passe à l'état ulcéreux. (*Voyez* *UTÉRUS* (Cancer, altération cancéreuse de l').)

MÉTRENCHYTE, f. f., *metrenchÿtes*, de *metra*, matrice, de *en*, dans, & de *chÿs*, je verse.

Galien désignoit sous ce nom, un instrument particulier, une espèce de seringue destinée à faire des injections dans la matrice. (*Methodus medendi*, chap. V, lib. 5.)

Cet instrument, dont Sculiet a donné un bon dessin, ne pourroit d'ailleurs être employé que dans le cas où l'utérus auroit acquis une certaine ampliation dans un état morbide. On lui substitue, sous le nom de *douches ascendantes*, avec avantage, dans les cas où ce développement n'existe pas, & pour calmer une affection douloureuse ou inflammatoire, un bain intérieur, une lotion permanente ou prolongée: moyen dont on fait un grand usage dans l'établissement des bains d'eaux minérales salines de MM. Paul & Triayre, de Paris.

METRETES, *metreta*, genus rasis constans ex duobus butis, de *metra*. Instrument employé par Galien, pour désigner une sorte de mètre contenant, servant l'évaluation du savant Budée, soixante feillers. (*Voyez* lib. II de *Ass.*)

MÉTRIOPATHIE, de *metris*, modéré, & de *patia*, passion, affection. On a doublé, dans la féminine, ce nom, qui n'est plus employé, à un individu qui sentent ou modère la passion & les souffrances.

MÉTRITE, f. f., metritis, de metra, matrice; auquel la terminaison *itis* ajoute la signification d'une douleur vive & pressante.

C'est le nom que l'on donne en médecine à l'inflammation du tissu propre de l'utérus, pour la distinguer de l'inflammation de la surface interne, avec augmentation de sécrétion muqueuse (catarrhe utérin) & de la péritonite.

Le siège de la maladie que l'on s'attache à caractériser sous le nom de *metritis*, n'est pas indiqué d'une manière exacte dans un grand nombre d'observations & de descriptions antérieures à l'époque actuelle des connoissances. Le plus ordinairement, la surface interne & le tissu propre sont affectés, sans qu'il soit possible d'indiquer celle de ces deux parties qui a été la première le siège de l'irritation. L'affection de la face interne est plus évidente dans la métrite chronique, ou même dans la métrite aiguë, qui n'est pas subite & qui se montre dans un concours de circonstances propres à favoriser le développement des affections catarrhales : opinion que nous aurons incessamment l'occasion de rappeler, en parlant de l'écoulement & des fausses membranes de l'utérus, dans les cas d'inflammation chronique & latente de cet organe.

Les recherches anatomiques qui répandent beaucoup de lumière sur le siège de la métrite, présentent en outre plusieurs résultats fort intéressants sur son étendue, le nombre & la gravité des lésions qui sont les suites de la maladie : ils font connoître en général, que dans la métrite très-intense, les parois de l'utérus sont plus gonflées, plus remplies de sang, mais d'une manière inégale dans les différents points de son tissu, tandis qu'il présente d'autres signes de lésion, des trous, des déchirures, des adhérences, des taches noirâtres ou charbonneuses, suivant que la métrite s'est terminée par suppuration immédiate ou par gangrène.

La métrite ne peut être convenablement connue que par un examen de sa marche & de ses formes dans l'état aigu, & dans l'état chronique, qui succède quelquefois à l'état aigu.

La *metritis aiguë* survient quelquefois sans cause connue, ou à la suite de causes légères ou indéterminées, qui anéantissent ou excitent toute autre maladie inflammatoire. Ainsi, dans certains cas, elle se manifeste à la suite d'une impression subite de froid sec ou de froid humide, de l'ingestion d'un liquide glacé, le corps étant échauffé & en sueur, d'une émotion vive & soudaine, d'un accès de frayeur ou de colère. Quelquefois aussi l'interception intempérive d'un état hémorrhoidaire, d'un catarrhe urétral ou d'une affection dartreuse, est suivie d'une métrite, sans qu'il soit possible de prononcer rigoureusement sur le rapport de cause & d'effet entre ces deux ordres de phénomènes. Les causes plus directes sont : l'irritation, l'excitement de l'utérus, les injections abstringentes ou stimulantes par la vulve, l'usage intempérif, exagéré

des relations conjuguées, surtout si la matrice est un peu basse & s'il existe une disproportion entre les organes de l'homme & ceux de la femme. Les coups, les chutes par le régime de l'hypogastre (Ponstus, de uteri inflammatione), les déchirures plus ou moins considérables de l'utérus, les lésions pour extirper les polypes, enfin l'irritation mécanique du même organe, soit pour provoquer l'avortement dans les vues les plus réprouvables, soit pour extraire l'enfant dans le cas d'un accouchement artificiel, qui ne peut se terminer qu'avec le forceps ou les crochets.

Les médecins & les chirurgiens qui se sont spécialement occupés de l'art des accouchemens & des maladies des femmes, ont rapporté plusieurs exemples de métrite évidemment provoquée par les causes directes & immédiates d'irritation que nous venons d'énumérer. Les exemples de cette maladie, dans un concours de causes prédisposantes & de causes extérieures, mais éloignées, sont beaucoup plus rares ; voici une observation tirée de notre pratique particulière, qui paraît mériter quelque attention.

Madame ***, âgée de cinquante ans, d'une complexion lymphatique, qui depuis quelque temps s'étoit sensiblement développée, en présentant tous les caractères d'un état morbide, avoit eu alternativement, depuis six mois, des engorgemens lymphatiques du sein très-étendus & des fleurs blanches très-abondantes, que l'on paroissoit traiter avec succès par les préparations toniques que l'on désigne vulgairement sous le nom d'*antiscorbutiques*. Ayant été exposée au froid humide pendant quelque temps, elle éprouva tout à-coup des douleurs très-vives dans toute l'étendue du bas-ventre, des nausées, des vomissemens. Appelé alors pour lui donner ses soins, j'observai ce qui suit :

La malade éprouvoit une douleur gravative très-forte au-dessus du pubis ; il lui sembloit continuellement que l'utérus étoit vivement porté en bas & avec des douleurs & des mouvemens comme pour accoucher. Il y avoit en même temps du tenesme, de la difficulté pour uriner, une douleur très-vive avec impression de chaleur à la région du sacrum, des tiraillemens, des palpitations musculaires dans toute l'étendue des lombes ; enfin, on pressoit constamment dans toutes les parties de l'abdomen, mais surtout de l'estomac, dont la sensibilité & l'irritabilité étoient augmentées au point de faire craindre qu'il étoit le siège de la maladie, si l'on n'avoit pas apporté la plus grande attention dans la marche & la combinaison des symptômes. Tous ces phénomènes annonçoient d'ailleurs par la façon, par le plus léger mouvement, mais surtout par la suite d'efforts, soit pour uriner ; soit pour aller à la garde-robe. On reconnoit par là, toucher, qu'il y avoit une douleur, beaucoup de chaleur, de gonflement au vagin, une tuméfaction très-prodruite & une augmentation de consistance & de sensibilité du col de l'utérus, qui étoit évidemment le siège de

l'inflammation qui occupoit la paroi postérieure du même organe.

Madame *** fut aussitôt saignée du bras, avec une apparence de soulagement qui fut augmenté par une application de vingt sangsues aux grandes lèvres, d'une heure après la saignée; on joignit à ce moyen les applications émollientes, le repos, la position horizontale, & l'emploi des bains renouvelés deux fois par jour & soutenus chaque fois pendant deux heures.

Dès le quatrième jour les symptômes, mais surtout les symptômes consécutifs, eurent beaucoup moins d'intensité; le fluxième, les douleurs locales devinrent aussi beaucoup moins vives, & il survint un écoulement féreux qui augmenta de consistance le jour suivant, & qui cessa du onzième au quatorzième jour, époque à laquelle la maladie fut entièrement terminée.

Dans d'autres circonstances j'ai vu la métrite résulter de l'essai, quoique très-moderé, des relations conjugales chez les femmes d'une complexion morbide, qui avoient eu antérieurement des fleurs blanches, des éruptions fréquentes de furoncles, des ophthalmies très-opiniâtres, & toujours dans certaines conditions où l'organe le plus excité semble devoir tout-à-coup le centre d'une fluxion acrimonieuse & constitutionnelle.

La métrite aiguë se manifeste tout-à-coup dans certains cas, & sans causes bien connues; dans d'autres circonstances elle survient au contraire progressivement, avec de longs préludes, & sous l'influence d'une cause bien connue & dont les effets ne se développent entièrement qu'après avoir occasionné quelques indispositions assez équivoques. Lorsque la maladie se termine par résolution, elle ne va guère au-delà du quatorzième jour; elle se prolonge indéfiniment, lorsqu'elle se termine par suppuration, ou lorsqu'elle se prolonge sous la forme de métrite chronique ou de métrite latente, en donnant lieu, dans ce dernier cas, à un appareil, à une combinaison d'infirmités & de souffrances, sur la véritable nature desquelles il est quelquefois bien difficile d'établir une opinion.

Les phénomènes consécutifs ou sympathiques sont observés quelquefois les premiers, surtout chez les femmes très-nervées & très-irritables; ce qui peut donner lieu à des méprises très-dangereuses de la part des médecins assez peu éclairés, ou assez peu exercés pour ne pas découvrir la véritable origine de ces symptômes.

Ces symptômes consécutifs sont principalement l'état fébrile, caractérisé par un pouls fréquent & dur, qui se développe par la saignée, le froid des extrémités, une irritabilité extrême de l'estomac, des nausées, des vomissemens, des distensions gazeuses de cet organe.

Madame la vicomtesse *** me fit appeler il y a deux ans, pour lui donner des soins; elle éprouvoit une partie de ces symptômes depuis quinze jours; son estomac ne pouvoit recevoir aucune espèce de

nourriture sans lui donner des angoisses, des envies de vomir, des renvois d'alimens & beaucoup d'oppression. Un médecin auquel on avoit déjà demandé du secours, n'avoit vu dans ces différents symptômes, qu'une débilité & un embarras gastrique; il avoit administré au vomitif & du quinquina sous différentes formes: ce qui avoit aggravé la maladie au point de faire désirer d'autres conseils à madame de ***. A ma première & à ma seconde visite, je portai toute mon attention du côté de l'estomac, qui me parut toutefois plus irrité qu'affaibli & embarrasé par un résultat de sécrétion morbide. Je prescrivis en conséquence un bain chaud de deux heures, l'eau de chaux à la dose de deux onces dans un véhicule adoucissant, & les alimens liquides très-légers pour toute nourriture. Ce traitement eut quelque apparence de succès; je fis alors un examen plus étendu de la maladie, & reconnoissant que la région du pubis étoit très-douloureuse, que cette douleur s'étendoit au-delà de l'ombilic, aux lombes, à la partie supérieure des cuisses, avec des tiraillemens, des pulsations musculaires, & une sensation de pesanteur très-incommode, surtout dans la station; je demandai une consultation avec un médecin accoucheur, pour reconnoître d'une manière positive l'état du vagin & de l'utérus. Ce que j'avois soupçonné en faisant cette démarche, fut bientôt confirmé, & le toucher nous fit connoître, à M. Gardien & à moi, un engorgement inflammatoire très-considérable du vagin, engorgement qui s'étendoit au col de l'utérus & à la paroi postérieure de cet organe, en donnant lieu aux différents phénomènes consécutifs auxquels on avoit voulu rapporter toutes les indications. La maladie fut traitée dès-lors en conséquence de cet examen; l'inflammation n'ayant pas d'ailleurs beaucoup d'intensité, on se borna aux applications émollientes, aux bains, aux injections prolongées par la valve, que l'on désigne si improprement sous le nom de *douches ascendantes*: l'eau de chaux fut d'ailleurs continuée, & on y joignit avec succès quelques doses de magnésie; dès le troisième jour, les symptômes avoient sensiblement diminué; le quatrième, il y eut un écoulement très-abondant de matière glauqueuse: écoulement qui se prolongea pendant quelques jours, qui diminua ensuite graduellement, avec les autres phénomènes de la maladie, dont il ne resta aucune trace, dix à douze jours après l'emploi du traitement établi sur notre consultation.

SYMPTÔMES PRIMITIFS OU ESSENTIELS.

Les symptômes primitifs ou essentiels qui se montrent d'une manière moins équivoque dans la plupart des autres cas de métrite, sont principalement des douleurs gravatives fortes, avec sentiment de contraction de l'utérus, & comme pour accoucher; une tension, une chaleur, une sensibilité

brûlé augmentée dans la région hypogastrique; un écoulement fœmieux ou rougeâtre par les parties fésselles, précédé de douleurs aux lombes & à l'hypogastre, dépendant des contractions de l'utérus, & que les femmes comparent aux tranchées pour l'expulsion du délivre. Du reste, la souffrance & l'iritation s'étendent plus ou moins, suivant la partie de la matrice qui est le siège de l'inflammation. Elles se font ressentir aux lombes, à la vulve, au périnée, & quelquefois à toute l'étendue des membres abdominaux. Il y a du tenesme, des épreintes, une grande difficulté d'uriner; les mamelles, quoique plus souvent douloureuses ou du moins très-sensibles, s'altèrent le plus ordinairement. Lorsque la douleur se propage jusque dans la région ombilicale, & que cette région acquiert un degré de sensibilité telle qu'on ne puisse la toucher, il est probable que la métrite affecte plus particulièrement le fond de l'utérus.

Dans la circonstance où la paroi postérieure seroit principalement le siège du même état morbide, il y auroit constamment pesant, douleur dans les lombes, affection congestive du rectum, difficulté ou presque impossibilité d'aller à la garde-robe. Dans le cas contraire, l'émission des urines seroit très-difficile; il y auroit strangurie & douleur constante à la région du pubis. On reconnoît par le toucher, la chaleur plus ou moins vive de l'utérus, le développement de cet organe, la dureté & son extrême sensibilité.

Diagnostic. Tous les phénomènes que nous venons d'énumérer, & l'ordre suivant lequel ils se succèdent ou se combinent, paroissent en laisser aucun doute sur le caractère de la maladie dont ils sont les symptômes. Il existe cependant quelques fois beaucoup d'obscurité & d'incertitude dans certains cas de métrite moins prononcée, ou qui arrive surtout lorsque l'inflammation n'est pas très-forte, lorsqu'elle est compliquée, ou qu'elle se développe chez des sujets peu irritables ou trop irritables, avec un défaut ou une exagération de phénomènes congestifs, qui peuvent aisément égarer l'observateur. Les maladies avec lesquelles on seroit d'ailleurs plus exposé à la confondre, sont l'hyssérie, la péri-tonite puerpérale & le catarrhe utérin.

Dans la péri-tonite, le toucher ne fait reconnoître ordinairement aucun changement notable dans les dispositions du vagin, du col de l'utérus & de la matrice elle-même. Les phénomènes congestifs ont plus d'étendue & une apparence de gravité plus marquée, comme on le voit par l'œdème, les nausées, les vomissements, le hoquet.

La douleur gravative, comme pour aller à la garde-robe, ou comme pour accoucher, n'a pas lieu; d'une autre part, cette même douleur ne se manifeste pas dans un simple catarrhe utérin, dont l'intensité, la marche, les effets congestifs sont ordinairement assez marqués pour dissiper toute incertitude. Il ne faudroit cependant pas l'at-

tacher d'une manière trop exclusive à ce défaut de douleur gravative dans le catarrhe utérin, pendant la durée duquel plusieurs femmes ne l'ont éprouvée que lorsque le catarrhe avoit une certaine intensité, & furent lorsqu'il avoit été augmenté par des injections toniques ou astringentes, sans donner lieu néanmoins à aucun symptôme de métrite; anomalie dont ma pratique particulière m'a fait rencontrer différents exemples.

L'hyssérie, qui succède quelquefois aux suites de couches, seroit la seule variété de cette maladie que l'on pourroit confondre avec la métrite; mais on évitera aisément toute méprise à cet égard, en observant que, dans le cas d'hyssérie, la compression, l'attouchement du bas-ventre, ne font pas douloureux.

Les développemens de la métrite aigüe sont plus ou moins rapides; il n'est pas sans exemple qu'elle soit devenue mortelle du troisième au quatrième jour: lorsque cette maladie se termine par résolution, c'est ordinairement du troisième au quatrième jour; dans le cas où l'on peut s'attendre à cette terminaison, les symptômes, après être parvenus à un haut degré d'intensité, restent stationnaires ou se calment. Les phénomènes congestifs surtout, diminuent sensiblement, les urines deviennent moins rouges, & si la maladie s'est développée chez une femme en couche, les lochies se rétablissent, tandis que les mamelles d'abord enflées, deviennent plus sensibles, se gonflent & sécrètent une certaine quantité de lait.

On trouve dans les traités généraux & dans les recueils particuliers d'observations, plusieurs exemples de terminaison de la métrite par suppuration; ce que l'on doit craindre lorsque la maladie conserve toute son intensité, après avoir duré plus de quatorze jours, surtout si le bas-ventre est ballonné & comme empli, & s'il survient des douleurs pulsatives, des lancemens vifs, que l'on peut attribuer à l'accumulation du pus dans l'utérus.

On reconnoît du reste que le siège de la douleur & des lancemens se trouve, soit au pubis, soit au rectum, soit du côté de l'ombilic, soit sur les cuisses, & jusqu'à l'aîne, suivant que la suppuration se forme à la partie antérieure du l'utérus, à son fond ou sur quelques points de ses parois latérales.

Le pus s'écoule, soit par le vagin, après s'être ouvert une issue par l'intérieur même de l'utérus, soit par le rectum, la vessie, l'utère, suivant qu'il s'établit des adhérences entre ces parties & la matrice.

Les auteurs qui ont écrit sur les maladies des femmes, citent des exemples d'abcès formés dans les cas de métrite, sur les différents points de l'abdomen, à l'aîne, du côté du nombril, ce qui arrive lorsque le pus dont il s'est fait une collection, parvient à se porter au dehors de l'utérus. Le cas le plus fâcheux est celui dans lequel le pus se répand dans l'intérieur de l'abdomen.

On conçoit aisément que la métrite, en se terminant par suppuration, & même de la manière la plus favorable, donne lieu à une série de symptômes qui ont une certaine durée, & qui se présentent avec toutes les apparences d'une nouvelle maladie.

La terminaison par gangrène, qui survient le plus ordinairement depuis le quatrième jusqu'à un douzième jour, dépend bien moins de la violence de l'inflammation, que de la nature & de l'état général des forces chez la malade. C'est surtout à la suite d'un accouchement dont le travail a été long & difficile, lorsque la matrice a été distendue outre mesure, & surtout si, pour calmer son état nerveux, on a abusé des narcotiques, que l'on doit craindre cette terminaison par gangrène. Elle s'annonce le plus ordinairement pour le médecin délégué, avec des symptômes qui paroissent d'ailleurs donner de la sécurité sur la situation de la malade.

Tel est le cas dont Levret a fait connaître toutes les circonstances. Une femme qu'il avoit accouchée, & qui le fit appeler neuf jours après son accouchement, commençoit à trouver une grande diminution dans l'état de souffrance & de douleur qu'elle avoit éprouvée, ayant d'ailleurs une suppression de loches, avec météorisme, & avec écoulement d'une matière sanguinolente, d'une odeur cadavéreuse. Le savant accoucheur porta le pronostic le plus fâcheux, contre l'opinion des assistants, & la malade mourut en effet le lendemain, après un accès de délire.

On a aussi admis une terminaison par induration, dont les signes présentent en général beaucoup d'incertitude; elle terminaison beaucoup plus fréquente est celle de la métrite aiguë en métrite chronique. Nous manquons de données physiologiques & d'observations cliniques & complètes, par des ouvertures de corps, pour reconnaître jusqu'à quel point différentes lésions organiques de l'utérus, mais surtout les squirrhes, les polypes, l'hydrométrie, les hydatides, les moles, &c., ont des rapports avec une inflammation antérieure de l'intérus, soit aiguë, soit chronique.

Le traitement que réclame la métrite aiguë, doit être modifié comme celui de toutes les autres maladies graves, d'après une foule de circonstances particulières qu'il est impossible d'indiquer dans des considérations générales; les évacuations sanguines surmontent d'ailleurs la partie essentielle du traitement; on saigne d'abord du bras, & plusieurs fois, à des époques même très rapprochées si la maladie est forte, par exemple, si la maladie est très-violente, & si le pouls, loin de s'affaiblir, se développe pendant la saignée ou après la saignée; Hoffmann, dans ces cas, préféroit la saignée du bras, la saignée du pied, qui de reste ne seroit plus particulièrement indiquée que dans un cas de coexistence de métrite avec la suppression des règles.

Les ventouses scarifiées, & dont Aetius faisoit usage, l'application des sangsues à la vulve, surtout dans le cas de métrite à la suite des couches; à l'anus, dans le cas d'hémorroides supprimées; sous les mamelles, pour opérer une espèce de dérivation, ne conviennent pas moins que la saignée générale, surtout lorsque cette dernière a été employée avec avantage. On joint à ce moyen les bains, les demi-bains, les fomentations émollientes sur le bas-ventre; les bains de vapeurs, les lavemens émollients par quart (*fractis dosibus*), le régime le plus sévère, enfin le repos le plus absolu & la position horizontale. Lorsque ce spasme augmente par toute espèce de mouvements & par la plus légère émotion, on sjoita avec un grand fœtus une demi-once, ou même une once de sirop d'acide, dans cinq à six onces d'une décoction mucilagineuse, donnée en lavement, pour être gardée au moins pendant deux ou deux heures; ce que l'on peut renouveler deux & même trois fois dans les vingt-quatre heures, avec la précaution de faire succéder immédiatement un de ces petits lavemens au premier, si celui-ci avoit été rendu presque aussitôt qu'il avoit été pris.

Quelques praticiens n'ont pas employé sans quelque succès, chez les femmes très-affaiblies, les vésicatoires placés sur différents points de l'abdomen, seulement dans le dessein de changer le foyer d'irritation.

Lorsque la métrite, mais surtout la métrite des femmes en couche, s'étend au-delà de douze à quinze jours, en conservant une grande intensité, & si en même temps les forces de la femme s'épuisent dans un concours de circonstances propres à faire croire à un épanchement de pus dans l'utérus, les maîtres de l'art conseillent l'application de deux vésicatoires aux jambes, & même de cataplasmes sinapisés aux pieds, dans l'espoir toutefois bien incertain, d'opérer une dérivation. Dans le cas de complication avec une fièvre bilieuse ou malarique, soit avec une fièvre putride ou une fièvre ataxique, plusieurs indications fondamentales se tirent de la nature de ces maladies.

La complication de la métrite avec la péritonite, ce qui n'a guère lieu que chez les femmes en couche, ou à la suite d'une fausse couche, ou dans le cas d'un avortement provoqué par des causes mécaniques, la maladie est beaucoup plus grave, sans offrir de nouvelles indications.

Dans le cas de terminaison par suppuration, & si l'abcès se présente vers les parois du ventre, on donne le conseil de l'ouvrir avant la complète maturité, afin de s'appuyer aigüé un épanchement de pus dans la cavité abdominale; on recommande les injections détensives, lorsque le pus s'étant frayé une route de dehors en dedans, s'échappe, soit par l'isthme, soit par la vulve, soit par la verge & la cavité même de l'utérus.

La métrite chronique peut être la suite d'une métrite aiguë qui s'est terminée d'une manière incomplète, soit par l'effet d'un traitement peu rationnel, soit par une disposition inhérente à la femme atteinte de cette maladie. Dans l'une & l'autre circonstance, la métrite chronique parcourt lentement les périodes, quelquefois même d'une manière latente, & peut être suivie d'affections squirrheuses & cancéreuses. Il se présente à ce sujet une question que l'état des connoissances ne permet pas de résoudre, & vers l'examen de laquelle il importe d'appeler l'attention des praticiens.

La métrite chronique peut-elle indifféremment, & par l'effet d'un traitement irrationnel, amener des affections squirrheuses ou cancéreuses de l'utérus? La phlegmasia qui est suivie de ces affections, n'a-t-elle pas un caractère particulier, ne doit-elle pas conduire d'une manière presque certaine à ce triste dénouement, par l'effet inévitable d'une prédisposition cancéreuse, soit héréditaire, soit acquise, qui n'attend pour ainsi dire qu'une occasion pour s'emparer d'un organe quelconque, au moment où il devient un centre d'irritation ou de fluxion?

Nous avouerons que nous serions portés à répondre par l'affirmative, d'après un certain nombre de faits qui toutefois ne nous paroissent pas suffisants pour établir une opinion. Quoi qu'il en soit, nous serons remarquer que c'est principalement au moment de l'âge critique, & chez les femmes que l'on peut supposer atteintes d'une prédisposition cancéreuse, sur lesquelles on a déjà porté son attention, que la métrite chronique, loin de se terminer par un traitement convenable, dégénère insensiblement en un carcinome de l'utérus; nous ajouterons que dans ces circonstances, comme dans le développement du cancer de la mamelle, les femmes attribuent une altération aussi grave à des causes légères & souvent plus éloignées, à des coups, à une chute, à des douleurs, à un écoulement maigreux ou séreux, à des suites de couches, &c. &c.

Du reste, la métrite chronique reconnoît les mêmes causes immédiates ou directes que la métrite aiguë, dont il seroit inutile de faire une nouvelle énumération. On peut regarder en outre comme des causes qui la produisent plus souvent que la métrite aiguë, une infection syphilitique négligée & dégénérée en constitution morbide, des fleurs blanches très-âpres & entretenues par une irritation habituelle, l'abus des astringens & des toniques en injection, l'interruption brusque & intempestive d'une dartre, de la gale, & enfin cette prédisposition cancéreuse dont nous avons parlé, & dont les premiers développemens doivent amener nécessairement une métrite particulière & caractéristique, par son incurabilité, du moins dans l'état présent des connoissances médicales.

Dans le cas où la métrite chronique succède à

la métrite aiguë, celle-ci peut, jusqu'à un certain point, être regardée comme la cause de la première. Dans certaines circonstances, une métrite d'abord très-vive se prolonge au-delà du terme d'une maladie aiguë, & devient une affection chronique, presque sans rien perdre de sa primitive intensité; je donne des soins à une dame qui s'est trouvée dans cette situation.

Cette dame, madame de C^{***}, âgée de 35 ans, d'une complexion rachitique, & remarquable par une mobilité nerveuse excessive, avoit eu assez habituellement un retour de règles tous les quinze jours, depuis une fausse couche qu'elle avoit faite il y avoit environ quinze ans; ce retour de règles, beaucoup plus douloureux que les règles elles-mêmes, durait deux ou trois jours, & consistoit dans un écoulement séreux & sanguin, accompagné de douleurs dans les lombes & dans toute l'étendue de la partie interne des cuisses. Il manquoit quelquefois, lorsque la santé devenoit tout-à-coup meilleure, surtout à la campagne & pendant les voyages. Au commencement de février dernier, cette dame fit une fausse couche, environ quinze ans après celle dont nous avons parlé; à la suite de cette fausse couche, qui fut très-longue, très-pénible, il survint une hémorrhagie éminemment active, & qui ne fut arrêtée que par la saignée.

Madame de C^{***} continua ensuite de souffrir; elle avoit de l'insomnie, son état fébrile augmentoit le soir, & un trouble nerveux, surtout dans l'étendue du bas-ventre. Un demi-lavement émollient ayant été administré, on s'aperçut que le poids du liquide déposé dans l'intestin augmentoit sensiblement ce trouble; & qu'en outre la malade éprouvoit constamment de la douleur, de la chaleur à la région du sacrum, de la douleur; mais sans chaleur à l'hypogastre, une sensibilité extrême dans toute cette région: ensemble de symptômes qui augmentoit à l'approche des règles, & que la station, les mouvements même dans le lit, les efforts pour aller à la garde-robe, rendoient parfois insupportables.

On reconnoît par le toucher une légère prééminence de l'utérus, qui fut attribuée aux spasmes de l'abdomen, une fluxion inflammatoire de cet organe & du vagin peñin un gonflement également inflammatoire & beaucoup plus considérable du rectum.

L'enduit trois mois la maladie a parcouru ses périodes, tantôt avec des exacerbations, tantôt avec des rémissions faibles, jusqu'à ce que les phénomènes généraux en eussent fait.

À la suite de la dernière menstruation (vers le milieu du mois de mai), la même malade, qui, depuis quelques jours, étoit beaucoup moins vive, se montra avec un redoublement très-fort, & qui sembla dès-lors éloigner toute idée d'une guérison prochaine.

Un nouvel emploi des bains très-prolongés & répétés, concurremment avec des quarts de lavemens opiacés, & donnés soir & matin, éloigna ces craintes & rétablit l'état naturel des choses. Les quarts de lavemens opiacés, loin d'occasionner la coagulation comme on devoit s'y attendre, favorisèrent, en diminuant le spasme abdominal, une excrétion très-abondante de matières glaireuses & muqueuses, & même de portions de fausses membranes, qui ne permirent pas de douter que le catarrhe inflammatoire du rectum s'étoit étendu jusque dans les autres parties du gros intestin. Cette excrétion a été comme critique, & depuis ce moment madame C*** a pu marcher, se tenir debout, aller à la garde-robe, sans occasionner aucun redoublement sensible dans les douleurs, générales & locales, dont nous avons parlé.

Dans le plus grand nombre des cas, la métrite chronique est plus latente, plus insidieuse, on ne paroît à'annoncer que par des phénomènes confusifs, dont il est facile & fréquent de méconnoître la véritable nature : ses phénomènes confusifs & très fréquents, sont la coagulation, les urines troubles, l'irritabilité de l'estomac, un développement exagéré de sensibilité & de mobilité nerveuse, ou quelques symptômes d'hystérisme, tels que le météorisme abdominal, l'oppression, le sentiment d'un corps étranger qui se place au milieu de la poitrine, ou s'élève jusqu'à la région du col, les battemens nerveux du cœur, les palpitations épigastriques : symptômes que l'on ne rencontre pas toujours à la vérité dans les hémorrhies, mais qui se manifestent le plus ordinairement en totalité ou en partie, chez les femmes d'une classe plus élevée, & par cela même plus disposées, par la délicatesse de l'organisation & l'étendue de l'existence morale, au développement des phénomènes sympathiques. Les symptômes qui peuvent faire reconnoître la véritable origine de ces phénomènes confusifs, & que l'observateur a ne les placez que sur le deuxième plan du tableau de la maladie, sont principalement la douleur grave, tirée à la partie inférieure du bas-ventre, se propageant vers le rectum & le col de la vessie, des douleurs sourdes aux lombes, à l'aîne, aux hanches, aux cuisses, s'irradiant dans la menstruation, quelquefois même des hémorrhagies, &c. &c.

Dans ces cas il est difficile de ne pas reconnoître une métrite; on se confirme dans ce diagnostic par le toucher qui est toujours très-douloureux, & qui fait découvrir une augmentation de volume de l'utérus, beaucoup de solidité & de chaleur à son col, mais moins de résistance & beaucoup plus de douleur que dans le carcinome de cette partie.

La maladie, dans cette situation, parcourt plus ou moins lentement ses différentes périodes; les symptômes qui lui sont propres deviennent de plus

en plus évidens; ils font beaucoup plus vite sentir que les règles ont manqué, ou si elles ont été moins abondantes; ils augmentent aux approches de la menstruation; quelquefois aussi ils semblent se suspendre ou abandonner les voies utérines, & la maladie ne se manifeste plus que par des phénomènes confusifs, tels que des douleurs vives à la région hypogastrique, une autre douleur au larynx, le clou hystrérique, une névrose gastrique qui permet à peine de prendre quelques alimens. Lorsque la maladie est plus avancée, l'utérus est assez développé pour faire saillie à la partie inférieure du bas-ventre, qui est beaucoup plus tendu & plus douloureux.

La métrite chronique se prolonge quelquefois pendant plusieurs mois, & même pendant quelques années. J'ai donné mes soins à une jeune dame écotole, & d'une complexion scrophuleuse, chez laquelle une semblable affiction, qui avoit été l'effet des premières relations conjugales, ne s'est entièrement terminée qu'après quatre années de souffrances & d'infirmité, qui auroient en sans doute l'issue la plus funeste, si on ne les avoit pas combattues pendant tout ce temps par un traitement efficace, & fondé sur les notions les plus exactes de la nature de cette maladie. Plusieurs indications doivent servir de base à un pareil traitement, dans les différens cas de métrite; celles qui portent à conseiller la saignée du bras, quelque temps avant les règles, ou les sangsues, soit à l'anus, soit à la vulve, si la menstruation n'a pas été assez abondante, peuvent être placées au premier rang.

Les bains, & surtout les bains gelatineux, les fomentations, les applications émollientes, les ablutions intérieures & prolongées, à l'aide d'un appareil particulier, & désigné vulgairement sous le nom de *douche ascendante*, sont également indiqués; en a proposé en outre des injections nasotiques par le vagin, dans les cas où les douleurs seroient trop vives, & accompagnées de tension & d'une commotion spasmodique plus ou moins forte de l'abdomen; mais ce moyen produit en général beaucoup plus d'effet dans ces cas, sous forme de lavemens à petites doses (*fractus doctus*), ainsi que la pratique nous l'a souvent démontré.

Lorsque les symptômes inflammatoires sont dissipés en grande partie, & que l'action morbide de l'utérus persiste sans douleurs vives, il convient de faire usage des eaux hydrominérales sous forme de bains généraux & de bains intérieurs & particuliers, appelés *douches ascendantes*; c'est principalement dans cette circonstance que l'un & l'autre vaient les eaux minérales de Greonle en Provence. Le traitement du recte doit être modifié dans les cas de complexion morbide, rhumatismale, dartreuse, syphilitique, cancéreuse, &c. &c.

Nous pourrions donner notre article sur la métrite à ce petit nombre de considérations, mais il nous paroîtroit incomplet si nous n'y joignons

par entre quelques remarques sur la métrite lente, qui s'étend le plus ordinairement à la surface interne de l'utérus, avec une augmentation d'exaltation qui donne lieu à des concrétions molles, & même à de faibles membranes, dont les praticiens qui les ont observées les premiers, étoient loin de soupçonner la véritable source & la véritable nature.

Un médecin de Lyon (Collob), dont les œuvres médico-chirurgicales furent imprimées en 1793, décrit ces faibles membranes qui se présentent à son observation, sous le titre du renversement de la membrane interne de la matrice & de son orifice. Une dame âgée de trente-deux ans, dit cet auteur, au lieu du sphincter de la matrice, avoit une tumeur oblongue, flottant dans le vagin, dont le corps étoit de la grosseur d'un œuf de pigeon, compaëte & uni à sa base. Le col de cette tumeur étoit allongé & souple, & on distinguoit, dans l'épaisseur de ses parois, un grand nombre de fibres tendineuses & ligamenteuses.

Cette tumeur, continue l'auteur, sortoit en partie de la vulve, lorsque la malade se tenoit quelque temps sur ses pieds; elle ressembloit alors un poids inquiétant, des douleurs vives dans le bas-ventre, des maux de cœur & d'abordement général de ses forces; elle n'éprouvoit aucun mal lorsqu'elle étoit étendue ou dans son lit; enfin, elle avoit une perte blanche très-abondante, souvent fanguinolente, & les règles tous les mois.

Collob pensa que cette tumeur étoit formée par le renversement de la membrane interne de la matrice; Pouteau fils & Florant, qui furent aussi consultés, n'adoptèrent pas cette opinion, & ils regardèrent la tumeur comme une excroissance polypéale qu'il falloit extirper.

L'opération fut faite par la ligature, avec un fil d'argent, suivant le procédé de Levret. La malade ressentit alors une petite douleur qui se renouveloit toutes les fois qu'on resserroit la ligature, & cette douleur s'étendoit dans le bas-ventre & sur la partie inférieure externe des cuisses, avec des maux de cœur & des convulsions spasmodiques dans les membres, pendant deux ou trois heures.

La tumeur étoit entièrement tombée le dix-neuvième jour après l'opération; on en fit l'ouverture en présence de Pouteau fils & Florant, & ils furent convaincus, dit l'auteur, que la partie extirpée n'étoit point un polype, mais une tumeur formée par le renversement de la membrane interne de la matrice, & de son orifice dédoublé comme je l'ai vu annoncer.

La malade rétablit parfaitement, n'eut plus de perte blanche, ni ses règles, & elle a joui d'une bonne santé.

Dans la seconde observation, il s'agit d'une jeune dame d'un tempérament vif, mariée depuis cinq ans, sans avoir eu d'enfants. Après

avoir pris beaucoup de bains domestiques, elle alla à Aix en Savoie, où en loi administra des douches, non-seulement sur la région lombaire, mais encore dans l'intérieur, par le moyen d'une espèce d'entonnoir. Après la douzième douche, cette dame s'aperçut de la chute de la tumeur sur le bord de la vulve; elle y ressentit un poids incommode, des douleurs dans le bas-ventre, & un mal-aise général lorsqu'elle agissoit; il lui survint aussi une perte blanche abondante, souvent fanguinolente, & des accès de vapeurs dont elle étoit vivement affectée. Cet état duroit depuis environ deux ans, lorsqu'elle consulta Collob. En l'examinant, il trouva dans le vagin, au lieu du sphincter de la matrice, une tumeur oblongue, dont la base étoit de la grosseur d'un œuf de pigeon, arrondie, compaëte & unie, le culépais, allongé & souple, & en y distinguoit faiblement des fillets tendineux & ligamenteux dans l'épaisseur de ses parois.

Pouteau père & Garnier, qui furent appelés, reconnurent, dit l'auteur, le renversement de la membrane interne de la matrice & de son orifice, & l'impossibilité d'en faire la réduction; enfin, la nécessité de l'extirpation étant bien constatée, l'auteur fit la ligature de la tumeur; la malade éprouva, comme dans le cas précédent, quelques accès qui cessèrent le dix-neuvième jour, par la chute de la tumeur, & depuis ce temps elle n'eut plus de vapeurs ni perte blanche, & quoiqu'elle n'eût plus ses règles, la santé n'a point été altérée.

Enfin, dans la troisième observation, il s'agit d'une jeune dame qui, après un accouchement long & laborieux, éprouva un poids incommode à l'entrée de la vulve, lorsqu'elle étoit quelque temps sur ses pieds; elle avoit en outre des douleurs dans le bas-ventre, de petits maux de cœur & une perte blanche abondante, souvent fanguinolente, & cet état duroit depuis environ deux ans. En l'examinant avec M. Bouëher, l'auteur trouva dans le vagin, à la place du sphincter de la matrice, une tumeur oblongue, de la grosseur d'une moyenne noix, compaëte & unie à sa base. Le col étoit épais, allongé & souple, tenant au corps de la matrice; on distinguoit faiblement entre ses parois, les fillets tendineux & ligamenteux qui formeront auparavant le sphincter de la matrice avant qu'il fut dédoublé. Quoi qu'il en soit, on fit la ligature de la tumeur comme dans les cas précédents; l'opération eut les mêmes succès; la malade n'eut plus de perte blanche ni ses règles, & elle a joui d'une bonne santé.

Tel est, dit M. le professeur Chassier (1), qui a examiné en quelque sorte ces observations pour faire connaître la véritable nature des phéno-

(1) Chassier, Nouveau Traité des hémorrhagies de l'utérus, par M^{re} Boivin.

mêmes qui en font l'objet ; tel est le précié des faits rapportés par Collomb. Nous n'en contestons pas la vérité, mais ils sont incomplètement décrits, & l'explication qu'il en donne ne nous paroît pas conforme à la texture, à la véritable disposition des parties. En effet, comme nous avons tâché de le faire voir, la cavité de l'utérus n'est point, comme celle des autres viscères creux, tapissée par une membrane distincte de son tissu propre, & que l'on puisse en séparer, par la dissection ou la macération ; en admettant même, comme on le croit encore assez généralement, l'existence de cette membrane intérieure, quelle cause, quelle puissance pourroit en déterminer la séparation ? Si l'on admet, comme semble l'indiquer Collomb, que les contractions lentes & graduelles de l'utérus peuvent opérer le dédoublement & l'expulsion de la membrane interne, la ténacité qui se prolonge dans le vagin doit conserver le caractère, les propriétés de la membrane qui la forme : ainsi elle doit être sensible, douloureuse, surtout par le toucher, la pression des doigts ; on doit aussi y apercevoir des traces d'organisation, des ramifications vasculaires. Enfin, le prolongement membraneux tel qu'on le suppose, forme nécessairement un sac conoïde, adhérent par son sommet au col de l'utérus, & dont la cavité doit contenir un fluide, soit sanguin ou séreux ou puriforme : & toutes ces circonstances si importantes pour déterminer la nature de la tumeur, ont échappé à Collomb ; au moins il n'en fait aucune mention, ce qui laisse quelques incertitudes sur cet objet.

« Cependant, en rapprochant les circonstances principales, énoncées dans les cas rapportés par Collomb, & les comparant avec ce que nous avons eu l'occasion d'observer, il nous paroît que ces tumeurs appendues à l'orifice de l'utérus, étoient uniquement des concrétions conuenues, accidentelles. Toutes se ressembloit par la forme, le volume, la consistance, le mode d'implantation à l'orifice de l'utérus. Il est cependant une différence que nous devons remarquer. »

Il est probable, suivant le même observateur (1), qu'une prétendue occlusion de l'utérus qui se seroit opposée à l'accouchement, & que l'on auroit été obligé de détruire par une incision, devoit être attribuée à une concrétion membranoïde, qui se seroit formée dans l'utérus pendant la grossesse & en auroit fait adhérer les bords. Quoi qu'il en soit, l'état de phlegmasie latente qui donne lieu à ces membranes, se prononce davantage à chaque menstruation, & alors produit des douleurs très-vives ; ce qu'on a observé quelquefois chez plusieurs femmes, qu'une pareille disposition rend le plus ordinairement fécondes.

Les femmes dont nous parlons, & dont l'existence est si péniblement modifiée par les effets d'une

inflammation lente de l'utérus, éprouvent habituellement un sentiment vague & obscur de souffrance dans toute l'étendue du bassin, accompagné de phénomènes consécutifs, qui détournent le plus souvent les observateurs de la véritable cause de ces phénomènes. Ce même sentiment devient beaucoup plus incommode au moment des règles, qui sont habituellement précédées, accompagnées, suivies de pesanteur dans le bassin, de tirailllements dans les lombes & à l'aïce de chaque côté, de douleurs aiguës à la région de l'utérus, & d'une sécrétion morbidité à la surface interne de cet organe. Le plus ordinairement, le produit de cette sécrétion, après avoir acquis une légère consistance, est mêlé & entraîné avec l'excrétion menstruelle, qui présente quelquefois, dans cette circonstance, des floccus & des lambeaux membranoïdes. Dans d'autres cas, qui sont beaucoup moins nombreux, & lorsque la phlegmasie latente a plus d'intensité, le produit de la sécrétion morbide a plus de consistance, & se montre sous les différentes formes que nous venons d'indiquer, & dont la nature ne fut pas reconnue par les observateurs qui en firent l'objet de leur attention. « Alors, dit M. le professeur Chaussier (1), la concrétion conuenue, formée & modelée dans la cavité de l'utérus, peut se détacher, être expulsée en entier, ou bien cette concrétion conuenue, décollée de la cavité de l'utérus, mais encore adhérente à son col, & poussée par le sang qui s'accumule à chaque époque menstruelle, s'insinue dans l'orifice, se prolonge dans le vagin & y forme une tumeur plus ou moins saillante, qui a l'apparence d'un polype. Nous en avons vu un cas très-remarquable. »

« Une jeune femme, d'un tempérament ardent, après quelques abus érotiques, se crut enceinte, parce que ses menstrues étoient supprimées depuis deux mois. Parvenue au troisième mois, elle éprouva les symptômes qui lui annonçoient ordinairement le retour des menstrues ; cependant il n'y eut aucune excrétion, & comme elle se plaignoit beaucoup de douleurs, de spasmes, & surtout d'un sentiment de pesanteur inaccoutumée, je fus appelé avec un de mes collègues. En examinant l'état des parties, nous trouvâmes l'utérus abaissé dans l'excavation pelvienne ; son orifice ouvert, élargi, donnoit passage à une sorte de tumeur molle, lisse, indolente, qui avoit la forme, la grosseur d'une figue ordinaire, dont le sommet allongé, rétréci, paroissoit adhérent, implanté au pourtour intérieur du col & de l'orifice de l'utérus ; mais, en tirant légèrement cette tumeur, que l'on pouvoit facilement saisir avec deux doigts, elle s'allongea peu à peu & se détacha tout-à-coup entièrement, & sans causer aucune douleur. Nous reconnûmes alors de la manière la plus évidente, que ce corps n'étoit

(1) Chaussier, *Traité des hémorrhagies utérines*, par M^{re} Boivin.

(1) *Traité des hémorrhagies de l'utérus*, par M^{re} Boivin.

qu'un sac concave, épais d'un millimètre, dont la cavité étoit remplie d'un sang brunâtre à demi fluide; sa forme étoit exactement celle de l'utérus, mais renversé. Sa base, ou la portion saillante dans le vagin, étoit large, arrondie; son pédicule, ou le point adhérent au col ou à l'orifice de l'utérus, étoit allongé, tubulé & garni à son extrémité, de franges ou petits lambeaux de forme inégale; enfin, son tissu dense, compacte, blancâtre, uniforme dans toute son étendue, ne présentait aucune apparence fibreuse ni aréolaire, aucune trace de ramifications vasculaires, & se dissolvait entièrement dans une liqueur alcaline. Il nous parut donc que cette concrétion convenue, après s'être d'abord formée, modelée dans la cavité de l'utérus, en avoit été peu à peu décollée ou détachée: 1^o. par l'humour perspiratoire qui se forme & s'exhale sans cesse à la face interne de l'utérus; 2^o. par l'impulsion & l'accumulation du sang qui devoit s'écouler à chaque époque menstruelle; & comme, lors de notre visite, la tumeur ne tenoit plus qu'au col & à l'orifice de l'utérus, les tractions légères que nous fîmes dans cet examen, en ont achevé la séparation: opération que la nature auroit peut-être faite par la suite.

Aussitôt après l'extraction ou décollement de ce sac membraneux, il s'écoula quelques cuillerées de sang brunâtre; les douleurs, les spasmes ont entièrement cessé, les membranes ont repris leur cours habituel, & la jeune femme n'a éprouvé aucun accident.

Plusieurs de nos lecteurs penseroient peut-être que l'ensemble des phénomènes que nous venons de décrire, auroit trouvé plus convenablement sa place dans l'article CATARRHE UTERIN. Toutefois la maladie que l'on désigne si improprement sous ce nom, affecte principalement la membrane muqueuse du vagin, & en s'étendant à peine jusqu'au col de l'utérus, au-delà duquel on n'a découvert jusqu'à ce jour aucune trace de membrane muqueuse; cette maladie diffère assez de celle que nous venons de décrire, pour qu'il soit inutile de comprendre cette dernière dans cette histoire.

Quoi qu'il en soit, cette maladie présente, & seulement à un plus faible degré, toutes les indications qu'il importe de remplir dans le traitement de la métrite chronique, savoir: quelques évacuations sanguines, six à huit jours avant la menstruation; une petite saignée du bras, par exemple; si la femme est jeune & sanguine, les applications de sangsues ou de ventouses scarifiées, dans la région des lombes, les bains, les demi-bains, le régime le plus doux, l'éloignement de toutes les causes d'irritation, mais surtout le séjour prolongé à la campagne, dans le cas où l'inflammation dont nous parlons paraîtroit entretenue, ou du moins augmentée, par le trouble des passions & le désordre d'une vie trop mondaine & trop agitée.

(L. J. N.)

MÉTROMANIE. Ce mot qui sert à désigner, dans l'acception la plus ordinaire, la fureur poétique, le goût passionné pour la versification, a d'abord été employé par les médecins, & indiqué dans son sens primitif & étymologique, la fureur utérine ou la nymphomanie. (Voyez ces mots.)

MÉTROPROPTOSE. Mot à mot, *providence de l'utérus, pariparturient*, id est *providens uteri*, suivant Castelli. (Voyez PROCTIDEM & UTERUS.)

MÉTRORRHAGIE. T. f. de *metra*, *matrice*, & de *rrhago*, *je romps*: cette affection ne doit pas être confondue avec la *ménorrhagie*. On désigne sous ce dernier nom un écoulement de règles trop abondantes, trop fréquentes ou trop prolongées, sans avoir un véritable caractère hémorrhagique, sans fournir un sang véritablement artériel & coagulable.

La *métrorrhagie*, avec laquelle il ne faut pas la confondre, indique au contraire toute hémorrhagie de l'utérus interne ou externe, produite par des circonstances liées à l'accouchement & désignées alors sous le nom de *perles* (voyez ce mot), ou indépendantes de cette fonction.

Les différentes espèces d'hémorrhagies utérines ont été divisées par quelques médecins, d'après de vues beaucoup plus spéculatives que pratiques. C'est ainsi que les uns ont voulu reconnaître des hémorrhagies artérielles, actives, passives & spasmodiques; d'autres, des hémorrhagies de même nature, par pléthore générale & par pléthore locale; d'autres enfin, des hémorrhagies pléthoriques, symptomatiques, accidentelles, latentes, lochiales (1).

Les hémorrhagies utérines, sans y comprendre les pertes ou les hémorrhagies qui se produisent de la vulve ou de l'accouchement, forment elles-mêmes une véritable maladie, ou doivent être regardées comme le symptôme, l'effet consécutif d'une autre affection morbide quelconque, mais principalement des polypes utérins & des affections encéphales.

On peut donc les ramener à deux divisions principales, savoir: les *métrorrhagies essentielles* & les *métrorrhagies symptomatiques* ou consécutives.

Chez les femmes qui succombent à des hémorrhagies utérines qui ne paroissent avoir aucun rapport avec une lésion organique antérieure, souvent on n'aperçoit aucune altération de tissu dans l'utérus; quelquefois seulement la surface interne de cet organe est plus rouge que dans l'état naturel, comme injectée, spongieuse, mais sans rupture ni écartement de ses fibres.

Quelle est la source, quel est le mode de l'écoulement sanguin dans les hémorrhagies utérines?

(1) Voyez la Nosophie naturelle de M. Alibert.

Le vulgaire ne conçoit pas ordinairement un pécil écoulement sans une rupture, une déchirure des vaisseaux sanguins. Cette lésion n'est pas impossible sans doute, & lorsqu'elle arrive, elle occasionne des hémorrhagies particulières & par lésion physique des vaisseaux (1). Quelquefois aussi ce même écoulement peut avoir lieu, lorsqu'à la suite de l'accouchement, les sinus utérins ne se resserrent pas comme il convient pendant les contractions de la matrice, & ce qui occasionne une métorrhagie passive & dépendante des lochies, dont nous aurons l'occasion de parler. Mais, le plus ordinairement, les hémorrhagies utérines, comme toutes les hémorrhagies, sont le produit d'une véritable exhalation sanguine, pouvant dépendre en même temps d'une irritation vasculaire ou d'une pléthore, soit partielle, soit générale.

Ce petit nombre de considérations nous paroît convenir d'une manière générale aux différentes espèces de métorrhagies qu'il importe d'étudier séparément, & en les rapportant aux divisions principales que nous avons indiquées; savoir :

1°. Les hémorrhagies utérines essentielles.

2°. Les hémorrhagies utérines, symptomatiques ou consécutives.

Les hémorrhagies utérines essentielles peuvent être distinguées, comme toutes les hémorrhagies, en *passives* & en *actives*.

Les hémorrhagies actives sont produites par toutes les causes qui peuvent occasionner subitement, ou entretenir avec plus ou moins de durée une irritation vive & une congestion sanguine du col de l'utérus. L'impression du froid peut être au nombre de ces causes, parmi lesquelles on doit compter au premier rang, la suppression d'une hémorrhagie habituelle, la gérison intempestive des hémorroides, mais surtout la cessation des règles chez les femmes de quarante à cinquante ans, l'excitement local des parties génitales, par l'abus & l'aberration des plaisirs.

On compte parmi les causes de ces mêmes hémorrhagies, l'effet stimulant du gaz acide carbonique, la chaleur, les odeurs stimulantes ou *sanguines*, principalement pour les femmes nerveuses ou se trouvant dans l'âge critique, la compression de l'abdomen, l'irritation intérieure de l'utérus dépendante d'un catarrhe utérin, l'irritation du même organe par des causes mécaniques, par la présence d'un pessaire, par exemple, l'injection de substances irritantes, l'usage des plaisirs solitaires, l'introduction & le frottement d'un corps étranger dans ce dessein, l'abus ou l'usage prématuré des plaisirs de l'amour (2).

Nous devons dire encore qu'il n'est pas sans exemple, que des causes morales, un accès de

colère, une terreur soudaine, ou même une joie également excessive & subite, aient occasionné une métorrhagie active.

La marche de cette hémorrhagie est le plus ordinairement aiguë & rapide, quelquefois plus lente, moins forte, & pouvant occasionner, lorsqu'elle n'est pas convenablement traitée, une péritonite, sur la nature de laquelle il est facile de se méprendre. Cette même hémorrhagie arrive quelquefois d'une manière brusque; quelquefois elle est précédée ou accompagnée de légers, d'horripilations, de la concentration ou de l'accélération du pouls. Les femmes disent alors qu'elles éprouvent une douleur gravative à la région de l'utérus, la sensation d'un gonflement aux hypochondres, d'engourdissement à l'aine de chaque côté, un sentiment de chaleur dans le bassin. Le plus léger excitements physique ou moral augmente d'ailleurs ces hémorrhagies.

On traite avec succès les hémorrhagies actives de l'utérus, par la saignée du bras, l'application des ventouses sur la région des lombes ou de l'abdomen, l'application des sangsues à la partie inférieure de l'avant-bras de chaque côté, pour opérer une dérivation, que l'on augmente par l'immersion des mêmes parties, dans une eau très-chaude & légèrement stimulante. On favorise l'usage de ces moyens, & on pourroit même les remplacer jusqu'à un certain point, par la diète la plus sévère, le repos le plus absolu, la suspension de toutes les impressions, la position horizontale, les dérivatifs, mais surtout les bains de bras, dont nous venons de parler.

Ni l'expérience, ni la théorie, ne paroissent appuyer le conseil que l'on attribue à Hippocrate, d'employer l'application des ventouses sur le sein, dans les hémorrhagies utérines, comme un moyen très-efficace. La ligature des membres, recommandée par Galien, nous paroît sans utilité. Les vomitifs, que Stoll dit avoir employés avec succès dans certains cas de complications d'hémorrhagie active de l'utérus, avec l'embarras gastrique, ne peuvent agir, dans ces cas, qu'à la manière des autres dérivatifs, & en changeant à la fois le centre de fluxion & d'irritation.

Les hémorrhagies essentielles de l'utérus, qui surviennent pendant le temps critique, chez les femmes sanguines ou nerveuses, présentent quelques indications particulières : elles se manifestent quelquefois avec les apparences d'une simple métorrhagie, & peuvent être traitées alors sans l'usage de la saignée : dans d'autres circonstances, elles exigent l'emploi de ce moyen.

Lorsque l'on peut craindre leur retour, & qu'elles tendent à la périodicité, on doit chercher à les prévenir par le régime, l'éloignement de toutes les causes stimulantes, même les saignées de précaution, les purgatives salines & qui s'appliquent à une surface étendue de la membrane muqueuse intestinale.

(1) Voyez *Thèses de Paris*, n°. 40, 1817 & le n°. 22, la *Dissertation de M. Bozz*.

(2) Tels sont ici l'exemple d'une jeune fille qui succomba à une métorrhagie provoquée par un semblable accès.

Il seroit possible que les hémorrhagies actives de l'utérus présentassent une grande intensité par l'effet de leurs complications avec un état spasmodique; ce qui indiqueroit, si l'on parvenoit à le reconnoître, l'association du mufc, de la valériane ou même de l'opium, avec les évacuations sanguines; ce fut sans doute dans le cas d'une pareille complication, qu'Hoffmann employa cette méthode avec beaucoup d'avantage, & que l'on pourroit suivre le conseil donné d'ailleurs par Robert Thomas, d'une manière trop générale.

Les hémorrhagies passives, ou plutôt les hémorrhagies adynamiques, n'ont pas lieu sans doute par l'inertie, par le relâchement atonique de l'orifice des vaisseaux capillaires de l'utérus, mais sont accompagnées ou précédées d'un état de faiblesse qui les entretient, & qui indique l'emploi des toniques les plus efficaces. Les femmes qui s'y trouvent le plus exposées, ont éprouvé pendant long-temps l'effet de plusieurs causes débilitantes. Leur complexion s'est affoiblie, dégradée; l'appareil vasculaire sanguin surtout, est dépourvu de réaction & d'énergie comme on le reconnoît par la faiblesse du pouls, la pâleur du visage, la flaccidité des chairs & toutes les apparences d'une adynamie scorbutique. Ces hémorrhagies surviennent ordinairement sans aucune cause occasionnelle, sans aucun signe d'indisposition générale ou de réaction; elles sont en général très-opiniâtres, & augmentent sensiblement par les évacuations sanguines, auxquelles on a trop souvent recours, surtout dans les cas de complication ou d'incertitude. Lorsqu'on ne parvient pas à les arrêter, elles augmentent nécessairement la faiblesse générale, & amènent à la longue une adynamie partielle & un ramollissement de l'utérus qui peut se terminer par la gangrène.

Nous évitons à dessein, dans ces considérations rapides, de traiter la grande question de savoir si l'on doit admettre dans toute la rigueur de l'expression, des hémorrhagies véritablement passives; renvoyant ce point de théorie, sur lequel M. Broussais a récemment appelé l'attention des médecins, à l'examen général des hémorrhagies. Voyez SANS, SANGUINES (Maladies), VASCULAIRES (Lésions du système).

Les hémorrhagies adynamiques de l'utérus sont celles qui indiquent plus particulièrement les toniques astringens, l'eau de Rabel, l'alun, la gomme kino, la noix de galle, le cachou, en un mot, tous les médicaments contenant du tannin & des principes aromatiques.

Dans l'écoulement sanguin qui survient deux ou trois jours après l'accouchement, d'une manière trop considérable, & avec tous les caractères d'une métrorrhagie adynamique, j'ai employé plusieurs fois, avec succès, l'eau de Rabel, jusqu'au point d'une acidité, soit acerbée, soit agréablement développée, dans une eau de riz, ou dans une décoction de grande confonde aromatisée avec la cannelle.

MÉDECINE. Tome II.

Dans plusieurs cas analogues, & lorsque la métrorrhagie étoit éminemment adynamique & sans aucune complication, j'ai fait souvent usage, avec succès, de la potion préparée d'après la formule suivante:

℥. Eau de menthe.....	℥. a.....	℥. iij
de mélisse.....	℥. a.....	℥. iij
Teinture de cannelle.....		℥. iij
Sirop de menthe.....		℥. iij
Pierre hématite.....		℥. iij

Donner de ce mélange trois cuillerées tous les quarts d'heure.

On pourroit ajouter, au besoin, quelques gouttes d'eau de Rabel ou d'alcool de tannin.

La racine de rathania donnée en substance, en décoction, en teinture & pour remplir les mêmes indications, a produit souvent les effets les plus prompts & les plus efficaces.

Dans le cas où l'hémorrhagie paroîtroit prolongée, & par adynamie & par une sorte d'aberration des propriétés vitales, tournée en habitude, la quinquina rouge, soit seul, soit combiné avec l'opium, pourroit conduire à des résultats que l'on n'auroit pas obtenus de toute autre médication; enfin, les lotions froides, glacées, mais surtout l'application soutenue d'une certaine quantité de glace, renfermée avec soin dans une vessie, sur la partie inférieure du bas-ventre ou sur le périéc, ont fait cesser des hémorrhagies passives que l'on avoit essayé vainement d'arrêter par d'autres moyens de traitement, ainsi que peut l'assurer l'auteur de cet article, d'après la pratique particulière.

Dans les hémorrhagies passives de l'utérus, qui sont excessives ou qui résistent aux moyens de traitement les plus énergiques, quelques praticiens ont fait usage d'injections toniques & astringentes. On cite à cet égard l'exemple de Gaïen, qui employa sous cette forme la décoction de feuilles de plantain, & celui de Prosper Alpin qui mit en usage la décoction vineuse de l'acacia d'Arabie. M. Koock, de Bruxelles, a infusé, dans ces derniers cas, sur l'usage de ce moyen, qui du reste doit être employé six à huit fois par jour, & de manière à faire parvenir le liquide injecté jusque dans l'utérus. (Voyez MÉTRORRHYEES.)

Hémorrhagies consécutives de l'utérus.

Ces hémorrhagies consécutives ou symptomatiques sont assez fréquentes; il est de la plus haute importance de ne pas se méprendre sur leur véritable nature.

La métrite aiguë, mais surtout la métrite chronique, ou même le gonflement inflammatoire de la membrane muqueuse du vagin ou du col, ont occasionné plusieurs fois ces hémorrhagies consécutives. J'ai donné récemment des soins à une femme de quarante à cinquante ans, chez laquelle

M

une hémorrhagie de l'utérus étoit prolongée pendant plusieurs mois dans une de ces circonstances, c'est-à-dire, avec une inflammation chronique de l'utérus, dont le col adhéroit, dans toute sa circonférence, avec les parois du vagin, à la suite de cette inflammation.

Plus récemment j'ai été consulté sur un cas de métrorrhagie qui se prolonge depuis le mois de juillet dernier, & qui paroît également dépendre d'une cause analogue, d'une affection de l'utérus, dont le diagnostic présente toutefois quelque incertitude, mais qui semble cependant se rapporter à une affection plutôt inflammatoire que cancéreuse : des douleurs très-vives, des symptômes consécutifs très-étendus s'étant manifestés dès le commencement de la maladie, ce qui n'arrive pas ordinairement au début des lésions cancéreuses du même organe. Dans d'autres circonstances dont je pourrois également citer des exemples, une hémorrhagie utérine se montre avec toutes les apparences d'une hémorrhagie active, au début d'une plegmasie, soit de la surface interne de l'utérus, soit de la membrane muqueuse du rectum, à la suite d'une fausse couche, dont le travail a été très-long & très-difficile.

On a observé quelquefois des hémorrhagies consécutives de l'utérus, dans les fièvres inflammatoires ou dans d'autres maladies aiguës, avec toutes les apparences d'une véritable crise. Quelques fois seulement, & dans ce cas, les règles avançant de plusieurs jours, sont beaucoup plus abondantes, & paroissent contribuer à terminer la maladie.

La métrorrhagie symptomatique, dans la circonstance d'ulcération de l'utérus, est ordinairement plus abondante, & se montre sous la forme d'un écoulement de matières sanguinolentes & purulentes, accompagné d'une grande débilité.

Un écoulement analogue peut dépendre aussi du squirrhe de l'utérus ; quant aux hémorrhagies utérines, qui sont occasionnées par des fongosités polypeuses, elles se renouvellent & varient continuellement, suivant le frige & le caractère de ces fongosités ; leur traitement est évidemment subordonné aux indications que présente cette maladie. (Voyez CANCER DE L'UTÉRUS, FONGOSITÉ POLYPEUSE, HÉMORRAGIES, MÉTRORRAGIE, SQUIRRES.) (L. J. M.)

METS. On désigne sous ce nom, des préparations alimentaires plus ou moins compliquées, qui ont bien moins pour objet de nourrir, de répondre, sous ce rapport, aux besoins de la nature, que d'exciter les organes digestifs, de ranimer ou de faciliter le sens du goût, & de développer par ce moyen un ordre de sensations plus ou moins agréables, mais presque toujours assez nuisibles pour être placées au premier rang parmi les causes des maladies qui paroissent affecter plus particulièrement les premières classes de la société. *Comptez les cui-*

siniers, disoit Boerhaave, lorsqu'on l'interrogeoit sur cette foule d'affections chroniques qui semblent propres aux gens du monde, & qui n'apparoissent du moins que très-rarement parmi les gens du peuple.

En effet, l'excitement continu des organes digestifs par une nourriture aussi abondante qu'irritante, l'espèce de surcharge ou de répression qui résulte de ce genre de vie, l'embarras, la gêne de la circulation, une activité continuellement augmentée dans les vaisseaux capillaires, la réaction d'un pareil état sur les forces nerveuses & sur les fonctions cérébrales, doivent être regardées comme une situation violente, peu naturelle ; & la force, la flexibilité de l'organisation humaine, peuvent seules faire concevoir comment un pareil état de choses n'occasionne pas encore des maladies plus graves & plus nombreuses. Voyez MORDE (Gens du), MORBIDE (Complexion), NOURRITURE, considérée sous le rapport pathologique, auquel l'auteur d'un ouvrage récemment publié, sur la goutte & le rhumatisme, M. Charles Sandmore, a donné toute l'importance qu'il mérite.

Consulter aussi un excellent ouvrage d'Abernetty, ayant pour titre : *On the constitutional origin and treatment of local diseases*.

La lecture de ces ouvrages, & mieux encore les détails de la médecine pratique dans les grandes villes, mais surtout dans les hautes classes de la société, confirmeront nos réflexions & conduiront à cette vérité générale, que les médecins perdroient une grande partie de leur ascendant & de leur importance, si les hommes vouloient s'offrir quelque jour de devenir plus sobres, plus tempérans & plus sages. (L. J. M.)

MEUM. (*Aethusa meum*.) Plante de la famille des ombellifères, dont les semences & les racines ont des propriétés stimulantes.

MEUNIER. (*Hygiène*.) *Cyprinus oblongus*. Partie II. Des choses improprement dites naturelles.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. *Alimenta*.

Section II. *Animalia*.

Le meunier ou menge est un poisson de rivière à aigreses molles, du genre de la carpe, qui vit près des moulins & assez souvent dans la fange ; qui a une très-grosse tête, des écailles luisantes, point de dents. Il a dans la tête un os entouré de quintes comme une châtaine.

La chair du meunier est blanche, molle, d'un goût fade, pleine d'arêtes ; elle n'est pas d'une très-facile digestion ; on l'apprête avec des sauces piquantes pour la rendre plus agréable. Il y a des meuniers qui pèsent jusqu'à quarante à cinquante livres. (MACQUART.)

MEURTRE. (L'action de meurtrir.) (Voyez MEURTREMENT.)

MEURTURIER. (Celui qui commet le meurtre.)

MEURTURISSURE. On ne devoit appliquer ce mot, dans une acception rigoureuse & étymologique, qu'à un résultat du meurtre, qu'à ce qui l'annonce, le caractère à la suite des blessures ou offenses & lésions par violence extérieure (1). Du reste, on donne généralement le nom de *meurturiature* à des taches livides ou noirâtres, dépendantes de dispositions bien différentes, de la contusion, par exemple, de l'ecchymose, & même du passage du sang dans les vaisseaux blancs : phénomène qui se manifeste quelquefois pendant la vie, mais qui survient le plus ordinairement comme on est convenu de la mort, avec les apparances & sous le nom de *lividités*.

Les trois articles *Contusion*, *Ecchymose* & *Lividité*, ayant été omis dans ce Dictionnaire, nous alloons nous occuper, sous le titre de *meurturiature*, des objets qui s'y rapportent; ce qui paroît d'autant moins déplacé, que ce mot *meurturiature* est moins technique, & que son emploi dans la langue commune, qui pourroit le faire rejeter d'un Vocabulaire spécial de la médecine, doit porter à le conserver dans une exposition générale & encyclopédique des connaissances humaines.

Ces trois expressions, *contusion*, *ecchymose* & *lividité*, qui répondent, dans l'acception vulgaire, au mot *meurturiature*, appartiennent, comme nous venons de l'indiquer, à trois ordres particuliers de phénomènes.

La contusion exprime, en médecine légale comme en chirurgie, une blessure plus ou moins étendue, dans le tissu des parties, produite par un corps contondant, sans division ou entamure de la peau, ce qui la distingue de la plaie ou même de la plaie contuse, dans lesquelles cette division a toujours lieu.

Dans la contusion, les parties atteintes sous la peau sont éraflées, avec infiltration de sang dans une plus ou moins grande étendue; mais la peau est intacte, circonstance qui distingue la contusion de la plaie (2).

La contusion est toujours accompagnée d'ecchymose, mais l'ecchymose peut exister sans contusion, & elle n'est pas toujours l'effet d'une violence extérieure. Il ne faut donc pas confondre ces deux expressions, ainsi qu'on le voit faire dans un grand nombre de rapports judiciaires, dans lesquels

les ecchymoses, les lividités cadavériques sont indistinctement désignées sous le nom de *contusion* ou de *meurturiature*; inattention qui peut induire le magistrat en erreur, & avoir les suites les plus funestes.

M. le professeur Chaussier rapporte à trois points principaux les degrés extrêmement variables de l'altération ou lésion des parties, dans les différentes espèces de contusions; savoir :

1°. Le simple froissement des tissus, avec rupture de quelques vaisseaux capillaires.

2°. La dilacération des tissus, qui présente une multitude de petites plaies rapprochées, qui diffèrent suivant la nature des parties comprises dans la solution de continuité.

3°. Enfin l'attrition, désorganisation complète des parties molles, qui paroissent comme machées, c'est-à-dire, *comminées*, réduites en une sorte de substance pulvace, comme on l'observe lorsque le boulet, dans les derniers temps de sa course, frappe obliquement, & par une portion de sa circonférence, quelque point de la surface du corps.

La sensibilité naturelle de la partie, l'état dans lequel elle se trouve lors de la percussion, produisent de grandes différences dans les suites. Une percussion sur le testicule, sur la mamelle, donne souvent lieu à un squirrhe, à un cancer; un coup léger à la tête est quelquefois suivi d'une suppuration à la surface des méninges (pis-mère); ou entre les deux lames. Les vaisseaux d'un muscle qui est frappé pendant sa contraction, sont plus facilement dilacérés que s'il étoit dans le repos; la contusion qui s'étend aux troncs, aux cordons nerveux qui se distribuent à une partie, est accompagnée d'un engourdissement, & quelquefois de paralysie; celle qui intéresse les vaisseaux sanguins peut être accompagnée ou suivie d'hémorrhagies internes ou d'anévrysmes. Lorsque la violence s'est portée jusqu'aux os, elle peut en déterminer la fracture, la carie, la nécrose; celle qui attaque les viscères est suivie d'accidents plus ou moins graves, & quelquefois de la mort dans l'instant de la percussion, suivant la nature de l'organe affecté. Enfin, quoique bornée à une partie d'un membre, la contusion peut être accompagnée de commotion, ou déterminer, par la suite, un trouble qui donne lieu aux maladies les plus graves.

L'ecchymose qui devient le plus souvent la suite de la contusion, indique l'effusion du sang dans les mailles ou aréoles du tissu lamineux, par la rupture de quelques capillaires, ce qu'indique le verbe grec *ecchymo*, je répands.

Le mot *suppuration*, que quelques auteurs ont voulu regarder comme synonyme d'*ecchymose*, ne doit être employé que dans son acception étymologique, & pour exprimer l'ecchymose légère & particulière que produit la *furcula*, ce qu'a

M 2

(1) M. le professeur Chaussier désigne la *meurturiature*, l'effusion de contusion produite dans une tumeur & par une violence extérieure.

(2) Robin, de *recognitione vulnerum*.

appelle *fugon* en terme vulgaire. (Voyez SCORR-LATION.)

L'ecchymose accompagne ordinairement la percussion, les contusions, les plaies, mais surtout les plaies dans les cas où la division est étroite, la direction oblique, ce qui empêche l'écoulement du sang.

L'ecchymose externe & superficielle présente dans sa durée une série de phénomènes très-remarquables. C'est d'abord une tache qui paraît plus ou moins rouge, plus ou moins bleuâtre, formée par le sang infiltré dans les mailles du tissu lamineux; un peu plus tard, cette tache devient noirâtre, plombée; elle s'éclaircit ensuite par degrés, devient violette, jaunâtre, citrooie, & finit par disparaître entièrement, de manière qu'il n'en reste plus aucun vestige; mais en prenant ces nuances successives, l'ecchymose s'étend, s'élargit peu à peu, & la circonférence est toujours d'une teinte moins foncée que le centre ou le point primitivement affecté. On trouvera la cause de cette série de phénomènes dans la nature du sang, la disposition & les propriétés du tissu lamineux. En effet, dès que le sang cesse d'être soumis à l'action circulatoire, il perd, par le repos, la couleur vive, devient brunâtre & tend à se coaguler; mais comme il se fait continuellement dans les aréoles du tissu lamineux une sécrétion vaporeuse, ses molécules sont successivement délayées, puis dispersées peu à peu par l'action tonique du tissu dans les aréoles circonvoisines, ce qui produisait en même temps la diffusion de la tache ecchymosée, ainsi que le changement de couleur que l'on y remarque, & qui diminue chaque jour par l'absorption successive du liquide épanché.

Cette résolution ne s'opère jamais sans que la tache produite par l'infiltration du sang se s'étende & ne présente cette dégradation successive de couleur que nous avons indiquée; circonstance qui, réunie aux considérations sur la forme de l'ecchymose, sur l'état du sujet, peut servir à déterminer, au moins d'une manière approximative, depuis quel temps l'ecchymose existe; ce qui peut être utile dans quelques cas de visite juridique, comme on le verra par le fait suivant.

Une jeune femme d'une bonne constitution, se plaignoit en justice d'avoir, huit jours auparavant, reçu un coup à la mamelle gauche, & demandait à être visitée, pour constater son état & la vérité de sa plainte. Un médecin & un chirurgien nommé d'office pour visiter la plaignante, trouvèrent à la mamelle gauche, sous la peau délicate de cet organe, deux ecchymoses superficielles, sans gonflement, sans douleur distincte, & séparées par l'intervalle d'un pouce; l'une étoit située un peu au-dessus du mamelon, & l'autre à la partie supérieure & interne de la mamelle. Chacune avoit une forme elliptique bien circonscrite, de la longueur de dix lignes sur huit de largeur; leur contour étoit d'un rouge-brunâtre dans toute

leur étendue, sans diffusion ou teinte jaunâtre à leur circonférence. D'après l'état de santé de la personne, & cet ensemble de circonstances recueillies avec soin, les experts déclarèrent dans leur rapport, que les deux ecchymoses, qu'ils avoient trouvées à la mamelle gauche, n'étoient point l'effet d'un coup reçu à cette partie huit jours auparavant leur visite; que, d'après leur contour uniforme dans toute leur étendue, ces ecchymoses ne pouvoient exister depuis huit jours, comme le disoit la plaignante, mais seulement depuis vingt-quatre à quarante-huit heures au plus; que leur forme régulière, circonscrite, en tout semblable, paroïssoit indiquer qu'elles avoient été produites non par un coup, mais par une succion faite avec la bouche; enfin, ils appuyèrent leur opinion sur ce que, dans la visite, ils avoient trouvée à la mamelle droite deux taches superficielles jaunâtres, disséminées, qui étoient évidemment la suite d'ecchymoses qui avoient été faites à cette partie sept à huit jours auparavant, & les éclaircissements fournis par la suite de l'instruction de l'affaire, confirmèrent entièrement la justesse de cette assertion.

L'ecchymose, lors même qu'elle est produite par sévices ou violences, ne présente pas toujours les phénomènes que nous venons d'indiquer; elle peut même exister très-profondément sans lésion apparente à la surface du corps.

Dans d'autres circonstances, cette lésion, & la lividité sous-cutanée, ne se manifestent que plusieurs jours après la blessure; dans le cas, par exemple, d'une percussion sur la partie moyenne & externe de la cuisse, avec contusion des muscles sous-jacents.

D'autres lésions plus graves, des ruptures, des déchirures de viscères, des épanchemens dans les cavités splanchniques, peuvent également exister sans aucune trace extérieure de lésion. Il ne faut donc pas, dit M. le professeur Chaussier dans ses leçons sur l'ecchymose, recueillir par M. Rieux (1); il ne faut donc pas, lorsque l'on fait la visite du corps d'un homme qui est mort plus ou moins promptement après une rixe, se borner à un examen extérieur; & conclure d'abord qu'il n'y a aucune violence, parce qu'il n'en existe aucune trace apparente à la surface de la peau; on doit s'en assurer en faisant l'ouverture des cavités splanchniques, en pratiquant de longues & profondes incisions à la face ipsiale du dos, aux cuisses, à toutes les parties qui sont reconvertees d'une lutte épouvantable.

(1) *Dissertation inaugurale sur l'ecchymose*. G. Paris, 1814, n°. 63; ouvrage dans lequel nous avons posé en grande partie les maximes de cet article, avec le respect & la confiance que nous aurons souvent occasion d'exprimer pour le savant professeur, auquel le fonds de cette dissertation appartient, & que l'on peut regarder comme l'un des promoteurs les plus actifs & les plus utiles de la médecine légale en France.

« Des observateurs superficiels, ajoute le même auteur, pourroient confondre de légères ecchymoses, à la surface de l'estomac, à la suite de vomissements ou de convulsions, avec des taches gangréneuses; mais on évitera cette erreur, si l'on fait attention à la nature des écharres qui, dans ces organes, sont toujours molles, pénétrantes, se détachent facilement, & s'èlèvent en les trottant ou en les ratissant légèrement. Dans les taches formées par une ecchymose récente, le sang est extravasé entre les membranes, & elles conservent la consistance qui leur est propre; enfin, pour s'en assurer d'une manière positive, on fait sur la tache une incision qui pénètre jusqu'au foyer de l'extravasation, puis on plonge la partie dans de l'eau, on la lave; on délaye ainsi les molécules de sang extravasé, & la partie reprend ainsi sa couleur naturelle. »

Dans plusieurs circonstances, l'ecchymose est indépendante de la contusion ou d'une plaie quelconque, & doit être attribuée à l'état même de l'individu, à une disposition morbide particulière. Il se forme quelquefois tout-à-coup, & sans cause bien connue, des ecchymoses plus ou moins considérables; ce qui arrive toutefois bien plus souvent chez les sujets scorbutiques sensiblement affoiblis, & dans une disposition adynamique générale, avec fluidité excessive du sang, & débilité, ramollissement de toutes les parties solides de l'organisation: manière d'être que l'on observe souvent à la suite de l'usage habituel & immodéré des boissons spiritueuses & alcooliques. On ne peut donner trop d'attention à cette distinction entre les ecchymoses spontanées ou par causes internes, & les ecchymoses provoquées ou produites par des violences extérieures. C'est un défaut de soins & de savoir dans une pareille question, qui fit condamner au dernier supplice l'infortuné Montbailly, comme atteint & convaincu de parricide.

L'accusé, que l'excès de son malheur a rendu célèbre, avec des circonstances dont l'atrocité & l'injustice excitèrent si vivement l'indignation & les remembrances de Voltaire, vivoit avec sa mère âgée de soixante ans, d'un embonpoint extraordinaire, & couvrait par l'habitude de s'enivrer avec de l'eau-de-vie. Cette femme, après quelques débats domestiques, se retira un soir dans son appartement, où elle fut trouvée morte le lendemain, dans un état d'apoplexie que l'on ne fut pas reconnoître: genre de mort assez commun dans le pays qu'elle habitoit, pour tous ceux qui se livrent à leur malheureux penchant pour les boissons spiritueuses. Il ne s'éleva d'abord aucun soupçon; mais bientôt, & d'après des rumeurs populaires, on imagina que Montbailly & sa femme avoient pu assassiner leur mère pour se venger. Ne pouvant les accuser d'avoir voulu en hériter, puisque cette femme laissoit plus de dettes que de bien, on arrange, on combine contre toute vraisemblance & toute raison, plusieurs circonstances qui sembloient

appuyer une pareille conjecture, & que les juges de Saint-Omer, qui connoissoient les mœurs de Montbailly, déclarèrent sans fondement. Mais le procureur du Roi, ayant appelé de cette sentence au conseil supérieur d'Arras, Montbailly, malgré le premier jugement qui le déclaroit innocent, fut livré d'abord au supplice de la question ordinaire & extraordinaire, puis condamné à mourir sur la roue, après avoir en le poing coupé, comme parricide. « Voilà, dit Voltaire, tout ce que je fais de cette horrible aventure, qui exciteroit les cris de toute la France, si elle regardoit quelque famille considérable par ses places ou par son opulence, & qui a été long-temps inconnue, parce qu'elle ne concerne que des pauvres. »

Les réclamations éloquentes de ce philosophe obtinrent, malheureusement trop tard, la révision du procès de Montbailly, entre les mains d'un nouveau conseil établi dans Arras. Ce nouveau tribunal le déclara, lui & sa femme, innocents. L'avocat qui avoit pris leur défense, « dit le grand homme qui fit réparer cette grande injustice, » ramena en triomphe la venue dans la patrie; mais le mari étoit mort par le plus horrible supplice, & son sang cria encore vengeance (1).

Le savant & le judicieux secrétaire de l'Académie de chirurgie, Louis, dont les travaux ont répandu tant de lumière sur plusieurs questions de médecine légale, fut consulté dans la révision du procès de Calas. Il attaqua avec toute la force de son expérience & de son érudition le rapport de Saint-Omer, comme ne pouvant constater l'assassinat de la venue Montbailly, qui avoit évidemment succombé à une attaque d'apoplexie, dont le penchant à l'ivrognerie est une cause occasionnelle si fréquente, ainsi que le prouvent plusieurs faits décrits par Lancisi & par Morgagni.

Quant à ce qui regarde l'ecchymose, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ces considérations, Louis s'exprime de la manière suivante :

« Les actes des médecins de Berlin font mention d'un soldat invalide, nommé Fischer, de petite taille & de tempérament sanguin, qui, jouissant d'une bonne santé, mourut subitement. A l'ouverture du cadavre on vit que toute l'habitude du corps étoit livide par la suffusion du sang. Qu'on juge du rapport fait à Saint-Omer, en 1770, d'après ce cas observé à Berlin en 1720. Quelle conséquence peut-on tirer des ecchymoses de la poitrine, si la couleur seule a déterminé le médecin & le chirurgien à les croire produites par des violences extérieures? A l'ouverture des téguments de la tête du soldat prussien, il sortit de dessous la peau une quantité considérable de sang fluide; s'il étoit tombé accidentellement sur une pierre, sur l'angle d'une table, d'un coffre, la commotion,

(1) Voltaire, Œuvres, édition de Pâris, t. XXXV, pag. 148.

dans cette disposition des vaisseaux, auroit pu donner lieu à une hémorrhagie considérable par les narines, telle qu'elle est arrivée à la femme de Saint-Omer; elle est bien prouvée par le sang qu'il y avoit dans le nez, suivant le rapport même, quoiqu'on y attribue la mort, à l'hémorrhagie d'une petite plaie connue à la paupière supérieure, ce qui n'est pas possible.

Les ecchymoses, les marques livides qu'on a observées sur la poitrine & sur les bras de la femme de Saint-Omer, sont regardées dans le rapport comme des meurtrissures faites par des coups ou des chutes; mais ces marques sont ordinaires à tous ceux qui meurent ayant les liqueurs en effervescence.

Un mendiant s'étant couché ivre, mourut subitement dans la nuit, à la fin de janvier 1746. Il fut porté le soir au collège de Padoue pour les leçons d'anatomie; on le trouva encore chaud le troisième jour, dit Morgagni, auteur de cette observation. Cette chaleur, conservée au mois de janvier, est une preuve bien décisive de la fermentation des humeurs dans cet homme. On lui trouva le scrotum ecchymosé, d'un rouge-violet, & la face remplie de sang, non pas seulement sous la peau, mais tous les muscles, les membranes qui les séparent, & les glandes parolides en étoient comme imprégnées. Cette observation de Morgagni n'eût-elle pas dû être appliquée à la femme en question? Mais on n'a fait aucune distinction entre la contusion, les meurtrissures proprement dites, & les ecchymoses; cependant, faute de cet examen particulier, & qui doit être exprimé dans un rapport, le rapport ne peut être concluant sur ces marques.

Le sujet fort replet, dont les fluides étoient en torgeffence, est mort de plénitude & de suffocation sanguine, dans la saison la plus chaude de l'année, à la fin du mois de juillet; il n'a été soumis au jugement des experts que trente-deux heures après la connaissance avérée de la mort, laquelle pouvoit avoir une date plus reculée. Or, il est très-probable que la chaleur putréfactive interne & externe, dans cette saison & dans ce sujet, a eu des effets dont on a méconnu la vraie cause, tels que le gonflement de la tête, les lividités de la poitrine & autres phénomènes confusifs très-naturels dont on n'a pas désigné le caractère distinctif. Il paroit donc démontré que le rapport n'a pas été fait avec soin & exactitude, que les grandes connaissances de l'art n'ont point servi dans la rédaction, & que l'on ne peut trouver la moindre preuve que la personne ait été assassinée.

Eclairé par des connaissances aussi positives, le conseil supérieur d'Arras réhabilita la mémoire de Montbailly, en terminant ainsi sa déclaration solennelle & mémorable.

Enjoint à tous les médecins & chirurgiens nommés pour la visite des cadavres, de faire

l'ouverture de toutes les parties du corps, par l'état desquelles il seroit possible de reconnaître les causes prochaines ou éloignées de la mort, de les exprimer, ainsi qu'elles sont & les raisons de science, sur lesquelles ils établissent leurs opinions ou leurs conclusions: le tout à peine d'interdiction (1).

Quelques personnes avec des intentions ordinairement reprouvables, cherchent à imiter par différents moyens, les phénomènes de l'ecchymose ou de toute autre espèce de meurtrissure, & les médecins jurés sont quelquefois appelés pour prononcer sur ce genre de tromperie & de fraude. On a même été jusqu'à se faire appliquer des sangsues ou à produire violemment des contusions & des ecchymoses pour exciter la compassion, ou se plaindre d'une violence extérieure; l'artifice, dans tous ces cas, peut se découvrir avec plus ou moins de facilité. Ainsi, lorsque l'on s'est borné à frotter une partie avec un morceau de plomb, ou de sulfure d'antimoine, cet artifice grossier se reconnoît sans peine; il suffit de frotter légèrement la partie avec le doigt, ou de la laver avec de l'eau pour en faire disparaître la lividité. La morsure triangulaire au centre d'une ecchymose produite par la langue, est aussi facile à constater, & l'ecchymose que l'on auroit provoquée de toute autre manière pourroit être rapportée à sa véritable cause & reconnoître pour l'effet de la fraude, en observant par ses apparences, qu'elle est plus ou moins ancienne que ne l'indique la demande de la partie plaignante.

L'ecchymose sur le cou, l'ecchymose des lombes & sur l'un des côtés du thorax doivent fixer l'attention d'une manière particulière dans les visites juridiques, d'après les remarques suivantes de M. le professeur Chianflier.

Pour déterminer la véritable cause de l'ecchymose sur le cou, il faut observer avec soin la situation de cette ecchymose, si elle se trouve placée à la partie supérieure, moyenno on inférieure du cou; il faut observer l'étendue, la forme extérieure, l'état des parties situées sous la peau, & rapprochant toutes les considérations que fournit l'examen des parties, on pourra déterminer la nature, l'espèce de violence qui aura été intentée. Nous rendrons ceci sensible par un exemple qui, en 1736, a beaucoup occupé le tribunal d'Aix.

Un jeune homme est trouvé suspendu à une branche d'arbre, par une corde passée autour du cou; la face est livide, violacée, les yeux saillans, &c.; mais aucune trace apparente de violence; & si l'on se fut borné à cette inspection, on auroit dit avec le peuple, que le jeune homme s'étoit lui-même pendu. Mais l'expert chargé de la visite, après avoir disséqué avec soin les ligaments, examina l'état des parties qui y sont situées,

(1) *Causas célèbres*, tom. 1^{re}.

se trouva aucune ecchymose, aucune altération à la partie supérieure; mais il voit à la partie inférieure une ecchymose circulaire & profonde, lividité des muscles, aplatissement, rongeur de la trachée-artère, déchirement de quelques faisceaux fibreux, & d'après cet ensemble de circonstances & de quelques autres qu'il seroit trop long de rapporter, il prononce que le jeune homme ne s'est point pendu, mais qu'il a d'abord été étranglé par un lien circulaire placé à la partie inférieure du cou & suspendu ensuite à la branche d'arbre; & les informations que l'on fit, confirmèrent le jugement de l'expert.

• L'ecchymose des lombes, à un des côtés du thorax, après une plaie qui a intéressé les parois de cette cavité, ou pénétré jusqu'aux organes qui y sont contenus, est toujours, à ce que prétend Valentin (1), un signe certain d'un épanchement de sang dans le thorax; mais souvent cette ecchymose ne survenoit point quoiqu'il y ait épanchement, & quand on la rencontre, elle ne dépend point de la transsudation du sang à travers la pleure; car, dans la vie, quelque minces & poreuses que paroissent les membranes, elles ne permettent point la transsudation des fluides qu'elles contiennent. L'expérience nous a fourni un cas particulier, propre à faire connoître la manière dont se forment ces sortes d'ecchymoses lombaires à la suite des plaies pénétrantes de la poitrine. Un homme, en le battant, fut blessé à la partie latérale droite du thorax, entre la quatrième & la cinquième des côtes sternales, par une pointe de fabre qui pénétra dans le thorax. Les bords de la plaie, qui avoient à peu près vingt-sept millimètres (un pouce), furent rapprochés, mis en contact par des bandelettes de taffetas adhésif, soutenues par des compresses & un bandage de corps. Bientôt la plaie extérieure fut consolidée, mais l'oppression, la dyspnée, l'anxiété, augmentoient chaque jour & indiquoient une lésion intérieure. Le dixième jour après la blessure, on remarqua une ecchymose fort large à la région lombaire; mais les accidents étoient portés à un haut degré, & le blessé mourut le douzième jour.

• A l'ouverture du cadavre, qui fut faite avec beaucoup de soin, on trouva dans le côté droit du thorax, une grande quantité de sang en partie fluide; & quoique la plaie fût à l'extérieur bien consolidée, elle ressoit béante entre les deux côtés, & l'on reconnut de la manière la plus évidente, que le sang épanché dans la cavité du thorax ressoit par la division qui ressoit ouverte entre les côtes, & que de-là il s'infiltoit dans le tissu lamineux qui se trouve sous le muscle lomboméral (grand dorsal), & s'arrêtoit à la région lombaire qui, dans la situation que le malade con-

servoit, étoit la partie la plus déclive. Après avoir enlevé, abîmé tout le sang contenu dans le thorax, on examina la pleure, & on reconnut évidemment par sa texture; sa couleur, qu'il ne s'étoit fait aucune transsudation à travers son épaisseur. Le signe indiqué par Valentin est donc illusoire. N'a-t-on pas vu plus d'une fois, à la suite d'une plaie uniquement horale aux parois du thorax, survenir une ecchymose aux lombes, aux aines, s'étendre même plus loin, suivant la quantité de sang qui s'infiltre dans l'interstice des muscles?

Les lividités que l'on ne pourroit confondre, sans les inconvénients les plus graves, dans un rapport médico-légal, avec les contusions & les ecchymoses, ont été également désignées plusieurs fois par les auteurs, sous le nom de *meurtrissures*: elles se présentent ordinairement sous la forme de taches superficielles, qu'il n'est pas rare de voir se former dans les derniers momens de la vie, chez des personnes qui succombent à des maladies chroniques, mais qui se montrent plus ordinairement après la mort, & que l'on a désignées sous les noms de *fulgillationes spuriae*, *maculae mortuae*, *maculae a morte productae*.

Suivant M. le professeur Chaussier, qui a donné une grande attention à ce phénomène, la lividité est bornée au dos, aux fesses, aux parties sur lesquelles le corps étoit couché lorsqu'il fut refroidi. Quelquefois elle s'étend plus particulièrement à la tête, au cou, aux parties génitales; enfin, d'autres fois elle est diffuse à toute la surface du corps, & disposée, soit par des taches lenticulaires ponctées, soit, ce qui est le plus ordinaire, par plaques irrégulières plus ou moins larges; souvent la lividité de la peau est entrecoupée, traversée par des lignes ou sillons blanchâtres & profonds, que l'on a comparés à l'impression que produisoit sur la peau la percussion faite avec des verges, ce qui fait distinguer cet état sous le nom de *vergeture* (1). Mais ces vergetures apparentes, qu'il faut bien distinguer de l'impression qui seroit produite par la percussion avec des verges, sont uniquement l'effet des ligatures qui existent à la surface du corps, des plicatures faites par les vêtements dont il est enveloppé, ou des fautes & inégalités du sol sur lequel il est appuyé.

Les lividités cadavériques diffèrent essentiellement des ecchymoses; elles dépendent uniquement de la congestion du sang qui s'arrête dans les réseaux capillaires, les remplit, les distend, lorsqu'ils perdent leurs propriétés vitales, & produit ainsi cette teinte brune & violacée que l'on remarque à la peau; mais jamais il n'y a effusion ou infiltration de sang dans les aréoles du tissu lamineux sous-

(1) *Cutis fulgillata ex verberibus, vibræ ou vibræ, compression, que quelques auteurs de médecine légale ont transportée dans la langue française sous la dénomination de vibices.*

(1) *Recherches critiques sur la chirurgie moderne.*

entand. Aussi, lorsqu'on fait l'ouverture juridique d'un cadavre, en présence de personnes qui pourroient regarder ces taches comme des ecchymoses, des marques de violence extérieure, il convient, pour prévenir & arrêter tous les propos absurdes de l'ignorance, de couper, dans l'endroit de ces lividités, une lame mince de la peau, d'y faire une incision pour démontrer que cette couleur livide est bornée à la surface de la peau, qu'elle ne s'étend point aux parties sous-jacentes; enfin, qu'il n'y a pas d'infiltration du sang, mais seulement congestion dans les réseaux capillaires.

La forme, l'étendue, la situation, la couleur plus ou moins foncée de ces lividités cadavériques, dépendent d'un grand nombre de circonstances qui ne doivent point échapper à l'attention des experts chargés des visites juridiques.

Le plus ordinairement, la lividité de la peau ne commence à paraître que quelques heures après la mort, lorsque le cadavre commence à se refroidir, & que les membres, en devenant roides, expriment le sang encore fluide dans les vaisseaux capillaires; mais, dans quelques cas, la lividité commence même avant que la mort soit complète. Ainsi, dans l'agonie de diverses maladies, les ongles, les mains, les pieds, le nez, les lèvres, les lobes des oreilles, prennent une teinte livide violacée; d'autres fois, ce qu'il faut bien remarquer, les lividités ne surviennent que deux, trois ou quatre jours après la mort, quelquefois même plus tard. On observe principalement ce phénomène lorsque le sang a perdu sa consistance, qu'il est accumulé dans l'oreillette droite du cœur, le tronc des veines caves, & que l'abdomen se distend par les gaz qui s'y développent; dans ce cas, & d'après la disposition anatomique des parties, le sang contenu dans l'oreillette droite & les veines caves est exprimé, repoussé dans les veines de la tête; les vaisseaux du cerveau s'engorgent; la face prend successivement une teinte foncée; les yeux, qui auparavant étoient ternes, assaillis, paroissent se remplir, prendre de l'éclat, la pupille se resserre; souvent, quelques vaisseaux de la membrane nasale se rompent, & il se fait par les narines un écoulement plus ou moins abondant, d'un sang clair & brunâtre; dans ce cas aussi, on voit parfois le sang être repoussé des troncs veineux aux parties génitales, le scrotum, le pénis prendre en peu de temps une teinte noirâtre, qui, comme cela est arrivé, a été regardée comme une preuve de violence exercée sur ces organes pendant la vie de l'individu.

La face, la congestion du sang n'est point bornée aux vaisseaux capillaires de la peau, mais elle peut avoir lieu dans tous les organes qui admettent dans leur composition un grand nombre de vaisseaux sanguins & de réseaux capillaires. On l'observe surtout aux poumons. On en apercevra facilement la raison, si l'on se rappelle que le sang qui revient de toutes les parties du corps, doit traverser

les poumons pour y éprouver des changements, une dépuration nécessaire à l'entretien de la vie; mais lorsque les propriétés vitales s'anéantissent, le sang, poussé par les derniers efforts du cœur, remplit les vaisseaux des poumons, les distend, les engorge, augmente ainsi le poids, la densité de l'organe, & lui donne une teinte livide plus ou moins foncée & étendue; quelquefois même la couleur des poumons est, dans certains endroits, entièrement noire, & ces organes paroissent affectés de gangrène; mais cette apparence est illusoire, & on le reconnoît facilement si l'on examine la consistance des poumons, si, après en avoir coupé une portion, on la lave ou l'exprime dans l'eau: mais quelquefois l'engorgement, la teinte des poumons, ces altérations cadavériques, ne s'observent pas également dans toute l'étendue de l'organe, elles diffèrent selon la situation dans laquelle le corps s'est refroidi. Ainsi, lorsqu'un homme meurt couché sur le dos, ce qui est le plus ordinaire, l'engorgement, la couleur livide des poumons se trouvera à la portion dorsale; s'il meurt dans une autre attitude, les lividités de la peau & des poumons se remarquent spécialement aux surfaces sur lesquelles le corps appuyoit lorsqu'il a perdu le mouvement & la chaleur.

Il n'est pas rare aussi de trouver aux viscères de l'abdomen, des taches diffuses, superficielles, rougeâtres ou diversement colorées; aussi presque toujours on aperçoit sur la portion droite & ascendante de l'intestin colon, une tache jaunâtre, verdâtre, qui s'étend parfois à une partie de l'estomac, de l'épiploon, & qui toujours correspond à la suite de quelques affections; on trouve à la surface de l'estomac une large tache superficielle d'une couleur rougeâtre ou d'un brun clair qui correspond à la portion du foie ou de la rate qui appuie sur ce viscère, & en trace exactement la forme; mais ces altérations cadavériques dépendent uniquement du contact réciproque des viscères, de la transsudation qui se fait après la mort, à travers les porosités de leurs tissus, de leurs membranes constitutives.

L'âge, la constitution du sujet, les affections qui ont précédé & accompagné la mort; la saison plus ou moins éloignée où l'on fait l'examen du corps, déterminent des changements plus ou moins remarquables dans la forme, l'étendue, la coloration de ces lividités; l'attitude dans laquelle le corps se refroidit, la situation de ces diverses parties y produisent aussi des différences. Ainsi, lorsque la tête ou les membres sont dans une situation d'éclive, le sang s'arrête en plus grande quantité dans les vaisseaux de cette partie, les distend, les engorge & y détermine une lividité plus ou moins remarquable.

(Extrait de la thèse de M. Renard, ayant pour titre : *de la manière de procéder à l'ouverture des cadavres*, rédigée avec des matériaux tirés des leçons

leçons de M. le professeur Chaulfrier. Paris, 1814, n°. 10.)

Tel est le résultat des excellentes remarques de ce savant professeur, sur les lividités.

Un des médecins les plus éclairés du dix-huitième siècle, Antoine Petit, ayant à prononcer, dans une accusation d'assassinat, sur plusieurs effets consécutifs de la mort, que l'on attribuoit à des sévices, caractérisa ces effets avec une grande attention, mais en les indiquant sous le nom très-impropre d'*ecchymoses* (1).

MEURTRISSURE DES TESTICULES. (*Chirurgie vétérinaire.*) L'étonnante sensibilité des testicules rend très-dangereuse la moindre lésion qui peut les atteindre. La meurtrissure ou l'engorgement douloureux produit par une contusion, est l'accident auquel ces organes font le plus exposés. Un coup, une forte pression, peuvent les meurtrir; cette lésion est quelquefois le résultat d'un coit fatigant : l'opération par laquelle on tord le cordon spermatique, & qui est connue sous le nom de *distourmage*, produit souvent des accidents qui simulent la meurtrissure. Indépendamment des dangers qu'offre cette pratique, elle ne remplit pas toujours le but qu'on se propose, puisque le sujet balaïonné conserve encore une partie de son sexe, & qu'il est dangereux de le laisser au milieu des semelles de son espèce, comme un canaque dont on n'aurait rien à craindre.

Les symptômes de la meurtrissure des testicules sont la douleur, l'engorgement sanguin de ces parties, la fièvre générale, quelquefois la rétention d'urine : les accidents à redouter sont une inflammation vive des testicules, la suppuration & même la gangrène ou le squirrhe. Les épiphénomènes de cette maladie peuvent être si violents, qu'ils entraînent la mort du sujet.

Le traitement curatif de la meurtrissure des testicules consiste à appliquer des réstrictifs froids aussitôt après l'action du corps contondant. Ces réstrictifs sont l'eau froide, l'eau saturée de sel marin, l'alun pilé & humecté, l'extrait de saturne. Si l'inflammation s'est développée, on emploiera les émoulliens, tels que les fumigations adoucissantes sous le ventre, les cataplasmes de mauve, de pommes cuites, de graines de lin : les émoulliens chaulfrieres & le lait seroient très-dangereux s'ils étoient appliqués dans cette circonstance.

La saignée & le régime antiphlogistique sont nécessaires pour combattre cette maladie, dont les effets se résorbent sur tout le système, à cause de la sensibilité exquise des testicules & de la sympathie qui les lie à tous les organes.

Lorsque les symptômes inflammatoires se seront calmés, on remplacera les topiques émoulliens par des applications de substances résolutives, telles

que l'infusion de fleurs de sureau aiguillée de fel ammoniac, le vin chaud aromatisé, l'eau-de-vie, la teinture d'aloes. Un excellent résolutif à employer sur la fin des inflammations glanduleuses, pour prévenir le squirrhe, c'est un liniment composé d'un mélange à parties égales d'huile d'olives & d'ammoniaque ou d'alcali volatil. Si on n'a pu éviter cette terminaison, l'extraction du testicule est indispensable pour prévenir les fongosités cancéreuses. Les vétérinaires ne devraient-ils pas se refuser à pratiquer cette opération, autrement que pour obéir à des indications curatives ? Lorsqu'il faut châtrer des animaux destinés à la boucherie, cette manœuvre doit être abandonnée à des bouchers. (GROONIER.)

MEUS. (Eaux minérales de). C'est un bonrg chef-lieu du pays de Trévies, à deux lieues de Lamur & à huit de Grenoble. La source minérale est entre ce bourg & Tremeni : elle est froide & gazeuse.

Dans l'extrait d'un Mémoire sur les eaux minérales du Dauphiné, par Nicolas, *Gazette médicale*, 1774, il n'est parlé de l'eau de Meus, que pour dire qu'on prétend que le Père Dominique en a fait l'analyse & y a trouvé du mercure. (MACQUART.)

MEYNES (Eaux minérales de). Meynes est un village près de la rive droite du Gardon, à une lieue & demie O. N. O. de Beaucaire, où l'on trouve une source froide.

Ranlin dit, pag. 293, que ces eaux sont peu chargées de principes minéraux, à l'exception du fer qui y est dissous.

En 1774, Amoreux fils a lu à l'assemblée publique des sciences de Montpellier, un Mémoire d'après lequel il paroît que les eaux de Meynes ne sont point minérales, mais très-semblables à l'eau commune. (MACQUART.)

MEZEREUM (Daphné). Cette plante, comme plusieurs autres espèces du même genre, tels que le *daphne gnidium*, le *daphne laureola*, le *daphne thymela*, &c. &c., est ordinairement employée à l'extérieur, ainsi que la clématite brulante, le poivre noir, l'euphorbe, pour exciter une inflammation acrimonieuse & ardente de la peau, avec rubéfaction & sans irritation suppuratoire.

On choisit pour cet usage l'écorce des jeunes pousses des branches ou même des racines, qui sont préférées par les Anglais. Cette écorce & les semences, ou les baies, sont très-irritantes, & produiroient même des effets vénéreux, si on les avaloit. Il n'est pas sans exemple que leur application ait donné lieu, soit par absorption, soit par des effets sympathiques, à des éruptions miliaires rougeâtres & à la tuméfaction érythémateuse du visage. Pour employer l'écorce, lorsqu'elle est récente, on la fait macérer dans le vinaigre; on l'applique

N

(1) Voyez *Causas célèbres*, tom. XIV, cause 205.

ensuite par petits morceaux sur les différens points du corps on s'en veut établir un centre de fluxion & d'irritation, en renouvelant cette application soir & matin, jusqu'à ce qu'elle ait produit son effet, & dès ce moment le pansement n'a plus lieu que de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures, ou même après un plus long intervalle.

Cette application du garou étoit en quelque sorte une pratique populaire de médecine dans l'Aunis, lorsque en 1767, un médecin d'ailleurs assez peu éclairé (Agathange Leroy) la fit connaître, & supposa beaucoup trop d'importance & d'étendue aux effets qu'il en polibit d'en obtenir.

On a proposé d'ailleurs l'usage du daphné mezereum sous différens formes, dans le traitement de plusieurs maladies chroniques, mais principalement des lèpreux, des affections syphilitiques invétérées. Ruell employoit dans ce dernier cas, & avec quelque succès, une préparation de cette plante suivant la formule ci-indiquée :

2^e. Ecorce récente de garou..... 3j.
Eau commune..... lbijj.
Réduisez par la cuisson à une pinte.
Ajoutez réglisse effilée..... 3j.

A prendre quatre onces de cette décoction deux & même quatre fois le jour.

Le daphné thuyale peut être employé de la même manière & aux mêmes usages.

Du reste, les empoisonnemens par les différens variétés de mezereum ne sont pas sans exemple. Linné a rapporté celui d'une jeune fille qui mourut pour avoir pris douze baies de la thuyale. Hennermann prétend que le camphre est l'antidote du mezereum. Notre expérience & nos lectures ne nous fournissent aucun résultat, soit pour affirmer, soit pour appuyer ces assertions. (Voyez BOIS GASTIL, DAPHNÉ, GAROU, THUYELLE, &c.)

MIASMATIQUE, adjectif ; *miasmaticus*. Qui vient des miasmes, qui est produit par les miasmes. Sauvages, qui ne s'étoit pas attaché à un petit nombre de phénomènes comparables & de même nature, dans sa distribution nosologique, a fait une classe de maladies *miasmaticæ* (mot *miasmaticæ*), qui n'a pas été consacrée par les successeurs.

MIASME, f. m., du grec *μιασμα*, littéralement souillure, infection. Ou a circonscrit, dans ces derniers temps, la signification de ce mot, en l'appliquant seulement aux émanations des hommes ou des animaux dans un état de maladie ou d'altération, & douées d'une activité délétère, & en quelque sorte véneuse & contagieuse. Toutefois on a étendu le sens du même mot aux émanées des substances animales ou végétales en putréfaction, & principalement aux émanées marécageuses. Il importe, tout en accordant cette latitude de signi-

fication au mot *miasme*, de ne point l'étendre jusqu'au virus ni au venin, ni aux différens genres de léthés, qui agissent comme de véritables poisons. (Voyez MORETUS, MÉPRISSE, SOURISSE, &c.)

En effet, les virus, les venins n'ont rien d'accidentel ou de temporaire comme les miasmes, mais sont le produit coustant de certaines sécrétions, soit dans l'état de santé, soit dans l'état de maladie, comme on le voit dans la morsure de la vipère ou des serpents, la propagation de la variole, de la vaccine, de la rougeole, de la syphilis, de l'hydrophobie. Nous traiterons d'abord, dans cet article, des miasmes dont la formation doit être attribuée à une altération indéterminée de la santé, ou à un état putride de maladie. Nous nous occuperons ensuite des miasmes des marais.

Parmi les miasmes dépendant d'un état morbide, les plus défectueux sont ceux qui se forment tout-à-coup & sans le concours d'une maladie déterminée au milieu d'un certain nombre de personnes rassemblées, ou plutôt entassées dans un local étroit & mal aéré, sur un vaisseau, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les dépôts de mendicité. Les émanations de cette multitude, réunies, rapprochées, & ne pouvant se dissiper dans l'atmosphère à mesure qu'elles se forment, acquièrent bientôt au plus haut degré, des propriétés délétères ; c'est ainsi que se produit une des maladies les plus redoutables, la *fièvre nosocomiale* (fièvre des prisons, typhus).

L'origine de ces miasmes, la formation d'un principe morbide, d'une cause qui altère tout-à-coup & profondément les puissances de la vie ; cette formation par le seul fait de l'accumulation d'un grand nombre d'individus dans un lieu trop resserré, est un des fléaux les plus fréquents & les plus défectueux chez un peuple civilisé, celui qui prouve le mieux la nécessité d'accorder au moins un peu d'air & d'espace, aux hommes les plus infortunés & les plus coupables. En effet, si les hommes doivent former des sociétés pour le bonheur commun, pour l'accomplissement des hautes destinées de leur espèce, ils ne se font jamais impunément réunis au milieu d'habitations trop rapprochées ou trop resserrées.

Les villes mal distribuées, mal exposées, les places-fortes pendant les sièges, les bagues, les pontons sur lesquels on entasse les malheureux prisonniers, sont de vrais foyers pour l'épée humaine ; & lorsque l'on est témoin de ce qui se passe au milieu de circonstances semblables, on peut bien s'écrier avec Rousseau (1) : « Non, sans doute, les hommes ne sont pas faits pour être entassés en fourmilières les infirmes du corps ainsi que les vices de l'âme, sont l'infaillible effet d'un concours trop nombreux.... L'aine de l'homme est mortelle à ses semblables, cela n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré.... »

(1) Rousseau, *Emile*, tome I, pag. 48.

Les hommes dont la santé n'étoit pas même altérée, engendrèrent des principes de maladies aussi actifs de destruction, lorsque leurs haleines, confondues, amassées, se corrompent par leur mélange & par leur stagnation.

Les personnes atteintes par ces causes délétères, qui épargnent quelquefois les malheureux au milieu desquels elles se sont formées, deviennent à leur tour le foyer d'une véritable infection, & propagent la maladie dont elles sont atteintes, quoique d'ailleurs, ce mode de contagion ait échappé jusqu'à ce jour à toutes les recherches, & ne soit connu que par l'évidence des effets & la réalité des exemples.

Le corps de l'homme, dans plusieurs autres maladies, exhale souvent des miasmes qui agissent, provoquent, chez d'autres individus, une maladie analogue à celle qui les a produits, sans qu'il soit possible d'ailleurs de les attribuer à une sécrétion particulière, & de les comparer, soit aux venins, soit aux virus. L'humidité de l'atmosphère, mais surtout l'humidité chaude, favorise sensiblement l'action des miasmes dont nous parlons. Il n'est pas sans exemple qu'une masse d'air imprégnée de miasmes, ait été entraînée sous forme de tourbillon dans un lieu très-éloigné de l'origine de ces miasmes, & de manière à répandre aussi à une grande distance, les malheurs de cette espèce de contagion.

Les miasmes dont nous parlons, ne sont connus ni par le témoignage de nos sens, ni par les moyens eudiométriques. On a cru cependant, lorsqu'ils étoient fort concentrés, & que l'air étoit très-humide, que l'on reconnoissoit leur présence à une odeur fade, nauséabonde, fétide, ou quelquefois acide & comme alcaline. Il est probable que les miasmes provenant d'un état morbide n'agissent dans le plus grand nombre des cas sur les corps soumis à leur impression, qu'après qu'ils ont été absorbés; mais leur effet, dans quelques circonstances, est si rapide, que l'on peut bien supposer que ces causes délétères ont agissé directement & comme d'emblée, les explosions des aërs sans le concours d'aucune absorption.

Dans la plupart des épidémies, dans plusieurs maladies épidémiques de l'homme, mais principalement dans certaines dysenteries, les miasmes ne se forment qu'au moment où la maladie a le plus d'intensité, & lorsqu'un plus grand nombre d'individus s'en trouvent atteints en même temps. Au commencement de cette maladie, ces miasmes ne se produisent pas encore, & ils diminuent graduellement à mesure qu'elle devient moins grave & moins générale.

Le chlore en vapeur, détruit, neutralise, comme on sait, les émanations formées par des substances animales en putréfaction; mais l'efficacité de ce moyen est loin d'être prouvée pour les miasmes dont les individus malades sont le foyer: comme

en l'a appris par des exemples fréquens pour le typhus dont plusieurs infirmiers ont été atteints à différentes reprises à la Salpêtrière, tout en faisant les fumigations de Goyon de Morveau; moyen dont la connoissance doit être rangée parmi les découvertes les plus utiles du dernier siècle, mais en reconnoissant que l'on a un peu exagéré leur importance, & que plusieurs des effets qu'on leur a attribués n'ont véritablement existé que dans l'imagination de l'auteur & sur le papier.

Il paroit démontré par un assez grand nombre de faits, que les miasmes d'origine animale peuvent adhérer aux surfaces d'un très-grand nombre de corps, mais principalement au tissu linéux & cotonneux: ce qui explique comment, pendant les épidémies du typhus, le vestiaire dans un hôpital, est toujours le local où l'on est le plus exposé à cette maladie.

Les miasmes d'origine végétale prennent ordinairement naissance dans les lieux marécageux; ils produisent des effets particuliers, mais principalement les fièvres intermittentes, les fièvres pernicieuses de différentes espèces, & même, suivant quelques auteurs, la fièvre jaune, dans les lieux récemment défrichés, & sur les côtes insalubres & marécageuses d'une grande étendue.

M. Rigaud de l'Isle, qui s'est occupé en dernier lieu de cette importante question, a fait construire un instrument avec lequel il est parvenu à recueillir avec soin, dans les marais du Languedoc, des miasmes, qui furent analysés à Paris par M. Vauquelin.

Suivant les observations de ce physicien, les miasmes s'élèvent dans l'atmosphère avec la vapeur aqueuse des marais; ils se condensent ou se précipitent comme elle; ils y sont simplement mélangés; ils s'en séparent par le plus simple obstacle, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas dans les appartements fermés à l'accès direct des vents; ils s'en séparent encore par leur pesanteur, qui ne leur permet pas de s'élever à plus de trois ou quatre cents mètres: ce qui fait qu'au milieu des contrées les plus insalubres, les habitations élevées offrent un refuge assuré contre les maladies. Ainsi, get air que l'on jugeoit toujours le même, varie nécessairement dans ses qualités d'un moment à l'autre, la nuit ou le jour, le soir ou le matin, par le vent ou par la pluie, par l'chaleur ou par le froid; dans tel lieu abrité ou élevé, ou dans tels autres qui ne le sont pas, dans telle rue, ou dedans ou au dehors de telle habitation où de telle cité défendue ou non défendue par des vents directs.

« Frappé de l'analogie parfaite qui existe dans les circonstances des fièvres simples, & du plus mauvais remède, j'ai d'né dans mes Mémoires, dit M. Rigaud (1), quelques exem-

(1) Mémoires lus à la première classe de l'Institut en 1813 & 1814.

ples de la facilité avec laquelle il étoit possible d'expliquer, à l'aide de ces principes, des faits raisonnablement inexplicables de toute autre manière : faits qui avoient été représentés par d'habiles médecins, comme des anomalies. J'avois cru devoir alors garder quelques ménagemens, & laisser simplement présumer que je ne croyois pas à la contagion de certaines fièvres ; mais ces ménagemens sont inutiles, puisque, dans le moyen que je propose pour s'en garantir, je ne cesse d'insister sur la nécessité de ne proscrire aucune des précautions usitées en pareil cas, & que je recommande comme un préalable indispensable & comme un guide nécessaire, l'usage de l'instrument auquel on pourroit donner le nom de *condensateur des miasmes*.

« Je ne dis pas : croyez sur parole ; je dis : éprouvez & cherchez, l'expérience est plus propre que tous les raisonnemens du monde à résoudre ces questions embrouillées par la dispute, & je vous présente les moyens de vous en convaincre. La maladie est-elle dans l'air ? en vingt-quatre heures il est probable que vous pourriez vous en convaincre. Une fois produite & développée, a-t-elle le pouvoir de se régénérer indépendamment en vice primitif de l'atmosphère ? Des illusions pourroient vous égarer dans cette recherche, je vous offre les moyens de les reconnaître & de les éviter. »

« Les moyens de se préserver de l'action des miasmes de tous pays où ils sont à craindre, le résument à un petit nombre de choses :

« 1°. Eviter, pour sortir en plein air, le moment de la précipitation de la vapeur aqueuse, & de tout refroidissement brusque dans l'atmosphère. Si l'on ne peut pas faire autrement, interposer une toile, une simple gaze entre les organes de la respiration & l'air que l'on respire.

« 2°. Interdire dans les habitations tout accès direct aux vents qui apportent les miasmes, sans quoi la réclusion elle-même devient inutile.

« 3°. Neutraliser ces miasmes par des fumigations acides, quand on soupçonne qu'ils ont été introduits quelque part.

« 4°. Conserver les forces, en évitant tous les excès qui affoiblissent ; les entretenir, & peut-être même les augmenter par une nourriture plus substantielle (1). » (L. J. M.)

MICHELOTTI (Pierre-Antoine), médecin, natif de Trente, étoit de la Société royale de Londres, de l'Académie des sciences de Berlin & de l'Institut de Bologne ; il étoit encore du Collège des médecins de Venise, où il pratiqua avec beaucoup de réputation dès le commencement de ce siècle ; ce fut aussi dans cette ville qu'il fit imprimer les ouvrages que nous avons de lui. On remarque parmi eux un écrit en italien, contenant ses con-

jeures sur la nature, les causes & la cure de la maladie qui attaqua le gros bétail dans l'Etat de Venise, vers l'automne de l'an 1711 : l'édition est de Venise, 1712, in-8°. On remarque encore :

De separatione fluidorum in corpore animalis, Dissertatio physico-mechanico-medica, Venetiis, 1721, in-4°. A l'exemple de Bellini, de Pitcairn & de Keill, il applique les mathématiques à la médecine, & il prouve qu'on peut en tirer un grand parti à plusieurs égards ; mais il recommande très-fort de n'en point abuser.

Epistola ad Bernardum Fontenellum, in qua, an aer pulmones influens cogat ne, an solvat sanguinem eorum canales permeantem, inquiratur, Lutetiae Parisiorum, 1724, in-4°. Le sentiment que Claude-Adrien Helvétius avoit avancé dans son Mémoire de 1718, sur la condensation du sang dans les poumons de l'homme, a mérité l'attention de Michelotti. Il soutient une opinion contraire, & prétend que l'air, en se mêlant avec le sang, le raréfie & lui donne une couleur plus rouge.

Rari ac propi inauditi ex utero morbi hystoria, una cum necessariis medicis animadversionibus, Venetiis, 1726. Il s'agit d'une longue abstinence d'alimens & de boissons. *Apologia in qua Bernouillium motricis fibre in musculum motu in flatu curvatorum suppositae defenditur*, Venetiis, 1727, in-4°. (Extr. d'Eloy.) (R. GEORGIOS.)

MICHON (Pierre), connu sous le nom de *abbé Bourdelot*, étoit fils de Maximilien Michon & d'Anne Bourdelot, petite nièce de Marie Bondelet, mère du fameux Théodose de Bèze, ministre de Genève. Pierre naquit à Sens, en 1610 ; son père étoit chirurgien : il apprit sur lui les premiers principes de cet art, & quelques éléments de pharmacie & de chimie. Se sentant du goût pour la médecine, il se rendit à Paris, auprès de ses oncles maternels, dont l'un, Edme Bourdelot, étoit médecin du roi Louis XIII. Dès qu'il fut mis sur les bancs de la Faculté de médecine, son oncle desira qu'il portât son nom, en obtint l'agrément du Roi, & depuis on ne connut Michon que sous le nom de Bourdelot.

En 1635 il suivit le comte de Noailles, qui se rendoit comme ambassadeur à Rome. Revenu à Paris, il s'attacha à Henri II, prince de Condé, qui le prit comme médecin, quoique Bourdelot ne fût pas encore reçu docteur, ce qui n'arriva qu'en 1642.

La même année il fut reçu médecin du Roi, quoique toujours attaché à la maison de Condé. En 1651, la reine Christine de Suède étant tombée malade, Bourdelot fut appelé : elle fut si satisfaite de ses avis, qu'elle demanda & obtint pour lui l'abbaye de Macé, vacante par la mort de M. de Châteauneuf, garde-des-sceaux de France. Lors de son séjour à Rome, il avoit obtenu des dispenses d'Urban VIII, qui lui avoit permis de posséder des bénéfices, sous la condition d'exercer la médecine gratuitement.

(1) Voyez le *Mémoire* du 14 novembre 1819.

Il mourut en 1685, d'un accident funeste, à l'âge de soixante-seize ans. Un domestique mit inconsidérément un moreeau d'opium dans le pot de roses musquées, dont il se servoit ordinairement pour le purger : il en prit un matin, & ayant reconnu l'opium au goût, il en rejeta une partie. Il ne laissa pas de demeurer près de vingt-quatre heures dans un tel assoupissement, qu'il étoit tout-à-fait insensible. Comme dans cet état on s'empressoit de l'échauffer, il fut brûlé au talon par une bassinoire, & il n'en sentit rien qu'après être revenu de son sommeil. Peu de temps après, la gangrène s'y mit & il en mourut. Il a publié quelques ouvrages peu importants.

Recherches & observations sur les vipères, Paris, 1670, in-12; *Histoire de la maladie & de la mort de M. de.....*, Paris, 1684, in-12. M. Galois a recueilli trois volumes de ses conférences.

(R. GROSSEAU.)

MICROCOSME, f. m., de *μικρος*, petit, & de *κοσμος*, monde. Dénomination qui fut donnée à l'homme, dans les vues d'une philosophie excentrique, & pour présenter sa structure comme un abrégé des merveilles de l'Univers, la mesure de toutes choses, l'archétype universel.

Un article d'une certaine étendue & sons un pareil titre, appartient bien moins à un dictionnaire des sciences médicales, qu'à l'histoire des erreurs de l'esprit humain. Pour le développer convenablement, il ne faudroit rien moins que rappeler les relations imaginaires de l'homme, avec le feu & la lumière, les planètes, les étoiles fixes, leurs différentes influences, la comparaison des mouvemens généraux de l'Univers, la révolution diurne de la terre, de la succession des siècles, avec le mouvement de la vie humaine, la liaison de cette existence avec les causes nombreuses qui la modifient, enfin l'harmonie de tous les êtres, la somme & l'enchâinement de toutes les existences, & les fluides incohérents qui établissent cette relation. Nos lecteurs sans doute n'exigeront pas de nous une pareille tâche, & nous saurons gré de les renvoyer, relativement à cette philosophie occulte, à *saint Thomas d'Aquin*, à *Marfile Picin*, à tous les médecins, astrologues ou méromanes, dont les systèmes rappellent une des plus tristes époques de la physiologie.

(L. J. M.)

MICROCOUSTIQUE, adject., de *μικρος*, petit, & du verbe *ακουω*, j'entends.

On a désigné sous ce nom tous les moyens, tous les instrumens qui ont pour objet de faire entendre les sons les plus faibles, les moins appréciables ou les plus éloignés, en s'opposant à la divergence des rayons sonores : le porte-voix, les cornets acoustiques sont des instrumens de ce genre, & dont l'examen appartient évidemment à l'hygiène considérée sous le point de vue le plus étendu & dans

son application aux moyens d'établir des compensations & des allègemens, à tous les genres de privations ou d'infirmités dont la vie humaine est susceptible. (Voyez MICROPHONE, PORTE-VOIX, &c.) (L. J. M.)

MICROGRAPHIE, f. f., de *μικρος*, petit, & de *γραφω*, écrire ou peindre. Description des petits objets, des tissus les plus déliés de nos organes, des animalcules, des corpuscules animaux ou végétaux, à l'histoire desquels on a grand nombre d'hommes laborieux & célèbres ont attaché leur nom. (Voyez MICROSCOPE.) (L. J. M.)

MICROPHONE, f. m. & adject., de *μικρος*, petit, & de *φωνη*, voix. On désigne sous ce nom les instrumens qui, comme le porte-voix, augmentent l'intensité des sons, & les font percevoir à une plus grande distance. (L. J. M.)

MICROPTHALMIE, f. f., de *μικρος*, petit, & de *οφθαλμος*, œil; littéralement, petit œil, & faisant une expression populaire, œil de cochon.

Les oculistes, qui ont été en général très-prodiges de mots techniques, ont désigné par cette dénomination l'état morbide de l'œil, dans lequel cet organe, à la suite de douleurs plus ou moins vives, diminue insensiblement de volume.

(L. J. M.)

MICROCHIDE, f. m.; *μικροχιδος*; littéralement, petit testicule, en adoptant la définition de Castelli.

L'affoiblissement, la diminution indiquée par cette dénomination technique, arrive au point que l'organe affecté paroît presque entièrement se détruire. On a vu quelquefois le *microchide* résulter des longues saignées de plusieurs campagnes, des privations qui les ont accompagnées, de l'abus des liqueurs spiritueuses, & surtout de l'eau-de-vie préparée avec les dattes, ou chargée de quelques principes narcotiques.

Ce fut sans doute à des circonstances semblables, qu'il faut attribuer le *microchide* par atonie, dont M. Larrey a rapporté plusieurs exemples, & qui se manifesta chez plusieurs soldats, après la campagne de 1799 (1). (L. J. M.)

MICROSCOPE, de *μικρος*, petit, & de *σκοπω*, je regarde. C'est le nom d'un instrument de dioptrique, au moyen duquel on parvient à considérer une sorte d'objets que leur exiguïté sembloit soustraire à jamais à notre observation; tels que les animalcules, ou plusieurs détails de la structure, soit animale, soit végétale.

Avec le simple secours de l'œil, la vision ne peut être nette & distincte, si les objets ne sont pas au moins à huit pouces de l'organe; avec le mi-

(1) Voyez Larrey, *Mémoires de chirurgie militaire*, tom. II, pag. 62.

crocope on augmente l'angle optique sous lequel on aperçoit un corps, en ne conservant toutefois à chaque faisceau lumineux, que le degré de divergence nécessaire. Le verre de l'instrument est appliqué contre l'œil, l'objet que l'on veut regarder se trouvant derrière la lentille, à une distance qui égale la longueur de son foyer principal, de telle sorte que la lumière réfractée pénètre dans l'œil, & se conduit comme si elle parloit d'un point réellement plus éloigné; ce qui ne profite les objets qu'en permettant de les voir de plus près.

On reconnoît des microscopes simples, des microscopes composés & des microscopes solaires. (Voyez ces mots dans le Dictionnaire de Physique.)

La découverte du microscope, & l'application de cet instrument aux observations physiologiques, ont fait époque dans l'histoire de l'anatomie de l'homme & des animaux. On leur doit plus particulièrement les résultats curieux des recherches de Rêdi & de Valsueri en Italie, sur les points les plus délicats & les plus difficiles des sciences naturelles. Les observations de La wrenock & d'Hartloeker en Hollande, sur les animalcules des infusions; les travaux de Swammerdam & Linné, sur l'organisation des insectes; de Malpighi & de Grew, sur la composition des tissus organiques, & plus récemment de Henson, sur la configuration des globules du sang & de plusieurs autres fluides, &c. (Voyez Microscopiques (Observations, recherches), dans les Dictionnaires d'anatomie.) (L. J. M.)

MICROSCOPIQUES (Animaux). On a désigné sous ce nom un grand nombre d'animalcules, dont quelques-uns ont été regardés comme la cause nécessaire ou l'effet constant de certaines maladies; tel est principalement l'*acarus* de la gale (*acarus scabiei*), auquel on a voulu attribuer, dans ces derniers temps, le développement de cette maladie. (Voyez l'article (Maladie).)

Quelques auteurs ont prétendu étendre cette idée d'un effet irritant & vénéréux de quelques animalcules, au développement de plusieurs autres maladies; telles que la syphilis, la dysenterie, les dartres. Ce système qui n'est pas moins de crédit que plusieurs autres théories, & qui compte comme elles des partisans enthousiastes & de violents antagonistes, s'élève surtout à la fin du dix-septième siècle & au commencement du dix-huitième.

Les médecins, les physiologistes, qui furent les promoteurs, ou les partisans les plus célèbres de cette théorie des animalcules, ne craignirent point de lui donner toute l'étendue d'un système général de pathologie. L'organisation de l'homme & des animaux, dans les différents états morbides dont elle est susceptible, devint pour eux un monde nouveau, peuplé d'animalcules ayant des formes, des mœurs différentes, qu'ils prétendirent voir ou avoir vues, à l'aide du microscope,

qu'ils décriront sans oublier d'enrichir ou de compléter leurs descriptions par des gravures. Un des hommes des plus éclairés du dernier siècle, Peyrilhe, avoit adopté, pour l'appliquer à quelques maladies, une partie de cette théorie, qu'il présentait toutefois avec la forme du doute, mais en lui donnant une grande apparence de probabilité, par une foule d'observations piquantes & de rapprochemens ingénieux. (L. J. M.)

MIDI. (*Hygiène.*) Midi, ou la deuxième heure, s'est trouvé long-temps chez les peuples modérés, surtout pour les classes inférieures de la société, la partie du jour que l'on consacroit au repas le plus nourrissant, & à quelques momens de repos, d'où la *méridienne*, sur laquelle nous croyons devoir revenir dans cet article.

On appelle *méridienne*, le sommeil que l'on prend après midi, surtout après un travail excessif, & chez les peuples du Midi; presque tous les animaux dorment dès qu'ils sont rassasiés: c'est l'effet d'un instinct qui ne les trompe jamais. L'usage de ce sommeil est très-ancien; on peut en juger par le passage de l'*Odyssée* d'Homère, où il est dit que Nestor dormoit après avoir mangé; cet usage étoit très-commun à Rome. Auguste, au rapport de Suetone, dormoit à la suite de son dîner; Varron dit qu'il n'auroit pu vivre s'il n'eût partagé les jours de l'été par la *méridienne*.

Tous les peuples orientaux & méridionaux dorment après le dîner, & plusieurs fondateurs d'Ordres religieux prescrivirent ce sommeil à leurs disciples. On pourroit encore citer en faveur de la *méridienne*, l'exemple de plusieurs personnes très-éclairées, qui ont éprouvé qu'elle contribuait à leur santé: tel étoit Du Ronin, médecin célèbre, qui, malgré les fatigues auxquelles l'exposoit la confiance de la ville la plus peuplée (Paris), est parvenu à un âge très-avancé.

Cependant l'utilité de ce sommeil est devenue un problème, & plusieurs médecins très-éclairés l'ont regardée comme chimérique; ils font même allés jusqu'à blâmer ce sommeil comme dangereux: mais des préjugés ne les ont-ils pas égarés? on a lieu de le présumer quand on réfléchit aux effets que doit produire ce sommeil, & quand on voit que pour éloigner les inconvénients qu'il peut avoir, il ne faut que le renfermer dans de justes bornes, & ne le permettre qu'à certaines personnes, & dans des circonstances faciles à déterminer.

Ceux qui blâment la *méridienne*, prétendent qu'elle nuit à la digestion; ceux qui l'approuvent, croient au contraire qu'elle la favorise: & pour se convaincre de son utilité, il ne faut doute que s'assurer de l'effet qu'elle produit relativement à cette fonction.

La digestion qui commence dans l'estomac, se perfectionne dans le duodénum & les intestins, & s'achève dans la masse humorale; même par l'assimilation du chyle. (Voyez Digestion.)

S'il est évident que la *méridienne* peut favoriser l'une de ces trois digestions, & qu'en la renfermant dans de justes bornes, elle ne peut nuire à aucune des autres, il la sera également que, loin de devoir être proscrite, elle doit être admise comme très-avantageuse.

La première digestion, celle qui se fait dans l'estomac, est, selon Boerhaave, l'effet de la dissolution des aliments par les liqueurs gastriques, par la salive, & surtout par le mélange du fluide nerveux, qui y abonde en grande quantité. La chaleur du lieu rend cette dissolution facile, & la pte alimentaire éprouve dans l'estomac un commencement de fermentation putride & acide.

Tout ce qui pourra entretenir dans l'estomac une chaleur modérée, y favoriser l'abord du fluide nerveux & la fermentation nécessaire, contribuera donc à la perfection de cette digestion. Or, pendant le sommeil, la circulation, surtout dans les gros vaisseaux, se fait avec liberté, & la chaleur intérieure augmente en même proportion. La situation de l'estomac le fait participer à cette augmentation de chaleur, & la *méridienne*, en tant que le sommeil, entretiendra dans ce viscère la chaleur nécessaire à la digestion.

Le fluide nerveux est employé pendant la veille à tant de fonctions, qu'il en résulte une dépense considérable; & comme dans le sommeil il s'en fait une moindre consommation, il s'en dépose alors une plus grande quantité dans l'estomac. La *méridienne*, en économisant ce fluide précieux, sera encore, sous ce rapport, favorable à la première digestion.

Le repos est une condition si nécessaire à la fermentation, qu'elle n'a que difficilement lieu dans les vaisseaux continuellement ballottés. La *méridienne* qui procurera ce repos important à l'estomac, favorisera donc ce mouvement intestin sans lequel la digestion seroit imparfaite.

Mais il faisoit à craindre que la fermentation ne fût portée trop loin; il faut que la pte alimentaire, après avoir éprouvé un commencement de ce mouvement intestin, passe dans le duodénum, où le mélange du suc pancréatique & de la bile lui fait éprouver une autre modification. Quoique ce passage fût le seul mouvement organique de l'estomac, il est avantageux qu'une légère agitation le facilite; cette agitation est encore nécessaire pour que le chyle parcoure les petits intestins, & se présente aux orifices des vaisseaux qui absorbent le chyle; pour que ce chyle parcoure le système des glandes & des vaisseaux lactés, se porte dans la tourelle; enfin, pour que cette liqueur nourricière, introduite dans la masse humorale, s'y assimile par le jeu des vaisseaux. Si la *méridienne* étoit continuée trop longtemps, elle nuirait à la seconde & à la troisième digestion.

Sa durée doit donc être limitée au temps nécessaire pour opérer la première, ou tout au moins pour

la porter au point où elle puisse s'achever facilement, & sans le concours de toutes les circonstances, dont la nécessité est presque indispensable dans les premiers moments. Il n'est pas possible de déterminer cette durée avec une précision mathématique, parce que les données de cette espèce de problème sont trop multipliées; mais heureusement que cette précision n'est point d'une nécessité absolue: qu'on pourroit, sans de grands inconvénients, faire une *méridienne*, ou un peu trop courte, ou un peu trop longue, & même s'y refuser, & que l'expérience à répandu sur cet objet des lumières suffisantes; elle a fait connoître que les personnes affaiblies par les maladies, par l'âge ou par les fatigues de l'esprit, digèrent plus lentement que celles qui jouissent d'une santé vigoureuse, qui sont à la fleur de leur âge, & excréent plus leur corps que leur esprit; que pendant l'hiver & dans les pays froids, la digestion se fait plus facilement qu'en été, & dans les climats chauds; qu'un estomac, toutes choses étant égales, digère plus promptement une petite quantité d'aliments qu'une grande; enfin, que si, dans quelques tempéraments & dans quelques circonstances, la première digestion exige; pour être faite en partie, une ou deux heures & même plus, il en est d'autres dans lesquelles cette fonction s'exécute avec tant de célérité, qu'avant la première heure, la pte alimentaire passe pour la plus grande partie dans les intestins; qu'ainsi la *méridienne* ne doit jamais dépasser deux heures; que souvent même il suffit d'y donner une heure, & même un temps moins long. La saison, le climat, l'état des forces, la nature du travail auquel on se livre, la quantité & la qualité des aliments; voilà ce qui doit décider la durée de la *méridienne*.

D'ailleurs, tous les hommes n'en ont pas un égal besoin; elle n'est pas également nécessaire dans tous les climats & dans toutes les saisons, & l'habitude en rend l'usage plus ou moins important.

Il est des hommes qui donnent tous les jours au sommeil plus de six à sept heures, espace de temps que la raison permet d'y employer, & la *méridienne* n'est point faite pour eux, parce que l'excès du sommeil est dangereux; il en est qui, après avoir sacrifié une grande partie de la nuit à l'insomnie ou aux plaisirs, ne s'éveillent que lorsque le soleil a déjà parcouru une partie de la carrière, & ils ne doivent point dormir après le dîner, à moins que ce repas ne soit beaucoup retardé, encore alors ce sommeil ne leur conviendrait-il que très-rarement, parce qu'il fera trop rapproché de celui que l'on est disposé à prendre la nuit.

L'indigence, l'ambition, le louable desir de se rendre utile à la société, mille autres motifs aussi pressants, forcent la plupart des hommes à se refuser à ce sommeil, & l'habitude qu'ils en ont contractée leur rend moins nécessaire. Tous peuvent cependant s'y livrer sans inquiétude, tous le doivent

lorsque la chaleur excessive affaiblit considérablement leurs forces, lorsqu'ils ont surchargé leur estomac d'une grande quantité d'alimens, lorsque le sommeil de la nuit a été ni assez tranquille, ni assez long; & il en est pour lesquels la *méridienne* est d'une importance qui leur impose l'obligation de la faire, sans peine de vivre dans la langueur & de succomber à leurs maux.

De ce nombre sont les enfans, les vieillards & les valétudinaires : les uns, surtout dans le premier âge, ont besoin de croire, il leur faut un chyle très-parfait; les autres ont si peu de chaleur, si peu de fluide nerveux, que sans la *méridienne*, leur digestion seroit très-difficile.

Le défaut de chaleur intérieure rend la *méridienne* très-utile aux phtisiques & aux pituiteux; elle est nécessaire aux gens de lettres, aux vaporeux & aux mélancoliques, à raison de la fécheresse de leurs fibres, à raison de la prodigieuse déperdition d'esprits animaux qu'ils font pendant la veille; ce dernier motif doit engager également les voluptueux à y avoir recours.

Quelq'avanantage cependant que le sommeil, pris après le repas, puisse être à ceux à qui il convient, les avantages qu'il est capable de procurer ne dépendent pas seulement de sa durée, mais encore du lieu dans lequel on s'y livre, de la situation que l'en garde pendant le sommeil, & même de la manière dont on est habillé ou couvert.

L'estomac a deux ouvertures; l'une donne entrée aux alimens, l'autre leur livre passage dans les intestins : ce n'est qu'après avoir été atténués par la fermentation & par les autres agens de la digestion, qu'ils doivent pénétrer dans le canal intestinal. Il faut donc qu'ils ne s'échappent point avant que cette atténuation ne soit faite; & l'estomac, pendant qu'elle s'opère, doit être dans une position qui eblige les alimens à y séjourner. L'enlèvement par lequel ils sortent de ce viscère, est un peu supérieur à son fond; si l'on se couchoit horizontalement, la pâte alimentaire en seroit trop rapprochée, elle pourroit entrer dans le canal intestinal avant d'être assez digérée; d'ailleurs, l'estomac seroit trop fur les gros vaisseaux. La situation horizontale est donc à craindre; la perpendiculaire seroit beaucoup plus favorable, mais elle auroit l'inconvénient d'occasionner un tiraillement incommode, une compression nuisible : on doit lui préférer la position dans laquelle le corps est un peu incliné à l'horizon, parce qu'alors les alimens sont retenus dans le fond de l'estomac par leur propre poids, & que la pesanteur de ce viscère n'est plus fatigante.

Ceux qui voudroient faire la *méridienne* ne doivent donc pas se coucher sur un lit & parallèlement à l'horizon, mais s'asseoir sur une chaise ou sur un sofa, la tête haute, le corps légèrement penché en arrière, & même un peu tourné sur le côté gauche.

Dans cette situation, l'estomac ne pèse point sur

les gros vaisseaux qui rampent le long des vertèbres, le cours du sang n'est point gêné; la liberté de la circulation est même ici d'une nécessité si indispensable, qu'il faudra ôter ou relâcher tous les liens dont la médecine & l'usage nous embarrassent : il faut encore être modérément couvert, & choisir, pour se livrer au sommeil, un endroit ni trop chaud, ni trop froid.

On sent aisément les motifs de ce conseil : on sent que, dans un moment où une chaleur modérée est nécessaire, il seroit également dangereux de s'exposer à l'affaiblir ou à la trop augmenter.

On trouve dans le Traité de Valverde, de *Sanitate tuenda*, édit. de Paris, 1551, & que Calzer Daurante a presque copié entièrement dans un ouvrage qui a pour titre *Tesoro della sanita*, & dans les dialogues latins de Georges Pictorius, édit. de Paris, 1555, des détails précieux sur les précautions avec lesquelles on doit se livrer au sommeil de l'après-dîner; il en est même une bien importante sur laquelle ils insistent également, & qui mérite qu'on y ait égard, c'est de ne pas éveiller brusquement ceux qui sent la *méridienne*. On sent l'importance de ce conseil, quand on réfléchit à l'époque de commotion que donne la surprise.

En s'astreignant à suivre les règles prescrites pour l'usage de la *méridienne*, on n'aura nulle pesanteur, nulle douleur de tête, nul engourdissement à craindre, accidens que l'on a quelquefois éprouvés en les négligeant, & qui ont autorisé plusieurs médecins à la proscrire. (L. J. M.)

MIEL, f. m.; *mel*, *mellis*; μέλι, des Grecs. On donne ce nom à une substance liquide & sucrée, formée par les abeilles, & pouvant être employée, soit comme nourriture, soit comme assaisonnement, soit comme médicament.

Le miel existe-t-il déjà tout formé dans le calice des fleurs, ou doit-il les propriétés constitutives à un travail sécrétaire & opéré par les organes des abeilles? Nous renvoyons, pour cette intéressante question, à l'article MIEL, dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*. Nous nous bornons dans cet article à quelques remarques sur le miel, considéré comme aliment & comme médicament.

Le miel considéré comme aliment, est plus ou moins recherché, & plus ou moins facile à digérer suivant les lieux qui le fournissent. Ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, les miels parfumés & légèrement toniques de Narbonne, de Minorque, de Mahon, du Mont-Hymet, doivent être placés au premier rang.

Le miel de l'île de Bourbon, que l'on appelle aussi le *miel vert*, a une saveur particulière, tonique & aromatique, qui le fait rechercher & comme aliment & comme médicament.

Le miel de Bretagne, qui est d'une couleur brune & d'une odeur désagréable, qu'il doit aux fleurs

Heurs de farraizin, est d'une qualité sensiblement inférieure.

Le miel que l'on recueille au printemps, quel que soit d'ailleurs le lieu qui le fournit, est de beaucoup préférable à celui qui reste dans la ruche jusqu'à l'automne. La cupidité, qui ne laisse échapper aucune occasion de faire naître ou d'exciter l'industrie, s'est appliquée à la sophistication du miel; ce qui s'opère, soit avec la farine, soit avec la pulpe des châtaignes, pour gagner environ un sixième. Dans le cas où l'on pourroit soupçonner un semblable mélange, il seroit facile de s'en assurer, en faisant chasser le miel, qui, loin de se liquéfier, deviendrait plus consistant s'il étoit falsifié.

Quelques personnes ne digèrent pas aussi bien le miel que le sucre, & soit qu'elles en aient fait usage comme aliment, ou comme le véhicule de quelques médicamens, elles éprouvent, après en avoir pris, des tranchées, des coliques qui peuvent être suivies d'évacuations assez considérables. On attribue principalement ces effets à une matière épaisse, de la consistance d'une pâte réduite & d'apparence granuleuse, formant à peu près onze quatorzièmes d'une quantité donnée de miel, & dont il fût de faire l'extraction, pour que le miel puisse être employé comme le sucre dans toutes espèces de préparations alimentaires & pharmaceutiques. En faisant fermenter le miel, en le mêlant avec le vin, l'alcool, le vinaigre, ou en forme plusieurs préparations d'usage salubre ou agréable.

On a souvent parlé, sur l'autorité de Xénophon, d'un prétendu miel vénéneux de la *Colchide*, regardé comme tel d'après des effets que l'on peut admettre, suivant cet historien, mais qui prouveroient seulement que les soldats qui avoient mangé avec excès de ce miel, auroient eu une espèce d'indigestion, accompagnée, comme la plupart des affections abdominales, de délire & de folle honte indécrite. On pourroit du reste ranger parmi les fables que plusieurs auteurs anciens ont recueillies d'après les traditions populaires, ce que Dioscoride & Plinie le Jeune ont raconté, d'un miel vénéneux, qui jetoit dans le délire ou la folie quelques personnes qui mangeoient d'un certain miel d'*Hémécle*. Toutefois il ne faudroit pas envenimer rejeter cette assertion sans examen, si, à l'époque où l'on recueille ce miel prétendu vénéneux, les abeilles qui le fournissent, ont récolté le pollen de plantes malfaisantes, & principalement de *Asclepias poatica*, ainsi que Tournefort l'a rapporté d'après des traditions très-anciennes, & qui subsistent encore parmi les habitans des bords de la Mer-Noire.

Les Anciens employoient le miel simple ou ses différentes préparations, pour un grand nombre d'usages auxquels les Modernes ont substitué le sucre, surtout pour les médicamens qui se donnent sous la forme sirupeuse. On conserve cependant encore dans les pharmacars & sous différents noms,

MÉDECINE. Tome X.

plusieurs miels pharmaceutiques (les *mellites*), tels que le miel de concombre sauvage, assez souvent employé par les Anciens comme purgatif; le miel cuivreux (onguent égyptiac) n'est employé qu'à l'extérieur; le miel mercurel composé, qui est plutôt une espèce d'elixir qu'un véritable mellite; le miel de néphtar, tombé à peu près en désuétude; le miel rosat, souvent conseillé pour les gargarismes, & formant en particulier la base d'une préparation contre les aphtes, mélange, soit avec l'acide sulfurique, soit avec le borax; le miel scillitique, auquel on préfère l'oxymel du même nom. (*Voys MIEL & OXYMEL*, dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie.*)

(L. J. M.)

MIER (Eaux minérales de). Mier est un village près de Nudet, où se trouve une source minérale froide, appelée fontaine de Saint-Félix; elle est dans le pré de Saint-Michel de Bagnères. Raulin, pag. 295, regarde les eaux de Mier comme vitrioliques. En 1624, Fabri a vanté ces eaux; & a donné quelques observations de maladies guéries par leur fait. Dans le *Dictionnaire hydrologique*, &c., ces eaux font présentées comme purgatives, rafraîchissantes, utiles dans les obstructions des viscères, des voies urinaires, dans les affections hysteriques, les fièvres intermittentes rebelles & les fleurs blanches. (MACQUART.)

MIGRAINE. La migraine est ordinairement considérée sous un point de vue purement pratique, & d'après l'observation des symptômes qu'elle présente le plus souvent chez les personnes qui en sont affectées. Cette maladie peut être envisagée en outre sous un rapport plus étendu; soit en mettant à contribution les archives de la médecine pratique, soit en s'appuyant de quelques aperçus de physiologie médicale, qui ont pour objet d'en faire connoître la nature, le siège & le traitement.

Dans l'article ci-joint que nous avons tiré des archives de l'*Encyclopédie méthodique* pour le *Dictionnaire de Médecine*, l'auteur s'est attaché à ce premier point de vue. Nous tâcherons de développer le deuxième dans un article assez étendu, pour offrir tous les caractères d'une monographie médicale. (L. J. M.)

La *MIGRAINE*, *hemicrania*, est définie par Sauvages, Linné, Vogel & Sagar, *une douleur aiguë qui occupe un côté de la tête*. Cullen n'en fait point mention dans ses classes de maladies. Le mot d'*hemicrania* exprime la même idée. Il est formé de deux mots grecs, *hemi*, moitié, *crâne*, ou *dessus de la tête*, comme qui diroit, maladie qui affecte la moitié du crâne ou de la tête.

Les symptômes caractéristiques de cette affection sont une douleur vive, des élancemens qui ordinairement n'occupent qu'un côté de la tête & principalement du front au-dessus de l'œil, dont la violence est si grande, qu'il semble aux malades

Q

que leur crâne va se fendre ; dans cet état ils ne peuvent qu'avec peine supporter la lumière ; le bruit augmente les élancements qu'ils éprouvent ; & pendant le cours de l'accès, la force du mal leur ôte l'appétit. Quelques personnes croient que le côté gauche de la tête est le plus sujet à être atteint par ces douleurs : c'est ce que je n'ai pu observer. On prétend aussi que les femmes sont plus sujettes que les hommes à le migraine. Je eroirois avoir remarqué le contraire, à moins qu'on ne confonde avec cette infirmité les douleurs de tête nerveuses & hystériques, auxquelles bien des femmes sont sujettes.

Quoique le migraine soit toujours accompagnée d'une vive douleur dans un côté de la tête, on y observe cependant des différences. D'abord, cette douleur n'est pas égoutte, sans quoi on ne pourroit la supporter; elle prend par accès, & ces accès sont plus ou moins fréquents; quelquefois ils reviennent deux ou trois fois par semaine, ce qui est rare; dans d'autres circonstances ce n'est que toutes les trois semaines, tous les mois, & même après des intervalles plus considérables que les malades en sont atteints. La durée de ces accès varie également. J'ai connu des personnes qui ne les éprouvoient que pendant cinq ou six heures, d'autres pendant vingt-quatre heures, & quelques-unes durant deux ou trois jours de suite. Il en est de même de la force & de la violence des douleurs pendant l'accès: chez quelques personnes elles sont extrêmes, tandis que chez d'autres elles sont supportables. Au reste, quelles que soient ces différences, les accès n'ont aucun marche réglé, aucun type uniforme.

Il n'est pas aisé d'assigner les causes de la migraine, & de connoître pourquoi certaines personnes y sont sujettes, tandis que beaucoup d'autres sont exemptes de cette maladie. On voit bien que certaines causes peuvent déterminer plus ou moins le retour des accès, telles que l'impression d'un air froid, un coup de vent dunt un côté de la tête aura été subitement frappé, quelques excès dans la boisson ou les élimens, un mouvement vif de passion, tel que la colère, la suppression de quelques évacuations, &c. Toutes ces causes peuvent déterminer les accès de migraine & les rendre plus violents & plus longs, mais elles ne produisent pas le même effet chez ceux qui n'y sont pas sujets. Il faut qu'il y ait une certaine disposition à cette infirmité, soit qu'elle soit héréditaire ou qu'elle dépende du tempérament, soit qu'elle soit la suite de quelque maladie. En effet, j'ai connu quelques personnes devenues sujettes à la migraine, à la suite de maladies graves, tendus que d'autres en ont été délivrés après avoir eu une longue fièvre quarte. Il y a donc une disposition soit naturelle, soit dépendante d'un changement dans le tempérament, qui donne lieu à la migraine. Mais, quelle est cette disposition? c'est sur quoi il faut avouer notre ignorance.

La migraine n'est point une maladie dangereuse par elle-même, quelques opinions qu'aient avancées Spigel, Bartholin, Wepfer & quelques autres médecins & anatomistes, qui voulaient faire dépendre cette affection d'un vice particulier dans l'intérieur du crâne. Cependant, si l'on abuse de la saignée, si l'on donne dans des excès, non-seulement les accès deviennent plus rapprochés & plus vifs, mais ils peuvent dégénérer en des maladies aiguës ou en des maux de tête habituels & fatigans. Il n'est de même s'en entreprendre de la guérir par l'usage de topiques répétés: l'humeur qui se portoit sur les nerfs des membranes de la tête & les irritoit, se trouvant déplacée, peut se jeter sur quelqu'autre partie & y produire des revages. On rapporte dans l'*Encyclopédie* l'exemple d'une femme qui, après s'être débarrassée de la migraine par ce moyen, eut des douleurs vives au fond de l'œil qui se terminèrent par la cécité. Enfin, quand la migraine, sans aucun remède, parvient à se dissiper d'elle-même, il y a encore à craindre que l'humeur acre qui lui donnoit naissance, ne fasse irruption sur quelques viscères essentiels à la vie, ce qui peut avoir des suites funestes. J'ai connu un homme qui, après avoir été sujet pendant plus de trente ans à des migraines vives & assez fréquentes, se sentoit d'en avoir été délivré naturellement, lorsqu'il fut pris d'une violente péripneumonie qui se termina par un abcès au poulmon & le conduisit au tombeau.

Ne connoissant point la véritable cause de cette maladie, il est difficile d'y apporter les remèdes curatifs; on ne peut que pallier la migraine, en éloigner les accès & diminuer la violence des accès qui les accompagnent. Cependant, si l'on fait attention que la migraine est le plus souvent la suite d'un mauvais état de l'estomac; que les malades qui, durant l'accès, ont des vomissemens, en sont en général plus débarrassés; que plusieurs, en prenant une tasse de café un peu fort & sans sucre, mettent fin à leurs accès; enfin, que les antispasmodiques toniques & stomachiques, tels que le quinquina, donnent en général du soulagement dans cette incommodité: on en conclura que le moyen le plus de guérir, au moins de modérer la migraine; doit consister à vider l'estomac des mauvais levains qu'il contient, à le fortifier ensuite en facilitant la digestion, & enfin à calmer l'irritation du genre nerveux & particulièrement des nerfs de l'estomac, par les antispasmodiques. Ainsi, le véritable traitement de cette maladie, celui qui soulage le plus dans cet état, consiste à donner d'abord un vomitif: l'émétique dans ce cas n'agit pas seulement sur l'estomac comme évacuant, mais le secousse qu'il excite dans toute la machine, donne un ébranlement à tout le genre nerveux, change la direction & l'influx du fluide qu'il chassie, & l'on sait combien est grande la correspondance sympathique de l'estomac avec la tête. Après cette

première opération, l'usage des amers est propre à rétablir les digestions & à faciliter le travail de l'estomac. Parmi ces amers, il en est un auquel on doit donner la préférence, quoi qu'en dise J. Fordyce dans sa dissertation de *hemieranis*, imprimée à Loovain, 1765; c'est le quinquina, qui est en même temps antispasmodique & qui convient d'autant mieux, que le système des nerfs paroît particulièrement affecté dans la migraine. On peut y joindre les martiaux, quelques amers toniques, & même la racine de valeriane sauvage, recommandée par Fordyce; mais le quinquina doit être la base & le principal de ces remèdes. Enfin, les personnes sujettes à cette fâcheuse incommodité, feront bien de se purger de temps en temps avec des purgatifs amers, tels que la rhubarbe & les préparations, pour rétablir le ton de leur estomac, en faisant usage, dans la saison convenable, des eaux minérales martiales. Par ces moyens on parviendra à modérer, à éloigner les accès de migraine, & peut-être à les guérir tout-à-fait. Mais il faut en même temps observer un régime convenable, éviter toute espèce d'excès, surtout dans le manger, n'user que d'aliments de facile digestion & point échauffans, avoir soin d'entretenir la liberté du ventre, éviter les impressions d'un air froid principalement sur la tête, en un mot, s'observer sur l'usage des six choses non naturelles.

Dans le sort de l'accès on peut chercher à en diminuer la violence par le moyen de l'odeur de quelques esprits volatils ou d'essences aromatiques, & même, chez les femmes, par l'usage de quelques potions antispasmodiques & antihystériques: attendu que chez les personnes du sexe, dont les nerfs sont très-sensibles, le genre nerveux joue souvent son rôle dans leurs accès de migraine. Mais le plus sûr, & ce qui soulage le plus, c'est le régime joint aux précautions proposées ci-dessus.

(GEOFFROY père.)

MIGRAINE, *f. f. hemieranis* (1). On range sous ce nom, plusieurs indispersions & plusieurs états morbides d'une nature très-différente, ayant pour symptôme commun une douleur très-vive, qui occupe un côté de la tête, avec des espèces de rémissions ou d'accès le plus souvent périodiques, douleurs qui est accompagnée du spasme de la peau, d'une sécrétion d'urine très-abondante & très-limpide (urines hystrériques), d'une irritation à la région de l'estomac, qui s'annonce quelquefois par des nausées ou par des vomissemens, enfin d'une exaltation morbide des sens, qui fait désirer le repos, l'obscurité, & ne permet pas de supporter sans

une augmentation de souffrances, le mouvement, le bruit, la lumière.

Sauvages, auquel on reproche avec raison d'avoir souvent considéré comme des maladies distinctes, plusieurs symptômes généraux que l'on rencontre également dans quelques situations morbides très-différentes, a non-seulement accordé une place assez étendue à la migraine, dans son tableau nosologique, mais a recouru en outre, dans ce même tableau, onze espèces distinctes de migraines, la *migraine ophthalmique*, la *migraine odontalgique*, la *migraine cutanée*, la *migraine hémorrhoidale*, &c. &c. (1).

Quelques autres nosographes ayant observé que le plus souvent la migraine est une affection purement symptomatique, ont donné dans un excès opposé, & ne l'ont pas comprise dans le dénombrement des maladies.

En s'appuyant sur les résultats & les conséquences les plus directes de la pratique médicale, on ne peut admettre la conclusion de ces derniers, & ne pas reconnaître que l'ensemble des symptômes qui constitue la migraine, lors même qu'ils dépendroient le plus souvent d'une autre maladie, doit occuper une place distincte dans un système complet de nosographie; cette place, du reste, ne peut être assignée que parmi les névralgies dont la migraine présente plusieurs caractères, sans avoir d'ailleurs la durée & la violence des névralgies les plus caractérisées, tels que le tic douloureux, la névralgie frontale, la sciatique, &c. &c.

Il est probable que de simples ramifications nerveuses & quelques tissus fibreux sont affectés dans la migraine, & d'une manière très-variable, si l'on en juge d'après les symptômes de cette maladie. En effet, le plus souvent le siège de la migraine paroît assez profondément situé, & de telle sorte que la douleur diminue par la compression dans certaines migraines opiacées, & qui paroissent dépendre d'une complexion costive; on dirait que ce même siège s'étend jusqu'à la dure-mère: dans d'autres circonstances il est tout-à-fait superficiel, & paroît se borner aux nerfs sous-cutanés & au tissu fibreux de la peau, ce qui rend la douleur beaucoup plus lancinante, beaucoup plus vive, plus susceptible de s'augmenter par le plus léger attouchement, & de telle sorte qu'au plus fort de l'accès, les malades ne peuvent rester couchés, & se trouvent obligés de demeurer assis & comme immobiles, en soutenant leur tête légèrement inclinée.

Madame la comtesse D^{re}, à laquelle je donne des soins depuis quelques années, m'a présenté l'exemple de l'une de ces migraines qui ne paroissent ainsi avoir le siège dans les nerfs sous-cutanés & le tissu fibreux de la peau. Les retours de cette migraine, dans la jeunesse de madame D^{re},

(1) De quâ & de quâvis, motus du crâne. Galien a connu cette maladie, dont il exportait le siège suivant la différence des symptômes, tantôt dans la membrane qui couvre le cerveau, tantôt dans celle qui adhère au crâne.

(1) Sauvages, *liv. cliv. (de doloribus)*, art. 111.

étoient beaucoup plus fréquens. Depuis quelques années, ils surviennent rarement sans le concours d'une cause occasionnelle très-évidente, tels que l'action de pleurer, un violent chagrin, l'insomnie, une constipation opiniâtre & prolongée : ils durent alors pendant trois, quatre, cinq & même six jours; ils diminuent un peu la nuit, & permettent quelquefois de dormir, mais ils sont intolérables pendant le jour; la douleur devient même souvent assez vive pour arracher des cris & des plaintes à madame D**, qui montre en général beaucoup de courage & de résignation dans ses souffrances; elle augmente & devient intolérable par la plus faible compression, par l'atouchement de la coiffure, par l'appui de la tête sur le coussin le plus flexible.

Dans cette situation, madame D** se tient assise, sans aucune action, & inclinant légèrement sa tête, & en la soutenant de temps en temps avec l'extrémité des doigts de la main droite ou de la main gauche, suivant le côté qui se trouve affecté; elle n'a jamais en d'ailleurs aucun symptôme de goutte, mais cette maladie est profondément établie dans sa famille, & M. le comte de L**, son père, a succombé à ses atteintes.

On a voulu dans ces derniers temps, & d'une manière exclusive, fixer le siège de la migraine dans les sinus qui servent de développement aux fosses nasales, & principalement les sinus frontaux (1). Il est vraisemblable qu'en effet, & dans plusieurs circonstances, le tissu très-maqueux & très-ferré qui tapisse les sinus frontaux & les ramifications nerveuses de ce tissu, est affecté dans plusieurs cas de migraine, tels que les exemples d'après lesquels l'auteur dont nous venons de rappeler l'opinion, a tracé l'histoire de cette maladie. Quoi qu'il en soit, on doit reconnoître, & contre l'opinion du même auteur, & d'après les résultats d'une pratique suffisamment étendue; deux sortes de migraines bien distinctes les unes des autres; savoir, des migraines essentielles & des migraines consécutives ou symptomatiques.

Il seroit difficile de donner une meilleure description des principaux symptômes des migraines essentielles, que celle qui a été tracée par l'auteur de l'ouvrage que nous venons de citer, & auquel nous allons emprunter cette description, sans d'ailleurs adopter l'opinion que les causes de cette maladie ne consistent pas quelquefois dans un état morbide des voies digestives, ou dans une autre maladie dont la migraine n'est alors qu'un effet consécutif ou symptomatique.

« La plupart des individus qui sont habituelle-

ment exposés à des migraines, ont un bon appétit, digèrent bien, ont le ventre libre, & jouissent de la meilleure santé de temps à autre, plus ou moins fréquemment, l'accès commence par une sécheresse dans l'une ou l'autre des narines, ou dans toutes les deux ensemble; immédiatement après, ils éprouvent une légère douleur sur l'un & l'autre sourcil, souvent par les deux en même temps, vers le grand angle de l'œil. La pression avec le doigt sur la branche frontale du nerf ophthalmique, paroit la calmer alors, mais momentanément; bientôt une douleur grave se annonce au-dessus de la racine du nez; elle s'étend ensuite sur l'un & l'autre bord orbitaire, elle devient plus forte, plus constante, & s'empare de toute la partie antérieure de la tête, d'une tempe à l'autre; les yeux se ferment presque malgré le malade; s'il vient à se haïsser devant, il éprouve alors des pulsations vives, douloureuses & redoublées; s'il se redresse, les pulsations continuent encore pendant quelques secondes, s'apaisent par degrés, & il n'éprouve plus alors que la chaleur brûlante qu'il sentoit auparavant. Le jour, la lumière, le bruit, les odeurs mêmes & le mouvement lui font insupportables à cause des vives douleurs qu'il souffre; d'autres s'imaginent recevoir des coups de marteau, d'autres croient que leur tête le fend; d'autres enfin ressentent des douleurs jusqu'au fond de l'orbite, ils cherchent la tranquillité, l'obscurité & le lit, auquel ils ont recours pour se livrer au sommeil. *Ut neque strepitum, neque vocem vehementer, neque luminis splendorem, neque motum tolerare possit, infirmus: sed tranquillitatem, obscurumque cubiculum querat, idque ob doloris vehementiam. Quippe nonnulli recluso malleo se percuti arbitrantur: alii caput contundi dissimulique sentiunt: non pauci ad oculorum quoque rudices dolor extenditur, &c. Galeus, classis IV, lib. m, pag. 30, litt. E.*

« Si l'accès va en augmentant, ils éprouvent des bâillemens, une légère augmentation de salive, des nausées, & bientôt le vomissement se déclare, mais ils n'en font point soulager; un profond sommeil s'empare d'eux, ce qui est le plus ordinaire. Le plus souvent, après sept à huit heures de repos, quelquefois plus, ils s'éveillent, marchent une matière épaisse, tenace, & se lèvent dans un état d'ivresse qui se dissipe quelques heures après s'en lever; bientôt l'appétit les avertit du besoin de manger, & ils le font avec plaisir; ainsi l'accès se termine pour reprendre dans un temps plus ou moins éloigné.

« Chez un assez grand nombre de personnes, chez celles particulièrement qui sont sujettes aux rhumatismes fugaces, légers & de peu de durée, l'accès commence par un froid aux pieds, même dans les chaleurs de l'été, & par plusieurs étourdissemens; il parcourt ensuite les mêmes degrés que ceux dont il vient d'être parlé.

(1) Voyez une Dissertation sur les maladies des fosses nasales & de leur sinus, par M. G. L. Deschamps, d'après un fond d'idées & d'observations que l'on attribue généralement à M. le professeur Dupuytren.

« Chez d'autres, tous les accès qu'ils éprouvent n'ont pas la même intensité; souvent ils se dissipent par l'exercice & par la dissipation, souvent même par le manger; il n'est pas étonnant d'observer qu'un commencement de migraine disparoisse après le dîner : *de la cet adage vulgaire*, mal de tête veut pain. *Et in dolore capitis vocato hemi-crania, seu hemicrania*, dit Galien, *meracius vinum sumptum confestim quidem manifeste iuvissit, accedente deinde summo in totum dolorem subsistisse videtur: videlicet autem me non illico, sejunctum, sed ab assumpto cibo exhibere: ad hoc loco Hippocrates utrinque miscuit & cibum & potum*, &c. Galienus, elasis III, de Morbis vulgaribus, cmm. VI, p. 196, litt. E. F.

« Cette maladie que l'on observe quelquefois chez les enfans de huit à douze ans, est beaucoup plus commune de vingt à trente; chez ceux-ci elle disparoit à un certain âge; quelques personnes en sont attaquées toute leur vie, mais on observe alors que les accès sont plus courts, moins violens & plus éloignés les uns des autres. Le retour de ces accès n'est point périodique; ils n'ont point tous la même intensité chez la même personne; ils laissent quelquefois plusieurs mois d'intervalle; souvent ils font très-rapprochés pendant un temps: j'en ai vu les éprouver jusqu'à deux ou trois fois dans une semaine, mais alors les accès ne sont pas violens & se dissipent dans la nuit; quelquefois ils s'annoncent au lever du malade, & disparaissent; comme je l'ai observé, pendant le dîner, ou peu après. Cette maladie, par ses retours fréquens, est très-incommode, & dans ces sorts accès elle est insupportable, mais elle ne tire à aucune conséquence. Galien dit: *Si quis hanc pussionem habuerit, & nullum cibum sumere querit, & dormire nequiverit, nauseam iterum non valent, & nullum soporinum ferent, & potestatem in lingua non habuerit ut debet, sed hesitaverit ut iudicetur, ista signa mortem significant*. Galienus, *spuria de hemicrania*, alter dyasum, pag. 23, litt. II.

« D'autres ont répété depuis, que si celui qui a la migraine ne peut ni manger, ni dormir, ni vomir, ni respirer, ni parler, c'est un signe de mort. J'observerai pourtant la tranquillité des malades sujets à la migraine, que ceux dont parle Galien ne sont point morts de la migraine; mais de quelques autres maladies, avec lesquelles on n'a point cessé de la confondre.

« Les migraines, & même les migraines essentielles, les seules dont nous parlons dans ce moment, suivent la plus ordinairement la marche qui vient d'être décrite, mais s'en écartent cependant quelquefois, & en présentant des variétés assez remarquables. Ainsi, dans plusieurs cas, la douleur de tête est plutôt lancinante que grave; elle occupe tantôt une région temporelle en totalité ou en partie, tantôt un côté du front, & se montre alors avec tous les caractères d'une névralgie bien prononcée, & dont elle ne

diffère que par la durée. Dans cette circonstance toute espèce de mouvement est presque impossible; mais la pensée se montre alors, au moins chez quelques individus; avec un nouveau degré d'activité, les odeurs les plus indifférentes deviennent incommodes ou agréables, on les perçoit ainsi que les plus légers bruits, à une très-grande distance; le sens de la vue n'est pas moins exact, & se trouve alors blessé par la plus faible lumière; au même temps toute la surface du corps paroît plus irritable, & les petits muscles sont agités parfois de mouvemens convulsifs.

D'autres migraines également essentielles sont précédées d'une indisposition assez prolongée, avec toutes les apparences d'une légère congestion sanguine vers la tête; la veille ou la nuit-veille du jour où elles doivent arriver, les personnes qui s'y trouvent exposées ont une propension continuelle à s'endormir pendant le jour; tous les mouvemens, toutes les actions de la vie leur paroissent difficiles; elles manquent de courage & de résolution, sont effrayées des plus petites difficultés ou des moindres obstacles, se fatiguent en marchant, sont d'ailleurs plus sensibles au froid, surient aux extrémités. Après ces préludes, la migraine se déclare enfin, à la suite d'un sommeil profond & d'un réveil douloureux & difficile; on le trouve bien moins tourmenté alors par une douleur vive & circonscrite, que par un poids, une pesanteur de tête, avec sécheresse & enlèvement de la peau, inappétence, excréation incommode & fatigante d'une macédoine visqueuse, frémissement d'une profonde tristesse, & redoublement de tous les symptômes qui avoient précédé l'accès. Vers le milieu de la journée, la pesanteur de tête diminue; le malade éprouve une douleur plus violente à la région temporelle du côté droit, ou à la région sus-orbitaire du même côté. Cette douleur, sans être vive, se prolonge quelquefois pendant plusieurs jours, avec des exacerbations même pendant la nuit, & en modifiant le sommeil qui se trouve alors agité, ou souvent interrompu par des rêves pénibles, dont le sujet est le plus ordinairement sans aucune espèce de rapport avec les idées habituelles du malade.

Certaines migraines sont périodiques, au moins pendant la jeunesse & le commencement de l'âge mûr, de vingt jusqu'à quarante ans. Dans d'autres circonstances elles paroissent presque toujours excitées par des causes occasionnelles, telles que l'impression subite du froid ou de l'humidité, l'exposition à un soleil trop vif, l'influence du vent du nord ou du vent de nord-est, le changement le plus indifférent en apparence dans les habitudes. J'ai été consulté, il y a quelques années, par un peintre célèbre qui ne pouvoit éprouver un certain degré de froid aux pieds, sans être pris tout-à-coup d'une migraine si violente, qu'il lui étoit impossible d'exécuter aucune espèce de mouvement, non-seulement par la violence de la céphalalgie,

mais en outre par suite d'une immobilité cataplectique & convulsive qui se manifestait à mesure que la douleur, d'abord légère, augmentait progressivement, au point d'avoir toute l'intensité du tic douloureux ou d'une névralgie frontale bien caractérisée. Dans cette situation le malade ne pouvoit même pas se coucher, & se faisoit placer sur le bord de son lit, la tête légèrement appuyée & la partie postérieure du corps soutenue par des coussins appuyés contre un plan inflexible direct: il suffisoit, pour faire cesser très-promptement cet accès violent de migraine, de réchauffer les pieds en les exposant à un feu assez vif pour y déterminer une rubéfaction presque douloureuse.

Le plus grand nombre des migraines essentielles ne paroît pas dépendre, dans son développement, de circonstances aussi éventuelles & de causes aussi légères; on peut même les regarder le plus souvent comme héréditaires, on du moins les considère comme l'effet d'une disposition constitutionnelle, le plus souvent douteuse & quelquefois rhumatismale. Dans ces deux dernières circonstances, il n'est pas rare de voir certaines migraines habituelles pendant une grande partie de la vie, cesser tout-à-coup, & se trouver remplacées par un accès de goutte, une impotence rhumatismale, quelques symptômes de gravelle & plusieurs autres maladies; ce qui explique comment l'illustre a été conduit à penser que la migraine étoit susceptible, comme beaucoup d'autres affections morbides, de déplacement ou de métastase. Quoi qu'il en soit, plus les migraines essentielles sont violentes & prolongées, & plus il est rationnel de les attribuer à une disposition goutteuse.

Mon répertoire de médecine pratique me fournit un exemple bien remarquable d'une de ces migraines. La personne qui fait le sujet de cette observation, & pour laquelle j'ai été plusieurs fois consulté, avoit tous les trois mois des migraines qui se prolongeoient pendant huit, dix & même quinze jours, & à la suite desquelles le malade étoit très-affoibli & à peine reconnoissable. Il étoit digne de remarque du reste, que pendant toute la durée de l'accès, la douleur n'étoit pas superficielle, & que loin de se porter, comme dans les autres migraines, sur une des régions temporales ou le grand angle de l'œil, elle occupoit toute la partie antérieure de la tête, en donnant au malade l'idée d'une compression douloureuse qui augmentoit par intervalles, en gênant alors le développement des facultés intellectuelles, on occasionnoit quelques légers symptômes de délire; douleur qui s'étendoit d'ailleurs à tout le globe de l'œil, sans attendre les autres sens, & en paroissant affecter plus particulièrement la sclérotique; ce que j'ai observé dans quelques autres migraines dont le siège pouvoit être rapporté à la dure-mère.

Cette cruelle infirmité se prolongea pendant plusieurs années. Vers l'âge de quarante ou quarante-cinq ans, il survint un violent accès de goutte,

& dès ce moment les migraines n'ont plus reparu; mais les accès de goutte ont toujours augmenté de force, & le malade a succombé après quatre années de souffrances, au défillement, à l'espèce de consomption qui en étoit la suite.

Je ne crois pas qu'il existe de médecin exerce, qui ne trouve dans la pratique plusieurs exemples de ces disparitions subites de la migraine, à la suite d'un état gouteux bien prononcé, & dont le développement permet alors de reconnoître la véritable nature des migraines qu'il avoit précédé.

On trouve toutefois dans les recueils d'observations, la description de plusieurs migraines qui, loin de se rattacher de cette manière à des dispositions constitutionnelles, ont dépendu d'irritations accidentelles & passagères. Ainsi, dans plusieurs circonstances, le catarrhe chronique des fosses nasales & des sinus frontaux, les collections purulentes dans ces sinus (1), leur exfoliation, la présence de plusieurs vers qu'on y a trouvés après la mort (2), la carie des dents, &c., ont paru, dans certains cas, la cause de quelques migraines très-opiniâtres & très-douloureuses. Le plus souvent, d'ailleurs, les causes occasionnelles se trouvent réunies aux causes prédisposantes, dans le développement de la migraine, comme on le voit pour quelques personnes qui ne peuvent éprouver le plus léger dérangement dans leur santé, ou la plus faible irritation de la tête ou des yeux, &c., sans être exposées à cette douloureuse maladie.

Les personnes qui sont sujettes aux migraines essentielles, présentent quelques différences assez remarquables dans la constitution, à laquelle cette infirmité paroît se rattacher. Les unes, par exemple, sont d'une constitution éminemment lymphatique & catarrhale, combinée le plus souvent avec une force musculaire très-remarquable; elles supportent impunément, soit les purgatifs, soit les vomitifs, dont quelques-unes font un emploi très-fréquent, ou pour prévenir leurs migraines, qui font le plus ordinairement périodiques & héréditaires, ou pour en abrégér la durée par une forte déviation: moyens que nous sommes loin toutefois de conseiller, mais qu'il importe d'employer lorsque l'on veut avoir recours avant le moment où l'irritation sympathique de l'estomac commence à se manifester; d'autres personnes, dont les migraines paroissent avoir une origine rhumatismale ou goutteuse & un certain caractère névralgique très-prononcé, sont d'une complexion très-irritable, enflammée par la maigreur sans défillement, la sécheresse des formes, la vivacité, l'état presque convulsif des traits du visage, &c. &c., qui s'altère à la longue, surtout lorsque les migraines sont violentes & très-rapprochées, &c.

Les migraines consécutives les plus fréquentes & les mieux observées dépendent de l'état du

(1) Forst Darwin, *Zoonomie*.

(2) Sauvages, vol. III, pag. 345 & 346.

Estomac & des intestins chez les hommes, des mêmes dispositions chez les femmes, mais plus particulièrement d'un dérèglement, d'un trouble de l'action nerveuse de l'utérus, au moment où la suite de la menstruation.

La migraine que Sauvages a appelée *migraine hémorrhoidale*, & celle que Baglivi a désignée sous le nom de *migraine hémorrhagique*, sont aussi des migraines parement symptomatiques. La marche de ces migraines, dont il importe beaucoup dans la pratique de remarquer le point de départ ou l'origine, diffère peu, lorsque elle est développée, de la marche des migraines essentielles, & se prolonge quelquefois lorsque l'affection qui l'avait provoquée a cessé ou revient ensuite, ou par une sorte d'habitude, sans le concours de cette affection. La distinction que nous cherchons à établir ici n'est pas moins fondée, & doit fournir les principales indications du traitement.

Les migraines symptomatiques ou consécutives sont ordinairement précédées, du moins dans le commencement, de plusieurs affections des voies digestives. Les personnes qui les éprouvent se sont écartées auparavant de leur régime habituel; elles ont fatigué leur estomac par des excès de table ou par un changement quelconque du vin & de nourriture; elles ont laissé se prolonger, & sans chercher à le combattre par une diète sévère ou par de légers purgatifs, un état saburral assez incommode, une constipation assez opiniâtre, ou tout autre symptôme de digestion incomplète & difficile. Souvent alors il suffit, pour dissiper certaines migraines assez fortes, qui dépendent d'une pareille disposition, d'un peu d'abstinence, de légers purgatifs & d'une nourriture mieux appropriée à la fatigue ou à l'irritabilité des organes de la digestion.

L'application des sangsues à l'anus, ou sur la région des lombes, qui souvent a prévenu ou fait cesser certaines migraines très-violentes, se trouve indiquée lorsque l'on peut supposer que la maladie, dont ces migraines dépendent, se rattache à quelques congestions sanguines de l'abdomen, mais surtout à une disposition hémorrhoidale.

Les migraines consécutives les plus violentes sont d'ailleurs celles que les femmes éprouvent à l'époque ou à la suite de leurs règles, avant le mariage ou dans un état forcé de continence & de virginité. Parmi ces migraines, celles qui sont le plus fréquentes, surviennent quelques jours avant l'époque menstruelle, dont elles annoncent le travail embarrassé & difficile. Chez les femmes d'une complexion nerveuse & sanguine, ces migraines sont ordinairement très-fortes & accompagnées le plus souvent de symptômes hystériques. Elles reviennent quelquefois vers le milieu du mois, & sont alors plus violentes : chez plusieurs femmes dont la vie se prolonge dans un pénible célibat, ces migraines deviennent une espèce d'affection

chronique qui augmente vers l'âge de quarante à quarante-cinq ans, & se deviennent un peu tolérables que lorsqu'il survient alors des pertes assez considérables; chez d'autres femmes qui ont eu des enfans, & dont l'état hystérique, tout-à-fait indépendant de la continence, résulte d'une sorte d'ataxie originelle ou acquise, les migraines qui coïncident avec la menstruation; sont encore plus violentes que chez les femmes célibataires, surtout si leur complexion est modifiée en même temps par une disposition goutteuse.

La migraine est assez généralement regardée comme une maladie qui résiste à tous les moyens de la médecine : elle est même rangée, par quelques médecins, parmi les maladies qu'il est dangereux de guérir; cependant on a cherché dans tous les temps à la combattre par un grand nombre de médicamens, chez les Anciens & chez les Modernes.

Le saux Galien, par exemple, accordait, dans le traitement de cette maladie, de grandes propriétés à une application, dans les narines, de l'huile de lierre mêlée à l'huile & au vinaigre : *item succo foliorum hederæ, cup oleo & aceto unguo nates, & statim dolor sedatur.*

Des médecins moins anciens, mais principalement les Arabes & quelques praticiens d'ailleurs célèbres du seizième & du dix-septième siècle, n'ont pas craint de proposer contre la migraine, des scarifications & des cantharisations aussi cruelles qu'inutiles, le fétou, le vélicatoire, l'artériotomie (1) on différens remèdes, sans aucune espèce d'efficacité; l'inspiration des eaux spiritueuses & assonnissantes, l'application de compresses trempées dans l'oxycrat, & différens topiques opiacés ou acides.

D'autres ont ajouté une grande confiance aux vomitifs (2), au trépane & à la magnésie (3), au café ou à l'opium (3), enfin à l'application de plaques simantées.

Linné raconte qu'il se guérit lui-même d'une migraine qui avait résisté à une grande variété de traitemens, en bovant tous les matins, à jeun, une livre d'eau fraîche, & en faisant de l'exercice avant dîner. Nous voyons dans les Mémoires de Marmontel, que ce littérateur célèbre parvint à triompher, à aussi peu de frais, d'une semblable indisposition; & d'après le conseil d'un maréchal-ferrant,

(1) Albucasi.

Voir aussi les observations de Fehsenckius, pour les cures qu'il attribue à un médecin de Bologne, qui prétendait avoir guéri, par ce moyen, une migraine très-opiniâtre chez un grand prince. Plusieurs autres médecins anciens & modernes ont aussi conseillé de faire usage de l'artériotomie dans la même circonstance.

(2) Cælius Aurelianus chez les Anciens, Van-Swieten & Tissot chez les Modernes.

(3) Baume, *Journal de médecine*, 1799.

(4) Tissot.

(5) Lemus.

s'il faut s'en rapporter à son récit, auquel il a voulu donner tout le sonnet d'une anecdote. Dans d'autres circonstances, on a vu la guérison spontanée de plusieurs migraines, se présenter comme la suite ou comme l'effet d'une hémorrhagie, d'un changement de régime, de l'arrachement d'une dent cariée, &c. &c.

Jean-Louis Petit rapporte, en particulier, un exemple assez remarquable d'une guérison de la migraine dans ces dernières circonstances. Une jeune demoiselle, que madame la princesse de Conti aimoit beaucoup, fut amenée par elle à Paris, pour la faire guérir d'une migraine dont elle étoit tourmentée depuis cinq ans : la médecine de Molière ne lui fut point épargnée, on la purgea abondamment ; Jean-Louis Petit fut appelé dans cette occurrence pour faire une saignée de la jugulaire, qui avoit été conseillée par les médecins de la malade : avant d'opérer, le savant chirurgien se permit quelques questions, & s'étant avisé de regarder avec soin la bouche de la malade, il reconnut que la deuxième dent molaire de chaque côté étoit trop serrée & faisoit une espèce d'effort sur les dents voisines. Il proposa en conséquence de suspendre la saignée & d'extraire ces deux molaires, qu'il regardoit comme la cause de la maladie. Son conseil fut suivi, la saignée de la jugulaire ne fut point pratiquée, & la migraine cessa de reparaître.

Pour s'arrêter à quelques idées exactes sur le traitement des migraines, sans négliger d'ailleurs les expériences les plus populaires, il importe beaucoup d'avoir égard à la nature de chacune d'elles, & à la différence des causes qui paroissent les avoir occasionnées. En général, les migraines essentielles se guérissent difficilement ; cependant on parvient quelquefois à les faire cesser ou du moins à les rendre moins fréquentes & moins fortes, soit par des antispasmodiques bien placés, soit par une irritation légère & dérivative, que l'on entretient sur le canal intestinal pour éviter toute congestion, ou pour provoquer même de temps en temps une purgation assez forte : on favorise d'ailleurs l'effet de ces moyens, en les combinant dans les temps humides & pour des personnes d'un tempérament lymphatique, avec l'usage du quinquina seul, ou mêlé soit avec l'opium, soit avec l'éther, soit avec les stimulans dissolvibles & aromatiques.

La magnésie paroît d'ailleurs convenir d'une manière particulière, dans le cas où l'on peut rapporter la migraine à une disposition goutteuse. On peut la donner dans ce cas, depuis un, deux, & même trois grains, soir & matin : les doses peuvent être même beaucoup plus fortes.

M. de F. R..., qui me consulta il y a quelques années pour des migraines de cette nature, dont les retours étoient très-rapprochés, les a vus s'affaiblir & s'éloigner, en prenant seulement tous les soirs, & pendant quelque temps, douze grains de

magnésie, qui excitoient le lendemain plusieurs évacuations stercorées.

Les pilules de jusquiame noire, composées d'ites de Mélin, & administrées suivant la méthode de ce médecin (1), m'ont paru aussi affaiblir sensiblement une disposition très-prononcée à des migraines essentielles ; dans d'autres cas j'ai obtenu des succès encore plus évidens de l'huile de Dippel, rectifiée suivant le procédé de Payen, & donnée à la dose de dix à douze gouttes, dans un véhicule convenable, savoir, quatre fois par jour dans l'intervalle des accès & en alternant deux fois en potion, & deux fois par quart de lavement.

Dans les cas d'une légère congestion sanguine vers la tête ou dans les sinus, on lorsque l'on peut supposer une relation de la migraine avec une disposition hémorrhoidale, comme embarrassée ou gênée dans son développement, on obtient beaucoup plus de succès des ventouses scarifiées entre les épaules, derrière les oreilles, sur les parties latérales du cou, sur la région des lombes & des reins.

Dans les circonstances où la migraine dépend évidemment d'un état morbide des voies digestives, ou d'une vésicule utérine & menstruelle, il est évident que le traitement doit être laborieusement à ces dispositions ; quant aux moyens qu'il convient d'employer pendant la durée des accès, quelle que soit d'ailleurs la nature de la migraine, on peut les négliger si les douleurs sont supportables, & se borner dans ce cas au repos & à la plus profonde obscurité ; dans une autre circonstance, & lorsque les douleurs sont presque intolérables, on est parvenu quelquefois à les calmer, tantôt par des applications de sangsues derrière les oreilles, tantôt par l'application d'un emplâtre émuaisé, appliqué pour couvrir en totalité la région douloureuse, tantôt par une compression assez forte que l'on fait plus particulièrement porter sur la branche frontale du nerf ophthalmique. J'ai obtenu en dernier lieu, & dans un cas de migraine qui paroisoit avoir son siège dans le tissu fibreux de la peau, de très-bons effets des fomentations analgésiques à celles que M. Scudamore recommande dans le traitement de la goutte (2).

Enfin, dans quelques cas où la migraine paroît avoir une origine rhumatismale, il ne seroit pas

(1) Ces pilules sont composées d'un grain de jusquiame noire, de deux grains d'extraire de valériane, & d'un grain de sucre de zinc. On en donne d'abord une chaque jour, soir & matin, on augmente progressivement le nombre jusqu'à six, huit, quinze & même plus par jour, on s'agit de s'arrêter & de diminuer la dose, lorsque le médicament occasionne quelques uns des symptômes du marasme qui lui sont propres, tels que la faiblesse, le trouble de la vue, une disposition vertigineuse.

(2) Ces fomentations sont faites avec un mélange composé d'une livre d'aloë en larmes détrempé, & de deux livres d'eau distillée, à laquelle on a mêlé une émulsion contenant quatre gros de sucre.

inutile d'essayer l'usage d'un liniment dans lequel on seroit entrer à haute dose l'huile essentielle de térébenthine, si d'ailleurs la susceptibilité de l'odorat permettoit cette application. (L. J. M.)

MILHAUD (Eaux minérales de). C'est une ville sur la rive droite du Tarn, à six lieues de Vabres; à côté de laquelle se trouve une source minérale froide, appelée la *Fontaine du chant du prier*. Il y avoit encore une autre source appelée *Chéiran*, qui est perdue aujourd'hui. (Macquart.)

MILIAIRE (Éruption). On désigne sous ce nom de petites pustules ressemblant, comme leur nom l'indique, à des grains de millet plus ou moins gros, & auxquelles on a donné différents noms, suivant les maladies dans lesquelles on les a observées. En effet, ces pustules se remarquent comme épiphénomènes dans un grand nombre de maladies. Ainsi on les a vues apparaître dans plusieurs épidémies, surtout depuis celle de Leipzig, en 1653, à laquelle les observateurs attachèrent avec raison beaucoup d'importance, & qu'ils décrivaient sous le nom de *fièvre miliaire*. Il a fallu quelquefois d'une grande chaleur dans l'été, d'un exercice violent pendant cette saison, pour provoquer des pustules miliaires chez des personnes d'une constitution molle & lymphatique. Des éruptions semblables se sont aussi manifestées plusieurs fois chez les femmes en couche, sans aucun trouble, sans aucun mouvement fébrile, on paroissant d'ailleurs favorisées par la chaleur du lit, les qualités acrimonieuses & l'abondance des sueurs, ou par un régime, ou par quelques autres dispositions inconnues, ainsi que de Briende l'a remarqué dans la haute Auvergne.

On a encore observé certaines éruptions miliaires & comme complication, dans plusieurs fièvres ataxiques ou putrides, dans plusieurs fièvres catarrhales, & dans les cas d'empoisonnement par l'arsenic, ou par toute autre substance corrosive dont le contact avoit excité une gastrite ou une entérite. Quoi qu'il en soit, les éruptions miliaires ont leur siège dans le tissu réticulaire de la peau, & ne paroissent pas résulter, en général, d'une irritation spéciale & primitive de cet organe. (L. J. M.)

MILIAIRE. (*Pratique médicale.*) La miliaire, ou fièvre miliaire, est une fièvre exanthématique, le plus souvent continue, rémittente, accompagnée d'une éruption de petites vésicules, principalement sur le cou, la poitrine & les bras, & quelquefois sur tout le corps, à l'exception cependant du visage. Cette maladie inconnue aux anciens médecins, ou que du moins ils n'ont pas remarquée ni décrite, parut d'abord en Allemagne il y a près de deux cents ans, & de-là se répandit en Europe, surtout dans les contrées du Nord. On lui a donné le nom de *miliaria*, parce que son

MÉDECINE. Tome X.

éruption ressemble, pour la forme & la grosseur, à des vésicules qui s'élèvent sur la peau, à des grains de millet : on l'a aussi appelée *vesiculare*, & elle ne paroît pas différer de la fièvre de Hongrie, décrite par quelques auteurs, ni de la suette de Picardie.

Les sentimens sont fort partagés sur la nature de cette maladie : les uns veulent que ce soit une espèce particulière de fièvre éruptive, comme la rougeole, la petite-vérole, une maladie *jui generis*, dont l'éruption est véritablement critique; & tel paroît être le sentiment de Sauvages, de Cullen, de Vogel, & des autres auteurs de nosologies méthodiques, d'après les définitions qu'ils en ont données : tandis que d'autres, & en particulier de Haen & Withe, soutiennent que la miliaire n'est qu'une maladie facile, purement symptomatique, due à l'usage d'un régime incendiaire & de médicaments échauffans; d'autres la regardent tantôt comme critique, tantôt comme symptomatique, & comme une suite de sueurs acres & abondantes. Plusieurs assurent que cette maladie est toujours jugée par une crise, soit par l'éruption miliaire qui survient, soit par les sueurs ou quelques autres évacuations qui y suppléent, tandis que d'autres prétendent qu'elle se guérit sans aucune crise. Il n'y a pas plus d'accord dans les opinions, soit à l'égard des tempéramens sujets à cette maladie, soit par rapport à ses périodes & à sa durée, soit au temps de l'éruption, que plusieurs regardent comme variable & incertain. Tâchons, s'il est possible, de débrouiller ce chaos.

Réellement cette maladie est un véritable prototype, d'après les différentes formes sous lesquelles elle se présente. Tantôt la miliaire commence d'une manière lente & presque insensible, & le malade est plusieurs jours dans un léger malaise, avant qu'elle se déclare; tantôt, au contraire, elle attaque tout-à-coup les malades, & déploie toute sa violence dès le premier instant. Sovent elle se cache sous l'aspect de maladies tout-à-fait différentes, telles que les fièvres rémittentes, intermittentes, malignes, la pleurésie, l'angine, &c; en sorte qu'il est quelquefois très-difficile de la reconnaître dans son invasion.

En général, pendant plusieurs jours, les malades ne se croient que légèrement indisposés; ils éprouvent un peu de pesanteur, moins d'appétit, des alternatives de chaud & de froid, que l'exercice ou la chaleur dissipent promptement, & une espèce de tension sur toute l'habitude du corps. Quoique les vents, les hémorrhogies se joignent à cette espèce de malaise, les personnes dans cet état y sont peu d'attention, & ne se croient point malades jusqu'à ce que la fièvre survienne. Ce prélude de la maladie dure plus ou moins de temps, suivant le tempérament du sujet, & le plus ou moins d'activité des canaux qui produisent la miliaire.

Mais d'autres fois, surtout lorsque la miliaire

est épidémique, dès le second ou le troisième jour la maladie se déclare par une fièvre continue rémittente, quelquefois par une intermittente, qui bientôt devient continue double-tierce. Les malades éprouvent des maux de tête, des douleurs de côté, surtout du côté gauche; ils rendent des crachats épais, muqueux, abondans, quelquefois teints de sang; ils sont tristes, accablés; leur urine est pâle, décolorée; ils ont des anxiétés, un poids sur le sternum, & des envies de vomir qui se renouvellent à chaque redoublement; leur langue, presque dans l'état naturel, se charge vers la pointe de quelques petites pustules, signe caractéristique de cette maladie, & avant-coureur de l'éruption qui se prépare. Enfin, le pouls n'est point serré, il est foible, & pour peu qu'on le presse, il se perd sous les doigts avec un certain frémissement. Si la maladie est fort grave, à ces accidens se joignent des soubresauts dans les tendons, quelques mouvemens convulsifs, surtout à la mâchoire inférieure, des boquets, des soiblesses & une toux sèche & importune. Tel est le commencement de la maladie pendant lequel se fait la coction de l'humeur morbifique: cet état ou première période dure jusqu'au cinquième, septième ou neuvième jour, où le fait l'éruption, qui arrive toujours à la fin du redoublement d'un jour critique.

À ce moment où l'éruption va se faire, le malade éprouve des picotemens par tout le corps, des fourmillemens douloureux dans les doigts; son sommeil est interrompu par des rêves effrayans, & les sueurs qui se montrent à la fin de chaque redoublement, deviennent plus abondantes & universelles; elles ont, ainsi que la transpiration des malades, une odeur aigre, piquante, désagréable. Alors le pouls se dilate, il est plein, mou & véritablement excrétoire; & si les sueurs n'ont pas été trop considérables, on provoque les premiers jours, la peau devient molle & souple; si, au contraire, le malade a déjà beaucoup sué, soit forcément, soit naturellement, il se fait une tension dans les tégumens, qui rend tous les mouvemens douloureux.

Enfin, l'éruption se fait sur la fin du redoublement d'un jour critique; elle arrive plus tôt ou plus tard, depuis le troisième ou cinquième jour, jusqu'au quatorzième ou vingt-unième, tantôt blanche, tantôt rouge, ou, ce qui est d'un mauvais augure, accompagnée de pétéchies & de taches pourprées; elle paraît sur différentes parties, principalement sur le cou & la partie supérieure & antérieure de la poitrine: du moins c'est dans ces endroits où elle commence. On aperçoit sur la peau quelques efflorescences rongées plus ou moins grandes, au centre desquelles s'élèvent de petites vésicules transparentes, d'abord presque imperceptibles. Ces vésicules augmentent, elles acquièrent la forme & la grosseur d'un grain de millet; de transparentes qu'elles étoient, elles prennent une cou-

leur jaunâtre, & si on les érève, il en sort une humeur limpide & visqueuse, qui file & s'attache aux doigts; ensuite cette humeur s'épaissit dans les vésicules, qui deviennent plus dures & plus obscures, jusqu'à ce que, en se séchant, elles acquièrent la dureté d'un grain de sable.

Mais cette éruption ne se fait pas toujours complètement en une seule fois; souvent elle ne s'achève que par parties, se réitérant & se renouvelant pendant plusieurs jours. Chaque redoublement sous la forme de double-tierce sonnit une nouvelle éruption, jusqu'à ce que l'humeur soit totalement épuisée, & chacune de ces éruptions est accompagnée des mêmes symptômes que nous avons décrits ci-dessus.

L'éruption totalement achevée, tous les accidens cessent, la dessiccation se fait; elle est suivie de la desquamation, la peau se lève en farine, la langue elle-même se dépoille par écailles, en commençant par la pointe, & successivement jusqu'à sa base, & le malade entre plus tôt ou plus tard en convalescence.

Tel est le tableau de la miliaire, qui, semblable à un protée, prend toutes fortes de formes & de caractères. Cette fièvre essentiellement putride s'annonce dans son principe avec des signes d'inflammation: semblable aux maladies inflammatoires dans le printemps, elle prend en automne la forme des maladies automnales & putrides: plus aiguë dans les pays secs, elle imite la pleurésie, l'angine, &c., tandis que dans les endroits bas & humides, elle s'annonce comme une fièvre rémittente.

Quant aux différences de la fièvre miliaire, la première & la principale, est celle par laquelle on distingue cette maladie en *essentielle* & en *symptomatique*. De Haen, Witbe & quelques autres modernes nient l'existence de la première, & prétendent que l'éruption miliaire, toujours accidentelle & symptomatique, n'est due qu'à un régime chaud du malade, ou aux remèdes incendiaires qu'on lui a donnés. Il est vrai que dans les campagnes, où les paysans ne connoissent dans les maladies aiguës d'autres remèdes que le vin, le sucre & la canelle, ou bien l'eau-de-vie, il survient des éruptions miliaires purement symptomatiques, suite de ce régime échauffant, & nous voyons fréquemment de pareilles miliaires dans les maladies inflammatoires. Mais outre ces éruptions symptomatiques, il existe des fièvres miliaires véritablement essentielles, qui surviennent spontanément sans être produites par un régime échauffant. Stork, Collin, Stoll, Quarin & plusieurs autres font mention de fièvres miliaires, dans lesquelles les malades avoient usé d'un régime antiphlogistique, & avoient respiré un air frais & renouvelé. Dans l'épidémie qui parut en Picardie en 1779, le docteur Marteau rend compte des fièvres miliaires, qu'il a combattues au commencement de la maladie par les saignées & les

acides, ce qui n'a point empêché l'éruption. Le docteur Boyer avoit employé la même méthode en 1747 & 1750, ainsi que Mazaray dans l'épidémie de Dourdan, & cependant l'éruption miliaire a paru. Depuis plus de soixante ans, la miliaire est fréquente & presque endémique en Normandie. Le célèbre Lepeque de la Cloture l'a toujours traitée avec les antiplogistiques. On trouve dans le *Journal de Médecine*, l'histoire de trois épidémies de cette maladie en Provence, décrites par le docteur Bouteille, qui a employé le même traitement; enfin, dans les *Mémoires de la Société royale de médecine*, Barailon a prouvé que la miliaire étoit souvent essentielle dans le Bourbonnois, tant par son universalité & sa contagion, que parce que semblable aux autres fièvres exanthématiques, elle étoit d'autant plus douce, que son éruption se faisoit facilement & complètement; plus dangereuse lorsqu'elle avoit de la peine à se faire, & enfin très-grave & même mortelle, quand on faisoit rentrer & disparaître l'éruption par des remèdes violents. Nous pourrions citer encore nombre d'autres preuves; mais nous croyons que celles-ci peuvent suffire.

1°. Il y a donc une miliaire vraiment *essentielle*, dont les remèdes ne peuvent empêcher l'éruption sans mettre les malades dans le plus grand danger, & une simplement *symptomatique*, qui n'est pas rare dans les maladies inflammatoires, lorsqu'on emploie un régime incendiaire. Cette dernière s'observe assez souvent à Paris, où la première n'est pas fréquente, tandis qu'elle est commune dans la Picardie, la Normandie & le Bourbonnois.

2°. La miliaire est quelquefois *épidémique & contagieuse*, passant successivement d'un pays à un autre par le moyen des vents ou par la communication des individus, comme le prouvent les observations d'Hamilton & de Fordyce en Angleterre, de Fantoni & d'Allioni en Italie, de Weisich & de Frédéric. Hoffmann en Allemagne, de Lepeque, Barailon, Marteau, &c., en France. D'autres fois elle est *sporadique*, n'attaquant que quelques individus, ce qui arrive principalement dans les pays où précédemment elle a été épidémique. C'est par cette raison qu'elle est encore assez fréquente en Normandie, surtout parmi les femmes en couche.

3°. La miliaire peut être *rouge ou blanche*. Dans la première il y a d'abord de petites taches rouges, & du milieu de chaque tache s'élève une petite pustule ou vésicule. Dans la seconde, que l'on nomme aussi *crystalline*, les vésicules blanches s'élèvent sur la peau sans changement de couleur; ces dernières, souvent symptomatiques, s'observent assez fréquemment dans les fièvres malignes & putrides. Je les ai même vues paroître dans la petite vérole, qui cependant se terminoit heureusement. Outre ces deux variétés de miliaires, M. Gallien, médecin à Montargis, en admet une troisième,

qui paroît tenir le milieu entre la rouge & la blanche.

4°. La miliaire est ordinairement une maladie *aiguë*; mais quelquefois, quoique plus rarement, elle devient *chronique*. On cite des exemples de personnes qui, pendant plusieurs mois & même des années de suite, en ont été tourmentées, chez lesquelles elle reparoissoit à la moindre impression de froid, & qui n'en ont été délivrées que par quelque maladie aiguë ou par une évacuation critique.

5°. Enfin, la miliaire peut être *benigne ou maligne*.

Quant à la cause qui donne naissance à cette éruption de vésicules, nous croyons devoir admettre, avec le savant Jaubert (*Mémoires de la Société royale de médecine*), pour cause *prochaine* & immédiate de la miliaire, une crémose tendante à dissolution dans la partie séreuse du sang. Dans cet état, cette sérosité, quand elle se sépare du sang, irrite les fibres de la peau: devenue plus acre encore par son séjour dans le tissu cellulaire, elle se réunit par son analogie avec le corps muqueux, qu'elle infecte & vicie, & pousse au dehors avec lui, elle fait soulever, par son acreté, les vésicules qu'on observe sur la peau.

Dans cette disposition acre & caustique de la sérosité, il faut peu de choses pour déterminer la miliaire à paroître. Ces causes *déterminantes* sont en grand nombre; mais les principales sont l'habitation & le séjour dans un endroit humide, la constitution de l'air & de la saison également humide, soit qu'elle soit froide ou chaude, avec cette différence que, lorsque le temps est chaud & que le vent souffle du midi ou du couchant, la miliaire prend un caractère plus marqué de putridité; au lieu qu'elle semble inflammatoire, au moins dans son premier abord, lorsque l'humidité est froide. En général, dans les pays secs, cette maladie est moins fréquente, plus courte & plus benigne. La miliaire paroît donc quelquefois inflammatoire dans son début; elle s'annonce sous l'aspect d'une angine, d'une pleurésie ou autre maladie aiguë, mais bientôt elle reprend le caractère de putridité qui lui est propre & particulier, ainsi que l'ont remarqué Jaubert & le docteur Bellot, dans une thèse soutenue aux écoles de médecine de Paris, en 1733.

Il est difficile de reconnoître la fièvre miliaire les premiers jours de son invasion: le malade éprouve les mêmes symptômes qui accompagnent & précèdent les fièvres éruptives en général, les anxiétés, un poids sur le sternum, les défaillances, les oppressions, & quelquefois des convulsions; ses yeux sont rouges & douloureux, tous signes qui annoncent une fièvre exanthématique quelconque. D'ailleurs cette maladie se manifeste sous toutes sortes de formes, soit de fièvre intermittente ou rémittente, soit de pleurésie ou d'angine, ce qui la rend méconnoissable. Mais ce qui peut faire soupçonner la miliaire, ce sont les alternatives

de froid & de chaud que le malade a éprouvées pendant quelque temps auparavant, le malaise qu'il a ressenti, son sommeil inquiet, interrompu par des rêves effrayants, & surtout si l'on aperçoit sur le bout de sa langue, qui d'ailleurs paroît saine & naturelle, quelques boutons, des commencemens de vésicules, signe certain de cette maladie. Au moment de l'éruption il est plus aisé de reconnaître sa nature; les sueurs grasses ont une odeur aigre, désagréable; le malade éprouve des fourmillemens dans les doigts, un picotement dans toute la peau, qui annoncent que l'éruption va se faire: cependant, malgré ces signes, elle manque quelquefois, soit à cause d'un mauvais traitement, soit parce que l'humeur aura pris son cours par une transpiration abondante, ou par quelques autres voies, & alors il y aura fièvre miliaire sans éruption, comme on l'a dit de la petite-vérole, soit enfin parce qu'au lieu de la miliaire, il survient des aphtes qui ont été observés par Hamilton & Mouro, & qui en tiennent lieu, ce qui rend cette maladie plus longue & plus dangereuse.

Si le diagnostic de la miliaire n'est pas aisé, surtout dans son commencement, son pronostic n'est pas plus facile. Cette maladie insidieuse s'annonce quelquefois avec les symptômes les moins effrayants, & fait périr promptement le malade au moment que l'on concevoit les meilleures espérances, tandis que d'autres échappent d'une miliaire qui paroît la plus orageuse. Cependant il y a quelques règles détaillées par un observateur exact, le savant Baraillon, d'après lesquelles on peut tenter de fonder son jugement.

1°. En général, la miliaire attaque plutôt les femmes & les hommes foibles & délicats, que les gens forts & vigoureux; mais aussi la maladie, chez ces derniers, est-elle plus grave, surtout s'ils sont d'un tempérament vis, ou s'ils sont adonnés au vin & aux liqueurs.

2°. Souvent mortelle pour les femmes en couche, la miliaire fait fréquemment avorter les femmes grosses, tandis que les nourrices en font la plupart exemptes. On a remarqué que les exutoires & les cautères des personnes atteintes de cette maladie rendent une odeur infecte, presque cadavéreuse.

3°. Les enfans & les vieillards sont moins exposés à gagner la miliaire; elle prend ordinairement depuis l'âge de quinze ans jusqu'à trente-cinq.

4°. On peut avoir espérance, lorsque l'éruption se fait promptement & en une seule fois, & que les accidens ne reparoissent plus; pour lors la maladie se termine en peu de temps: si l'éruption ne se fait qu'à plusieurs reprises, & qu'à chaque fois les accidens diminuent, il y a encore lieu d'espérer, mais la maladie se prolongera; si, au contraire, les symptômes augmentent après l'éruption, c'est un très-mauvais signe.

5°. Si, après les signes avant-coureurs de l'éruption, celle-ci n'a pas lieu, il est à craindre que l'humeur ne se porte sur quelque partie intérieure, ce qui devient très-dangereux.

6°. Lorsque l'éruption se fait trop promptement dès le premier ou le second jour, elle n'est pas sans danger, & quelquefois le malade périt le cinquième; mais elle est très-fatale vers le septième.

7°. En général, la miliaire benigne se termine au quatorze ou au plus tard au vingt-un, & il est rare que passé le dix-sept, les malades en périssent; dans la miliaire maligne, le malade meurt du dix au quatorze, souvent plus tôt.

8°. On a cependant observé que certaines circonstances, comme le défaut de régime, ou quelques imprudences, ont enlevé des malades le dix-neuvième jour, & même plus tard.

9°. On doit s'attendre à une éruption abondante, si les fourmillemens à la peau & la douleur positive des doigts font considérables.

10°. La langue noire & sèche, ainsi qu'une grande soif, sont des symptômes dangereux.

11°. L'éruption faite & les accidens calmés, les malades doivent se tenir quelque temps par leurs gardes: les alimens pris trop tôt ou en trop grande quantité, l'impression d'un air froid, des purgatifs donnés trop promptement, peuvent rappeler la fièvre, qui sera suivie d'une nouvelle éruption, ce qui prouve qu'il exisle encore pendant long-temps un relle du levain miliaire dans les humeurs.

Les cadavres des personnes qui périssent de la fièvre miliaire se corrompent promptement, à cause de la dissolution du sang & des humeurs, & la plupart rendent, après leur mort, quantité de sang par le nez, quand même ils en aroient beaucoup perdu par les saignées & les hémorrhagies. En ouvrant la tête, on y trouve du sang diffus, fluide, ichoreux & de très-mauvaise odeur. Si l'humeur extrêmement mobile de la miliaire s'est portée sur quelque viscère, on y découvre les ravages qu'elle y produit. Mais ce n'est pas seulement sur les parties externes, telles que la peau & la langue, que l'on trouve des pustules, on en découvre à l'intérieur, dans l'œsophage, la trachée-artère & les poumons.

Dans le traitement de la fièvre miliaire essentielle, la seule dont il s'agit en ce moment, le médecin a deux indications à remplir: il doit favoriser & soutenir l'éruption critique, & en même temps ne pas perdre de vue l'état de la fièvre, qui est altérée & viciée, & qui tend à la dissolution & à la putridité; en un mot, il doit regarder la miliaire comme une fièvre putride, & la traiter en conséquence. Cependant, comme dans les premiers momens de son invasion, cette fièvre a souvent quelques caractères d'une fièvre inflammatoire, on doit d'abord mettre en usage les antiphlogistiques, & revenir ensuite aux remèdes propres à combattre la putridité.

Ainsi, au moment de l'invasion on pratiquera, s'il est nécessaire, la saignée plus ou moins répétée, suivant les forces, le tempérament du malade & suivant le degré de la fièvre; on prescrira une diète légère & antiplogistique, & après avoir détrempé les vaisseaux, on se hâtera de vider les premières voies par l'émétique. Par ce moyen on évacue le levain contenu dans l'estomac, qui, passant dans la masse des humeurs, les infecteroit, & quelquefois on parvient, ainsi que l'a observé le docteur Jaubert, à étouffer la maladie dans son principe. Après ces préliminaires il sera bon d'évacuer légèrement avec des laxatifs doux & acridulés, tels que la casse, les tamarins, la crème de tartre, le petit-lait, qui, en tempérant l'ardeur du sang & prévenant les sueurs trop copieuses, évacuent le reste du levain que l'émétique n'a pu entièrement emporter. Cela fait, si la miliaire est benigne, la nature seule fait le reste de l'ouvrage, & il ne reste à l'art que de l'aider par l'usage d'apozèmes delaynés, composés avec les plantes chiconacées jointes aux acides & au quinquina, & par celui de boissons tièdes, un peu diaphorétiques; ces acides corrigent la puridité, que les miasmes introduits dans le sang ont pu faire contracter aux humeurs séréuses. On peut encore joindre à ces remèdes l'application des vésicatoires, pour détourner au dehors une partie de l'humeur morbifique. Du reste, il faut employer fort peu de remèdes, & si la maladie fuit heureusement son cours, le médecin n'est que spectateur du travail de la nature; mais si la maladie ne marche qu'à pas lents, & si l'éruption ne se fait qu'avec peine, on peut l'aider par le moyen du kermès minéral, du camphre, des gouttes d'Hellmann, sans aucuns cordiaux échauffans: on peut aussi employer les frictions, les fomentations, & même les bains tièdes & les sinapismes, qui favorisent la sortie des vésicules. Tel est le traitement des fièvres miliaires benignes.

Mais il y en a d'autres plus rebelles: souvent, après une première éruption, l'humeur trop abondante n'a pas été toute évacuée, il en reste une portion considérable dans la masse du sang, la fièvre & ses accidents se renouvellent, & on voit reparaître les signes avant-coureurs d'une nouvelle éruption. Dans ce cas, les légers diaphorétiques, les fomentations & les autres moyens que nous avons précédemment proposés, ne suffisent pas; mais contre le régime antiplogistique, il faut recourir à un émético-cathartique, pour détourner par bas les humeurs, & empêcher le sang de se porter au cerveau. La saignée, qui dans le commencement pouvoit être indiquée, ne convient plus: elle appauvrirait le sang qui tend à se décomposer; & on ne doit alors l'employer que dans la plus grande nécessité, lorsque la chaleur est vive & le pouls dur & tendu, encore faut-il beaucoup ménager ce moyen. Il vaut mieux avoir recours à des potions tempérantes, composées avec les abfor-

bans, la poudre d'yeux d'écrevisses, le corail préparé, saturés d'acide de citron & étendus dans un véhicule convenable. Ces abforbans joints aux acides, ainsi que l'usage d'une boisson fraîche, acidulée, empêchent la dissolution du sang & des humeurs.

Quelquefois le pouls foible & déprimé annonce que les forces de la nature sont trop languissantes pour que l'éruption puisse se faire: on ne voit point paraître les vésicules. Dans ce cas il faut ranimer les forces, non par des cordiaux & des remèdes chauds, mais par l'application des vésicatoires, qui sollicitent l'action de la nature & attirent au dehors le levain acre de la maladie. Son accrété est quelquefois si forte & si active, que les plaies des vésicatoires se couvrent d'une croûte gangréneuse qu'on est obligé de fessier.

Lorsque malheureusement il survient, dans la miliaire, des pétéchies, des taches pourprées, qui annoncent la décomposition du sang, le danger est extrême, & l'on doit employer les antiputrides les plus énergiques, tels que le quinquina, dont Monro'a démontré l'efficacité dans cet état, le contra-yerva, la serpentaire de Virginie, le camphre, &c., & toujours les acides, soit minéraux, soit végétaux.

Il arrive assez fréquemment que le commencement de la fièvre miliaire se masque sous l'apparence d'une pleurésie. Le malade rend des crachats teints de sang, & il se plaint d'un point de côté vif, assez ordinairement du côté gauche. Rien ne réussit mieux dans ce cas, que l'application d'un vésicatoire sur le point douloureux: ce topique calme la douleur & facilite l'expectoration, ce qui soulage beaucoup le malade.

Il est bon d'observer que dans les éruptions miliaires, soit benignes, soit malignes, il ne faut jamais forcer les sueurs, ne point charger les malades de couvertures, & ne pas trop échauffer la chambre. D'un autre côté il ne faut point exposer le malade à un courant d'air froid qui pourroit faire rentrer l'éruption, mais s'en tenir à un juste milieu, & n'entretenir qu'une température douce & modérée.

En général, la convalescence de cette maladie est longue; on a souvent à craindre des rechutes, & il est prudent, même après la guérison, de continuer quelque temps les remèdes, d'observer le régime & d'user de précautions, sans quoi les restes de la matière séréuse & acre de la miliaire produisent des rechutes & de nouvelles éruptions, ou donnent naissance à d'autres maladies, telles que des fièvres intermittentes rebelles, des dépôts, des infiltrations & des hydropisies.

Tel est le traitement de la fièvre miliaire essentielle. Nous ne parlerons pas ici de la miliaire symptomatique, qui se rencontre assez souvent dans plusieurs maladies aiguës, mais qui ne demande pas un traitement différent de celui de la maladie dont elle dépend. (Grossescripture.)

Addition. Il sera facile de reconnoître dans l'article que l'on vient de lire, l'exacitude de la clarté qui résulte d'une grande expérience chez un médecin aussi sage qu'éclairé. Nous n'ajouterons eu conséquence qu'un très-petit nombre de remarques à cet article. A l'époque à laquelle il fut écrit, & qui déjà est assez éloignée, on n'avait pas mis en question l'existence des fièvres essentielles, & l'on regardoit d'ailleurs comme telles, & d'après des vues pratiques, certaines fièvres ischiariques, & les fièvres éruptives en général, que l'on a voulu, dans ces derniers temps, désigner comme des phlegmasies de la peau. Toutefois l'éruption miliaire peut se rencontrer sans doute dans un grand nombre de maladies différentes, & dépendre tantôt d'une irritation des voies digestives ou de l'appareil pulmonaire, tantôt d'un état particulier de la peau, & peut-être d'un excitements morbide, occasionné par la sueur ou par l'humour perspiratoire, altérés dans leur sécrétion; ce qui devoit arriver, & ce qui advint en effet très-souvent, lorsque, dans le cours de différentes maladies aiguës, on produisoit les sudorifiques, & lorsqu'en même temps les malades se trouvoient dans une température trop élevée. (Voyez MILIAIRE (Eruption).) Dans certains cas, la fièvre miliaire essentielle ou symptomatique s'est montrée à la suite de plusieurs autres fièvres, ou des maladies aiguës de la poitrine. En voici un exemple qui me paroît assez remarquable pour être coulé dans cet article.

M. le marquis de Ch***, d'une complexion très-irritable & d'un tempérament sanguin, modifié cependant par une tendance particulière aux affections catarrhales, éprouva tout-à-coup, & sans cause occasionnelle, une douleur vive au côté gauche, avec fièvre, & accompagnée de tous les symptômes qui caractérisent la pleurésie.

Le traitement indiqué fut opposé à cette maladie, qui se termina du cinquième au septième jour par des sueurs spontanées qui furent précédées de quelques crachats rosés, mais offrant tous les signes d'une espèce de maturité. Le neuvième jour, & lorsque l'on devoit penser que M. de Ch*** alloit entrer en convalescence, la fièvre, qui avoit cessé, revint tout-à-coup & avec plus de violence que dans les premiers jours de la maladie, mais sans oppression, ni toux, ni douleur de côté. Le pouls développé & fréquent avoit environ de quatre-vingt-dix à cent pulsations par minute; le visage étoit très-coloré, l'œil ardent & ne pouvant se fixer, la tête douloureuse, & les fens de l'ouïe & de la vue dans un véritable état d'exaltation. Du deuxième au troisième jour de cette nouvelle situation, il survint plusieurs symptômes nerveux assez effrayans, des doubréfaits dans les tendons, des crampes très-fréquentes & très-fortes, un resserrement remarquable de la pupille, & une altération mentale très-rapprochée du délire, sans en avoir cependant les caractères.

En effet, M. de Ch*** reconnoissoit toutes les personnes qui l'environnoient, & ne déraisonnoit leasiement sur aucun point; mais son caractère étoit évidemment changé & beaucoup plus irritable. Une garde dont jusqu'alors les soins assidus & éclairés lui avoient été agréables, lui devint tout-à-coup & sans motif, incommode & insupportable; une ancienne femme de chambre de madame sa mère, à laquelle peut-être il n'avoit pas pensé depuis dix ans, se présenta vivement à son esprit dans cette occurrence, comme la seule personne capable de le soigner à son gré, & on ne parvint à le calmer qu'en discourant cette femme qui fut sa garde depuis ce moment jusqu'à la fin de sa maladie.

Je n'étois pas sans inquiétude sur l'ensemble de ces différents symptômes, & blye, que je fis appeler un consultant, les partagea, en pensant ainsi que moi, qu'il étoit à craindre que l'inflammation latente des meningés n'eût succédé à la pleurésie, par une sorte de déplacement ou de métastase, dont les signes de la médecine pratique présentent assez d'exemples. Aucune indication positive ne s'offrant toutefois à nos investigations, nous nous bornâmes à une médecine, finie entièrement expéctante, du moins très-peu active, & qui se réduisit à un emploi alternatif & répété, de trois heures en trois heures, des bains de bras & des pédiluves dans l'eau très-chaude & un peu sucrée, dont nous cherchâmes à favoriser l'effet, d'une part par des bouillons antispasmodiques, & d'une autre part par un moyen d'une potion calmante dans laquelle on fit entrer l'huile animale de Dippel rectifiée, & la liqueur minérale d'Hollmann. A la fin du quatrième jour, tous les symptômes dont nous avons parlé se montrèrent avec beaucoup plus d'intensité; il y eut en outre beaucoup d'oppression; des envies de vomir, de la cardialgie, & quelques signes fugaces de divagation & de délire. La nuit fut très-mauvaise; mais dans la matinée du cinquième jour, on aperçut à la région du cou, en front, sur quelques points du visage & sur toute la partie antérieure de la poitrine, une éruption miliaire bien caractérisée, dont l'apparition, qui fut complète avant la fin de la journée, fit cesser entièrement tous les symptômes qui nous avoient alarmés.

Du sixième au neuvième jour de cette nouvelle invasion, la maladie fut entièrement terminée, sans aucun autre phénomène critique que l'éruption, & sans rien changer au moyen de traitement que nous avions mis d'abord en usage pour attendre & reconnoître les motifs d'une médication plus énergique.

Les fièvres miliaires analogues à celles dont nous venons de rapporter un exemple, doivent se trouver comprises dans une nosographie essentiellement pratique, dans la grande famille des affections aiguës, que l'on devoit rapprocher & désigner sous le nom de *fièvres exanthématiques*

& éruptives, ayant pour caractère commun un état général de trouble & d'irritation qui précède l'éruption, le plus souvent accompagné d'anxiété, d'angoisse, d'une grande irritation de la poitrine ou de l'épigastre, & de quelques symptômes particuliers suivant le caractère de la maladie; d'angine, par exemple, dans la fièvre scarlatine; d'ophthalmie, de toux dans la rougeole, de disposition bilieuse dans l'érysipèle, &c.

Ces fièvres offraient ainsi l'éruption miliaire comme une de leurs circonsférences principales, out-elles été observées, décrites par les Anciens, ou doivent-elles être regardées comme des maladies récentes, ou de moins comme des maladies qui n'auraient été décrites avec détail que par les Modernes? Les auteurs sont partagés sur cette importante question; il nous paroîtroit inutile de vouloir les accorder. Il nous suffira de remarquer que quelle que soit l'antiquité de cette maladie, elle n'a commencé à être décrite & observée avec beaucoup de soin qu'en 1653, dans l'épidémie de Leipzig, qui fut assez désastreuse pour être regardée comme une sorte de peste ou de contagion, à laquelle on supposoit, comme à tous les fluxus de ce genre, une origine éloignée & étrangère.

Dans cette épidémie & dans la plupart de celles qui lui ont succédé, il paroîtroit du reste que l'éruption miliaire n'aurait pas été un symptôme essentiel, mais un simple épiphénomène; mais doit-on en conclure ensuite, on qu'il n'existe point de fièvre miliaire essentielle, ou que l'on doit admettre une semblable fièvre?

La question seroit bientôt décidée si on avoit généralement une idée exacte de ce qu'il faut entendre par fièvre essentielle. Quelques novateurs ont voulu que l'on donnât seulement ce nom à une perturbation générale des propriétés vitales, à une réaction générale de l'organisme, qui seroit partout sans avoir aucun point de départ fixe, ni aucun centre déterminé de mouvement.

Dans cette supposition, ni la fièvre miliaire, ni aucune autre espèce de fièvre, ne doit être regardée comme une fièvre essentielle. Il faudra en contraire reconnoître plusieurs fièvres essentielles, si l'on fait dépendre le mouvement fébrile, d'après les vues physiologiques & pratiques, d'un changement morbide dans l'innervation & la circulation; fonction dont des organes ne sont pas atteints plus tard, ni moins souvent, dans les maladies aiguës, que l'estomac ou les intestins, sur les phlegmasies desquels on chercheroit vainement à fonder un nouveau système de pathologie, en généralisant, à la manière des anciens faiseurs de théories, quelques observations judicieuses, & dont les auteurs eux-mêmes avoient fait d'abord un très-bon usage. Nous dirons plus: plusieurs fièvres sont essentielles, lors même qu'elles ont été précédées & occasionnées par un phlegma local, par une irritation partielle, si ces dernières venant à cesser, la fièvre persiste suivant

une marche régulière, comme on le voit pour la fièvre bilieuse, la fièvre inflammatoire, certaines fièvres ataxiques.

En appliquant ces remarques à l'exemple de fièvre miliaire que nous avons rapporté, & à plusieurs faits analoges & consignés dans les annales de médecine pratique, nous croyons pouvoir admettre une fièvre miliaire essentielle, caractérisée par la marche, la combinaison, la succession de ces symptômes, tout en reconnoissant que dans le plus grand nombre des cas, l'éruption du même nom peut avoir lieu comme un simple épiphénomène, dans plusieurs autres fièvres & dans certains cas d'inflammation, ou même résulter d'une irritation locale & particulière de la peau, comme chez les femmes en couche qui ont des sucrs trop abondans, & que l'on tient dans une atmosphère trop échauffée.

La fièvre épidémique de Wetzlar, qui régna en 1606, nous paroît offrir un des exemples dont nous parlons; la maladie avoit du moins les caractères, la marche des fièvres éruptives; elle avoit succédé à une scarlatine, & peut-être d'émit-elle rien autre chose que cette maladie altérée ou dénaturée. Les malades avoient d'abord de la fièvre, beaucoup de malaise & d'anxiété, de tremblement, des horripilations: symptômes qui augmentoient du deuxième au troisième jour, époque à laquelle se faisoit ordinairement une éruption miliaire un peu rougeâtre; la fièvre augmentoit ensuite, en s'accompagnant d'une angoisse considérable, & dont les progrès quelquefois devenoient funelles. Du reste, la maladie offroit un grand nombre de variétés & de complications.

L'épidémie de Louviers, observée en 1778 par Lepeq de la Cloture, nous paroît aussi rentrer dans les fièvres miliaires essentielles: l'éruption étoit précédée du moins d'une fièvre, & d'une fièvre très-grave, accompagnée de pétéchies, & ne se monroit que du troisième au cinquième jour, en paroissant critique lorsqu'elle se prolongeoit, & lorsque le développement des pustules se soutenoit pendant un certain temps. (L. J. M.)

MILIAIRE. (Fièvre miliaire des femmes en couche.) La plupart des médecins qui se sont occupés de cette maladie, n'ont guère montré plus de discernement, plus de lumières que les sages-femmes & les gardes-malades, avec lesquelles ils l'attribuent d'un commun accord, à un reflux de la matière laiteuse dans la masse des humeurs, à une matière acrimonieuse venant de cette humeur laiteuse, ou des lochies qui se font suppurées. Cette suppression des lochies, la diminution ou l'interruption de la sécrétion laiteuse, qui sont bien plutôt les premiers symptômes, les premiers effets d'une maladie quelconque des femmes en couche, ne sont jamais considérées sous ce point de vue par le vulgaire. Ces dérangemens étant beaucoup plus remarquables que ceux qui les précèdent & les oc-

caïonnent, on leur attribue tout ce qui suit, d'après le suéale adage : *post hoc, ergo, propter hoc.*

Quoi qu'il en soit, les femmes en couche, & surtout celles qui ne nourrissent pas, & que l'on tient dans une atmosphère très-échauffée, sont exposées à des éruptions miliaires, souvent sans fièvre, mais le plus souvent annoncées par un certain prurit, des picotements, des démangeaisons, surtout lorsque les sueurs sont très-abondantes. Lorsque la fièvre se joint à l'éruption miliaire, on désigne alors cette complication sous le nom de *fièvre miliaire des femmes en couche.*

Cette fièvre, que l'on a observée quelquefois chez des femmes que l'on n'avait pas soumises à un régime échauffant & stimulant, paroît dépendre cependant, dans le plus grand nombre des cas, de ce régime, ainsi que de Haen, White & plusieurs autres médecins éclairés l'ont prétendu d'après leurs observations. Il est rare qu'elle ne soit pas compliquée avec un embarras gastrique; ce ne seroit même, jusqu'à un certain point, que la fièvre de lait prolongée, & modifiée par la double circonstance d'un embarras gastrique & du mouvement fluxionnaire qui se fait à la surface du corps. Dans ce cas, la fièvre est assez forte; les malades se plaignent d'une chaleur incommode à la peau, & d'une démangeaison insupportable. Les sueurs abondantes ne tardent point alors à se montrer, & sont accompagnées tantôt de pustules blanches ou cristallines (*miliaire blanche*), & tantôt de pustules également blanches, mais offrant une aréole rougeâtre (*miliaire rouge*). L'éruption commence par le cou; les pustules se montrent ensuite au poignet, à la poitrine, & souvent sur toutes les parties du corps, & pendant l'éruption la fièvre devient beaucoup plus forte; la langue est humide, & le plus souvent chargée d'un enduit jaunâtre ou blanchâtre très-frais.

La maladie est beaucoup plus grave si les lochies se suppriment promptement & entièrement; elle peut d'ailleurs le devenir davantage encore si elle se joint à un embarras gastrique plus prononcé, à une disposition adynamique, à une irritation morbide de la membrane muqueuse des intestins & de la peau, qui se manifeste par une grande prostration, le météorisme, les vomissements de matières bilieuses & verdâtres, des excréments fétides; enfin, des sueurs abondantes & d'une odeur insupportable.

Dans ces cas, l'éruption miliaire n'est pas complète & n'apporte aucun soulagement. Plusieurs médecins qui se sont principalement occupés des maladies des femmes, ont pensé, d'après ces différentes complications, que la fièvre miliaire n'avoit rien de constant ou de régulier, & que l'éruption de ce nom se manifestoit à une période indéterminée de la maladie, & dans plusieurs fièvres de nature très-différente. Il est probable aussi que la même éruption s'est rencontrée avec une péritonite, avec une gastrite ou une mé-

trite, dans plusieurs des cas qui ont été décrits par les observateurs sous le nom de *fièvre miliaire putride*, de *fièvre putride maligne*. Quoi qu'il en soit, le traitement de la fièvre des femmes en couche, accompagnée d'éruptions miliaires, doit être subordonné à une foule de circonstances particulières.

Dans le plus grand nombre de cas, & lorsque la maladie offre peu de gravité, on fait vomir utilement avec l'ipécacuanha; on donne ensuite de légers purgatifs ou boissons adoucissantes légèrement aromatisées, tout en secondant ces médications d'un régime sévère, d'une propreté recherchée, & d'une température douce & ne s'élevant pas à plus de douze ou quinze degrés dans la chambre de la malade. Dans les cas beaucoup plus graves, le traitement se rapporte aux moyens qu'il convient d'employer, soit dans la péritonite, vulgairement appelée *fièvre puerpérale*, ou dans toute autre phlogénie obscure qui succéderoit à l'accouchement, ou dans les fièvres soit ataxiques, soit putrides; ce qui présente souvent, dans l'application, des difficultés qu'il est impossible de surmonter sans les notions les plus exactes sur ce qui appartient à ces différentes espèces de maladies, même dans les circonstances où elles ne se montrent que d'une manière insidieuse, & avec des apparences qui entraînent presque toujours les médecins vulgaires dans les méprises les plus funestes. (J. L. M.)

MILITAIRE. (Médecine, Hygiène, &c.)

L'article MÉDECINE MILITAIRE, qui a été inséré dans le volume précédent, est très-loin, malgré son étendue, de répondre à ces deux titres. Il doit être regardé comme une histoire détaillée de la partie administrative du service de santé dans les armées, & non comme une exposition historique & dogmatique des principaux objets de la médecine militaire, considérée comme une des grandes divisions des sciences médicales. L'auteur de cet article a mérité malheureusement un reproche beaucoup plus grave, celui d'avoir mêlé à des détails scientifiques, aux intérêts de la science & de l'humanité, des intérêts d'amour-propre, des considérations personnelles qui l'ont rendu injuste envers des hommes aussi recommandables par leur zèle que par leurs lumières, & dont la conduite au milieu des calamités de la guerre, a été si honorable pour la médecine en général, & pour la médecine militaire en particulier.

L'auteur de l'article en question, & dont il est de notre devoir de signaler ici les méprises & de redresser les torts, a voulu voir dans l'administration de la guerre, pour l'année 1805, une influence très-étrangère au bien du service, & des motifs entièrement démentis par le caractère des hommes distingués qu'il attaque dans cet article.

Tous ceux qui connoissent les succès solides & brillants, les sacrifices pénibles & multipliés de ces hommes, c'est-à-dire, des anciens chefs de

notre

notre médecine militaire, MM. Desgenettes, Percy & Larrey, ont dû voir avec autant de surprise que de chagrin, l'attaque que nous venons de rappeler, & le point de vue défavorable sous lequel on cherche à présenter l'institution de l'inspection générale du service de santé en 1804, & supprimée au commencement de 1816. On va même jusqu'à faire à ces hommes si respectables un reproche de leur éloignement pour la vie paisible, en donnant à entendre qu'ils étoient effrayés de la fatigue des bureaux, en leur faisant presque un crime d'avoir suivi long-temps nos armées dans leurs triomphes, & de ne les avoir point abandonnées dans leurs revers. On vendroit même laisser planer quelques soupçons sur leur désir d'acquiescer des honneurs ou de la fortune, lorsque les étrangers, beaucoup plus justes, ont proclamé leur désintéressement.

Depuis l'époque où ces fautes, qu'il étoit de notre devoir de relever, ont été écrites, le gouvernement français a pu apprécier comme il le devoit des insinuations aussi peu fondées. M. le professeur Desgenettes a déjà été rappelé au conseil de santé de la guerre, & l'on doit espérer que la même justice sera nécessairement rendue à MM. Percy & Larrey, dont la postérité, quelle que soit la conduite des contemporains, n'oubliera point les travaux & les services. (L. J. M.)

MILITAIRE (Profession). A l'article MILITAIRE de ce Dictionnaire, M. Biron & moi avons traité des qualités physiques & morales propres au soldat, de la nourriture, de ses vêtements, des habitations qui lui font destinées, soit en temps de paix, soit pendant la guerre, des marches, des manœuvres, des bivouacs & des différens exercices militaires auxquels il est exposé dans la carrière des armes. Tous ces objets ont été spécialement envisagés sous le rapport de l'hygiène; nous y avons ajouté diverses considérations générales sur les causes des maladies de troupes, sur le caractère qui leur est propre, sur les difficultés qui accompagnent leur traitement, & sur les règles de thérapeutique qui leur conviennent. Aujourd'hui nous avons à nous occuper de la profession militaire considérée en elle-même. Cet article sera donc consacré à l'examen des changemens que cette profession opère sur les fonctions & l'organisation, sur les facultés intellectuelles, les habitudes & les passions, sur la santé & les maladies; on, en d'autres termes, il aura pour objet l'étude de l'influence de la profession militaire sur le physique & le moral de l'homme.

S'il est une profession inséparable d'exercer une influence profonde & durable sur l'économie animale, c'est sans contredit celle dont nous nous occupons. La plupart des autres professions, en effet, se bornent à modifier certains organes, certaines fonctions, un petit nombre ou une seule de nos facultés; elles n'agissent en quelque sorte, pour la plupart,

que sur une fonction de l'homme. Les unes portent plus particulièrement leur action sur le cerveau, les autres sur la poitrine, d'autres sur les membres, & quelques-unes sur tel ou tel de nos sens. Il y en a qui fortifient le corps & d'autres qui l'affaiblissent; on en voit qui impriment une grande activité aux fonctions de l'entendement; d'autres qui exaltent la sensibilité, & d'autres qui donnent une grande énergie aux mouvemens. Il en est enfin qui sont plus ou moins favorables à la conservation de la santé, quelques-unes qui la détériorent, & plusieurs, comme on sait, sont la source de diverses maladies spéciales. Mais la profession militaire, en soumettant les hommes à un régime particulier (payes la dernière partie de l'article MÉDECINE MILITAIRE), à des vêtements uniformes & aux mêmes exercices du corps; en les soumettant dans des habitudes communes; en les soumettant aux mêmes usages & aux mêmes habitudes; en leur inspirant les mêmes sentimens, les mêmes passions, les mêmes idées; en les assujettissant enfin aux mêmes actions & à la même discipline, exerce à la fois son action sur toutes les parties du corps, sur tous les organes; elle modifie simultanément toutes les facultés de l'homme, elle exerce une influence puissante sur tout son être sensible, & amène ainsi dans l'économie animale des changemens extrêmement remarquables.

Le maniement continu des armes, les promesses, les revues, les manœuvres & autres exercices qui se partagent le temps, & en quelque sorte l'existence des militaires; les soins journaliers que réclame l'entretien de leurs armes, les corvées & les gardes qu'on en exige en temps de paix comme en temps de guerre; & dans ce dernier cas, les marches & contre-marches, les attaques, les bivouacs, les campemens & tous les travaux qui leur sont imposés, sont autant de circonstances qui les tiennent dans une activité continuelle. Par ce moyen toutes les parties du corps, simultanément ou alternativement exercées, acquièrent un degré de force & de développement aussi éloigné de l'excès que les travaux excessifs de certaines professions mécaniques impriment à divers organes, que de l'espèce de moiteur & d'atrophie, soit générale, soit locale, que produisent certaines professions sédentaires, ainsi que la vie molle & voluptueuse des oisifs citoyens. Aussi, comparez une troupe de militaires de tous grades, avec un nombre égal d'individus du même âge également bien conformés, mais pris dans une autre profession. D'un côté vous trouverez une juste proportion entre toutes les parties du corps, une égale répartition de forces entre les différens organes, & d'un autre côté vous serez surpris de rencontrer un organe très-fort à côté d'un organe très-foible, une disproportion manifeste entre les diverses parties du corps; en un mot, vous observerez une grande analogie dans la constitution, les formes & la physiologie des premiers, & les seconds vous éton-

neront par la variété des différences & les anomalies de leur organisation.

La constitution physique qui caractérise en général les militaires, est marquée par un développement & une vigueur modérée, par une égale répartition des forces dans tous les organes, par le juste équilibre des solides & des fluides, par l'aisance & la régularité des actions vitales, & par le libre exercice de toutes les fonctions corporelles. Dans cette profession, les exercices continuels & variés donnent au troc & aux membres une consistance & une vigueur modérée, aux muscles une énergie convenable, aux articulations de la solidité & de la souplesse, & à tous les mouvemens une solidité remarquable. La sobriété, dont l'exagité de leur solde fait aux militaires une loi stricte, entretient par suite toutes les autres fonctions intérieures ou nutritives dans la même activité & la même régularité. Toutes ces circonstances, & particulièrement leur vie active, sont p'ns propres à modérer qu'à exciter les desirs vénériens; en outre, la vie est communément rendant parmi eux le vice de l'onanisme fort rare, il arrive que la profession militaire expose moins aux excès vénériens qu'elle ne le semble faire au premier abord. D'un autre côté, & la constante uniformité & l'éternelle monotonie à laquelle les militaires sont généralement condamnés par une discipline en quelque sorte monacale, écouffe la sensibilité, engourdit les sens, ralentit & affoiblit l'action oerveuse : la nécessité de n'agir & de ne penser que par ordre, l'habitude de ne se montrer en quelque sorte qu'en vertu d'une impulsion étrangère, ôtent tout ressort à l'âme, toute activité à l'esprit, resserrent les bornes de l'intelligence & plongent généralement les militaires dans l'insouciance, l'incurie & la torpeur. En tarissant ainsi la source des plus nobles affections du cœur humain, cette disposition morale, triste fruit de la profession des armes, rend les hommes étrangers pour la plupart à l'équité naturelle, aux sentimens de l'égalité & de la justice, & aux charmes de la liberté, à cet ardent amour de l'humanité qui constitue la charité & la philanthropie, & à l'amour de la patrie. Elle suit trop souvent dominer en eux le goût de la servitude, l'attachement au pouvoir & le penchant pour la tyrannie. Je sais qu'il y a d'honorables exceptions à cette règle; j'en ignore pas que Washington & Pélopidas ont vu plus d'un imitateur parmi les militaires; je sais qu'à diverses époques, & tout récemment encore, on a vu paraître, dans la profession des armes, des hommes dont les noms immortels figureront à jamais parmi les plus illustres & les plus vertueux défenseurs de la liberté; mais ces exceptions, en général fort rares, n'ont été présentées que par des hommes qui avoient acquis toutes les vertus du citoyen avant de devenir militaires. Elles tiennent à des habitudes morales antérieures, & surtout à une bonne éducation première, dont

l'influence chez quelques âmes privilégiées est plus forte encore que celle de la profession des armes; de sorte que cette profession, en général, tend à développer le physique aux dépens du moral de l'homme. Elle donne de l'énergie, de la force, de la régularité à toutes nos fonctions corporelles, mais elle affoiblit & engourdit nos facultés morales & intellectuelles, en un mot elle fortifie & développe le corps, en même temps qu'elle comprime & rétrécit l'esprit.

Du reste, en favorisant le développement & l'activité de tous nos organes, elle répand uniformément la vie dans tous nos tissus, & semble établir entre nos différens appareils ou systèmes organiques, cette sorte d'harmonie qui est la source de la santé & le propre du tempérament sanguin regardé à juste titre, par les Anciens, comme le tempérament par excellence. Tous les attributs de ce tempérament se retrouvent en effet chez les militaires. Aussi, ils ont en général la peau assez souple, un teint médiocrement coloré, un tronc robuste, une poitrine bien développée, des membres bien proportionnés, des formes très-promuocées sans être dures, des chairs fermes, des muscles bien dessinés & des mouvemens faciles. Leurs sens, généralement peu actifs, sont d'une médiocre sensibilité, leur sommeil est modéré, & leur aptitude pour les exercices du corps est remarquable; au besoin du changement ils joignent beaucoup d'insouciance, un singulier penchant pour l'oisiveté, un petit nombre de passions quelquefois souveuses, ordinairement peu durables, & des facultés intellectuelles peu actives & généralement très-bornées.

Par suite des dispositions organiques qui résultent de ce tempérament, le militaire est porté par instinct au mouvement, à l'activité & à la gaieté; il aime le bruit, les rixes, les disputes, les jeux bruyans, les combats, les expéditions hardieuses. Malgré son penchant pour l'oisiveté, la gêne de la discipline & la monotonie du régime auquel il est soumis, lui font saïr avec une incroyable avidité toutes les occasions de braver les dangers & de surmonter des obstacles, & même de prodiguer son sang. Peu propre aux sensations modérées & aux affections douces & paisibles de l'âme, la sensibilité écouffée par la monotonie, mère de l'ennui, lui fait en quelque sorte un besoin des sensations fortes : aussi le militaire, en général, recherche les alimens épicés, les boissons aigres & stimulantes, le tabac & autres substances susceptibles de faire une impression forte & vive sur ses sens, ainsi que les situations de la vie propres à ébranler puissamment son être. Telle est la source de sa fureur pour les jeux de hasard, pour le duel, pour le pillage & la dévalisation; on connoît aussi son déplorable penchant pour les excès de tous genres, pour les orgies, l'ivrognerie & la débauche la plus crapuleuse. Le sentiment de la force, qui le rend ordinairement facile, obligeant, brave,

confiant & généreux, lui inspire souvent un orgueil, une dureté insupportables, & le remplit parfois de forfanterie & de jactance. Souvent irrité par des besoins qu'il ne peut satisfaire, fatigué de la dépendance, de l'abjection & des injustices, que dans les grades inférieurs on ne lui épargne pas, il devient brutal, grossier, insolent, colére, & d'un égoïsme révoltant. Tout entier à la sensation du moment & incapable de dissimuler, il se montre tel qu'il est, & paroit alternativement foudroyé des vices les plus révoltans, & doué des qualités les plus brillantes. Tantôt en proie à une cupidité insatiable qui paroit être, dans certains cas, la source impure de sa valeur ; tantôt d'une libéralité sans exemple & d'un dévouement héroïque, il va pour la cause la plus légère, & souvent sans aucun motif, verser le sang d'un ami, pour lequel, un moment auparavant, il auroit sacrifié mille fois sa vie : assemblage vivant de tous les contrastes, il est franc, inflexible & loyal par caractère ; sobre, industrieux, patient par nécessité ; vain, orgueilleux & querelleur par besoin ; doux & brutal, sévère & humain, égoïste & généreux par occasion ; enfin, il est dominé tout à tour par l'amour de la gloire, qu'il confond quelquefois avec le mépris de la vie, & par la crainte des châtimens presque toujours arbitraires, & souvent avilissans, que partent des chefs capricieux & des codes barbares lui intelligent à tout propos.

Étranger en quelque sorte à la société, dont on lui interdit toutes les douceurs, dont il ne pratique point les devoirs, dont il viole souvent les usages ; placé hors de la civilisation, dont il est à son usage un des plus redoutables fléaux ; ne connaissant de la religion que quelques pratiques superstitieuses, de la morale qu'un petit nombre de principes obscurs qu'il se fait souvent gloire de violer, le plus souvent étranger à toute espèce de culture intellectuelle ; n'admettant d'autre vertu que le courage d'un moment qui fait supporter la mort avec dévotion ; d'autres devoirs que l'obéissance passive ; la raison, en général peu exercée, & par conséquent très foible, reste complètement subordonnée à ses passions. Celles-ci, dans la profession militaire, se rapportent bien plus souvent aux besoins instinctifs qu'aux sentimens sociaux ; c'est dire qu'eiles n'ont pas toujours pour principe ce qu'il y a de plus grand & de plus noble dans le cœur de l'homme, & que l'égoïsme ou l'intérêt individuel les caractérisent très-souvent. Mais un fait qui est digne de remarque, c'est que ses passions communicatives, telles que le courage & la peur, se manifestent chez les militaires avec une extrême intensité, & se transmettent parmi eux avec une rapidité étonnante & proportionnée en général à l'énergie de leurs réunions. C'est ainsi que la gaieté & la tristesse, l'audace & le découragement, sont si faciles & si prompts à se développer dans les grands rassemblemens de troupes. Dans une foule de circonstances, on a vu un seul homme cou-

rageux, en se montrant à leur tête, leur inspirer instantanément l'ardeur & la passion qui l'animent, & exciter avec la rapidité de l'éclair, dans une armée entière, ces flots subits de courage qui assurent la victoire : comme aussi il n'est pas rare que la simple vue d'un seul individu, dont tous les traits respirent la frayeur, soit la cause de ces frayeurs subites qui s'emparent instantanément de toute une armée, & de ces terreurs paniques, dont les troupes les mieux organisées donnent quelquefois des exemples.

La profession militaire ne se borne pas à modifier puissamment la constitution physique & le moral de l'homme ; elle agit encore sur son organisation, de manière à le disposer à diverses maladies qui, par leur fréquence dans cette profession, peuvent être regardées comme la conséquence.

Sur quatre mille six cent quatre-vingt-sept malades que j'ai observés dans différens hôpitaux militaires en France, en Espagne & en Italie, & dont j'ai soigneusement noté les affections à leur entrée à l'hôpital, il s'est présenté :

Fièvres intermittentes de tons types.	1400
Gastro-entérites.	903
Entérites.	729
Bronchites.	323
Gastrites.	303
Rhumatismes divers.	277
Scorbut.	90
Phthisie pulmonaire.	83
Pleurésies.	83
Ascites.	64
Anasarques.	52
Angines.	50
Pneumonies.	53
Stomatites.	29
Idiotes.	27
Ophthalmies.	26
Olites.	19
Exanthèmes divers.	18
Erysipèles.	17
Héméralopie.	17
Hydrothorax.	12
Hémoptygies.	11
Névralgies diverses.	9
Paralysies.	8
Epilepsies.	7
Dartres.	6
Péritonites.	5
Convulsions.	5
Zona.	4
Asévrisines du cœur.	4
Scrophules.	3
Manies.	3
Apoplexies.	3
Hépatites.	3
Méningites.	3
Splénite.	1

Total. 4683

Q 2

Suite de l'autre part..... 468a

Mélancolie.....	1
Épistaxis.....	1
Hématémèse.....	1
Catarrhe.....	1
Asthme.....	1

Total..... 4687

Ce tableau, où les maladies observées dans les hôpitaux militaires, sont disposées dans l'ordre de leur fréquence respective, donne pour résultat :

1°. Que les fièvres intermittentes de tous types forment environ le tiers des maladies auxquelles les militaires sont exposés.

2°. Que les fièvres continues & rémittentes, maqueuses, adynamiques, ataxiques, & les typhus réunis dans ce tableau, sous le titre de *gastro-entériques*, comme n'étant que des modifications ou des variétés de l'inflammation de la membrane muqueuse de l'estomac & de l'intestin, en forment plus du quart.

3°. Que la diarrhée & la dysenterie, également comprises sous la dénomination commune d'*entérites*, comme appartenant à la phlegmasie de la membrane muqueuse du gros intestin, en constituent un peu moins du sixième.

4°. Que les bronchites ou catarrhes pulmonaires en forment une fraction encore moins grande.

5°. Enfin on voit par ce tableau, que les embarras & les fièvres gastriques, soit continues, soit rémittentes, réunies ici sous le titre de *gastro-entériques*, comme tenant à l'irritation ou à l'inflammation de l'estomac, dans une plus petite proportion que les bronchites, sont cependant beaucoup plus communes dans la profession militaire, que la plupart des autres maladies.

En considérant les affections dont nous venons de donner la liste, relativement aux grandes cavités du corps, où elles ont leur siège, on en trouve appartenant à l'abdomen. 2068

— au thorax. 554

— à la tête.. 13a

et de réponses dans tout le corps,
on sans siège fixe & déterminé... 1933

Sous le rapport des systèmes d'organes qu'elles affectent, elles peuvent être disposées dans l'ordre suivant :

Maladies réputées générales, ou dans lesquelles presque tous les systèmes paraissent être affectés, dont le siège par conséquent est indéterminé, à..... 1519

Maladies du système muqueux. 2421

— des systèmes fibreux & musculaires..... 277

— du système fibreux..... 160

— du système parenchymateux..... 125

— du système dermoïde..... 72

— du système cellulaire..... 52

— du système nerveux..... 49

— du système lymphatique..... 3

Relativement aux appareils des fonctions qui sont essentiellement liés dans les maladies des militaires, on en trouve appartenant indistinctement à tous, ou à la plupart des appareils, ou sans siège bien déterminé..... 1561

Appartenant à l'appareil de la

digestion..... 2024

— de la respiration..... 550

— de la locomotion..... 277

— des émanations..... 181

— des sécrétions glandulaires..... 20

— des sensations..... 3

— de la circulation..... 38

— de l'absorption..... 3

En égard enfin aux organes particuliers qui sont le plus fréquemment affectés chez les militaires, leurs maladies peuvent être disposées dans l'ordre suivant :

Maladies dont le siège est douloureux

ou indéterminé..... 1501

— affectant à la fois l'estomac

& l'intestin..... 963

— de l'intestin..... 720

— des psoas..... 550

— de l'estomac..... 303

— des muscles & de leurs dépendances..... 277

— de la peau (y compris vingt-sept lésions simples)..... 72

— du péritoine..... 69

— du tissu cellulaire..... 52

— des yeux..... 43

— du pharynx & du voile du

palais..... 36

— de la bouche..... 29

— du nez..... 20

— de l'oreille..... 19

— de l'encéphale..... 4

— du cœur..... 4

— du foie..... 2

— de la rate..... 1

— du nez..... 1

En ajoutant à cette liste la gale & les maladies vénériennes, qui sont très-communes parmi les militaires, on aura une idée exacte des affections auxquelles ils sont plus particulièrement exposés. La gale, en effet, règne constamment parmi eux ; mais elle est beaucoup plus fréquente lorsque les troupes sont en marche ou campées, que lorsqu'elles occupent des garnisons pourvues de casernes. La malpropreté des habitations où les soldats sont ordinairement logés, dans le premier cas, est la principale cause de cette différence. Les affections syphilitiques, au contraire, sont beaucoup plus communes dans les garnisons des villes, que parmi les troupes qui sont en campagne & campées ; & l'on en fait parfaitement la raison. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'observer le rapport de la fréquence de ces maladies avec celles dont j'ai donné la liste.

Quoique le typhus soit en général très-fréquent parmi les militaires, & même assez commun pour avoir mérité depuis long-temps le titre de *fièvre des casernes, des camps & des hôpitaux*, je n'ai point

fait une mention spéciale de cette maladie, parce qu'au début elle se rapproche tellement de la gastro-entérite, qu'il est presque toujours impossible de la distinguer de cette dernière à la première visite, époque à laquelle j'ai coutume de signaler sur mes cahiers, les affections des malades qui sont soumises à mon observation. Cependant cette maladie redoutable & éminemment contagieuse, sévit très-fouvent dans les hôpitaux militaires, & dans beaucoup de cas elle complice dangereusement les maladies pour lesquelles les militaires ont été reçus dans ces établissements. C'est surtout dans les hôpitaux que le typhus prend sa source; il s'y déclare toutes les fois qu'ils sont encombrés de malades ou de blessés, qu'ils manquent de fournitures, que le désordre règne dans leur administration, que la propreté est négligée, qu'ils manquent de soustractions, que l'air des salles n'est pas fréquemment renouvelé par une ventilation convenable. Dans toutes ces circonstances, les fournitures, & l'air lui-même, imprégnés des émanations ou miasmes invisibles, impondérables & délétères qui s'élèvent des hommes réunis dans des lieux trop étroits ou mal aérés, ou par cette raison le typhus s'est développé spontanément, le transmettent, soit par contagion, soit par infection à tous les malades qui usent des mêmes fournitures ou qui respirent le même air.

Si l'encombrement, la malpropreté & le défaut de ventilation rendent le typhus endémique en quelque sorte dans les hôpitaux militaires, l'insalubrité de l'air qu'on respire dans ces établissements, la monotonie du régime auquel les malades & les convalescents y sont soumis, le défaut d'exercice, l'ennui & la tristesse qui en sont la suite, y engendrent continuellement le scorbut. Aussi cette affection se présente parmi les militaires beaucoup plus fréquemment que ne l'indique le rang qu'elle occupe dans le tableau que j'ai mis sous les yeux du lecteur. Ce tableau, en effet, ne fait mention que des affections scorbutiques primitives, développées antérieurement à l'entrée des malades à l'hôpital; & nullement de celles qui se font manifester chez eux pendant leur séjour dans ce genre d'établissements, où le nombre de ces dernières est infiniment plus considérable que celui des autres; & c'est surtout dans le cours, ou à la suite des phlegmasies chroniques ou de leurs rechutes, des rhumatismes aigus, de la phthisie, de la nœphalgie, que le scorbut survient ainsi dans les hôpitaux.

La nœphalgie elle-même, bien plus commune encore que le scorbut, & non moins meurtrière que le typhus, peut être considérée comme un des plus tristes attributs de la profession des armes. Si le nom de cette redoutable névrose ne se trouve pas dans la liste précédente des maladies des troupes, cela tient à ce que les jeunes soldats qui en sont atteints, ne font envoyés à l'hôpital que pour quelque autre affection concomitante, qu'on

se borne à noter sur les cahiers, à la première visite, en attendant que l'on puisse reconnaître la nœphalgie, que certains individus dissimulent avec beaucoup de soin.

Ainsi le scorbut, le typhus & la nœphalgie, par leur fréquence, peuvent être considérés en quelque sorte comme endémiques parmi les militaires; & les deux dernières surtout, par leur gravité & la mortalité qui en est la suite, peuvent être regardées à juste titre comme une des plus funelles conséquences de la profession des armes.

De reste, ces maladies, ainsi que celles qui ont été précédemment désignées, se présentent rarement chez les militaires dans l'état de simplicité ou d'isolement; presque toujours elles s'associent plusieurs entr'elles, & se emparent les unes les autres, ou nombre de deux, trois, quatre & même en plus grand nombre. Ainsi rien n'est plus commun que de rencontrer dans les hôpitaux militaires, une fièvre intermittente, un rhumatisme ancien, ou toute autre affection de vieille date, chez les sujets qui sont en même temps atteints d'une angine, d'une bronchite, d'une pleurésie, d'une pneumonie, de la dysenterie ou d'ictère, & quelquefois même de plusieurs de ces affections réunies. La gastrite & l'entérite sont bien plus souvent réunies que séparées chez les militaires, & leurs nombreuses modifications, si communes dans cette profession, se montrent bien plus rarement dans l'état de simplicité, que diversement associées à l'ophtalmie, aux aphtes, à l'érysipèle, & à l'inflammation de la bouche ou des poumons. Chaque jour on voit, dans les hôpitaux militaires, une phlegmasie nasale marcher simultanément avec celle de la plèvre & du péritoine, & avec un rhumatisme, soit musculaire, soit articulaire; enfin, à la suite du typhus, d'une gastrite, d'une dysenterie, ou d'une gastro-entérite, ou de toute autre phlegmasie, soit aiguë, soit chronique. Combien n'observe-t-on pas de malades simultanément atteints de phthisie pulmonaire, d'hydropisie, du scorbut & de nœphalgie! redoutable & funelle complication qui les conduit lentement au tombeau, après leur avoir fait douloureusement parcourir tous les degrés de la cachexie; en un mot, si, dans la profession militaire, les maladies affectent un caractère particulier, c'est sans contredit celui de l'extrême fréquence de leurs complications.

On ne connoitroit toutefois qu'imparfaitement les maladies de cette profession, si l'on ne faisoit entrer en ligne de compte les *maladies simulées & les maladies dissimulées*, qui se présentent à chaque instant dans l'exercice de la médecine militaire. D'après ce caractère généralement trus & loyal des soldats, on ne pourroit jamais croire, si l'expérience n'en donnoit la preuve chaque jour, combien certains individus parmi eux, même en apparence les plus obtus & les plus grossiers, emploient d'astuce, de ruse & d'artifices, pour en imposer sur les maladies qu'ils éprouvent réel-

lement, ou dont ils se prétendent atteints. Les uns, quoique profondément atteints de diverses phlegmasies chroniques très-graves du poulmon, de l'estomac & de l'intestin, fatigués de l'abstinence qui leur est prescrite & du traitement qu'exigent leurs maladies, plus souvent encore ennuyés de leur long séjour dans un triste & ennuyeux hôpital où ils sont comme emprisonnés, assurent qu'ils n'éprouvent aucune douleur ni anxiété, qu'ils ont beaucoup d'appétit, qu'ils dorment parfaitement bien, qu'ils ne ressentent plus ni froid, ni chaleur, ni sucs, autre symptôme fébrile, & protestent qu'ils se portent bien, en demandant à grands cris des aliments en abondance, ou leur sortie de l'hôpital : & il n'y a pas d'efforts qu'ils ne fassent pour tromper ainsi, sur leur état, les personnes intéressées à le reconnoître. Or, c'est surtout dans les phlegmasies chroniques exemptes de fièvre, qu'il est facile de s'en laisser imposer & de tomber dans l'erreur à cet égard ; car dans les autres maladies, une observation attentive peut faire éviter l'erreur, pourvu qu'on soit sur ses gardes.

Il n'en est pas toujours de même à l'égard des maladies simulées, dont certains militaires se prétendent atteints, dans la vue d'obtenir une exemption de service, un congé ou leur réforme. En effet, les uns attestent que dès long-temps ils sont atteints d'une affection de poitrine ; ils le plaigent d'insomnie & d'oppression ; ils imitent assez bien le genre de la respiration, la toux & la physionomie d'un homme souffrant ; ils ont soin de le faire maigrir, de mêler du sang à leurs crachats, & prétendent qu'ils s'affoiblissent de jour en jour ; d'autres se plaignent de douleurs dans la tête, au ventre ou dans d'autres parties du corps ; ils supportent plusieurs jours l'abstinence qu'on leur impose, se font dévorés par la soif, & trouvent même les moyens d'augmenter en eux la chaleur & la fréquence du pouls, & de simuler ainsi des mouvements fébriles. Quelques-uns ont soin de se frotter la langue avec leur drapeau ou leur couverture, de manière à la rendre rouge, sèche, aride & écaillée comme dans les variétés les plus graves de la gastro-entérite ; de la fièvre ataxo-dynamique par exemple. Plusieurs imitent à s'y méprendre, les phénomènes de l'épilepsie & des convulsions, & surmontent avec un courage imperturbable les épreuves les plus douloureuses sans se démentir. Il y en a qui, se prétendant atteints d'incontinence d'urine, ont la confiance de lâcher continuellement ce liquide, & d'en abreuver leur couche & leurs vêtements pendant des années entières, sans qu'aucune mesure de rigueur puisse les déterminer à renoncer à une pareille imposture. On rencontre bien plus souvent encore de jeunes soldats qui imitent les manières, prennent toutes les allures du foudre, & en jouent le rôle avec une adresse & une confiance véritablement étonnantes. On en voit, nouveaux ventri-

loques, qui, doués d'une poitrine bien développée & d'une constitution robuste, prétendent avoir perdu la voix depuis long-temps ; ils ont l'art de l'affaiblir & de la modifier au point d'imiter celle des individus atteints de phthisis laryngée ou d'une véritable aphonie. Il y en a qui, par des irritations mécaniques ou des applications acres & corrosives, s'opposent à la cicatrisation d'ulcères, soit naturels, soit artificiels, qu'ils présentent comme ayant résisté à tous les traitements. Enfin, on en rencontre qui affectent la classification ou une contraction permanente de quelque membre, & soutiennent l'imposture avec tant d'adresse & d'opiniâtreté, qu'ils mettent souvent l'observateur le plus attentif dans une forte d'incertitude sur la réalité de leurs infirmités prétendues. Toutefois, avec le temps & nos attentions, l'ouïe, on parvient, dans la plupart des cas, à reconnoître la fraude. Quelle que soit en effet l'habileté d'un individu, pour feindre les principaux phénomènes d'une maladie, il ne peut imiter assez exactement les symptômes qui la caractérisent, sans laisser paroître tôt ou tard, entre eux, un défaut d'ensemble & d'harmonie, qui finit par le trahir & par dévoiler l'imposture. La chose est plus difficile à l'égard de certaines douleurs rhumatismales, que les militaires, par cette raison, se plaisent à simuler par-dessus tout. On sait en effet que des douleurs musculaires & articulaires, quelquefois même assez fortes pour s'opposer à la locomotion & aux mouvements de la partie affectée, existent sans aucun siège apparent, si ce n'est l'augmentation de la douleur que détermine la compression, le tiraillement ou un mouvement subit imprimé à la partie malade ; ou si le sujet a assez d'adresse pour manifester cette aggragation de douleur chaque fois qu'on presse le lien qu'il dit être le siège précis de son mal, il laisse nécessairement l'expérimentateur dans le doute sur la vérité de ses assertions. Il est en outre certaines douleurs, telles que celles auxquelles on a donné le nom d'*ostéocopes*, qui n'augmentent nullement par la pression, le tiraillement & le mouvement communiqué, qui n'ont par conséquent aucun signe à l'aide duquel on puisse s'assurer de leur existence, sur lesquelles on est par conséquent forcé de rester dans le doute, ou de s'en rapporter au dire des malades.

On a cherché à déterminer le nombre des malades que fournit en général une armée d'une force connue, dans un temps donné ; & l'on pense généralement qu'en Europe, ce nombre s'élève ordinairement le dixième du nombre des combattans, dans le cours d'une année ; de sorte que, suivant ce calcul, une troupe de dix mille hommes, auroit mille malades au bout d'un an, sans compter les blessés. Cependant rien n'est moins variable ni moins constant que ce résultat ; car on sait très-bien qu'une foule de circonstances diverses peuvent faire varier à l'infini le nombre

des malades, dans un rassemblement armé ; tels sont entr'autres le climat, la saison, les vicissitudes atmosphériques, les localités, les aliments & les boissons, l'abondance & la disette, les désastes, les victoires, le désordre & la discipline. Ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, une armée fournit plus de malades dans un climat froid que dans un climat chaud, dans un pays sec que dans les contrées humides, & dans des régions découvertes & élevées, que dans des pays couverts, bas & marécageux. J'ai constamment vu à l'armée plus de malades l'hiver que l'été, même dans le midi de l'Europe, & l'expérience des long-temps prouve que les armées victorieuses en donnent beaucoup moins que celles qui sont vaincues. Il en est de même d'une armée qui observe une exacte discipline, & dans laquelle les troupes sont bien nourries & vêtues convenablement, relativement à celle où règnent le désordre & l'indiscipline, & qui manque des choses les plus nécessaires.

La mortalité produite par les maladies des militaires n'est pas plus constante que la quantité de ces maladies elle-même : elle varie également selon une suite de circonstances. En général, je l'ai toujours trouvée plus considérable en hiver qu'en été. On fait qu'elle est portée au maximum parmi les troupes qui occupent des contrées marécageuses, telles que la Zélande, & surtout parmi celles qui se trouvent dans des pays à la fois chauds & humides, comme dans les régions équatoriales. Toutes choses égales d'ailleurs, elle est infiniment moins considérable dans les hôpitaux militaires d'une médiocre étendue, où les fournitures sont en bon état & en quantité suffisante, où l'ordre & la propreté sont bien observés, que dans ceux qui sont d'une grande étendue, où la malpropreté, le désordre & la pénurie exercent leur funeste influence. Sous ce dernier rapport, la différence de la mortalité entre différents hôpitaux est immense. Ainsi, dans le même pays, dans la même année, dans des saisons analogues, & sous le règne des mêmes maladies, j'ai vu la mortalité s'élever quelquefois jusqu'au tiers du nombre des malades, & d'autres fois ne pas même en atteindre le quartième. Or, entre ces deux extrêmes, la mortalité peut présenter (selon les circonstances qui influent sur les malades) une suite de degrés : totokia, au généralisant les résultats des notes journalières que j'ai prises dans les hôpitaux militaires, je trouve 185 morts sur 4687 malades ; ce qui porteroit la mortalité moyenne à $\frac{185}{4687}$, ou environ $\frac{1}{25}$.

D'après les listes de mortalité dressées par les Anglais, pendant la guerre de l'indépendance de l'Amérique septentrionale, il périt huit fois plus de soldats par les maladies, qu'immédiatement par les blessures reçues dans les combats. Or, si l'on observe une aussi grande quantité de maladies mortelles parmi les troupes d'un peuple aussi soigneux de la santé de ses soldats que le peuple

anglais, combien plus grande encore doit être la mortalité dans les armées des autres nations de l'Europe, lorsqu'on réfléchit que la plupart des gouvernements qui pourvoient avec une prodigalité sans exemple à l'entretien d'un nombre immense d'états-majors, & d'une foule d'objets de luxe sans utilité pour leurs soldats, & propres tout au plus à jeter un éclat éphémère dans une parade, apportent une odieuse & révoltante parcimonie dans les dépenses les plus urgentes que réclame la santé des aveugles & malheureux instruments de leurs haines & de leurs vengeances ! (CHAMBERT.)

MILLE-FEUILLE. (*Achillea millefolium.*) Cette plante, indiquée dans la plupart des matières médicales, ne paroît avoir aucune propriété bien constatée. La mille-feuille des Alpes, que l'on appelle aussi improprement la *petite absinthe*, mérite beaucoup plus d'être employée par les médecins. Elle jouit d'une grande réputation comme vulnéraire, & dans plusieurs cantons de l'Helvétie on en fait une infusion très-forme qui se trouve indiquée dans plusieurs affections catarrhales, & dans certaines atonies des voies digestives. (L. J. M.)

MILLE-PERTUIS. (*Hypericum.* Linn.) Les mille-pertuis qui se trouvent dans la petite famille des hypericées de Juskieu, contiennent, comme toutes les familles de cette plante, un suc gommeux & jaunâtre, auquel elles doivent sans doute leurs propriétés purgatives & vernissées. Plusieurs de ces plantes exhalent une odeur très-pénétrante, qui est due à une huile volatile que renferment des glandes pellucides.

Les vèrns vulnéraires que l'empirisme populaire accorde à cette plante, font loin d'être prouvés, sans doute ; mais nous ne craignons pas d'affirmer, d'après notre propre expérience, que la macération des feuilles de mille-pertuis dans l'huile (huile de mille-pertuis), peut être employée dans le pansement des piqûres, des plaies cruelles très-douloureuses, avec beaucoup plus d'avantage que les emphitres ou les onguens les plus vantés. (L. J. M.)

MILLERIE (Eaux minérales de la). La Millerie est une terre près de Ville-Dieu, où nous savons seulement qu'on trouve une source d'eau minérale froide, que Ponsièvre a dit martiale, & qui est à côté du château. (MACQUART.)

MILLERY (Eaux minérales de). C'est un village distant de Nancy de deux lieues & demie ; à droite de la Moselle, où se trouve une source d'eau minérale froide que l'on dit ferrugineuse. (MACQUART.)

MILLOT, MILLET. (*Pathologie.*) Ce sont de petites ébullitions répandues sur toute la peau, & quelquefois seulement à certaines régions, & qui bientôt se convertissent en petites vésicules pleines d'une lymphe plus ou moins limpide, s'écrivent alors sous

l'apparence & le volume du millet blanc. Le millet peut furvenir à tout âge comme chez tous les sexes; il paroît cependant plus communément chez les enfans & les femmes que chez les vieillards, ainsi qu'on le verra dans les articles suivans. (Voyez MUGUET (Pathologie).) (PETIT-RADEL.)

MILPHOSE. Nom qui a été donné par Aétius à la dépilation des paupiers.

MINADOUS (Jean-Baptiste), médecin du seizième siècle, étoit de Ferrare. Il a laissé un *Traité De abusu miffionis sanguinis in malignâ febris, etiam apparentibus petculis*. Venet. 1597, in-4°.

Il eut deux fils qui embrassèrent la même profession, & dont l'un, nommé Aurèle, a publié un *Traité De virulentâ venerâ*, Venet. 1596, in-4°, où il s'attache à prouver la réalité de l'existence de la vérole, chose dont on ne doute plus aujourd'hui.

L'autre frère, appelé Jean-Thomas Minadous, a laissé plusieurs petits ouvrages, dont voici les principaux :

De ratione mittendi sanguinis in febrilibus. Venet. 1587, in-4°.

Medicamentum disputationum liber. Tarvisi, 1590, 1610, in-4°.

De humani corporis turpitudinibus cognoscendis & curandis libri tres. Ibid. 1600, in-8°.

De arthritide liber unus. Ibid. 1602, in-4°.

De variolis & morbillis liber unus. Patav. 1603, in-4°.

De febre malignâ libri duo. Ibid. 1604, in-4°.

(R. GEORGEOT.)

MINDERER (Raimond), médecin de la ville de Hambourg, sa patrie, se fit un nom vers le commencement du dix-septième siècle, par son attachement à la secte chimique. Les succès de sa pratique lui méritèrent l'estime & la confiance de l'officier & du soldat; ils se répandirent même si avantageusement dans les cours de Vienne & de Munich, qu'il y fut souvent appelé par les personnes de la première distinction. C'est à lui que l'on doit une composition fort usitée, & connue sous le nom d'*esprit de Mindererus*. Les observations que ce médecin avoit faites sur les maladies régnantes dans les armées, lui ont fourni la matière d'un ouvrage écrit en allemand; il fut traduit en latin sous ce titre :

Medicina militaris, seu liber castrensis, exposita & facile perhibita medicamenta continens. Aug. Vind. 1620, in-8°. Norimb., 1668, in-8°, en anglais. Lond., 1674, in-8°.

De pestilentia liber unus. Aug. Vind. 1608, 1619, in-8°.

Aldurarium marcosolinum. Ibid. 1616, in-8°.

De calcarantho seu vitriolo, ejusque qualitate, virtute & viribus. Ibid. 1617, in-4°.

Threnodia medica, seu splandus medicince lugentis. Ibid. 1619, in-8°.

(R. GEORGEOT.)

MINÉRALES (Eaux). On devoit appeler *eaux minérales*, & dans l'acception la plus étendue de ce mot, toutes les eaux qui contiennent des matières inorganiques en quantité suffisante, pour exercer non-seulement une action sur l'économie animale, mais aussi pour avoir des propriétés particulières, qui les distinguent des eaux naturelles. Dans ce sens, l'eau de la mer, & même la plupart des eaux employées dans l'économie domestique, les eaux de neige & de pluie, quelques eaux de sources exceptées, seroient des eaux minérales. Voici, d'après M. Chevreul, l'énumération des différens corps qu'on a trouvés en dissolution dans celles de ces différentes eaux, que l'on ne regarde pas comme des eaux minérales :

Gaz simples. { Oxygène,
Azote.

Acides qui s'y trouvent, soit libres, soit à l'état de sel. { Acide carbonique;
Acide sulfureux;
Acide sulfurique;
Acide nitrique;
Acide hydrosulfurique;
Acide borique;
Silice.

Alcalis libres. Soude.

Barates {
— de soude.
Carbonates {
— de soude,
— de potasse;
— de chaux;
— de magnésie,
— d'alumine;
— de protoxyde de fer,
— de protoxyde de manganèse,
— d'ammoniaque.

Sulfates {
— de soude,
— de chaux;
— de magnésie,
— d'alumine,
— de fer,
— de cuivre,
— de manganèse.

Sels. {
Nitrates {
— de potasse,
— de chaux;
— de magnésie.
Hydrochlorates {
— de baryte;
— de chaux;
— de magnésie,
— d'alumine,
— de manganèse,
— d'ammoniaque.

Hydrosulfates {
— de soude,
— de chaux;

enfin, des matières organiques.

On désigne du reste plus particulièrement sous le nom d'eaux minérales ou d'eaux médicinales, & dans le sens que nous y attachons dans cet article, plusieurs sources dont les eaux possèdent des propriétés médicales, soit par leur chaleur très-élevée (thermales), soit par des gaz qu'elles renferment (eaux gazeuses), soit par des oxydes ou des sels qui s'y trouvent en dissolution (eaux salines), soit enfin par la réunion de ces divers éléments (eaux mixtes).

Ce qui concerne les différentes sources d'eaux minérales en particulier, a été ou sera indiqué, sous l'article qui lui est propre, dans ce Dictionnaire. Nous devons nous borner ici à quelques considérations générales qui ont été négligées dans la plupart des traités de matière médicale, ou même dans les dictionnaires de chimie, de médecine, d'histoire naturelle; considérations que l'on a plus particulièrement le droit d'exiger dans une encyclopédie, dont les auteurs, en donnant toute l'attention nécessaire à la partie technique de leur travail, ne doivent jamais oublier les points de vue philosophiques & littéraires, qui lui donnent un intérêt général & le rattachent à l'ensemble des connaissances humaines. Nous rapporterons ces considérations aux quatre articles suivants :

- 1°. Considérations historiques;
- 2°. Considérations géographiques & physiques;
- 3°. Analyse chimique & classification;
- 4°. Emploi thérapeutique.

Considérations historiques.

L'usage des eaux minérales remonte à une époque très-éloignée dans l'histoire de la médecine. Plusieurs sources d'eaux minérales sont même déjà indiquées dans les auteurs grecs les plus anciens. Les avantages qu'elles offroient aux malades, déterminèrent souvent à placer dans leur voisinage plusieurs temples d'Esculape; ainsi, près d'un temple que ce dieu avoit à Athènes, se trouvoit une source d'eau thermale suivant Xénophon, & l'on voyoit jaillir une source d'eau salée & chaude, qui baignoit les murailles d'un temple d'Épidaure.

Le génie poétique qui ne méconnoissoit pas l'utilité de ces grandes ressources, fournies si immédiatement à la médecine par la nature, plaça à la source de ces eaux des divinités particulières, dont l'idée sans doute ajoutoit à la réalité de leur effet, par l'empire de la superstition.

Du reste, les écrits des Grecs renferment quelques traces de connaissances relatives aux eaux minérales. Ainsi Hippocrate, dans son *Traité des airs, des eaux & des lieux*, fait mention de quelques eaux chaudes, & chargées de molécules d'argent, de cuivre, d'or, de soufre, &c.

Aristote semble avoir entrevu que certaines vapeurs pouvoient se trouver mêlées dans différentes

sources d'eaux minérales, ce qui leur donneroit des propriétés particulières.

Strabon a parlé d'une autre source dont les eaux auroient eu, suivant son récit, des vertus lithontriptiques.

Les Romains donnoient toutefois beaucoup plus d'attention que les Grecs, aux vertus attribuées aux eaux minérales; & pour peu, dit M. Bertrand, que l'on se figure l'état où les Romains trouvoient la Germanie, on ne peut s'empêcher d'admirer l'insatiable persévérance avec laquelle ils ont marché à la découverte de ces sources thermales, dans les forêts les plus sombres, dans les réduits les plus cachés de vos montagnes. Il n'en est peut-être pas une de quelque renom dont l'histoire ne remonte à ces maîtres du Monde, pas une où les traces de leur séjour ne soient marquées par des monuments de leur munificence.

Les auteurs qui ont plus particulièrement parlé de l'usage des eaux minérales chez les Romains, sont Pline, dans plusieurs endroits de son immense ouvrage, Vitruve, Sénèque le philosophe, & plus tard, l'excellent ami de l'empereur Julien, Oribase, ainsi qu'Aétius d'Amide, qui ont donné l'un & l'autre différents préceptes sur l'emploi des eaux minérales, dans le traitement de plusieurs maladies du foie & de l'estomac, des affections rhumatismales, & de ces maladies cutanées qui, d'abord concentrées chez les Barbares, s'étoient répandues de plus en plus chez les Romains, à mesure que leur civilisation & leur empire s'étoient affoiblis.

Dans les premiers siècles du christianisme & pendant le moyen âge, les eaux minérales furent négligées nécessairement, par des causes qui montrent dans toute sa force l'influence de l'état général de l'esprit humain & de la société, sur la marche des sciences médicales: rapport qu'il est si intéressant de démontrer dans l'histoire, & que Bordenave traité d'une manière à la fois si piquante & si philosophique. Empruntons ici quelques fragments de l'ouvrage de ce médecin philosophe, sur un sujet aussi digne de notre intérêt & de notre attention.

« Les Romains s'arrêtoient à toutes les sources chaudes. Pluie en est le témoin: il y en a où ces pères avoient placé des divinités particulières; il reste des traces de leur *ex voto*. Les nymphes, les naïades & les dieux guerriers étoient très-bien logés dans ces lieux alors solitaires, & où s'opéroient des cures miraculeuses, à l'ombre d'antiques forêts, dans le creux des rochers, d'où les échos portoient au loin les merveilles.

« Les chrétiens, fixant ces objets du côté de la mondanité, & songeant qu'ils appartenaient aux rêveries du paganisme, les trouvoient déplacés. Ils n'aimeient point à se baigner pêle-mêle, suivant la liberté romaine: leurs femmes suivoient cette solatelle impie & mal morigénée. Ils se concentroient dans leurs monastères, & s'occupoient peu de la propreté & de la santé du corps; »

ils ne pensoient qu'à celle de l'ame. Ils trouvoient trop de donnelleterie dans les enfans du siècle; qui mettoient tant de prix à leur santé. Les vénéraliens alloient ensevelir leurs infirmités dans des maisons religieuses, devenues l'objet principal des féculations dans ces siècles. On cachoit ses maux au lieu d'en faire parade; on se mortifioit en gardant les douleurs; leurs souffrances mêmes leur étoient chères.

« A qui se seroit-on confié dans ces temps d'innocence & de simplicité ? Les Juifs que l'on harceloit, s'étoient emparés de la médecine, & ils la réduisoient à l'usage des médicamens qu'ils vendoient & mangonoient. Les Arabes, autres ennemis des chrétiens, étoient en possession des grands principes de l'art de guérir. Les chrétiens suspectoient tout ce qui venoit de la part des infidèles. Les moines attiroient le monde dans leur retraite, où ils avoient placé des hospices & des hôpitaux à côté des églises, & des viges qu'ils cultivaient. Le vin, & long-temps après, l'eau-de-vie, devinrent la pause générale des couvens, & de tout le peuple humble, dévot & fers.

« La lèpre fixa l'attention de l'Europe, & on la traita en séquestre de la société ceux qui en étoient affectés, & par des remèdes propres aux pays où les croisés avoient été la chercher. Les baumes de la Mecque & celui de Judée, les bézoards & autres médicamens orientaux faisoient oublier ceux qui croissent en Europe. Les commerçans véritables favorisoient ces idées & plaçoient partout leur thérapie.

« Les grands chemins étoient peuplés de coureurs & de mauvais garnemens. Le commun des hommes se cantonnait dans ses maisons : on se rapprochoit des églises & des châteaux pour être en sûreté; on vivait dans des réduits suffisants pourvu qu'ils missent à l'abri des volours & des frimats; on aimait à vivre, à mourir, à se faire inhumer dans la paroisse, dans son église, à côté des siens, & le plus près possible des fondateurs de ces lieux qui rappeloient les catacombes des premiers siècles. Toutes les sensations étoient pour ainsi dire concentrées & resserrées par la piété naissante, par l'amour de ses foyers. On ne pensoit qu'à vivre ou à passer, pour mourir bientôt. Qu'auroit pu, dans de pareilles dispositions, la médecine qui aime & conseille les distractions, la propreté, l'éloignement des lieux infects, la gaieté, les voyages, le changement d'air & de nourriture ?

« Aix-la-Chapelle, lieu chéri des Romains à cause de ses sources chaudes & abondantes, devenu le centre de l'empire d'Occident, avoit pu fixer particulièrement l'attention des médecins qui donnoient leurs leçons dans les palais des rois, dans les églises & dans les maisons religieuses; ils

auront pu user de ces eaux comme les Romains en usent; mais l'horreur & la crainte du paganisme continuoient à captiver les suffrages. Le médecin, toute théologique, toute ecclésiastique, s'occupoit principalement à rappeler les peuples aux mœurs, aux dogmes & aux pratiques approuvées par les canons. L'amour & le goût de la retraite d'avoient encore chez le commun des catholiques. Quelques courtisans ne faisoient point la loi aux peuples; au contraire, ils les fortifioient dans leurs opinions.

« La pratique des bains étoit trop mondaine, surtout pour les femmes, qui entraînent toujours dans leurs goûts, le gros de la nation française, & qui ont influé sur la médecine en France comme partout.

« Aix en Savoie, autre source connue des Romains, devenoit déserte. Aix en Provence, Bonne-les-Bains, & autres lieux de cette espèce, ne fournissoient plus de ressources aux malades, ni d'objet de distraction aux valétudinaires. Plombières étoit à peine connu à la cour de Lothaire. Le midi de la France étoit sous le joug des Arabes & des Goths, plus occupés de leurs conquêtes & de leurs hérésies, que du profit qu'il y avoit à tirer du grand nombre de sources de l'Aquitaine, si connues sous l'Empire romain, si agréables, & où les païens venoient de loin chercher leur santé & se délasser des fatigues de la guerre.

« La manière de penser des Eodes & autres princes de l'Aquitaine, plus favorables aux Arabes & aux Goths qu'aux catholiques, formait une barrière impénétrable aux Français, aux Espagnols, aux Normands. Les grandes guerres de la succession de Charlemagne bouleversoient l'Empire. Comment auroit-on pénétré jusqu'aux eaux des Pyrénées ? Ces montagnes étoient habitées par les descendants de ces Cantabres qui résistèrent au joug romain : peuples sobres & libres, circonscrits dans leurs vallées : peuples un peu sauvages, qui aisoient de laisser dépérir dans leur voisinage les travaux faits par les Romains à quelques sources minérales; qui regardoient les grands chemins comme des lignes de servitude, comme des préparatifs pour des conquêtes & des prétextes pour la tyrannie.

« La magie, les songes, l'astrologie judiciaire (ensuite les fées), les sorcières, les sorts, les enchantemens, occupoient les esprits frappés de quelques traits de lumière encore mal aperçue. La fuscellerie & la fêrie avoient succédé aux idées poétiques des nymphes, des naïades, des fées & des chèvre-pieds. De languissantes rêveries, effats d'un crépuscule de raison qui commençoit à prendre le dessus, entretenaient un foud de mélancolie & de timidité qui faisoient voir des loopgaroux & des salbats, partout où les ennemis de la religion avoient porté leurs pas, & dans tous les lieux sombres & retirés. Les drozes espagnols tenoient leurs assemblées dans les Pyrénées, qu'Hern-

eule avoit parcourues, que les dieux païens avoient brûlées. On tremblait au seul récit de ces rêveries. Cette espèce de maladie, cette sorte d'épidémie, qui étoit, comme les autres, du ressort des médecins, étoit aussi trop enracinée pour être combattue par une méthode bien fixe & bien raisonnée.

« Ce que nous venons d'exposer fust, quant à présent, pour notre histoire des eaux minérales, d'autant mieux que c'est à peu près vers le dix-septième siècle que nos rois donnèrent l'intendance générale & la sur-inspection de ces eaux à leurs premiers médecins : on commença ensuï à sentir l'importance de ce secours.

« Il est aisé de juger pourquoi on y a pensé si tard. La foi naissante de nos peuples les dégoûtait de tout ce qui se ressenoit du luxe des Gentils, grands partisans des bains & des eaux minérales. Les Juifs ne pensoient qu'au commerce des drogues. Les moines attiroient les malades à leurs hospices, aux hôpitaux qu'ils fondeoient, & qu'ils desservioient comme médecins & comme prêtres. Les cours se tournoient du côté de la retraite : on s'assembloit sans cesse auprès des églises, d'où procédoient toutes sortes de consolations. Les pèlerinages faisoient un exercice commun, utile & décent pour les valetudinaires. Les médecins ecclésiastiques s'occupoient autant des moyens moraux que physiques, pour polier les peuples & adoucir les mœurs. Ils copioient les manuscrits des Grecs & des Arabes, & conseilloyent seulement les remèdes qui s'y trouvoient ; ils s'occupèrent ensuite de traductions, & créèrent en France une médecine grecque & arabe. Les bains publics étoient regardés comme des pratiques peu honnêtes aux chrétiens, qui se fournissant peu à peu de linge, avoient moins besoin de s'occuper de lotions à la manière des païens & des Mahométans. Ils préféroient des bains d'eau douce à ceux des eaux minérales, qu'il étoit dangereux d'aller chercher, au loin, à cause des mauvais chemins. Ce n'étoit pourtant pas sans quelque sorte de scandale qu'on voyoit Louis XI se baigner avec toute sa cour, au milieu de la Suïne & en plein jour, en sortant des spectacles pieux que donnoient alors les confrères de la passion.

« Les chimistes méprisoient les eaux naturelles, & ne vouloyent user que d'eaux artificielles, d'essirs & de quintessences. Le sel de Glauber, que la nature fournissoit dans les eaux minérales, ne fut d'abord connu que comme une opération de l'art. La pharmacie galbrique & la chimique se partageoient toutes les suflrages ; les remèdes préparés par la nature étoient oubliés. L'Amérique cependant en avoit singulièrement imposé par ses drogues nouvelles, parce qu'elles venoient de loin. Les médecins ne pensoient qu'à disséquer, à égorger des animaux, à faire des expériences ;

les guerres civiles empêchoient la liberté du commerce ; la médecine ne s'occupoit que de se parer à la française, & tout le monde prétendoit l'entendre.

« Les lieux des eaux étoient le rendez-vous des joueurs, des farceurs, des baladins & des garnemens des provinces. On connoit des eaux dans les Pyrénées qui se nomment encore *engrossesuses* (*empeignaderes*) ; il y en a où les souverains & leurs courtisans alloient se faire baigner & faire des parties de plaisir. Marguerite de Valois le reprochoit à Henri IV son époux. Tout cela faisoit fuir les gens graves, timides, & dévots & modestes. Les fées s'étoient emparées de quelques sources : il y en a aussi dans les Pyrénées que l'on nomme encore *fontaines des fées* (*hon de las hades*). Les sorcières, broxes & lumps-garoux y faisoient, comme nous l'avons remarqué, leurs sabbats. Il n'y a pas un siècle que l'on voyoit encore dans ces lieux escarpés & éloignés de toute habitation, où la nature fit jaillir les eaux minérales, des boucs & des chèvres-pieds de mauvais présages pour les devins & les astrologues. C'étoit à peu près le temps où la *Galulai* révéloit au parlement de Paris le vrai secret de la forceillerie & de la magie.

« Toutes ces causes concouroient à détourner l'attention des médecins de l'emploi des eaux, & donnoient aux peuples une impulsion contraire aux voyages & aux essais de ces eaux. Tout a changé de face dans notre siècle, & plaise au ciel que des excès contraires à ceux de nos pères ne nous rendent pas moins heureux qu'ils ne l'étoient. Quelques-uns de leurs timides préjugés les font regarder souvent avec dédain & pitié : notre peu de retenue pourroit, si on ne s'arrête à propos, nous rendre plus méprisables aux yeux du la postérité. Notre liberté, notre fureur d'aller, notre *cosmopolitisme* en tout genre, peuvent devenir excessifs & entraîner bien des inconvéniens. » (Boussu, *Traité des maladies chroniques*.)

Si l'on veut suivre l'histoire des eaux minérales d'une manière plus spéciale & plus scientifique, on n'y trouvera rien de positif & qui appartienne à la géologie ou à la chimie avant le dix-septième siècle. A la fin du seizième parut le premier ouvrage *ex professo* sur les eaux, par Baccius, qui, du reste, ne parla pas de leur analyse, ainsi que Jean Théodore, dans une énumération des eaux minérales d'Allemagne.

Avant ces deux auteurs, & à la fin du quinzième siècle, Savonarola avoit publié un *Traité des eaux*, dont la seconde partie étoit consacrée aux eaux thermales. La surintendance des eaux minérales en France, sous Henri IV, attira l'attention des premiers médecins de ce côté. Fagon entr'autres, médecin de Louis XIV, s'occupa des eaux de Bonnes & de Barèges, relativement à la fistule de Sa Majesté, dont Mory le guérit bien plus sûrement par une opération. Chirac, d'une autre part, s'occupa beaucoup des eaux de Balaruc, &

l'occasion d'une blessure du Régent, dont il étoit le médecin. Par l'influence de ces archiatres, & par plusieurs autres causes, le crédit des eaux minérales augmenta beaucoup vers le commencement du dix-huitième siècle, époque à laquelle différents médecins parlèrent avec enthousiasme des eaux minérales de leur patrie.

Boyle eu 1663, Duclou en 1670, commencèrent à s'occuper de leur analyse. (Voyez le mot EAUX MINÉRALES dans la *Dictionnaire de Chimie*.)

Un peu plus tard, Geoffroy, Boulduc, Leroy de Montpellier, Margraff, travaillèrent à une analyse partielle de quelques sources, analyse qui se termina par la découverte de la dernière portion du dix-huitième siècle sur le même objet. L'idée d'une imitation des eaux minérales s'étoit présentée à l'esprit de Bacon, comme un de ces aperçus que les hommes de génie faussent sans avoir le temps de les confirmer. Cette même idée fut reprise & suivie par Venel, de 1750 à 1760, & devint alors le sujet de plusieurs recherches qui ont fait époque dans les sciences naturelles. Le même chimiste fut chargé dans la suite avec Bayen, & par ordre du Roi, d'examiner sur les lieux toutes les eaux minérales de France. L'attention que la Société royale de médecine accorda, un peu plus tard, aux différents travaux sur les eaux minérales, doit être regardée comme une nouvelle époque dans l'histoire de cette partie de la thérapeutique.

La nature des eaux minérales fut exactement connue à peu près dans le même temps par Black, dans ses travaux sur l'air fixe (gaz acide carbonique), & par l'ensemble des recherches des autres savans qui ont appris à dissoudre cet acide dans l'eau, & à l'en retirer par divers procédés.

Bayen, Monnet, Bergman, Rouelle, Fourcroy, n'ont pas moins fait pour les eaux hépatiques ou sulfureuses.

L'état présent des connaissances chimiques promet sans doute plusieurs découvertes sur la composition & la décomposition des eaux, espérances dont quelques-unes sont déjà réalisées (1) par différents progrès de détail, qui ne peuvent manquer de s'étendre & de s'accroître, si l'administration accorde aux divers établissemens d'eaux minérales, toute l'attention qu'ils méritent de la part d'un gouvernement éclairé.

La connaissance des parties constituantes des eaux minérales ne pouvoit pas être stérile entre les mains des chimistes & des médecins qui ont

attaché le plus de prix à cette partie des sciences naturelles. Elle éclaira beaucoup sur leur usage & sur leurs effets, dans le traitement de plusieurs maladies, pour lesquelles on consulta différentes eaux particulières, d'une manière moins vague & moins empirique. Cette même connoissance donna l'idée de composer de toute pièce, & dans le laboratoire des chimistes, plusieurs eaux minérales; idée que l'on a voulu faire remonter jusqu'au chancelier Bacon, qui paroît avoir en effet indiqué, sous forme d'aperçu, cette imitation.

Vers le milieu du dix-huitième siècle, Venel (en 1755) réalisa cette espérance du philosophe anglais, pour les eaux gazeuses de Seitz. Un peu plus tard, Bergman, dans ses dissertations, s'écotoit avec détail sur la préparation des eaux froides artificielles. En 1779, un ouvrage particulier, celui de Duchanoy, eut pour objet l'imitation de la plupart des eaux minérales; cette imitation fut ensuite reprise plus tard par MM. Paul, Nicolas & Tryaïre, qui fonderent le grand établissement des eaux minérales salines, si connu aujourd'hui sous le nom de bains & d'eaux minérales de Tivoli.

Considérations géographiques & physiques des eaux minérales.

Différentes eaux minérales, très-renommées & très-actives, thermales ou non thermales, se trouvent répandues avec plus ou moins d'abondance, dans presque tous les lieux de la terre, mais principalement dans le voisinage des volcans, ou sur les territoires volcaniques, près des montagnes, ou dans leurs vallées, &c. &c. Ainsi on trouve à Astracan & sur les bords du Tigre, des eaux qui contiennent des matières bitumineuses. L'Italie vante avec raison ses eaux de Gurgitelli, de Giara, de Capoue, de Piscinelli; l'Angleterre, celles de Bath, de Bristol, de Townbridge; les Pays-Bas & l'Allemagne, celles de Pyrmont, de Carlsbad, de Saint-Charles, de Toplitz; la Suisse, celles de Loucheville, de Bades; enfin la France possède les sources si justement célèbres de Barèges & celles du département de l'Allier, & du Mont-d'Or, qui ne sont guère moins recommandables.

Il seroit difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre dans un seul *Trist* l'histoire de ces différentes sources, & les médecins de chaque pays doivent nécessairement se borner à donner toute leur attention aux différentes eaux minérales que renferme le territoire de leur patrie. D'après cette remarque, nous nous sommes occupés & nous continuerons de nous occuper plus particulièrement des eaux minérales de la France. Leurs sources sont inégalement distribuées dans nos différents départemens; on diroit même qu'elles sont presque exclusivement renfermées dans nos provinces méridionales les plus voisines de l'Espagne, & dans nos départemens de l'Allier, des

(1) Voyez principalement le Catalogue des principaux écrits sur les eaux minérales, par Carrère; — l'analyse des eaux d'Englien, par Fourcroy; — les recherches de Bayen, publiées en 1766 et 1770, pour les eaux de Baginès de Luchon; — celles de Bergman & de Rouelle sur le gaz hépatique, qui a été appelé depuis le gaz hydro-sulfureux. — Enfin les Annales de chimie, le Journal de pharmacie & la Médecine, par M. Bouillon-Lagrange, publiées en 1811; travaux dans lesquels on s'est exclusivement attaché à l'analyse des différentes eaux minérales.

Vosges & du Puy-de-Dôme. M. Gaultier de Claubry, qui a dressé une très-bonne carte, dans laquelle on est frappé de ces dispositions, va nous fournir une énumération géographique, dans laquelle nous nous bornerons toutefois à l'indication des sources les plus connues & les plus efficaces. Nous rapporterons cette nomenclature à trois titres principaux; savoir : 1°. les sources de nos provinces méridionales; 2°. les sources des provinces moyennes; 3°. enfin, les eaux des provinces septentrionales, dans la direction de l'ouest à l'est, depuis la source à peine connue de Lation, dans le Finistère, aux sources les plus célèbres du Bas-Rhin & de la Moselle.

Art. I^{er}. EAUX MINÉRALES DU MIDI. Ces eaux se trouvent dans la direction de l'ouest à l'est, dans les départements des Pyrénées, dans les départements des Hautes & des Basses-Pyrénées, Hautes-Garonnes, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var & Basses-Alpes. Nous nous bornerons à citer les sources de Bonnes, de Bagnères de Bigorre, de Saint-Sauveur, de Barèges, de Cantarel, de Bagnères de Luchon, d'Audoubert, de la Preste, de Balaruc, d'Arles, de Nîmes, d'Aix en Provence, & enfin la source de Grolaux, qui n'est point assez connue, & qui devrait attirer une grande affluence de malades, si elle avoit eu pour l'infiltrer ou pour en diriger l'emploi, des médecins aussi distingués que ceux qui ont été ou qui sont attachés aux établissements de Barèges, de Vichy, du Mont-d'Or, &c.

Art. II. Dans les provinces moyennes de la France, dans la direction de l'ouest à l'est, on ne trouve que quelques sources d'eaux minérales ferrugineuses assez peu connues, excepté dans les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de Saône & Loire, de la Nièvre, de la Haute-Marne & des Vosges.

Ces divers départements contiennent plusieurs sources très-renommées & très-fréquentées, principalement celles de Bourbon-l'Archambault, de Néris, de Vichy, dans le département de l'Allier; du Mont-d'Or, de Bar, de Chateldon, dans le département du Puy-de-Dôme; de Pougues, dans le département de la Nièvre; de Bourbon-Lancy, dans le département de Saône & Loire; de Bourbon-lès-Bains, dans la Haute-Marne, & enfin de Luxeuil, de Bussang, de Plombières, de Contrexville, dans le département des Vosges.

Art. III. Dans les provinces du Nord, nous citerons seulement les eaux de Provins; dans le département de Seine & Marne; celles de Passy ou d'Engluien près Paris & celles de Vorges dans le département de la Seine-Inférieure, & de Saint-Amand dans le département du Nord; de Pont-à-Mousson, dans le département de la Meurthe; enfin de Seltz, dans le département du Bas-Rhin.

La minéralisation des eaux qui les rend salines, & l'échauffement qui les rend thermales, sont des phénomènes de géologie encore très-gen-

connus, & qui attireront sans doute, par la suite, l'attention des savans les plus capables de répandre quelque lumière sur cette partie importante de l'histoire naturelle. En général, aussi long-temps que les eaux souterraines n'ont été en contact qu'avec des roches siliceuses qu'elles sont incapables d'attaquer, elles se rapprochent beaucoup, par leur pureté, des eaux pluviales; elles ont une limpidité & quelquefois une fraîcheur qui les rend très-agréables à boire; mais ces eaux sont placées dans des circonstances qui leur permettent de se charger plus ou moins de gaz, de sels, de substances organiques mêmes, & d'acquiescer par-là une faveur ou d'autres propriétés que ne possèdent pas les eaux naturelles qui s'approprient de l'état de pureté, on les nomme *eaux minérales*.

Pluies eaux souterraines privées du contact de l'oxygène & circulant dans des canaux, ou contenues dans des cavités qu'elles remplissent en totalité, peuvent éprouver deux sortes de changemens quand elles sont parvenues à la surface de la terre. Le premier de ces changemens est relatif à la proportion du gaz qu'elles tiennent en dissolution. Comme la quantité de gaz qu'une eau peut absorber, éliminée ou poids, est d'autant plus considérable que ce gaz est plus comprimé, il doit nécessairement arriver que, quand une eau souterraine aura dissous un poids de gaz plus grand que celui qu'elle pourroit dissoudre sous la simple pression de l'atmosphère, cette eau, parvenue à la surface de la terre, en perdra une portion, qui s'en dégagera avec bouillonnement. Le second changement se rapporte à certains corps, qui sont altérables par le contact du gaz oxygène ainsi les hydrosulfates contenus dans plusieurs eaux, se décomposent à l'air : le carbonate de protoxyde de fer s'y décompose également; la balle, en se suroxydant, se dépose à l'état d'hydrate, & l'acide carbonique mis à nu se dégage, au moins en partie, dans l'atmosphère.

Les eaux de la mer doivent être considérées comme des eaux minérales; car, entre qu'elles contiennent plusieurs espèces de sels en dissolution, & en assez grande quantité, on rencontre dans le sein de la terre, des eaux qui ont les plus grandes analogies avec elles; & nous devons faire observer que les eaux de la mer & certaines eaux qui se trouvent dans le sein de la terre, sont les moins pures que l'on connoisse.

Les eaux des fleuves, sans être entièrement pures, ne contiennent jamais une assez grande quantité de gaz ou de matières inorganiques en dissolution, pour être regardées comme minérales ou comme médicinales. En effet, d'une part, une partie des matières qu'elles contiennent est continuellement rejetée sur leurs rives, & d'une autre part, la simple pression de l'atmosphère n'est pas suffisante pour y tenir en dissolution une simple quantité de gaz; & d'ailleurs l'action de la lumière

teud sans cesse à faire reprendre au gaz dissous l'état aërien.

Les eaux placées à de très-grandes profondeurs, & traversant des terrains de nature différente, se trouvent dans toutes les circonstances les plus propres à les faire se charger de divers gaz, & d'un grand nombre de substances inorganiques, salines, métalliques; ce qui arrive eu effet dans les sources dont on a le mieux étudié les principaux phénomènes. Quelques sources contiennent aussi même des substances volcaniques, du pétrole & des matières bitumineuses, comme on le voit pour les eaux de Mouté-Zebio, observées par Spallanzani dans le Modénois, celles d'Altracau & celles du Tigre, qui renferment une si grande quantité de ces matières, qu'il fust d'approcher une torche de ces eaux pour les enflammer dans une grande étendue de leur surface.

Il ne peut pas entrer dans nos intentions, sans doute, de donner une théorie sur la formation des eaux minérales, & sur les phénomènes qui accompagnent cette formation. Mais nous aurions pensé laisser une véritable lacune dans ces considérations générales, si nous avions négligé entièrement d'y faire entrer quelques aperçus élémentaires d'hydrologie; les eaux thermales auroient du reste un droit particulier à notre attention, & nous nous en occupons avec quelques détails, si l'état de la science nous fournissait à ce sujet un nombre suffisant de connaissances positives.

Ces eaux thermales sont répandues dans un grand nombre de contrées différentes. Un de leurs principaux phénomènes, c'est la constance de leur température, qui paroit ne point avoir changé depuis plusieurs siècles: ce qui ne peut supposer rien d'éventuel ou d'accidentel dans la cause d'un semblable phénomène. Quelques sources paroissent bouillir, apparence qui s'explique par le dégagement du gaz qu'elles contiennent, la plus chaude de ces eaux n'ayant pas plus de soixante-dix degrés au thermomètre de Réaumur (celle d'Olette, dans le département des Pyrénées-Occidentales).

Du reste ces eaux thermales, malgré leur excessive chaleur, ne bouillent pas plus vite que l'eau commune, si ce n'est la chaleur; elles se refroidissent très-lentement, tiennent davantage aux gaz qui s'y trouvent, & loin de brûler ou de brûler le tissu délicat des végétaux, elles augmentent ou rétablissent sa fraîcheur.

Ces faits sont si curieux qu'ils paroissent à peine admissibles, s'ils n'avoient pas été constatés par un grand nombre d'observations.

Ces particularités des eaux thermales ont attiré vivement l'attention de l'ingénieur auteur des Lettres sur l'histoire des eaux du Béarn.

Le thermomètre, dit Bordeu, s'agit sur l'eau thermale comme sur l'eau commune échauffée au même degré, mais l'eau commune fait plus d'effet sur nos sens & sur certains corps que nous y

plongeons; elle se refroidit plus vite, l'expérience le démontre, il n'y a rien à dire: quel champ pour un physicien éclairé! Comment trouver le motif de toutes ces difficultés? & comment rendre raison, d'où vient qu'une eau minérale chaude n'a pas plus de disposition pour bouillir, que l'eau commune froide? cela paroît incroyable: il faut pourtant autant de temps pour faire bouillir l'une que l'autre; ou a souvent fait l'expérience, & s'y a exposé à un feu égal la même quantité d'eau minérale refroidie, de la chaude, & de l'eau commune, elles ont bouilli en même temps, à peu de chose près. (Bordeu, Lettres sur les eaux minérales, pag. 27.)

Mais ce qui me paroît encore plus difficile à expliquer, ajoute le même auteur, c'est que les eaux minérales ne font pas sur les organes du goût & de tact, les mêmes effets que l'eau commune chaude au même degré d'un thermomètre connu: d'où vient cette différence? est-ce que les parties du feu contenues dans l'eau minérale sont trop subtiles? & ne devroient-elles pas par cela même être plus pénétrantes? Cependant il y a des matières très-lendres, comme l'oselle, qui résistent à l'action de ces particules, qui en sont brûlées à peine, & qui sont bientôt cuites dans l'eau commune chaude au même degré, avec ceci de singulier, que cette eau commune se refroidit beaucoup plus vite que l'eau minérale. Elle perd plus vite une chaleur plus active; elle a une chaleur plus âpre, qui s'évapore, qui se dissipe, & celle de l'eau minérale se concentre, & l'abandonne avec peine, comme si elle y avoit quelque lien qui l'y retint, & qui ne la laissât agir que pour le mourir pour ainsi dire, pour se faire connoître, sans faire des effets que l'on attend: quels paradoxes!

Ces effets, énoncés d'une manière générale par Bordeu, sont constatés chaque jour aux différentes eaux, & par une grande variété d'exemples. On boit les eaux de Bourbon-l'Archambault à quarante-huit, à cinquante degrés, sans se brûler.

Les bains des eaux thermales de Balaruc, du Mont-d'Or, d'Aix, sont toniques; plusieurs sources d'eaux minérales offrent quelquefois des circonstances qui ne font peut-être pas étrangères aux considérations géologiques, qui pourroient répandre quelque lumière sur la coloration de ces eaux.

Ainsi il n'est pas sans exemple, suivant l'observation de l'auteur que nous venons de citer, de voir, dans les Pyrénées, de petits feux follets qui voltigent vers les fontaines; des éclairs que l'on voit la nuit, & qui ne font rien autre chose que le bitume & le sulfure des eaux, qui prennent feu: phénomènes que le peuple attribue toujours à des enchantelements.

Dans le voisinage des mêmes eaux, on voit souvent, surtout pendant le mois d'août, des échaufures d'une grosseur énorme, qui se glissent jusque dans les appartemens les

» plus retirés ; on compte nulle histoire sur
 » ces animaux : le peuple les croit enchantées
 » par une ancienne magie. On parle de
 » plusieurs personnes du sexe qui en ont trouvé
 » dans leurs lits ; on le souvient aussi d'une
 » pauvre fille qui avoit le timbre un peu fêlé, &
 » qui s'imagina, en ayant senti un qui s'entortil-
 » loit à la jambe, qu'elle étoit tentée ; elle fai-
 » soit un vacarme étonnant, elle imploroit tout
 » secours ; on eut toutes les peines du monde à la
 » convaincre qu'elle n'étoit ni la seule ou la pre-
 » mière femme ; elle regardoit tous les assistants
 » comme des animaux à son service, & le serpent
 » comme un ennemi fort à craindre. On ne dit
 » pas si les eaux forcérent le dérangement de son
 » cerveau ; je ne l'ai qu'à croire. »

D'autres phénomènes plus liés sans doute à la
 théorie des eaux thermales, se manifestent dans
 quelques sources. Plusieurs bassins d'eau miné-
 rale bouillonnent, éprouvent une espèce d'in-
 tumescence avant ou pendant le plus violent
 orage ; ce qui a été observé par M. Bertrand,
 pour le grand bain au Mont-d'Or, dont l'eau
 devient alors plus chaude : on a cru aperce-
 voir aussi à différentes époques, un rapport
 entre le bouillonnement de plusieurs eaux ther-
 males & des tremblements de terre, ou des
 éruptions volcaniques à des distances très-grandes
 de ces eaux.

Quoi qu'il en soit, il est impossible d'admettre
 avec Bordes, pour expliquer ce qu'il y a de
 particulier dans la chaleur des eaux thermales,
 deux espèces de feu ou de calorique. Il est bien
 plus rationnel de supposer, dans un concours de
 moyens que la nature emploie en grand, & que
 l'art ne peut imiter, un mode particulier d'échau-
 fement de l'eau, tel que chacune des molécules
 intégrantes du liquide soit réunie au calorique,
 & avec un degré d'adhérence qui rend le refroidis-
 sement plus lent & plus difficile, ce qui n'ar-
 rive pas dans nos manières artificielles d'échauffer,
 qui se bornent à introduire du calorique dans
 l'eau, sans l'attacher fortement à ses molécules.

Quelle peut être d'ailleurs la source de ce calo-
 rique des eaux minérales, & les moyens qui font
 mis en usage pour l'enchaîner aussi puissamment
 à ses molécules ?

L'hypothèse d'un calorique central, modifiée
 ensuite dans la supposition d'un refroidissement
 progressif de la terre, a été proposée plusieurs
 fois pour servir à l'explication de ces phénomènes.
 Elle a eu plusieurs partisans depuis Empédocle, à
 qui on l'attribue, jusqu'à Buffon, qui s'attacha à la
 soutenir & à la développer dans sa théorie gé-
 nérale de la terre (1).

D'autres hypothèses ont été admises plus tard,
 mais sans répondre à l'ensemble des phénomènes
 qu'elles prétendent expliquer, sans en excepter la
 théorie des hydrologues, qui ont voulu appliquer
 à ce grand phénomène des eaux thermales, l'in-
 fluence du fluide électrique. Quoi qu'il en soit,
 on doit voir dans les eaux thermales & salines,
 comme dans les volcans & les tremblements de
 terre, l'effet très-évident d'un agent ou de plu-
 sieurs agents intérieurs, dont les travaux ultérieurs
 de la philosophie découvriront peut-être quelque
 jour & la nature & l'influence.

Ces agents ou cet agent, que le globe terrestre
 recèle dans son sein, ne doivent pas être proba-
 blement rapportés, pour ce qui concerne les eaux
 thermales, à un principe unique d'action. Les re-
 marques que M. Bertholet a faites à ce sujet, sur
 la cause qui allume & qui entretient le feu volca-
 nique, s'appliquent complètement à la question
 qui nous occupe en ce moment.

» Cette cause, dit ce célèbre chimiste, est très-
 vraisemblablement différente de celle qui pro-
 duit nos feux & nos combustions ordinaires ; elle
 est probablement un effet de l'action chimique que
 certains corps exercent les uns sur les autres,
 dans les entrailles de la terre. Le mélange d'acide
 sulfurique & d'eau, l'extinction de la chaux
 vive, &c., nous offrent des exemples d'une chaleur
 produite par une pareille action.

» Les chimistes hollandais, en combinant des
 métaux avec du soufre, ont obtenu, même sans
 le contact de l'air & de l'eau, la production d'une
 grande chaleur, sans le contact de l'air & de la
 lumière. » (Bertholet, *Statique chimique*, tome 1,
 pag. 225.)

Une pareille disposition peut contribuer sans
 doute, dans plusieurs circonstances, à la chaleur
 de quelques eaux minérales. Mais en voyant les
 eaux thermales sortir du sein de la terre, & depuis
 un temps immémorial, avec le même degré de
 chaleur, il est impossible de concevoir un sem-
 blable phénomène, sans admettre, pour l'expli-
 quer, une chaleur souterraine, dont les foyers se
 rattachent peut-être à la constitution primitive du
 globe, & à des forces de chaleur d'autant plus
 fortes, qu'elles seroient placées à de plus grandes
 profondeurs, ainsi que l'on est porté à le penser,
 d'après quelques observations qui ont été faites
 avec le plus grand soin, sur la température assez
 considérable de plusieurs mines.

Les volcans sous-marins, les volcans actuels, les
 volcans éteints, ne seroient peut-être pas d'ail-
 leurs sans quelque influence sur cette chaleur :
 influence qui paroîtra d'autant plus probable,
 que, dans quelques tremblements de terre, on a
 reconnu par leur extension, des communications
 souterraines à de très-grandes distances, de Lima,
 par exemple, à différentes contrées de l'Europe, de
 Constantinople à Saint-Petersbourg, de Lisbonne

(1) *Discours sur la théorie de la terre. — Époque de la nature.*

aux rives septentrionales de l'Afrique, &c. (1).

La chaleur souterraine, qui ne seroit plus alors forte pour opérer ou pour continuer les tremblements de terre & les éruptions volcaniques, solliroit peut-être pour l'échauffement des eaux thermales, qu'il est difficile de ne pas rapprocher de ces grandes catastrophes de la nature. Quoi qu'il en soit de l'importance ou de l'exactitude de ces aperçus, il restera toujours une grande difficulté dans la manière de concevoir l'échauffement des eaux thermales : échauffement tout-à-fait différent de ce qui se passe dans nos foyers, puisque les eaux thermales naturelles se refroidissent beaucoup plus lentement que les eaux dont nous élevons artificiellement la température, & qu'elles ne paroissent pas agir comme les premières, par le dégagement du calorique libre, mais par l'application de leurs molécules, pénétrées & comme saturées de ce fluide : phénomène qui dépend, dans la formation de ces eaux, de circonstances que la science ignore entièrement, quo notre industrie, par conséquent, ne reproduit pas à volonté, & qui ne permettroit jamais de regarder, du moins dans l'état présent des connoissances, les eaux salées & thermales artificielles, comme véritablement analogues aux différentes eaux naturelles, sous le nom desquelles on les a si improprement désignées.

Classification & analyse des eaux minérales.

Ces deux objets d'examen sont inséparables : l'analyse chimique des eaux minérales ayant fourni les bases de leur classification, & cette classification favorisant à son tour les procédés nécessaires que l'on voudra employer pour se livrer à de nouvelles analyses.

L'analyse chimique des eaux, dans les premiers temps, avoit été bien incomplète, bien insuffisante, même dans le sein de l'Académie des sciences, qui sentit de bonne heure toute l'importance qu'il falloit attacher à cette partie des sciences naturelles (1670 & 1671). Ce fut déjà un grand pas de fait, lorsque de la simple distillation, d'abord mise en usage pour les analyses, on passa à l'évaporation dans des capsules de verre évallées, idée dont on fut redevable à Geussroy (1707). Dans l'état présent des connoissances, ces procédés d'analyse, & l'ordre dans lequel on les emploie, leur méthode, ont été portés à un haut degré de perfection.

On commence d'abord par l'histoire naturelle, l'examen physique de l'eau ou des eaux que l'un veut analyser. Ainsi, on s'occupe successivement de leur chaleur, de leur transparence, de quel-

ques autres dispositions, de leur saveur, de leur poids, enfin de leur température. Voici, à ce sujet, le résultat des observations de M. Chevreul.

Couleur. « Les eaux font presque toujours incolores; car parmi les sibilances qui s'y trouvent, on ne connoît guère que les sulfates de fer & le sulfate de cuivre qui peuvent les colorer, les premiers en verdâtre ou en jaunâtre, seivant l'état d'oxydation du fer; le dernier en bleuâtre. Mais faisons observer que ces sels ne sont pas très-communs dans les eaux, & qu'ils peuvent y exister sans les colorer, lorsque l'un y est en foible quantité. Ajoutons que des sibilances organiques colorent quelquefois les eaux en jaunâtre ou en brun; souvent cette dernière couleur est le résultat de l'action de l'acide gallique sur des quays de fer; l'acide gallique provient d'écorces ou de feuilles tombées dans les eaux, & les oxydes de fer, du sol baigné par ces eaux. »

Transparence. « La plupart des eaux sont transparentes; lorsqu'elles ne le sont pas, c'est par une cause qui n'agit que momentanément; ainsi des matières argileuses ou calcaires, celerées à un sol meuble par des eaux en mouvement, en altèrent la limpidité; mais ces eaux, par le repos, reprennent leur transparence, parce que les parties sulfureuses se précipitent. Des eaux sulfureuses qui sortent très-limpides du sein de la terre, déposent du soufre par le contact de l'air, & deviennent laiteuses. Des eaux de sources contenant des sous-carbonates de fer & de chaux, se troublent lorsqu'elles perdent l'acide qui tenoit ces sels en dissolution; enfin, des matières organiques rendent ces eaux plus ou moins opaques en s'y décomposant; les eaux troublées par cette cause, sont celles qui mettent le plus de temps à s'éclaircir. »

Odeur. « L'eau pure est inodore; celle qui est surchargée d'acide carbonique est piquante à l'odorat; celle qui contient de l'acide hydrosulfurique, a l'odeur des œufs pourris. L'eau qui contient des matières organiques devient plus ou moins fétide lorsque ces matières se décomposent. Enfin, il existe des eaux dont l'odeur participe de celles du soufre & du fer métallique humide, dans lesquelles la chimie n'a pu encore saisir le principe de cette propriété.

« Les eaux qui se rapprochent de l'eau pure, n'ont pas de faveur que l'on puisse définir, mais celles qui contiennent de l'acide hydrosulfurique ont un goût de soufre; celles qui contiennent de l'acide carbonique libre, ont une faveur acide. Les sibilances qui ont le plus d'influence pour donner de la faveur aux eaux, sont le sulfate de magnésium qui les rend amères, le chlorure de sodium qui les rend salées, les sels de fer qui leur donnent de la stypticité, le sulfate de cuivre qui leur imprime une faveur styptique astringente, le sulfate d'alumine qui leur en imprime une faveur sucrée & astringente. »

(1) Voyez Hottelard, Mémoires sur les tremblements de terre, & la Copulation volcanique, tome V, parus tranquillement.

Poids spécifique des eaux. « Pour le déterminer, on prend un flacon bouché à l'éméri, dont le col est droit, & dont la capacité est de 25 à 30 centimètres cubiques; on le remplit de l'eau que l'on veut examiner; on le bouché, en ayant soin de ne pas laisser d'air entre le bouchon & le liquide; on le met en équilibre dans une balance; on le vide; on le sèche intérieurement; on le remet dans la balance, & l'on ajoute des poids jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli: on a ainsi le poids de l'eau. On remplit le même flacon d'eau distillée, ayant la même température que l'eau naturelle; on en prend le poids avec les mêmes précautions que celui de la première eau, puis on divise le premier poids par le deuxième. Le quotient exprime le poids spécifique de l'eau naturelle. »

Température. « On ne prend, en général, la température des eaux que quand celles-ci sortent de la terre. C'est surtout la température des eaux qui servent à la médecine, que l'on s'attache à bien connoître; on la détermine en y tenant un thermomètre plongé jusqu'au sommet de la colonne de mercure, pendant un temps suffisant pour que la colonne reste constante. On doit faire cette observation à l'ombre, & la répéter dans le même temps sur un thermomètre placé dans l'air & pareillement à l'ombre. Il est bon de faire les observations une demi-heure avant le lever du soleil, ou à deux heures de l'après-midi & au soleil couchant, & de les répéter dans les différentes saisons de l'année. »

« Enfin, il existe d'autres observations à faire pour que l'examen des eaux soit complet. Ces observations sont relatives à la situation géographique & géographique du lieu où les eaux se trouvent; à la nature des corps qui sont en contact avec elles; au mouvement de ces eaux ou à leur état de repos; à leur volume. Si elles sourdent de la terre, on doit décrire tous les phénomènes qu'elles présentent, tels que le dégagement d'un gaz, le dépôt d'une matière sulfureuse calcaire, siliceuse, ferrugineuse ou organique. On doit aussi faire mention des êtres organiques qui peuvent vivre dans les eaux. » (Chevreul, *Dictionnaire des sciences naturelles*.)

Quant à la méthode proprement dite d'analyse chimique, elle n'exige qu'un très-petit nombre d'essais, & consiste, suivant M. Thénard, à déterminer la proportion des différents gaz ou matières volatiles, qui peuvent être contenus dans l'eau minérale; à évaporer ensuite une assez grande quantité de cette eau, pour se procurer quinze ou vingt grammes de résidu; à traiter ce résidu par l'eau distillée, pour dissoudre tous les corps qui peuvent être très-solubles; à évaporer ensuite la nouvelle dissolution jusqu'à siccité, & à mettre en contact la matière restante, avec l'alcool, à une douce chaleur: par ce moyen on partage ce résidu en trois parties; & comme il est rare qu'il contienne plus de cinq à six substances, il en

MÉDECINE. Tome X.

résulte que chaque fraction en contient au plus deux ou trois qu'il est toujours facile de reconnaître, & que l'on peut isoler, ou du moins dont on peut apprécier le poids. On rend ainsi très-simple une analyse très-compiquée.

Les eaux minérales, d'après les analyses nombreuses & variées qui en ont été faites, en grande partie, suivant cette méthode, peuvent être rangées en quatre grandes classes, que l'on divifera ensuite, suivant qu'elles sont thermales ou froides, ou que certaines substances s'y trouvent dans une plus grande proportion. Ces classes sont: 1°. les eaux salines; 2°. les eaux acides; 3°. les eaux ferrugineuses; 4°. les eaux sulfureuses.

Les eaux salines se rangent naturellement sous deux titres principaux: 1°. les eaux salines thermales; 2°. les eaux salines froides.

A ce premier titre appartiennent plusieurs sources. Celles de Plombières (Vosges), dont la température est de 56 à 74°; les eaux de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), de 46 à 69°; l'eau de Chaudes-Aigues (Cantal), de 88°; les eaux d'Eucaille (Haute-Garonne), de 23° 75. (Voyez BOURBONNE, CHAUDES-AIGUES, EUCAILLE, dans ce Dictionnaire.)

Parmi les eaux salines froides, on a remarqué principalement les eaux de Joux (Jura), l'eau de Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées), l'eau de mer elle-même, qui doit être regardée comme une eau minérale, dont MM. Marcet & Moray ont fait récemment une très-bonne analyse. (Voy. MEA (Eau de la).)

II°. Classe. EAUX ACIDULES.

« Ces eaux n'ont point l'odeur de l'acide hydro-sulfurique; elles sont aigres au goût; elles dégagent beaucoup de bulles de gaz acide carbonique par l'agitation; elles rougissent la teinture de tournesol; elles ne contiennent pas de quantité notable d'oxyde de fer. C'est donc l'absence de l'acide hydro-sulfurique & de l'oxyde de fer, & la présence de l'acide carbonique libre, qui caractérisent ces eaux. Mais faisons observer que la distinction des eaux acidules d'avec les eaux sulfureuses, qui est très-bonne pour la médecine, n'est nullement rigoureuse pour le chimiste, puisqu'il existe dans la plupart des eaux sulfureuses de l'acide carbonique, & que l'acide hydro-sulfurique libre que ces eaux peuvent contenir, leur donne un goût acide & la propriété de rougir la teinture de tournesol. Les eaux acidules contiennent, en général, une assez grande quantité de sels. » (Chevreul.)

Ces eaux, comme les précédentes, se subdivisent en EAUX ACIDULES THERMALES & en EAUX ACIDULES FROIDES.

L'eau de Balnear (Hérault) est une eau acidule thermale, dont la température s'élève à 47° 5. (Voyez BALNEAR, & surtout l'excellente

S

analyse de cette eau, par MM. Brongniart & Fignier.)

Les eaux acidules froides, & le plus souvent acidules & salines, sont très-nombreuses. Les plus renommées sont celles de Pougeus (Nièvre), de Seltz (Bas-Rhin), de Seydchitz (Hongrie), de Sedlitz (Bohême), d'Allier (près de Cologne).

III^e. Classe. EAUX FERRUGINEUSES.

Ces eaux seront encore divisées en eaux thermales & en eaux froides. Parmi les eaux ferrugineuses thermales, se trouvent quelques-unes des sources de Vichi, principalement la source dite de la *grande grille*, à 46°; l'eau de la Campagne (Aude), 27°, 5; l'eau de Bourbon-l'Archambault (Allier), de 58 à 60°.

Les eaux ferrugineuses froides sont assez répandues, & l'on distingue, pour les placer au premier rang, les eaux de Spa, celles de Pymont, de Forges, de Buffang, qui, toutes ou presque toutes, contiennent une certaine quantité d'acide carbonique qui leur donne une saveur plus ou moins piquante.

Les eaux de Contrexeville, que l'on a rangées aussi parmi les eaux ferrugineuses, devroient plutôt être rapportées aux eaux salines.

Les eaux sulfureuses, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus employées que les précédentes, sont très-remarquables; elles ont l'odeur de l'acide hydro-sulfurique, la propriété de dorer d'abord, puis de brunir l'argent métallique qu'on expose à leur contact; elles précipitent l'acétate de plomb, ainsi que le nitrate d'argent, en brun plus ou moins foncé.

D'après les analyses des eaux sulfureuses que l'on a faites en différents temps & dans différents pays, on pourroit conclure qu'il faudroit distinguer trois genres de ces eaux, sans avoir égard à leur température, qui peut être froide ou plus élevée que celle de l'atmosphère; mais presque toutes les analyses d'eaux sulfureuses manquent de la précision qui seroit nécessaire pour les distribuer dans ces groupes, soit que leurs auteurs n'aient point eu de connaissances chimiques suffisantes, soit qu'ils aient travaillé à une époque où la science de l'anatomie n'étoit point assez avancée. Quoi qu'il en soit, nous allons exposer ce que l'on fait sur la composition des eaux sulfureuses les plus connues. Nous prendrons pour cette classe d'eaux & les suivantes, dans l'article EAUX MINÉRALES du *Dictionnaire des sciences naturelles*, les résultats des analyses dont nous n'avons pu nous procurer les originaux.

Les eaux sulfureuses sont presque toutes thermales; les plus renommées sont : 1^o. celles des Pyrénées; les eaux de Barèges, de Bonnes, de Saint-Sauveur, de Bagnères de Luchon; 2^o. les eaux & les boutes de Saint-Amand; 3^o. les eaux d'Aix-la-Chapelle, celles de Bade, de Wiesbaden;

4^o. celles d'Aix en Savoie. (Voyez ces différents noms.)

On ne cite parmi les eaux sulfureuses froides, que les eaux d'Egghien.

D'après l'analyse des eaux sulfureuses, qui est très-avancée, on peut, avec M. Chevreul, en reconnoître trois genres principaux.

I^{er}. Genre. EAUX MINÉRALES qui contiennent de l'acide hydro-sulfurique libre, sans hydro-sulfate ni sulfure.

Ces eaux, agitées avec du mercure, perdent la totalité de leur soufre, & celui-ci se combine au métal, tandis que l'hydrogène qui lui étoit uni est mis en liberté; elles perdent leur acide hydro-sulfurique par une courte ébullition. D'après l'analyse des eaux d'Aix-la-Chapelle, il paroîtroit que quand l'acide hydro-sulfurique est mêlé à une certaine quantité d'azote, les acides nitreux & sulfureux ne le décomposeroient pas, quoique cette décomposition ait lieu avec précipitation de soufre, lorsque l'on verse ces mêmes acides dans de l'eau distillée, qui contient de l'acide hydro-sulfurique pur. »

II^e. Genre. EAUX qui contiennent un hydro-sulfate.

Elles ne perdent pas, du moins en totalité, leurs propriétés sulfureuses par l'ébullition opérée sans le contact de l'oxygène : agitées avec le mercure, il n'y a que l'acide hydro-sulfurique libre, qu'elles peuvent contenir, qui sulfure le métal; d'un autre côté, en y versant de l'acide sulfurique étendu, de l'acide hydrochlorique, on n'en précipite pas de soufre au moment du mélange des liquides. Le seul phénomène qui arrive quelques minutes après, c'est la manifestation d'un léger trouble, semblable à celui que l'on observe lorsqu'on dissout de l'acide hydro-sulfurique dans l'eau distillée aérée. »

III^e. Genre. EAUX qui contiennent un sulfure hydrogéné.

Elles ne perdent point leurs propriétés sulfureuses quand on les fait bouillir en vases clos. L'acide hydrochlorique en dégage de l'acide hydro-sulfurique, mais en même temps il en précipite du soufre. Agitées avec du mercure, le sulfure hydrogéné est réduit en hydro-sulfate.

Ce genre n'est établi que sur des analyses qui manquent de précision; il est permis de penser, d'après ce qui est arrivé, que la plupart des eaux qu'ils renferment, rentreroient dans le genre précédent quand elles auroient été mieux examinées. »

En s'occupant de l'analyse des eaux, on cherche d'abord à connoître les substances qu'elles tiennent en dissolution; on s'occupe ensuite de dé-

couvrir la quantité de ces substances, ce qui exige de la part du chimiste plusieurs procédés délicats & compliqués, dont l'exposition appartient à diverses parties du *Dictionnaire encyclopédique*. (Voyez EAUX MINÉRALES, dans le *Dictionnaire de Chimie*.)

Nous nous bornerons ici à l'indication de quelques résultats trop importants pour être omis dans cet article, sans y laisser une lacune que l'on seroit en droit de nous reprocher.

On doit faire deux parts des matières trouvées dans les eaux minérales : 1°. les matières volatiles & les gaz ; 2°. les matières fixes.

Parmi les matières gazeuses & volatiles, se trouvent l'air atmosphérique lui-même, l'oxygène, l'azote, le gaz acide carbonique, l'hydrogène sulfuré, l'acide sulfureux, &c.

Les moyens de découvrir ces matières, sont d'un emploi assez facile. Du reste, on trouve rarement autant d'air atmosphérique dans les eaux minérales que dans les eaux qui ne le sont point. L'acide carbonique est, au contraire, très-répandu dans ces eaux ; le gaz hydrogène sulfuré domine également dans plusieurs, & l'acide sulfureux ne se rencontre guère que dans celles qui avoisinent les volcans.

Parmi les matières fixes qui se trouvent dans les eaux minérales, & qui contribuent plus ou moins à leurs propriétés médicinales, les unes sont insolubles dans l'eau & l'alcool très-concentré ; d'autres solubles seulement dans l'eau.

Parmi les premières, se trouvent principalement les carbonates de chaux, de fer, de magnésie, les sulfates de chaux, &c.

Dans la première section, c'est-à-dire, parmi les matières solubles dans l'eau & dans l'alcool, on rangera plusieurs muriates : ceux du chaux, de magnésie, d'ammoniaque, de soude & la soude elle-même.

Parmi les matières qui ne sont solubles que dans l'eau, & qui sont les plus nombreuses, on compte les sulfates de soude, de magnésie, d'ammoniaque, de fer, de cuivre, d'alumine, le nitrate de potasse & de soude, le sous-borate de soude & l'acide borique.

Il a existé une époque dans l'histoire des sciences chimiques, où les avantages de l'analyse des eaux minérales, relativement à la médecine, furent beaucoup exagérés.

Bergmann lui-même pensoit alors que l'analyse d'une de ces eaux ne devoit être réputée exacte, que lorsqu'en dissolvant les principes de cette eau, on pouvoit les employer avec quantité suffisante d'eau distillée, pour en former une eau minérale toute semblable.

Monnet porta plus loin ces idées, & voulut que l'on ne pût juger de l'efficacité des eaux minérales, que d'après les résultats de leur analyse.

Aucune de ces opinions ne prévaut. Les médecins les plus éclairés, & les chimistes eux-mêmes,

favoroient très-bien que des propriétés, une action très-efficace, dans certaines eaux, comme dans celles de Forges, de Villiers, de Bourbonne, ne peuvent être attribuées aux principes que l'analyse y a fait découvrir. Il y a toujours quelque chose de particulier qui échappe à ces savantes recherches, dont l'organisation, bien plus sensible, bien plus parfaite que les instruments les mieux faits d'un laboratoire, démontre la présence par les effets qu'elle en reçoit dans l'état de santé & dans l'état de maladie. Le temps, l'espace, ne sont pas combinés dans les appareils de l'art, comme dans les grands laboratoires de la nature. Le calorique s'arrose, se refuse, au milieu de tous les efforts du chimiste, aux dispositions & aux combinaisons qu'il subit pour produire la thermalité des eaux, ce qui suffiroit dans un petit nombre de cas pour faire voir jusqu'à quel point on peut raisonnablement désigner les eaux sulfées, sulfureuses ou salines, sous les noms d'eaux de Barèges, de Plombières, de Vichy, de Balaruc, &c. (Voyez MINÉRALES (EAUX MINÉRALES Sulfées).)

Effets médical & thérapeutique des eaux minérales.

Un des médecins le plus justement célèbre du dix-septième siècle, Stahl, regardoit les eaux minérales comme le dernier refuge de l'ignorance des médecins, & le dernier asile des malades.

Stahl étoit injuste ; on doit accorder à ce moyen souvent si puissant de la thérapeutique, une confiance éclairée, limitée même par le doute philosophique, & aussi éloignée d'une crédulité populaire, que d'un scepticisme scientifique.

Les effets thérapeutiques de quelques eaux doivent même leur être exclusivement attribués, sans faire presqu'aucune part à l'influence des déplacements, des voyages, d'un changement très-étendu dans le genre de vie & des habitudes. Dans le plus grand nombre des cas, ces diverses causes secondaires, la durée, l'époque de la maladie, la disposition à une guérison spontanée, & toutes les circonstances nécessaires qui peuvent modifier la partie essentielle de son traitement, se joignent à l'action d'une eau minérale & la compliquent.

« L'effet médical d'une eau minérale, même très-efficace, doit nécessairement & le plus souvent paroître bien incertain, bien obscur aux yeux des hommes éclairés, & qu'une grande expérience a rendus difficiles sur tout ce qui concerne la liaison des effets & des causes, dans la succession de plusieurs phénomènes.

« Il en est des eaux minérales comme des autres agents les plus puissants de la thérapeutique. Pour savoir si elles guérissent, & comment elles guérissent, il faudroit bien connoître d'abord, & en faisant abstraction de tout effet curatif, le genre d'action qu'elles développent dans l'économie animale. Il seroit également nécessaire d'indiquer

avec plus de précision, le genre ou l'espèce de maladie qui se guérit ou qui change de forme, à la suite d'un traitement, par les eaux minérales.

Une méthode aussi rigoureuse est indispensable dans l'examen de toute espèce de médicament érogique; néanmoins elle n'a pas encore été employée pour les eaux minérales, qui l'exigent peut-être plus encore qu'aucun autre moyen de la thérapeutique. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des médecins, étrangers à la pratique de ces eaux, & que l'on consulte sur leur emploi, reconnoissent combien il est difficile de répondre alors à la confiance, & aux demandes des malades. On voit également, par l'omission de la même méthode, comment on trouve, même aujourd'hui, dans plusieurs écrits d'ailleurs recommandables, ces phrases inexactes & banales. On a *administré les eaux de Barèges dans le traitement des maladies vénériennes, les affections catarrhales chroniques, les scrophules, les maladies lacteuses, les engorgemens du vagin & de l'utérus.*

M. Labat, inspecteur des eaux de Cauteretz, *souvoit leur efficacité dans les affections les plus graves de la poitrine, telle que l'hémoptysie, les toux anciennes & rebelles, la phthisie tuberculeuse.*

Quelle inexactitude & quel langage! & malheureusement la plupart des traités les plus estimés de matière médicale, & les monographies consacrées aux eaux minérales, sont écrits dans ce style, avec ce défaut de précision; en vain on y chercheroit quelques indications positives & suffisantes pour conseiller aux malades une des eaux minérales les plus connues, pour en rendre ou pour en étendre l'usage, en se décidant par un calcul de probabilité très-éloigné sans doute de la certitude, mais bien supérieur toutefois à une vaine & dangereuse conjecture.

Quoi qu'il en soit, aussi long-temps que l'on ne sera pas éclairé sur les eaux minérales par des observations rigoureuses, & dont tous les bons esprits sentent le besoin, on continuera de les conseiller au hasard, si on ne s'adresse pas directement aux médecins chargés de l'administration des sources minérales les plus efficaces, & qui méritent une grande confiance, quand, à l'exemple de ceux de Vichi & du Mont-d'Or, ils ne sont pas moins recommandables par leur désintéressement que par leurs lumières.

On étoit d'ailleurs d'une manière trop générale, & d'après une opinion qui doit être modifiée par l'état présent des connoissances médicales, que les eaux minérales sont indiquées dans le traitement de toutes maladies chroniques. Malheureusement un grand nombre de maladies est incurable, d'autres exigent un traitement particulier & spécifique, & d'autres se rattachent à des inflammations chroniques, insensibles & latentes.

Dans ce cas de phlegmasies chroniques de différents viscères, qu'il seroit aussi dangereux d'exagérer que de méconnoître, certaines eaux, celles de Vichi, de Plombières, par exemple, ne doivent pas être prescrites sans exception; elles pourroient même devenir d'une grande efficacité dans plusieurs de ces phlegmasies anciennes & en quelque sorte constitutionnelles, soit en opérant des dérivations salutaires, soit en favorisant la résolution d'engorgemens invétérés, & diverses résorptions devenues indispensables.

Du reste, les maladies chroniques indépendantes de toute lésion organique permanente, & que l'on traite avec un succès particulier dans plusieurs établissemens d'eaux minérales, sont assez nombreuses: telles sont toutes celles que l'on peut rationnellement rapporter à une altération profonde de la nutrition ou de quelques sécrétions, les tumeurs, les engorgemens morbides divers, que l'on a si souvent désignés sous le nom d'*obstructions*, toutes les formes & les variations sous lesquelles peuvent se masquer le rhumatisme, la goutte, les scrophules, l'irritation herpétique.

Beaucoup de médecins ajouteroient sans doute à cette énumération, le squirrhe, la phthisie tuberculeuse, la paralysie générale, l'hémiplégie, la paraplégie, les paralysies & les impotences partielles, qui sont l'effet inévitable de certaines apoplexies.

L'état présent des connoissances pathologiques ne peut admettre de semblables effets pour ces maladies. Les premières sont malheureusement incurables; les autres sont au-dessus de toutes les ressources de l'art, & quand l'altération morbide n'est pas très-étendue, se guérissent seulement avec le temps, & par l'admirable résorption de la sérosité & du sang épanché, qui est la cause matérielle & prochaine de ces états morbides.

On s'est aussi occupé, dans le siècle dernier, d'une question assez importante de thérapeutique: la question de savoir si la fièvre ne pourroit pas être utilement excitée pour favoriser la curation de plusieurs maladies chroniques. Si cette question pouvoit jamais se décider d'une manière positive, ce seroit sans doute par l'expérience des médecins attachés aux principaux établissemens d'eaux minérales, & d'après quelques-unes des vues de Bordeu, modifiées, retraits par l'état actuel des connoissances pathologiques.

Cet homme si justement célèbre, & qui avoit sans doute encore plus de génie que de savoir, trouva dans les traditions de sa famille, & dans son expérience autant que dans ses méditations, le germe des idées qu'il a énoncées dans les réflexions suivantes, qui s'appliquent si bien à la question qui nous occupe.

Les vrais enfans d'Hippocrate, contemplant avec curiosité de la nature comme lui, se plairont seuls.

» à mettre à côté de l'histoire des *Meton*, des *Pylion*,
 » des *Silène* & autres maladies des épidémies, celle
 » des maladies chroniques, rapprochées des ma-
 » ladies aiguës; ils sauront ce qu'ils ont à faire de
 » ces histoires; & à quoi elles sont utiles à méde-
 » cine, en quoi elles peuvent servir à un médecin
 » philosophe.

» Déjà quelques beaux génies ont ouvert la
 » carrière & laissé des équipes propres à servir
 » de modèles. Le cours entier de la vie a été re-
 » gardé comme une sorte de maladie qui a ses
 » diverses phases & périodes, ses mouvemens
 » variés, ses crises. Les âges, leurs révolutions,
 » ont été calculés sur le pied de mouvemens on
 » d'efforts critiques, accompagnés d'accidens plus
 » ou moins aigus, douloureux, *maladifs*. La pul-
 » monie a été partagée en trois temps ou degrés
 » notables; on a suivi la goutte, la néphrétique,
 » les hémorroïdes, dans leurs périodes; les
 » écrouelles ont été examinées suivant le même
 » plan, &c.

» D'après ces idées, on voudrait mettre en évi-
 » dence, dans le cours de ces recherches, la
 » marche ou les progrès des maladies chroniques;
 » essayer de distinguer dans cette marche, les
 » temps d'irritation, de coction & d'évacuation;
 » suivre les métastases ou les changemens des
 » maladies chroniques, non moins assujettis à une
 » règle fixe, que ceux des maladies aiguës. On
 » désireroit pouvoir surprendre la nature prépa-
 » rant une maladie chronique, la développant, &
 » faisant des efforts pour la terminer. On vou-
 » droit assigner les momens favorables pour agir,
 » & ceux où il faut se livrer à l'expectation; pron-
 » ver jusqu'à quel point il est vrai qu'une ma-
 » ladie chronique doit, pour se terminer, devenir
 » aiguë, & qu'ainsi que les plus aiguës, les chro-
 » niques ont leurs crises, leurs redoublemens, leurs
 » évacuations, leurs temps de calme, de repos,
 » d'intermittence, de rémission, leurs momens
 » de résistance aux remèdes, leurs temps de ma-
 » turation, de douceur, de facile *réductibilité*, leur
 » *curabilité* & leur *incurabilité*; leur sujétion à la
 » nature des tempéramens & aux grandes secousses
 » des âges, des saisons, des variations de l'atmos-
 » phère; leurs rythmes particuliers du pouls,
 » leurs urines, leurs évacuations, leur admi-
 » rable dépendance des passions. On insuffleroit
 » beaucoup par ces causes morales, plus efficaces
 » souvent que les physiques, plus difficiles à saisir,
 » plus importantes à observer que les révolutions
 » purement corporelles.

» Il n'est, dans le corps vivant, aucun effort
 » particulier qui ne soit dû à l'influence de toutes
 » les parties mobiles & sensibles; c'est ce qu'ap-
 » prend l'histoire des fonctions naturelles: en con-
 » séquence, l'ébranlement, la maturation, les
 » crises, les détentes nécessaires pour vaincre les
 » maladies, exigent plus ou moins une révolution
 » générale dans toute la machine, un accord bé-

» reux entre le physique & le moral, & si on peut
 » le dire, un *renforcement* & un *remontement* de
 » tous les ressorts, de tous les mouvemens. Les
 » effets des spécifiques les plus décidés sont sujets
 » à ces lois; ils ont lieu dans les maladies aiguës,
 » & plus encore dans les chroniques, qui ne sont,
 » à les bien prendre, que des maladies aiguës
 » prolongées, des aiguës qui vont se préparant,
 » & que le temps va faire éclore.

» Le traitement des eaux minérales employées
 » à leur source, dit Borden, est, sans contredit,
 » de tous les secours de la médecine, le mieux
 » en état d'opérer, pour le physique & le moral,
 » toutes les révolutions nécessaires & possibles
 » dans les maladies chroniques: tout y concourt;
 » le voyage, l'espoir de réussir, la diversité des
 » nourritures, l'air surtout qu'on respire, & qui
 » haïgne & pénètre les corps, l'étonnement où l'on
 » se trouve sur les lieux, le changement de sen-
 » sations habituelles, les connaissances nouvelles
 » qu'on fait, les petites passions qui naissent dans
 » ces occasions, l'honnête liberté dont on jouit;
 » tout cela change, bouleverse, détruit les habi-
 » tudes d'incommodes & de maladies anxieuses
 » tout surtout sujets les habitans des villes.

» On ne peut le nier, ils sont tous plus ou moins
 » affectés de quelque passion qui tient en éche-
 » les mouvemens de l'économie animale. Il seroit
 » permis de les comparer à des espèces de som-
 » nambules, dont les goûts pour les fonctions na-
 » turelles sont distraits & mal dirigés, qui ne
 » respirent, n'entendent, ne voient & ne digèrent
 » qu'à demi, qui sont perpétuellement pressés,
 » tirailés, irrités, & du côté de la tête, & du
 » côté du cœur & de celui de l'estomac; qui sont
 » sans force, sans sommeil, ennuyés, épuisés, en-
 » gorgés de suc étrangers à la santé, dans un
 » orage perpétuel sur le fait des sensations, agi-
 » tés par des projets forcés, ébranlés par des
 » pertes & des malheurs que leur excessive sen-
 » sibilité leur grossit. Ces détraquemens habituels
 » de la partie sensible énervent les fonctions,
 » entretiennent & aggravent les maladies longues &
 » lentes; elles les multiplient & les rendent rebelles
 » en étant le cours de l'espoir, la patience, cette
 » heureuse indifférence, cette précieuse insen-
 » sibilité qui font naître le bon sens, la paix de
 » l'âme & la bonne santé.

» Bordeu, qui connoissoit bien d'ailleurs l'action
 » énergique & indépendante des eaux minérales,
 » ne pouvoit manquer de faire aux circonstances ac-
 » cessoires qui forment cette action, une part trop
 » étendue, les observations ayant été recueillies en
 » grande partie sur des malades qui appartiennent
 » aux classes les plus élevées de la société.

» Du reste, si la médecine a jamais dû paroître
 » puissante, efficace & même impuissante dans ses
 » moyens de traitement; c'est dans l'administration
 » des eaux minérales. Ce ne sont plus des soins mi-

notieux, des arcanes, des potions, des sirops, en un mot, un appareil de formules, une réunion de secrets répétés dans les bernes de l'industrie pharmaceutique; c'est l'emploi en grand des ressources mêmes de la nature, que l'en applique aux malades par tous les points, par toutes les voies de leur organisation, sous forme de boissons, de bains, d'étuves, de douches ou même de fomentations actives & prolongées sur toute la surface du corps (dans les boues de Saint-Amand).

Le temps où une semblable médecine peut & doit être mise en usage, n'est pas sans doute indifférent, soit que l'on considère son activité, soit que l'on considère seulement la situation des eaux minérales, qui sont presque toutes placées dans un climat un peu froid & dans le voisinage des montagnes: ainsi on n'est plus arrêté, pour l'emploi de ces eaux, par des préjugés sur les influences malfaisantes & spécifiques de la canicule, mais on recommande de les ajourner, de les modérer ou de les suspendre si la chaleur est trop forte, & on regarde d'ailleurs comme le temps le plus favorable à leur administration, la fin du printemps, l'été & le commencement de l'automne, en partageant cet intervalle, pour le plus grand nombre des eaux, en deux saisons. Il ne sera pas inutile de remarquer, d'une autre part, que le plus grand nombre des maladies qui font recourir aux eaux minérales, se rattachent à des altérations méridiennes, constitutionnelles ou habituelles, qui éprouvent au commencement du printemps, & même dès la fin de février, une tendance à s'exaspérer ou à se montrer avec une apparence d'irritation & de turbulence, opposée à l'emploi d'une médecine aussi efficace que les eaux minérales.

On recommande plusieurs précautions hygiéniques aux personnes qui suivent le traitement des eaux. Je ne fais si cette sollicitude n'est pas un peu superflue, la plupart de ces personnes ayant un penchant à l'hypocondrie, qui les engage souvent à porter trop loin ces précautions, sans avoir remarqué, dans le cours de leur vie, qu'il est plus utile & plus sûr d'habituer insensiblement son organisme à se défendre lui-même par le bon usage de ses forces, que de réunir & multiplier autour de soi une foule de secours qui manquent rarement de se trouver en défaut, si l'insécurité & le luxe, poussés trop loin, ont laissé le principe de la vie sans énergie & sans réaction.

Toutefois nous sommes loin de ne pas attacher beaucoup d'importance, pour les personnes qui prennent les eaux, à une grande sobriété, à l'usage des vêtements de laine sur la peau, aux frictions sèches & avec une brosse, aux moyens propres à prévenir la conspilation. Nous attachons également beaucoup de prix pour les mêmes personnes, aux avantages que l'on peut retirer d'un exercice modéré, à pied ou à cheval, suivant l'état des forces & la nature des maladies; des occupations faciles & agréables, des distractions les plus pro-

pres à détourner des préoccupations mélancoliques, & aussi éloignées des ennuis d'une dangereuse oisiveté, que des plaisirs turbulents & des émotions tumultueuses, dont le goût & l'habitude suivent trop souvent les malades à plusieurs sources d'eaux minérales.

Quant à la manière de prendre les eaux & aux détails pratiques que comprend leur administration journalière, on trouve dans chaque lieu des usages que l'expérience & d'anciennes traditions ont établis. Nous dirons seulement ici, & d'une manière générale, qu'il faut avoir beaucoup de prudence dans cette administration, & préférer, parmi les manières de les boire, celles qui paraissent permettre aux eaux de passer plus facilement.

L'âge, le sexe, la complexion individuelle, la nature de la maladie, mais surtout l'état particulier des organes de la digestion, apportent de grandes différences dans la manière de prendre les eaux, & dans les doses qu'il est convenable de prendre.

Les verres sont ordinairement de cinq à six onces, & on les renouvelle de demi-heure ou même de quart d'heure en quart d'heure, à la source, autant qu'il est possible, & quelquefois dans le lit, pour trouver dans le repos & une chaleur égale, une confiance propre à la faire passer avec moins de peine.

Les exemples d'un empressement mal entendu & d'une forte d'intemperance dans l'usage des eaux ne sont que trop fréquents parmi les malades, qui croient guérir d'autant plus vite, qu'ils boivent davantage. Les médecins des établissements les plus fréquentés ont eu souvent à se plaindre de cette insubordination, & on ne pourroit, sans injustice, leur attribuer les fâcheux effets qui en ont été la suite, surtout dans les cas de phlegmasies chroniques ou d'engorgements coïncidant avec ces inflammations, qui exigent la plus grande circonspection & toute la délicatesse de l'exploration médicale, pour l'emploi d'un moyen aussi énergique: & ce qu'il y a de singulier, dit Borden à ce sujet, dans ses Lettres sur les eaux du Béarn, c'est que cette façon de penser s'étend chez le vulgaire le plus grossier: j'ai vu une femmelette qui, après avoir fait dix lieues à pied, par un temps très-chaud, alla tout de suite boire vingt ou vingt-cinq gobelets d'eau minérale très-chaude & très-purgative; elle eut une dysenterie des plus opiniâtres: une autre se mit dans l'esprit de plonger sa tête dans un bain très-chaud, & d'y rester jusqu'à ce qu'elle urachât le sang. Combien n'y a-t-il pas de personnes qui crèvent pour le trop gorgé d'eau, qu'ils paient, disent-ils, assez chèrement pour en boire une bonne dose!

Il me semble qu'il seroit à propos que les magistrats attentifs réformassent des abus pareils: & pourquoi permettre que qui que ce soit prenne

» des remèdes sans le conseil d'un médecin ? J'ai vu quelquefois avec compassion, les funestes effets qu'ont produits la crédulité ou la forte envie de guérir, chez des malades qui se feroient fort bien rétablis s'ils eussent été traités comme il faut. » (Bordeu, *Lettres sur les eaux minérales.*)

L'effet des eaux, quelle que soit la manière de les employer, seroit beaucoup plus utile si les médecins qui les conseillent, pouvoient avoir quelque jour des plus exactes sur cette branche si importante de la thérapeutique.

Ce n'est pas seulement le degré, la nature de la maladie, toutes les particularités constitutionnelles du malade, qu'il faut prendre en considération dans l'usage des eaux minérales : dans quelques cas, il faudroit en outre préparer, disposer l'organisation à leur effet curatif. Il en est du moins, je pense, d'un agent aussi puissant comme de certains médicaments très-énergiques : on ne peut, on ne doit pas, dans certaines circonstances, les employer *ex abrupto* & d'emblée, & sans avoir modifié profondément l'état des propriétés vitales : question très-délicate, qui n'a peut-être encore attiré l'attention des praticiens, que pour le traitement de certaines dégénérescences de la syphilis, & qui pourroit s'étendre à quelques-unes des altérations morbides qui font recourir aux eaux minérales.

Certaines eaux, peut-être, produisent un effet qui pourra disposer à l'action de quelques eaux plus fortes & plus efficaces. Dans d'autres circonstances, l'effet des eaux se trouve subordonné à une médication antérieure, à des traitements altérant, antiscorbutique, antihépatique, antistomacal, antisyphilitique. Questions d'une haute & difficile pratique, qui ne peuvent être décidées que par des hommes qui joignent beaucoup de savoir à une expérience consommée.

Dans tous les cas, on doit distinguer avec soin, dans l'action des eaux, l'effet immédiat ou direct, de l'effet ultérieur ou curatif. L'effet immédiat ou direct, auquel on n'a pas donné toute l'attention qu'il mérite, & qu'il faudroit considérer, ainsi que nous l'avons remarqué, indépendamment de ses conséquences curatives ; cet effet se manifeste par une modification universelle des propriétés vitales, on par des changements particuliers dans les fonctions de différens organes. Ainsi, dans plusieurs cas, le pouls devient plus fréquent ; il s'établit même, & progressivement, une espèce d'état fébrile, non morbide, qui se prolonge pendant quelque temps après la saison des eaux, ainsi que je l'ai observé chez des personnes qui revenoient des bains d'Aix en Savoie, de Barèges, du Mont-d'Or, &c. Dans d'autres cas, & dans le plus grand nombre de circonstances, pour les eaux hydro-sulfurées thermales, la peau, le tissu cutané, sous-cutané, sont vivement excités, ainsi que les organes urinaires & la membrane muqueuse intestinale, ce

qui va jusqu'à déterminer des éruptions, des fièvres critiques, de l'augmentation dans la respiration cutanée ou pulmonaire, la sécrétion des urines & des mucosités intestinales.

Il n'est pas également sans exemple de voir survenir aussi par l'action des eaux, une fièvre symptomatique, un embarras gastrique, une irritation qui pourroient appeler ou augmenter une phlegmasie chronique ; effets qui doivent nécessairement faire modérer quelquefois, ou faire suspendre le traitement ; on voit aussi pendant l'usage des eaux, des douleurs, des souffrances habituelles s'exaspérer, ce qui ordinairement annonce une crise favorable ; une sensation de froid, une impression de pesanteur se manifeste, ainsi que des vomitemens, des diarrhées, surtout à la fin du traitement ; des congestions sanguines vers la tête, ou des contractions spasmodiques dans différentes parties du corps, surtout pendant l'usage des eaux ferrugineuses (1).

L'effet curatif peut être quelquefois direct ou immédiat, lorsque les eaux s'appliquent sous forme de bains, de douches, d'éteuves, de boues, pour combattre les tremblemens athéniques partiels, une fausse ankylose, la roideur ou l'impotence qui succèdent à certaines blessures, mais principalement aux plaies d'armes à feu, aux fractures, aux entorses, aux luxations.

Dans le plus grand nombre des cas, l'effet curatif ne se manifeste que progressivement ou consécutivement, & comme une suite de la révolution qui s'est opérée par l'action des eaux. Souvent même, cet effet curatif n'est complet ou même sensible, qu'après plusieurs saisons. De plus longs détails seroient assurément superflus ici sur cette matière. L'article que nous lui avons consacré, nous a offert plusieurs difficultés, qu'il nous a été impossible de surmonter, mais sur lesquelles nous croyons avoir suffisamment appelé l'attention de MM. les médecins des principaux établissemens d'eaux minérales, à qui il appartient d'éclairer, par leur expérience, cette partie importante & encore si peu avancée de la thérapeutique. (J. L. M.)

Eaux minérales factices.

L'industrie de l'homme, qui est parvenu à contraindre & à fabriquer en quelque sorte de toute pièce dans ses laboratoires, les vins les plus d'li-

(1) Madame *** , à laquelle j'ai conseillé plusieurs fois ces eaux, pour combattre une atrophie abdominale assez grave, s'est entièrement détreinte, pendant toute la saison des eaux, de tous les symptômes de cette maladie : ils étoient remplacés par une douleur continue & passiois insupportable de la région de l'épigastre, avec impossibilité de prendre aucune espèce de nourriture pendant cinq à six jours, sans éprouver d'ailleurs le plus léger sentiment de soif ou d'indigestion quelconque, par cette longue abstinence.

cats & les plus recherchés, ne s'est pas appliqué avec moins d'activité & de succès à l'imitation des eaux minérales les plus énergiques.

L'acte de cette imitation, que l'on fait remonter à Bacon, ne fut exécuté que par Veucl, en 1755, pour les eaux de Seltz. Ce célèbre chimiste pensa d'ailleurs à cette époque, que le gaz de ces eaux émis de l'air condensable : opinion, dit Fourcroy, qui étoit encore une erreur, tandis que le procédé de Veucl étoit le premier pas assuré qui eût été fait parmi les hommes, pour l'imitation de ces produits de la nature.

Les travaux successifs de plusieurs chimistes célèbres, dont M. Duchanoy fit connaître les procédés & les découvertes, dans un ouvrage particulier, donnèrent beaucoup d'étendue à la préparation artificielle des eaux minérales. On peut assurer, disoit, au commencement du dix-neuvième siècle, un auteur que nous venons de citer, dans son rapport (1) à l'Institut national, sur les eaux minérales artificielles, fabriquées à Paris, par les sieurs Nicolas, Paul & compagnie, ayant pour collaborateurs & pour successeurs, MM. Tryaïre, Jurine & Audouard ; « on peut assurer que l'art d'imiter les eaux est poussé maintenant » au dernier degré, & que les chimistes habiles » dans les ressources & les procédés de leur manipulation, ne rencontrent plus d'obstacles dans la » préparation de ces liquides. Aussi les pharmaciens » instruits ont-ils répondu, depuis vingt ans, » dans ce genre de travail, aux vœux des médecins affectés éclairés pour ne pas se délier de l'art » chimique, & pour croire que cet art a trouvé » le secret de la nature. Dans les pharmacies bien » tenues, on fabrique des eaux de Seltz, de Sedlitz, du Spa, de Balaruc, de Harigès ; on les fabrique plus fortes ou plus faibles que celles de la nature ; on les prépare au degré d'énergie » ou de douceur que les indications médicales » réclament. Mais, outre que cette fabrication » ne peut avoir lieu avec la même facilité ou la même certitude dans toutes les pharmacies, » parce que leurs emplacements, les moyens mêmes » de ceux qui les dirigent, ne suffisent pas toujours pour remplir ce but, elle n'auroit jamais » pu acquiescer cette généralité, cette grandeur » utile de ses résultats, capable de remplacer l'usage des eaux naturelles, & de fournir aux besoins des malades d'une grande & populeuse » cité, si des hommes également habiles dans la connaissance des procédés chimiques & de la mécanique n'eussent pu donner à ces derniers toute l'étendue, la promptitude & la simplicité » qu'exige une abondante production, n'avoient » conçu & exécuté le projet d'établir des ateliers

en grand, de véritables manufactures d'eaux minérales artificielles. Parmi quelques-uns de ces établissements, formés depuis quelques années en France & à Paris, on doit surtout distinguer celui qui vient d'être élevé au ci-devant hôtel d'Uzès, rue Montmartre, par la société de M. Paul & compagnie (1).

Ce chimiste, qui a fabriqué les mêmes eaux à Genève, avec un grand succès, depuis dix années, & qui, d'abord en société avec M. Goffe, habile pharmacien de cette ville, & connu par plusieurs travaux utiles, a débité par année jusqu'à quarante mille bouteilles d'eau de Seltz artificielles, présente, dans la France de la classe du 26 brumaire dernier, sur la fabrication des eaux minérales, un Mémoire dont nous allons d'abord rapporter les principaux traits : nous donnerons ensuite la description des moyens ingénieux que nous avons vu employer dans l'établissement où le fait la fabrication. Nous passerons de-là à l'examen des eaux artificielles qui en résultent ; nous y joindrons quelques observations sur leur nature & sur leurs propriétés comparées, quelques remarques sur certaines améliorations dont elles nous paroissent susceptibles ; enfin, nous terminerons ce rapport par les résultats que les faits précédents nous auront fournis, & par les conclusions que nous proposons à la classe.

Notice du Mémoire de M. Paul & compagnie.

L'exposition des avantages que Genève a déjà retirés de l'établissement d'une fabrique d'eaux minérales artificielles, fait depuis dix ans dans son enceinte, forme la première partie de ce Mémoire ; à l'imitation simple de ces eaux, par laquelle M. Paul a commencé, ont succédé des modifications dictées par les besoins de cette ville, & surtout la préparation d'eaux gazeuses plus chargées que celles de la nature. Cet établissement peut être regardé comme une pharmacie pneumatique, en raison de l'étendue & de la variété des produits que les propriétaires y ont successivement ajoutés. On n'apporte presque point à Genève d'eaux minérales, & celles de la manufacture ont déjà été exportées. Quarante à cinquante mille bouteilles de litre, en font annuellement. Ce premier succès a engagé la société à former un établissement pareil à Paris. On y prépare neuf espèces d'eaux minérales artificielles. Les résultats des observations déjà faites sur chacune de ces espèces, se réduisent aux données suivantes :

(1) Au nom d'une commission composée du rapporteur Fourcroy, & de MM. Pelletier, Portal, Chaptal & Berthollet.

(1) Cet établissement a été transféré depuis, avec de nouveaux développemens, dans la rue Saint-Lazare, où il est devenu si justement célèbre, sous le nom d'établissement pour les eaux minérales fabriquées de Trévise, dirigé aujourd'hui par M. M. Jurine & Audouard.

» 1°. Les eaux de Seltz ont été utilement employées dans les catarrhes, les rhumatismes, l'asthme, les maladies bilieuses & putrides; elles agissent comme diurétiques & antiseptiques; même à l'extérieur. Elles réussissent dans les spasmes de l'estomac; elles facilitent la digestion; on les boit avec du sirop, du lait, du vin. Le fleur Paul les prépare de deux manières, relatives à l'extraction de l'acide carbonique: dans l'une il est dégagé de la craie par l'acide sulfurique; dans l'autre il est séparé par le feu. Le premier donne à l'eau une apreté due à la petite portion de l'acide sulfurique, & une propriété irritante. Le second ne communique rien de semblable à l'eau, & permet de l'administrer dans les maladies où l'irritation seroit à craindre. Il fabrique de plus, avec l'un ou avec l'autre de ces gaz, des eaux de Seltz fortes ou faibles, suivant la proportion d'acide qu'il introduit.

» 2°. Les eaux de Spa, chargées, comme celles de Seltz, d'une grande proportion d'acide carbonique, sont distinguées par la présence du fer qu'on y ajoute: aux propriétés des premières, elles réunissent la qualité tonique & stomachique de ce métal.

» 3°. Les eaux alcalines gazeuses, très-recommandées en Angleterre dans la gravelle & le calcul, apportent en effet, dans les douleurs qui accompagnent l'un & l'autre de ces maux, un soulagement très-marqué qui pourroit être attribué, suivant les auteurs du Mémoire, à la qualité dissolvante que ces eaux communiquent aux urines. Ils les croient propres à remplacer l'alcali caustique & le remède de Stephens. Les malades doivent en prendre tous les matins, deux ou trois verres, coupés avec le lait.

» 4°. Les eaux de Sedlitz, les plus faciles à imiter, ont les propriétés purgatives & fondantes parfaitement semblables à celles de la nature.

» 5°. Les eaux oxygénées contenant à peu près la moitié de leur volume de gaz oxygène, sans faveur particulière, & que le fleur Paul a le premier fabriquées d'après les vues des médecins de Genève, ont répondu parfaitement à leur attente & méritent la plus grande attention de la part des gens de l'art; elles raniment l'appétit & les forces, excitent les urines, rappellent les règles, calment les spasmes de l'estomac & les accès hystrériques. Le *Journal britannique* contient une suite intéressante d'observations sur leurs bons effets.

» 6°. Les eaux hydrogénées contenant le tiers environ de gaz hydrogène, sont calmantes, utiles dans les fièvres avec quelques symptômes inflammatoires, diminuant alors la fréquence du pouls, dans les douleurs des voies urinaires, dans quelques affections nerveuses & dans les infomnies.

» 7°. Les eaux hydrocarbonées ne diffèrent pas essentiellement des précédentes.

» 8°. Les eaux hydrosulfureuses préparées avec le gaz hydrogène, mêlé de gaz hydrogène sulfuré en petite quantité, ont l'odeur & le goût d'œufs pourris, & ressemblent aux eaux thermales sulfureuses; elles sont diaphorétiques, fondantes, résolutives, très-avantageuses dans les obstructions, les jaunisses, les affections du méfentère. On peut les varier beaucoup par la proportion du gaz. Leur usage extérieur mérite autant d'attention de la part des médecins, que leur emploi à l'intérieur: chargées de beaucoup de gaz hydrogène sulfuré, elles deviennent précieuses en lotions & en bains, dans les maladies pforiques; en donches, elles réussissent dans les ulcères de mauvais caractère; elles remplacent très-avantageusement l'usage des eaux thermales pour les malades dont les moyens ne permettent pas des voyages dépendieux.

» Les auteurs du Mémoire les terminent par deux considérations également importantes: l'une a pour objet le point de vue économique, l'argent exporté pour le prix des eaux, retenu en France, & celui des étrangers, attiré dans notre pays; l'autre est relative aux résultats utiles à la science, que les procédés employés à la fabrication des eaux leur paroissent susceptibles de fournir. Telle est la substance du Mémoire présenté à l'Institut: il est écrit avec la simplicité & la précision qui conviennent à un pareil sujet.

Procédés suivis pour la fabrication artificielle des eaux: description de l'établissement où on les prépare, &c. &c.

» La commission, sur l'invitation de la compagnie de M. Paul, s'est transportée dans l'atelier où l'on prépare ces nouvelles eaux artificielles, & qui est situé maison d'Uzez, rue Montmartre. Elle a d'abord été frappée de la simplicité des appareils, de l'ordre qui règne dans les dispositions respectives, des moyens ingénieux employés pour se procurer l'eau, pour la filtrer entre le premier réservoir & celui d'où elle est puisée pour être minéralisée, de la perfection des machines pour obtenir le gaz & surtout l'acide carbonique, soit par la calcination du carbonate de chaux, soit pour son dégagement par le moyen de l'acide sulfurique, & surtout du mécanisme rapide par lequel le gaz est comprimé & condensé dans le liquide qui les reçoit. Partout elle a reconnu les ressources d'une mécanique éclairée, associée à l'exactitude des procédés chimiques: partout elle a été frappée de la différence qui existe entre cette fabrication en grand & la petite, on pourroit même presque dire la mesquinerie des pra-

» tiques employées jusqu'à présent, pour la préparation de ces liquides. Les machines de l'atelier que nous décrivons, sont disposées de manière à fabriquer à la fois plusieurs centaines de litres d'eaux minérales, & à leur donner la plus forte comme la plus uniforme énergie.

» L'auteur de ces procédés & de ces manipulations utiles, entièrement au courant de toutes les variétés d'appareils employés dans les laboratoires français, pour découvrir & montrer toutes les propriétés des fluides élastiques & leur influence sur les phénomènes chimiques de la nature, semble avoir consacré l'ensemble de ces machines à des recherches exactes; tant il a mis de sagacité dans l'invention & de précision dans l'exécution de ces moyens! Sans vouloir décrire ici en détail les machines employées dans l'atelier de fabrication des eaux, machines dont l'auteur desire réserver la connoissance à sa compagne, sur tout par rapport au mécanisme de compression, qui fait le principal appareil de son invention, & qui nous est resté caché: la commission croit devoir au moins donner une idée générale des principaux procédés mis en usage dans cet atelier, afin de faire connoître à la classe les soins & les lumières qui dirigent cette importante fabrication: ce qu'elle va entendre suffira pour en faire juger le mérite & l'avantage, mais ne suffira pas pour en permettre ou en dicter l'exécution. La commission remplira donc ainsi & ce que la classe attend d'elle, & ce qu'elle doit à l'auteur du mécanisme dont le résultat l'occupe.

» Deux genres d'appareils également simples, ingénieux, & poussés jusqu'à une perfection qui deviendra très-utile, même dans nos laboratoires de recherches, sont destinés à l'extraction & au dégagement des gaz, l'un pour ceux que le feu doit développer, l'autre pour les fluides dégagés par l'effervescence. Le premier est un cylindre métallique traversant un fourneau, & muni à ses deux extrémités de tous les ajustages nécessaires, soit pour voir ce qui se passe dans son intérieur à tous les temps de l'opération, soit pour recueillir, transporter, mesurer, laver & purifier les gaz eux-mêmes dégagés. La vue & la marche de cet appareil montrent à l'observateur tout ce que la chimie moderne a imaginé de plus exact & de plus utile pour l'extraction & la connoissance des fluides élastiques. De l'extrémité de cet appareil, séparé en deux par une cloison, & offrant d'un côté le fourneau & le cylindre, de l'autre les récipients munis de tout ce qui assure le recueillage, la mesure & la purification des gaz; partout des tuyaux mobiles, que l'on peut allonger, raccourcir, élever, descendre, diriger à volonté, & qui portent les gaz dans une pompe d'où ils sont recueillis dans des tonneaux sèches, où la dissolution dans l'eau filtrée, qui arrive

» d'un autre atelier voisin, par une conduite particulière, s'opère à l'aide de la pression & de l'agitation. Ce premier appareil est appliqué à l'extraction des gaz acides carbonique, oxygène & hydrogène.

» Le second genre d'appareil, consacré aux développemens des fluides élastiques par l'effervescence, est encore plus simple que le premier. Quoique semblable à ce que l'on connoît déjà dans nos laboratoires, & consistant en un vase muni de tubes & de robinets, le sieur Paul y a porté une perfection, une simplicité, une commodité, qui rendent cette opération & plus facile, & plus prompte, & plus sûre qu'elle ne l'a encore été jusqu'ici. Sa fabrication est si exacte, qu'il ne se perd rien; que tout le gaz est recueilli; que les matières en effervescence ne se boursoufflent jamais assez pour arriver jusque dans la première eau traversée par le gaz; que tout, jusqu'au temps & à l'espace, est employé à profit. Le mécanisme qui produit cet effet, est en même temps d'une simplicité qui étonne, & qui annonce dans son auteur une grande habitude des procédés, & une connoissance aussi profonde des inconvéniens reconnus dans les machines usitées, que de ce qui restait à y ajouter. Le gaz fourni par ce procédé est aspiré par la même pompe, & porté dans les mêmes tonneaux de dissolution, que celui qui est le produit du feu.

» Quant à la machine de compression, dont la structure & le mécanisme ne nous ont point été communiqués, & dont l'auteur & sa compagne se réservent entièrement le secret, nous nous contenterons de dire qu'elle remplit son but de la manière la plus désirable, puisque les eaux gazeuses diverses, fortes ou faibles, que nous avons vu préparer, contiennent plus de fluides élastiques, même de ceux que l'on fait n'être pas dissolubles dans l'eau, au moins sans pression, que toutes celles que l'on a fabriquées jusqu'à aujourd'hui.

» Nous avons vu préparer en moins de deux heures, deux petits tonneaux d'eau de Seltz, soit avec le gaz acide carbonique extrait par le feu, soit avec le même gaz retiré par l'acide sulfurique. Cette opération, simple dans toutes ses parties, n'entraîne ni difficulté, ni irrégularité, ni perte de temps. La propriété la plus grande régnant dans toute la continuité. Les matières salines & fixes, qui doivent faire partie de quelques-unes de ces eaux, & surtout de celles de Seltz, de Sedlitz, de Spa, &c., sont placées toutes dosées, bien mêlées & en poudre fine, dans chaque bouteille, avant de remplir celle-ci de l'eau gazeuse, au moment où l'on va la tirer du tonneau de fabrication: l'art même de tirer le liquide gazeux de ces tonneaux, est aussi perfectionné qu'il peut l'être. Le sifflement & le bruit, ainsi que la fracture de quelques-unes de ces bou-

« teilles, à l'instant où l'on y enfonce le bouchon, » annonce assez que l'eau gazeuse y est furchargée de ce gaz, & quo, malgré la perte inévitable qui s'en fait, le liquide en contient beaucoup plus qu'aucune eau artificielle n'en a contenu jusqu'ici. » (*Institut national des arts, extrait des registres de la classe, séance du 21 frimaire an 8.*)

Telle étoit la manière de s'exprimer de Fourcroy, au commencement du dix-neuvième siècle, sur la grande manufacture des eaux minérales salées de l'hôtel d'Uzes, plus connue aujourd'hui sous le nom d'établissement de Tivoli. On avoit suivi, pour la fabrication de ces eaux, les résultats des belles analyses de Bergman & de quelques autres analystes plus récentes, opérées à la demande de la compagnie Paul, par M. Vauquelin.

Ces eaux, à l'époque du rapport, se bornoient aux eaux de Selts & de Spa, fortes & foibles; l'eau de Sedlitz & plusieurs eaux hydrocarbonées, & des eaux hydrofoufurrées foibles & hydrofoufurrées fortes. On y a joint dans la suite, & d'après les données fournies par les meilleures analyses, l'eau de Vichi, l'eau de Bussang, de Pyrmont, les eaux de Vals, de Contresseville, de Balaruc, de Plombières, de Badeges, & enfin l'eau foufureuse de Naples, si active, si efficace, lors même qu'elle n'est qu'imitée, & qui paroît devoir ses propriétés à la réunion de l'acide hydrofoufurré & de l'acide carbonique, dans une même eau minérale. La compagnie Paul ne se borna point à ces différentes fabrications, dont l'idée étoit prise dans la nature; elle composa aussi, & pour répondre à des indications particulières, l'eau oxygénée, l'eau hydrogénée, l'eau alcaline gazeuse.

On pourroit regarder encore comme une espèce d'eau minérale nouvelle, l'eau de Selts douce ou préparée avec l'acide carbonique extrait par le feu, & qui n'est point styptique, stimulante comme celle qui est fabriquée par l'acide carbonique dégagé par effervescence.

Le savant rapporteur, dont nous empruntons en grande partie les remarques dans cet article, s'étoit fait de l'eau oxygénée une idée trop favorable, & qui ne s'est point réalisée, ni dans la médecine pneumatique, ni dans les applications que l'on croyoit pouvoir faire de cette découverte, aux arts & à l'agriculture. Les rédacteurs de la *Bibliothèque britannique* avoient partagé ces flatteuses espérances, & publièrent, pour les appuyer, les observations de Cruikshank, de Rollo, de Beddoes, qui n'ont pas été confirmées. Fourcroy n'attachoit pas, avec raison, la même importance à l'eau hydrogénée. Quant à l'eau alcaline gazeuse, que l'on continue de trouver à l'établissement de Tivoli, & le ne paroît avoir été préparée que dans le dessein de reproduire exactement l'eau méphytique alcaline de Iloue, si recommandée en Angleterre par Jegen-Houtz, dans le traitement des affec-

tions calculeuses, quoique, suivant l'auteur du rapport, on ne puisse guère leur accorder la propriété qui leur est attribuée, savoir, de dissoudre les calculs, dont le plus grand nombre, en effet, est formé par de l'acide urique, ou par du phosphore de chaux, qui ne peuvent être attaqués par un carbonate alcalin.

Depuis le rapport de MM. les commissaires de l'Institut, l'établissement des eaux minérales salées de M. Paul & compagnie s'est continuellement agrandi & perfectionné: il n'a plus seulement aujourd'hui pour objet la préparation & la distribution des eaux minérales qui doivent être employées en boissons; il renferme, en outre, des bains composés avec les mêmes eaux, ou avec des eaux plus énergiques, des appareils pour les bains de vapeurs sèches ou humides, des bains de vapeurs à l'oriental, des douches sous toutes les formes (douches ordinaires, douches en arrosoir), bains d'immersion, bains par ouïe, douches dites ascendantes.

Le rapport dont nous avons parlé, celui de la Société de médecine de Paris, les rapports successifs de l'inspecteur du Gouvernement, ont fait suffisamment connoître cette grande & nouvelle branche de l'industrie française, & l'on voit, en les parcourant, qu'un grand nombre d'affections diverses ont été traitées avec autant de succès qu'elles auroient pu l'être aux eaux minérales naturelles les plus renommées.

Il se présente maintenant une question qu'il seroit important de traiter, & dans l'intérêt de la science, & dans celui de l'humanité. Les eaux minérales factives offrent-elles, relativement à la médecine, une imitation exacte des eaux naturelles, & surtout de quelques eaux, dont l'activité n'est pas suffisamment expliquée par le résultat de leurs analyses, telles que celles de plusieurs sources de Vichi, celles de Plombières, du Mont-d'Or, de Spa? Nous sommes bien loin de partager dans la manière de décider une pareille question, l'opinion de Bergman & de Fourcroy; sans doute le nouvel établissement d'eaux minérales présente un grand appareil de ressources à la médecine: « En effet, ce ne sont plus les petits moyens ordinaires des laboratoires de chimie, » c'est plus une expérience réfléchie & étendue » que l'on a eue par d'autres expériences; c'est une véritable pharmacie pneumatique, une magasin » saine où les mêmes observations faites avec beaucoup de soin, & en grand, conduisent constamment à un résultat identique. Enfin, cette » préparation d'eaux minérales artificielles faites » assez en grand pour en fournir à un grand nombre d'individus à la fois, est propre à créer pour » Paris & pour la France une nouvelle branche » d'industrie utile tout à la fois aux habitants, par » les médicaments qu'elle leur fournit, au commerce, par les sommes dont elle prévient l'exportation, par les sommes qu'elle doit attirer

» de l'étranger, & enfin, à la prospérité nationale,
 » par les produits de tous genres qu'elle y fait
 » naître. »

Nous fouscricrons sans hésiter à ces éloges, mais nous ne dirons point avec Fourcroy, qui malheureusement étoit trop étranger aux questions de médecine pratique, que M. Paul & compagnie ont parfaitement rempli l'objet qu'ils s'étoient proposé, celui de fournir à la médecine des médicaments comparables, & souvent même supérieurs aux eaux minérales naturelles. Sans doute les eaux de Seltz ou quelques autres eaux acidules gazeuses, les eaux de Sedlitz, quelques eaux hydrosulfureuses froides, peuvent être fabriquées dans nos laboratoires jusqu'à un certain point; mais comment imiter les eaux salines thermales, celles de Vichy, par exemple, de Plombières, qui ont une si grande efficacité sur les lieux mêmes où on les prend, tandis que les eaux artificielles que l'on désigne sous le même nom, ne peuvent leur être comparées sous ce rapport? Les commissaires de l'Institut n'ont pas même spécifié dans leur rapport, relativement aux eaux de Vichy, quelle étoit la source dont on avoit analysé les eaux pour les imiter, & l'on fait cependant combien ces eaux sont différentes, combien celles de la source dite de la *grande grille* agissent plus puissamment que celles de la source dite de l'*Hopital*, & combien celles des *Célestins* ont peu d'analogie avec les deux premières.

L'établissement des eaux minérales salsées de Tivoli, en le considérant sous son véritable point de vue, doit être envisagé comme un vaste ensemble de moyens thérapeutiques; il a son objet particulier, & répond aux intentions des médecins pour plusieurs indications spéciales; il peut convenir même, ou réussir, dans le traitement de quelques maladies qui ont résisté à l'action des eaux minérales naturelles (plusieurs affections herpétiques très-invéterées), sans pouvoir toutefois n'être comparé que d'une manière très-floignée, aux sources justement renommées de Vichy, de Spa, du Mont-d'Or, de Barèges, de Cauterets, de Plombières, &c.

Le dégagement très-considérable de l'acide hydrosulfurique, qui s'opère dans l'emploi de plusieurs eaux minérales salsées, présente en particulier, dans le traitement des maladies cutanées, des avantages que l'on ne rencontrerait peut-être pas dans les eaux minérales naturelles hydrosulfureuses. On administre dans les établissements dont nous parlons, le soufre en vapeurs, le cinabre : moyens que l'on a utilement employés dans le traitement de certaines paralysies, d'impotences rhumatismales très-invéterées, de dartres non moins opiniâtres, & de syphilis dégénérée & constitutionnelle. (Voyez VAREUX (Bains de).)

(L. J. M.)

MINES. (*Fodinae*.) On désigne sous ce nom

plusieurs excavations souterraines, dans l'intérieur desquelles différents ouvriers sont employés pour en retirer diverses espèces de métaux, & quelques fossiles non moins importants dans l'économie sociale. Nous pourrions considérer ce qui concerne les mines, d'abord sous le point de vue de leur histoire naturelle, & ensuite sous le rapport de leur insalubrité pour la classe particulière des artisans qui s'y trouvent renfermés. Le premier point de vue, sans être entièrement étranger aux études de la médecine, nous écarteroit trop de notre objet particulier, pour qu'il nous soit possible de nous y arrêter. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Chimie*.) Nous dirons seulement ici, & sous forme de digression, que la température des mines, qui vient d'attirer tout récemment l'attention des physiciens d'une manière toute particulière, paroit répondre à leur profondeur: l'idée d'un *feu central* avoit déjà porté de Mairan & Buffon à différentes recherches sur la température des excavations les plus profondes de la terre, comparée à celle de la surface.

Le beau travail de M. Fourier, sur la chaleur, l'a ramené sans aucun intérêt de théorie ou de système, vers les mêmes objets de spéculation. Plusieurs observations ont été faites en même temps avec beaucoup d'exactitude dans différents lieux; & d'après l'ensemble de leurs résultats, il est difficile de ne pas convenir que les températures en tous les lieux sont constantes, à chaque profondeur un peu considérable, mais qu'elles augmentent à mesure que l'on descend.

Ainsi, à une profondeur de 433 mètres dans les mines de Giroisagny, le thermomètre centigrade s'est trouvé à 22°,7, tandis qu'il s'élève seulement à 12°,5, à la profondeur de 101 mètres dans les mêmes mines.

Dans une autre mine, dans celle de Kùhschacht, qui est regardée comme la plus profonde des mines de Fryberg, le thermomètre s'est trouvé à 16°,5, à une profondeur de 271 mètres, lorsqu'il ne marquoit que 2°,5 centig. en plein air, eu dehors de la mine; enfin, des résultats analogues ont été présentés dans la mine Janginheirke, qui a été exploitée jusqu'à une profondeur de 350 mètres, dans celles de Huelgoat de Cornouailles, ainsi que dans les principales mines de la Nouvelle-Espagne, d'après les observations de M. le baron de Humboldt (1).

Les mines ont été, chez plusieurs nations modernes, l'objet d'une industrie très-active & très-développée : telles font les mines de la Saxe, de la Bohême, de la Hongrie, de tout le nord de l'Europe en général, de la Suède & de la Russie en particulier, où les ordonnances qui concernent l'exploitation des mines, forment une partie essentielle de la législation. Malheureusement ces

(1) Voyez *Annales de chimie*, tom. XIII, pag. 183.

travaux ont en bien plutôt pour objet le plus grand parti que l'on pouvait tirer des mines, que les moyens qui ont pour but d'en diminuer l'insalubrité.

Cette insalubrité, les dangers de tout genre auxquels se trouvent exposés les infortunés mineurs, surpassent peut-être tout ce que l'on pourroit imaginer.

Cette insalubrité, ces périls sont communs à presque toutes les mines, & plusieurs appartiennent en outre en particulier, à quelques mines, telles que celles d'arsenic, de mercure, de charbon de terre, &c.

La respiration, les fonctions de la peau sont continuellement menacées & troublées dans la plupart des mines; tous ceux qui les ont visitées, s'accordent sur la profonde altération de l'air dans les plus grandes excavations; ce qu'on appelle *l'ainage* en terme de mineurs, a pour objet, afin de corriger cette altération, de multiplier & de disposer le plus convenablement possible les *perçonnets*, de les établir en ligne droite autant qu'il est possible, & de tenir enfoncé sur le haut des puits, une espèce de brasier, pour produire un courant d'air de bas en haut.

Pour se faire une idée du degré auquel l'industrie humaine est arrivée dans ces précautions, il faut visiter les principales mines d'Angleterre, mais surtout celle de Newcastle, où les machines à vapeurs & toutes les ressources de la mécanique pratique la plus avancée ont été employées pour rendre l'exploitation des mines le plus productive & le moins insalubre qu'il étoit possible (1).

D'autres dangers menacent les mineurs, non-seulement par l'humidité du milieu dans lequel ils vivent, mais encore par l'afflux des eaux pluviales, au milieu desquelles ils seroient souvent inondés, si de grands efforts n'étoient pas continuellement employés pour détourner ces eaux par des *galeriers d'écoulement*, ou pour les épuiser par différents procédés très-pénibles.

On est en outre exposé, dans les mines, à l'action de plusieurs émanations nuisibles & de plusieurs gaz délétères. Les simples exhalaisons ou vapeurs sont moins dangereuses, en général, que les gaz dont nous parlons. Quelques-unes néanmoins ont occasionné les plus grands désastres : telles sont les vapeurs, appelées par les mineurs *le feu brisou* ou *ferrou*, le *ballon*, la *mouphète* ou *pouffe*.

Le *feu brisou* se dégage avec sifflement des souterrains; il paroît dans les mines sous la forme d'une toile d'araignée, & s'allume avec une violente explosion s'il se trouve en contact avec la lampe des mineurs. Pour prévenir un semblable effet, un homme enveloppé de linge mouillé, & portant, au bout d'une longue perche, une torche allumée,

descend dans la mine, se couche à plat ventre, & enflamme la vapeur en lui présentant la lumière du plus loin qu'il lui est possible.

Le *ballon* consiste dans une espèce de globe formé par une vapeur circonscrite, & suspendue dans l'atmosphère : aussitôt que les ouvriers aperçoivent ce phénomène, ils prennent la fuite; & si le ballon crève avant qu'ils aient eu le temps de se sauver, ils sont tous ou presque tous frappés de suffocation.

La *mouphète* ou *pouffe* étoit les mièrres, & les mineurs sont avertis de sa présence à cette propriété. Lorsque son action est très-légère, elle occasionne une toux convulsive qui peut être suivie d'une pneumonie chronique, & de la consommation qui en est l'effet nécessaire, lorsque cette maladie n'est pas traitée par des moyens convenables. Si cette même action est plus forte, elle occasionne une asphyxie, à la suite de laquelle on vomit des matières noires & sanguinolentes.

La plupart des gaz délétères qui rendent le séjour des mines si dangereux, ne s'y trouvent pas habituellement, mais s'y dégagent tout-à-coup, comme dans les fosses d'aisance, lorsque les ouvriers viennent à communiquer, par leur travail, avec d'anciens puits, ou lorsqu'ils brisent des substances dont peuvent se dégager des vapeurs meurtrières.

La plupart du ces gaz délétères, sont le gaz acide carbonique, le gaz oxyde de carbone, le gaz hydrogène carboné, le gaz hydrogène sulfuré. Souvent les ouvriers, surpris par leur dégagement subit, sont frappés de mort avant qu'il soit possible de leur donner le moindre secours : dans le cas contraire, on cherche à les sauver, en les arrosant d'eau & de vinaigre, ou en les enveloppant à l'air libre, suivant un usage adopté en Angleterre, de bouille mouillée : procédé que sans doute on pourroit rendre plus utile & mieux adapté à une situation aussi dangereuse.

Plusieurs autres causes de souffrances ou d'insalubrité menacent encore la santé des ouvriers qui travaillent dans les mines; différentes matières corrosives, irritantes, se portent souvent sur les jambes, sur les mains, sur les yeux, & occasionnent des plaies ou des ulcères qu'il est difficile de guérir. Les uscles dont parle Agricola, que l'on a appelés *les lucifuges*, & qui se trouvent plus particulièrement dans les mines d'argent, ne sont guère moins incommodes & moins nuisibles. Ce que Galien raconte de la caverne de Chypre, portée à la regarder comme une mine de vitriol.

Du reste, l'industrie humaine a opposé plusieurs moyens de défense à ces nombreux dangers qui menacent la santé des mineurs; nous en avons déjà indiqué quelques-uns. Les Anciens donnoient assez d'attention à cette partie de l'hygiène publique; on connoît, d'après Jules Pollux, leurs gantelets & leurs bottines, pour défendre les ouvriers d'un grand nombre d'irritations mécani-

(1) Voyez Bibliothèque universelle de Genève, 1817; & 1818.

qucs. Pluie a parlé en outre de différens masques de verre dont il faisoient usage pour se préserver des émanations les plus dangereuses.

Les médions huileuses, les masques d'éponges mouillées, proposés par M. Joffe pour les vangeurs & pour tous les ouvriers qui travaillent au milieu des matières les plus dangereuses, offrirent de grands avantages dans l'intérieur de plusieurs mines.

Dans plusieurs des mines très-profondes, on a eu recours, pour purifier l'air, à une labellation très-forte, à différens moyens de ventilation, & même à des fumigations préparées avec le nitre : on a cherché aussi à boucher avec de la terre glaise, les fissures qui pouvoient laisser passer les émanations nuisibles. On sent aisément tout le parti que l'on pourroit tirer d'une distribution des mineurs suivant leur santé ou leurs forces, & de l'usage de vêtement ou de chaussure imperméable dans plusieurs mines.

La lampe proposée récemment par M. Davy, & qu'il appelle *lampe de sûreté*, a pour objet de prévenir les détonations qui sont quelquefois si redoutables dans l'intérieur des mines.

Plusieurs autres mines réunissent à la plupart des dispositions nuisibles que nous venons d'indiquer, des causes particulières d'insalubrité qui résultent de leur nature, ou que l'on doit attribuer au dégagement de certains gaz, sur la composition desquels nous sommes encore très-peu avancés. Nous placerons au premier rang les mines d'arsenic (*royez Arsenic*), les mines de cuivre, de mercure, de plomb. (*Voyez ces différens mots.*)

Les mines de houille ou de charbon de terre présentent aussi quelques causes particulières d'insalubrité très-actives. Les ouvriers qui s'y trouvent employés, sont continuellement placés dans l'atmosphère la plus insalubre & au milieu de molécules pulvérisantes, qui salissent, embarrassent leur peau, irritent leurs poumons ; ce qui occasionne, pour cette classe d'artisans, les nombreuses maladies qui dépendent d'une altération grave & prolongée de la respiration : & de la perspiration.

Une nouvelle maladie s'est manifestée en outre, au mois de germinal an 11, sur tous les ouvriers qui se trouvoient dans la galerie d'une mine de charbon de terre, exploitée à Fresnes près Condé, située comme les autres à 120 toises au-dessus du sol, & ne paroissant en différer par aucune particularité remarquable. L'atmosphère de ce souterrain a une température de dix-sept à vingt degrés au thermomètre de Réaumur. Les lumières y brûlent avec moins de vivacité, & l'on y respire difficilement ; le charbon qu'on en retire exhale une odeur sulfureuse très-marquée ; les eaux qui filtrent à travers la mine font transparentes, mais un peu jaunâtres, & produisent une espèce d'érythème ou plutôt d'érythème, lorsque quelques

gouttes de cette eau se trouvent appliquées sur la peau. Lorsque les ouvriers, qui jusqu'alors n'avoient rien éprouvé de particulier, ressentirent différens symptômes de maladies très-graves, plusieurs d'eux eurent les uns après les autres consulté le médecin de l'établissement : ces malades avoient une grande difficulté de respirer, des coliques fort douloureuses, un mal de tête, des palpitations, une prostration effrayante ; le pouls étoit petit, accéléré, le ventre météorisé, mais insensible au toucher.

Ces différens symptômes augmentèrent bientôt de la manière la plus alarmante, & lorsqu'enfin ils étoient calmés, après dix ou quinze jours de souffrance, ces malheureux ouvriers n'étoient pas complètement guéris, & passaient d'un état aigu, à une maladie chronique très-grave. Cette influence délétère se prolongea, malgré plusieurs travaux qui furent entrepris pour assainir la galerie où elle avoit lieu ; cette galerie fut alors fermée, mais plusieurs ouvriers qui avoient été exposés à ces émanations, & qui d'abord ne paroissent pas en avoir ressenti les funestes effets, tombèrent malades trois & quatre mois après avoir été soumis à cette influence, en éprouvant toutefois des symptômes moins violens que ceux qui viennent d'être décrits. Quatre de ces nouveaux malades furent conduits à l'hospice de perfectionnement de l'école de Paris, qui déjà avoit été consultée, & dont l'insurrection n'avoit eu aucuns résultats utiles jusqu'à cette époque (1). M. le professeur Hallé, auquel l'observation & le traitement d'une maladie aussi intéressante furent confiés, a rendu compte de cette tâche aussi délicate que difficile, dans un rapport que nous nous empresserons d'employer en grande partie.

Lorsque ces ouvriers malades arrivèrent à l'hospice de l'école de médecine, « ils étoient jaunes, » « blafards, dit M. le professeur Hallé, non pas » « tels que des hommes affectés de jaunisse, mais » « du jaune que présente la cire blanche quand elle » « a été long-temps gardée : ils étoient ardemment » « le visage surtout étoit bouilli, ainsi que les extré- » « mités supérieures : les inférieures étoient aussi, » « mais la fatigue du voyage pouvoit y avoir con- » « tribué. En effet, après deux jours de repos, les » « jambes sont devenues moins ardemment » « enflées, & ont » « fini par être aussi maigres que dans l'état naturel. » « La décoloration de la surface du corps étoit uni- » « verselle, & non-seulement la peau étoit blafarde » « & jaunâtre, mais la conjonctive, le revers des » « paupières, l'intérieur des lèvres & de la bouche, » « la langue même, étoient privés de leur couleur » « naturelle. Aucune ramification de vaisseaux ca-

(1) Voyez la thèse de M. Caudebec de Condé, ayant pour titre : *Traité historique de description générale de la maladie décrite sous le nom d'anémie des ouvriers d'une galerie de mine de charbon de terre en exploitation à Fresnes, département du Nord*, Paris, 1818, in-8°, n.º 108.

pillaires ne paroissent sur la conjonctive, non plus qu'an dedans des paupières & des conjonctives, en général aucune veine ne se rendoit sensible, ni par la couleur, ni par sa faillie dans l'épaisseur de la peau, soit au bras, soit à l'intérieur de l'avant-bras & au dos de la main.

Le ventre ne présentoit aucun embarras sensible au toucher; seulement le mésentère paroissant faire un paquet assez volumineux, quoique souple. Les hypochondres paroissent libres.

Le pouls étoit habituellement accéléré, battant quatre-vingt-dix & cent fois par minute, sans qu'il y eût pour cela une chaleur sensible à la peau. Cependant, dans les moments où il s'éthaloit une fièvre sensible, la peau devenoit fort chaude, le pouls s'accéléroit encore, & d'autres symptômes annoncoient aussi un changement dans la mesure habituelle des fonctions: outre cela, le pouls étoit fréquemment altéré par des palpitations, & le cœur même, lorsqu'il ne palpitait pas, battoit très-fortement contre les parois de la poitrine.

Un autre symptôme non moins constant, & différend des palpitations, quoiqu'on pût imaginer qu'il en étoit une suite, étoit l'impobilité où étoient ces malades de marcher sans être obligés de s'arrêter au bout de quelques pas & de s'asseoir; ils ne pouvoient également monter un étage sans être forcés de s'asseoir plusieurs fois sur l'escalier; la percussion de la poitrine n'indiquoit cependant aucun engorgement des viscères de cette cavité, ni aucune quantité d'eau épanchée.

Les mains étoient fréquemment humides dans leur partie interne, & ils suivoient assez habituellement la nuit.

D'ailleurs ces hommes, en d'eux excepté, avoient de l'appétit, mangeoient avec avidité les aliments qui étoient de leur goût, n'aimoient pas la viande de boucherie, & avoient d'autres goûts qui paroissent être l'effet de l'habitude plus que de la maladie: ils digéroient sans peine, mais leurs excréments n'annonçoient pas une digestion parfaite ni égale; elles étoient souvent demi-liquides, quelquefois liquides, brunes, jaunes, & quelquefois vertes. Les urines, dont on en a fait l'analyse, étoient en général de couleur ordinaire.

Ainsi les symptômes caractéristiques étoient la décoloration universelle, la teinte jaune de la peau, la bouffissure, l'impobilité de marcher sans suffoquer, les palpitations, les sueurs habituelles.

Au bout de quelques jours de l'arrivée de ces hommes, & quand ils furent familiarisés avec tout ce qui les environnoit, on s'occupa de régler leur régime en leur donnant des aliments substantiels, des viandes telles qu'ils les desiroient, le plus souvent rôties; d'abord d'excellente bière, puis du bon vin, du pain parfaitement cuit. On

satisfaisoit leur appétit & leurs desirs autant que la prudence le permettoit, & autant que cette conduite défendait pouvoir s'accorder avec la nécessité de choisir leurs aliments d'une manière convenable; enfin, on n'a rien négligé pour qu'aucune affection morale ne pût aggraver leur état.

Déterminé par le rapport du médecin qui les avoit conduits, & le succès présumé des frictions mercurielles, on les leur administra d'abord à la dose d'un gros, à deux jours d'intervalle, & en même temps on donnoit une tisane amère, faite avec le houblon & la petite centauree; on leur donnoit aussi le vin antiscorbutique; ces derniers moyens répondoient, d'une part, à l'indication apparente tirée des symptômes, de l'autre à l'indication qu'il étoit naturel de redouter de la sage du mercure.

Au milieu de ce traitement, l'un des malades a succombé à son mal: il avoit toujours paru plus languissant que les autres, & avoit moins d'appétit. Dans les premiers jours de son arrivée, il avoit été atteint d'un rhume de courte durée; les frictions avoient été commencées sur lui ainsi que sur les autres, le 15 mellior; elles furent discontinuées le 25, parce qu'on s'aperçut alors qu'il avoit un mouvement de fièvre très-sensible tous les deux jours. La fièvre continua, & le 6 thermidor elle prit un caractère grave; elle étoit continue, avec douleur dans tous les membres, & une céphalalgie aiguë; le pouls même étoit dur. Malgré la violence de la fièvre, ainsi que la sécheresse & l'ardeur de la peau, aucune partie ne se coloroit, ni la langue, ni les lèvres, ni la conjonctive. La langue étoit parfaitement nette, ainsi que celle des autres malades; le ventre étoit tuméfié & douloureux au toucher. On sentoit le long du bord inférieur des côtes, du côté droit, une rémittence qu'on rapportoit au foie. Au bout de deux fois vingt-quatre heures, la fièvre tomba, & le pouls devint foible, il y eut des efforts pour vomir, qui n'amènèrent que quelques glaires, & que l'on chercha inutilement à secouer par une potion cordiale émettique; une forte oppression, un pouls foible & intermittent, le froid des extrémités, succédèrent. Un vésicatoire sur le côté, appliqué & réitéré comme sinuait, fit lever une ampoule, mais ne releva le pouls que pour quelques heures. L'intermittence augmenta, ainsi que le froid des extrémités & l'oppression de la poitrine, & le malade mourut.

On l'ouvrit, & voici l'état dans lequel se présenta le cadavre.

Le ventre étoit un peu tuméfié; la peau ne présentait aucune vergeure, & la couleur étoit, en général, la même que dans le cours de la maladie.

Le bas-ventre ne contenoit point de sérosité épanchée; les intestins se montrèrent distendus, & surtout le colon; le graillo contenue entre les membranes de l'épiploon étoit très-jaune, & l'on re-

» marqua la même couleur dans celle qui est entre
 » les lames & à l'origine du méfentère, & dans
 » celle qui occupe le tissu graisseux sous-cutané.
 » Le foie étoit petit, ne sailloit point au-delà des
 » côtes; il étoit souple & mollet dans toute son
 » étendue, d'une couleur blonde, tant à l'extérieur
 » que dans sa substance, qui étoit molle & on-
 » tueuse au toucher. La vésicule étoit à demi pleine
 » d'une bile de la couleur du jaune d'œuf, & dont
 » on a fait l'analyse: on y a trouvé beaucoup d'li-
 » bumine coagulable, & des particularités dont
 » nous ne ferons pas mention ici; la rate étoit pe-
 » tite, plus molle qu'à l'ordinaire, & le liquide qui
 » s'en écouloit par l'incision, étoit d'un rouge lie de
 » vin foncé, à peu près comme à l'ordinaire.

» L'estomac ouvert s'est trouvé à moitié plein
 » d'une liqueur de couleur lie de vin; le duodénum
 » & le jéjunum étoient enduits d'une mucofité de
 » couleur semblable: cette mucofité enlevée, la
 » membrane muqueuse parut intacte & blanche
 » dans toute son étendue, tant dans l'estomac que
 » dans les intestins; le rectum contenoit des ma-
 » tières épaisses, moulées & d'un brun-verdâtre;
 » tous les autres viscères étoient sains.

» Dans la cavité de la poitrine, le poulmon droit
 » adhéroit presque en entier, mais surtout dans sa
 » partie antérieure, à la plèvre collée; le poulmon
 » gauche étoit presque entièrement libre; les deux
 » cavités ne contenoient aucune quantité notable
 » de sérosité; l'un & l'autre poulmon étoient légers,
 » crépitoient sous les doigts, n'étoient engorgés
 » dans aucun point, étoient extérieurement blancs
 » & parsemés de quelques points d'un bleu foncé, &
 » par les incisions ils répandoient une sérosité écu-
 » meuse & jaunâtre, qui s'échappoit de tous les
 » points du parenchyme, & ne sortoit d'aucune
 » collection particulière contre nature.

» Le cœur étoit d'un volume très-ordinaire; sa
 » chair étoit pâle comme une chair musculéuse qui
 » auroit été macérée & lavée; ses parois étoient
 » mollasses, & les colonnes charnues, grêles; au-
 » cune altération n'affectoit sa structure: il ne s'est
 » écoulé de ses cavités aucune goutte de sang
 » rouge: on remarquoit dans le ventricule gauche,
 » un caillot pâle comme la chair du cœur elle-
 » même, & qui ne contenoit aucune portion appré-
 » ciable de partie colorante. Le péricarde ne con-
 » tenoit point de sérosité.

» Le cerveau étoit blanc; la substance extérieure
 » étoit peu cendrée, & se distinguoit peu de la sub-
 » stance blanche. Trois à quatre grammes de séro-
 » sité seulement se trouvoient dans la partie posté-
 » rieure de la cavité du ventricule gauche: le
 » plexus choroïde étoit rouge, mais assez pâle.

» Dans les trois cavités, tous les vaisseaux arté-
 » riels & veineux étoient encore vides de sang co-
 » loré, & ne contenoient qu'un peu de liquide fé-
 » reux. On ne trouvoit de sang ni dans l'aorte, jus-
 » qu'aux subdivisions crorales, ni dans les ar-
 » tères, jusqu'aux subdivisions brachiales, ni dans

» les veines congénères, ni dans la systole des vais-
 » seaux hépatiques, ni dans aucun des sinus du cor-
 » veau. En incisant profondément les cuisses dans
 » l'épaisseur des chairs musculaires, il s'écouloit un
 » sang liquide & noir en petite quantité; en toute
 » autre partie il ne s'en écouloit point; les chairs
 » des muscles qui recouvrent le thorax étoient af-
 » fectées rouges; celles des extrémités l'étoient moins.

» Il est à remarquer que cette absence du sang
 » s'est également rencontrée dans les ouvertures
 » qui ont été faites sur les lieux mêmes où la ma-
 » ladie s'est déclarée, qu'elle est d'accord avec la
 » décoloration générale, observée dans toutes les
 » parties naturellement rouges, & sur toutes les
 » surfaces où le système capillaire reçoit évidem-
 » ment le sang rouge; on peut donc la regarder
 » comme un état spécialement dépendant de la
 » maladie, se démontrant par des signes évidens
 » dans tous ses temps, & arrivant à son comble lors-
 » que le mal est à son terme & à son dernier période.

» Frappé de ce phénomène, ainsi que de l'état
 » généralement fait de tous les organes, confi-
 » dérés dans leur substance propre, nous pensâmes
 » aussitôt que l'usage des martiaux eût été peut-être
 » plus convenable au traitement de cette maladie,
 » que celui des amers simples, des antiscorbuti-
 » ques, & surtout des mercuriaux. Nous savons que
 » le quinquina lui-même avoit été donné sans suc-
 » cès; nous nous déterminâmes donc aussitôt à
 » changer le traitement, & sans abandonner les to-
 » niques que fournissent les amers, les antiscorbu-
 » tiques & le kina, nous nous proposâmes de donner
 » le fer à forte dose; nous prescrivîmes un opiat
 » d'un gros de quinquina comme tonique, & d'un gros
 » de muriate d'ammoniaque comme stimulant, &
 » d'un gros de limaille de fer porphyrisée. Cette
 » dose devoit être consommée en un jour par cha-
 » que malade. Ayant depuis observé que les mala-
 » des éprouvoient de temps en temps des douleurs
 » déchirantes dans les entrailles, nous avons sup-
 » primé le muriate d'ammoniaque, & les douleurs
 » ont cessé.

» Nous craignons que le triste sort de ce premier
 » malade n'influit sur les dispositions morales de
 » ses camarades. Nous n'eûmes aucun obstacle à
 » vaincre à cet égard; l'espoir que l'ouverture du
 » corps seroit découvrir la nature du mal & met-
 » troit sur la voie d'un traitement plus heureux,
 » sans leur ôter le regret de la perte de leur com-
 » pagnon, l'emporta de beaucoup sur ce dernier
 » sentiment, & sans doute cette disposition d'esprit
 » leur fut favorable.

» En effet, le traitement ayant été établi sur des
 » bases que nous venons d'indiquer, nous ne pûmes
 » pas méconnoître, au bout de huit jours, les signes
 » d'un changement heureux; les premiers indices
 » de ce changement ont été d'une part, la saillie
 » évidente des veines du bras bien au-delà du cou-
 » lume qu'elles avoient précédemment; puis dans
 » la face palmaire du poignet, les traces colorées

» des vaisseaux qui deviennent sensibles à travers la
» peau; d'une autre part, la faculté de monter
» l'échelier de l'hospice, sans avoir besoin de s'ar-
» rêter. Les malades nous monstroient chaque jour
» comme une découverte, de nouveaux vaisseaux
» qu'ils prétendoient n'avoir point vu la veille, &
» réellement la conjonctive, le revers des pau-
» pières, l'intérieur des lèvres, les gencives & la
» langue se coloroient évidemment; l'appétit de-
» venoit plus franc, & les digestions encore va-
» riables, se font successivement régularisées. Un
» dévoiement calmé par le diacondium, ne fut
» pas un accident de longue durée. Aujourd'hui
» ces hommes sont, dans Paris, des tourtes
» très-estimées, sans éprouver de fatigues; sen-
» timent les battements du cœur leur ont été
» long-temps incommodes, & n'ont pas encore
» entièrement disparu.

» Il en est cependant un dont le rétablissement
» n'a pas suivi la même progression, & qui, tou-
» menté du mal de tête fréquents, voit paroître
» tout à coup d'une issue peu favorable. Nous
» avons appris, & nous nous sommes convaincus
» par nous-mêmes, qu'il existoit chez lui des
» causes étrangères à la maladie commune, & dont
» la nature étoit telle, qu'elles pouvoient à elles
» seules amener de grands accidens. Nous croyons
» être parvenus à les écarter: depuis ce temps, en
» effet, ce jeune garçon a repris de l'appétit, de
» l'activité; & quoique moins avancé que ses com-
» pagnons, il suit aujourd'hui la même progression
» qui a amené les autres au point d'amélioration au-
» quel ils sont parvenus. Ces hommes aujourd'hui
» sont d'une coloration peu différente de celle qui
» leur est naturelle, & la peau palmaire de l'avant-
» bras, dont la peau est plus transparente que celle
» de autres parties visibles de l'extérieur du corps,
» a maintenant une couleur de chair très-sensibi-
» le à ce qu'elle doit être dans l'état de santé. Il y
» a trois ans que ces hommes sont à l'Ecole de
» médecine.

» D'après ces phénomènes & d'après l'état phy-
» sique auquel nous ne doutons pas qu'ils corres-
» pondent, il nous semble que l'on pourroit donner
» à cette maladie le nom d'*anémie*, ou privation
» de sang, imaginée par Linnæus, & la distinguer
» alors de l'anémie chlorotique, de l'anémie con-
» sensitive, suite de différentes maladies; des ané-
» mies qui dépendent des diverses causes dont
» l'auteur fait mention, & de plusieurs autres sur
» lesquelles quelques-uns de nos confrères nous
» ont fait part de leurs idées, & dont ils nous ont
» promis de nous communiquer les détails; mais
» ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une discussion
» approfondie en cet égard; nous espérons être dans
» le cas de poursuivre nos observations sur plu-
» sieurs autres ouvriers également affectés par les
» mêmes causes, & dans le même lieu, & peut-
» être alors pourrâmes-nous prononcer avec plus de

MÉDECINE. Tome X.

certitude, sur ce que nous ne professons ici que
» comme des probabilités. » (L. J. M.)

MINEURS (Maladies des). (*Hygiène.*) On di-
» signe, en général, sous ce nom de *mineurs*, les
» ouvriers qui sont employés dans les mines à une
» grande variété de travaux dont plusieurs sont aussi
» dangereux que pénibles.

Ces travaux ont pour objet, en général, de
» former la galerie & les puits pour extraire la
» mine de son gîte, dans les ouvrages à gra-
» dins, pour le transporter hors de la mine,
» pour le préparer par des treillages, des bocar-
» dages, des lavages; & d'autres travaux tout di-
» rigés pour lutter sans cesse contre les obstacles
» & les dangers dont le mineur est environné; pour
» soutenir, par exemple, les parois des excavations
» de la mine, par de la charpente ou de la maçon-
» nerie, pour favoriser la circulation de l'air, &
» pour épuiser les eaux qui se rassemblent conti-
» nuuellement au-dessus de la tête des travailleurs,
» ou dans le fond des souterrains. On conçoit aisé-
» ment le danger d'une pareille condition; les An-
» ciens, qui en avoient été frappés, ne forçoient que
» les esclaves & les criminels au travail des mines.
» On se rappellera sans doute que les premiers chri-
» tiens y furent souvent condamnés, & l'on n'a
» point oublié la lettre que saint Cyrille leur
» adressa pour les engager à conserver leur foi &
» leur courage dans une si pénible épreuve.

Les mineurs sont exposés à toutes les causes de
» souffrance & de maladie, qui dépendent de
» l'exercice des autres professions insalubres, soit
» par le milieu particulier dans lequel les ouvriers
» qui les exercent sont obligés de vivre, soit par la
» violence & le danger des mouvements; des ef-
» forts auxquels ils se livrent, & qui produisent
» pour eux un grand nombre d'accidens & de
» blessures. Ils ont en outre des maux & des dangers
» qui ne sont que pour eux, & qui rendent leur
» existence aussi précaire que misérable.

L'insalubrité propre aux mines, résulte surtout
» d'une privation très-prolongée de lumière, de
» l'humidité, de l'absence d'un grand nombre de gaz
» & d'émanations diverses. (*Voyez* Mises.)

On manque entièrement de documents exacts
» sur la mortalité des mineurs; mais on s'accorde en
» général, pour la regarder comme beaucoup plus
» forte que celle des autres professions.

Agricola prétend avoir vu au mont Cnapax des
» femmes de mineurs qui avoient eu jusqu'à sept
» maris.

On ne trouve guère dans Ramazzini que des
» lieux communs & des généralités assez peu in-
» structives sur les maladies des mineurs. Ce savant,
» dont les intentions étoient d'ailleurs si estima-
» bles, manquoit malheureusement de données posi-
» tives & d'observations exactes sur ce sujet, & sur
» les maladies des artisans en général. V

plus particulièrement aux mineurs, sans en indiquer la cause, l'asthme, la pleurésie, l'apoplexie, la cachexie, l'œdème des pieds, la chute des dents, les ulcères des gencives, les douleurs & le tremblement des membres, en concluant de cette énumération, que les pommons & le cerveau sont principalement affectés chez les mineurs.

Il y a aussi, ajoute l'auteur, des espèces qui épouvantent, qui attaquent les mineurs, & qui, au rapport d'Agricola, ne sont chassés que par les prières & par les jeûnes.

Nous venons de remarquer, en général, que la plupart des dangers & des causes d'insalubrité qui menacent les mineurs, rentrent dans l'insalubrité de plusieurs autres professions : tantôt ces causes, ces périls, sont un bien plus grand nombre dans les mines que dans les autres ateliers ou les autres milieux où travaillent les différentes classes d'ouvriers : quant aux causes d'insalubrité qui attaquent plus particulièrement les mineurs, ce sont l'humidité, divers miasmes, l'insécurité, divers gaz délétères, mais principalement l'azote, le gaz acide carbonique, le gaz oxyde de carbone, le gaz hydrogène sulfuré. Il est certain, d'une autre part, que le plus grand nombre de ces causes d'étranglement plus particulièrement les fontions de la peau, & affectent les organes de la respiration & de la circulation, ce qui produit en effet les maladies les plus communes parmi les mineurs, savoir, le scorbut, la leucopneumonie, différentes espèces d'hydropisie, plusieurs variétés de phthisie & de phlegmasies chroniques de différents viscères, &c.

Certaines mines renferment en outre différentes causes d'insalubrité qui leur sont propres. (Voyez ARSENIC, CUIVRE, MERCURE, MINES DE CHARBON DE TERRE, &c. &c.) (L. J. M.)

MINIUM. Mot emprunté du latin pour indiquer un chaux de plomb coloré en rouge par le fer, vulgairement le *vermillon* (deutoxyde de plomb rouge des chimistes modernes).

Dès l'année 1770 on découvrit en France des procédés pour préparer le minium que les Anglais & les Hollandais avoient fabriqué (1), & fourni au commerce pendant long-temps (2).

Le minium est plus employé dans les arts que dans la médecine; on lui donne ordinairement la forme d'emplâtre, & il n'est pas inutile de remarquer qu'il entre dans l'emplâtre de Nuremberg & dans l'onguent bruis, si souvent mis en usage pour favoriser la cicatrisation des ulcères syphilitiques.

Les artisans qui fabriquent le minium, & ceux qui sont employés à des préparations dont il fait partie, tels que le *stint-glass*, la composition de la

convertie de plusieurs poteries, sont sujets à la colique métallique, ou colique de plomb. (Voyez PLOMB.) (L. J. M.)

MINORATIF. Du verbe *minorare* de la basse latinité, qui exprime l'idée d'amoindrir, d'affaiblir, &c.

On a désigné sous ce nom une classe particulière de purgatifs inconnus aux Anciens, & que l'on introduisit dans la matière médicale à deux grandes époques, savoir, au moment des relations très-étendues des Arabes avec l'Europe, & après la découverte du Nouveau-Monde & du Cap de Bonne-Espérance.

On a désigné aussi les mêmes médicaments sous le nom de *laxatifs*, & l'on comprend dans cette catégorie, sans pouvoir les distinguer entièrement des autres purgatifs plus forts, la manne, *mannâ*, la casse, *cassia fistula*, le tamarin, *tamarindus indica*, & même l'huile de ricin, lorsqu'elle est bien préparée & mêlée à une petite quantité d'huile d'amandes douces & d'éther.

Les minoratifs ont cela de remarquable, que, dans tous ou presque tous, l'élément purgatif se trouve allié à une substance alimentaire, & que, d'une autre part, ces médicaments provoquent plutôt des déjections muqueuses que séreuses, sans exciter de douleurs, excepté dans les cas de susceptibilité excessive des intestins, ou de l'administration d'une dose trop forte du médicament. Un auteur moderne d'ailleurs estimable, M. Barbier d'Amiens, nous parait s'être trompé, en donnant une théorie assez compliquée sur le mode d'action des minoratifs (1), qui, suivant cet auteur, relâcheroient le tissu de l'estomac & agiroient ensuite comme un corps étranger lorsqu'ils seroient parvenus dans le canal intestinal : ce qui rentre dans l'opinion vulgaire, que la manne & les laxatifs du même genre purgent par indigestion.

La plupart de ces minoratifs ne produisent guère des effets sensibles que dans un petit nombre de cas particuliers, & lorsqu'ils ne sont pas indiqués. Les travaux les plus récents des chimistes ont fait d'ailleurs découvrir dans le plus grand nombre, des parties constituantes assez actives pour augmenter la sécrétion intestinale; nous pensons, en conséquence, que sans doute l'appareil de la digestion se conduit avec les minoratifs comme avec les substances alimentaires, mais que leur digestion est accompagnée d'une excrétion séro-muqueuse beaucoup plus abondante, ce qui doit être attribué aux parties excitantes que ces médicaments contiennent, & dont l'effet est surtout bien évident dans la manne & dans l'huile de ricin.

(1) Voyez les Mémoires de l'Académie des sciences, année 1679.

(2) Voyez l'article *Laxatif* du Dictionnaire des sciences médicales, tome XXVII, page 324 & suiv.

On emploie, en général, les minoratifs à la fin & pendant le traitement des maladies aiguës, dans tous les cas où l'indication de purger le rencontre avec des symptômes d'irritation, telles que la soif, la sécheresse, la rougeur de la langue, &c.

Dans les simples indispersions, mais surtout dans les convalescences de plusieurs maladies chez les enfans, un de ces purgatifs, la manne, est donné avec le plus grand succès à plusieurs reprises, soit pour opérer une douce dérivation, soit pour exciter une sécrétion intestinale trop languissante, soit enfin pour débarrasser le canal intestinal des mucosités qui s'y sont amassées à la suite des engorgemens, d'un embarras gastrique, ou même de petites indigestions ou de digestions laborieuses répétées, en donnant lieu à différens symptômes de dérangement, dont la véritable cause est le plus souvent méconnue.

Du reste, la plupart des minoratifs s'administrent à des doses assez fortes, à la dose d'une once, de deux, de trois onces même. On peut en supporter l'usage pendant plusieurs jours de suite, comme on le voit pour la manne & pour l'huile de palmaris, employées chez les enfans, dans le traitement de plusieurs affections catarrhales, ou données comme un puissant dérivatif pour combattre une ophthalmie du deuxième ou du troisième degré. (L. J. M.)

MIRABELLE. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. Alimens.

Section I. Végétaux.

La mirabelle est une espèce de petite prune jaune, d'un suc excellent.

On en distingue deux espèces, des grosses & des petites. On en fait des confitures où il faut très-peu de sucre quand elles sont bien mûres, & qui valent presque celles d'abricots. On en fait sécher pour avoir des pruneaux. Cette prune se digère très-facilement, parce qu'elle est très-sucrée, & je crois qu'en n'en fait pas tout-à-fait autant de cas qu'elle le mérite, parce qu'elle ne présente qu'un petit individu. (Macquart.)

MIRAGE. Les marins désignent sous ce nom un phénomène d'optique, suivant lequel les objets qui sont vus très-près de l'horizon paroissent quelquefois doubles, circonstance dont le savant Blonde parvint à découvrir la véritable cause dans le terrain de la Basse-Egypte. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Physique.)

MIREBEAU (Eaux minérales de). Mirebeau est une petite ville, capitale du Mirebalais, à cinq lieues de Poitiers. Il y a près de cette ville une source minérale, que M. Gallot, d'après le témoignage de M. Aumont médecin à Mirebeau, dit sulfureuse. (Macquart.)

MIROBOLAN. (Voyez MYROBOLAN.)

MIROTTIERS (Maladies des). Les maladies des miroitiers sont toutes celles des artisans qui se trouvent exposés à l'action du mercure. On trouve aussi les miroitiers dans la liste des ouvriers que l'on a le plus souvent occasion de traiter à la Charité de la culigne de plomb, maladie à laquelle ces artisans ne pourroient être exposés qu'autant que l'étain qui sert dans l'alliage pour mettre au tain, seroit mêlé à quelques parcelles saturnines. Du reste les miroitiers qui emploient le mercure à froid, ou plutôt les diamants de glaces, sont bien moins exposés au frémissement mercuriel que les doreurs. (Voyez MAREVAS & TREMBLEMENT MERCUREL.) (L. J. M.)

MIRON (Marc) étoit des environs de Tournai. Il fut reçu docteur en la Faculté de Paris, en 1558, & devint médecin de Henri III, lorsqu'il n'étoit encore que roi de Pologne. Lorsque ce prince quitta cette couronne pour aller prendre possession de celle de France, Miron lui fut fort utile en le supplantant malade, & lui donnant le temps de s'évader.

Henri III le récompensa en le nommant premier médecin de la personne, & en lui donnant la confiance dans des circonstances délicates.

Miron est le premier qui ait été revêtu du titre de *Comes archiatrorum & sanctorum consilium*. Il mourut en 1608, étant doyen d'âge de l'école.

(R. GROTTOY.)

MIRTE. (Voyez MYRTE.)

MIRTILLE. (Voyez MYRTILLE.)

MIRTILLE, AIRELLE, RAISIN DE BOIS, MORETTE. (Matière médicale.) Le goût des fruits de mirtille est assez agréable, quoiqu'il aigre. On conseille d'en faire un remède utile contre les cours de ventre bilieux. On a aussi vanté ses fruits séchés & réduits en poudre, à la dose d'un gros jusqu'à deux, ou en décoction, depuis une demi-once jusqu'à une once, contre la dysenterie; mais nous avons des remèdes bien plus éprouvés & plus sûrs que celui-ci. (Voy. AIRELLE, MYRTILLE, &c.) (Macquart.)

MISANTHROPE, du grec *misos*, je hais, & de *anthropos*, homme; moi à moi, celui qui hait les hommes. (Voyez MISANTHROPIE.)

MISANTHROPIE. Mot à mot, & d'après l'étymologie, haine des hommes.

C'est bien plutôt un travers d'esprit, un caractère particulier, qu'une véritable maladie; toutefois la misanthropie la plus farouche peut se présenter & se présenter en effet assez souvent au début de la mélancolie: elle se rattache alors aux sentimens d'un orgueil exagéré, ou à une impression habituelle & prolongée d'inquiétudes imagi-

naître, ou de crainte, ou de terreur. Du reste, dans cette situation, on lui bûit plutôt les hommes & la société qu'on ne les redoute, soit d'après des idées fausses, des perceptions erronées, soit, & malheureusement trop souvent, d'après des épreuves, des procédés qui ont conduit aux préventions les plus tristes & les plus défavorables : telle fut la mélancolie de Rousseau, que l'on a injustement regardé comme un misanthrope, & qui craignoit les hommes sans les haïr, mais tout en renfermant dans le fond de son âme, le désir passionné d'exercer, par ses écrits, un haut degré d'influence sur le bonheur de ses semblables. (Voyez MÉLANCOLIE, MONOMANIE.)

(L. J. M.)

MISERERE. *Misere mei, miserere.* Mot employé par les Anciens, mais justement critiqué, pour exprimer un état de douleur extrême dans lequel le malade invoque la pitié de Dieu & des assistants. Ce terme a été pris affectivement & d'une manière vicieuse, pour désigner certaines enlignes dans lesquelles des douleurs déchirantes jetent les malades dans des angoisses & une anxiété inexprimables.

Ce mot *colique de misere* doit être banni d'une langue médicale bien faite. Il ne peut peindre que la torture du malade, sans faire connaître le siège ou la nature de l'affection.

En ne le considérant que comme le synonyme d'*ileus* ou de *volvulus*, *ileus* *passio*, *chordapfus*, il ne devoit pas être conservé, car ces expressions sont elles-mêmes fort impropres, & désignent des maladies très-différentes. Dans ces coliques, les douleurs de l'abdomen sont très-vives, continues ou intermittentes, avec constipation, sensibilité au toucher, dépression ou balonnement du ventre, mouvement anti-péristaltique des intestins & vomiturations de matières alimentaires, puis d'une bile jaune, verdâtre, porracée, enfin des matières fécales, &c.

Galen paroît avoir indiqué la *colique de misere* lorsqu'il a dit : *ileus est phlegmone intestini, ita ut nec flatus nec stercorea exant, tormina sequuntur vehementia & cruciatus intolerabiles* (1).

Ces divers symptômes peuvent appartenir à des maladies très-différentes, & dans lesquelles le traitement ne doit pas être le même. On fait que la néphrite calculuse ou vermineuse, les concrétions dans les voies biliaires, les entérites, les gallitres, suites d'empoisonnement, la colique saturnine, la colique de Poitou, la péritonite, la métrite, les ruptures ou déchirures des intestins, de la vésicule biliaire, de la vessie; les plaies pénétrantes de l'abdomen, avec la lésion des organes & l'épanchement dans la péritone, de la bile, de

l'urine ou des excréments, peuvent produire des effets analogues. Les hernies étranglées, les étranglements internes & tous les obstacles au libre cours du résidu alimentaire dans les voies digestives, déterminent des accidents que le vulgaire des médecins appelle *misere*, *ileus*, *puffio*, *ileus*, mais dont les esprits rigoureux & observateurs s'appliquent à étudier les causes, & ne traitent rationnellement qu'après en avoir découvert la nature en s'éclairant du flambeau de l'analyse.

Quelques-unes de ces causes sont encore peu connues, & leurs effets ont été mal décrits dans les auteurs : c'est pourquoi nous nous efforcerons d'en tracer une esquisse complète à l'article *Volvulus*. (Voyez ce mot, ainsi que celui *ILEUS*.)

C'est sous le nom d'*ileus*, *ileus*, *uixis*, qu'Hippocrate a indiqué les symptômes dont nous parlons (1). Les traducteurs l'ont rendu par le mot *volvulus* ou *chordapfus*, & suivant Celse, à *barbatis misere* met. Quelques Anciens ont employé comme synonyme le mot *colica* (2).

Il est des Modernes qui ont rendu le terme *ileus*, *volvulus*, *puffio*, *ileus*, *chordapfus*, *misere* *mei*, par le mot *ischocolia*, *ischia*, *alvus*, & de *uixis*, *retinco*, *alvi retento*. Ils le regardent aussi comme synonyme d'*epistaxis* (*ischia*, Hipp.), *obstructio*, *rebellis*, *obspatio* de Cullen, *stypsis* de Plouquet, *dolor* & *spasmus* *ileus* de F. Hoffmann, *cholera sicca* de quelques autres. (G. DRESCHT.)

MISLA. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. *Aliments*.

Section I. *Végétaux*.

Le *misla* est une boisson que font les Indiens sauvages qui habitent la terre-ferme de l'Amérique, vers l'isthme de Paama. Il y en a de deux sortes. La première se fait avec le fruit des plantes seichement caudex. Après l'avoir rôti dans la gousse, on l'écrase, on ôte la peau, & on met le jus qui en sort avec une certaine quantité d'eau.

La *misla* de la seconde espèce se fait avec le fruit du platane fêché, & dont on a formé une espèce de gâteau. Pour cet effet on cueille le fruit dans sa maturité, on le fait fêcher à petit feu, sur un gril de bois, & l'on en fait des gâteaux, qui servent de pain aux Indiens. (MACQUART.)

MISOGAME, de *mis*, haine, & de *game*, mariage.

Cette disposition ne pouvoit appartenir à la médecine en général, ou à un vocabulaire de la médecine mentale en particulier, que dans le cas

(1) *Diffinit. medic.* n.º 273. — Charac. tom. II.º

(1) *Aphor.* lib. III. — *Aphor.* 22.
(2) *Nesbrou.* n.º 116. — *Syll.* § I. *Pr. medic.* c. 15. — *P. Baudette*, l. 4, c. 7.

où elle se manifesterait d'après quelques perceptions erronées, & avec une exagération vésanique qui n'auroit aucun rapport avec les idées acquies, & le caractère reconnu de l'individu qui éprouveroit accidentellement une pareille aversion.

MISOGYNIE. (*de misus, haine, & de gyno, femme.*) Aversion pour les femmes, ce qui suppose un sentiment tout-à-fait opposé, un vice de cœur, ou erreur d'imagination qui pourroit bien se rattacher par des liens secrets, dans certaines circonstances, à une imperfection physique ou organique. (L. J. M.)

MISUM. (*Hygiène.*)

Partie II. Matière de l'Hygiène.

Classe III. *Ingesta.*

Ordre I. *Aliments.*

Section III. *Alimentation.*

C'est le nom que les Chinois & les Tartares tonkinois donnent à une liqueur dont ils font une sauce à certains aliments.

On choisit une espèce de choux rouges à feuilles minces, on les sale fortement, & on les conserve dans une étuve, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'aigrir & à dépoler de l'eau. On décante cette eau & on la fait bouillir fortement, jusqu'à ce qu'elle ait une consistance épaisse comme celle de la bière qui n'a point fermenté. Quand cette liqueur est refroidie, on la met dans des bouteilles que l'on expose au soleil pendant l'été, & que l'on met sur un poêle pendant l'hiver : par-là, elle devient de plus en plus épaisse. (*Voyez* Gmelin, *Voyage en Sibérie.*) (Macquart.)

MITHRIDATE. Préparation très-composée, comme la thériaque, tombée en désuétude.

Mithridate VI., roi de Pont, s'étoit tellement habitué au poison, à ce que dit l'histoire, qu'il ne put s'empoisonner. Il avoit inventé un contre-poison qui, au rapport du Sésenau Samosien, étoit composé de vingt espèces de rhues, d'un grain de sel, de deux noix & de deux figues seches. L'on voit, d'après cela, qu'il n'est point l'auteur de l'antidote qui porte encore aujourd'hui son nom. (R. GORRAUD.)

MITRE. (*Facies capitalis.* Capeline.) Espèce de bandage pour les plaies de tête, employé & décrit par Hippocrate.

MITTE. (*Ophthalmis des vidangeurs.*) On a donné aussi ce nom aux émanations alcalines & irritantes qui produisent cette ophthalmie. L'irritation que ces vapeurs occasionnent est très-vive, & s'étend aux fosses nasales, souvent avec une cécité qui dure pendant deux ou trois jours. L'obscuration la plus profonde & l'application sur les yeux de compresses imbibées d'eau froide, forment le traitement de la mitte.

M. le professeur Hallé, dans son rapport sur les fosses d'aisance, avoit eu sur la suite des idées exactes, qui s'éloignent un peu de l'opinion que Lavoisier avoit adoptée sur la cause de cette maladie, & qui se sont trouvées confirmées depuis par les expériences fondamentales de M. le professeur Dupuytren. (*Voyez*, pour plus de détails, *Mémoires, Vidangeurs* (Maladies des).)

MIVA. On trouve désigné sous ce nom, dans le *Lexicon* de Castelli, un médicament composé, qui s'administreroit sous la forme sirupeuse.

MIXTE. On donne ce nom à toutes les substances composées de différentes parties.

MIXTION. Synonyme de mélange. (*Voyez* MÉLANGE.)

MIXTURE. (*Matière médicale.*) La mixture est un remède magistral qui doit être formé sur-le-champ, & par le simple mélange, c'est-à-dire, sans décoction, sans infusion, &c.

Gaubius distingue trois espèces de mixtures : la mixture étendue, la mixture moyenne & la mixture concentrée. La première n'agit qu'à grandes doses & même à doses répétées ; la deuxième, à doses moindres ; enfin, la troisième à très-petites doses. On peut considérer la première espèce comme la composition plus connue sous le nom de *julep* (*Voyez* Julep) ; la seconde est tout simplement une potion ; la troisième n'est autre chose que ce qu'on nomme *goutte*. (*Voyez* ces mots dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie.*) (Macquart.)

MIZAUD (Antoine), natif de Mont-Lacon dans le Bourbonnois, fit une partie de ses études à Bourges & les acheva à Paris, où il mourut en 1578. Ne s'étant occupé que d'astrologie judiciaire, de mathématiques & de jardinage, la plupart de ses ouvrages prouvent la folie & son goût pour une science vaine & chimérique, & ne méritent pas même la peine d'être cités.

(R. GORRAUD.)

MNÈME. MNÉMONEUTIQUE, *de mnès, mémoire.* On pourroit désigner sous ce titre, tout ce qui se rapporte à la mémoire, considérée dans l'état de santé & de maladie, les moyens d'hygiène philosophique & de haute thérapeutique, qui ont pour objet d'en favoriser l'exercice, d'en assurer les opérations ; ce que l'on a appelé la *mnémotechnique*, l'art de la mémoire, qui ne pourroit pas avoir été étranger aux Anciens, & dont l'invention a été attribuée à un certain baron d'Arles, qui en fit un mystère, ainsi que ses initiés & ses disciples les plus fameux.

On a donné aussi l'épithète de *mnème* à un bandeau céphalique, dans une ancienne édition de la pharmacie de Schroeder. (*Voyez* Castelli, *Lexicon*, pag. 505. 1746.)

MNÉMÉCÉPHALIQUE. Ou a désigné sous ce titre un baume auquel on attribuait la propriété merveilleuse, & dans un langage hyperbolique, de rendre perpétuel le souvenir des choses que l'on avoit apprises: arcanes qui fut acheté, dit-on, dix mille florins à un docteur anglais, par Charles, duc de Bourgogne. Cette préparation a été décrite par Sennert & par Schroeder, qui lui a donné ce nom. (L. J. M.)

MNÉMON, médecin natif de Sidé en Pamphlie, vécut dans le trente-huitième siècle du monde. On lui a anciennement attribué d'être l'auteur des caractères qui se trouvent à la fin de quelques histoires des maladies dont Hippocrate fait mention dans son troisième livre des *Epidémiques*. Galien le rapporte d'après d'autres écrivains. Il dit que Mnémon prit un exemplaire des Œuvres d'Hippocrate, dans la bibliothèque de Ptolémée Evergète, sous prétexte de vouloir expliquer le troisième livre des maladies épidémiques, & qu'il y ajouta les caractères dont il est question. Ce trait est cependant rendu différemment par certains auteurs. Ils conviennent que l'exemplaire des ouvrages d'Hippocrate dans lequel se trouvoient ces caractères, étoit dans la bibliothèque d'Alexandrie; mais ils ajoutent qu'il y avoit été apporté de Pamphlie en Egypte par Mnémon, qui l'avoit vendu à Ptolémée. Ils assurent même qu'il étoit écrit au titre de cet exemplaire, que Mnémon Sidite l'avoit corrigé & qu'il avoit été envoyé par mer. (*Extrait d'Éloy.*)

(R. GORRHOY.)

MNÉMONIQUE, du grec *mnēma*, mémoire. Cet art, qui se rattache sous plusieurs rapports à la physiologie & à l'hygiène, est fondé sur l'association purement mécanique de certains mots, de certaines consonances, soit mécaniques, soit rationnelles, avec de longues séries de perceptions ou d'idées que l'on y attache.

Chaque homme laborieux se fait en quelque sorte une mnémonique particulière à son usage, & il paroît que les anciens orateurs en général, & Cicéron en particulier, portèrent assez loin cette espèce d'industrie: on a voulu tentois attribuer la mnémonique spéciale comme une découverte au baron de l'Arétin, qui eut des disciples, des initiés plus ou moins célèbres. Nous voyons toutefois que dès le seizième siècle & le dix-septième, Pierre de Ravenna, Schenkel, firent des expériences publiques de mnémonique, en France & à Paris.

Une certaine application très-délicate & très-difficile de la mnémonique ne seroit peut-être par inutile pour exciter la mémoire, souvent profondément altérée à la suite d'une commotion du cerveau, ou d'un certain degré d'apoplexie.

(L. J. M.)

MNÉSITHÉE (qui se souvient de Dieu). Il paroîtroit que l'on auroit déigné sous ce nom, dans quelques anciens ouvrages, une espèce particulière de visonnaires qui auroient mêlé intempérativement aux choses les plus indifférentes de la vie, le souvenir de la divinité, & chez lesquels cette perception exclusive & dominante auroit été un symptôme évident d'aliénation.

Mnésitrée, de *mentes*. Galien a désigné sous ce nom un médecin d'Athènes. (Voyez Galien, de *Arte curandi ad Glaucodem.*) Dioscoride a donné aussi ce nom à une plante.

Mnésitrée étoit d'Athènes, & vivoit, à ce que l'on croit, dans le trente-huitième siècle du monde. Galien en parle comme d'un célèbre anatomiste, & Celse le met au rang des plus habiles médecins. Oribase fait mention d'un autre Mnésitrée qui étoit Cyzicénien. (*Extrait d'Éloy.*)

(R. GORRHOY.)

MOBILE. Expression que les médecins emploient comme les gens du monde, pour indiquer la disposition, l'aptitude aux mouvements, à l'émotion, considérées comme un trait principal du tempérament & du caractère, & d'où résulte le plus souvent une inconstance, une variation dans les goûts, dans les impressions, l'impossibilité d'être fixé, &c.

La pratique de la médecine fait rencontrer souvent dans les hautes classes de la société plusieurs exemples de ces complexions & de ces caractères; la mobilité se rattache à la disposition que M. le professeur Hallé fait renfermer dans les constitutions dépendantes du système nerveux, & qu'il désigne sous le titre de *susceptibilité* rapide ou augmentée. Cette manière d'être, devenue habituelle, & portée à un certain excès, exclut absolument, dit ce savant professeur, par l'impossibilité d'une attention suffisante, le rapport exact de la sensation avec son objet, la netteté dans les idées & la justesse dans les jugemens.

C'est le caractère particulier & le mode de complexion le plus commun des enfans, des femmes, des peuples du Midi, mais surtout des Italiens.

(L. J. M.)

MOBILITÉ, f. f. La propriété, l'habitude d'être mobile; on l'emploie aussi pour désigner la faculté de se mouvoir, le principe du mouvement dans les animaux, dont le ton ou la tonicité, la contradictilité, &c., ne font que des modifications. (*Voyez* **MUTILITÉ**.)

La mobilité, considérée dans sa première acception, pourroit aisément devenir le sujet d'une suite de liens communs & de considérations générales qui nous paroissent très-étrangères à notre sujet, & pour lesquels nous renvoyons à certains auteurs qui écrivent sans penser, ou qui, du moins, sont aussi pauvres d'idées que prodigues de

citations & de paroles. Du reste, sous cette dénomination que l'on prodigue peut-être trop souvent, les médecins désignent, ainsi que les gens du monde, la susceptibilité que développent, dans une haute civilisation, l'étendue de l'existence, les raffinemens du luxe : susceptibilité qui rend toutes les impressions, soit extérieures, soit intérieures, soit physiques, soit morales, plus vives, plus promptes, plus communicatives qu'elles ne devraient être.

On s'accorde assez généralement, pour attribuer cette manière d'être, à une délicatesse d'organisation qui exagère l'influence de l'action nerveuse, & d'où résulte en même temps une sensibilité plus vive & une disposition convulsive, mode de complexion qui ne parait pas avoir été observé chez les Anciens avant le siècle d'Auguste, & qui n'est devenu assez général chez les Modernes, pour attirer l'attention des observateurs, que vers la fin du dix-septième siècle & au commencement du dix-huitième. Un état incomplet d'hystérie & d'hypocondrie, & cette variété de souffrances & de perturbations que l'on a désignées sous le titre de *vapeurs*, de *maux de nerfs*, sont les symptômes les plus prononcés & les effets les plus fréquens de la mobilité nerveuse chez les adultes. Cette mobilité chez les enfans se rattache à des dispositions différentes, & se manifeste principalement à certaines époques par les convulsions, dont le traitement a rien de commun avec celui des vapeurs & des névroses abdominales dont nous venons de parler.

Une mobilité perpétuelle, un tremblement plus ou moins fort, présentent des symptômes qui appartiennent à plusieurs affections nerveuses ou convulsives, telles que le tremblement sénile, le tremblement des doreurs ou tremblement mercuriel, la danse de Saint-Guy, le tarentulisme. (Voyez ces mots.)

Un penchant extraordinaire à l'imitation, une disposition involontaire & sans aucune espèce d'émotion ou d'affection, à pleurer en voyant pleurer, à s'irriter ou s'agiter à la vue d'un homme en colère, à éprouver enfin momentanément les sentimens que l'on voit fortement exprimés, ou répéter les mouvemens dont on est témoin, jusqu'au point de pouvoir contraindre ainsi des habitudes d'ordonnances & des maladies convulsives, se rapportent aussi à une mobilité nerveuse, mais à une mobilité nerveuse exagérée & morbide. Un des exemples les plus remarquables de cette manière d'être, a été cité par Boerhaave; c'étoit celui d'un vieillard qui répétoit fidèlement, & sans pouvoir s'en empêcher, tous les mouvemens, toutes les actions des autres hommes, qui se faisoient sous ses yeux, & qui éprouvoit un sentiment très-pénible & une véritable oppression, lorsque l'un s'opposoit à ses gesticulations convulsives.

(L. J. M.)

MOCHLIE, de *mochlos*, levier. C'est le nom employé par Hippocrate pour la réduction de certaines luxations. (Voyez le Traité De fracturis & articulis.)

MOCHLIQUE, de *μωχλις*, j'ébranle, je secoue. Dénomination sous laquelle on a désigné une méthode de traitement très-violente par les purgatifs, & principalement dirigée d'une manière empirique, & dans les vues d'une médecine perturbatrice, dans la colique des peintres.

Voyez, dans ce Dictionnaire, le mot vulgaire ou populaire **MACARONI**, dont les religieux de la Charité se servirent pour désigner la préparation qu'ils employèrent les premiers pour cette médication. (Voyez PLOM, COLIQUE PAR LE PLOM, ainsi que le petit Traité d'Hippocrate, ayant pour titre *Mochlus*; il se trouve placé dans l'édition latine de Haller, à la suite du Traité De fracturis & articulis, dont il n'est en quelque sorte qu'un abrégé qui n'est pas cependant à négliger. Voyez *Artis medicæ principes*, ed. Halleri, tom. 1^{er}, pag. 408.)

MOCHLIQUES ou **DRASTIQUES**. On a désigné sous ce nom, & d'une manière générique, les purgatifs les plus forts, tels que ceux que l'on tire des baies du nerprun, de la coloquinte, de la gomme-gutte, &c., sans remarquer d'ailleurs que d'autres purgatifs plus doux, tels que le séné ou la rhubarbe, peuvent agir comme mochliques ou drastiques, lorsque l'irritabilité du canal intestinal est très-développée, & qu'il est presque impossible de la solliciter sans exciter des douleurs très-vives & d'abondantes évacuations. Du reste, les substances désignées sous ce titre de *mochliques* ne sont plus guère employées aujourd'hui que dans quelques médicamens composés, & que l'on administre dans le traitement des hydropisies. (Voyez PURGATIFS.) (L. J. M.)

MODE, du latin *modus*, manière d'être. Ce mot qui, dans son acception générale, n'appartient point à la médecine, est employé cependant quelquefois d'une manière technique dans les locutions *mode d'action*, *mode d'organisation*, &c. (Voyez ORGANISATION.)

MODES. Usages. Ce mot est employé pour indiquer les habitudes, les goûts plus ou moins durables de certaines nations, dans ce qui concerne plus particulièrement les vêtemens & la parure. La mode, considérée sous le point de vue de l'hygiène, a sonné dans tous les temps, des sujets d'observations & des motifs de remarques plus ou moins importantes aux médecins & aux philosophes. (Voyez COSMÉTIQUES, CORPS À LA MODE, PARURE, POURPOINT, VÊTEMENTS, &c.)

La mode quelquefois aussi s'est étendue à des objets beaucoup plus graves que les habillemens ou la parure. La médecine elle-même n'a pas toujours été à l'abri des caprices, comme il sera

faible de s'en convaincre en parcourant le tableau mobile de cette partie des connaissances.

(L. J. M.)

MOEBIN (Godefroi), de Lauche en Thuringe, où il naquit en 1611, fut reçu docteur en médecine à Jena en 1640, & devint médecin de Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, d'Auguste, duc de Saxe, & de Guillaume, duc de Saxe-Weimar. Il mourut à Hall en 1664, à cinquante-trois ans, laissant quelques ouvrages qui ne sont que des compilations.

(R. GERRARD.)

MOELLE, *medulla*. (*Hygiène*.)

Partie III. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingrés*.

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux.

La moelle est une substance grasse, oléagineuse, que l'on trouve en masse au milieu des os longs, & qui remplit les cellules des extrémités spongieuses des mêmes os.

La saveur agréable & douce du suc médullaire, fait croire que c'est un extrait des parties les plus délicates, & les plus fines de la portion huileuse du sang, qui se trouve continuellement filtrée dans le tissu vésiculaire.

La moelle abonde dans les jeunes animaux; elle s'oblitére en su dessèche à mesure qu'ils arrivent à un âge avancé, ce qui rend alors les os plus faciles à casser.

La moelle donne un aliment très-sain, très-subsistant & très-délicat. Elle doit être mangée chaude, sans quoi elle est désagréable au goût. Les personnes qui ne digèrent pas bien les corps gras, doivent s'en abstenir, ainsi que les bilieux & les mélancoliques. (MACQUART.)

MOELLE ALONGÉE. C'est le nom sous lequel on a improprement & ridiculement désigné cette partie du cerveau qui en forme le centre, par le concours ou la réunion de ses différentes parties (le méso-encéphale ou mésoencéphale de M. le professeur Chaussier, des mots grecs *μῆλον*, milieu, & *ἐνέφαλον*, tête). Par sa situation, sa composition, le méso-encéphale, dit ce savant professeur, est en quelque sorte la partie moyenne & centrale de l'organe encéphalique, le nerf qui réunit les différents faisceaux dont il est composé, & il comprend uniquement la portion qui se trouve entre le cerveau, le cervelet, & forme la paroi antérieure du quatrième ventricule. Son étendue est par conséquent peu considérable; elle est limitée en haut, du côté du cerveau, 1°. par un sillon ou un enfoncement circulaire, large & profond en devant, superficiel & peu marqué en arrière; 2°. par la commissure postérieure du cerveau; sur les côtés, par la base des pédoncules du cervelet; en bas, ou du côté de l'occipital, par un rétrécissement

semi-circulaire, en manière de collet, qui donne naissance au prolongement rachidien.

On évalue à la soixantième ou à la soixante-cinquième partie du poids total du cerveau, la quantité du méso-encéphale ou de la moelle allongée, d'ailleurs beaucoup plus consistante, & formée presque entièrement de substance blanche. Les différentes portions que l'on distingue dans la moelle allongée sont le pont de Varole (protubérance annulaire), à la face antérieure sur la base du crâne, les tubercules quadrijumeaux de Winslow (tubercules du mésoencéphale, M. Chaussier). La substance jaune & plus colorée, que l'on a aperçue entre les fibres blanches de la moelle allongée, paroît lui appartenir en propre, & en former un des principaux caractères. On a aussi remarqué que la lame externe de la méninge est toujours séparée de l'intérieur, & que les artères fournies par un tronc qui forme l'union anatomique des deux artères cérébrales postérieures sont petites, mais très-nombreuses. (Voyez le *Traité de l'Encéphale*, par M. Chaussier, pag. 106 & suivantes.)

On avoit du reste une idée bien peu exacte de la moelle allongée où du mésoencéphale, si on le regardoit comme une partie distincte ou séparée du cerveau; elle n'en est qu'une continuation, quasi que la moelle épinière & le prolongement rachidien. Les expériences de Lorry, publiées dans le troisième volume des *Savans étrangers de l'étranger des sciences*, ont eu pour objet de prouver que le principe de la vie avoit principalement son siège dans la moelle allongée. Des expériences plus récentes, & faites avec le plus grand soin par Legalliois, qu'une mort prématurée a enlevé aux sciences physiologiques, ont démontré, d'une part, en quoi les recherches de Lorry étoient défectueuses, & comment, d'une autre part, la cause des mouvements du cœur se trouvant dans la moelle épinière, surtout après la naissance, cette partie de l'encéphale devoit être regardée comme le siège principal de la vie chez les animaux vertébrés. Les lésions organiques que les recherches anatomiques ont fait découvrir dans la moelle allongée, sont principalement les altérations squirreuses & métastatiques; différents états de ramollissement & d'induration.

La privation de l'odorat (*anosmie*), celle de la vue (*amaurose*, ou *goutte serena*), ont été la suite des altérations de cette partie. M. Portal dit en particulier avoir observé une induration dans toute la moelle allongée, mais principalement au pont de Varole, à l'ouverture du corps d'une jeune fille qui, après avoir montré un développement prématuré des facultés intellectuelles, devint stupide & succomba dans un état de consomption qui présentoit toutes les apparences d'une fièvre lente nerveuse.

MOELLE ÉPINIÈRE. On donne ce nom à la partie

de l'encéphale qui, de l'extrémité inférieure, la base du cerveau, s'étend dans le canal vertébral, jusqu'à la hauteur de la première ou de la deuxième vertèbre des lombes, en fournissant dans son trajet un grand nombre de nerfs. C'est le prolongement, la continuation de la moelle allongée, dont elle n'est distinte que par un enfoncement transversal beaucoup plus visible dans l'homme que dans les animaux. Les formes, la structure, la disposition, en un mot, les détails descriptifs concernant la moelle épinière, appartiennent à l'anatomie; nous nous bornerons en conséquence à un petit nombre de remarques sur les résultats de ce genre d'études, qui tiennent de trop près à la physiologie médicale & à la médecine pratique, pour être omis dans ce Dictionnaire.

On remarque une grande analogie entre la composition de la moelle épinière & celle de la moelle allongée. La consistance de la première, très-prolongée dans l'homme adulte, s'affaiblit promptement après la mort, surtout chez les personnes qui succombent à la suite des fièvres adynamiques ou ataxiques, & des maladies chroniques. M. Chaussier croit pouvoir avancer, d'après plusieurs dissections sur des sujets de différents âges, que, chez l'enfant nouveau-né, le prolongement rachidien a plus de consistance que dans l'adulte. On évalue la moelle épinière à la vingt-cinquième partie du poids total du cerveau dans l'homme adulte, & à la quarantième dans l'enfant nouveau-né, proportion qui est beaucoup moins grande dans la plupart des animaux. L'extrémité supérieure (queue de la moelle allongée, & mieux, bulbe rachidien) est renfermée dans le crâne, & se porte directement au trou occipital pour se prolonger ensuite dans toute l'étendue du canal vertébral. C'est par l'ébranlement, la dilacération violente de cette partie, qu'un certain mode de pealaison rendoit la mort des suppliciés beaucoup plus prompte, & tout-à-fait différente de celle qui est produite par la simple strangulation. Les petites faillies du bulbe rachidien, au nombre de six, sont en devant, d'une part, les éminences médiales (corps pyramidaux antérieurs), d'une autre part, les éminences latérales ou olivaires, & en arrière les éminences postérieures (colonnes inférieures du crâne & de quelques anatomies).

Le corps du prolongement rachidien, d'abord un peu aplati de devant en arrière, présente ensuite une forme cylindrique dans toute son étendue, mais en formant deux renflements dont l'un répond à l'origine des nerfs brachiaux, & l'autre à l'origine des nerfs lombaires. Cette partie de l'encéphale est fixée dans la position qu'il lui est propre, par l'arachnoïde qui la recouvre, & s'unit aux parties voisines; on y découvre d'espace en espace des petits filons transversaux que Monro regardoit comme des articulations, disposition qui paroît se prêter avec un grand avantage aux mouvements de la colonne vertébrale. On remarque

aussi que chacune des faces de la moelle épinière a un filon médian qui en partage l'étendue en deux parties égales.

Ce que l'on regarde comme les racines des nerfs, se trouve à une certaine distance de ce filon, disposé régulièrement à chaque face sur deux lignes, sous la forme de filaments blanchâtres, qui se réunissent en faisceaux distincts, pour former des cordons qui sortent par les trous inter-vertébraux. Il importe de remarquer avec Reil & M. Chaussier, que chaque filament nerveux se montre sous la figure d'un tube cylindrique formé par l'arachnoïde, & traversé dans la cavité par de petites lames dont tous les espaces se trouvent remplis par la pulpe molle & blanche de l'encéphale. A son extrémité, chacun de ces filaments présente une sorte de bulbe grisâtre que M. Chaussier appelloit le *bulbe radical des nerfs*.

Nous omettrons de parler ici du filon d'implantation, des filons collatéraux & de la commissure longitudinale, qui aient avec raison l'attention des anatomistes.

L'observation des maladies & le résultat de plusieurs expériences sur les animaux, semblent ne laisser aucun doute sur l'entrecroisement des nerfs de la moelle épinière; mais en admettant cet entrecroisement, il resto à savoir si le fait réellement à la base de l'organe encéphalique. M. le professeur Chaussier remarque judicieusement que les démonstrations anatomiques sont loin de décider positivement cette question.

La préparation de la moelle épinière & l'ouverture du canal vertébral au rachidien ne sont pas des procédés exclusivement relatifs à l'étude de l'anatomie; ils peuvent, dans certaines circonstances, jeter beaucoup de lumières sur des questions de médecine légale, & demander alors une attention toute particulière. On recommande surtout d'observer avec le plus grand soin, dans cette préparation, s'il n'existe point dans l'épaisseur des muscles, des ecchymoses, des contusions; s'il n'y a point de fractures, de déplacement ou de mobilité contre nature, de quelques-unes des vertèbres, & si leurs ligaments se trouvent dans toute leur intégrité. On ne donne pas moins d'importance à l'état des membranes, aux vaisseaux, aux tissus graisseux qui l'environnent, au prolongement rachidien lui-même, en n'oubliant pas d'ailleurs qu'il n'est pas rare de voir les veines rachidiennes gorgées de sang, & une stérilité plus ou moins colorée dans la gaîne vertébrale: ce qui doit être attribué aux suites de la mort, aux symptômes qui l'ont précédée, & à la situation dans laquelle le corps a été conservé.

Des expériences récemment faites par MM. Magendie & Delille, d'abord avec l'extract de l'opium, & ensuite avec l'extract alcoolique de noix vomique, ont prouvé qu'il existoit un genre de poison caractérisé par son effet en quelque sorte exactif sur la moelle épinière, soit que le poison

s'introduit par une plaie dans les veines ou dans les voies digestives.

D'autres expériences assez nombreuses & assez compliquées, & dont peut-être l'importance a été exagérée, ont paru prouver à Legalluis que le principe des mouvements du cœur résidoit exclusivement dans la moelle épinière; il est du moins certain, ainsi que M. Lallemand l'a très-bien observé, que dans certains fœtus acéphales, la vie, & par conséquent les mouvements du cœur, ont continué jusqu'au moment de la naissance, malgré la destruction du cerveau, du cervelet & de la moelle épinière; & la question se réduit alors, dans ce cas, suivant l'auteur que nous venons de citer, à savoir si les mouvements du cœur se font exercés par une force spéciale indépendante de l'encéphale, ou s'ils ont dépendu d'une puissance nerveuse qui avoit fa source ailleurs que dans le cervelet & la moelle épinière. On sait aujourd'hui, d'après les travaux de Scarpa, que le cœur a les nerfs comme les autres viscères, qu'il est par conséquent modifié par leur action, par leur influence, & qu'il n'est pas possible d'attribuer son action à une circulation éternelle régulière, à une irritabilité locale & indépendante de cette influence. Quant à la force de cette même puissance nerveuse dans les fœtus acéphales, dont nous venons de parler, il faut bien admettre qu'elle existe dans les ganglions du grand sympathique, qu'elle a survécu à la destruction de la moelle épinière, quoique la destruction fabite de cet organe, dans les animaux, occasionne un désordre & un trouble qui rendent la mort inévitable. (Voy. M. Lallemand, *Observations pathologiques pour éclaircir plusieurs points de physiologie*, thèses de Paris, 1818, n°. 165.) (L. J. M.)

MOELENBROECK (Valentin-André), d'Erfort, se fit recevoir médecin à Jena, en 1630. Il professa d'abord dans sa patrie, passa ensuite à Hall et Sive, où il mourut en 1675. Il fut membre de la Société des curieux de la nature, & donna les ouvrages suivans :

Médecine totius præcox aphoristica. Erfurt, 1636, in-4°. Cet ouvrage, qui est de Tobie Dornell, a été enrichi de notes par Moellenbroeck.

De variis seu de art-nitide sagâ scorbutica. Halæ, 1662, in-8°. Lipsie, 1663, 1672, in-8°.

Cochlearis curiosæ cum figuris & indice locupletissimo. Lipsie, 1674, 1746, in-8°, mauvaises figures. (R. GORROU.)

MOEURS, f. f. pl. (*Médecine*.) Burlamaqui, dans son ouvrage sur les principes du droit naturel, donne le nom de *mœurs* « aux actions libres, » en tant que l'esprit les considère comme susceptibles de règles. De-là vient, ajoute-t-il, qu'on appelle *morale*, l'art qui nous enseigne ces règles de conduite, & les moyens d'y conformer nos actions. »

Le même auteur ajoute au chapitre XI, pag. 126 : « la loi étant la règle des actions humaines, si l'on compare ces actions avec la loi, un y remarque ou de la conformité, ou de l'opposition, & cette sorte de qualification de nos actions, par rapport à la loi, s'appelle *moralité*. »

« Le terme de *moralité* vient de celui de *mœurs*... & l'on appelle *morale*, l'assemblage des règles que nous devons suivre dans nos actions. »

Ces principes, posés par l'auteur, apprennent à distinguer les mœurs pures des mœurs vicieuses. (Voyez ce que nous dit Montesquieu sur le même sujet.)

Les mœurs sont différentes dans les monarchies, les républiques & les états despotiques. Les lois du commerce perfectionnent les mœurs par la même raison qu'elles perfectionnent le commerce corrompt les mœurs pures. Dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, ou trafique de toutes les actions humaines & de toutes les vertus morales.

L'empire du climat est le premier de tous les empires sur l'homme & sur les animaux. Les manières représentent les mœurs, &c....

Examinons à présent quelle est l'influence des mœurs sur la vie & la santé de l'homme. Non-seulement les climats & les gouvernemens divers influent sur les mœurs, ainsi que l'observe Montesquieu, mais l'on doit ajouter encore l'action de la religion, celle de l'éducation, qu'il faut considérer parmi nous sans trop rapports, savoir, l'éducation paternelle & maternelle, celle des maîtres, & enfin la dernière que l'on apprend en entrant dans la société.

Presque toutes les religions assujettissent l'homme à un culte extérieur & à des pratiques plus ou moins austères. Elles lui promettent une vie future heureuse, s'il se conforme à ce qu'elles lui ordonnent, & le menacent des malheurs éternels, s'il ne se conforme point. La crainte & l'espérance le tourmentent tour à tour, elles altèrent sa vie & sa santé, & sont souvent le thermomètre de ses mœurs.

Les nations civilisées sont divisées par classes. Ces classes sont plus ou moins subdivisées, suivant le degré de civilisation; il a fallu nécessairement les multiplier en raison des besoins naturels ou factices des individus, parce qu'il a fallu pourvoir au bonheur de tous. Ces besoins trop multipliés influent sur les mœurs; ils altèrent la santé & diminuent la population, surtout dans les villes. Les arts mécaniques y usent le corps. Les arts libéraux corrompent les mœurs des artistes; ils exaltent leur imagination au point qu'il y en a qui ont des dispositions à devenir maniaques.

Ceux qui cultivent les sciences sont portés à la mélancolie; elles détruisent les fonctions de l'estomac. La classe des savans est celle des gouteux.

Nombre de médecins célèbres ont décrit les maladies des artisans, ainsi que celles des autres

classe de citoyens; elles font occasionnées par leurs métiers, leurs études, leur nourriture, leurs mœurs, l'air & les atomes qu'ils respirent dans leurs ateliers.

J'aurais dû dire, en parlant des religions, que celles qui conseillent le célibat, nuisent à la santé & s'opposent à la population en contrariant la nature.

Les gouvernements doivent surveiller l'éducation de la jeunesse sous le rapport de la santé, lorsque, pour son instruction, elle quitte la maison paternelle. Sa constitution physique forte & robuste, est favorable à l'induction, soit pour le bonheur de l'individu, soit pour l'utilité publique, soit pour les générations futures. Ces deux derniers motifs doivent faire la sollicitude de tous les gouvernements sages. Ils doivent faire un choix scrupuleux des maîtres que l'on donne aux enfans dans les pensions; c'est là surtout où les mœurs se corrompent dans l'ombre & le silence.

Les plaisirs vénériels excessifs, ou leur privation absolue après l'âge de puberté, nuisent aux mœurs & à la santé. Cette réflexion souffre peu d'exceptions.

Les boissons spiritueuses, prises avec excès, changent le physique & le moral; elles nuisent souvent aux militaires & aux marins.

Les peines & les chagrins nous rendent mélancoliques; ils portent le désordre dans les mœurs, & occasionnent des maladies graves.

On est persuadé que les peuples ichthyophages multiplient beaucoup plus. Il est bien certain que la population est plus nombreuse dans les manufactures.

Si les mœurs des villes sont dépravées, celles des campagnes sont pures, surtout si ces campagnes sont éloignées des grandes routes & des lieux de commerce, ce qui vérifie l'observation de Mémphien. Les mœurs des campagnes sont donc, saines, les familles sont nombreuses, fortement constituées, ne redoutant point l'intempérie des saisons.

Presque toutes les actions de la vie se font par habitude: ce sont les habitudes louables qui forment les bonnes mœurs, d'où résulte une bonne santé.

La nourriture, les boissons, l'exercice, le sommeil, toujours pris dans la même mesure, ne font point la meilleure règle pour la santé. Il vaut mieux suivre ses besoins journaliers, dans lesquels je comprends ceux de l'âge, du sexe, du climat, &c.

Les peuples pasteurs ont moins de travail à faire que les peuples agriculteurs; ceux-ci en ont moins que les vignerons. Ces différentes mesures de travaux portent des différences sensibles dans leurs mœurs & leurs tempéramens.

(BAIXDZ.)

MOFETTE ou **MOUFETTE**, f. f., du toscan *mofcheta*, que quelques philologues font venir d'un verbe syriaque, qui signifie mot à mot, souffler.

On a désigné sous ce nom, & en terme de mineur, les vapeurs, le gaz délétère qui se trouvent habituellement ou accidentellement dans la plupart des mines métalliques & des bouillères. Il y a aussi des mofettes dans les fasses d'aisance, les puits, dans lesquels on ne prend de l'eau que très-rarement. (Voyez *MIRAMUS*.)

Les mofettes sont de diverses natures, les unes qui sont formées d'azote, ne peuvent servir ni à la combustion, ni à la respiration; elles déterminent l'asphyxie, mais sans occasionner aucune altération morbide; d'autres causent également l'asphyxie, mais avec des symptômes plus ou moins pénibles, surtout dans la partie la moins élevée du lieu où elles se trouvent. Elles sont essentiellement formées de gaz acide carbonique: telle est la mofette de la fameuse grotte du Chien, dans les environs du lac d'Agnano, près de Naples.

Plusieurs mofettes produisent leurs redoutables effets avec une explosion violente. (Voyez *MIRAMUS*.)

D'autres paroissent encore plus éminemment délétères: telles sont les mofettes que forment le gaz hydrogène carboné, le gaz hydrogène sulfuré, &c. (L. J. M.)

MOIGALISME, de *μυγαλιν*, parler avec peine. C'est le bégaiement dans le sens le plus général, & en particulier l'impossibilité de prononcer les lettres *b*, *p*, *m*, c'est-à-dire, les labiales, comme dans le bec de lièvre, fustout avec privation des incisives. On prononce la lettre *v* à la place de la lettre *f*, & la lettre *f* à la place de la lettre *p*, si la lèvre inférieure est privée de mouvement. Le moigalisme n'est d'ailleurs qu'une espèce de psellisme ou de bégaiement & de parophonie. (Voyez ces mots.)

MOINICHEN (Henri de), médecin danois qui, après avoir étudié à Padoue, sous Antoine Molinetti, & à Venise, sous Michel-Ange Rota, revint dans sa patrie, où il reçut le bonnet de docteur à Copenhague. Il vivoit dans cette ville en même temps que Thomas Bartholin, c'est-à-dire, au milieu du dix-septième siècle, & il étoit intimement lié avec lui. Comme il avoit recueilli différentes observations en Italie sur des cas rares, & qu'il en avoit amassé d'autres dans sa pratique, il les rassembla en un volume, qu'il dédia à son ami Bartholin, sous ce titre:

Observationes medico-chirurgicae XXIV. Hafniae, 1665, in-8°; ibid. 1678, in-8°, avec le *Cultus anatomicus* de Michel Lyser. Francf. 1669, in-8°. Drefde, 1691, in-12. L'auteur se récrie contre l'abus des escarrotiques dans le traitement des carmélites de l'urètre. Les sondes ou bougies dont on se servoit du son temps, étoient composées de caustiques violents. (*Extrait d'Ehy.*)

(R. GYOFROY.)

X a

MOÏSE. (*Histoire de la médecine.*) Le chef, le législateur des Hébreux.

Ses livres, qui sont regardés comme les monumens littéraires les plus anciens, embrassent toutes les parties des connoissances acquises ou cultivées à cette époque parmi les Egyptiens, chez lesquels Moïse avoit reçu son instruction. Ils renferment en particulier plusieurs documens, plusieurs indications qui appartiennent à l'histoire de la médecine & à la médecine légale.

Nous voyons dans ces livres & dans les réglemens qu'ils établissent, que, chez les Juifs comme chez les Egyptiens, les parties les plus importantes de la médecine se trouvent être entre les mains des prêtres. Suivant Sprengel, on trouveroit, même dans les lois & les pratiques établies par Moïse, une preuve de connoissance assez exacte & assez détaillée sur la lèpre, les taches qui annoncent son invasion, les symptômes de son existence bien confirmée, son traitement, sa terminaison, sa complication avec la lèpre ulcérée (1); du reste, la lèpre, comme toutes les autres grandes maladies, étoit attribuée à la colère céleste, & ne pouvoit être guérie que par des moyens propres à la calmer, sous la direction & avec le secours des lévites descendans de Jacob.

Quelques indications ou quelques traits épars sont d'ailleurs reconnoître dans les lois de Moïse quelques notions & quelques usages qui se rapportent à la médecine légale: ainsi, par exemple, Moïse parle de quelques signes d'après lesquels on pouvoit reconnoître légalement la virginité; il ordonne la visite des personnes blessées, & celle des femmes qui se plaignent de viol; il fait aussi mention, dit Borden, des coups qu'une femme grosse auroit reçus, de la sanicle couchée qui peut s'en suivre, & de la punition due à ce crime. Ce qu'il dit de Joseph, qui ordonna à ses médecins d'embaumer le corps de Jacob, ne se rapporte point, comme on l'a pensé, à une première mention de la médecine, considérée comme art ou comme profession, mais doit s'appliquer à des esclaves chargés de quelques soins relatifs à la propreté ou à la santé.

L'Ecriture elle-même nous console, dit ce sujet, & d'une manière très-ingénieuse, le médecin que nous venons de citer, de ce que peut avoir d'offensant cette dénomination d'esclaves médecins. « L'Eternel prend le nom de médecin du peuple d'Israël dans l'Exode, & c'est la deuxième fois qu'il soit fait mention des médecins dans l'Ecriture. »

Nos livres font d'ailleurs ornés de sentences de l'Ecclesiastique, que nos prédécesseurs ont apprises tout le monde. « Honorez le médecin à cause de la nécessité, car c'est le Très-Haut qui l'a créé;

» toute la médecine vient de Dieu, & elle récevra » des présens du roi. La science du médecin s'élève » vera en honneur, & il sera loué devant les » grands; c'est le Très-Haut qui a produit de la » terre tout ce qui germe, & l'homme sage n'en » aura pas d'éloignement. »

Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter ces passages de ceux qui les précèdent dans le même endroit de l'Ecriture, & qui me paroissent au moins aussi favorables à la médecine. « Ne soyez point avide dans un lésin, & ne vous jetez point sur toutes les viandes, car la quantité de viande cause des maladies, & le trop manger cause la colique: l'intempérance en a tué plusieurs, mais l'homme sobre vit plus long-temps. »

Voilà des leçons qu'on ne peut révoquer en doute; elles appartiennent sans contredit à la médecine réunie à la théologie, qui les consacre & les ennoblit. Elles sont la base contre la gourmandise & la glotonnerie.

Les patriarches, suivant un historien moderne, & les princes du peuple juif..... devoient continuellement veiller sur eux qu'ils gouvernoient..... les soigner même dans leurs plus grandes nécessités, & remédier à leurs maux. C'étoit une raison d'exclusion du commandement & de la couronne, lorsqu'on n'avoit aucune connoissance des maladies & de leurs remèdes (dit Isaac, chap. III, vers. 7). Votre roi, je ne suis point médecin.

Il n'est point douteux que les princes du peuple juif ne dussent veiller sur ceux qu'ils gouvernoient; mais il ne paroît pas certain que ces princes fussent exclus du trône, lorsqu'ils n'avoient aucune connoissance des maladies & des remèdes. Il seroit assurément glorieux pour nous, que les héritiers du trône, parmi les Juifs, eussent été obligés d'étudier la médecine & d'en faire un cours complet. L'auteur qui l'assure ne donne point de preuves de ce fait important.

Le passage d'Isaac ne le prouve point: ce passage est même tronqué, & le voici dans son entier.

« Je ne suis pas médecin, il n'y a point de pain » dans ma maison, il n'y a point de vêtements. » En raisonnant comme l'historien dont il est question, il y auroit lieu de conclure, d'après Isaac, que c'étoit une raison d'exclusion du commandement & de la couronne, lorsqu'on n'avoit pas de pain dans sa maison, & lorsqu'il n'y avoit point de vêtements, ou bien, ce qui revient au même, qu'il falloit, pour être roi, être boulanger ou tailleur.

Du reste on trouvera, suivant le même auteur, soit dans l'Ecclesiastique, soit dans plusieurs autres livres de Moïse, plusieurs passages qui annoncent des observations judicieuses ou des remarques souvent exactes sur les phénomènes de l'organisation: telle est en particulier la description suivante de la vieillesse.

« Lorsque les gardes de la maison commen- » ceront à trembler, les forts s'ébranleront; ceux » qui avoient accoutumé de moudre seront ré-

(1) Ces détails se trouvent principalement dans le Lévitique.

» duits en petit nombre & deviendront piffis,
 » & ceux qui regardoient par les trous, seront
 » convertis de ténébres.

» Lorsque les bras, qui font vos gardiens natu-
 » raux, manqueront de force, vos jambes, qui font
 » faites pour vous soutenir, ne pourront plus vous
 » porter: elles lâcheront sous le poids de votre
 » corps affoibli. Le nombre de vos dents, qui font
 » destinées à moudre la nourriture, sera sensible-
 » ment diminué; celles qui resteront seront ébran-
 » lées & auront perdu leur émail; vos yeux, qui
 » font des sentinelles placées à portée de vous aver-
 » tir à propos, seront obscurcis; ils feront chas-
 » siens, la voyant & sans vivacité.

» Les portes des nœs seront fermées; la voix de
 » celle qui avoit accoutumé de moudre, sera basse;
 » on se lèvera au chant de l'oïseau; les filles de
 » l'harmonie deviendront sourdes.

» Les voies naturelles par lesquelles le corps se
 » nettoie, se fermeront ou perdront leur ressort; les
 » organes de la voix n'auront plus leur souplesse, &
 » l'usage même de la parole sera interdit; vous ne
 » pourrez, pour le sommeil nécessaire, vous fer-
 » réveiller dès le point du jour, sans pouvoir vous
 » livrer à la tranquillité de la nuit. Les oreilles qui
 » vous amusoient par les sons agréables qu'elles
 » faisoient passer jusqu'à votre ame, comme les ins-
 » truments de musique les plus mélodieux, ne vous
 » amuseront plus; vous serez plongé dans un morae
 » & triste silence.

» Les lieux les plus élevés ne feront point épar-
 » gnés, & ils trembleront dans le chemin. L'a-
 » mandier fleurira, la fanellette s'engraïssera, le
 » ciprier se desséchera.

» Le corps se courbera & se fléchira d'autant
 » plus qu'il aura été plus droit & plus élevé; il ne
 » pourra plus se remuer sans danger. Les cheveux
 » blanchiront; la taille, qui fut délicate, s'épaissira;
 » le ventre, qui fut souple, grossira; la barbe, qui
 » est le signe de la force & de la chaleur, tombera.

» Avant que la chaleur d'argent soit rompue,
 » avant que la bandelette d'or se retire, avant
 » que la cruche se brise sur la fontaine & que la roue
 » se détruise sur la citerne, la poulrière reviendra
 » à la terre d'où elle étoit venue.... L'homme s'en
 » ira dans la maison de l'éternité, & les pleureurs
 » ne pèneront dans les places publiques.

» La moelle de l'épine, qui est une colonne blan-
 » che & délicate qui s'étend dans toutes les parties où
 » elle entretient le sentiment, n'aura plus de sensi-
 » bilité, la faiblesse & la paralysie s'enlèveront bien-
 » tôt; le sang qui suit les vaisseaux comme les rontes
 » naturelles, pour aller revivifier les différentes
 » parties & leur porter la chaleur & la couleur ver-
 » meille qui dénote la vie & la santé, sera arrêté
 » & se figera dans les vaisseaux; le cours des urines
 » sera suspendu, soit que la vessie, qui est comme
 » la cruche destinée à les recevoir, ne puisse les
 » contenir, soit que les reins, qui ont quelque rap-
 » port aux roues ou aux poulies au moyen desquelles

» on tire l'eau des citernes, ne puissent plus tirer
 » du sang; l'urine & troupera & le fera tomber en
 » corruption.

» Le corps reprendra sa première existence de
 » terre & d'un peu de boue, dont il fut formé;
 » l'âme rentrera dans le sein de l'Eternel; vos amis
 » s'entreverront quelques instans de l'histoire de
 » votre vie, ils le sauront bientôt, & vous feront
 » leurs derniers adieux.

Nous ne parlerons point ici, & avec dessein,
 des témoignages du savoir de Moïse, par lesquels il
 surpassa les magiciens de l'Egypte, dont il étoit le
 disciple, tels que la réduction en poudre du veau
 d'or, le moyen de rendre l'eau de mer potable,
 qui doivent être regardés comme des miracles,
 dont l'examen est tout-à-fait étranger à l'histoire
 des sciences naturelles. (L. J. M.)

MOISSURE. (*Hygiène.*)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Infusio.*

Ordre I. Aliments.

Sectio IV. Leur préparation.

La moisissure est une végétation très-fine, très-
 délicate, qui se multiplie de semences, cinq ou six
 heures après avoir été produites; elle se manifeste
 sur les corps humides qui commencent à se dé-
 composer & à entrer en putréfaction. Suivant la
 nature des corps où elle s'applique, sa couleur
 varie. Rien n'est plus curieux à examiner que la
 végétation de la moisissure, qui donne une vraie
 plante, mais rien n'est plus inutile que ses effets :
 c'est ordinairement le pain qui souffre le plus de
 la moisissure, par plusieurs raisons, soit parce que
 l'eau surabonde dans la farine, soit parce que la
 pâte n'est ni assez pétrie, ni assez élevée, soit
 parce que le four est trop ou trop peu chaud, soit
 parce qu'étant cuit, on porte le pain dans un en-
 droit humide. Lorsqu'on s'aperçoit de ce défaut,
 il faut couper les pains, ôter la moisissure, & faire
 sécher le reste au four; on s'en servira pour les
 animaux. On a tort, dans les campagnes, d'appli-
 quer les pains les uns sur les autres, tandis qu'avec
 des bâtons on devoit les séparer. Il n'est pas
 besoin de recommander de ne pas manger les
 substances prises de moisissures; car, indépendamment
 qu'elles sont très-insalubres, elles répugnent
 encore généralement au goût. (Macquet.)

MOITEUR. (*Hygiène.*) On donne le nom de
 moiteur à une transpiration légèrement excitée, &
 plus forte que la transpiration insensible; qui est la
 suite de quelque exercice ou d'un bain, ou d'une
 boisson aqueuse ou diaphorétique un peu abon-
 dante.

Il y a encore des crises de maux particuliers,
 qui s'opèrent ainsi quand la nature a choisi la peau
 pour évacuer. En général, la moiteur dont
 nous venons de parler est très-favorable, & l'on
 ne doit rien faire pour en arrêter le cours; sans

cela on risquerait l'atteinte des maux qui sont toujours la suite de la suppression de la transpiration. (Voyez TRANSPIRATION.)

On donne encore le nom de *moiteur* à une humidité froide, quelquefois chaude, qui se répand sur le corps, dans les syncopes, les défaillances & autres états fâcheux.

La pratique médicale l'observe journellement. (MACQUART.)

MOLAIRES ou **MEULIÈRES**. On désigne sous ce nom les dents situées à la partie postérieure des mâchoires, & qui servent à brayer les aliments. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.) La dernière dent molaire, que l'on appelle aussi *dent de sagesse*, quoique plus petite que les autres, ne se montre que dans l'âge adulte, & son éruption est quelquefois accompagnée de symptômes très-pénibles. (Voyez DENTITION.)

MOLAIRES (Glandes). Les glandes molaires sont formées de l'assemblage de plusieurs corps glanduleux, dont les conduits excréteurs s'ouvrent à la face interne de la joue, vers la partie postérieure; elles peuvent, ainsi que les autres glandes buccales, être le siège de différentes lésions ou de différentes phlegmasies; en outre, leur structure n'est pas à l'abri de plusieurs dégénérescences. (Voyez SALIVAIRES (Glandes) ou *APFARIL SALIVARE*.) (L. J. M.)

MOLDAVIQUE. Plante de la famille des labiacées. (Voyez MÛLLER.)

Une espèce de ce genre, le *dracocephalum virginianum* de Linné, est remarquable par ses fleurs, qui conservent la position qu'on leur donne; phénomène qui a fait donner le nom de *cataplectique* à cette plante, & qui parait avoir été observé pour la première fois par de la Hire (1). (Voyez MOLDAVIQUE, dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

MOLE. (Médecine légale.)

Consultation de Zucchi. — Matianus Alben-tius avoit une femme qu'il aimoit extrêmement, & dont il n'avoit point d'enfants. A sa mort il la constitua, par testament, unique héritière de tous ses biens, à la condition qu'elle ne se marieroit pas, & que la régularité de sa conduite ne donneroit jamais lieu à aucun soupçon injurieux à sa pudicité; que si elle se remarquoit, ou que sa conduite cessât d'être régulière, elle seroit privée de ses biens, qui passeroient alors à un monastère qui fut désigné. Deux ans après la mort de son mari, cette veuve fut appelée en justice, comme vivant irrégulièrement & ayant ainsi perdu ses droits aux clauses du testament en sa faveur; les biens

furent revendiqués par les religieux qui l'avoient citée. Dans le nombre des preuves que l'on alléguoit de sa mauvaise conduite, la principale fut l'apparence de grossefle caractérisée par le volume du bas-ventre; elle la nioit, en protestant n'avoir connu aucun homme depuis la mort de son mari. Les religieux voyant approcher le terme présumé de la grossefle, demandèrent qu'elle fût gardée sous leurs yeux, ce qui ne put leur être refusé. Plusieurs mois se passèrent, & vers le terme ordinaire de la gestation, cette femme, à la suite de quelques douleurs, rendit par la matrice une certaine quantité d'eau & de sang coagulé; le ventre tomba, elle recouvra une saignée parfaite. Les religieux soutinrent qu'elle avoit été enceinte & qu'elle étoit accouchée d'une *mole*; produit irrégulier, mais incontestable de la conception, & preuve indubitable de sa mauvaise conduite. Les débats qu'entraîna cette affaire n'ayant rien présenté sur quoi on pût établir le peu de sagesse de cette femme, les juges prononcèrent que les médecins seroient consultés sur la question de savoir si l'accident qu'avoit éprouvé cette veuve étoit l'effet d'une grossefle, si la mole qu'elle avoit rendue étoit un vrai produit de la conception.

La première preuve au procès contre cette femme, étoit qu'elle avoit rendu par la matrice une masse coagulée, paroissant charnue, & ne pouvant conséquemment être confondue avec les concrétions sanguines que peuvent rendre dans les suppressions des menstrues, des femmes & des filles dont on ne peut pas soupçonner la vertu; quelques parties membraneuses, adhérentes à cette masse, ajoutoient encore à la présomption qu'elle ne pouvoit être autre chose qu'une *mole* ou *faux germe*.

La seconde preuve se fondeoit sur les accidents qu'avoit éprouvés cette femme, & qui présentoient une grossefle réelle vraie ou fautive; tels étoient la suppression des menstrues, la tuméfaction du bas-ventre, la sécrétion laiteuse dans les mamelles, divers autres accidents particuliers aux femmes enceintes, & le temps ordinaire de la gestation, symptômes dont la réunion n'a donc pas eu pour cause la présence d'une masse sanguine, par suite de suppression des règles, mais bien plutôt une mole, produit dégénéré d'une véritable conception.

D'autres raisons militoient en faveur de la veuve, & sembloient prouver, qu'elle n'avoit pas été enceinte d'une mole réelle, ou que, quand même elle eût porté dans son sein une mole réelle, produit indubitable de la conception, on n'en pouvoit pas conclure que cette conception fût postérieure à la mort de son mari, & conséquemment on n'en pouvoit arguer aucune preuve de sa mauvaise conduite.

La grossefle d'une mole, que l'on peut regarder comme un produit réel de la conception, n'étant qu'une dégénérescence de cette concep-

(1) Voyez *Mémoires de l'Académie des sciences*, années 1712.

tion, n'est pas soumise aux lois & aux temps de la vraie grossesse. Hippocrate, Avicenne, Sennert, Roderie de Castro & plusieurs autres médecins célèbres soutiennent que la gestation d'une môle n'a point de temps déterminé. Ces observations prouvent que des femmes en ont porté pendant plusieurs années, d'autres pendant toute leur vie. Il est donc possible que la môle rendue par cette veuve, deux ans après la mort de son mari, eût été le produit d'une vraie conception pendant la vie de son mari; ce qui réduit à le penser, c'est que cet homme n'a jamais eu d'enfants ni de cette femme, ni d'une autre qu'il avoit épousée avant elle, & que les suites de la cohabitation ont pu être des produits informes de germes avortés. La conduite de cette veuve ne peut donc être soupçonnée par le seul fait de l'accident qu'elle a éprouvé.

On objecta que cette femme n'eut pendant la vie de son mari, aucun accident sensible de grossesse fautive ou vraie, & que si la môle avoit été conçue pendant le mariage, la présence dans la matrice & son accroissement le fussent manifestés par quelques symptômes; on ajoute qu'il est au moins bien extraordinaire, que deux ans après la mort de son mari, les accidents de la grossesse se soient prononcés & terminés par l'accouchement d'une môle.

Zacchias répond à cette objection que les symptômes d'une conception réelle sont quelquefois, par des causes particulières, trois, quatre, cinq, six mois & plus, sans être manifestes, & que cet événement est assez ordinaire dans les conceptions avortées, c'est-à-dire, dans celles qui n'ont pour produits que des mûles. La veuve n'ayant jamais eu d'enfants, quoiqu'ayant plusieurs années cohabité avec son mari, n'a pu raisonnablement attribuer à un état de gestation les divers accidents qu'elle a éprouvés par la conception de la môle; elle a dû au contraire regarder ces accidents comme les effets du dérangement des menstrues, dérangement qui étoit presque habituel chez elle; or, la suppression ou l'irrégularité des menstrues, présentent des phénomènes qui ressemblent beaucoup à ceux de la grossesse.

A ces preuves, Zacchias ajoute celles de fait. Les médecins & les sages femmes qui ont visité cette femme, & d'après la môle qu'elle a rendue, ont déclaré qu'elle est accouchée de morceaux de sang coagulé, qui ressembloient à de la chair; mais on fait que des concrétions sanguines présentent quelquefois une ressemblance singulière avec la chair, & qu'elles en ont même la consistance. Or, la môle, d'après l'opinion de la plupart des auteurs qui ont traité cette matière, est tellement compacte & ferme, qu'elle se laisse couper avec peine. Il n'y a donc nulle certitude que la môle rendue par cette femme ait été une véritable môle; on peut même assurer que ce n'en étoit pas une. En effet, la môle, produit de la conception, doit présenter dans les débris, des traces de ses adhérences avec

un placenta, seul moyen qu'elle puisse avoir de se nourrir & de s'accroître; or, le rapport ne présente qu'une masse informe sans vestiges quelconques de liaison antérieure avec un autre corps dans la matrice; il n'y a donc rien de prouvé dans ce que l'on peut appeler le *corps du delit*.

Mais quand bien même ce feroit une môle, ajoute Zacchias, il n'est nullement prouvé que la cohabitation de l'homme soit absolument nécessaire à la production de ces masses singulières, dont la génération & l'organisation ne sont pas assez connues; & du moment où cette question est encore indéfinie, il est impossible que des juges prononcent d'après une hypothèse, quelque ingénieuse & vraisemblable qu'elle puisse être.

Que si l'on ajoute que cette masse étoit revêtue de portions membraneuses qui annonçoient assez qu'elles avoient renfermé un germe avorté, & qu'elle étoit conséquemment un produit de la conception, on répond que des masses purement sanguines peuvent revêtir un caractère membraneux; la formation de ces fausses membranes étant le produit presque nécessaire des développemens du fœtus concret, & ce phénomène se reproduisant dans un grand nombre d'affections morbifiques; la présence de ces membranes n'annonce donc point une véritable môle.

D'après ces motifs, Zacchias conclut qu'il n'y a rien de prouvé contre la bonne conduite de cette veuve, & qu'elle doit rester en possession tranquille des biens de son mari.

J'ai présenté cette consultation après en avoir éloigné tout ce qui appartenoit au temps où écrivait Zacchias; on voit assez, après avoir lu tous ces détails, qu'il peut rester des doutes sur la vertu de cette veuve, mais que ces doutes ne peuvent influencer l'opinion des juges qui avoient à prononcer dans un cas semblable.

Les opinions des médecins légistes les plus célèbres sur cette matière, présentent les résumés suivants, qui peuvent servir de règles de conduite dans les cas analogues.

La médecine légale s'occupe des mûles dans les circonstances suivantes:

Une fille, une veuve, une femme séparée de son mari, rendent une môle à la suite d'accidents de grossesse; elles soutiennent que ce n'est point un produit de conception, & qu'elles n'ont eu aucune cohabitation charnelle.

Une femme accusée d'avortement prémédité soutient qu'elle n'est accouchée que d'une môle ou faux germe.

On entend en général, par môle, une masse solide qui s'échappe de la matrice à la suite de quelques douleurs; cette définition n'est pas exacte. Il faudroit ne donner le nom de *môle* ou de *faux germe*, qu'à un produit constaté d'une conception dégénérée.

La môle, suite de la conception, est ordinairement un corps qui a la grosseur & la forme d'un

œuf, & qui est rempli de sérénité; son tissu est blanc, libreux, compacte & ferré : il est facile de la distinguer des concrétions sanguines. Si cette môle contient l'embryon, Plenk lui donne le nom de *môle embryonnée*. Elle prend de l'accroissement & du développement dans les membranes qui environnent l'œuf détaché de l'ovaire, & dans lequel le germe a péri; elles occasionnent une fausse grossesse qui se signale par des symptômes semblables à ceux de la vraie, de manière que l'on ne peut guère distinguer cet état avant le cinquième mois, époque à laquelle le toucher peut fournir quelques lumières. Hippocrate présente les signes qui annoncent ce phénomène : selon lui, le ventre se tuméfié, mais on ne sent point remuer le fœtus au terme ordinaire; les mamelles prennent du volume, mais il ne s'y forme point de lait.

La *môle non embryonnée* est celle qui se présente sous forme de masse spongieuse, ou *hydatisée*, ou *résiculaire*; elle peut avoir pour cause un œuf fécondé dont le germe a péri, & qui a dégénéré en cette môle.

Une *fausse môle* peut être produite par les débris du placenta resté dans la matrice; ce peut être un polype dégénéré & sans pédicule. Un auteur célèbre, Walter, a avancé, dans une très-bonne dissertation qui a paru à Berlin en 1771, qu'il est possible que, sans cohabitation charnelle, ou œuf non fécondé se détache de l'ovaire par l'action d'une passion vive qui accompagne des idées très-voluptueuses, passe dans la matrice & y dégénère en *fausse môle*.

Enfin, on rencontre de *fausses mûles sanguines*; ce sont de vraies concrétions de la fibrine; leur base & leur corps présentent une texture ferme avec une enveloppe membraneuse; leur sommet est d'une mollesse particulière. Elles sont le produit de la suppression des menstrues & de la rétention dans la matrice du sang menstruel. Elles peuvent donc appartenir, chez des filles, des femmes séparées de leurs maris & chez les veuves, sans qu'il y ait eu union des sens.

Ces détails prouvent assez avec quelle circonspection l'homme de l'art appelé par les magistrats pour des rapports & des consultations dans des cas de cette espèce, doit se conduire pour ne pas léziner injustement la pudeur, & accuser témérairement l'innocence. (GILBERT.)

L'article qui précède, & que nous avons trouvé dans les archives de l'*Encyclopédie* pour le *Dictionnaire de Médecine*, nous a paru mériter d'être conservé pour les observations qui en forment la première partie. Dans les réflexions que l'auteur y a jointes, il est évident qu'il n'avait pas de notions exactes sur ce genre de phénomènes, & que la dissertation de Walter lui étoit tout-à-fait inconnue. Du reste, les considérations médicales dont les mûles peuvent être l'objet,

rentrent dans la question plus étendue & plus générale de la viabilité & du droit des moultes. Nous ne devons pas oublier cependant de rappeler que la forme régulière & bizarre de plusieurs mûles, d'ailleurs mal observées par des sages-femmes superstitieuses ou des accoucheurs ignorants, a fait croire plusieurs fois que des femmes étoient accouchées de différents animaux vivans ou morts, de taupes, de rats, de tortues, &c., merveilles & prodiges dont Lemnius & Thomas Bartholin ont rapporté des exemples, & ce qui pourroit encore donner lieu aujourd'hui, dans plusieurs pays, à des accusations de magie ou de sorcellerie. Nous dirons encore que, dans quelques circonstances particulières, il pourroit être important de distinguer, par des recherches anatomiques, une môle de toute autre espèce de tumeur, afin de déclarer qu'elle provient ou qu'elle ne provient pas d'une relation conjugale ou d'une véritable grossesse, contre l'opinion des auteurs qui, confondant le faux germe avec la môle, ont pensé que cette dernière pouvoit se former sans le concours de l'homme, chez les vierges & les femmes évidemment célibataires (1).

MÔLE. Corps organisé, végétation qui se forme & se développe dans l'utérus, & s'en trouve expulsé à une certaine époque, par une espèce d'accouchement. Ces masses ou tumeurs, dont le mécanisme n'a été bien connu que par les Modernes, ont été observées plusieurs fois par les Anciens, mais souvent confondues avec des hydatisés, des tumeurs sanguines, le polype, le squarrie.

Le caroncule que la femme de Gorgias rendit quarante jours après être accouchée d'une fille vivante & à terme, paroît appartenir aux mûles (2). Aristote, Plin, ont également parlé de tumeurs de l'utérus, qui rentrent dans la même catégorie. Avant Wisberg, qui écrivit au commencement du dix-huitième siècle, & Levret, qui est plus moderne, on ne paroît pas avoir eu des idées exactes sur la véritable nature & la formation des mûles.

Levret surtout s'attacha, d'après de bonnes observations, à l'idée que les mûles sont toujours le produit d'une grossesse qui ne peut parvenir à terme. Dans ce cas, le fœtus périt plus tôt ou plus tard, tandis que le placenta qui lui survit continue de se développer avec des circonstances propres à son mode d'organisation & à la privation du cordon ombilical.

Toutes les causes qui peuvent occasionner des mûles sont donc celles dont l'action est assez forte pour attaquer la frêle existence du fœtus & troubler la gestation.

(1) Buffon a soutenu cette opinion.

(2) *Maladies populaires*, liv. IV.

Ces causes sont très-nombreuses, & la vie intra-utérine, ce premier temps de l'existence, n'est pas moins exposé à une mort accidentelle & prématurée, que la vie extra-utérine qui s'assure même à mesure que l'on s'éloigne du moment de l'existence.

D'une autre part, les causes sont toutes les maladies qui peuvent atteindre le fœtus, & qui sont assez graves pour menacer son existence; & d'une autre part, tous les genres d'accidens capables de troubler la gestation.

Quelques circonstances particulières paroissent d'ailleurs contribuer davantage à ce genre d'accidens : telle est entr'autres la fréquence ou l'excès des relations conjugales pendant les premiers mois de la grossesse.

Il n'est pas sans exemple de trouver un fœtus avec une ou plusieurs mûles, ou des débris de fœtus dans la substance de ces dernières; il n'est pas sans exemple aussi, qu'après la mort du fœtus, ses annexes survivent & continuent de végéter, ce qui donne à la mûle qui se développe dans cette circonstance, une apparence & une structure particulières.

La mûle ressemble d'autant plus au placenta, qu'elle est moins ancienne; elle se nourrit par le sang qu'elle reçoit des sinus mûlins, & qui se trouve déposé dans un tissu cellulaire spongieux, sans aucune espèce de circulation, le cordon ombilical ayant été détruit; ce qui occasionne nécessairement des pertes de sang assez fréquentes dans cette espèce de grossesse.

Le poids des mûles varie depuis une once jusqu'à quarante & plus : quelques-unes sont très-volumineuses, d'autres très-petites.

Nous ne parlerons pas des signes propres à faire reconnaître la grossesse d'une mûle, parce qu'en général ils méritent peu de confiance.

L'absence du balotement à quatre ou cinq mois, conduit quelquefois à quelques présomptions sur une pareille grossesse.

La durée de cette grossesse varie de deux à neuf mois, & même à plusieurs années, si l'on s'en rapporte aux observations de quelques auteurs (1).

L'expulsion d'une mûle ne diffère du mécanisme de l'accouchement que par l'intensité & la durée des contractions mûlines. Dans l'état présent des connoissances, on ne cherche point à la provoquer par des fecorins étrangers, ainsi que les Anciens l'avoient conseillé.

Les pertes très-fortes sont les seuls accidens qui peuvent rendre la grossesse d'une mûle très-dangereuse; hors ce cas, leur pronostic n'offre rien d'alarmant. Dans le cas d'une perte, il faut suivre le conseil & la pratique de Puzos, c'est-à-dire,

terminer l'accouchement. (*Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Chirurgie.*) (L. J. M.)

MOLÈNE. *Verbascum*, Linn. Genre de plantes de la famille des solanées, dont il existe plusieurs espèces que l'on vend indistinctement chez les herboristes, sous le nom vulgaire de bouillon blanc.

Les feuilles, les sommités de cette plante sont données en infusion théiforme, que l'on emploie dans le traitement des affections catarrhales, ainsi que plusieurs autres préparations désignées sous le nom populaire de *tisane pectorale*. (L. J. M.)

MOLINETTI (Antoine), né à Venise, célèbre professeur d'anatomie de l'université de Padoue, & habile praticien, fut appelé par le duc de Bavière & le duc de Parme, & revint à Padoue comblé de leurs présents. Il mourut à Venise en 1675. Il a donné un très-bon ouvrage, intitulé :

Dissertationes anatomicae & pathologicae de sensibus & eorum organis. Patav. 1669, in-4°. Venet., 1675, in-4°. Molinetti étoit que c'est le pont de Varole qui fournit les nerfs aux organes des sens, & que c'est dans cette partie que réside la perception. Il ajoute un septième muscle aux moteurs des yeux, sous le nom de *trochileateur*, & il dit l'avoir découvert en 1666, avec François Boldini son professeur. Il a combattu l'ancienne erreur sur la distinction des nerfs propres au mouvement & d'autres à la sensation. Il a soupçonné que l'humeur cristalline est le siège de la cataracte. (R. GEORROV.)

MOLITX (Eaux minérales de). Molitx est un village à trois lieues de Prade & de Perpignan, où se trouvent des eaux que Carrère, dans son *Traité des eaux minérales du Roussillon*, regarde comme sulfureuses, d'après leurs qualités sensibiles & leur analyse.

La douce chaleur de ces eaux lui fait regarder les bains qu'on y prend comme des bains de délices. Il les croit fondantes, vulnéraires, détersives, pectorales & antispérisiques.

(MACQUART.)

MOLY. Tel est le nom d'une plante dont parle Homère dans l'*Odyssée*, & dont Ulysse devoit faire usage pour se préserver des enchantemens. Plusieurs érudits se sont livrés, à ce sujet, à des recherches qui ne peuvent appartenir qu'à une histoire minutieuse & détaillée des sciences naturelles, en restant d'ailleurs entièrement étrangère à l'histoire philosophique & générale de ces mêmes connoissances. Du reste, Sprengel a rapporté cette plante, dans ses savantes énumérations, aux alliacées, & croit du moins y reconnaître tous les caractères de *Allium nigrum*, dont la racine & les fleurs ont en effet beaucoup d'analogie avec les traits qu'Homère attribue au moly, la plus célèbre

(1) Ambroise Paré cite un exemple de grossesse d'une mûle de dix-neuf ans.

des herbes, ainsi que Plin l'a appelée, *clarissima herbarum* (1). Cette opinion est d'autant plus probable, que les traditions anciennes attribuoient à plusieurs plantes de la famille des alliées, & a propriété d'écarter les maléfices, & que l'une d'elles, *l'allium magicum*, doit son nom à cette prétendue propriété. (L. J. M.)

MOLLESSE, f. f. Habitude d'un luxe exagéré, genre de vie qui affaiblit l'organisation & la rend plus susceptible, en faisant abus des stimulans droméiques, & en réunissant autour de l'homme riche, des moyens de protection & de secours qui privent insensiblement les différens organes, & surtout l'appareil de la respiration & la peau, d'une réaction suffisante pour changer impunément de température, de régime, de climat, &c. (Voyez Monnex (Gens du), Ricuzs (Maladie des gens).) (L. J. M.)

MOLLET, *Surs*. Le gras de jambe, la partie postérieure & saillante dont le développement est principalement marqué par les muscles jumeaux & folaire : disposition qui appartient exclusivement à l'homme, & qui fait partie de l'ensemble des moyens, qui sert à la station perpendiculaire. (Voyez STATION.) (L. J. M.)

MOLLETES. (*Chirurgie vétérinaire*.) La mollette est une tumeur qui survient au boulet, & qui tire son nom de la mollesse de sa consistance. Cette tumeur varie dans son étendue & dans sa situation : tantôt elle circonscrit le boulet, tantôt une de ses parties latérales. Quelquefois elle est placée à la partie inférieure du canon, d'autres fois elle occupe la partie supérieure du paturon; enfin, elle peut être externe, & sur les tégumens, ou logée entre le tendon du muscle sublime & les os dont l'union forme le boulet. Lorsqu'elle survient aux deux côtés du tendon, on lui donne le nom bizarre de *mollette soufflée*. Si elle est située à la partie postérieure du tendon, on la nomme *mollette simple* ou *mollette nerveuse*. On donne quelquefois le nom de *loupes* aux mollettes : cette expression est impropre. J'ai dû donner cette synonymie pour être entendu de tout le monde.

La mollette est particulière aux solipèdes; on la voit rarement au boulet de l'âne & du mulet. Les chevaux d'un tempérament slegmatique, ceux qui paissent dans les marécages, sont sujets à cette mollette qui circonscrit le boulet, & qui est

une véritable hypodermie de l'articulation. Ceux qui sont livrés à des travaux forcés, les chevaux de poste, les chevaux de rousage, connus sous le nom de *limoniers*, sont plus souvent atteints de mollettes externes & circonscrites, qui occupent l'une ou l'autre face du boulet. La compression d'une corde, d'un bandage, peut déterminer cette tumeur indolente. Les chevaux dont l'articulation du boulet est foible & mince, dont le tendon est peu détaché, le fatiguent davantage, & par conséquent sont plus exposés à la mollette. Cette tumeur ne parait pas immédiatement après de longues fatigues, mais le boulet est atteint d'un engorgement douloureux & inflammatoire qui disparaît bientôt, & la mollette se montre à la place.

La mollette n'est d'abord qu'une hypodermie locale, due à l'exhalaison de la sérosité qui n'est point pompée par les absorbans. Cette humeur épanchée peut acquérir de la consistance, & un engorgement séreux se change en une tumeur lymphatique; elle peut quelquefois s'éclaircir davantage & acquérir la solidité d'une induration squarreuse, & même celle d'une excoale.

La mollette conserve peu l'impression des doigts lorsqu'elle est devenue lymphatique : cette impression s'efface lentement, & elle est douloureuse. Lorsque la tumeur acquiert une consistance osseuse, elle est facile à reconnoître par le tact, & elle occasionne la claudication de l'animal.

La mollette est assez facile à guérir lorsqu'elle est récente & séreuse; lorsqu'elle a acquis la dureté d'un squirre, on peut encore la faire disparaître; mais si elle a pris une nature crétacée, aucun topique ne peut la dissoudre.

Le traitement de la mollette récente consiste dans l'application des restrindits les plus styptiques, tels que la fomentation d'extrait de saturne, par l'application d'une argile melle saupoudrée d'alun, la noix de galle pilée, ou l'écorce de chêne pulvérisée & légèrement humectée, & retenus au moyen d'un bandage approprié. Si ces moyens ne suffisent pas, on si la tumeur est invétérée lorsque l'on commence le traitement, il faut, sans balancer, lui opposer l'adésion. On placera dans ce cas les pointes de feu sur la tumeur même, si elle est externe; on se contentera d'en brûler les côtes, si elle est placée entre l'os & le tendon.

Un exercice modéré secondera le traitement topique, & pourra suffire seul lorsqu'un trop long repos aura occasionné les mollettes & qu'elles ne seront pas anciennes. Il est inutile de faire observer que ce moyen seroit nuisible si elles sont le résultat de travaux outrés.

Si les mollettes sont dues à un état cachectique du système, si elles ne sont que des ordèmes symptomatiques, il est évident que le traitement intérieur est indispensable. Les toniques, les astringens, les diurétiques, les frictions locales, trouvent ici leur indication. Des mollettes dégénérées

(1) Fustache, l'un des plus célèbres commentateurs d'Homère, Sumasie, Triller, Wedel, &c., se font principalement occupés de ce point d'érudition, & que M. Virey, toujours prodigue de savoir & de paroles, a repris de nouveau pour adopter, sans y rien ajouter, l'opinion de Springell. (Voyez principalement ce dernier, *Histor. Rei herbaria*, tom. 1, pag. 24.)

en exostoses, celles qui tiennent à un vice de conformation, sont incurables. (GROOSTEN.)

MOLLUSCUM. M. Bateman, dans son *Abrégé pratique des maladies de la peau*, désigne sous le nom de *molluscum*, certains tubercules fessiles, dont l'accroissement est assez lent, & qui se prolongent quelquefois pendant toute la durée de la vie, & sans paroître dépendre d'ailleurs d'une maladie chronique quelconque, ni même d'une constitution morbide. (L. J. M.)

MOMIE. *Mumie* ou *momie*. (Histoire naturelle de l'homme, anthropologie, anatomie, histoire des sciences médicales.)

C'est principalement sous ce dernier rapport que les momies sont considérées dans cet article, & que leur examen peut appartenir à ce Dictionnaire. (Voyez, pour les autres points de vue, les mots **EXAMEN** & **MOMIE**, dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

MOMIE, de Parabe *mum*, cire, suivant l'opinion la plus généralement adoptée. On désigne sous ce nom les cadavres de l'homme ou des animaux, desséchés ou conservés d'une manière accidentelle ou artificielle, par une combinaison de circonstances ou de conditions qui en ont modifié la texture, & les ont défendus contre les causes les plus générales de putréfaction, telles que l'humidité, le contact de l'air, l'action de la lumière, la pression atmosphérique, &c. &c. (1.)

Les momies naturelles ou accidentelles se trouvent ordinairement dans les parties les plus arides & les plus éloignées de l'Afrique; elles sont attribuées à des molécules de sable très-fin, très-divisé, qui s'introduisent dans toutes les porosités du corps de l'homme ou des animaux, sans en former d'ailleurs un véritable fossile.

Les momies accidentelles les plus nombreuses sont celles que l'on trouve dans les déserts, & qui attestent que des caravanes entières d'hommes & d'animaux ont été ensevelies au milieu des sables de l'Arabie.

La nature particulière du sol, & le concours de quelques circonstances qui n'ont pas été convenablement appréciées, ont fait rencontrer quelquefois des momies formées par la simple dessiccation, dans les contrées les plus tempérées de l'Europe.

Les momies du caveau de l'église des Cordeliers de Toulouse pourroient être citées ici comme exemple : quelquefois la conservation est même beaucoup plus entière, ainsi que nous avons en

l'occasion de l'observer, il y a quelques années, dans l'exhumation d'un ciuitière, au milieu duquel on trouva le corps d'une jeune femme qui étoit morte, depuis un siècle, de la petite-vérole, dans une intégrité si parfaite, que les pulsules n'étoient pas mêmes effacées, & fournirent une quantité suffisante de matière pour inoculer des luges (1).

Il existe aussi des exemples très-remarquables de conservations d'hommes ou d'animaux, par le froid & au milieu de masses de glace, principalement celles de plusieurs grands quadrupèdes qui paroissent avoir été ainsi soustraits à la putréfaction, depuis la grande catastrophe que le globe terrestre a éprouvée (2). Dans d'autres circonstances, & surtout dans les grandes exhumations, on a trouvé au milieu d'un grand nombre de débris, quelques corps conservés ou momifiés par des causes tout-à-fait inconnues.

L'exhumation à jamais mémorable du cimetière des Innocens, à la fin du dix-huitième siècle, fit reconnoître d'autres exemples de momies accidentelles; les momies adipocireuses fur lesquelles l'Hourst & Fourcroy ont publié d'excellentes observations.

Ces momies se forment plus particulièrement dans un sol déjà imprégné & surchargé de substances animales. Dans cette condition particulière, les différens tissus organiques, tels que les muscles, le tissu lamineux, la matière encéphalique, passent, comme on le dit, au *gris*, se transforment en *adipocire*, & dans ce cas l'osculaire, ou du moins plusieurs parties du cadavre, ont les apparences d'une masse de suif bien conservée.

Les momies artificielles résultent de différentes préparations ou procédés que l'homme lui-même a employés pour soustraire les débris de ses semblables à la putréfaction. Les plus anciennes & les plus célèbres sont celles des Egyptiens, que des circonstances particulières paroissent avoir conduits à ne pas reconnoître d'autres modes de sépulture : circonstance dont le pouvoir auroit d'ailleurs été augmenté par plusieurs notions superstitieuses, mais surtout par ce désir d'immuabilité, qui forme l'un des principaux traits du caractère de cette nation. On a cité aussi les momies des Guanches ou des Iles fortunées, & les momies péruviennes.

Les momies égyptiennes ont été, pour les auteurs qui ont écrit sur les antiquités en général, & sur les antiquités ou l'histoire de la médecine en particulier, le sujet de plusieurs récits qui n'ont

(1) D'après les observations de MM. Baccroy de Montpellier (1811) & de M. Davy dans ses *Éléments de chimie appliquée à l'agriculture*.

(1) On voit dans le muséum de la Faculté de médecine de Paris, la main de cette momie, prise dans un creux, & qui est encore couverte de pulsules varioliques.

(2) Voyez *Histoire des animaux fossiles*, par M. Cuvier, discours préliminaire.

pas inutile de rappeler, & à la suite desquels nous placerons les résultats des observations & des recherches les plus récentes sur cette importante question.

Les plus anciennes notions relatives aux momies, se trouvent dans la *Genèse*, dont le savant auteur rapporte que Joseph fit embaumer son père pour le conduire en Canaan, & que, lorsque lui-même il eut terminé sa carrière, il fut embaumé à son tour, & conservé dans un coffre pendant un siècle & demi, c'est-à-dire, jusqu'à l'époque où il fut emporté par Moïse, dans la fuite des enfans d'Israël. Hérodote, qui visita l'Égypte environ dix siècles après le séjour de Moïse dans cette contrée, a donné une attention toute particulière à l'embaumement & aux momies. « Il y a », dit-il, en Égypte, certaines personnes que la loi a chargées des embaumemens, & qui en font profession. Quand on leur apporte un corps, elles montrent aux porteurs des modèles en bois peints au naturel. Le plus recherché représente, à ce qu'ils disent, celui dont je me suis scrupuleusement de dire le nom (1); ils en font voir un qui est inférieur au premier, & qui ne coûte pas si cher; ils en montrent encore un troisième qui est au plus bas prix; ils demandent ensuite suivant lequel de ces trois modèles on souhaite que le mort soit embaumé. Après qu'on est convenu du prix, les parens se retirent; les embaumeurs travaillent chez eux, & voici comment ils procèdent à l'embaumement le plus précieux.

» D'abord ils retirent la moelle par les narines, en partie par le moyen des drogues qu'ils introduisent dans la tête; ils font ensuite une incision dans le flanc, avec une pierre d'Éthiopie tranchante; ils tirent par cette ouverture les intestins, les nettoient & les passent au vin de palmier; ils les passent encore dans les aromates broyés; ensuite ils remplissent le ventre de myrrhe pure broyée, de canelle & d'autres parfums, l'encens excepté; puis ils le reconfont; lorsque cela est fini, ils salent le corps & le reconfont de natrum pendant soixante-dix jours; il n'est pas permis de le laisser séjourner plus long-temps dans le sel; ces soixante-dix jours écoulés, ils lavent le corps & l'enveloppent entièrement de bandes de toile de coton, enduites de gomme, dont les Égyptiens se servent ordinairement comme de colle. Les parens tirent ensuite le corps; ils font faire en bois un étui de forme humaine, & le mettent dans une salle destinée à cet usage; ils le placent droit contre la momie. Telle est la manière la plus magnifique d'embaumer les morts.

» Ceux qui veulent éviter la dépense, choisissent

» cette autre sorte. On remplit des seringues d'un liquide onctueux qu'on a tiré du cèdre; on en injecte le ventre du mort sans y faire aucune incision, & sans en tirer les intestins. Quand on a introduit cette liqueur par le fondement, on le bouche pour empêcher la liqueur injectée d'en sortir; ensuite on sale le corps pendant le temps prescrit. Le jour, on fait sortir du ventre la liqueur injectée: elle a tant de force qu'elle dissout le ventricule & les entrailles, & les entraîne avec elle. Le natrum consume les chairs, & il ne reste du corps que la peau & les os; cette opération finie, ils rendent le corps sans y faire autre chose.

» La troisième espèce d'embaumement n'est que pour les pauvres. On injecte le corps avec la liqueur nommée *surmaia*, on met le corps dans le natrum pendant soixante-dix jours, & on le rend ensuite à ceux qui l'ont apporté.

Diodore de Sicile, moins ancien qu'Hérodote d'environ quatre siècles, ajoute quelques traits à son récit, sans en rien dire d'ailleurs qui lui soit opposé: c'est lui qui nous apprend, à ce sujet, une circonstance bien opposée aux progrès de l'anatomie, celle de l'incision des cadavres qui devoient être embaumés, consignée à un inciseur de profession, le *parafchiste*, qui, lorsque son opération étoit terminée, devenoit en horreur aux assistants, & n'évitoit d'être lapidé que par la suite.

Les *taricheutes*, qui sont les embaumeurs proprement dits, ne partagent point, suivant Diodore, cette animosité populaire, & se livrent avec sécurité aux différens procédés de l'embaumement. Ces témoignages d'Hérodote & de Diodore, qui paroissent établis sur de bonnes observations, ne justifient en aucune manière l'opinion de ceux qui ont voulu voir dans la pratique des embaumemens des Égyptiens, des connoissances d'anatomie & d'histoire naturelle qui leur étoient tout-à-fait étrangères. Tout se réduit, dans cette pratique, dit un de nos savans contemporains (1), à deux opérations très-grossières, l'une pour retirer le cerveau par les narines, l'autre pour inciser le bas-ventre, afin d'en extraire les viscères. « Le procédé des femmes qui incisent le ventre des jeunes coqs & qui en retirent les testicules pour les chaponner, est en vérité bien plus délicat, & pendant ces femmes ne prétendent pas être anatomistes. »

Quoi qu'il en soit, il paroit que la pratique des embaumemens se conserva pendant long-temps en Égypte, & qu'elle subsistoit encore dans le cinquième siècle, à l'époque de saint Augustin, parmi les Égyptiens qui avoient embrassé le christianisme (2). Cette coutume avoit même conservé

(1) Celui qu'Hérodote, initié dans les mythes égyptiens, se fit scrupule de nommer, étoit Osiris ou Bacchus, d'après les suppositions de Heyne, *Spicilium antiquitatis mægyptiorum*. (Voyez Comment. Gœtting. III, 82.)

(1) Voyez Lauth, *Op. cit.*, pag. 15.

(2) Voyez Walch, de *monachis christianis*, in *Comment. Gœtting. III*, 46.

toute sa force dans le premier siècle de l'ère chrétienne; & lorsqu'Auguste visita l'Égypte, on lui montra le corps d'Alexandre-le-Grand & celui de Ptolémée, si bien conservés, que les os & même la peau paroissent dans toute leur intégrité. Cet usage se perdit insensiblement, & un médecin arabe, qui écrivait dans le treizième siècle, range les momies parmi les antiquités, & donne quelques détails sur l'espèce de commerce qui en est l'objet, & l'abîme qui s'étoit établi de piller les catacombes pour s'en procurer un plus grand nombre (1).

Des momies venant de plusieurs lieux différens, & pour plusieurs desquelles sans doute les mêmes procédés d'embaumement n'avoient pas été employés, se font trouvées placées dans différens musées de l'Europe, & soumises à l'examen de plusieurs savans, qui n'ont pas dû s'accorder toujours dans leurs opinions; il paroîtroit même que des momies falsifiées auroient pu tromper les observateurs, & jeter beaucoup d'obscurité dans leurs discussions. On voit que, dès l'année 1681, le cabinet de la Société royale de Londres possédoit déjà quelques modèles de l'embaumement des Égyptiens. On fait mention, dans la description de ce cabinet, d'une momie dont la matière balsamique avoit pénétré les parties molles & même les os, de manière à paroître noires & calcinées. Némias Grew en tira la conclusion que si l'on rapprochoit d'un passage de Diodore, que dans certains embaumemens on soumettoit les corps à une sorte de coction, dans une espèce de baume liquide.

Caylus & Rouelle, en France, s'occupèrent de l'examen des momies, dans la première moitié du dix-huitième siècle; le premier veut élever des doutes sur le passage dans lequel Hérodote a parlé de l'extraction d'une partie du cerveau par les narines, & prenant, dans une momie qu'il examinoit, la suture sphéno-maxillaire du côté droit, pour une ouverture artificielle, il prétendit qu'elle avoit été faite pour opérer cette extraction, ce qui prouve seulement que quelques notions d'anatomie ne font pas inutiles même pour un antiquaire (2).

Rouelle les soumit à une espèce d'analyse chimique, pour en tirer les motifs d'une critique d'Hérodote, qui n'est pas mieux fondée que celle du savant académicien que nous venons de citer.

Le célèbre voyageur Shaw, dans la relation de son voyage publié en 1756, a très-bien décrit une momie de la Basse-Égypte. Il trouva la cloison du nez brisée, les parties musculaires détruites, à l'exception des muscles de la cuisse qui tombèrent en poussière lorsque l'on y toucha. Suivant le récit du même auteur, on déroula plus de cinquante

aunes de bandes dont le corps étoit immédiatement enveloppé, & qui paraissent d'abord très-fermes, & que l'on déchira facilement ensuite lorsqu'elles eurent été exposées à l'air.

On trouve dans le cabinet de Goettingue une momie qui a été examinée par Wriberg & décrite par Heyne, qui ont pensé l'un & l'autre, d'après leurs observations, qu'il auroit existé en Égypte un mode de momification suivant lequel on auroit enlevé toutes les parties molles, pour ne conserver qu'un squelette qui n'auroit eu ensuite la forme d'une momie, qu'au moyen des bandes dont il auroit été enveloppé.

Plusieurs savans attachés à la grande expédition d'Égypte, ont donné de nouveau leur attention à l'examen des momies : ils ont observé, non-seulement dans la basse Égypte, les fameuses catacombes de Saqqâra, mais dans la haute, dans les vastes hypogées de la Thébaïde : tels font principalement MM. Ronger (1), Jomard (2) & Larrey (3), auxquels nous devons, sur cette importante question, les vues les plus judicieuses & les documens les plus authentiques. On doit aussi plusieurs renseignemens influés sur le même sujet, à M. Savigny, ainsi qu'à M. Villeteau, dont plusieurs recherches ont été citées & employées par M. Sylvestre de Sacy, dans la traduction de l'ouvrage arabe sur l'Égypte, dont nous avons déjà parlé. Les renseignemens fournis par ces différens auteurs, loin d'élever des doutes sur le récit d'Aristote, le confirment, & donnent sur l'embaumement des Égyptiens, des idées très-exactes & très-étendues, que l'on chercheroit vainement dans les écrits de leurs prédécesseurs.

Les momies que ces savans ont décrites, ont présenté du reste une assez grande variété, ce qui paroît annoncer qu'il auroit existé plusieurs différencés remarquables dans les procédés de l'embaumement : ainsi, dans plusieurs momies, on a trouvé la déchirure des parois du nez & la brisure de l'os ethmoïde, opérées sans doute pour extraire le cerveau par cette ouverture; dans d'autres momies, au contraire, ces mêmes parties étoient bien conservées, ce qui paroît démontrer que l'extraction du cerveau n'étoit pas toujours regardée comme indispensable; il est évident aussi que dans plusieurs cadavres momifiés, les viscères du bas-ventre ont été détruits en partie, au moyen d'injections corrosives, introduites par l'anus, sous forme de lavemens, tandis que dans plusieurs autres, ces mêmes viscères ont été extraits par l'incision consignée aux parascistes.

Parmi ces derniers, M. Rouyer distingue, relativement aux matières qu'elles contiennent, plusieurs variétés, savoir : 1°. les aunes de couleur

(1) Voyez la Religion de l'Égypte, traduction de l'arabe en français par M. Sylvestre de Sacy, pag. 268.

(2) Voyez Acad. des inscript., tom. XXIII.

(1) Sur les embaumemens des anciens Égyptiens.

(2) Sur les hypogées de la Thébaïde.

(3) Sur la conformation physique des différentes races qui habitent l'Égypte.

olivâtre, remplies de résines aromatiques, ayant la peau comme tannée, faisant corps avec les fibres & avec les os, attirant promptement l'humidité lorsqu'elles sont exposées à l'air; 2°. les momies remplies d'asphalte pur (baume de momie), de couleur rougeâtre, d'une grande pesanteur, ne subissant à l'air que très-peu d'altération; 3°. les momies qui ont été préparées par une sorte de salaison, & remplies eu même temps de substances résineuses, dont la peau est noire, dure, tendue comme le parchemin.

Les momies formées avec les cadavres dont les intestins n'ont point été extraits par une incision abdominale, sont très-nombreuses, mais mal conservées.

Parmi les momies qui n'ont été que salées & desséchées, quelques-unes ont passé au gris dans différents points du corps; elles contiennent beaucoup de sulfate de soude, & quelquefois des morceaux d'adipocire très-considérables.

Les momies de la haute Egypte paroissent avoir été préparées avec beaucoup plus de soin, & sont beaucoup mieux conservées que toutes celles qui avoient été connues en Europe avant l'expédition française.

M. Jomard a observé que, dans plusieurs de ces momies, on trouve entre la peau & les os une poussière brunâtre dont la nature est tout-à-fait inconnue, & qui, lorsqu'on la jette sur le feu, suse & s'enflamme comme la poudre à canon.

Les momies des Iles fortunées ou des Gouanches paroissent avoir été préparées suivant les procédés les moins recherchés & les moins dispendieux des Egyptiens; on en trouve plusieurs dans les différents musées de l'Europe : deux de ces momies, que l'on voit au Muséum d'histoire naturelle de Paris, s'y trouvent depuis l'année 1776. Elles viennent de l'une des plus célèbres catacombes de Ténériffe, qui renfermoit plus de mille cadavres. On a parlé aussi des momies du Pérou, ou du moins de celles de quelques Incas, qui auroient été parfaitement conservées, suivant le récit d'Acosta & de Garcilasso de la Vega.

MOMIES (Matière médicale, usage médical des).

L'usage des substances fournies par les momies est entièrement tombé en désuétude. On a cependant attribué, dans plusieurs anciens traités de matière médicale, des propriétés merveilleuses à ces substances : celles d'être *incarnatives*, *roborantes*, *resolatives*, *deshystruantes*, de convenir particulièrement dans le traitement de l'aménorrhée, de l'asthme, de la plithisie, &c.

On désigne aussi en matière médicale, sous le nom de *munie*, l'asphalte ou le bitume de Judée. Van-Hellmont, d'autre part, donnoit, dans son langage figuré, le nom de *munie* des os (*munia medullæ*) à la moelle, de *munia transmarina* à la mauve, & de *munia elementorum* à la com-

position fantastique & imaginaire des anciens alchimistes.

Les matières, ou la substance des momies, ont été aussi employées dans les arts, & il n'est pas étonnant qu'elles aient été l'objet d'un commerce assez étendu pour les Arabes. (L. J. M.)

MONANTHEUIL (Henri de), né à Reims, vers l'an 1536. Il fit ses premières études dans l'Université de cette ville, y prit le degré de maître ès-arts, & y professâ les humanités pendant quatre années. Il vint ensuite à Paris, & suivit les leçons du célèbre Ramus, à la philosophie duquel il fut depuis fort attaché. Ce fut à l'étude de la médecine & des mathématiques qu'il se voua avec plus de zèle. Il eut pour élèves dans l'arithmétique & la géométrie, le célèbre historien Jacques-Auguste de Thou, & le savant Pierre Lamoignon, oncle du premier président. Monantheuil fut reçu docteur en médecine le 11 octobre 1568; il devint doyen le 8 novembre 1578, & posséda cette magistrature jusqu'au mois de novembre 1580. Il fut nommé professeur de pharmacie en 1582, & continué en 1583, de nouveau, en 1590 jusqu'en 1594. Il avoit été nommé professeur des écoles en 1575 & 1574. Ses leçons de médecine étoient très-fécondes, & sa réputation comme praticien le fit souvent rechercher.

Monantheuil étant doyen, traduisit au Parlement Roch-le-Bailly, Esclaphe, médecin frangirique. Il harangua devant le Parlement contre ce célèbre empirique, & fit une telle impression, que Bailly fut chassé de Paris en 1579, par un arrêt de la Cour. Sa harangue avoit pour titre : *Oratio in senatu habita, anno 1579, adversus famosum empiricum Rivierum, dictum Roch-le-Bailly, qui decreto senatus expulsus est urbe*.

Charles IX érigea pour Monantheuil une chaire de professeur de mathématiques au collège royal. A la mort de ce prince, cette nomination fut confirmée par son successeur Henri III. Monantheuil ouvrit les leçons par un discours dans lequel il prend la défense des mathématiques, & qu'il fit imprimer la même année (en 1574). *Oratio pro mathematicis artibus*, in-4°, à Paris, chez Denis Dupré. Amiot, grand-aumônier de France, avoit prétendu qu'il ne falloit pas nommer à une chaire royale un professeur qui avoit déjà un autre emploi, & que Monantheuil possédoit la médecine. L'orateur s'attacha, dans ce discours, à contredire ce sentiment, & à démontrer qu'un médecin peut enseigner les mathématiques avec utilité, & allier ensemble deux professions, sans que l'une nuise à l'autre. Son goût pour les mathématiques le fit remarquer dans tout ce discours. Cette science étoit négligée, malgré la fondation de Ramus, dont l'orateur rapporte toute l'honneur. Il exhorte Amiot à se resourcer l'étude, & à bannir les duperesses & les autres ignorances de cette trempe; il le presse de maintenir toutes les conditions de la

fondation de Ramus, & l'excite à nommer des hommes capables pour remplir des places qui étoient alors vacantes. Il reconnoît que le Roi l'avoit nommé pour enseigner les mêmes sciences; mais il ne craint point d'ajouter qu'il est prêt de céder la place, quelque attachement qu'il ait pour elle, si l'on choisit quelqu'un qui ait plus de capacité que lui. Il faut croire que Monantheuil est des ennemis paillans, puisqu'il fut dépossédé de sa place quelques années après, & fut rayé de l'état de professeur & de celui des gages. Cette injustice fut reconnue par ses collègues; ils s'en plaignirent, présentèrent au Roi une requête, où les services & l'assiduité de Monantheuil étoient rappelés, & demandèrent que le Roi rétablît ce professeur dans sa place & dans l'état de sa maison. Henri III accueillit favorablement cette requête, & Monantheuil fut rétabli avec tous ses émolumens & prérogatives. Cet heureux succès le combla de joie. Il la témoigna publiquement par le discours qu'il prononça sur son retour au collège royal, *pro suo in cathedram regiam reditu*, & qu'il fit imprimer à Paris en 1585, in-12. Dans ce discours, il témoigne sa reconnaissance au Roi, au chancelier de Cheverni, au secrétaire d'Etat Pierre Brulart de Genlis, & à tous ses amis & protecteurs qui s'étoient intéressés pour cette affaire.

Monantheuil demeura toujours fidèlement attaché à Henri IV durant les troubles de la Ligne; souvent même on s'assembloit chez lui, sous prétexte de discours de sciences, pour aviser aux moyens de rétablir la paix & de remettre la ville de Paris sous l'obéissance de son roi légitime. Quand cette fourniture eut lieu, Monantheuil en félicita publiquement Henri IV, au collège de Cambrai. *Panegyricus dictus Henrico IV; statim à felicissimâ & auspiciatissimâ urbis restitutione, latine habitus in aula Cameracensi, & postea Gallia versus. Paris, apud Frederic. Morel. 1591.* — Ce discours avoit été imprimé en latin, en 1594, & fut traduit en français. — Monantheuil fit aussi une autre discours, le 14 novembre 1595, dans lequel il engage Henri IV à exécuter le projet de François I^{er}. Ce discours a pour titre : *Quale esse deberet Collegium regium ut sit perfectum?* Il fut imprimé en 1596, in-8^o, & dédié à Achilles de Harlay, premier président du parlement de Paris.

Monantheuil mourut subitement à Paris, en 1606, âgé de 70 ans, regretté de tous les savaus de son temps. Il fut inhumé à Saint-Benoit.

Outre les haranges de Monantheuil, ou à encore de lui : *Admonitio ad Jacobum Peletarium, de angulo contectus*. Paris, 1574, in-4^o.

Commentarius in librum Aristotelis πρὶ φυσικῶν, cum græco textu Aristotelis emendato, & novâ in latinum versione. Paris, 1599, in-4^o. — Monantheuil prétend que ce livre est d'Aristote.

Ludus intro mathematicis, missis factus ad avertendum tres Academia primarios hostes; πλάτων, ἀριστο, ζωπύρι, seu oratio quâ ost-

tenditur non solum utilis, sed etiam omnino necessaria septem artium mathematicarum cognitio medico Hippocrato & Galenico, habita per quatuor dies continuos in aula Cameracensi. Paris, 1597, in-8^o, avec une épître dédicatoire à Jean Rivière, premier médecin de Henri IV. — *Id.* *ibid.* 1700, in-8^o.

De puncto primo geometriæ principio liber. Logdun Batavorum, 1600, in-4^o.

Problematis omnium quæ à duo decentis annis inventa sunt nobilissimæ demonstratio. Paris, 1600.

On a aussi de lui une lettre française à Joseph-Julle Scaliger, pour le remercier d'un exemplaire que celui-ci lui avoit envoyé de son édition de *Manilius*. Cette lettre se trouve pag. 137 des *Épîtres françaises* écrites à Scaliger.

Monantheuil a laissé plusieurs manuscrits, entr'autres un Traité intitulé : *Commentarius in jurisjurandum Hippocraticum*. Gni-Patin & Menlâ s'étoient chargés de publier cet ouvrage, mais ils ne tinrent promesse ni l'un ni l'autre.

Monantheuil avoit aussi composé l'*Apologie contre ce qui est écrit de lui au livre du manent & du malicieux*.

On eut de grandes obligations à Monantheuil pour les réglemens salutaires qu'il prescrivit pendant la maladie pestentielle qu'il affligea la capitale en 1580, réglemens qui furent observés & couronnés d'un heureux succès. (ASDREY.)

MONARDES (Nicolas), médecin du seizième siècle, étoit de Séville. Il fit son cours de médecine à Alcalá de Henares, & alla ensuite pratiquer cette science dans sa patrie, où il mourut en octobre 1578. L'héritière naturelle fut le principal objet de ses études & eût sur elle que roulent une partie de ses ouvrages.

De secundâ venâ in plenitudine inter Græcos & Arabes concordia. Illisli, 1579, in-4^o. Antwerp, 1564, in-8^o.

Dos libros de las cosas que se traen de sus Indias occidentales, que sirven al uso de medicina. Séville, 1565, in-12. L'édition in-4^o est augmentée d'un troisième livre. Charles de l'Escluse a mis les deux premiers livres en latin, sous ce titre : *Simplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum, quorum in medicinâ usus est, historia*. Antwerp, 1574, 1579, in-8^o. La traduction du troisième, par le même auteur, a paru à Anvers en 1582, in-8^o; en français, par Colin, apothicaire de Lyon. Lyon, 1619, in-8^o.

Libro de dos medicinas eccellentissimas contra toda veneria, la piedra Bezaar, & la yerme escoufouera. Séville, 1569, 1580, in-8^o.

Libro que trata de la nieve. Séville, 1571, in-8^o. Il l'opé beaucoup la biffion à la glace, & il assure que les Espagnols n'en font jamais incommodés. (Extrait d'Elky.) (R. G. TITOT.)

MONASTIQUE'S (Ordres). On a de l'éminent

ce nom différentes réunions d'individus soumis à certains réglemens, & formant, au milieu de la société, des nations à part, & comme des variétés particulières de l'espèce humaine.

L'état monastique, comme les autres professions, présente aux médecins qui ont pu l'observer dans le détail de ses pratiques, & dans le genre de vie qui lui est propre, des maladies particulières, des changemens dans l'organisation, & d'autant plus étendus, que plusieurs des usages & des habitudes dont ils font les effets, s'éloignent, dans quelques circonstances, des besoins de la vie les plus impérieux, ou des mouvemens les plus naturels de l'organisation. Nulle autre situation, nulle autre profession, ne montre sans doute à l'observateur philosophe, des exemples aussi remarquables des transformations & des changemens qui se font opérés dans l'homme, lorsqu'il a tourné sur lui-même le pouvoir de modifier l'ouvrage & les lois de la nature, qu'il a si fortement & si généralement exercés par tout ce qui l'entoure.

Les ordres monastiques doivent être considérés sous différens points de vue particuliers relatifs à la médecine.

Un premier point de vue auquel il importe de s'attacher, a pour objet de considérer les ordres monastiques dans leurs fondations successives, sous le rapport de leurs institutions, soit avec l'état des connaissances en général, soit avec l'étude & la pratique de la médecine en particulier.

Il n'est pas moins nécessaire ensuite de chercher à saisir les résultats que peut offrir au coup d'œil rapide sur les caractères & les changemens de l'homme, dans les différentes situations où l'humanité s'est trouvée, suivant les réglemens & le genre de vie propre aux divers ordres monastiques.

Des ordres monastiques sous le point de vue historique.

Les institutions monacales ne furent pas entièrement étrangères aux Anciens. Les fakirs de l'Inde, les collèges de prêtres chez les Égyptiens, chez les Grecs & chez les Romains, peuvent être regardés, jusqu'à un certain point, comme des ordres monastiques, qui différaient toutefois des moines d'Occident, en ce qu'ils n'étoient pas gouvernés par des intérêts souvent opposés à ceux des peuples au milieu desquels ils vivoient, soumis dans tous les liens, avec le dévouement d'une obéissance passive, à l'autorité d'un chef éloigné.

La ferveur du zèle, l'ardeur de l'enthousiasme, les impulsions de la charité & les intérêts de la politique firent successivement établir chez les nations modernes un grand nombre d'institutions monastiques.

On regarde en général la secte des thérapeutes ou des Esséniens chez les Juifs, dans le premier siècle, comme l'origine & le modèle de ces institutions. On les appelloit *ascètes*, de *askoin*, s'exer-

cer (*ascans*), s'éprouver, dont nous avons fait *ascétique* (vie, habitude, contemplation).

Les premiers moines, qui étoient en effet des *ascètes*, des *anachorètes*, s'établirent au troisième siècle dans la Basse-Egypte, sous la direction de saint Antoine, remarquable par une ignorance qui étoit tout-à-fait semblable à ce que nous avons appelé depuis le vandalisme, dont elle est souvent l'aveuglement & la barbarie. D'autres institutions furent fondées dans l'Orient au quatrième siècle, & recurent leurs règles de saint Basile. On reporte aussi à cette époque la première institution d'un hôpital destiné aux lépreux, dans un faubourg de Césarée, & pouvant être comparé à une ville par son étendue, suivant saint Grégoire de Naziance. Ce fut aussi à la fin du quatrième siècle & au commencement du cinquième, que l'on vit se présenter en si grand nombre les *parricobolins*, espèce de moines ou de millionnaires, dont l'institution avoit pour objet de porter des secours aux malades, dans les pays désolés par la peste ou par des épidémies. Ces *parricobolins* étoient soumis à la juridiction de l'évêque d'Alexandrie. Poussés par l'ambition de l'un d'eux, de Cyrille, dont le nom demeure à jamais déshonoré par l'assassinat juridique de la savaute Hypatie, ils excitèrent au théâtre une espèce d'émeute, dans le dessein de compromettre le dépositaire de l'autorité civile, qui étoit opposé aux vues du saint évêque. Ils occasionnèrent des scènes non moins turbulentes, & l'empereur Théodose lui-même fut obligé de prendre des mesures contre ces fanatiques, qu'il réduisit à cinq cents, & dont il enleva les nominations aux évêques.

Depuis le sixième siècle, plusieurs ordres monastiques furent attachés aux hôpitaux, dont les fondations commençoient à devenir nombreuses. (*Voyez Médecine clinique.*)

Des moines qui se vouèrent dans la suite aux travaux de l'érudition & à la culture des sciences, furent établis au Mont-Cassin par saint Benoît, au commencement du sixième siècle, & leur règle se répandit plus tard dans les autres Etats de l'Europe. Dans le onzième siècle, d'autres ordres monastiques s'établirent, tels que ceux des camaldules, des trappistes, réformés plus tard par Jean de Ransé, des chartreux établis par saint Bruno, des trinitaires pour la rédemption des captifs, & des nombreuses institutions établies par saint Vincent de Paule, que les sœurs de la charité, en particulier, regardent comme leur fondateur.

Les premières institutions des moines furent très-éloignées de tout travail scientifique, mais surtout de la médecine, dont leur aulénité composoit les études & les secours : mépris qui s'étendoit à toutes les choses mondaines, à toutes les cultures rationnelles & littéraires ; dans plusieurs ordres même, beaucoup plus sévères que les autres, il n'étoit pas permis d'appeler les médecins dans un état de maladie ; en se confondant ainsi,

« ainsi, on eût manqué de réligion & de courage. Le fatalisme des Orientaux égale à peine cette infatigable, cet abandon de salut de plusieurs ordres monastiques. » Dieu vous guérira s'il lui plaît (disoit saint Pacôme à saint Théodore), « souffrez & ne pensez pas qu'il arrive des maux » qu'il n'a pas voulu : noire vie n'est-elle pas mesurée & pouvons-nous y ajouter ? » Telles étoient les paroles souvent adressées aux moines & aux chrétiens. « Il est vrai (disoit saint Basile) que Dieu a donné des propriétés aux racines, aux fleurs, aux frois de plusieurs végétaux ; mais les maladies ne sont-elles pas les châtimens naturels de nos intempérances ? » Cependant, & dans la suite, plusieurs ordres monastiques se consacraient aux soins des malades & à une médecine populaire. Ils attiroient les hommes, dit Borden, dans leurs retraites, où ils avoient placé des hospices & des hôpitaux à côté des églises, & de la vigne qu'ils cultivotent, & dont les produits, qu'ils faisoient préparer, le vin & l'eau-de-vie, devenaient la panacée générale des couvains & de tout le peuple humble, dévot & serf.

Nous avons déjà parlé des parabolains & de la première léproserie ; les autres moines qui s'occupèrent de la médecine ou du soin des malades, s'adressèrent aux traditions d'un empirisme populaire, les conjurations, les prières & toutes les pratiques superstitieuses ; tels furent les frères de Saint-Antoine, à Vienne en Dauphiné, les Alexiens, les Cellites, les Béguines, les Sœurs noires, &c. &c. Ce fut le temps des prodiges, des miracles, du pouvoir des reliques de toute espèce. Différents lieux & différents saints étoient plus particulièrement célèbres par ces dernières : ainsi les cendres de S. Deus dédit de Bénévent guérissent infailliblement les fièvres intermittentes ; les reliques de saint Ida, du saint Martin de Tours opéroient les cures les plus inespérées : Salerne, Montpellier, paroissent même avoir été redevables à la réputation de leurs reliques, du commencement de leur célébrité médicale ; ces miracles, ces prodiges, se faisoient surtout en faveur des rois, des princes & des grands de la terre. Un des plus remarquables eut pour objet la guérison de l'empereur Henri II, qui vint, au commencement du onzième siècle, chercher au Mont-Cassin des secours contre une affection calculée ; saint Benoît se fit voir à lui en songe dans une chapelle où il avoit couché, fit l'opération, & mit la pierre tirée du vésicle dans la main du malade, qui se trouva entièrement guéri à son réveil. « Le désir de voir partout des prodiges, dit M. Prunelle, qui rapporte ce trait d'après Leibnitz (1), étoit tel, que si l'on trouvoit une source minérale douée d'une propriété salutaire, on la plaçoit sur-le-champ sous l'invo-

cation de quelque saint ; & ce n'étoit plus l'eau minérale, c'étoit le saint lui-même qui possédait les vertus apéritives, diurétiques, &c. Les moines abandonnoient à l'envi leurs monastères pour se livrer à l'exercice de la médecine, qui leur fut à la fin expressément interdit par les décrets de la plupart des conciles du douzième siècle. Toutes nos légendes étoient remplies de relations de cures merveilleuses, avant que Mahillon & les fameux auteurs des Actes des saints eussent dévoilé les menfonges, dont une piété mal entendue les avoit chargées. La fraude étoit même allée si loin, relativement aux guérisons opérées par ceux qu'on vouloit faire placer au rang des saints, que les papes déclarèrent qu'ils n'admettroient plus aucun miracle de cette espèce, dans les actes d'enquête pour la canonisation. » (Prunelle, *De l'influence exercée par la médecine sur la renaissance des lettres*, pag. 95.)

Parmi les moines qui se livrèrent à la médecine, quelques-uns montrèrent cependant un peu plus de savoir & moins de superstition ; ainsi il est évident que quelques-uns d'entr'eux étudioient les ouvrages de Celse (1), & que quelques autres, d'après les conseils de Caliodore, avoient pris Caelius Aurelianus pour guide dans le traitement des maladies, tandis que le plus grand nombre s'en rapportoit aux compilations informes de Marcellus d'Apollée.

Quelques-uns de ces médecins, attachés aux ordres monastiques, obtinrent & méritèrent une certaine célébrité : tels furent, par exemple, Théodore de Cantorbéry & plusieurs autres membres du clergé anglican (2) ; tels furent aussi plusieurs médecins de Salerne, qui se trouvèrent attachés à divers princes, depuis le neuvième jusqu'au onzième siècle.

Les religieuses elles-mêmes se livrèrent à la médecine, eu la regardant comme un exercice de piété & de charité. Une d'elles fut même élevée au rang des saintes par ses guérisons & les miracles (3).

L'exercice populaire de la médecine par les moines, ne leur ayant pas attiré une grande considération, il fut défendu aux membres du haut clergé, tandis que d'une autre part, un synode particulier, tout en conservant le droit de prati-

(1) Voyez les Lettres de Gerbert d'Auvergne, plus connu sous le nom de Sylvestre, *épist. XV*, pag. 83.

(2) Théodore donna lui-même des instructions aux moines, qui exerçoient la médecine.

(3) Hildegarde, abbesse d'un couvent près de Bingen, née en 1098 & morte en 1180. On lui doit une espèce de matière médicale, rédigée suivant l'esprit du temps, & dans laquelle on trouve plusieurs prescriptions assez bizarres : celle de la saignée môle, par exemple, contre toutes les espèces de diabetiques ; la cendre de mouches contre toutes les affections de la peau, & la graine de ridoises contre la salivation & les maux de tête. (Voyez *Histoire de la médecine de Sprengel*, trad. franç., tom. II, pag. 359.)

(1) Vita sancti Meinweri apud Leibnitz script. Brunsv. I, 555.

quer la médecine, leur interdit de la manière la plus rigoureuse, toutes les opérations de la chirurgie (1).

Le plus grand nombre des ordres monastiques fut encore plus opposé dans sa primitive institution, à toute espèce de culture littéraire ou scientifique, qu'à l'étude ou à la pratique de la médecine. En général, les premiers chrétiens, mais surtout les moines du troisième siècle, les solitaires de la basse Thébaïde, ceux de la haute, que dirigea saint Pacôme, les écolotes de la Palestine, les anachorètes de la Géorgie, de la Mingrélie & de l'Arménie, traitèrent les sciences profanes des païens avec le plus grand mépris, & cherchèrent souvent dans la ferveur de leur enthousiasme, à détruire ces plus beaux monuments. Ainsi plusieurs chrétiens d'Éphèse vinrent brûler leurs livres après une prédication de saint Paul qui en blâmait la lecture. Les canons, les conciles défendirent même quelquefois aux évêques l'étude des auteurs païens, & saint Jérôme reprochoit à ses prêtres, comme une espèce de délit, ou du moins comme une faute très-grave, d'avoir lu avec complaisance les œuvres de Virgile. Des bibliothèques entières furent enveloppées dans l'incendie & la destruction des temples où elles étoient placées. Ce fut ainsi qu'à la demande du patriarche Théophile, & par les ordres infensés du crédule Théodose, la bibliothèque d'Alexandrie fut brûlée avec le temple de Sérapis : dévastation qui ne laissa rien ou presque rien à faire aux Arabes, beaucoup moins barbares dans leur enthousiasme religieux, que les premiers chrétiens. Il est malheureusement probable que plusieurs chefs-d'œuvre de l'antiquité, dont nous avons été privés, seroient arrivés jusqu'à nous, si les chrétiens & les premiers ordres monastiques n'avoient pas compris dans leurs profcriptions les monuments des sciences & des arts, parmi les objets du culte & de la religion des Anciens. Alcyonius, suivant Ginguené, fait dire au cardinal Jean de Médicis (depuis Léon X), dans son dialogue *De arto* : « d'avez dire dans mon enfance, à Démétrius Chalcondyle, homme très-instruit de tout ce qui regarde la Grèce, que les prêtres avoient eu assez d'influence sur les empereurs de Constantinople, pour les engager à brûler les ouvrages de plusieurs auteurs poètes grecs, & en particulier de ceux qui parloient des amours, des voluptés, des jouissances des amans, & que c'est ainsi qu'ont été détruites les comédies de Ménandre, Diphile, Apollodore, Philémon, Alexis, & les poésies lyriques de Sappho, Corinne, Anacréon, Mimnerme, Bion, Alcan & Alcée : qu'on y substitua les poèmes de saint Grégoire de Naziance, qui, bien qu'ils excitent nos coeurs à un amour plus ardent de la religion, ne nous

» apprennent pas cependant la propriété des termes attiques & l'élégance de la langue grecque. Ces prêtres, sans doute, montrèrent une malveillance honteuse envers les anciens poètes, mais ils donnoient une grande preuve d'intérêt, de probité & de religion (1). » (Ginguené, *Histoire littéraire de l'Italie*, chap. I, pag. 52.)

Les ordres monastiques qui portèrent d'abord, & beaucoup plus loin que les autres chrétiens, le mépris des choses savantes & mondaines de l'antiquité, s'adoncèrent, se civilisèrent un peu dans la suite; plusieurs d'eux empêchèrent même la conformation de la barbarie, en se consacrant à la transcription des manuscrits, dans un temps où les bons copies étoient devenus fort rares, & lorsque d'ailleurs les manuscrits anciens tomboient de vétulité, ou se trouvoient réduits à un très-petit nombre d'exemplaires, par la bouleversement de la guerre & les calamités des conquêtes.

Cette transcription faisoit partie des travaux manuels qui étoient imposés aux moines dans plusieurs ordres; l'excellent Callodore en faisoit lui-même son plus grand plaisir, & l'enseigna à ses religieux avec autant d'habileté que de patience. Les moines les plus instruits ne se bornèrent pas à ces travaux d'une manière purement mécanique; ils s'attachèrent à perfectionner les caractères de l'écriture & à cultiver avec beaucoup de soin l'art particulier de la calligraphie. On attribue d'ailleurs, & principalement ses utiles réformes, à l'abbaye de Ponteville, à l'église de Saint-Remi de Reims, aux moines de Corbie, dont l'heureuse influence contribua si puissamment à faire établir en France le grand caractère romain, tel qu'il étoit dans les beaux temps de la littérature ancienne. (Voyez M. Pruvette, *Op. cit.*)

Cette heureuse habitude donna le désir & le moyen de former des bibliothèques dans plusieurs couvents; d'une autre part, les millionnaires envoyés en Angleterre par saint Grégoire, étoient des hommes instruits, & conservèrent quelques traces de savoir dont le goût se répandit ensuite dans plusieurs autres parties de l'Europe.

Théodore de Cantorbéry, dont nous avons déjà parlé, Colombe, Érigène, Tobie de Rosai, appartenoient à cette savante institution, ainsi que le célèbre Alcuin, dont les services sont demeurés si honorablement unis à la gloire & aux grandes entreprises de Charlemagne.

Les ordres monastiques eurent évidemment alors une part très-active aux établissements d'instruction qui furent formés par ce grand prince, &

(1) Turpius quidem sacerdotes isti in veteres Græcos malevoli fuerunt, sed ingratius, probius & religiosius maximum docere testimonium. (Alcyonius, *medicus legatus prius*, pag. 69, édit. de Mencken. Lipsick, 1707.)

(1) Le synode de Reims, de 1131.

d'où résultèrent les écoles des cathédrales ou des monastères, ainsi que les académies carlovingiennes, qu'il ne faut pas confondre, comme on l'a fait trop souvent, avec les universités, dont la fondation, beaucoup plus récente, ne remonte pas même, pour les plus anciennes, au-delà du douzième siècle. Il ne nous appartient pas de rappeler ici avec détail l'histoire de ces savantes institutions; nous nous arrêterons seulement sur ce qui concerne la médecine, qui fut enseignée sous le nom de *physique*, d'après les Capitulaires de Thionville, en 805, dans plusieurs de ces écoles, dont quelques-unes furent très-célèbres (1). Un des hommes les plus savans de cette époque (2) apportoit que, parmi les arts libéraux qu'il avoit appris dans une de ces écoles, se trouvoient la médecine & l'agriculture. On voit aussi par les lettres de Gerbert, que plusieurs personnes attachées aux ordres monastiques cultivoient la médecine, au moins comme une branche de la philosophie.

Cependant, parmi les médecins qui se formèrent dans ces écoles, & qui appartenoient en général au sacerdoce, on en trouve à peine quelques-uns dont le nom ait mérité d'être transmis à la postérité : ce fut beaucoup plus tard, dans le onzième siècle, & lorsque les relations avec les écoles arabes s'établirent, que plusieurs hommes, sortis des cloîtres pour acquérir des connoissances, fournirent à l'Occident des savans en général, ou des médecins en particulier beaucoup plus recommandables, tels que Lupat de Barcelonne, Campano de Navarre, Gérard, qui traduisit Galien, enfin Constantin dit *l'Africain*, que l'étendue de ses connoissances fit pourvoir comme forçier, & le célèbre Gerbert, que les honneurs de la tiare défendirent à peine contre cette accusation. Dans les temps plus modernes, plusieurs ordres monastiques se sont rendus de nouveau recommandables par le goût de l'étude & même par des travaux littéraires d'une grande étendue, tout en cessant de s'occuper d'une manière spéciale de la médecine, dont la pratique leur fut interdite par plusieurs conciles.

Des ordres monastiques relativement à leur influence sur l'organisation.

L'état monastique, considéré sous le point de vue de l'influence des habitudes & du genre de vie qu'il lui soit propre, doit être classé parmi les professions qui ont cela de remarquable, qu'elles s'exercent en commun, & qu'il se joint aux différentes particularités de leurs effets, sur les dispo-

sitions physiques ou morales, la puissance incalculable de l'imitation, toujours inséparable de la nécessité de travailler & de vivre continuellement ensemble, d'être sous le même joug, de porter les mêmes fers, & de se trouver dans la même atmosphère. Dans l'exposition des variétés de l'espèce humaine, & dans l'examen de l'effet des professions, sur la disposition de la santé & la différence des maladies, on n'a point assez apprécié peut-être toute l'importance d'une situation aussi remarquable dans la vie monastique, de cette réunion d'un grand nombre d'individus de l'un ou de l'autre sexe, rassemblés dans un même local, soumis à un même régime, quelquefois très-extraordinaire, gouvernés par les mêmes opinions, & livrés à des travaux ou à des loisirs semblables. D'une autre part, les observateurs ont manqué le plus souvent à ce genre de faits, aux remarques délicates & importantes qu'il étoit possible de faire dans un pareil état de choses, sur les changemens de l'organisation & les développemens des maladies. Quoi qu'il en soit, plusieurs effets de la vie monastique sont trop remarquables pour avoir entièrement échappé aux observateurs. Ce qui frappe surtout, & au premier coup d'œil, dans la position particulière & si souvent violente où elle se trouvoit pour plusieurs ordres, ce sont des changemens à peine croyables dans la nature de l'homme, la répression de tous les penchans, des impulsions, des directions nouvelles dans les idées & dans les sentimens; enfin plusieurs exemples d'insensibilité, de souffrances, d'épreuves dans lesquelles on diroit que l'homme a voulu faire sur lui-même, & pour arriver à quelques vérités importantes, plusieurs de ces expériences, auxquelles les physiologistes ont soumis les animaux vivans, dans les vues & dans l'intérêt de la science qu'ils cultivoient.

Les fakirs de l'Inde avoient déjà donné l'exemple de ces supplices volontaires, & en eussent toujours si imposant, de la doctrine de la vie. Les uns faisoient des mois, des années, dans une attitude forcée & difficile; d'autres se déchiroient par des cilices ou par les coups redoublés du martinet, ou se couchaient sur un plan hérissé de pointes de fer; d'autres se plaçaient sur un brasier, se brûlaient & se connoient de blessures, se mutiloient, se condamnoient à des jeûnes, à des abstinences, à des efforts de tous genres. Les premiers anachorètes, les cenobites de la basse & de la haute Thébaïde ne montrèrent pas moins d'enthousiasme & de fanatisme; plusieurs vivoient nus ou presque nus dans leur solitude, où ils se condamnoient aux pénitences les plus cruelles & aux privations les plus extraordinaires. Un d'eux, saint Dorothee, vécut soixante ans dans une caverne, avec six onces de pain par jour, de l'herbe & un peu d'eau. Les femmes elles-mêmes, telles que sainte Marie l'Egyptienne, ne montrèrent pas moins de zèle, & plusieurs ne vouloient prendre

Z a

(1) Les écoles de Lyon, de Metz, de Fulde, d'Osna-bruck.

(2) L'abbé de Corbie. (Voyez la grande Collection des historiens de France, tom. II, pag. 334.)

pour aliment que les racines & les herbes de quelques plantes non cultivées. Saint Jérôme se condamnoit lui-même à des tourmens, à des abstinences semblables, mais sans pouvoir éteindre l'ardeur de ses sens, ni repousser le fœuvein & l'image des dames romaines, qui le poursuivoient sans cesse dans les horreurs de sa folitude. Saint Jean Climaque, qui fut témoin de ces anxiétés des premiers cénobites, les a décrites avec une vérité effrayante. « J'en vis, dit-il, dans ces pri-
sons, qui passaient les nuits debout pour forcer la nature, & se reprochaient le sommeil; d'autres, les mains liées derrière le dos, frappant la terre de leur front, & à genoux sur la cendre, s'écrioient qu'ils n'étoient pas dignes de regarder le ciel. Quelques-uns, alpis & froissés par un cilice, se battoient si fort la poitrine, en poussant des soupirs, qu'ils sembloient s'arracher l'âme : cependant ils se reprochoient de ne pas faire plus de pénitence, & de ne pas répandre assez de larmes. J'en vis qui paroissoient hors d'eux-mêmes endurcis par la douleur, & comme insensibles; d'autres braulant la tête, rugissant comme des lions. Nous savons, disent-ils, qu'il n'y a pas de supplice dont nous ne soyons très-dignes : vous n'entendez que ces paroles, malheur, malheur à moi ! pardon, pardon, Seigneur, miséricorde ; faites-nous grâce, s'il est possible. Vous en auriez vu la langue aride, brûlante, hors de la bouche, se priver de boire; d'autres, abattus de tristesse, & dont les corps étoient couverts de pustules & de vermine, faite d'en prendre soin, oublioient toute nourriture ou mangeoient de la cendre avec du pain : leur peau, attachée aux os, étoit desséchée comme de l'herbe : tous avoient sans cesse la mort devant les yeux, & se récrioient en tremblant : quelle sera la sentence ? puis ils s'entre-dema-
noient : frères, avançons-nous en perfection ? frayoient-ils la porte jusqu'à la fin ? il faut courir sans s'arrêter cette malheureuse chair.
« Ils avoient, dit encore saint Jean Climaque, les yeux creux, les joues rouges & sillonnées de larmes, & toutefois un teint pâle, livide, exténué de jeûne, la poitrine meurtrie, & souvent ils crachoient du sang ; leurs genoux étoient endurcis & calleux ; ils ignoroient l'usage des lits & toute propreté, en sorte que leurs vêtements déchirés se remplissoient d'insectes ; ils ressembloient à des croquebuts dans des cachots, ou à des possédés. Mettez-nous les fers aux pieds & aux mains, pour ne les en tirer qu'à la mort, craignent-ils quelquefois à leur abbé ; & quand ils se croyoient près de mourir, ils le conjuroient de les jeter comme une charogne de bête, sans sépulture. »

Les cénobites d'Occident, établis dans le onzième siècle, les ermites de Vallonbreuse, les trapistes, les chartreux, sans se livrer à des austérités aussi dégoûtantes, ne portèrent pas moins

loin le mépris de la douleur ou de la vie, & l'étendue, les efforts qu'ils oppoient aux penchans & aux besoins les plus impérieux de la nature. Dans la suite, les différents ordres monastiques se font éloignés d'une anxiété aussi exagérée, aussi contraire au véritable esprit de la religion ; mais le sentiment moral qui les anime, la continence forcée, le régime sévère de quelques ordres, ont conservé assez de force pour modifier sensiblement l'organisation, pour imprimer, par exemple, un caractère particulier aux traits du visage, & donner lieu à différentes maladies.

Les sentimens qui dominent dans la vie monastique, tels que l'obéissance passive, le mysticisme, la résignation, donnoient nécessairement, à la longue, un caractère remarquable & presque indélébile à l'habitude du corps & à l'ensemble de la physionomie.

Les physionomies sacerdotales d'une classe inférieure sont remarquables en général par quelque chose de résigné, de calme, qui annonce un esprit borné & crédule : expression dans laquelle on démêle parfois, avec quelque facilité, plusieurs signes de dissimulation, de modestie affectée, & d'une humilité qui est moins dans l'âme que dans les manières.

Les moines de plusieurs ordres offrent en outre, dans leurs poses, dans leurs attitudes, dans leur expression, quelque chose de particulier, & qui les seroit reconnoître presque aussi facilement que le collume qui leur est propre. On a dû faire souvent cette réflexion, en admirant les tableaux de Le Sueur. Comme ces disciples de saint Bruno, qu'il a peints, font bien caractérisés ! & combien leurs différentes physionomies expriment avec une grande propriété d'expression, la dévotion, l'abnégation & le dévouement religieux de ces pieux solitaires ! Il y a dans ces figures quelque chose de calme, de reposé, d'étranger à la terre, qui se reproduit sous mille formes, sans fatiguer par l'uniformité.

Si les solitaires de la Thébaïde, les ermites de Vallonbreuse, les trapistes & les autres ordres monastiques avoient eu un Lefneur pour les peindre, nous ne serions pas moins frappés du caractère particulier de leur physionomie, & du double effet que produit à la longue, sur ces hommes rassemblés, le pouvoir de l'imitation & l'action sans cesse renouvelée d'occupations & de pensées semblables & uniformes.

Du reste, la vie monastique présente dans son régime & ses habitudes physiques, pour les différents ordres, des diversités qui ne permettent pas d'attribuer aux moines, comme à des personnes d'une même profession, une hygiène spéciale & un développement particulier de maladie.

Ce qui est commun seulement dans ce genre de vie, & ce qui, dans plusieurs circonstances, a modifié sensiblement la santé, c'est la continence forcée, le célibat souvent laborieux & difficile

auxquels des hommes & des femmes, dans la force de l'âge, se trouvoient également condamnés dans tous les ordres monastiques.

L'irritation continuelle de la peau par des vêtements grossiers, un état continu d'exaltation, le mépris des soins de propreté, considérés comme un vain luxe & une délicatesse mondaine, étoient bien plus propres d'ailleurs à faire sentir péniblement les inconvénients de cette continence, qu'à les affaiblir & à les diminuer.

Ceux qui vivent dans le célibat, hommes & femmes, disoit Borden, ne prennent point assez garde que leur négligence & la malpropreté dans laquelle ils semblent se plaire, ne font pas les meilleurs moyens de repousser les tentations. . . . la nature se fortifie & l'amour germe sous la baine.

« Nos anciens solitaires s'écartoient à cet égard » de leur objet principal, en dédaignant les bains » & la propreté. . . . Les calomniateurs de saint » Jérôme trouvaient mauvais qu'il passât sa vie avec » quelques dames romaines : il répondoit qu'elles » étoient trop dégoûtées pour inspirer des desirs. » Cette réponse étoit faible & peu concluante. » On » ne me reproche, dit-il, que mon sexe. . . . ja » n'ai jamais donné dans le luxe au sujet de la » parure; je ne connois ni l'usage des perles, ni » celui des habits de soie, non plus que celui de » peindre mon visage; j'aurois pu, étant à Rome, » m'attacher à des femmes bien différentes de » celles qui passent leur vie dans le jeûne & les » pleurs, qui sont très-malpropres, maigres & » décharnées, & que le soleil trouve sautant leurs » prières. La continence est leur unique plaisir, » elles ne pensent qu'à pleurer; on ne les voit » jamais manger. . . . Ainsi vivoient Paule & Mé- » lanie. On ne parleroit point d'elles, si elles » alloient aux bains publics, & si elles n'osoient de » la liberté de leur état. . . . Telles qu'elles sont, » on les accuse de vouloir passer pour belles, & » de perdre leur ame en macérant leur corps. . . . » D'autres se plaisent à la parure & à la toilette; » elles méprisent ces sortes de propretés recherchées; d'autres ne parlent que de leurs repas somptueux. . . . nous vivons de sèves. J'aime mieux Paule & Mélanie courbées sous la pénitence, & pleurant leurs péchés, que tous ces beaux cercles où l'on ne fait que babiller & médire. . . . elles ne boivent que de l'eau fraîche, » tandis que d'autres se gorgent de vins préparés » & miellés. . . . Il n'y a pas, se méprendre sur la pureté des intentions de saint Jérôme; mais nous parlons en médecins, & nous pouvons mettre en thèse, que toutes ces macérations, cette diète & cette malpropreté de Paule & de Mélanie n'étoient point les recours les plus efficaces auxquels elles auroient pu avoir recours : au contraire, elles se trompoient dans le choix des moyens, & saint Jérôme avec elles. (*Voyez Borden, Recherches sur les maladies chroniques, pag. 425.*)

Des migraines violentes, des palpitations habituelles, des menaces fréquentes de suffocation, les nombreux défordres qui peuvent résulter de l'irritation & des névroses abdominales, se manifestent souvent dans les deux sexes, à la suite de cette continence intempestive & difficile. La raison même succomba plusieurs fois dans une situation aussi contraire aux vœux de la nature. Buffon entr'autres a cité un exemple bien remarquable d'une aberration occasionnée par une cause semblable, & dont les détails lui furent transmis par le malheureux ecclésiastique qui en fut la victime (1).

Les effets de ce même célibat sur des hommes robustes, & que les aullérités du cloître ou les progrès de l'âge n'avoient pas encore affaiblis, ont été regardés aussi comme la cause des sentimens d'indépendance & de liberté qui se réveillèrent parfois dans l'ame de ces hommes, & qui occasionnèrent, dans différentes circonstances, des troubles si violents dans plusieurs maisons religieuses.

Les travaux corporels excessifs, la qualité peu nourrissante des alimens, des jeûnes extraordinaires, des abstinences prolongées, avoient évidemment pour objet de calmer cette activité des sens & ce sentiment d'énergie physique qui portoit nécessairement à l'insubordination & à la désobéissance. Tel paroît être du moins l'esprit des réglemens somptuaires de plusieurs ordres monastiques. Quelques fondateurs de ces ordres ont même été plus loin, dit Cabanis; ils ont prescrit des saignées plus ou moins fréquentes. . . . Cette pratique est ce qu'ils appellent, dans leur latin barbare, *minutio monachi*; & suivant la température & l'état physique du pays, suivant le régime & les travaux habituels des communautés, suivant le tempérament & le caractère de chaque moine, ils ordonnent d'éloigner ou de rapprocher les saignées, de les rendre plus ou moins abondantes, en un mot, d'*amoinir le moine* (*minuere monachum*), suivant l'exigence des cas.

De quoi s'agissoit-il en effet, ajoute le même philosophe? de plier aujour d'hui l'union d'hommes dans toute la force de l'âge, que la retraite & l'uniformité de leur vie ramenoient sans cesse aux mêmes impressions, & qui pesoient longuement sur leurs moindres circonstances; à qui la méditation contemplative & l'expérience du monde, en leur ôtant sans cesse des peintures chimériques de ce qu'ils avoient perdu, devoient nécessairement inspirer les idées les plus bizarres, les penchans les plus fangeux. Il s'agissoit de ranger ces êtres dégradés, à des lois encore plus absurdes qu'eux-mêmes, à des lois qui violoient & soulevoient aux pieds tous les droits & tous les sentimens de la nature humaine.

(1) Edit. du Louvre, in-12, Supplément.

» Il falloit faire plus : il falloit, s'il étoit possible, » leur faire approuver & chérir la barbarie elle-même de ces loix.

» Ces esprits ardens & mélancoliques, ces » jeunes gens, dont les erreurs de l'imagination, » l'inquiétude aventurière, des goûts singuliers, » des espérances folles déçues, où l'indolence & » la faiméante peuploient les cloîtres; ces hommes » dévoués au malheur, dont tout concouroit à » troubler de plus en plus la tête, à faire fermenter les passions, avoient besoin d'être réprimés sans cesse, d'être rabaisés au-dessous d'eux-mêmes. Leur existence toute entière n'eût été qu'un tourment pour eux. Mais on peut juger en outre, d'après les relations les plus exactes qui nous ont été transmises de la vie intérieure des cloîtres, que les fétions & les révoltes étoient toujours près d'éclater (1) dans ces lieux de désespoir, & que la fureur des supérieurs leur paroissoit demander la diminution directe des forces physiques de leurs infortunés esclaves (2). » (Cabanis, *Rapports du physique & du moral de l'homme*, tom. II, pag. 61, 2^e édit.)

Les habitudes diététiques les plus sévères des différentes corporations monastiques avoient aussi, & il faut l'avouer, un autre objet; elles se rattachent à des observations assez exactes, relativement à l'influence de certain régime ou de certaines nourritures, sur les habitudes de l'esprit ou les affections de l'âme, la pratique plus facile de certaines vertus, la disposition à la vie contemplative, le penchant à l'enthousiasme & au besoin, l'exaltation & les fureurs du fanatisme. Du reste, les jeûnes si sévères, ce régime en apparence si mal proportionné avec l'entretien des forces, & les pertes régulières qu'entraînent la nutrition, n'étoient pas aussi contraires à la santé & à la longévité, que l'on seroit tenté de le croire.

Un tableau comparatif de la durée de la vie, tiré des biographies d'un certain nombre d'académiciens, & des solitaires les plus célèbres de la Thébaïde, a même donné comme résultat, une vie moyenne plus étendue pour ces derniers, que pour les hommes qui cultivent les sciences ou les lettres.

(1) Les personnes au fait de l'intérieur des couvents, surtout de ceux d'ordres très-sévères, savent que la guerre y régnoit continuellement entre les particuliers, & que les supérieurs étoient souvent menacés du fer ou du poison.

(2) Dans les couvents d'un des généraux des Chartreux, appelé Guigues, on trouve l'article de la faligne, ou de manie; minimeur en onze cinquante. Sans cela, ces malheureux tombent dans de violents délire, ou le couvent échoit en proie aux scandales & aux mêmes désastres qui éclatent dans les bagues & dans les prisons.

Ce Guigues gouverna depuis 1109 jusqu'à 1136. (Voyez les *Annales de l'ordre des Chartreux*, par dom Mallon, qui dit que dix son temps, c'est-à-dire, dans le dix-septième siècle, on s'agitoit les moines avec plus de réserve.)

Il importera cependant de remarquer que la règle particulière ou les devoirs, les exercices, les habitudes de certains ordres monastiques, exposent à une mort prématurée, à certaines maladies ou à certaines infirmités plus ou moins graves : tels sont, relativement aux chances d'une mort accidentelle, & avant le terme ordinaire de la vie, les ordres dont l'institution charitable & vraiment philanthropique a pour but de porter des secours dans les maladies contagieuses, de protéger les voyageurs au milieu des glaces & dans les passages les plus difficiles des Alpes, où de faire pénétrer les germes de la civilisation & les principes de la morale religieuse chez les sauvages, dans l'exercice aussi difficile que périlleux des missions.

Les ordres dont la discipline expose davantage à des maladies ou à des infirmités particulières, sont ceux parmi lesquels tous les genres d'austérités & de pénitences sont exagérés, où l'on est privé en partie du sommeil ou de nourriture, livré à des travaux excessifs, forcé de demeurer long-temps debout ou à genoux, de chanter, de prier dans cette attitude : poussez donc l'effet occasionnel souvent des bernies, qui étoient si communes chez les trapistes, & qui, abandonnées à elles-mêmes avec toute la résignation & l'inouïssance ascétiques, étoient suivies des accidents les plus graves & des terminaisons les plus funestes.

(L. J. M.)

MONCHAUSSON (Eaux minérales de). C'est un lieu ainsi nommé, entre Saint-Gilles & Saint-Flour, où se trouvent des eaux minérales froides peu connues. (MACQUART.)

MONDE (Régime des gens du). (*Hygiène.*)

Partie III. Moyens de l'hygiène.

Classe I. Règles générales.

Ordre I. Principes généraux de régime.

On pourroit diviser la société générale en individus qui ne sont pas riches & en ceux qui le sont. L'hygiène, en s'occupant également de la santé des uns & des autres, observe que les premiers, qui forment la masse d'une nation, présentent souvent des malheurs auxquels la fortune a refusé les besoins de première nécessité, qui, privés des lumières personnelles, qui font la suite d'une bonne éducation, trouvent difficilement, pour se guider, des personnes instruites, aux avis desquelles ils ne demandent pas mieux que de s'écarter dans les différentes infirmités auxquelles ils sont sujets.

Les seconds, bien moins nombreux, offrent des individus à qui rien ne manque, & qui, malgré les lumières qu'ils doivent à une instruction soignée, ne semblent vivre que pour hâter leur destruction. Quand, au milieu de jouissances flatteuses d'un luxe effréné, la douleur vient leur donner une leçon de tempérance, s'ils implorent le secours

des personnes les plus éclairées dans l'art de les calmer, ils voudroient les forcer à les guérir plutôt qu'à leur insu; ils ont tout fait pour le rendre malades, & à peine veulent-ils faire quelque chose pour le rétablir.

C'est leur rendre un service important que de leur faire sentir l'impossibilité d'un arrangement qui contrarie les lois de la nature, qui ne fait faire acception de personne. Le mal qui les fait rentrer dans la classe générale, exige le secours de plusieurs volontés, pour trouver plus sûrement & plus commodément une fin prochaine.

Il faut convenir que la grande aisance se plie difficilement à l'espèce de gêne qu'impose le soin de la santé; c'est pourquoi il est bien moins aisé d'astreindre au régime les gens du monde, que ceux qui y sont forcés pour la vie. En suivant le plan de Tissot, qui, parmi le peu d'auteurs qui ont écrit sur la santé des gens du monde; est celui qui s'en est le plus particulièrement occupé, nous démontrerons, par comparaison suivie, que plus on s'éloigne des mœurs & de la tempérance des gens de la campagne, plus on est exposé au danger des grandes civilisations, surtout quand on peut y porter un grand luxe & une grande dépense.

Entre le riche & le campagnard, il existe la même différence qu'il y a entre un enfant sain & un enfant malade; le premier s'amuse de la moindre chose, le second se trouve agité par quelque peu d'amusement qu'on lui procure. Quand nous aurons esquissé le tableau de l'abondance & celui de la frugalité, si l'homme du monde persille dans les goûts qui lui sont nuisibles, il ne pourra s'en prendre qu'à sa propre faiblesse.

L'abondance reçoit pour nourriture solide & pour boisson, toutes les substances acres, de haut goût & finement assaisonnées, tels que les jus, les coulis, les aromates de toute espèce, les vins les plus chauds, les plus pétillans, les liqueurs les plus fines, c'est-à-dire, les plus fortes, souvent presque éthyérées, puis le café, le thé, &c. &c.; on mange d'autant plus, que le goût est plus attaché par la délicatesse des mets qui sont offerts, & qu'on ne s'aperçoit pas dans le moment des inconvéniens qui résultent par suite de l'excès du travail qu'on donne journellement à l'estomac.

La frugalité se contente de pain, de lait, de beurre, d'un peu de viande, de légumes, de farineux, dont l'assaisonnement se fait avec le sel, le poivre, le persil, l'ail & le cerfeuil. L'eau fait la boisson la plus habituelle; si l'on se permet du vin, c'est en petite quantité, mêlé à l'eau, & sans en changer l'espèce dans un même repas. Jamais l'homme n'est fatigué par ce régime, qui, n'exigeant que ce qu'il faut pour satisfaire au besoin, laisse toujours de l'appétit. C'est ainsi qu'ont vécu des hommes dont l'existence a vu celle de tout un siècle, & ceux-là n'ont pas pris pour devise: *courtois & bonne*.

L'air des grandes villes est toujours infect & malsain; les spectacles, les sociétés nombreuses, où il y a beaucoup de lumières, les boues, les égouts, tout cela ne peut soutenir la comparaison avec l'air pur qu'on respire à la campagne, où le cultivateur mal logé, mais toujours frais & actif, se rend bien moins accessible aux vicissitudes du chaud, du froid & de l'humidité, que le citadin pile & passif, quoique bien mieux logé & bien clos. C'est positivement la différence qu'il y a entre une plante qui croît en plein air, & celle que l'on cultive à l'ombre ou sur une fenêtre.

Si l'exercice est une des grandes bases de la santé, qu'on voie ce qui se passe dans un grand cercle, où des personnes même délicates restent inactives toute une journée, pour se donner la nuit des mouvemens mal combinés.

A la campagne on repose la nuit, on veille tout le jour, on ne s'étiole pas, & la force, qui est la suite de ce régime, est le bénéfice de l'exercice & la récompense des plus utiles travaux.

Mais si le physique fait peu d'exercice dans le grand monde, on s'en dédommage bien sur le moral; nulle part on ne trouve autant de passions en jeu, autant de sensibilité, autant de tourmens.

En effet, souvent les passions ont une influence plus marquée sur la santé de l'homme que l'air & les alimens. Les affections fortes, sans en excepter les plus agréables, agissent & minent insensiblement l'existence; quelquefois même elles tuent sur-le-champ. A cet égard, la comparaison est bien en faveur de l'habitant des campagnes. L'homme du monde a sans cesse l'imagination frappée d'une grande variété d'objets & d'intérêts différens, tandis que l'autre, occupé d'un petit nombre de choses qui se représentent successivement & dans le même ordre, se conduit en automate. Cette économie d'idées est pour lui un des plus sûrs préservatifs de la santé, qui se trouve d'autant plus assurée, qu'il réfléchit moins.

C'est ce qu'indiquent les vers suivans, de la belle épitre à M. de Montuté :

La nature a voulu sans doute en mère sage,
Entre tous ses enfans faire un égal partage;
Aux brutes s'accorder qu'un instant de lumière,
Mais un place d'esprit leur donner la santé.

A ce titre, le potentat éclairé qui est chargé du pesant & précieux fardeau de rendre les peuples heureux, doit, quand il s'en occupe essentiellement, rencontrer une suite d'obstacles à la conservation de sa précieuse santé. Si sa santé s'altère en pensant beaucoup & fortement, quels seront les dangers sous l'empire des passions? L'ambition des honneurs & de la fortune, que le luxe rend nécessaire, tient l'une dans une agitation qui suffit seule pour détruire la santé, qui ne peut tenir contre les revers, les mortifications, les dépit,

les dissimulations, les jalousies & les chagrins de toute espèce qui en sont inséparables.

Le laboureur n'ambitionne que des récoltes abondantes, à l'aide des saisons favorables; tous ses vœux se tournent de ce côté, ce sont ceux de ses voisins, & ils ne se croient pas, car il n'attache point son bonheur à une multitude d'objets qui, étant aussi enviés par les autres, deviennent un sujet de rivalité, ou un prix que chacun se dispute. Il ne recherche ni honneurs, ni faveurs, ni vanité. Seul artisan de sa petite fortune, entouré des siens & de ses égaux, qui pensent comme lui & se prêtent aisément à toutes les volontés, il n'est la victime d'aucune passion profonde & destructive. S'il en éprouve quelquefois, sa sensibilité étant moins grande, elles sont bien plus foibles & bien plus passagères. Il n'est jamais mu que par le présent, au lieu que l'homme du monde a toutes les inquiétudes de l'avenir.

Combien de femmes (sans parler des autres causes), par cette succession continuelle de terreurs, qui font la suite de leur mobilité, se trouvent dans des états violens qui dérangent habituellement leur organisation!

Un souffle, une ombre, un rien, tout leur donne la fièvre, a dit Lafontaine,

Cette grande sensibilité rend les gens du monde victimes de leurs affections, même les plus honnêtes. Les malheurs de leurs parens, de leurs amis, ceux de l'humanité & de la vertu souffrante, font pour eux des maux cruels qui les troublent souvent plus que les leurs propres, & nuisent essentiellement à leur santé; & de ce côté, puisqu'ils sont plus sensibles à toutes les impressions que l'homme des champs, il est de toute nécessité qu'ils souffrent davantage.

Une suite des passions, c'est de troubler le sommeil; aussi à la ville, le jeu, les dettes, les inquiétudes, les soins de toute espèce, & par-dessus tout cela les indigentions, viennent souvent éveiller l'existence qui soupire après le repos.

Le payan, qui ne connoît ni les erreurs de l'âme ni celles du régime, entrevoit à peine l'intervalle entre son coucher & son lever; l'inquiétude & le mal-aise ne fument point avec lui; il ne connoît point les cauchemars, n'est point troublé par des rêves brusques & effrayans, & ne s'échauffant pas au lieu de le rafraîchir, il est toujours sûr de trouver dans le repos la force qui doit suffire aux travaux du lendemain.

La manière de vivre des gens du monde, laissant difficilement à l'estomac & aux autres viscères le jeu qui leur convient, les sécrétions & les excréments se font imparfaitement; la transpiration est souvent inégale & quelquefois supprimée; c'est cependant une fonction qu'il faut redouter intimement de voir déranger, puisqu'elle est toujours la

cause la plus commune des maux qui affligent l'humanité.

Pourquoi faut-il que malheureusement on ne se persuade bien ces vérités que quand les maladies & les infirmités précoces viennent en avertir les mortels imprudens? Ils sont bien forcés de chercher alors, dans les bras de la médecine, des secours capables de réparer des fautes aussi volontaires. Heureux quand elle arrive à temps, & quand on ne lui donne pas à récrépiter des édifices qu'il n'est plus donné à l'homme de rebâtir!

Lorsque des aliments acres, des boissons échauffantes, des assaisonnemens brûlans, ont dérangé la sécrétion de l'humeur gastrique, qui se sépare dans l'estomac, pour servir à la digestion des aliments, cette dernière fonction se faisant mal, la bile s'enflamme, les congestions succèdent, les engorgemens naissent, le fœmeil disparaît, la santé se fane, & la porte est ouverte à toutes les maladies chroniques.

On doit aussi mettre au rang des excréments les plaisirs de l'amour, & ici tout l'avantage reste encore à l'homme de la nature. Accoutumé de bonne heure à une vie active & fatigante, à l'abri des lectures dangereuses & des objets de séduction qui fourmillent dans les grandes villes, il ne connoît que tard le besoin d'une compagne. Lorsque son accroissement a acquis toute sa perfection, ce n'est plus qu'un excédant de santé qu'il met à sa disposition, sans éprouver jamais dans les desirs cette impatience qui naît d'une imagination échauffée & passe le but de la nature.

Le jeune citadin le trouve dans des circonstances, tout-à-fait différentes: chez lui, le libertinage devance toujours de quelques années l'âge de la force; la lecture des livres inutilement descendus, puisqu'on en permet la publication & la vente, l'inspection des tableaux & des estampes libres, la vue des femmes publiques, la liberté dangereuse qu'on leur donne de trop bonne heure, le mauvais choix qu'on lui laisse faire dans ses liaisons, tout cela, sans contredit, suffit bien pour lui donner des habitudes facheuses, qui bientôt seront suivies, ou de maladies qui tiennent à la débauche, ou de celles qui sont la suite des excréments prématurés, qui ne manquent jamais de mener à un véritable dépérissement dès la fleur de l'âge.

Nous avons fait connoître dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, les désavantages qui résultent de différentes parties de l'habillement, surtout des corps balcinés, des différentes ligatures dans le jarret, au bas-ventre, aux aisselles, au cou, au poignet, qui toutes apportent une grande gêne dans la circulation & dans le jeu des parties.

Si les habitants des villes se font en partie corrigés de l'habitude cruelle des corps balcinés, qui étoit encore générale vers le milieu du siècle dernier, ils ont acquis d'un autre côté, avec les modes nouvelles, de nouveaux moyens de distraction,

traffion, qui certes ne seroient pas pencher la balance en faveur des modernes. On va voir jusqu'à quel point les femmes de nos jours ont poussé l'oubli de ce qu'elles se doivent à elles-mêmes & à la société dont elles font l'ornement, par l'inconvenance de leur habillement.

On pourroit, il y a quelques temps, considérer les robes des femmes comme leur vêtement principal; celles d'aujourd'hui n'en font plus qu'une ombre légère.

Les Françaises ont cru que la révolution seroit incomplète si elle ne s'étendoit jusque sur les modes; elles en ont donc fait une à leur manière, qui, dans son genre, n'a pas été plus heureuse que l'autre. Pour nous dépayser, c'est dans la Grèce qu'elles ont été chercher les modèles de leurs costumes. Comme les Grecques étoient du voyage, on se contenta de combier l'agréable, sans s'inquiéter de l'utile, ce qui cause quelques erreurs de calcul relatives aux saisons & aux températures. On ne fit pas attention que si les gens n'ont jamais songé à se vêtir comme les habitants du Nord, on pourroit en France parodier au moins impudenter en adoptant les habillemens des pays chauds.

En effet, les draperies dont se couvrent nos jolies femmes sont si aériennes, qu'elles ne peuvent les garantir, même dans les plus belles heures de l'été, du soleil & de l'humidité pernicieuse qu'exhale abondamment la terre privée des rayons bienfaisans de l'astre du jour.

Que dire de la température froide qui, dans l'hiver, vient les saisir à demi nues à la porte de ces spectacles tumultueux, où elles attendent, en grelottant, le phédon bruyant, dont la course rapide, en fendant l'air, ne fait qu'ajouter à sa rigueur?

C'est peu d'avoir été plongées pendant quatre ou cinq heures dans un bain d'air vicié par la transpiration & la respiration de la multitude, par la combustion de l'huile & des autres lumières; elles passent subitement d'une température de 15 à 20 degrés de chaleur, à une autre de 8 à 10 degrés de froid, & c'est beaucoup encore quand on s'est doublé ou bien une douillette ou même des yeux, viennent, en couvrant la beauté, amortir le saisissement qu'elle éprouve. C'est ainsi qu'une jeunesse imprudente ose braver l'inflexible nature, qu'elle voudroit faire plier sous le joug des goûts frivoles du moment.

Mais ces présensations elles-mêmes sont insuffisantes, parce qu'elles ne font pas d'ailleurs assez vaines pour passer subitement du chaud au froid. C'est encore un inconvénient assez grave pour les femmes, même bien saines, d'avoir la gorge & la poitrine alternativement découvertes & recouvertes. Il est probable que, dans les grandes villes, ces vicissitudes dans des températures différentes peuvent causer des maux de poitrine plus ou moins dangereux, & dont les femmes de la campagne, qui ont toujours la poitrine couverte,

MUSEE, Tome X.

sont exemptes. Ce qui le prouve invinciblement, c'est la foule de maux & de victimes qui ont eu lieu à la suite de pareils dénuemens. Les moins dangereux accidens qui se sont manifestés, ont été des éruptions sabbites, causées par le resserrement des pores de la peau & des vésicules pulmonaires, des rhumatismes universels, des catarrhes fusoires, des suppurations facheuses, des écoulemens de sang, des coliques, des oppressions, des toux convulsives, la phthisie & l'altération des poudrons.

Grâces aux modes grecques, une quantité effrayante de jeunes femmes aussi agréables que sages, ont été, dans la capitale, les tristes victimes de la vanité & de l'ambition mal combinée. Celles qui n'ont pas succombé ont perdu la santé, & celle-ci a entraîné dans sa chute la perte des attraits & des agrémens dont on avoit si mal combiné l'emploi. On peut affirmer qu'au moins la moitié des femmes qui, vêtues à la légère, se font exposées aux différentes variations atmosphériques, ou dans les promenades de nuit, ou dans les spectacles d'hiver, a été prise par quelques-unes des maladies dont nous venons de faire l'énumération.

Après avoir relevé un si fâcheux abus, après avoir fait sentir aux jeunes & jolies femmes les risques qu'elles ont à courir en cherchant à ravir nos suffrages, nous leur donnerons un avis salutaire pour les circonscrire où elles auroient été saisies vivement par le froid, soit en sortant d'un spectacle, soit après des promenades nocturnes, soit après la danse, &c. : il faut qu'au lieu de retourner chez elles, elles se fassent sur-le-champ conduire chez un baigneur, où elles prendront un bain d'eau tiède, avec quelques tasses de thé ou un verre de bon vin. Ce moyen est infailible & il dissipera les craintes qu'on auroit pu concevoir légitimement, relativement aux suites cruelles du refroidissement de la transpiration qui aura été interrompue. Celles qui auroient assez d'aisance pour pouvoir se procurer un bain dans leur intérieur, auront soin de commander qu'on leur en tienne un tout prêt pour leur retour.

Un désavantage de la toilette des hommes & des femmes qui n'ont pas des têtes à la grecque, c'est que la poudre & la pommade, en bouchant les pores de leur chevelu, arrêtent la transpiration, & produisent souvent des maladies des paupières, des yeux & des oreilles, qui prennent aussi très-souvent pour cause l'application du rouge & du blanc, dont l'usage est toujours dangereux, & d'autant plus inutile, qu'au lieu de rendre de la fraîcheur & de la jeunesse, ils ne font que hâter la sécheresse & les rides de la peau. (Voyez Cosmétique.)

Une belle femme qui, à l'âge de quarante ans, inspira la passion la plus forte à un roi qui en avoit dix-huit, Diane de Poitiers, ne se lavoit qu'avec de l'eau froide & n'usa jamais d'ennemi

À

promade, on en assure qu'à soixante-dix ans elle étoit encore charmante.

La tête inégalement couverte, dans les changements de temps surtout, peut encore causer une suppression fâcheuse de la transpiration. Plus ou moins aisé même les événements d'être nuisibles, en arrêtant la transpiration du visage, & de causer des maux d'yeux, de dents & des éruptions durs & fétides.

Chez les femmes du monde qui ne nourrissent pas, la sécrétion du lait devient une cause de divers accidents aussi fâcheux que rebelles. (Voyez ALLAITEMENT.)

On leur reproche encore un goût très-vif pour les odeurs, qui plusieurs fois ont agi assez puissamment sur des cerveaux foibles, pour en déranger l'organisation. On sait que des femmes en comètes sont devenues folles par l'effet seul des odeurs. (Voyez ODEURS.)

Après avoir indiqué rapidement ce qui cause le plus communément les maladies des gens du monde, nous jetterons un coup d'œil sur les maladies elles-mêmes, qui résultent le plus généralement de l'action continuelle de ces différentes causes, en observant que souvent elles influent sur les générations, de manière à prouver une dégénérescence véritable de rare en rare : ainsi,

Nos pères, bien moins forts qu'ils étoient nos aïeux,
Ont fait des héritiers beaucoup plus foibles qu'eux.

C'est un accident auquel on peut remédier par le croûtement des vases. (Voyez RACE.)

Si la première éducation de l'homme du monde a été bien raisonnée, on le rendoit assez vigoureux pour soutenir, en entrant dans le monde, les choses qu'il doit à effuyer; mais par une éducation molle & efféminée, dès l'aurore de sa vie on commence à ruiner sa santé, ainsi il lui restera peu de choses à faire pour la perdre tout-à-fait, quand il pourra en disposer à son gré.

Il résulte de ces institutions, une délicatesse & une sensibilité prodigieuses aux impressions de l'air, dont les moindres variations incommencent. L'homme délicat, du fond de son alcove, est sûr que c'est le vent du nord qui règne; une infortune & un malaise général lui apprennent. Les inquiétudes lui donnent la migraine; un temps de pluie l'opresse; celui qui est froid le fait tousser ou lui donne des coïques. On se rappelle que le chancelier Clugny prédit au président de Thon; que si le duc de Guise traitoit l'esprit mobile de Henri II, pendant la gelée, il le feroit expédier sans forme de procès.

Les migraines sont une maladie très-fréquente chez les gens du monde; & elles sont une suite d'un vice dans l'estomac ou dans les nerfs, souvent de tous les deux. On a vu des paralysies, des convulsions, des asthmes, des crampes d'estomac &

des dysuries très-fortes succéder à des migraines cessantes.

Un autre effet peu considérable en lui-même, mais qui est une source de maux, ou par l'ingratitude qu'il donne, ou par les remèdes qu'on fait pour s'en débarrasser, ce sont les dardes & les boutons qui viennent au visage; ils sont la suite d'une humeur acre due à l'irrégularité de la transpiration, & qui est bien rarement l'apanage des gens de la campagne, chez qui la sale, qui est aussi due à une sorte d'armonie des humeurs, présente bien moins de désagrément.

La goutte, fruit des mauvaises digestions, de l'inaction, d'un goût excessif pour Bacchus & la déesse de Paphos, est encore un acolyte des citadins opulents, & malheureusement elle passe chez les pères qui l'ont méritée, à des enfants qui sont innocents. Elle devient très-dangereuse quand elle ne se fixe pas, & peut produire des spasmes, des angoisses, des paralysies, des ulcérations, des calculs, des nodosités, quelquefois même la mort par suffocation.

Le poulmon est un des organes qui souffre le plus de la disposition acre & inflammatoire des humeurs; chez des personnes faibles & naturellement délicates. De-là, la toux, l'oppression, les chaleurs de poitrine, l'asthme, les catarrhes, les tubercules & la phthisie. Les mois succulents, les vins forts & des liqueurs, l'abus des femmes, y conduisent par des chemins d'autant plus dangereux qu'ils sont semés de fleurs.

L'estomac est un des organes dont les fonctions sont le plus dérangées par le genre de vie qui caractérise l'opulence. De-là les spasmes, les aigreurs, le dégoût, la bouche sèche & mauvaise, les vomissements, la constipation, les coliques, les hémorrhoides, qui sont plus ou moins souffrir.

Les obstructions des différents viscères, surtout du foie & du méfentère, naissent souvent de l'inaction, plus souvent encore des troubles, des sécrétions & de celle de la bile, par le fait des passions vives. De ces engorgements & de l'acreté des humeurs naissent des hèvres lentes, qui, petit à petit, minent les individus & finissent par les enterrer.

Entre les maladies dont nous venons de faire l'énumération, il en est encore une plus fréquente & plus particulière aux gens du monde; je veux parler des maux de nerfs, qui font évidemment l'effet de leurs maux & de leur régime habituel.

La délicatesse de la constitution, la grande mobilité physique & morale, sont les principales causes de ces maux, qui sont encore facilement augmentés par les veilles, l'acreté des alimens, les mauvaises digestions, le défaut d'exercice, surtout par l'effet des passions, &c. Il en résulte une sensibilité si considérable qu'elle va jusqu'à l'asthme, parce que la réaction des nerfs ou l'irrégularité de leur action n'est jamais proportionnée à l'action

que produit l'impression : de là le mot ridicule de *sapeurs* ; de là de véritables affections nerveuses qui rendent la vie si fâcheuse à tant de personnes à qui d'ailleurs, tout rit, qui sont déshabillées par tout ce qui ne les flatte pas, & continuellement défolées par des idées fâcheuses qu'il n'est pas en leur pouvoir d'éloigner.

Les femmes du beau monde ont encore à ajouter aux maux précédents quelques affections qui sont bien plus communes à la ville que dans les campagnes ; parce que le genre de vie y est bien différent ; ce sont l'irrégularité des règles, les fausses couches, les suites fâcheuses des couches, & les pertes blanches.

Si les règles paraissent tard chez les femmes de la campagne, elles se maintiennent bien plus régulièrement qu'à la ville, où elles sont précoces, mais avec retards ; même sans cause apparente, arrivent fréquemment. Il suit la suite de la délicatesse, du régime, du peu d'exercice, de la langueur & de l'inquiétude des jeunes personnes. De là les maux de nerfs & les coliques artères qui les font cruellement souffrir.

La foiblesse des fibres de l'utérus, qui en rend les évacuations irrégulières, entraîne nécessairement des dispositions aux fausses couches, parce que l'adhérence de l'arrière-faix est bien plus faible, parce que l'abandon du sang étant irrégulier, s'il est trop abondant, il cause des hémorrhagies ; s'il ne l'est pas assez, il ne fournit pas une nourriture suffisante au fœtus, qui se bécote dans les enveloppes. Les fausses couches épuisent les femmes, & la première fois qu'elles reviennent pour empêcher les enfants de jamais venir à bien.

Il n'est que trop commun, dans les grandes sociétés, de voir les couches suivies d'accidens plus ou moins fâcheux par la complication de fièvres putrides, d'inflammation de la matrice, de lait épanché & d'autres affections nerveuses, & ces maux, dans de pareilles circonstances, portent souvent à la santé des coups dont elle ne peut point se remettre.

C'est à la ville qu'on entend parler des ravages causés par le lait, maux livrés autrefois qu'ils sont à peine indiqués par les anciens médecins, & dont on n'est pas encore parvenu à expliquer les causes maternelles d'une manière bien satisfaisante. Tous jours est-il vrai que les femmes qui nourrissent leurs enfants qu'au lieu ordinairement exemptes. Elles n'ont point à craindre que le lait restant dans la masse des humeurs, cause une fièvre lente qui, détruisant toutes les fonctions, ne manque pas de conduire au trépas ; on que n'ayant pu être évacué par les selles, les urines ou la peau, il donne naissance à des dépôts plus ou moins dangereux, selon l'importance des parties où il se fixe. Si les femmes savaient ce qu'il doit leur en coûter de douleurs pour s'être opposées au vu le plus formel de la nature, il n'en est presque pas même des plus

déliées, qui ne s'efforcent à remplir un devoir aussi impérieux.

Les pertes blanches sont une autre maladie bien désagréable, qui, presque inconnue à la campagne, est indigemment commune dans les grandes villes. Il en résulte une foiblesse presque continuelle, du dégoût, de la pâleur, de la maigreur, de la tristesse, on sentimens fréquents d'aiguille au creux de l'estomac, qui, si l'on n'y ramédie pas de bonne heure, amènent des maux de nerfs & ruinent la santé. Elles sont constamment l'effet du genre de vie passif & irritant tout à la fois, dont nous avons fait sentir plus d'une fois les dangers.

C'est point assez de connaître les maux dont la santé des gens du monde est affaiblie, aussi que les causes qui les ont fait naître, il faut encore chercher les moyens de les soulager, ou au moins d'en diminuer l'intensité.

Une santé foible & douloureuse qui abîme les jours ; rend malheureux tout ce qui entoure, & infecte les enfans d'un germe de langueur & de maux, est un objet bien digne de toute notre attention ; mais toute seule elle serait insuffisante, si le malade n'y rencontrait de toutes les facilités. Il faut que le sentiment de son mal lui donne une volonté fixe d'y guérir ; il faut enfin qu'il se détermine à chasser les causes de la maladie, en changeant absolument son genre de vie.

L'homme du monde cherche à effrayer sa santé, quand il aura bien calculé qu'on aura bien avoir de l'esprit, des talens, des vertus, des grâces, des richesses, tout cela ne peut être avantageusement employé que quand le physique jouit de tous ses avantages. Voltaire a dit :

Il a tout : il a l'art de plaire ;
Mais il n'a rien s'il ne digère.

Quand l'homme souffre, à quoi lui servent ses talens & ses lumières ?

Et dans un corps mal-sain qu'importe la raison ?
C'est un éucher silencieux, sans sur le timon,
D'un char tout fracassé sans soupçons & sans roue,
C'est un phare égaré sur un vaisseau sans proue.
Dans un corps tout souffrant, l'esprit n'a point d'effort.
Le mal, le mal l'enchaîne & c.

Extrait de Mouton.

Ce rayon lumineux de l'essence spirituelle,
Unit avec nos sens, croît, s'affaiblit comme eux.

C'est donc un point essentiel de commencer par se soulager à toutes les causes qui mènent à la douleur au trépas, surtout quand le bonheur qu'elles offrent est purement imaginaire ; car il faut bien distinguer le plaisir de ce qui en est l'abus, quand il s'agit de conserver ou de rappeler la santé. Lorsque le sang froid prendra la place de l'effervescence & de l'exaltation, on verra que les jouissances véritables portent l'empreinte de la

nature, & qu'elles sont complètement ennemies de l'insivité & de l'insolence, &c. &c.

Pour ne pas effrayer l'homme du monde, qui vit dans la luxure & l'opulence, par un changement total de régime qui lui paraîtrait insupportable, nous ne lui ordonnerons pas de quitter subitement ses habitudes, mais d'arriver à ce point par des gradations insensibles qui puissent mitiger les privations.

S'il se perdus de bien-être, sans l'exercice & l'air pur, il ruinera sa santé, il ne balancera pas à quitter la ville pendant le beau temps, pour jouir modérément de l'un & de l'autre. Il ne faut pas perdre de vue que les petites impressions aient bien plus une santé délicate que les grandes n'incommodent une santé vigoureuse, & que plus on veut se soustraire à l'action des agents qui nous ennuient, pour l'avantage de notre conservation, plus on en est incommodé. On fait que les Sybarites pharaoniques les coqs de leur ville pour n'en pas être réveillés, & que le pli d'une feuille de rose les empêchant de dormir. Celui qui craint de sortir de son appartement & de s'exposer en plein air, quand le vent du nord souffle, s'expose à en être incommodé, même lorsqu'il ne sort pas de son lit.

Sans se coucher avec le soleil, on peut bien ne pas faire du jour la nuit & de la nuit le jour; comme si le riche ne pouvait avoir de plaisir que quand le reste de la nature dort de telles habitudes privent de la jouissance de l'air pur & procurent une sorte d'éloignement.

On ne réduira pas le citadin oisif à vivre de pain bis, de laitues, de lard, de pois & de choux, qui conviennent aux organes vigoureux des cultivateurs. Quand le genre de vie est si différent, la nourriture ne peut être la même. Il y a un milieu compatible avec la santé, qui peut réunir la légèreté, la délicatesse & l'agrément du goût. Ce n'est qu'une juste simplicité qu'on peut trouver un plaisir constant. Tout ce qui irrite les organes, émeut le sentiment & nécessite des succédanés encore plus piquants. Le buveur d'eau la trouve toujours mauvaise; il est l'abri du dégoût qui accompagne des jouissances plus délicates.

À l'égard des passions, nous avons déjà touché cet article. Nous convenons qu'il est difficile d'en corriger les fâcheux effets, tant que les causes existent; car on ne fixe point un vaisseau sur une mer agitée par la tempête. Mais les affections sont bien moins actives sur les constitutions fermes & robustes, dont les humeurs sont douces & homogènes, que sur celles qui sont foibles, délicates & nerveuses.

Malheur aux personnes qui sont parvenues à un degré d'indolence tel, qu'il les porte non-seulement à renoncer à l'exercice, mais même à le craindre! elles se privent du conservateur le plus certain de la force & de la santé; & lorsqu'on peut s'en occuper, il faudroit y employer au moins deux heures par jour, soit à pied, soit à cheval, soit en voiture.

Le dérangement des sécrétions dépendant de toutes les erreurs du régime, elles le seront mieux à mesure que l'on commettra moins de ces erreurs. Bon air, bons aliments, de l'exercice, du sommeil, moins de passions, l'ordre se maintiendra & se réparera.

Quant aux moyens qui n'ont pour but que de réparer des fantes absolument défectueuses des gens du monde, il faut avoir recours à chacun des articles de ce Dictionnaire, qui traitent des maux dont ils sont atteints. (Macquart.)

MONDÉ, adj., **MONDER**, employé en pharmacie & en chirurgie pour signifier, dans son acception la plus étendue, l'action de nettoyer, de purifier, en séparant d'une chose quelque chose qui lui est étranger. C'est dans ce sens que l'on dit monder, mondifier une plaie, un ulcère, &c. à dire, le nettoyer, le déterger.

L'orge mondé n'est autre chose que l'orge entièrement débarrassé de toute substance hétérogène, en quoi il diffère de l'orge perlé, qui se trouve séparé de son tégument, & qui, par cela même, produit d'autres effets thérapeutiques.

(L. J. M.)

MONDIFICATIF, sub. & adj. Ce qui nettoie, ce qui purifie; adjectif que l'on prend souvent dans la même acception que celle de détersif. Les chirurgiens du dix-septième siècle donnoient cependant une acception plus étendue à ce mot, & regardoient comme mondificatifs tout ce qui étoit les obstacles à la cicatrisation, en attachant cette propriété, d'après des vues hypothétiques ou des observations inexactes, à certains médicaments très-composés & qui de sont plus maintenant en usage.

L'onguent mondificatif d'ache, qui se trouve dans cette catégorie, a pu servir quelquefois dans le traitement des ulcères atoniques. Il n'a pas été repris dans le nouveau Codex.

(L. J. M.)

MONDO. (*Matière médicale*.) Le mondo est un graminé du Japon, dont la racine est bulbeuse & fibreuse. On fait prendre aux malades les petits tubercules qui terminent les plantes, après les avoir fait cuire au sucre. (A. E. Macquart.)

MONTEINS (Eaux minérales de). Montéins est une petite ville entre celles de Pau & de Navarrenx, à deux lieues ouest de la première. La source minérale, qui porte le même nom que la ville, est dans un bois. C'est tout ce que nous en savons. (M.)

MONFIN (Eaux minérales de). C'est un village au bord du Rhône, à quatre lieues d'Avignon & de Nîmes, où se trouve une source minérale froide: elles sont présentées dans une distillation de Gualfidi, 1715, comme contenant un sel pétrifiant & résolutif. (M.)

MONGOL. (*Anthropologie ou Histoire naturelle de l'espèce humaine.*)

MONGOLS, MONGOLIQUES. adj. Blumenbach a désigné sous ce nom l'une des cinq races principales de l'espèce humaine, dont les brachées occupent ou ont occupé le nord de l'Asie, la zone glaciale des deux continents. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*, & dans celui d'*Histoire naturelle*.)

MONNE (Eaux minérales de). Monné est un village qui est à cinq lieues de Perpignan, où des eaux minérales froides se trouvent à un quart de lieue de l'endroit. Il y a plusieurs sources, parmi lesquelles on en distingue deux principales, la Mouffe & la Mène, du nom des lieux où elles sont placées. Carrère, dans ses *Eaux minérales du Roussillon*, 1756, parle des eaux de Monné, qu'il regarde comme passablement chargées de fer. C'est tout ce que nous en savons. (M.)

MONOCLE. sub. & adj. (*Anthropologie, chirurgie*.) On appelle ainsi, en histoire naturelle, certains animaux dont les yeux très-rapprochés paraissent n'en former qu'un seul.

On a désigné également sous ce nom un bandage particulier & propre à maintenir un topique quelconque sur les yeux. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.)

MONOCOTYLÉDONES. f. f. pl. de *monocotylédon*, & de *arabidées*, *cavité*. Nom que les botanistes ont donné aux parties principales de l'embryon ou de la jeune plante, parce qu'elle présente la forme d'une calotte sphérique.

On distingue en conséquence sous le nom de *monocotylédones*, une grande sorte de plantes rapprochées entre elles par cette circonstance, de n'avoir qu'un seul cotylédon ou feuille seminaire : disposition à laquelle se rattachent plusieurs autres traits d'analogie ou de ressemblance. En effet, dit M. DeCandolle, quoique les monocotylédones renferment des familles très-diverses par leurs formes, on peut cependant y reconnaître plusieurs caractères communs dans l'organisation. La chimie observe de même que, dans la plus grande partie des monocotylédones, les racines & les tiges contiennent une quantité de macilage assez considérable ; que ces mêmes organes, & surtout les graines, donnent une grande quantité de siccule ; que leur épiderme & les nœuds qui se trouvent à l'intérieur, sont presque entièrement formés, dans la plupart, par des dépôts de terre siliceuse. A ces caractères chimiques on peut encore ajouter que, selon l'observation de Fourcroy, les fruits d'aucune monocotylédone ne contiennent d'huile fixe ; qu'on ne trouve de suc propre hâteux dans aucune des plantes de cette classe ; que les acides végétaux y sont très-rare ; que le canalicule, le tuber & peut-être

le camphre, le tannin, n'y ont pas été découverts jusqu'à présent. De même si nous tentions de nous former une idée de leurs propriétés générales, nous remarquerions que la plupart des monocotylédones peuvent être employées, soit comme matières nutritives, soit comme substances douces & séfolvantes ; mais il convient, sous ce point de vue, d'observer chaque famille en particulier. (DeCandolle, *Propriétés médicales des plantes*.)

Les quatre premières familles de cette classe, en faisant l'énumération de l'auteur que nous venons de citer, ne présentent aucune propriété mécholes bien connues ; la cinquième, les *Ancrées*, renferme plusieurs plantes qui sont utiles par leurs racines épaisses & charnues, contenant une siccule douce & nourrissante, mêlée à un principe stimulant très-léger & très-diffusible. Le pied-de-veau, *arum maculatum*, appartient à cette famille (voyez ce mot). D'autres aroïdes, les *arum mucronatum*, *esculentum*, *violaceum*, &c., ont été employés comme aliments dans plusieurs provinces.

Les Indiens de Démétrius font usage des feuilles fraîches de *diocotylum partium*, pour produire une vésication légère & universelle dans le traitement de l'anasarque. On pourroit remplir les mêmes indications avec les feuilles récemment cueillies de presque toutes les aroïdes. On a pensé en outre que la décoction de la racine d'*arum triphyllum* dans le lait, formoit une préparation alimentaire légèrement tonique, qui pouvoit convenir dans certaines consomptions ; enfin, les pelotes ou les *égagrophylles marines*, qui se forment avec les poils écaillés d'une autre aroïde, le *zoster marina*, sont employées dans le traitement du goître, à peu près comme le ponce brûlée. (Voyez *ZOSTERA MARINA*.)

La famille suivante, celle des *Oncoïdes*, nous offre le saule & la vanille (voyez ces mots). Un grand nombre de médicaments & d'assaisonnements appartiennent à une autre famille de la même classe, celle des *drymyrhizées*, mot à mot, racines aromatiques ; tels sont le gingembre ; le galanga, le coïssa, le curcuma, la zéaïre, &c.

Le baran-kaba de Herman, dont la racine sent le camphre, appartient à la même famille, & passe, chez les Indiens, pour un médicament efficace dans les maladies les plus graves.

L'arrow-root, dont l'usage, comme aliment très-léger, s'est répandu depuis quelque temps en France & en Angleterre, est aussi une aroïde : la *maranta indica*.

On trouve dans la même classe plusieurs autres familles qui intéressent le médecin, soit sous le rapport de l'hygiène, soit sous le point de vue de la matière médicale, savoir :

1°. Les *iridées* ; 2°. les *amaryllidées* ; 3°. les *smilacées* ; 4°. les *liliacées* ; 5°. les *calchicacées* ; 6°. les *palmyres* ; 7°. les *cyperacées* ; 8°. les *graminées* ; 9°. les *longères*.

Les racines de plusieurs lauriers ont une odeur de violette assez développée. On peut les employer comme de légers stimulans. Les *Des versicolores* & l'*ins verna* sont employés comme un cathartique dans l'Amérique septentrionale.

Les crocus ou safran, qui ont des propriétés particulières, les doi principalement à ses pétales remarquables par un arôme qui leur est propre. (Voyez SAFRAN.)

Les AMARYLLIDÉES ont presque toutes des bulbes qui renferment une petite quantité de sève & un extraitif gomme-résineux très-abondant, analogue à celui que l'on obtient de l'oignon.

Le narcisse poétique, *narcissus poeticus*, qui appartient à cette famille, parait avoir été employé comme émétique par les Anciens. (Voyez ce mot.)

Les SILLACÉES sont connues par leurs propriétés diaphorétiques très-développées dans la liqueur de la salisparille. (Voyez SALISPARILLE, SILLACÉES, SILLAC, SQUIN.)

Les LILIACÉES sont offertes plusieurs groupes que l'on peut considérer comme des familles distinctes.

Le premier groupe qui se présente, les asparagus, a de grands rapports avec le linon la plus connue dans nos climats. Les asparagus servent comme légume apéritif : usage qui parait commun à toutes les plantes de même genre. Le sang-dragon, que l'on rapporte provisoirement au même groupe, a d'autres propriétés (voyez ce mot) ; mais son origine, suivant M. Decandolle, est couverte de trop d'obscurité pour qu'il soit possible de le considérer comme faisant exception aux lois générales de cette famille.

Un autre groupe, celui des trilliacées, est remarquable par les racines, qui sont vigoureusement émétiques. (Voyez ce mot.)

Un troisième, celui des asphodelées, renferme des plantes dont les bulbes contiennent un suc gomme-résineux remarquable par des propriétés stimulantes très-prononcées, surtout dans la scille marine (voyez ce mot), l'aloë & les aulx. Observons, relativement à ces deux dernières, avec M. Decandolle, que si elles font une exception dans les propriétés de la famille, il faut convenir que du moins toutes les espèces de ces deux genres ont des vertus tellement semblables, qu'on les substitue fréquemment l'une à l'autre, & que chacune de ces genres se distingue de tout le reste de la famille par un caractère très-prononcé, tel que l'infertilité immédiate des étamines dans les aloë, & la disposition des fleurs en ombelle dans les aulx. Les propriétés excitantes & l'odeur alliées sont communes à toutes les espèces d'ail sans exception, & la plupart peuvent être substituées les unes aux autres, soit comme condimens, soit comme diurétiques, soit comme aphrodisiaques : leur célébrité est fort ancienne ; car le *myx* d'Homère est bien certainement une espèce de ce genre. (Voyez ce mot.) Serait-il inutile d'ajouter, dit le même

auteur, que quelques-unes des propriétés qui semblent les plus particulières à ces plantes, se retrouvent dans d'autres espèces de la même famille ? Ainsi les habitants des Égyptes emploient comme purgatif le bulbe du *scilla filix hyacinthus* ; ceux des Landes le servent comme purgatif de la racine du *anthemum bicolor*, Delphinacées, qui le rapprochent aussi de l'aloë & de la scille ; ceux du royaume de Valence en Espagne, retirent de l'*agave americana*, un extrait tout-à-fait semblable à celui des véritables aloës.

Deux autres groupes intéressent encore le médecin dans la grande famille des liliacées : celui des broméliées & des tulipacées.

Les broméliées ne renferment que des espèces hétérogènes. Le fruit de Tannassie, carte de toute la famille par son parfum aromatique & son principal ingrédient, & quant aux tulipacées, voyez ce mot dans ce Dictionnaire.

Les Colchicacées se distinguent par leurs propriétés vénéreuses, plus connues dans les racines des colchiques & des vératres, surtout dans les premières, à l'époque du printemps : le principe sacré qu'elles contiennent en abondance, se transforme plus tard en matière à vomir.

Le véritable parait être l'ellébore blanc des Anciens. (Voyez VÉRATRE DU VÉRATRE.) La racine de l'*helioscopus abrotan* est employée comme vermifuge, & on la prépare par infusion aqueuse, & comme tonique amer, lorsqu'on la fait macérer dans l'alcool.

Les feuilles des colobiques & des vératres, moins dangereuses que les racines, ne peuvent pas être impunément mangées par les herbivores, & leurs graines participent à leurs propriétés vénéreuses, quoique l'on puisse les employer à petites doses comme vermicides, propriétés plus connues dans la cécaville.

Le périsperme, dans les plantes de cette famille, présente d'abord une matière lactée plus connue dans la cocoetter, quoiqu'elle se trouve également dans les jeunes graines de plusieurs palmiers, que l'on nomme sagou. (Voyez ce mot & SAGOU.)

On substitue en partie de la plupart des tiges de ces plantes, une liqueur limpide, que l'on peut faire facilement pour en obtenir du vin ou de l'absolu ; leurs semences, connues sous le nom de *choix* ou *palmyres*, sont employées comme alimens dans tous les lieux où croissent les palmiers.

Le palmier verrou, découvert par les indiens, & nommé de Quindiu par M. de Humboldt & Bonpland, fournit de la cire, ainsi que le palmier du Brésil, que les naturels appellent *carnauba*.

(L. J. M.)

MONOCULÉ (Voyez MONOCÉL.)

MONOCÉLÉ, f. f., de *monos*, seul, & de *cera*, matière, habitation. Dénomination sous laquelle

linée a déposé la vingt-neuvième classe de plantes dont les fleurs mâles & femelles sont placées séparément sur le même individu. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

(L. J. M.)

MONOGAMIE, f. f. Section, de la dix-neuvième classe du Linné, dont les plantes ont des étamines réunies par leurs anthères. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

On entend aussi par monogamie, l'état des animaux que leur nature dispose à vivre dans une espèce de mariage, & avec une seule femelle. Buffon s'est attaché à prouver que l'espèce humaine se trouve dans ce cas, & que la bigamie, regardée jadis comme un délit, n'était pas moins contraire aux vues de la nature, qu'aux lois de la société. (L. J. M.)

MONOGASTRIQUES, adj. Animaux qui n'ont qu'un seul estomac, par opposition aux ruminants qui en ont plusieurs. (Voyez ces mots dans les *Dictionnaires d'Histoire naturelle, d'Anatomie & de Physiologie*.) (L. J. M.)

MONOGRAPHIE, f. f. de *mon*, seul, & *graphie*, écrire. Description séparée d'une espèce particulière d'animal ou de plantes. (Voyez ces mots dans les *Dictionnaires d'Histoire naturelle & de Botanique*.)

On désigne sous le même nom, en médecine, l'histoire particulière & complète, ou du moins très-détaillée, d'une espèce ou d'un groupe déterminé de maladies, ou de lésions organiques.

Les meilleures monographies sont celles des maladies publiées par des médecins qui ont eu l'occasion d'observer ces maladies dans tous leurs développemens, & avec une grande variété de symptômes dans une épidémie ou dans toute autre circonstance : telles sont l'*Histoire des fièvres bilieuses de Lausanne*, par Tissot ; les descriptions des mêmes fièvres dans l'épidémie de Teklenbourg, par Fiacq ; celle du la fièvre muqueuse par Wagler, du scorbut par Lind, du typhus par Hildenbrand, & de l'aliénation mentale, par M. Pinel.

On devroit peut-être, & par extension, donner aussi le nom de *monographie* à l'exposition particulière des maladies propres à certaines professions ou à certaines situations de la vie, ou à quelques organes ; tels que les traités sur les maladies des mineurs, des marins, des soldats, de la vicieillesse, des femmes enceintes, des femmes à l'époque de l'âge critique, &c. &c.

On ne paroit avoir commencé à donner quelque attention aux monographies médicales, que depuis Hollmann & depuis les écoles allemandes de Halle, de Gœttingue, dont les dissertations inséguales présentent plusieurs ouvrages de ce genre vraiment classiques. Les recueils

des nouvelles écoles de médecine de France n'ont pas été moins riches sous ce rapport, & plusieurs des dissertations qui roissent leurs recueils sont justement regardées comme d'excellentes monographies.

Nous ne nous arrêtons pas à vouloir prouver l'utilité des monographies, qui en généralement senties en effet, en genre de travail, & les observations particulières, sont regardées aujourd'hui comme les véritables bases de la médecine.

Une monographie suffisamment détaillée doit se composer de trois parties bien distinctes ; savoir : 1°. l'introduction, c'est-à-dire, l'examen du la maladie ou des maladies que l'on se propose de décrire sous un point du vue historique & bibliographique, ce que quelques auteurs allemands ont désigné sous le nom de *partie littéraire* ; 2°. les matériaux ou la série d'un certain nombre de faits particuliers ou d'observations, dont les détails sont ressortir les principaux symptômes de cette maladie ; 3°. le résumé ou le tableau général des symptômes essentiels & constants d'après les faits particuliers, ce qui conduit à une suite du développemens sur le siège, la pronostic de cette maladie, sur ses causes, son traitement. M. Double a placé à la tête de son *Traité du croup*, un discours sur la monographie, qui méritent d'être médités par les praticiens, & que l'on doit regarder comme un excellent article de philosophie médicale. (L. J. M.)

MONOGYNIE, f. f. de *mon*, seul, & de *gyn*, femme ou femelle. Dénomination employée par Linné, pour réunir dans un seul ordre les plantes dont la fleur ne renferme qu'un pistil. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

MONOÏQUES, adj. On désigne sous ce nom, dans le système du Linné, des plantes dont les organes sexuels se trouvent placés séparément sur le même individu. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

MONOMANIE, f. f. de *mon*, seul, & de *man*, délire ou folie. Délire sur un seul objet, ou sur une seule série d'objets.

M. Esquirol a indiqué le premier, sous ce nom, l'état d'aliénation que nous avons désigné sous celui de *délire exaspilé & chronique*, répondant à la mélancolie des auteurs qui, en écrivant sur la médecine mentale, ont donné à ce mot une acception trop étendue & trop éloignée de la signification dans la langue générale ou vulgaire. Toutefois M. Esquirol a peut-être trop restreint l'idée de la monomanie, en voulant n'y rapporter que le délire partiel, qui dépend des passions excitées, expansives, gaies, & qui se trouve ainsi placé entre la manie & la mélancolie. Il nous paroit bien convenable d'accorder à ce même mot toute l'étendue de

son acception étymologique, afin d'y rattacher les différentes espèces de délires exclusifs, savoir : 1^o. le délire des hypochondriaques (1); 2^o. le délire mélancolique (2); 3^o. le délire exclusif indéterminé, ou le monomanie proprement dite.

C'est pour cette dernière seulement que M. Esquirol a voulu employer le mot *monomanie*.

Suivant cet observateur aussi éclairé que laborieux, la monomanie proprement dite s'annonce par des idées exagérées & des passions très-énergiques. Lorsque la maladie se déclare, ceux qui l'éprouvent sont ordinairement dominés par des idées de grandeur, de richesses, de félicité & de puissance imaginaire. Les uns se croient rois, dieux, interprètes ou ministres d'un pouvoir céleste; d'autres ont la ferme conviction de se trouver des savans distingués, de grands poètes, de grands orateurs; ils pensent avoir fait les plus belles découvertes; & en parlent avec autant de chaleur que d'abondance. Certaines hallucinations qui sont le plus souvent l'origine ou la cause de leur délire, subjuguent entièrement ces malades, après avoir été quelquefois modérées ou combattues par un reste de raison. Ces malades paraissent, en général, dans un état d'excitement cérébral très-prononcé; ils ont le visage animé, le poil développé & souvent très-fort, la peau chaude, le sommeil léger & presque toujours interrompu.

Les causes de la monomanie sont toutes celles qui peuvent occasionner les autres espèces d'aliénations; sa marche est rapide, sa terminaison inattendue & sans crises; dans l'état aigu, l'aberration est renfermée dans le sphère du délire exclusif; mais lorsqu'elle se prolonge, elle dégénère en démence, mais après avoir passé par un état intermédiaire, que M. Esquirol croit avoir observé le premier. (L. J. M.)

MONOPAGIE ou MONOPÉGIE, f. f., de *monos*, seul, & de *pagos*, je sers. Valesius de Tarente a employé ce mot comme synonyme d'hémicranie ou de migraine. Il répondroit cependant plutôt à celui de clon hystérique.

MONOPÉTALE. Nom que l'on donne aux fleurs qui n'ont qu'une fleur ou pétale.

MONOPHAGE, adj. Ce mot, qui est très-peu usité, pourroit s'employer pour caractériser les personnes qui, par besoin ou par caprice, ne feroient usage que d'une seule espèce d'alimens; habitude dont il existe quelques exemples dans les Annales de la médecine.

MONOPHTHALME. (Voyez *MONOCLE*.)

MONOPHYLLE, adj. Le calice des fleurs composé d'une seule pièce ou d'une seule tige.

MONOPTÈRE, f. m., de *monos*, seul, & de *pteron*, aile. Les naturalistes donnent ce nom à un genre de poisson dont le caractère est de n'avoir d'autres nageoires que celles de la queue, comme on le voit dans les gades & les scombres.

MONOPYRÈNE. Fruit qui ne renferme qu'un noyau.

MONORCHIDE, adj., de *monos*, seul, & de *orchis*, testicule, & *orchis*, seul. On a désigné sous ce nom certains individus que l'on supposoit n'avoir qu'un testicule, parce que celui qui ne se monroit pas à l'extérieur avoit été arrêté derrière l'anneau ou dans l'anneau lui-même; ce qui paroit avoir eu lieu pour Sylva, suivant le témoignage d'Arien.

On pourroit plus exactement appeler *monorchides*, les personnes qui sont privées d'un testicule par un accident, ou à la suite d'une opération de chirurgie. Ce que quelques voyageurs ont rapporté des Hotentots, qui se privent volontairement de l'un de ces organes, se trouve démenti par Sparmann, dans son *Voyage au Cap de Bonne-Espérance*.

Le traitement des hernies des enfans, d'après le procédé employé par des opérateurs antérieurs, & connu sous le nom d'*opération par le point dur*, faisoit assez souvent rencontrer ailleurs dans les campagnes, lorsqu'il étoit mis en usage, plusieurs individus monorchides.

Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à développer ni à combattre l'opinion des auteurs anciens ou modernes qui ont pensé que les monorchides n'avoient pas dans toute leur plénitude la faculté d'engendrer; que les monorchides du côté gauche, par exemple, ne peuvent avoir que des filles, & les monorchides du côté droit que des garçons, parce que, suivant Ambroise Paré, le testicule de ce côté est plus chaud & plus solide; « partant » plus éloigné d'engendrer mâle. » (Voyez Paré, ses Œuvres, lib. XXIV, chap. 12.) (L. J. M.)

MONOSITIE, f. f. L'usage de ne faire qu'un seul repas, que quelques personnes ont adopté par goût, par habitude ou par nécessité. (M.)

MONOSPERME, de *monos*, seul, & de *sperma*, semence, graine. On appelle ainsi les fruits qui ne renferment qu'une semence. (M.)

MONRO (Alexandre). Cette famille, devenue en hommes célèbres, a fait faire à la science des progrès qui ne seront jamais oubliés.

Monro le père, professeur d'anatomie à Edimbourg, fut membre de la Société royale de cette ville.

(1) Voyez dans ce Dictionnaire notre article *MASTURBATION*, vol. IX, pag. 109.

(2) Voyez *MANIACQUE* & l'article *MÉTÉORE MENTAL*, pag. 109.

ville & de celle de Londres. Demours a publié une traduction de plusieurs Mémoires de cet auteur, contenues dans le Recueil de la Société d'Edimbourg.

Monro a donné un Traité ayant pour titre : *Anatomy of human bones*. Edimb., 1729, 1732, &c. Cet ouvrage, déjà estimé par lui-même, a reçu un nouveau lustre par la belle édition que Sue en a donnée en français, sous le titre de *Traité d'ostéologie*, traduit de Panglais de M. Menro, professeur d'anatomie & de la Société royale d'Edimbourg, auquel l'on a ajouté des planches en taille-douce qui représentent au naturel tous les os de l'adulte & du fœtus, avec leurs explications. Paris, 1739, 2 vol. in-folio.

Tentamina anatomica circa methodum injiciendi. Leidæ, 1741, in-8°.

• Médecine d'armée, ou *Traité des maladies les plus communes parmi les troupes, dans les camps & les garnisons*. Trad. de la Begue de Presse.

An account of the inoculation of small pox in Scotland. Edimb., 1763, in-8°.

Donald Monro, fils d'Alexandre, a publié : *Dissertatio de hydrops*. Edimb., 1735, in-8°, en français. Paris, 1760, in-8°, par Savari.

• Enfin, Alexandre Monro le fils a donné pour thèse inaugurale : *De testibus & de semine in variis animalibus*. Edimb., 1755, in-8°, avec fig.

Dissertatio de venis lymphaticis valvulosis & de earum imprimis origine. Berolini, 1757, in-8°. Lipsie, 1760, in-8°. Il révoque en doute l'existence des artères lymphatiques, & n'admet que les veines de ce genre, qu'il regarde comme les vrais vaisseaux absorbans qui reportent dans le torrent de la circulation le liquide déposé dans les viscères & les principales cavités du corps. C'est au moyen de ce système qu'il explique les métastases dont il cite plusieurs exemples.

Anatomical and physiological observations, &c. Edimb., 1758, in-8°. (R. GORRAV.)

MONSTREIL (Jean de), de Paris, docteur le 21 novembre 1640, fils & petit-fils de médecins de la Faculté. Il fut attaché de bonne heure à la maison de Condé, fit les études avec distinction, & s'adonna particulièrement à l'anatomie & à la chimie. Il suivit le duc d'Enguien (le Grand Condé) dans ses campagnes, & soigna avec une égale activité & un égal succès la santé des chefs de l'armée & des soldats. Tant de fatigues altérèrent sa santé ; une fièvre violente termina ses jours au mois d'août 1647. Il fut universellement regretté. La Faculté fit prononcer son oraison funèbre par Charles Lebreton, qui lui succéda dans la chaire des écoles.

Monstreil, quoique très-occupé, composa deux ouvrages, l'un de *l'Art de la dialectique*, qui a été imprimé en français, selon Charles Lebreton ; l'autre, qu'il avoit intitulé *Euchides medicus*, & qui, à ce qu'on croit, est demeuré manuscrit.

(ANDRY.)

MÉDECINE. Tome X.

MONSTRES, f. m., de *monstrum*, *monstrando*, suivant l'acception vulgaire, qui se montre, se fait voir, soit spectacle, par des dispositions qui s'écartent des lois générales de la nature, & qui excitent, par cela même, la curiosité & l'attention.

Horrendum & distu video, mirabile monstrum.

Encl.

L'onde s'approche, se brise & vient à nos yeux,
Parmi des flots d'écume, un monstre furieux.

RACINE.

Dans l'acception scientifique, le mot *monstres* a plus d'étendue, & s'applique à tous les êtres qui présentent des monstruosités, c'est-à-dire, des anomalies, des dérangemens de conformation organique, plus ou moins contraires à un exercice de la vie, mais antérieurs à la naissance, & ne réunissant pas toujours, dans leurs apparences, la singularité ou l'horreur du spectacle, qui semble inhérent à l'idée des monstres ou des monstruosités, suivant l'acception vulgaire. (Voyez MONSTROSITÉ, ORGANISATION VICIEUSE ou DÉRÉGULÉE, VICE DE CONFORMATION.)

Une conformation bizarre dans quelques dispositions d'organes peu importants, qui ne pourroit oppoler aucun obstacle à la vie individuelle & à la faculté reproductive, ne devroit pas être regardée comme un monstre, lors même que ce qu'elle a d'étrange ou d'extraordinaire exciteroit un certain degré de surprise : telles sont, par exemple, les divisions ou les réunions insolites de quelques parties, leur défaut ou leur augmentation, leur déplacement.

La transposition des viscères de la poitrine & du bas-ventre, d'ailleurs bien conformés & propres à la longévité, ne devroit pas être considérée comme une monstruosité. Le sujet qui donna pour la première fois l'occasion de faire cette remarque, étoit un invalide qui vécut jusqu'à l'âge de soixante-douze ans, & chez lequel on trouva, après sa mort, le cœur à droite, le foie à gauche, & en général, tous les viscères de la poitrine & de l'abdomen transposés, mais sans aucune altération de forme ou de structure, capables de nuire à leurs fonctions. Lemery, qui donna toute son attention à cette singularité de structure, refusa de la comprendre dans la catégorie des monstres, & distinguoit avec raison les simples variétés de formes extérieures chez des animaux, des lésions & des altérations du fœtus, intérieures, profondes & formées dans le premier temps de son développement ; de telle sorte que les fœtus se présentent au moment de leur naissance, avec des figures bizarres, & tout-à-fait éloignées du type propre à leur espèce. C'est là, dit l'auteur, ce que l'on appelle vulgairement *monstres* ; c'est-à-dire des productions dans lesquelles la structure naturelle des parties se trouve toujours plus ou moins altérée, & dont le caractère

Bb

consiste toujours dans un vice de confection d'une ou de plusieurs parties. Il y a tel de ces vices, dont les suites ne tardent guère à être très-funestes pour le malheureux fœtus dans lequel ils se rencontrent; d'autres sont moins fâcheux, mais il n'y en a aucun qui ne produise un dérangement plus ou moins grand dans les fonctions; de manière qu'à proprement parler, les monstres présentent tous l'exemple des différentes maladies organiques qui peuvent survenir à un fœtus qui ne fait que de naître, & qui n'a point encore vu le jour. (*Mémoires de l'Académie des sciences*, t. 38, pag. 305.)

En effet, suivant la remarque de Lemery, il suffit de parcourir rapidement une certaine suite d'observations sur les monstres, pour se convaincre que tous ne sont tels, que par des lésions organiques, & qu'il faut les regarder comme de grands malades, comparables, sous tous les rapports, à ceux qui le deviennent dans le cours de la vie, en présentant des singularités & des altérations de structure plus ou moins remarquables. Certaines difformités de structure ne peuvent à la vérité se développer avant la naissance, que par des accidens de la gestation ou de l'incubation, ce qui ne peut empêcher de les regarder comme des lésions & des maladies organiques: disons même avec le savant académicien dont nous rappellerons ici la saine doctrine, que les monstres proprement dits, sont au contraire tout au moins aussi malades que les malades que nous leur comparons, & que si l'on considère exactement la chose, ils le sont ordinairement davantage; ce qui en fait des malades à part, vient de leur situation particulière, & deux germes, par exemple, pressés l'un contre l'autre, par les parois de la matrice, qui est leur habitation, pouront par un effet de la mollesse, & de la flexibilité & le peu de résistance de leurs parties, s'unir en différents sens, & produire des composés monstrueux, que des corps organisés & plus solides, pressés de la même manière les uns contre les autres, ne seroient jamais capables de produire. (*Voyez MONSTROSITÉ.*)

MONSTREUX. Dénomination, qualification qui indique, dans les individus auxquels on l'applique, le plus grand développement possible de monstruosité. Dans l'espèce humaine, les sujets monstrueux sont non-seulement des individus nés malades, mais bien des individus très-malades. Leur existence ne va guère au-delà de leur vie extra-utérine. Le plus grand nombre du moins meurt en naissant, ou quelque temps après la naissance, & présente dans l'imperfection ou les défectuosités de son organisme, des obstacles invincibles à une longévité plus étendue & à la faculté de se reproduire. (*Voyez MONSTREUX.*)

MONSTROSITÉS. (*Considérations gé-*

rales.) Ce qui constitue les corps monstrueux, les monstres, les dispositions irrégulières & insolites des parties, les maladies, les lésions organiques, qui se manifestent au moment de la naissance. Les monstruosité sont plus ou moins incompatibles avec la vie extra-utérine, & toujours contraires à son exercice, à la longévité.

Les monstruosité, que l'on n'a pas observées peut-être avec autant de soin que les lésions organiques qui se développent plus tard, & dans le cours de la vie extra-utérine, ne sont pas moins variées, & présentent en effet certaines altérations de formes, de structure, qui ne pourroient se développer avant la naissance, & qui résultent de certains dérangemens dans la gestation ou l'incubation; tout ce qui est possible, & même des combinaisons que l'esprit le plus pénétrant n'auroit pu prévoir, s'est réalisé dans ces combinaisons. Il sera facile de se convaincre de cette vérité en parcourant la collection des *Mémoires de l'Académie des sciences*, depuis la fin du dix-septième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième, ou en jetant un coup d'œil sur différentes parties de la riche collection anatomique du Muséum de la Faculté de médecine de Paris.

L'exposition de ce qui concerne les monstres, considérée dans toute son étendue, présente un grand intérêt, soit qu'on l'envisage dans ses rapports avec les sciences naturelles, soit qu'on la suive dans ses détails & dans ses relations particulières avec la médecine légale, la pathologie, l'anatomie & la physiologie: connaissances dont plusieurs points très-obscurs & plusieurs questions très-difficiles & très-controversées se sont trouvées éclaircies par ce genre d'observations.

A une époque où une application aussi philosophique de l'étude des monstres n'avoit pas encore été essayée, Bacon paroit en avoir senti l'importance & les avantages. Dans ses rapides énumérations des connaissances acquises & à acquérir, il n'oublie pas l'histoire de ce qu'on appelloit alors les *écarts & les accidens de la nature*; il eût même que ce genre de faits, présenté comme l'objet d'une science régulière, serviroit beaucoup à la philosophie, en nous apprenant à généraliser nos observations avec une lage lenteur.

Ajoutons à cette remarque, qu'en faisant entrer dans l'histoire naturelle les êtres extraordinaires & monstrueux, on suivroit dans un horizon moins restreint, les opérations variées, les mouvements faciles & libres de la nature, qui réalisent tous les possibles, & sortant de l'espace étroit où notre savoir incomplet & nos petites méthodes prétendent la renfermer, se plaît à varier ses productions, & à réaliser souvent des combinaisons de formes, dont l'imagination la plus hardie n'auroit pu soupçonner l'existence.

Les autres productions, les autres phénomènes, sont les faits communs & habituels de la nature,

qui n'intéressent que les hommes instruits. Les monstres, les monstruosités en sont les accidents, dont la singularité toujours ou presque toujours surprenante, excite la curiosité & l'attention du vulgaire.

Il ne faut donc pas s'étonner, si les observateurs de tous les temps & de tous les pays, ont recueilli avec tant d'empressement un si grand nombre d'exemples de monstruosités, non-seulement dans les formes de l'homme, mais dans les formes & la constitution des animaux & des plantes. On a publié des faits de ce genre, dans des Traités particuliers (1), ou dans des Traités généraux d'histoire naturelle (2); ou les a consignés dans des recueils d'observations ou dans plusieurs journaux de science (3). Tous ces ouvrages présentent, à différents intervalles, des descriptions très-détaillées, & si variées, si nombreuses de monstruosités de tout genre, que lorsqu'on les a parcourus, on est presque tenté de croire que même dans ses jeux & dans ses écarts, la nature a épuisé toutes les combinaisons, qu'elle a fait & exécuté tout ce qui pouvoit être produit & réalisé; qu'elle ne peut plus que s'imiter, se répéter, se reproduire.

Nous avons fait cette remarque en nous occupant, il y a quelques années, de recherches relatives au genre de monstruosités que présente alors un jeune homme, dans le corps duquel on trouva un fœtus extraordinaire attaché à ses entrailles, & paroissant avoir contribué à sa mort prématurée. Lorsque l'on publia ce fait, le premier sentiment fut celui du doute, le premier cri celui de l'incrédulité. C'étoit bien évidemment l'un des exemples les plus extraordinaires de monstruosités; mais lorsqu'un examen attentif eut succédé à la première surprise, non-seulement on fut obligé de croire à la réalité de toutes les circonstances les plus singulières de ce cas de gestation secondaire & prolongée chez un jeune homme, mais on apprit bientôt, par différentes recherches, que cette

espèce de prodige du dix-neuvième siècle, pouvoit être classé dans un tableau, au milieu duquel il paroîtoit d'abord isolé & séparé de tous les faits déjà connus & recueillis. Les collections académiques générales ou particulières sont d'ailleurs les ouvrages où l'on a rassemblé le plus grand nombre de faits relatifs à l'histoire des monstres. Nous citerons seulement les *Actes des curieux de la nature*, les *Mémoires de l'Académie des sciences*, les *Commentaires de Saint-Petersbourg*, les *Transactions philosophiques*, les *Medical facts and observations*, les *Commentaires d'Edimbourg*, les *Actes de la Société de Manchester*, l'*Histoire de la Société royale de médecine*, les *Recueils académiques de la Société de Copenhague* (Soc. méd. Hafl.), &c. &c. En parcourant ces riches collections de faits curieux & de travaux importants, on est comme accablé par les récits multipliés des merveilles & des prodiges qui s'y trouvent consignés par les observateurs de temps & de pays différents. Mais en considérant ensuite tous ces phénomènes sous un point de vue philosophique, on ne tarde pas à voir qu'ils peuvent rentrer dans un petit nombre de divisions elles-mêmes.

Arrêtons-nous un instant à ce catalogue méthodique des jeux & des aberrations les plus remarquables de la nature. Nous essayerons ensuite de reconnaître les causes de ce genre de phénomènes, au moins dans quelques-unes de leurs circonstances, & autant qu'il est permis à la science de le faire, en soulevant le voile dont la nature s'enveloppe souvent, & d'une manière d'autant plus impénétrable, qu'elle semble déroger à ses règles habituelles & changer l'esprit de ses lois.

Buffon avoit cru pouvoir faire entrer dans trois classes tous les exemples de monstruosités, savoir: 1°. les monstres par excès; 2°. les monstres par défaut; 3°. les monstres par renversement.

Cette division nous paroissant insuffisante, nous lui préférons celle que M. le professeur Chaullier a exposée dans ses cours d'anatomie & de physiologie, à laquelle nous nous sommes permis toutefois de faire quelques modifications.

Suivant M. Chaullier, les monstruosités sont des organisations vicieuses ou accidentelles, ou de naissance, dans une ou dans plusieurs parties du corps; elles peuvent se ranger sous sept titres, savoir:

I. Les monstruosités relatives à la grandeur; d'où les nains, les géants.

II. Les monstruosités par augmentation de parties; d'où les corps doubles ou à deux têtes seulement, ou les corps à quatre bras, à quatre ou à trois jambes, à six doigts, à parties génitales doubles, &c.

III. Monstruosités par défaut; d'où les enfants sans tête ou les acéphales, les manchots, les cyclopes, &c.

IV. Les monstruosités relatives à la position, Bb 2

(1) Evonymos, de *Naturæ & Monstris*. Vitæ. 1595.

Ulisse Aldrovande, *monstrorum Historia cum plurali po-*
mois.

Licetus, de *Monstris, causis, naturæ & differentiis*.
Amsterdam, 1661, in-4°.

Bastholius, de *Monstris in naturæ & arte*. Bst. 1645,
in-4°.

Huber, *Observationes & cognita novella de monstris*.
Niedstadt. Dissertatio de generatione imperfectæ & monstris,
1558, in-4°.

Jacobi, de *Monstris quoad medicamentum forentem*. Hal. 1779.

(2) Aristotle, *Plin.* Buffon, *Ambrôise Paré*, Kerckwin-
gias, *Hieremberg*, *Palfy*, *Primrose*, *Pischaka*, &c.

(3) *Bastholius. Anat. hist.*

Boehmer, *Obs. anat. rar. fest.* vol. 2, pag. 45.

Borelli, *Cent. salerni, Obs. commerciarum*.

Van Doeveren, *Specimen. Obs. acad. gentleman's ma-*
gazin.

Haller, *Opera minora*.
Les journaux de médecine & de physique.

d'où les pieds-bots, les transpositions d'un grand nombre de parties, les changements dans la situation naturelle de différentes parties, principalement de l'appareil des organes générateurs, dans les deux sexes, &c.

V. Les monstruosités par la réunion contre nature de plusieurs parties; d'où une seule d'agglutinations ou d'imperfactions qui sont plus ou moins nuisibles, selon le lieu de l'organisation où elles se trouvent.

VI. Les monstruosités superficielles & relatives à la couleur; d'où les envies, les signes, &c.

VII. Les monstruosités dans la texture & la consistance des parties.

Les différentes altérations de formes & de structure, qui constituent les monstres, & qui peuvent être rapportées aux titres que nous venons d'énoncer, doivent être considérées successivement sous un point de vue purement historique & sous un point de vue théorique; qui rentre nécessairement dans la physiologie, dont il n'est qu'un très-grand & très-important chapitre.

Un grand nombre d'ouvrages, mais surtout les Collections académiques & les Recueils d'observations médicales, renferment, ainsi que nous l'avons déjà énoncé, des exemples de monstruosités très-variées: choisissons dans cette foule de faits, & pour les rapporter successivement à chacune de nos catégories, les phénomènes les plus brillans & les plus remarquables.

Exposition historique & classification des monstruosités relatives à la grandeur.

Les monstres de cette classe sont les géans, & les nains; on pourroit aussi y rapporter les individus que leur développement & leur volume excessifs rendent extraordinaires, & dont Buffon a cité plusieurs exemples dans ses suppléments, si, pour ne pas donner une extension illimitée à la question déjà si étendue des monstres, on n'étoit pas forcé de la borner aux conformations bizarres & défectueuses qui se sont formées ou développées avant la naissance.

Il seroit plus convenable d'ailleurs de rapporter aux monstruosités relatives à la grandeur, le développement excessif, le volume ou la longueur extraordinaire de certaines parties. Haller, en particulier, a cité pour la tête des exemples de ces monstruosités, qui ne peuvent être attribuées qu'à l'Hydrocéphale.

M. Chaussier, dans son immense pratique à l'hôpital de la Maternité, a eu l'occasion d'observer un côté de la tête beaucoup plus développé que l'autre. D'autres ont vu des bras, le pied, la main ou seulement les doigts, le coccyx, l'ensemble ou plusieurs parties de la génération, avoir un volume assez considérable pour devoir être regardés comme une monstruosité. Ce seroit peut-être ici

l'occasion de parler, en suivant les monstruosités jusque sur les limites des variétés de l'espèce humaine, de la *Fénus hottentote* qui en vient mourir à Paris.

Parmi les géans les plus extraordinaires dont le souvenir est parvenu jusqu'à nous, sont principalement Gilly, de Tréte, de la taille de huit pieds deux pouces huit lignes.

Un garde prussien ayant huit pieds huit lignes. Margraib, montré à Londres.

Un nain que quelques circonstances particulières ont rendu plus fameux que ses géans, c'est Bébé, connu sous le nom de *nain du roi de Pologne*. A l'époque de sa naissance, il pesoit deux onces; il fut allaité par une chèvre, & eut un sabot rembourré pour berceau; il ne marcha qu'à deux ans; ses premiers foulons n'avoient pas dix-huit lignes de long; de deux à six ans, il eut plusieurs maladies graves; à cinq ans il avoit vingt-deux pouces, & paroisoit entièrement formé. Cet être extraordinaire par toutes ces circonstances, ne put jamais s'élever au-delà de l'intelligence d'un chien assez passablement dressé.

Un autre nain dont on a conservé l'histoire, & qui s'appeloit *Borwilaski*, jouissoit de toutes les facultés accordées aux hommes d'une taille ordinaire & bien conformés.

Le nain d'Auguste, dont la statue a été conservée, n'avoit que deux pieds.

Sous Domitian on vit des nains gladiateurs.

On a cité un grand nombre d'exemples de monstruosités par excès de volume du corps ou par le développement prématuré des forces physiques. Un des plus singuliers, que j'ai décrit dans le *Journal de Médecine* de MM. Leroux, Corvisart & Boyer, est celui d'un jeune homme âgé de douze ans, remarquable par le volume de sa tête, la grosseur & la force de ses membres. On n'observa rien de remarquable pendant les deux premières années de la vie de ce jeune homme. A l'âge de trois ans on crut s'apercevoir que les testicules étoient beaucoup plus gros qu'ils ne le sont ordinairement à cet âge. A six ans, ce volume avoit quelque chose de monstrueux, & alors cette circonstance étoit accompagnée d'une force physique extraordinaire. La voix étoit grave, & plusieurs régions du corps étoient couvertes de poils aussi épais & aussi forts que chez l'adulte le plus vigoureux. A sept ans, ce petit homme fut obligé de faire sa barbe. Il étoit presque aussi grand, aussi fort qu'il est aujourd'hui, & pouvoit conduire une charrue & se livrer à des exercices très-pénibles. La dégénérescence & le volume des testicules font d'ailleurs ce qu'il y a de plus remarquable chez ce jeune homme. Ces parties ont pris plus tard un accroissement qui a conduit à une dégénérescence morbide, dont les suites ont exigé l'opération de la castration.

Monstrosités par augmentation de parties.

Les monstres par addition & augmentation de parties, appartiennent à une classe dans laquelle on trouve les exemples les plus extraordinaires de cette grande liberté, avec laquelle nous avons dit que la nature résout les possibles que l'imagination la plus active & la plus bizarre auroit pu à peine concevoir. Les monstres à deux têtes, à trois jambes ou à trois bras, appartiennent à cette division, ainsi que les corps doubles.

Parmi ces derniers, on en cite un, dont Buffon a donné l'histoire, & qui a vécu vingt-un ans. Il étoit né à Tron en Hongrie : c'étoit une réunion de deux filles, d'ailleurs bien conformées & se trouvant jointes par la région des reins, de manière à ne pouvoir se voir qu'en tournant la tête. On les vendit à nous aus pour être offertes à la curiosité publique. L'une s'appeloit *Judith*, c'étoit la plus faible; l'autre *Hélène*, beaucoup plus forte, & mieux constituée. A voir chacune par-devant, lorsqu'elles étoient arrêtées, on ne voyoit rien de différent des autres femmes. Il n'y avoit qu'un seul aus pour ces deux êtres ainsi accolés & réunis dans la fonction relative à cet organe, mais pour l'émission des urines il en étoit tout autrement. Chacune avoit ses besoins, ce qui occasionnoit de fréquentes querelles, parce que quand le besoin prenoit à la plus faible & que l'autre ne vouloit pas s'arrêter, celle-ci l'emportoit malgré elle; pour tout le reste elles s'accordoient, car elles paroissent s'aimer tendrement. Judith devint infirme à six ans, Hélène étoit belle, gaie, avoit de l'intelligence & même de l'esprit. Elles ont au en même temps la petite vérole & la rougeole; mais toutes les autres maladies ou indispositions leur arrivoient séparément. A seize ans leurs règles parurent presque au même temps, & ont toujours continué de paroître séparément à chacune. Vers l'âge de vingt-deux ans, Judith eut la fièvre, tomba dans une espèce de léthargie & mourut. Hélène fut obligée de suivre son sort. Trois minutes avant la mort de Judith, elle se trouva mal & mourut presque en même temps (1).

On trouve dans les auteurs un assez grand nombre de faits analogues à celui que nous venons de rapporter. Un monstre de la même catégorie, cité par Haller, étoit double dans presque toutes ses parties; cependant il n'avoit qu'un seul cœur au milieu du thorax, avec deux ventricles correspondant à chacun des deux jumeaux, & une seule oreille, qui recevoit les veines caves & pulmonaires des deux fœtus. Arrangement singulier, d'où il seroit résulté que si ces jumeaux avoient vécu, il eût fallu que l'un des deux eût mangé, pour servir à la nourriture de tous les

deux, si toutefois la vie avoit pu se prolonger pendant quelque temps, avec un mélange aussi complet du sang des veines & du sang des artères, dans un même réservoir.

Le même auteur a cité plus de trente exemples de monstres à corps doubles, dans son excellente *Dissertation sur les monstres*. On trouve également la description de quelques faits analogues, & non moins singuliers, dans plusieurs ouvrages qui ont paru depuis Haller, mais principalement dans une dissertation de Meckel (2), & dans les *Bulletins de la Faculté de médecine de Paris*.

Un corps double encore plus extraordinaire, est celui qui a été annoncé, il y a deux ans, avec tant de bruit & d'éclat, à la curiosité publique, sous le titre d'un fœtus monstrueux trouvé dans le corps d'un jeune homme de Verneuil, âgé de quatorze ans.

Ce jeune homme, auquel la bizarrerie de son malheur & de sa mort a donné une sorte de célébrité, se nommoit *Riffes*. Son enfance fut pénible, & dès qu'il balbutia, il se plaignit de douleurs au côté. Il avoit le ventre très-gros, mais variable dans son volume. Son corps, par la suite, resta grêle; sa figure étoit maigre & pâle. A douze ans, la santé parut devenir un peu meilleure, mais bientôt il ressentit au côté des douleurs vives avec fièvre. Une tumeur large & saillante se manifesta à l'hypochondre gauche, & le malade mourut avec toutes les apparences d'une phthisie, le 23 prairial an XII.

Des recherches exactes sur son cadavre y ont fait découvrir un fœtus monstrueux, ou plutôt un corps organisé, du même âge que celui aux entrailles duquel il étoit attaché. Lorsque la nouvelle d'un phénomène aussi nouveau fut annoncée, on fut d'abord tenté de la révoquer en doute.

Un examen attentif & les recherches les plus exactes n'ont plus laissé aucune incertitude par la suite. Le fœtus de Riffes étoit son frère, comme Hélène étoit la sœur de Judith. Par un défaut d'espace suffisant, le germe de ce fœtus, plus faible d'ailleurs, plus lent dans son développement que le fœtus son frère, ou même peut-être fécondé plus tard & produit par une superfétation, a dû être développé à la surface des entrailles de l'individu plus fort, & d'ant, à cette époque de réunion, les tégumens de l'abdomen n'étoient pas encore formés. On l'a trouvé renfermé dans une poche membraneuse qui a fait fonction de matrice, & qui s'étoit formée dans l'épaisseur du méso-colon transverse, auquel adhéroit un cordon ombilical fort court. Cet être monstrueux, qui s'étoit développé dans le sein de son frère, étoit d'ailleurs doué d'un organisme dont il étoit impossible de douter. La dissection y fit découvrir quelques traces d'organes des sens, un cerveau, une

(1) Voyez Buffon.

(2) De duplicata monstri, Commentarius, 1815.

moelle épinière, des nerfs très-volumineux, des muscles transformés en une matière fibreuse, un squelette présentant une colonne vertébrale & une partie supérieure que l'on pouvoit regarder comme une tête déformée; enfin, une ébauche assez imparfaite des membres; ensemble de dispositions bien suffisant pour établir l'individualité de cette masse organisée.

La peau qui reconvroit ce corps étoit épaisse & ridée, parsemée de plusieurs prolongemens qui avançaient, ainsi que le développement de plusieurs dents & la pousse d'une grande quantité de cheveux (1), que la vie ressource dans un espace trop étroit étoit exercée à la surface, dans l'altération & même dans la transformation d'une partie, qu'elle n'avoit pu développer ni étendre.

Tel est, sur un phénomène que l'on pourroit appeler la merveille du dix-neuvième siècle, le résultat de nos propres observations & d'un excellent Mémoire de M. Dupuytren, inséré par extrait dans le premier volume des *Bulletins de la Faculté de Paris*.

On voit aisément qu'une partie du merveilleux qui environne ce fait, à l'époque où il fut rendu public, & devint l'objet général de la curiosité & des conjectures, auroit disparu si, au lieu de le donner sous le titre de fœtus trouvé dans le corps d'un jeune homme de quatorze ans, on l'eût aussitôt classé dans la division des monstruosités auxquelles il appartient; ce genre de phénomène doit être désigné sous le nom de *monstre à deux corps*, dont l'un-intérieur plus foible, s'est développé au dedans du second, sous la forme d'une masse complètement organisée; cette monstruosité ainsi énoncée auroit paru moins extraordinaire, moins isolée, dans l'histoire des faits déjà connus, & se seroit rattachée d'une part aux monstres à corps double, comme celui dont nous avons donné l'histoire d'après Buffon, & d'une autre part aux exemples de grossesse extra-utérine.

Les monstres par augmentation de parties, dont nous venons de citer les exemples les plus remarquables & les plus extraordinaires, ont nécessairement pour origine la réunion plus ou moins complète de deux jumeaux; & cette réunion s'opère suivant des combinaisons différentes, depuis la jonction par quelques points de deux jumeaux entiers, ayant leur moi, leur existence distincte, jusqu'à une pénétration si complète que cette double existence ne soit plus rappelée que par quelques débris, quelques parties isolées, & comme greffées sur différents points de l'individu plus fort, qui

s'est développé dans ce concours de circonstances.

Les variétés placées entre ces deux termes sont nombreuses & comme innombrables; on peut cependant les rapporter à trois combinaisons principales:

1°. La simple juxtaposition ou jonction de deux ovules, qui se font développés séparément dans l'ensemble de leurs parties.

2°. La jonction de deux ovules ou de deux embryons, avec fusion ou pénétration de plusieurs parties; ce qui produit les monstres à corps double, *acéphales* ou *anencéphales*, mutilés, dépourvus de différentes portions de membres.

3°. La réunion des ovules & des embryons contemporains ou d'âges différents, ou dont l'un plus foible, plus jeune ou plus tardivement développé, se trouve renfermé dans l'embryon du fœtus plus avancé, & attaché à ses entrailles avant ou après la formation de l'écume abdominale.

Le cas de Biffen, dont nous avons parlé avec quelques détails, se rapporte à cette dernière combinaison; quoique très-rare & très-extraordinaire, il n'est point isolé dans le tableau des monstres. Plusieurs faits analogues ou semblables se sont présentés à différents observateurs, & viennent naturellement se ranger dans la même catégorie. Ainsi, on trouve dans le *Journal de Verdun*, année 1711, un fait entièrement analogue à celui de Biffen; l'exemple d'une petite chienne de deux mois, de l'intérieur de laquelle on retira un petit chien. Un autre exemple, qui s'en rapproche encore davantage, a été décrit dans les *Transactions médicales de Londres*, par M. Young, pour 1800. L'individu qui le présente étoit un enfant mâle d'un dix mois, qui avoit dans son intérieur un autre fœtus, ayant pour matrice un kyste placé dans l'épaisseur du méso-colon transverse; aberration, déviation singulière de la nature, qui ne permettent pas de regarder comme impossible la circonstance dans laquelle une jeune fille offroit tous les signes de la maternité, sans avoir cessé d'être vierge.

En observant ces exemples à une distance plus ou moins éloignée de l'homme, on doit regarder aussi comme analogue aux phénomènes qui nous occupent dans ce moment, les cas de deux jumeaux, non crûs contenant un autre crû dans son intérieur, différents fruits renfermant d'autres fruits, comme on l'a observé plusieurs fois pour des cerises, pour des oranges.

Lorsque les parois de l'abdomen ne sont pas encore entièrement formées, l'embryon qui s'est développé plus tard, & aux dépens & à l'intérieur d'un autre fœtus, montre à l'extérieur, & comme une espèce d'appendice, la portion plus ou moins étendue de son corps, qui a pu le développer; disposition dont nous trouvons plusieurs exemples dans les recueils d'observations médicales & dans les collections académiques.

(1) On avoit trouvé dans les poches faisant fonction de matrice, une quantité assez considérable de cheveux, & l'on remarquoit à la partie supérieure du corps organisé, & dans l'épaisseur d'un rebord couvert d'une membrane lisse, cinq dents implantées dans des alvéoles, & annonçant par leur développement qu'elles appartenaient à un fœtus de plusieurs années.

Les monstres avec augmentation de parties, qui ne présentent pas un corps double, mais seulement une portion de ce corps, ou quelques membres ou quelques parties de membres, rentrent naturellement dans notre seconde catégorie, c'est-à-dire, dans les combinaisons monstrueuses qui se forment lorsque de deux sexes, un seul se développe en totalité.

Parmi les autres monstruosités avec excès ou augmentation de parties, dont les observateurs ont recueilli des exemples, on rencontre toutes les combinaisons possibles de forme & de structure, plus ou moins contraires, soit à l'exercice plein & entier de la vie, soit à la durée naturelle ou à la longévité; ainsi on a vu des monstres à corps double, mais incomplets, n'ayant que trois bras, dont l'un se montrait comme une espèce d'appendice ou de partie surnuméraire, quoiqu'il fût porté par une double omoplate; ce qui annonçoit bien évidemment qu'il étoit le résultat de la fusion ou de la pénétration des deux bras primitifs (1); dans d'autres circonstances on a vu les mêmes corps doubles, ayant d'ailleurs quatre bras, n'avoir cependant que trois ou deux membres inférieurs. On a conçu aussi, dans les recueils d'observations, des exemples de monstres qui, doubles dans la partie supérieure du corps, devenoient simples depuis le bassin; entr'autres l'exemple cité dans le *Journal des sçavans* pour l'année 1665, d'un enfant ayant toute la partie supérieure du corps double, & qui reçut en conséquence un double baptême. L'un des moitiés de ce monstre vraiment singulier fut appelé *Marc* & l'autre *Marce*.

Ambroise Paré a cité deux cas analogues. On multiplieroit inutilement les pages & même les volumes, si l'on vouloit citer & décrire toutes les autres combinaisons qui se rapportent aux monstruosités par excès ou par augmentation de parties, & dont les observateurs ont fait connoître divers exemples.

Il n'existe guère moins de variétés dans les monstres par excès, dont certaines parties se sont trouvées augmentées, sans qu'il fût possible d'apercevoir exactement l'origine de cette augmentation. Ainsi on a cité plusieurs exemples de cet excès pour les os en général, pour les muscles, les différens viscères, & principalement pour les organes de la génération; augmentation d'où est résultée, relativement à ces dernières, ce que l'on a désigné sous le nom d'*hermaphrodite*; lorsque les organes des deux sexes, ou du moins une grande partie de ces organes, se trouvoient réunis dans cette singulière combinaison.

Arrêtons-nous un moment sur ce dernier phénomène, qui si souvent a manqué d'observateurs.

éclairés, & qui si fréquemment a donné lieu à des méprises; à des erreurs, qu'un peu de savoir ou d'attention auroit pu aisément prévenir.

La nature, dont la puissance ne peut être sans doute ni bornée ni calculée, a-t-elle confondu quelquefois les attributs de l'homme & de la femme dans un même individu, & formé un *androgyn* humain, un véritable *hermaphrodite*? Cette question nous paraît mériter toute l'attention des philosophes & des physiologistes. Il seroit sans doute bien facile d'y répondre, si l'on vouloit recevoir sans critique les traditions fabuleuses, ou même les faits rapportés sérieusement par les historiens & les naturalistes. Ainsi Favorin d'Arles, un capitain Phylorète, rhéteur de son métier & contemporain de l'empereur Adrien, réunissoient les attributs des deux sexes. Les sçavans, les anatomistes, ont aussi avancé qu'ils avoient connu des descriptions & des exemples authentiques d'une réunion complète dans le même individu. Cette réunion paroît même dans l'ordre naturel, pour plusieurs espèces qui se trouvent placées en dehors de la grande série des animaux vertébrés, en commençant par les plantes. Le limacon est dans ce cas. Des organes mâles & femelles bien conformés sont réunis dans le même individu; mais cet animal singulier ne peut pas néanmoins se féconder seul & sans le secours d'un excitement qui détermine le détachement de l'ovule.

Il en est autrement dans les espèces d'un ordre plus élevé; les organes des deux sexes peuvent sans doute se réunir & se sont réunis en effet, & d'une manière imparfaite, dans certaines conformations monstrueuses. Mais l'hermaphroditisme complet, qui, en thèse générale, n'est pas impossible, ne paroît pas cependant avoir été observé.

Des déplacements d'organes, des vices organiques, de véritables monstruosités, ont pu souvent tromper des témoins peu éclairés, qui sont demeurés persuadés ensuite qu'ils avoient vu réellement des hermaphrodites.

L'esprit de critique fait apprécier à leur juste valeur ces singularités, dont la crédulité & l'amour du merveilleux ont si souvent dédaigné les conséquences les plus ridicules. Souvent même on a pris pour un exemple d'hermaphroditisme, l'indication équivoque ou mal exprimée des parties de l'un ou de l'autre sexe; plus tard cette incertitude disparoissoit, surtout lorsque ces dispositions singulières étoient observées par des hommes vraiment instruits; & dans ce cas, comme dans plusieurs autres, le merveilleux s'évanouissoit à la lumière d'un examen approfondi & d'une judicieuse observation. C'est ce que l'on vit arriver pour la prétendue fille italienne, qui devint homme du temps de Constantin, au rapport d'un père de l'Eglise, & à Marie Germain, qui, suivant Ambroise Paré, devint homme tout-à-coup, après avoir fauté un foflé.

Les prétendus hermaphrodites qui ont eu l'écon-

(1) Voyez la collection des monstres & des animaux, peints par Regnauld.

lement monstruel n'étoient, d'après Colombo, que des véritables filles, en s'attachant avec une scrupuleuse exactitude à l'examen des parties génitales.

L'hermaphrodite nègre, d'Angola, qui fit tant de bruit à Loundres dans la dix-huitième siècle, n'étoit rien autre qu'une femme en tout semblable à l'individu décrit par Colombo.

Marguerite Malane se trouva aussi à peu près dans le même cas, & auroit pu passer aussi comme hermaphrodite, si elle avoit échappé à l'examen médico-légal de Saviard. Elle vint à Paris, en 1695, en habit de garçon, l'épée au côté, le chapeau retrouffé, & ayant tout le reste de l'habillement de l'homme; elle croyoit elle-même être hermaphrodite. Elle disoit qu'elle avoit les parties naturelles des deux sexes, & qu'elle étoit en état de se servir des unes & des autres. Elle se produisoit dans les assemblées publiques & particulières de médecins & de chirurgiens, & elle se faisoit examiner, pour une légère gratification, à ceux qui en avoient la curiosité.

Parmi les curieux qui l'examinèrent, il y en eut sans doute plusieurs qui, manquant de lumières suffisantes pour bien juger de son état, se laisserent entraîner à l'opinion la plus commune qu'elle leur inspiroit, de la regarder comme un hermaphrodite. Il y eut même des médecins & des chirurgiens d'un grand nom, qui assurèrent hautement qu'elle étoit réellement ce qu'elle se disoit être, & justifièrent, par leurs certifications, que l'on peut avoir acquis beaucoup de réputation en médecine & en chirurgie, sans avoir un grand fonds de connaissances solides & de véritables capacités.

Enfin, Saviard se trouvant presque le seul homme de l'art qui fût incrédule, se rendit aux pressantes sollicitations que lui firent ses confrères d'examiner ce prodige en leur présence. Il ne l'eut pas plutôt vu, qu'il leur déclara que ce garçon avoit une descente de matrice; en conséquence il réduisit cette descente à la guérison parfaitement. Ainsi l'unique hermaphrodisme, dans ce sujet, se trouva développé plus clair que le jour. Marguerite Malane, établie de sa maladie, présenta au Roi sa requête très-bien écrite, pour obtenir la permission de reprendre l'habit de femme, malgré la sentence des capitouls de Toulouse, qui lui enjoignoient de porter l'habit d'homme.

Dans plusieurs circonstances, certaines conceptions, où les types ordinaires sont beaucoup plus altérés, de véritables monstruosités, simulent davantage l'hermaphrodisme, & présentent une ébauche, non exemple imparfait d'un double appareil d'organes de reproduction. Le sexe mâle prédomine, au moins dans ces sortes d'individus, & l'ambiguïté dépend ordinairement d'une séparation des testicules, du dérangement de quelques autres pièces de l'appareil masculin, & quelquefois de l'addition d'une cavité cellulaire, d'une sorte de poche qui paroît répondre au vagin & à

l'utérus. On a rencontré aussi dans l'intérieur de l'abdomen un assemblage bizarre d'organes mâles & d'organes femelles, sans que les apparences extérieures fissent soupçonner de monstruosité. Tel est l'exemple du soldat observé par Pott de Namur. Cette espèce de prodige offroit l'apparence d'un hermaphrodisme intérieur; & une dissection soignée y fit découvrir des testicules qui n'étoient pas sortis de l'abdomen, une apparence d'utérus, de vagin & de trompes utérines; enfin des rudimens, un simulacre d'appareil féminin.

Ces conformations vicieuses, ces monstruosités qui présentent toutes les apparences d'une réunion bizarre d'attributs sexuels, se présentent plus ordinairement à l'extérieur, où elles occasionnent des méprises, & déguisent le type, dont elles sont un accident & une dégradation. Parmi ces cas, un des plus fréquents est celui où le prétendu hermaphrodite n'est qu'un mâle impuissant, dont le canal de l'urètre a subi une déviation & vient s'ouvrir à la région du péciné, pour s'y terminer par une sente tendre, rouge & assez étendue pour avoir quelque analogie avec un des canaux extérieurs de l'autre sexe. (*Histoire naturelle de la femme.*)

Un jeune homme observé par Ballon, quoiqu'entièrement dépourvu de la moindre partie du sexe féminin, offroit aussi quelques apparences d'hermaphrodisme. Le membre viril avoit peu de développement; les testicules formoient deux éminences au côté du pubis; le scrotum vide se trouvoit divisé par une sente, offrant toutes les apparences d'une vulve, dans laquelle on auroit vainement cherché quelques traces de clitoris, de symphes ou de vagin; le canal de l'urètre s'ouvrait au fond de cette sente. Il est bien naturel, disoit Ballon à ce sujet, que des personnes qui n'ont point de connaissances précises en anatomie, se soient méprises sur le caractère véritable de cet individu, & l'on ne doit pas être surpris qu'il ait porté des habits de femme avant d'arriver à Paris, pendant qu'il a pris des habits d'homme dans la capitale. Toutefois, & dans certains cas, on a rencontré la réunion, le mélange des deux sexes; mais suivant une combinaison telle, que l'individu qui présentoit ce monstrueux assemblage étoit condamné à l'impuissance ou à la stérilité.

Maret, de Dijon, a cité un exemple de cette monstruosité par augmentation de parties.

Un individu décrit par Giraud, dans le *Journal de la Société de médecine*, se rapprochoit assez de cet exemple; cependant il étoit plutôt mâle que femelle, & n'étoit pas monstrueux par une augmentation dans le nombre de ses organes, mais seulement par une distribution vicieuse des parties d'un seul & même sexe. Il passa long-temps dans la suite pour une femme, & le trouva uni par un lien volontaire avec un homme qui a rempli long-temps après de lui les fonctions de mari. Ce singulier personnage vint au grand hôpital d'humanité, pour s'y faire traiter d'une maladie dont il mourut.

mourut. Livré alors aux recherches anatomiques, il offrit à l'extérieur un assemblage monstrueux de parties des deux sexes. Le bulbe étoit entièrement masculin; des poils durs & très-analogues à la barbe couvraient le menton; le con étoit gros, la poitrine large, le sein légèrement renflé, & les mamelons parfaitement semblables à ceux des hommes.

L'autre moitié du corps, depuis la ceinture jusqu'aux pieds, faisoit contraste avec le bulbe; les formes de toute l'extrémité moins exprimées & plus délicates, les fesses mieux arrondies; le bassin plus élevé & les cuisses plus écartées, présentoient un assemblage de caractères féminins très-marqués. Les parties extérieures de la génération offroient un membre viril imparfait, deux testicules, une apparence de vulve qui conduisoit à un vagin; dont l'entrée étoit garnie de tubercules qui sembloient former les débris de l'hymen.

En se bornant à cet examen superficiel, on auroit pu conclure que l'individu qui en faisoit le sujet étoit complètement hermaphrodite. L'observation de Maret présente un phénomène analogue.

Une recherche plus approfondie donna pour résultat que les testicules étoient bien organisés, que les vésicules féminales manquoient d'une partie importante (1), que le vagin se terminoit par un cul-de-sac, & qu'enfin toutes les parties de cette conformation monstrueuse, loin de donner un double sexe à l'individu qui le présentait, le condamnoient au contraire à une triste neutralité (2).

Dans les monstruosités moins éloignées d'un idéal d'hermaphroditisme, les parties des deux sexes se sont trouvées à la vérité réunies, mais dans un état d'échance ou d'imperfection; de telle sorte que l'individu qui présente cette réunion ne pourroit pas même remplir tout à tour les fonctions de l'homme & de la femme, ni même, & la plus souvent, l'une de ces fonctions.

L'exemple le plus complet d'une pareille affection a été décrit, dans ces derniers temps, dans les *Bulletins de la Société de médecine de Paris*. La personne qui la présentait avoit vingt-huit ans; elle avoit le visage mâle, le teint brun & un peu de barbe. Quoique pourvue des organes masculins, elle avoit un appareil du sexe féminin bien conformé, en fit usage, à deux époques différentes; conformation dont les détails ne seront exactement connus qu'après la mort de cet individu, & lorsqu'à la suite d'un examen anatomique, il ne restera aucun doute

sur la véritable nature des testicules & de leurs conduits excréteurs.

Nous ne terminerons pas cette espèce de digression, qu'il seroit facile de prolonger par un grand nombre de faits ou d'observations, sans faire remarquer que chez plusieurs individus regardés comme des hermaphrodites, ou traités successivement comme hommes ou comme femmes, l'habitude & l'éducation ont développé quelquefois des penchans & des costumes en opposition avec la véritable nature de ces individus: disposition évidemment acquise, & dont l'observation démontre que l'on doit attribuer une part assez considérable à l'éducation & aux premières directions de la sensibilité, dans le caractère moral & la nature des affections de l'homme & de la femme.

Du reste, dans ces augmentations & ces déviations monstrueuses, ainsi que dans les exemples des autres organes doubles, en totalité ou en partie, on doit avoir soin de ne pas confondre ce qui peut dépendre d'une simple variété, d'une simple anomalie constitutionnelle, & entièrement étrangère à une disposition morbide, avec ce qui se rapporte à ces mêmes dispositions.

Les monstruosités par augmentation de parties, dans le premier cas, devraient plutôt être regardées comme des accidents ou des variétés de structure, que comme de véritables monstruosités. Tels sont tous les cas dont nous avons déjà parlé, & dans lesquels on a trouvé un plus grand nombre d'os, de muscles, ou de parties dans certains viscères; tel est même le cas des sex-diguitaires, qui s'est présenté quelquefois comme un trait de famille, & se transmet du père aux enfans comme certaines maladies héréditaires (1).

Quant aux autres monstruosités, soit dans l'homme, soit dans les autres mammifères, on peut, sans hésiter, les regarder comme de véritables monstruosités, que l'on doit attribuer à un second fœtus qui a été détruit en grande partie, & dont il ne reste que ses portions plantées & comme greffées sur le fœtus qui a survécu, & aux dépens duquel elles ont végété & continué de végéter après la naissance.

Cette observation s'applique également aux monstruosités avec excès dans les organes de la génération, soit que les parties appartenant à un seul sexe soient doubles, soit qu'elles tiennent des deux; ce qui constitue alors l'hermaphroditisme dont nous venons de parler avec quelques détails.

(1) Un des principaux exemples de cette transmission, & d'ailleurs que cite Beaupré d'un certain Gratio Kallia de Maltre, qui étoit sex-digitaire des mains & des pieds, & dont les enfans eurent tout quelque chose de cette conformation, principalement l'ailot, dont la femme a des sex-diguitaires à son tour. (Voyez aussi les *Œuvres de Montaigne*, tome II, pag. 275, sous l'histoire de Jacob Rabbe, de Berlin, analogue à celle de Gratio Kallia.)

(1) Les uréters.

(2) *Poey's Journal de médecine rédigé par Sedillot*, tome II, pag. 307 & suiv.

*Monstres par défaut ou avec diminution
de parties.*

Les monstres par défaut ou par diminution de parties, ne présentent pas moins de variétés que les monstres avec excès ou augmentation d'organes. On place au premier rang les *acéphales*, c'est-à-dire, les fœtus entièrement dépourvus de tête & réduits à une espèce de torse ou de tronc, & les *anencéphales* ou fœtus dont le cerveau a été entraîné à une époque déjà assez avancée de la vie intra-utérine, pour qu'il reste quelques débris de cet organe, ou des parties dont l'existence parait dépendre de la base.

Les acéphales le sont à différents degrés : les uns sont dépourvus de la tête & du cou, d'autres de ces parties, des bras & même du thorax ; ce qui les réduit à une espèce de torse incomplet ou de tronçon, dans lequel l'œil du l'atomoiste. Seul peut découvrir encore quelques traces de l'organisation de l'homme.

Le phénomène de l'acéphalie, quoique très-extraordinaire en apparence, est assez fréquent ; & ses collections académiques, les relations de voyages, les descriptions de cabinets, en font connaître plusieurs exemples. En les considérant seulement à l'extérieur, on est frappé de la conformation bizarre de ces monstres, que quelques dispositions, quelques parties mal observées ont fait rapporter quelquefois pour l'homme, à différentes espèces d'animaux. Si de l'extérieur on passe ensuite à l'intérieur, pour découvrir au milieu de ce désordre apparent quelques traces d'une marche régulière, on est moins étonné de la singularité de ces espèces de prodiges, que de l'espèce de coïncidence ou de rapport de leurs circonstances les plus remarquables.

En effet, ce n'est pas seulement la tête, ou une portion plus ou moins étendue de la colonne vertébrale, qui manque dans les monstres de cette classe, ainsi que M. le professeur Bérclard l'a fait remarquer dans un très-bon Mémoire sur les fœtus acéphales (1). Plusieurs autres parties manquent également & en même temps. Lors même que ces monstres sont dépourvus seulement de la tête ou du cou, ils ont des déficiences plus ou moins nombreuses à l'extérieur, & demeurent privés de membres thoraciques ; du cœur, du poumon ; de la plupart des autres viscères : ceux qui n'ont à la fois ni tête ni thorax, ne présentent ordinairement qu'une masse informe dans le tronçon qui a survécu.

En outre, dans presque toutes les histoires & les figures d'acéphales, dit l'auteur que nous venons d'évoquer, on remarque à la surface du corps incomplet, des inégalités, des vestiges, des ruines qui semblent indiquer que quelque chose de plus d'

existé autrefois ; dans la plupart des observations & des figures, ajoute M. Bérclard, on trouve expressément indiqués des cicatrices, des ouvertures prises pour une bouche, des yeux, des oreilles ; des poils au voisinage de l'extrémité supérieure du tronçon, des racines plus ou moins grands des membres supérieurs dans ceux qui ont encore une partie du cou ; enfin, & dans plusieurs, des os irréguliers fixés dans les chairs, aux environs des inégalités de la peau. En parcourant rapidement les causes principales des monstruosités, nous verrons, & en continuant de nous éclairer par les savantes recherches de M. Bérclard, que ces déficiences de détail, des privations de membres & de viscères, sont des effets nécessaires de l'absence des différentes portions de l'appareil nerveux que présentent les acéphales, & que nulle autre partie de l'histoire des monstres ne répand autant de lumière sur la physiologie, que ce qui concerne ces acéphales. Du reste, les organes du mouvement, ceux de la nutrition, de la génération, présentent dans les monstres de la même classe, des dispositions que le même observateur a su rattacher à des lois constantes & régulières.

Les muscles qui restent dans ces corps mutilés, sont ceux qui reçoivent des nerfs, de la portion de la moelle épinière qui n'a pas été détruite ; quelquefois ils sont blanchâtres, & d'autres fois ils paraissent s'être transformés en une masse qui ressemble à un tissu cellulaire infiltré, ce qui répond à une altération morbide ou à une demi-nutrition de leurs foyers nerveux ; les os des membres inférieurs existent même quand il n'y a pas de muscles dans ces parties du corps ; ordinairement les pieds sont contournés en dedans & difformes, & quelques orteils manquent en totalité ou en partie (1).

Le tissu cellulaire est presque toujours le siège ou d'une hydropisie très-considérable, ou d'un engorgement avec induration. Les propriétés, la composition de tissu, sont altérées au point que la chair musculaire paraît souvent méconnaissable, on se déclare avec une facilité singulière. Le foie, la rate, manquent toujours ou presque toujours ; les reins, quand la colonne vertébrale est détruite dans une grande partie de son étendue.

Les organes de la génération, même la vessie, ne manquent presque jamais ; ils forment, avec le rectum, & souvent avec les reins en avec l'un des reins, tous les viscères des acéphales, dont la mutilation s'étend jusqu'à la portion de la moelle épinière.

Les fonctions des fœtus acéphales, suivant le même auteur, sont bornées à la nutrition & à différentes sécrétions. Chez les individus moins mutilés, il existe en outre quel-

(1) *Annales de la Faculté de Paris*, 1812, n°. 1X & X, & 1813, n°. IX & X.

(2) Bérclard, op. cit. (*Bulletin de la Faculté de Paris*, tom. V, pag. 405.)

ques traces d'une action musculaire. Dans la plupart de ces cas, dit M. Bédard, même dans ceux que nous avons observés nous-mêmes, l'absence du cœur, mais surtout la disposition insolite & l'absence des vaisseaux, laissent beaucoup d'obscurité sur la manière dont la circulation s'est faite. L'innervation est incontestablement nécessaire à la nutrition, poignée, avec l'absence d'une certaine étendue des centres nerveux, se trouve constamment celle des organes des sens, des muscles & même des membres entiers, auxquels, ces centres fournissent des nerfs; cette innervation proportionnée sans doute à la quantité de parties nerveuses, & surtout de centres qui existent, doit être très-foible, quand les appareils des sens, la moelle allongée & une partie de la moelle épinière proprement dite, n'existent point. La nutrition assez régulière dans les os qui existent, & dans la peau, est beaucoup moins dans les muscles. Les sécrétions muqueuses du canal intestinal paroissent le faire comme dans les cas ordinaires; enfin l'action musculaire paroît, suivant quelques observateurs, s'être exercée pendant quelques instans après la naissance.

Les anencéphales ne sont pas, comme les acéphales, dépourvus d'une région entière du corps; chez le plus grand nombre on trouve la moelle épinière & ses nerfs, son bulbe supérieur, & les nerfs qu'il fournit. Les sens externes, suivant M. Bédard, existent ordinairement tous, de manière que ces monstres ne sont privés que des lobes du cerveau & des os qui les recouvrent. Ils vivent quelques heures, quelques jours même; les cas de ce genre sont nombreux, & on les trouve indiqués dans des livres, sous le titre d'*Histoire d'un enfant sans tête qui a vécu*.

Chez les anencéphales, que l'on a désignés sous le nom de *monophts* ou *cyclopes*, il ne manque, suivant le savoir anatomiste dont nous empruntons ici le travail, que le nerf olfactif, ou le processus olfactif dans les animaux; absence avec laquelle coïncide le défaut de l'ethmoïde; ce qui entraîne la *compression* plus ou moins intime des deux yeux (1).

L'anencéphalie, qui est toujours ou presque toujours l'effet d'une hydropisie, suivant l'observation de Morgagni, est plus ou moins étendue, plus ou moins complète, suivant l'époque de cette maladie: quand l'hydropisie survient plus tard, & se manifeste sous la forme d'une hydropcéphale; elle écarte seulement les os du crâne, ou ne les détruit que très-incomplètement.

La destruction du cerveau, par l'épanchement d'un liquide qui se fait le plus ordinairement dans

les ventricules, s'étend quelquefois jusqu'à la moelle épinière, & l'on cite l'exemple de *fortis* qui, n'ayant ni cerveau, ni cervelet, ni moelle épinière, ont vécu cependant plusieurs heures après leur naissance.

Morgagni a décrit avec beaucoup de détail un de ces exemples. Le corps de l'individu qui le présentait, étoit bien conformé; il n'avoit aucune apparence extérieure de ce qu'il y avoit de défectueux; les os du crâne, les apophyses épineuses, la courbure de la portion cervicale de l'épine ne pouvoient être reconnus que par l'œil exercé de l'anatomiste.

On trouve dans les recueils d'observations plusieurs cas analogues, dont le plus remarquable est celui d'un fœtus mâle, décrit par Mery, & qui, dépourvu de cerveau & de moelle épinière, vécut vingt-une heures, & prit même quelque nourriture (1).

Des monstruosités par défaut ou par diminution de parties.

M. Lallemand, de Metz, a décrit tout récemment, & avec beaucoup d'exactitude, un exemple d'anencéphale que l'on pourroit appeler *complet*, & qui paroît avoir évidemment survécu à la destruction de la moelle épinière. Les nerfs qui, dans ces sortes de monstres, n'avoient pas été examinés avec assez de soin par les anatomistes, attirèrent toute son attention. Tous ceux de la face lui parurent dans l'état naturel. Les nerfs qui se rendoient aux espaces inter-vertébraux du cou, étoient grêles, & n'avoient le volume ordinaire de ces nerfs qu'après avoir traversé les trois de conjugaison. « Je distinguai surtout avec soin, ajoute l'auteur, les nerfs cardiaques; les moindres filets étoient très-apparens. J'ai pu suivre très-distinctement ceux qui sont fournis par le ganglion cervical supérieur, le pneumogastrique, le récurrent, le ganglion cervical inférieur, & j'avoue que dans l'adulte, je n'ai jamais mieux vu les plexus cardiaques; j'ai même pu suivre jusque dans la substance du cœur quelques filets du plexus coronaire antérieur. Les nerfs dorsaux n'ont rien offert de remarquable; les ganglions thoraciques étoient moins nombreux que de coutume, mais très-gros; il y en avoit à gauche cinq ou six; à droite on n'en trouva que trois; les très-gros au milieu; deux autres plus petits très-rapprochés, l'entouroient de nombreux rameaux; il en paroit en dehors des filets de communication avec les nerfs intercostaux: le tronç du grand splanchnique étoit aussi volumineux que le nerf médian du même côté; il paroit du ganglion le plus volumineux, & se terminoit dans le plexus solaire, qui fournissoit au plexus hépatique, rénal, pulmonaire, coe-

(1) M. Bédard, en le bornant à cette indication dans son second Mémoire, *op. cit.* pag. 499, annonce qu'il publie sous quelques mois sur cette double singularité, un ouvrage qu'il n'a pas encore rempli, & dont nous devons à cet écrivain par d'autres devoirs & d'autres travaux.

(1) Voyez les Mémoires de l'Académie des sciences.

naïve, stomachique, des filets aussi distincts & presque aussi gros que ceux de l'adulte. Du côté gauche, les rameaux fournis par les ganglions thoraciques étoient, ainsi que ces ganglions, moins gros & plus nombreux; les nerfs des membres n'offrent rien de particulier, non plus que les muscles ni les os de ces parties (1). La mère de cet acéphale étoit hydropique; deux jours avant d'accoucher, elle déclara qu'elle sentoit distinctement les mouvements du fœtus, mais qu'ils étoient moins forts que dans ses grossesses précédentes. Dans le travail de l'accouchement, elle rendit une quantité prodigieuse de liquide; son enfant du sexe mâle avoit les chairs fermes, la peau recouverte d'un suint très-abondant, & l'épiderme adhérent dans tous les points au tissu de la peau; il n'avoit ni cerveau, ni moelle épinière. La poitrine, le ventre, les membres thoraciques & abdominaux étoient beaucoup plus gros, mais plus courts que dans un fœtus à terme, ce qui devoit être attribué à une grande quantité de graisse rongée; qui remplissoit partout les aréoles du tissu lamineux.

M. Bérard s'éleve des doutes sur les observations des auteurs qui prétendent n'avoir trouvé ni cerveau, ni cerveau, ni moelle épinière dans les fœtus acéphales qui avoient conservé les membres & la totalité du tronc. Il lui paroît du moins que, dans ces circonstances, on s'est mépris, ou que l'on a exagéré ce que l'on avoit vu. Ainsi, dit-il, dans certains cas, on n'a constaté l'absence de la moelle qu'en introduisant un stylet dans le canal; mais d'autres observateurs plus attentifs ayant ouvert le canal, y ont trouvé de la moelle (2). Dans d'autres cas où le rachis étoit bifide, on n'a trouvé, à la place de la moelle, qu'une membrane vasculaire d'où provenoient les nerfs. N'est-il pas évident que cette substance, prise pour la pie-mère, est la moelle altérée dans sa forme, changement peu important dans un organe dont les fonctions ne sont point mécaniques, & que la connoissance de la structure de la moelle rendrait à concevoir? Les faits rapportés par Soemmering & Reil, qui disent avoir trouvé des nerfs dans l'absence de la moelle, & j'ai vu aussi ce cas dans des anencéphales dont le rachis étoit bifide; ces faits n'influent pas la remarque qui précède.

L'absence des membres supérieurs ou d'une partie du tronc, celle du cœur, du diaphragme, ou de plusieurs autres viscères, résistent nécessairement, comme nous aurons bientôt l'occasion de le remarquer, d'une acéphalie plus ou moins étendue. Il existe toutefois plusieurs autres monstruosités par défaut, qui ne paroissent pas dépendre de

la même cause. Ainsi on a cité des exemples d'absence de l'oreille, de la langue, de la vessie, & de différentes parties des organes de la génération, même de l'utérus; le défaut des membres ou d'une partie des membres, est d'ailleurs beaucoup plus fréquent. Une des variétés les plus communes de ces combinaisons, est celle où les mains ou les pieds paroissent comme attachés à l'épaulé & à la hanche, par le défaut des bras, des avant-bras, des cuisses, des jambes; tel étoit le monstre que l'on a long-temps montré à Paris, en 1777 & 1758, sous le nom du petit Pépin.

Des monstruosités relatives à la position.

Les différentes transpositions des viscères du bas-ventre ou de la poitrine, dont il existe plusieurs exemples (1), seroient au premier rang dans cette quatrième catégorie, s'il n'étoit pas plus convenable de les regarder, avec Mery, comme un simple accident & une variété indifférente de l'organisation, que comme de véritables monstruosités.

Les déplacements, les hernies, les renversements d'organes, les déviations quelconques de parties, qui précèdent la naissance, & qu'il faut, par cette raison, ranger parmi les monstruosités, se font présentées avec une grande variété de circonstances; ils entraînent d'ailleurs des dispositions d'autant plus défectueuses, plus extraordinaires, plus monstrueuses, qu'ils ont eu lieu à une époque moins avancée de l'incubation, & de manière à entraîner la mesure que le développement s'opère, des changements notables dans la forme & la structure du fœtus.

Les exemples de cette classe, qui rentrent pour la plupart dans la nomenclature chirurgicale, sont très-nombreux; on en trouve non-seulement pour les viscères du bas-ventre, mais aussi pour ceux de la poitrine & même du cerveau.

Taillé plusieurs viscères de l'abdomen sont placés en dehors & dans une enveloppe particulière, soit à l'aîne, soit à l'ombilic; tantôt quelques-uns de ces mêmes viscères du thorax se trouvent hors de cette cavité: double déplacement, dont M. le professeur Chaussier a décrit deux exemples (2).

Dans une autre circonstance, on en voit encore un déplacement plus extraordinaire chez un fœtus

(1) Voyez Mery, *Mémoires de l'Académie des sciences*.

Bigny, *Zodiacum galliçum*, 2^e année, observ. IX, pag. 120.

Nolan, *Opusculum anatomicum*, 10-15, 1652.

M. Dupuyrou, *Bulletin de la Faculté*.

(2) *Bulletin de la Faculté*, tom. XI & IV. L'exemple rapporté dans ce dernier, à pour objet la position du cœur hors de la poitrine & dans la partie supérieure de l'abdomen; chez des sujets qui, pour la plupart, ne-pourent vivre, quoiqu'un d'eux fût âgé de 27 ans, lorsque l'on observa ce cœur particulièrement remarquable de son organisation.

(1) M. Hallemaud, *Observations pathologiques propres à éclaircir plusieurs points de physiologie. Thèse Paris, 1818.*

(2) *Philog. Transact.*, n^o. 296.

ayant une exomphale dans laquelle se trouvèrent en même temps plusieurs organes de l'abdomen & du thorax, avec une ouverture au centre du diaphragme, pour la sortie du cœur (1).

Il a suffi d'ailleurs, dans plusieurs circonstances, de déplacements beaucoup moins considérables, d'une simple déviation dans les parties génitales de l'un ou de l'autre sexe, pour constituer les cas d'impotence ou de stérilité, ou pour offrir des apparences d'hermaphrodisme qui disparaissent à la vue de l'homme suffisamment éclairé, pour reconnoître & pour apprécier des dispositions semblables.

Des monstruosités par la réunion contre nature de plusieurs parties.

Toutes les monstruosités de cette catégorie, au premier rang de laquelle on doit placer les imperforations, sont presque toujours l'effet d'une altération pathologique, & n'offrent que très-rarement cet aspect extraordinaire & bizarre, qui semble inséparable de l'idée des monstres, au moins pour le vulgaire. La même remarque s'applique aux monstruosités relatives à la couleur, ainsi qu'à la texture & à la conformation des parties.

Considérations physiologiques sur les causes & le développement des monstruosités, système & hypothèses sur les monstres.

On a voulu rapporter les monstruosités de différents ordres à plusieurs causes, & les expliquer par des théories & des hypothèses plus ou moins fondées.

L'influence de l'imagination des mères est une des circonstances que l'on a le plus souvent mise en jeu; des médecins d'ailleurs estimables ont même admis cette influence dans certains cas, pour expliquer différentes monstruosités qui ne devoient être considérées alors que comme des altérations morbides.

L'imagination, les sensations, les passions vives de la mère, exercent sûrement une influence notable sur le fœtus enroulé dans son sein, & peuvent devenir la cause éloignée d'un tempérament particulier ou d'une constitution morbide; mais admettre que les pensées, les idées de la mère, puissent opérer sur différents points du corps de l'enfant une altération déterminée & conforme à la nature de ces idées & de ces pensées, & vouloir expliquer ainsi les tégnes, les envies & les difformités de plusieurs individus, c'est une opinion qui n'a jamais été appuyée que par des observations controuvées,

ou par des faits qui n'avoient été vus que par des témoins entièrement étrangers à la connoissance des véritables rapports que la nature a établis entre le fœtus & les organes de la gestation.

Des maladies, différentes altérations que la fœtus a éprouvées pendant la grossesse, sont bien souvent la cause de toutes les variétés de formes, de couleurs, que l'on croit expliquer par l'effet de l'imagination de la mère. Les physiologistes citent à cette occasion l'exemple d'une dame qui, pendant sa grossesse, s'étoit beaucoup occupée de l'ange Gabriel, & qui accoucha d'un fils en tout semblable à un petit ange, & muni de deux ailes.

On cria au miracle; mais un observateur un peu plus attentif, ayant examiné le fait, trouva que les deux ailes n'étoient rien autre chose que deux tumeurs scrouelleuses très-considérables, & que l'enfant, loin d'avoir été rapproché par les pensées de sa mère, d'une nature angélique, étoit une pauvre créature dont la maladie avoit commencé presque avec la vie, & qui étoit condamnée par la nature à une longue infirmité.

Suivant une autre théorie beaucoup plus plausible, les monstruosités seroient toujours le produit des maladies & des altérations accidentelles que l'embryon ou le fœtus auroit éprouvées depuis la conception jusqu'à la naissance : c'est ce que l'on a appelé le *système des causes occasionnelles*, auquel on ne pourroit reprocher qu'une généralité trop étendue & contraire, sous ce rapport, à plusieurs faits qu'il ne peut comprendre. Une autre théorie plus restreinte, & dont les partisans admettent d'ailleurs les causes évennelles dans un grand nombre de circonstances, rapporteroit plusieurs monstruosités à une altération primitive dans les germes ou plutôt dans la sécrétion propre aux ovaires & aux testicules : opinion à laquelle on peut opposer plusieurs objections, dont les plus faibles feroient son incompatibilité dans le système des causes finales.

La connoissance des monstres, considérée sous son véritable point de vue, se rattache d'une part aux principales données de l'anatomie pathologique, qui peuvent d'ailleurs répandre beaucoup de lumière sur plusieurs points très-importans de physiologie, & d'une autre part à l'histoire de la reproduction & des accidents des vianes, dont cette fonction est susceptible.

C'est avec cet ensemble de notions, & on agrandissant le sujet de ces recherches pour en mieux apercevoir les détails, sans l'obscurcir ou l'embarrasser par de vaines hypothèses, qu'il est possible de reconnoître, au moins pour un grand nombre d'exemples, les causes des monstruosités qui se rangent sous les différents titres que nous venons d'indiquer; sans vouloir d'ailleurs les expliquer toutes ni les rapporter à une même origine, en s'attachant exclusivement à un seul genre d'idées ou d'explications.

(1) Voyez la description détaillée de cette monstruosité, par M. Biçlard. (*Bulletin de la Faculté*, tome III, pag. 323.)

De grandes difficultés se présentent sans doute dans cette recherche; en effet, plusieurs circonstances de la génération nous sont tout-à-fait inconnues. L'existence primitive, la végétation de l'ovule, les altérations ou les dégénérescences, son animation, les premiers moments de la vie intra-utérine, l'état de l'embryon pendant tout le temps où il n'est encore attaché par aucun lien à l'utérus, la conformation de ses membranes, celle du placenta, les développemens successifs des tissus & des organes du fœtus, toutes ces choses nous sont encore très-peu connues; cependant tout n'est pas entièrement obscur ou ignoré dans un pareil sujet de recherches & de réflexions. Dans l'état présent des connaissances, une doctrine, une considération théorique ou dogmatique des monstruosités peut même être envisagée en dernière analyse, comme l'anatomie pathologique du fœtus & l'histoire médicale de la vie intra-utérine, dégagées de toutes vues systématiques, & exclusivement appuyées sur l'observation.

Nous ne nous engageons pas toutefois dans cette étude approfondie & détaillée des différentes monstruosités, dont plusieurs parties doivent être renvoyées à différents articles de ce Dictionnaire & à celui d'*Anatomie & de Physiologie* (1).

Il nous suffira de passer rapidement en revue, & dans un petit nombre d'articles, les circonstances qui peuvent contribuer, le plus souvent, aux différents espèces de monstruosités, tels que le fait même de l'embryon, le plus léger changement dans les conditions indispensables de l'incubation, les maladies, les altérations spontanées ou occasionnelles de l'ovule ou du fœtus, l'absence ou la lésion des organes qui se montrent les premiers, & qui paroissent exercer une influence remarquable sur les autres parties du fœtus.

Le fait même de l'incubation & du développement du produit de la conception doit être placé au nombre de ces circonstances; trois conditions sont indispensables pour ce premier temps de la vie des animaux, savoir, la chaleur, l'élément & la nourriture; il suffira de déranger, de modifier une seule de ces conditions, pour apporter le plus grand trouble dans le développement du fœtus, & changer la disposition naturelle de ces organes.

Dans les mammifères & dans les oiseaux, les moyens de protection qui environnent l'embryon assurent davantage le maintien de ces mêmes conditions, & les monstruosités doivent être & sont en effet moins faciles & moins nombreuses que dans les poissons & les quadrupèdes ovipares, dont les œufs, qui ne sont point renfermés dans une ma-

trix, ou distendus par une enveloppe solide, se trouvent communément exposés à des causes de destruction ou de perturbation. Quelques physiiciens paroissent avoir tiré parti de cette circonstance, pour produire à volonté différentes monstruosités dans les animaux de ces classes & dans les plantes. Les chances de ce genre d'accidens, quoique beaucoup moins restreintes dans les mammifères & dans l'homme, ont encore beaucoup d'étendue.

Un poëte philosophe; Lucrèce, a supposé que dans le premier âge du monde, à l'origine des choses, la nature étoit assurée dans la marche, plus incertaine, plus inhabile dans ses opérations, avoit créé un grand nombre de formes bizarres & de monstres qui n'avoient pu se reproduire.

Maloque cum Tellus, aëtem portante creantem.
Conata est, necdum facie monstruosa coacta,
[Androgynum neutrum, inter artemque, ac virumq;].
Orbi prius jam parvum, materis voluisti virginis;
Mala sine ore cœcum, sine velis, erca repens.
P'instinctu membrarum per totum corpus induta,
Nec facere ut possent conquirant, nec cedere qualem,
Nec vitare malum, nec fœvere quod foret aliis;
Cœtera de genere hoc monstra, ac pœneria cepisti.

Lucrèce, de *Reveris naturæ* (lib. V, v. 246-256).

Cette fiction du poëte, cette supposition du philosophe, s'est bien souvent été allée pour l'homme & pour les animaux dans les premiers temps de leur existence, c'est-à-dire, au moment de l'incubation & de la vie intra-utérine; c'est l'âge des changemens rapides & des métamorphoses, le moment le plus propre à l'altération des types primitifs, au développement des conformations défectueuses, en un mot, aux aberrations, aux écarts, aux monstruosités de tous genres; en effet, dans ces temps primitifs, à cette origine des choses, le fœtus, très-peu consistant & presque liquide ou fluide, peut être aisément modifié dans sa structure, par les causes les plus légères d'altération, soit que déjà il se trouve fortement attaché à l'utérus, soit que les liens qui doivent établir cette union n'aient pas encore été formés. L'style déjà si étroit qui le renferme, ne peut être momentanément resserré ou agité, sans menacer son existence, sans troubler la nutrition ou lui imprimer des formes, des dispositions plus ou moins bizarres, plus ou moins contraires par la suite à un exercice plein & entier de la vie. D'une autre part, l'accroissement, la formation des différens organes, s'exécutoient alors avec une grande rapidité; c'est un changement continuel d'état ou de formes, une existence plus remplie de révolutions & d'événemens purement physiques ou organiques; & combien, dans ces différens passages, dans ces diverses révolutions, la marche de la nutrition & de l'accroissement ne peut-elle pas être accélérée ou retardée, embarrassée ou contraindre, de manière à donner lieu à des anomalies, à des accidens de

(1) Voyez ORGANES, ORGANES EN GÉNÉRAL, ORGANES (vices, difformités, lésions, dégénérescences, maladies), FŒTUS, DÉVELOPPEMENT, ÉMBRYON (phases, accroissement des fœtus), ACROPHALUS, DYSACROPHALUS, GÉLATA, NAÏRE, TRANSPOSITIONS DES VISCÈRES, &c.

structure ou de conformation, dont il faudroit s'étonner peut-être que les exemples, quoiqu'ils très-fréquens, très-singuliers, ne soient pas encore plus extraordinaires & plus nombreux !

Ajoutons que, dans l'organisation de l'embryon & de ses parties, les rapports mutuels d'action & de réaction des parties n'étant pas encore fortement établis, chaque organe peut végéter ou se développer isolément, & avec cette activité de nutrition que l'on a trouvée si favorable, dans ces derniers temps, à des lésions de structure, à des transformations & à des développemens de tissus qui, dans le cas de la vie intra-utérine, escomptaient aisément le résultat d'une aberration primitive, & se surchargeaient de monstruosités nouvelles.

Telles sont les réflexions qui se présentent naturellement à l'esprit, lorsque l'on considère les monstruosités *a priori*, comme une suite du fait même de l'incubation & des chances de la vie intra-utérine.

Des conditions de l'incubation & des monstruosités que le défaut ou l'altération de ces conditions peut occasionner.

Trois conditions que nous avons déjà indiquées sont nécessaires pour que cette vie intra-utérine, ou l'incubation s'accomplisse avec régularité, savoir, l'espace, l'aliment & la température. Tout ce qui pourra gêner l'embryon ou le fœtus dans les enveloppes, diminuer, rétrécir l'espace qui lui est nécessaire, amènera différentes espèces de monstruosités que l'on pourra même prévenir ou déterminer à volonté, ainsi que le prouvent les expériences de Swammerdam sur les chrysalides, & celles d'un académicien de Berlin, sur les ovules des poissons.

Cette diminution accidentelle de l'espace exige pour l'évolution des différentes parties de l'ovule, est une des causes les plus fréquentes de monstruosités chez les espèces monogames, dans les grossesses de deux ou de trois jumeaux, & M. Bichard n'a pas craint d'avancer, dans son excellent Mémoire sur les acéphales, que les indistincts de ce genre sont tous formés dans la circonférence d'une semblable grosseur (1).

En effet, chez la femelle des espèces, dont l'ovaire n'a été obstrué ou comburé que pour l'incubation d'un fœtus unique, le développement régulier de deux ou trois jumeaux doit être assez difficile.

Dans cette condition, les chances pour les embryons, d'un développement dans l'espace voient leur être nécessaire, d'âge gène, d'une compression, d'un rapprochement, sont de moins très-nombreuses, & c'est ainsi que l'on conçoit la formation des monstres par excès, dont il existe un si grand nombre d'exemples.

La gêne, la compression qui doivent résulter pour un fœtus, de la présence d'un autre fœtus co-utérin dans la même cavité, ces circonstances, dit l'auteur que nous venons de citer, doivent être aussi une des causes fréquentes d'atrophie d'une partie aussi molle, aussi peu prolongée que l'est la moelle allongée, au moment où elle se développe.

L'aliment, cette autre condition de l'incubation, qui n'est pas moins nécessaire que l'espace, sera fortement altéré ou dérangé par l'épuisement ou les maladies très-graves de la mère, & d'une manière plus directe, par la compression du cordon ombilical, ou par une difficulté, une gêne quelconque dans la circulation.

Plusieurs monstruosités se sont formées sans doute par des causes de ce genre, & Littere a décrit un exemple d'anencéphalie avec spina bifida, dans toute l'étendue de la moelle épinière, chez un fœtus dont le cordon étoit entouré d'une manière remarquable. Le plus souvent, du reste, l'embarras dans les mouvements de la circulation du fœtus à la mère, agit moins dans la production des monstres, en portant atteinte à la condition de l'aliment, que par l'hydropisie qui résulte naturellement d'une semblable disposition.

Une autre condition, le degré de température nécessaire pour l'incubation, paraît assurée à la vérité chez les mammifères, & ne peut éprouver du moins que des changemens très-peu considérables; mais dans les poulets que l'on fait éclore par une incubation artificielle, il suffit de ne pas échauffer également les différentes parties des œufs, pour produire des monstres.

Du système des causes accidentelles des différentes espèces de monstruosités.

L'opinion, d'après laquelle on admet comme cause de monstruosité, les circonstances diverses qui peuvent altérer plus ou moins les conditions de l'incubation, ainsi que les différentes maladies spontanées ou provoquées de l'embryon & du fœtus, cette opinion constitue ce que l'on a appelé le système des causes accidentelles des monstres, par opposition avec l'hypothèse des causes nécessaires adoptées par les physiologistes, qui voulaient faire dépendre les mêmes monstruosités d'une défectuosité organique & primitive des germes.

Cette grande question de la formation des monstres attira vivement l'attention des savans en France, dans le milieu du dix-huitième siècle, à l'époque d'un monstre à corps double, dont

(1) Les fœtus acéphales, dit M. Bichard, sont tous des jumeaux. Parmi les histères particulières, il y en a presque la moitié qui sont mention expresse de cette circonstance : la plupart de ceux qui n'en parlent pas sont incomplets, au moins à l'égard de la circonstance opposée. (Voyez *Bulletins de la Faculté de médecine de Paris*, tom. V, pag. 496 & 497.)

l'examen particulier conduisit bientôt à des considérations générales.

Du Verney & Winslow combattoient pour l'hypothèse de l'altération originaire ou primitive des germes, & Lemery, pour le système des causes accidentelles. Cette importante discussion ayant fait époque dans l'histoire des sciences anatomiques, nous croyons devoir la rappeler avec quelques détails, mais sans rien changer à son exposition ni à sa rédaction des pièces officielles les plus importantes qui s'y rapportent.

Je fus appelé, dit Winslow, il y a quelques années, à l'hôpital général, pour voir une fille malade que l'on disoit avoir deux corps, & pour débiter si l'on administrerait l'extrême-onction à une seule ou à deux. Cette fille, âgée de douze ans, étoit assez grande pour cet âge, & d'ailleurs bien formée, excepté qu'elle avoit à la région épigastrique, un peu vers le côté gauche, la moitié inférieure, c'est-à-dire le bas-ventre & les extrémités inférieures d'un autre corps, qu'on prenoit aussi pour celui d'une fille.

Ce demi-corps étoit beaucoup plus petit, à proportion, que le corps entier; n'ayant qu'environ les deux tiers du volume de la parvité portion du grand. La situation étoit telle, que le ventre du petit corps regardoit le ventre du grand. On n'apercevoit dans le petit aucun vestige de tête, ni de bras ni de poitrine, excepté une rangée de vertèbres, dont on sentoit assez distinctement la portion supérieure, qui paroissoit être attachée & comme soudée à la moitié inférieure du sternum du grand corps, de manière que leurs apophyses épineuses étoient insérées en devant, & que leurs portions arrondies regardoient le sternum de la grande fille. Le reste de cette rangée de vertèbres ou épine du dos, s'avancoit peu à peu sur le devant, en s'éloignant de plus en plus du corps entier.

La partie inférieure du dos & la partie supérieure de l'épigastre du corps imparfait, ou petit corps, paroissent confondues avec la partie inférieure de l'épigastre du grand corps. Au reste, les deux bas-ventres étoient tout-à-fait séparés; l'un de l'autre, & tournés l'un vers l'autre avec les bassins & les extrémités inférieures.

On ne distinguoit pas les vertèbres lombaires du demi-corps, au lieu desquelles on sentoit, en y touchant, une espèce de ligament plat, très-fort, qui paroissoit attaché par ses extrémités à un bas des vertèbres du dos, & par l'autre à l'os sacrum & aux parties voisines des os des hanches, appelés communément os innommés, de sorte que par le moyen de ce ligament, le demi-corps étoit comme suspendu sur le devant du corps entier. La pauvre fille étoit même obligée de le soutenir continuellement dans une espèce d'écharpe pour se soulager du fardeau, & pour empêcher le ballolement qui lui étoit fort incommode, surtout quand elle étoit debout &

faisoit quelques mouvements ou marchoit. Elle étoit encore obligée de tenir les fesses du petit corps, toujours enveloppées de linges, à cause de l'écoulement des matières fécales.

Les extrémités inférieures, c'est-à-dire, les cuisses, les jambes & les pieds du petit corps, étoient toujours en attitude de flexion & ne donnoient aucune marque de mouvement. D'ailleurs, la conformation externe ou superficielle du bas-ventre, des fesses & de toutes les autres portions des extrémités inférieures, étoit très-naturelle. Toutes ces parties paroissent même bien nourries, grasses & dans un état ordinaire d'embonpoint. La peau dont elles étoient couvertes, étoit comme une vraie continuation de la peau du grand corps.

La connexion de ces deux sujets paroît d'abord, à la première inspection, comme s'il y avoit eu dans le grand corps une grande ouverture au-dessus du creux de l'estomac, par lequel le petit corps auroit fourré la tête, les bras, ses épaules & la poitrine, dans la cavité de la poitrine du grand corps, de sorte que le bas-ventre avec les extrémités inférieures, auroient resté dehors, & la peau de l'un auroit été entièrement unie & comme incorporée avec celle de l'autre par leur rencontre mutuelle.

C'est ce qui avoit donné lieu de soupçonner à quelques-uns que la moitié ou portion supérieure du petit corps pourroit être résolument cachée au dedans du grand, & que, par conséquent, il pourroit y avoir deux sujets entiers, dont chacun en particulier, seroit capable de recevoir le même sacrement. Mais ne voyant qu'une étendue ou capacité très-médiocre de la poitrine & du bas-ventre du grand corps, & n'ayant considéré très-attentivement la connexion particulière de l'épine du dos du petit sujet avec le sternum du grand, j'opimai que le petit n'avoit ni tête, ni bras, ni même quelque apparence de cœur, & qu'on ne pouvoit pas le regarder comme un sujet animé en particulier.

Le soupçon qu'on en auroit formé auparavant, auroit encore pu être poussé plus loin par l'observation suivante. Je remarquai pendant cet examen, que la fille portoit de temps en temps les mains sur les fesses & sur les cuisses du petit corps, & qu'elle les grattoit. Je demandai pourquoi elle le faisoit, & si elle sentoit les impressions qui en arrivoient à ce petit corps: elle me répondit qu'elle les sentoit très-bien & que cela lui faisoit plaisir.

Cette observation me fit souvenir d'une parvité que j'avois faite sur un Italien âgé d'environ dix-huit ans, à la foire de Saint-Laurent, l'an 1698. Il avoit imparfaitement au-dessous du carriage de la troisième côte du côté gauche, une autre tête beaucoup plus petite que la sienne. L'inscription vénitienne de son portrait, que j'ai toujours gardé depuis, marqueoit que les deux

• deux têtes avoient été baptisées sous des noms différens, savoir : la sienne, sous celui de *Jacques*, & l'autre sous celui de *Mathieu*. La petite tête étoit siée comme si un enfant, caché dans le bas-ventre, l'en avoit poussée au dehors, pour regarder quelque chose. Elle étoit fort adhérente au grand corps par la moitié inférieure de la partie latérale du côté droit de la face ; de sorte que l'oreille droite & les parties circonvoisines de cette oreille étoient cachées. Tout le reste de la tête & de la face, avec les cheveux & la plus grande partie du cou, étoit entièrement dehors ; & en y voyoit le front, les yeux, le nez, la bouche, les dents & le menton, très-distinctement. Je lui demandais s'il sentoit quand on touchoit à la petite tête, & m'ayant répondu qu'oui, je cherchai une occasion favorable pour en être bien assuré. Je ne fus pas long-temps sans y réussir, car pendant que j'examinais toutes les parties de cette tête, je me saisis du moment qu'un certain objet fit détourner le visage du grand garçon, & je pinçai avec mes ongles, la peau derrière l'oreille de la petite tête. Le grand cria dans l'instant que je lui faisois mal, & je lui marquai que je l'avois fait exprès. Ainsi voilà deux expériences que j'ai faites moi-même, de la communication du sentiment du toucher entre deux corps joints ensemble contre nature.

• Pour revenir à l'histoire de la fille, comme elle étoit très-malade, je priai qu'en cas de mort, on me fît avertir, & qu'on me permit d'en faire la dissection. Elle mourut quelques jours après, & en ayant été averti, jeme transportai à l'hôpital. Feu M. du Verney le professeur s'y trouva aussi, de même que M. Dupont, chirurgien-major des maisons de cet hôpital. Le fœtus étoit déjà très-altéré, & presque corrompu par la grande chaleur de la saison, ce qui nous empêcha de faire ce que nous aurions souhaité, & nous obligea à nous contenter des observations suivantes, d'autant plus qu'on étoit fort pressé pour l'enterrement, à cause de la peste.

• L'estomac étoit unique & situé à l'ordinaire, mais d'un grand volume ; il étoit flasque & très-médiocrement rempli ; l'intestin duodénal en sortoit comme de coutume, suivi naturellement de l'intestin jéjunum, & à peu près d'un tiers de l'intestin iléum, qui ensuite faisoit une bifurcation, & produisoit le reste de deux intestins iléums, l'un pour le grand fœtus, l'autre pour le petit. Chacun de ces deux iléums aboutissoit à de gros intestins ordinaires.

• Le foie paroissoit d'abord simple, excepté que le lobe gauche, qui ordinairement est petit, étoit fort épais. La convexité du face supérieure de toute la masse du foie, étoit uniforme & sans apparence d'un foie double. La face inférieure portoit deux vésicules du fiel bien formées, l'une ordinaire & dans la situation naturelle, sous le lobe droit, l'autre extraordinaire & placée sous

• le lobe gauche. Ces deux vésicules alloient séparément au duodénal, à peu de distance l'une de l'autre.

• Dans le petit fœtus, l'intestin colon, au lieu d'aboutir à celui qu'on appelle *rectum*, paroissoit se confondre avec la vésicle & en former une espèce de cloaque avec les artères, qui s'y terminoient aussi à l'ordinaire. Ce réceptacle commun de la matière fécale & de l'urine n'avoit qu'une issue, dont l'extérieur étoit en manière d'anus confondu avec une petite portion de la partie naturelle externe du sexe féminin. Au reste il n'y avoit dans ce petit fœtus, ni au dedans, ni au dehors, aucun vestige d'organe de la génération ou marque de sexe.

• Dans ce même petit fœtus, toutes les parties inférieures étoient à l'extérieur très-bien conformées ; les lombes, le siège, les hanches, les cuisses, les jambes, les pieds, avec toutes les articulations, paroissient être dans leur état naturel, & même les fesses, comme s'il eût été appelé communément le *mollet* ou *gras de jambe*, marquoient très-bien la forme & la consistance ordinaire de ces parties. Je voulus, nonobstant la grande pesanteur inévitement arrivée par la chaleur de la saison, examiner particulièrement le dedans de ces mêmes parties, dont j'avois vu & expérimenté si évidemment la communication de sensibilité qu'elles avoient avec le corps du grand fœtus pendant leur vie. M. du Verney me dit que je pourrois y rencontrer ce qu'il avoit vu antérieurement dans un fœtus à peu près semblable, savoir, qu'il n'y avoit pas de muscles. Cela augmenta ma curiosité, & ayant moi-même disséqué ces parties d'un bout jusqu'à l'autre, je n'y trouvai aucun muscle, ni même la moindre fibre charnue ; ce n'étoit que la seule graisse avec une distribution de vaisseaux sanguins & de nerfs, qui remplissoit l'intervalle de la peau & des os.

• Ayant depuis, en différents temps & à tête reposée, fait plusieurs réflexions sur ces phénomènes, j'ai trouvé de très-grandes difficultés dans le système de ceux qui nient les germes originaires monstrueux ; & attribuent la formation des monstres qu'au dérangement accidentel de la structure naturelle des germes originaires, soit par confusion de deux ou de plusieurs germes entiers, soit par destruction, ébranlement, adhérences, &c., de quelque portion des germes naturels, selon les différens degrés & les différentes manières de compression par les parties voisines. Ces difficultés, que j'avois ensuite abandonnées pendant quelque temps, se sont encore renouvelées à l'occasion d'un fœtus de biche à deux têtes, dont je fis la dissection & la description par ordre du Roi, comme je le dirai ci-après.

• Ayant à cette occasion parcouru, dans les *Mémoires de l'Académie*, toutes les observations

» qui s'y trouvent sur les monstres, les mêmes
 » difficultés se font beaucoup augmentées. Elles
 » n'ont paru enfin insurmontables, après avoir
 » comparé ces observations les unes avec les
 » autres; n'en ayant d'abord examiné que les deux
 » les plus détaillées, dont l'une est employée pour
 » le système des monstres originaux, dans les Mé-
 » moires de l'année 1706, par M. du Verney, &
 » l'autre pour le système des monstres accidentels,
 » dans les Mémoires de l'année 1724, par M. Le-
 » mery.

» Voici l'histoire du fœtus à deux têtes, dont il
 » est fait mention ci-dessus, & que je reçus le
 » 23 mai 1739, de M. d'Onz-en-Bray, à qui M. le
 » cardinal de Fleury l'avoit envoyé de la part du
 » Roi, pour en faire faire la dissection & la des-
 » cription. Ce fœtus, considéré comme étant de-
 » bout sur ses quatre pattes, avoit quatorze pous-
 » ses de hauteur & autant de longueur. Le cou & les
 » deux têtes étoient d'une dimension proportionnée
 » à cette mesure. L'une des deux têtes étoit posée
 » sur le cou, presque dans l'attitude ordinaire,
 » mais sans être inclinée sur le côté droit.
 » L'autre tête étoit unie par la partie latérale in-
 » férieure du côté gauche de l'occiput, avec la
 » partie latérale inférieure, du côté droit de l'occi-
 » put de la tête supérieure. La même tête latérale ou
 » inférieure étoit posée de manière que la tête supé-
 » rieure étoit vue de profil, on voyoit la tête laté-
 » rale directement de front : elle paroissoit un peu
 » plus grosse que l'autre.

» Il y avoit trois oreilles, une au côté droit de
 » la tête supérieure, une au côté gauche de la tête
 » latérale, & une commune aux deux têtes. Cette
 » oreille commune & moyenne, étoit un peu plus
 » large que les autres; par sa convexité elle étoit
 » fort égale & simple, mais au fond de sa concavité,
 » s'élevait une ligne saillante qui partageoit ce
 » fond comme en deux cinquièmes, & ensuite conti-
 » nuoit le long de la concavité de l'oreille, où elle
 » se perdoit entièrement. Le bord de la concavité
 » de chacune des deux autres oreilles, ou oreilles
 » propres, étoit garni d'un poil blanc vers l'extré-
 » mité de l'oreille, lequel poil blanc environnoit
 » le poil noir, dont le milieu de la concavité étoit
 » médiocrement couvert. Le bord blanc de l'o-
 » reille moyenne ou commune, jetoit de sa
 » pointe une raie blanche qui alloit gagner la
 » ligne saillante mentionnée ci-dessus, & divisoit
 » la portion voisine du milieu noir en deux.

» Les deux têtes étoient jointes, par dehors,
 » jusque vers le milieu des joues voisines, de ma-
 » nière qu'elles avoient chacune séparément leurs
 » deux yeux à l'ordinaire, excepté que l'un des
 » deux yeux de la tête latérale étoit un peu plus gros.
 » & un peu plus saillant que les autres yeux. Chaque
 » tête avoit son nez, ses narines, son museau, sa
 » bouche, ses mâchoires, son palais, sa langue & sa
 » gorge; la mâchoire inférieure de l'une ou de l'autre
 » tête étoit également mobile, pour pouvoir

» servir à brouter, & les deux mâchoires étoient
 » également garnies de dents à l'ordinaire.

» Le cou qui portoit ces deux têtes, de la ma-
 » nière qu'il est dit ci-dessus, étoit plus court
 » qu'à l'ordinaire, & tant soit peu incliné à droite;
 » tout le reste du corps n'avoit rien de singulier à
 » l'extérieur; les deux côtés du cou & du tronc ou
 » corps, étoient légèrement jalés de taches blan-
 » ches, comme le font pour l'ordinaire ces animaux
 » dans le premier âge.

» Je me suis contenté d'examiner par la dissec-
 » tion les deux têtes, & de m'attacher principa-
 » lement dans cet examen, à ce que je trouvois de
 » singulier dans les parties communes à ces deux
 » têtes, en les comparant avec celles qui y avoient
 » rapport dans chaque tête en particulier: (Win-
 » slow, *Mémoires de l'Académie des sciences*, année
 » 1733, pag. 366 & suiv.)

» Le sujet de la question, & les faits qui portoient
 » à s'en occuper, se trouvent très-bien exposés dans
 » le Mémoire de Winslow, dont nous venons de rap-
 » porter quelques passages. Un phénomène analogue
 » fut décrit plus tard par du Verney (1706); c'étoit
 » un nouvel exemple d'un monstre à corps double,
 » & composé de deux enfans mâles qui se trouvoient
 » réunis jusqu'à la partie inférieure du bas-ventre; ri-
 » rien n'étoit extraordinaire dans cet exemple, jus-
 » qu'à l'endroit de la jonction; là seulement com-
 » mençoit la monstruosité. Du Verney vouloit expli-
 » quer, comme Winslow, ce rapprochement bizarre
 » de deux structures différentes dans une grande
 » partie de leur étendue, par des germes essentielle-
 » ment & primitivement monstrueux, avec la persua-
 » sion que les parties monstrueuses existent déjà
 » dans leur germe, comme les parties régulières ou
 » naturelles d'un autre corps vivant dans le sien;
 » les unes & les autres n'ayant besoin que de déve-
 » loppement, & d'un développement produit par les
 » mêmes causes, pour paroître telles qu'on les voit
 » ensuite.

» Préoccupés par cette théorie, les deux savans
 » académiciens prétendoient que ces monstruosités,
 » par augmentation de parties, ne sont point l'ou-
 » vrage du hasard ni l'effet d'un dérangement fortu-
 » it dans les mouvements naturels; que depuis les
 » enveloppes jusqu'au plus profond des entrailles,
 » tout annonce un dessein conduit par une intelli-
 » gence libre dans ses vues, persistante dans son exé-
 » cution, & toujours sage dans les moyens qu'elle
 » met en usage; ils ajoutoient, au sujet des monstres
 » dont nous parlons, & que cette intelligence a réelle-
 » ment voulu produire ces monstruosités; que la
 » preuve de cette intention est l'accomplissement
 » même du fait, & qu'enfin l'inspection de ces mon-
 » stres, suivant Lemery, qui résume cette opinion pour
 » la combattre ensuite, fait voir la richesse de la mé-
 » canique du créateur, au moins autant que les pro-
 » ductions les plus réglées, puisqu'à toutes
 » les preuves que nous en avons, elle ajoute encore
 » celle-ci, d'autant plus forte & d'autant plus con-

vivante, qu'étant hors des règles communes, elle montre mieux la liberté de la nature, si féconde & si variée dans ces sortes d'ouvrages.

Un autre fait, l'exemple d'un monstre avec diminution de parties, se trouva compris plus tard dans la même discussion; il fut communiqué à l'Académie par Winflow. L'enfant qui en présentait toutes les circonstances que l'on reconnut par des recherches anatomiques, étoit né sans tête, sans cou, sans cœur, sans pommou, sans estomac, sans rate, sans foie, sans pancréas & sans une partie des premiers intestins (1). Il étoit le frère jumeau d'un autre enfant bien conformé, dont la naissance avoit précédé celle de ce monstre; celui-ci n'avoit guère plus que sept à huit ponces de longueur; il étoit très-gros, surtout à la région des haanches; il n'y avoit à chaque pied que le ponce & deux orteils, avec un appendice qui répondait au cinquième doigt. Le cordon ombilical étoit placé un peu plus bas que de coutume. Ce petit corps étoit très-gras, & son tissu cellulaire rempli de beaucoup de sérosité; on ne découvrit de traces d'un tissu musculaire qu'entre la peau & le tissu graisseux. Tous les viscères dont nous avons parlé manquoient, ainsi que la vésicule du fiel, l'épiploon & l'intestin duodénum; le reste des intestins présentait des circonvolutions & un mécontent comme dans l'état naturel. Tous les vaisseaux que l'on put découvrir, se contenoient qu'une sérosité lymphatique, & on n'apercevoit aucune apparence de sang dans toute l'étendue de ce monstre. On voyoit sortir du rectum, par les échancrures des vertèbres lombaires, & par les trous de l'os sacrum, plusieurs filets de nerfs qui ne lardoient pas à se perdre ou à s'effacer dans la sérosité dont tout l'organisme étoit pénétré. Les vertèbres des lombes, l'os sacrum, le bassin, les fémurs, les tibiaux, les péronés, les tarses, se trouvaient à peu près dans l'état naturel. Les rotules manquaient; toutes les parties offuses étoient dépourvues de muscles, excepté les extrémités supérieures des os fémur, autour desquels se trouvaient quelques faisceaux charnus très-pâles.

Winflow, après avoir fait connaître avec beaucoup de détail, d'après sa propre observation, cet exemple de monstruosité dont nous avons seulement indiqué les principales dispositions, rapporte plusieurs faits analogues tirés pour la plupart des *Mémoires de l'Académie des sciences* (2).

(1) Voyez les *Mémoires de l'Académie des sciences*, année 1740, pag. 580.

(2) 1701, Observation de Lédre, concernant deux enfants.

Autre observation par M. Antoine, dans les mêmes *Mémoires*, pour l'année 1713, concernant un agneau acéphale dépourvu en outre de cœur, de foie, de rate, de vésicule. 1730, Observation de Méry. Sur un autre acéphale, dépourvu de cou, d'omoplate, de clavicule, de tibia, &c.

& tous relatifs aux monstruosités par diminution de parties.

A la suite de cette exposition, l'auteur s'attache à reproduire les idées qu'il avoit déjà énoncées dans ses *Mémoires précédents*, pour expliquer par des œufs ou germes primitivement déformés, ces différents monstruosités avec diminution ou défaut de parties; opinion que du Verney avoit également adoptée, ainsi que nous venons de le remarquer; L'émery, moins connu dans l'histoire des sciences que du Verney & Winflow, attaque leur explication, d'après des idées plus exactes, plus conformes à l'expérience.

« J'ai beau chercher, dit encore le même auteur, j'ai beau chercher dans les monstres dont il s'agit, j'avoue que je ne saurois y découvrir ce qui a pu donner lieu à M. du Verney de le récrier si fort sur le bel arrangement de cet ouvrage, dans lequel, ainsi que dans ce qui caractérise tous ceux de cette nature, je ne vois que bouleversement, désordre, dérangement; confusion, exécutions manquées. Pour s'en convaincre, il n'y auroit d'abord qu'à jeter les yeux sur les suites ordinaires de l'union de deux fœtus, moyennant laquelle des parties destinées à obéir, par leurs mouvements, aux volontés de l'âme, & qui ont souvent pour cela la conformation requise, & telle que l'auroient deux enfants qui ne tiendraient pas l'un à l'autre, ne peuvent cependant le faire, ou le font très-mal en vertu de cette union. Les jambes, par exemple, du monstre de M. du Verney avoient tout ce qu'il falloit pour marcher, & cela aussi bien que d'autres enfants non unis; cependant ils n'eussent pu le faire en avant, par rapport à leur union; ils ne l'eussent guère pu que de côté, & encore eût-il fallu que celui qui auroit eu envie de marcher, attendût que l'autre se fût voulu aussi; mais tout ceci n'est rien en comparaison de ce qui suit.

« Il est bien vrai que deux enfants qui sont partie d'un même monstre, viennent originellement du créateur; mais en sortant de ses mains, ils étoient séparés; leur construction étoit alors suivant l'ordre naturel; c'est l'action fortuite & immédiate de quelques-unes des causes accidentelles auxquelles les deux fœtus ont été malheureusement exposés, qui a corrompu & dérangé deux ouvrages de la nature & en a fait un monstre; car, comme ces sortes de causes font par elles-mêmes aveugles & dispensées d'avoir un dessein, des vues saines & de les suivre, elles ne jouissent que trop souvent de leurs droits; en agissant inconsidérément sur tout ce qu'elles trouvent, en faisant des allages bizarres & déraisonnables, & donnant lieu à des constructions folles & extravagantes, qui s'accordent parfaitement avec tous les agens qui ne voient ni ne savent ce qu'ils font, mais qui jurent & ne s'arrêtent jamais d'être d'accord avec la cause respectable

» à laquelle le système des œufs originairement monstrueux, les attribue immédiatement. »

S'attachant inoins à ce qui est possible, qu'aux choses effectives du réel, l'auteur dont nous venons de citer le passage qui précède, fit voir qu'il importoit plutôt de connoître la manière dont les monstruosités qui étoient le sujet de la question s'étoient formées, que de la manière dont elles pouvoient arriver; ce qui lui fit adopter sans restriction le système des causes accidentelles.

Ne se plaçant pas d'abord dans un point de vue général, il se borna à l'analyse du monstre décrit par du Verney, & ne craignit pas d'avancer qu'il lui paroïssoit évidemment produit par la pression réciproque de deux germes simultanément fécondés, en rappelant, pour appuyer cette opinion, les phénomènes de la greffe, & quelques monstruosités végétales. Ces deux germes séparés se sont rencontrés dans les trompes ou dans l'utérus, dans le sens qui a pu produire le monstre à corps double qui fait le sujet de la discussion: rapprochement qui auroit pu également se faire, & qui s'est fait souvent par d'autres points: ce qui produit les différentes variétés dont les monstres par augmentation de parties sont susceptibles.

Lemery remarque avec beaucoup de raison, que le lieu de la jonction de deux fœtus est le seul qui contienne des parties monstrueuses; que partout ailleurs les organes conservent leur état naturel, ayant été à l'abri de toute espèce de compression: c'est pour cela, ajoute-t-il, que dans le monstre de M. du Verney, où toute la pression mutuelle des deux fœtus n'avait vraisemblablement porté que sur le bas de leurs troncs, & ne les avait aussi unis qu'en cet endroit, on n'a trouvé de parties monstrueuses que dans l'hypogastre, & c'est par la même raison que dans les fœtus joints par les côtés, depuis le cou jusqu'au bas du tronc, il n'y a de parties monstrueuses que dans la poitrine & dans le bas-ventre, & ces parties sont différemment monstrueuses, & le sont en plus grand nombre suivant que les deux fœtus se sont pénétrés & approchés de plus près & en différens sens; par exemple, dans les uns, telles parties sont restées doubles & distinctes, qui, dans les autres, se sont réunies, & de deux n'en ont fait qu'une.

Dans un troisième Mémoire, le même auteur, pour expliquer les monstres avec augmentation de parties, développe avec une surabondance de raisonnement & de preuves qui convenoient alors, le système des causes accidentelles, de perturbation de la vie intra-utérine, en l'opposant à celui des causes nécessaires, établi sur l'hypothèse des œufs primitivement ou essentiellement monstrueux, & donnant lieu, par leur simple évolution, aux différentes espèces de monstruosités possibles ou réalisables (1).

Dans un autre Mémoire, abandonnant enfin la question si longuement débattue des monstres à corps double, ce savant académicien, dont nous nous plaisons à rappeler les vues avec quelques détails, présente des réflexions très-philosophiques sur les monstres, considérés sous un point de vue plus général, en les prenant pour ce qu'ils sont en effet, c'est-à-dire, pour des individus malades; très-malades, & ne pouvant vivre très-longtemps après la naissance; ce qui le conduit à rejeter de la catégorie des monstruosités, les simples transpositions de viscères, qui ne s'opposent ni à la reproduction, ni à la longévité.

Une nouvelle & dernière série de réflexions par le même auteur, a pour objet d'appliquer aux monstruosités avec absence ou défaut de parties, le même système, les causes accidentelles de perturbation. Un exemple des monstruosités de cette classe, dont nous avons déjà parlé, & dans lequel l'individu qui le présentoit se trouvoit réduit à une espèce de torse incomplet, sans cœur ni pousmons, ni estomac, &c., fut le sujet de cette nouvelle discussion. Lemery ne crut pas devoir lui donner beaucoup d'étendue, & il remarqua avec raison que ses observations précédentes renvertoient d'avance l'application que l'on voudroit faire des causes nécessaires à ce cas particulier de monstruosité.

L'espèce de cécité de Winslow, qui lui faisoit reconnoître quelques causes violentes de monstruosité, telles que les chutes, les coups sur l'abdomen pendant la grossesse, les attitudes gênantes, les mouvemens extraordinaires, paroît insuffisante à son antagoniste, qui se montre justement persuadé, que les causes accidentelles dont l'action est sourde, imperceptible, mais continue, contribuent bien plus efficacement à la formation des monstres que celles qui agissent plus fortement & avec plus grand fracas.

Tout ce que nous venons de dire relativement à la formation des monstres; & en rappelant avec quelques détails, vu son importance, la discussion qui occupa si vivement l'Académie des sciences, il y a près d'un siècle, le rapporte plus particulièrement aux causes extérieures de monstruosité, qui agissent en restreignant ou diminuant l'espace nécessaire au développement du fœtus. Elles sont les seules dans l'incubation indépendante & isolée des ovipares, soit que les ovules aient un tégument qui les protège, soit qu'ils se trouvent abandonnés sans enveloppe, sans protection, à des causes nombreuses de dérangemens, & aux chances de la destruction prématurée sans laquelle une seule de ces espèces, livrée à toute sa fécondité, se trouveroit bientôt gênée dans l'immensité des mers ou sur la surface de la terre.

Chez les mammifères dont l'incubation des ovules s'opère dans le sein même de l'individu qui les a formés, ces mêmes causes extérieures de dérangement font beaucoup plus rarement & beau-

(1) Voyez *Mém. de l'Acad. des sciences*. M., pag. 260, année 1738, & l'année 1740. M., pag. 210 & 214.

coup plus limitées; mais d'une autre part le réser-
voir qui les contient, étant lui-même une partie
vivante & susceptible d'un grand nombre d'alté-
rations directes ou indirectes, qui peuvent agir
sympathiquement ou copécucivament sur le fœtus,
celui-ci est nécessairement plus exposé, surtout
dans l'espèce humaine, que chez les animaux
d'un ordre moins élevé, à des dégénérescences
morbides, à des déformations & à des mon-
struosités.

*De l'état de la mère pendant la gestation, & des
altérations primitives de l'ovule, relativement
aux monstruosité.*

Les lésions dorsales ou passagères de l'utérus,
les autres maladies dont les lues peuvent s'étendre
jusqu'à cet organe, en dérangeant la nutrition & les
mouvements, & faire aborder une quantité trop
grande ou trop petite de sang, sont autant de
causes qui peuvent rendre les développemens de
l'ovule imparfaits. Différentes causes morales peu-
vent même contribuer au même effet, ou du moins
occasionner un très-grand trouble dans la vie in-
tra-utérine; telles sont l'imagination de la mère,
le trouble de son ame, les aberrations de son esprit,
la force de ses passions, la violence de ses senti-
mens, dont il est impossible de ne pas admettre
l'influence sur l'embryon ou sur le fœtus, sans la
concevoir ni l'expliquer dans le sens & avec les
idées du vulgaire.

Une autre classe de causes ou d'accidens qui se
rapportent d'une manière moins directe à l'utérus,
peut également contribuer au développement de
plusieurs lésions organiques qui constituent dis-
sentes espèces de monstruosité. Il est même pro-
bable que l'état primitif de l'ovule, & les change-
mens qu'il éprouve au moment de la fécondation,
ne sont pas entièrement sans influence sur la santé du
fœtus, la perfection ou l'imperfection de sa structure,
la régularité ou l'irrégularité de ses transforma-
tions. Le fait des maladies héréditaires donne un
haut degré de probabilité à cette conjecture, soit
que ces maladies viennent de la mère, ce qui sup-
pose une dégénérescence primitive de l'ovule, soit
qu'elles viennent du père, & par une transmission
trop évidente pour en rejeter les exemples, dont
plusieurs conduisent à faire soupçonner, de la part
des mâles, quelque chose de plus qu'un simple
excès, dans la reproduction.

La situation des époux dans les momens rapides
de leur union, l'énergie ou la faiblesse de leurs
organes, l'intensité ou la faiblesse de leurs pen-
chans, ne paroissent pas même sans résultats sur
le produit de la conception. C'est peut-être par
cette raison que, comme le remarque Buffon,
il se trouve plus de monstres dans les animaux
domestiques que dans les animaux sauvages, où
le nombre des mâles qui concourent à la gé-
nération, est aussi grand que celui des femelles. « Lor-

qu'il n'y a qu'un mâle, pour un grand nombre
de femelles, dit ce philosophe, elles n'ont pas la
liberté de consulter leur goût. La gaieté, les
plaisirs libres, les douces émotions leur sont
enlevés; il ne reste rien de piquant dans leurs
amours; elles souffrent de leurs seurs; elles lan-
guissent en attendant les froides approches d'un
mâle qu'elles n'ont pas choisi, qui souvent ne
leur convient pas, & qui toujours les flatte moins
qu'un autre qui se seroit fait préférer. De ces
tristes amours, de ces accouplemens sans goût,
doivent naître des produits aussi tristes, des êtres
aussi insipides, qui n'auront jamais le courage,
ni la fierté, ni la force que la nature n'a pu
propager dans chaque espèce qu'en laissant à
tous les individus leurs facultés tout entières,
& surtout la liberté du choix & même le hasard
des rencontres (1). »

Ces diversités, ajouterons-nous en développant
l'idée de Buffon, ces diversités qui résultent d'un
plaisir plus ou moins vif, & de la distraction d'un
amour sans énergie, doivent avoir une influence
encore plus sensible & plus marquée chez les mâles.
En effet, l'emploi des organes masculins étant une
sécrétion, ses résultats, comme tous ceux des opé-
rations du même genre, dépendent nécessaire-
ment de la sensibilité des filtres sécris & animés
qui les effectuent; & si la salive est plus péné-
trante, lorsque la saim ou un aliment détreint
dérégule une plus abondante sécrétion, si les
larmes sont brûlantes, lorsqu'une douleur très-
vive ou une irritation mécanique les fait couler;
si plusieurs autres sécrétions s'exaltent ou chan-
gent de nature lorsque les organes sont plus vive-
ment excités, pourroit-on se refuser à penser que
l'élaboration de la semence n'est pas soumise aux
mêmes lois? que la liqueur prolifique qui est for-
mée & versée pendant l'instant rapide d'une vo-
lupté sans énergie, jouit des mêmes propriétés &
éprouvera la même influence sur le germe, que
celle qui s'élabore & qui est lancée dans les cir-
constances d'une irritation vive, d'une ardeur sans
bornes & d'un ineffable plaisir? La quantité de
matière que fournit le mâle, paroît aussi devoir
apporter quelque différence dans l'influence pa-
ternelle, surtout en supposant que la liqueur sé-
minale agisse à la fois comme aliment & comme
stimulant (2): ce qui confirmeroit les expériences
de Koefreuter, dont les physiologistes pensent
étendre les résultats à la génération de l'homme
& des animaux (3).

(1) Buffon, *Discours sur la dégénération des animaux.*

(2) Bonnet & M. le professeur Chaussier ont admis cette
opinion.

(3) Koefreuter a forcé ou diminué les ressemblances pa-
ternelles dans les plantes hybrides, en augmentant la quan-
tité de la poussière fécondante.

Des maladies du fœtus considérées comme cause de monstruosités.

Quel que soit l'effet des causes éloignées que nous venons d'indiquer, & sur lesquelles il restera toujours beaucoup d'obscurité, certaines dispositions plus directes, des altérations plus évidentes, des maladies inévitables caractérisées se développent le plus souvent avant la naissance, & peuvent laisser après elles des traces, des stigmates, des lésions organiques assez étendues pour produire de véritables monstruosités. C'est ainsi que l'on conçoit du moins l'origine des taches, des tumeurs, des déformations, en un mot, des configurations bizarres, que l'on appelle *envies*, en les attribuant avec le vulgaire à une cause entièrement étrangère à leur formation. Ces accidents de structure & de forme sont évidemment l'effet & comme l'empreinte de plusieurs altérations morbides qui se sont développées pendant la gestation.

Les monstruosités relatives à la grandeur, les mains, les géans, ne sont presque jamais que des rachitiques, de petits ou de grands malades, qui l'étoient déjà au moment de leur naissance. Les scrophuleux seuls ou combinés avec le rachitisme, ne sont pas moins propres à faire naître dans le fœtus des altérations assez graves, assez prononcées, pour être rangées paroi les monstres. D'une autre part, les encéphaliques (fœtus sans cerveau) deviennent rarement tels sans une hydropisie de la tête, qui s'est formée graduellement & qui a fini par entraîner la destruction du cerveau.

L'hydropisie, que l'on doit placer au premier rang parmi les maladies qui peuvent occasionner des monstruosités, est très-fréquente pendant le cours de la vie intra-utérine; il l'est, pour qu'elle survienne, que la progression du sang du fœtus à la mère soit gênée ou embarrassée à une époque quelconque de la gestation, mais surtout dans son premier période (1). En outre, la carie, les diverses inflammations suivies de gangrène, ont occasionné également des mutilations, des lésions organiques, qui se montrent avec toutes les apparences d'une véritable monstruosité. M. le professeur Chaudrier décrit avec beaucoup de soin l'exemple d'une séparation entière & spontanée du bras, pendant la gestation. L'enfant qui fait le sujet de cette observation étoit né avec un moignon, & l'on trouva les os de l'avant-bras implantés dans le placenta.

Un fait analogue, l'exemple d'une séparation commencée & non achevée d'un membre, a été décrit avec beaucoup de soin par M. Bclard.

Un fœtus hydrocephale très-difforme, dit ce savant anatomiste, fut écorché, il y a quelques

années, à la Faculté de médecine, par madame Ador, sage-femme de Paris; ce fœtus avoit les doigts médius & annulaire de la main droite mutilés, mais l'extrémité du médian tenoit encore au moignon par un filament; les jambes étoient converties de phylloènes rouillées; la gauche avoit dans sa partie supérieure une scissure transverse pénétrant jusqu'aux os, semblable à celle qu'auroit produite une ligature serrée, & dont les deux surfaces presque coagulées étoient cicatrisées. Il est évident que si ce fœtus étoit encore resté quelque temps dans le sein de la mère, il en seroit sorti avec une jambe amputée & cicatrisée, dont on auroit pu retrouver les restes dans l'eau de l'amnios.

Si nous voulions rappeler ici toutes les maladies, toutes les altérations morbides, dont l'embryon ou le fœtus se trouve passible, & qui peuvent déranger sa structure au point de la rendre monstrueuse, il ne faudroit rien moins que passer en revue la plupart des lésions organiques qui ont été reconnues jusqu'à ce jour, & que l'on a essayé, dans ces derniers temps, de rapporter à un certain nombre de titres, afin de donner à leur étude le caractère d'une science ou d'une doctrine.

Des monstruosités de détail, qui résultent de l'absence ou des organes les plus essentiels à la vie en général, ou de l'appareil nerveux en particulier.

Les différents genres de causes que nous venons d'énumérer rapidement dans les considérations qui précèdent, peuvent agir séparément; mais le plus souvent il y a concours, complication d'influence dans leurs effets.

La nature, l'importance des organes qui peuvent être altérés ou détruits par ces causes, rendent d'ailleurs les monstruosités beaucoup plus graves, plus considérables & plus incompatibles avec la vie intra-utérine.

Ainsi, la privation & les lésions du cœur, des poumons, du cerveau, de quelques viscères de l'abdomen, entraîneront les conséquences plus ou moins graves sur le développement des autres parties, & se manifesteront par des monstruosités beaucoup plus considérables que la mutilation de quelques membres ou le déplacement de quelques viscères.

Cette influence est surtout bien remarquable pour l'appareil nerveux qui se forme l'un des premiers, & qui exerce sur les autres parties une influence si constante & si générale; influence que M. Bclard n'a point hésité à regarder comme une loi, dans son excellent Mémoire sur les encéphales, où il explique par cette correspondance, les monstruosités de détail que l'on observe dans les monstres de cette classe, & que l'absence de certaines portions du cerveau & de la moelle épini-

(1) Voyez M. Bclard, op. cit. (Bulletin de la Faculté de médecine de Paris.)

nière rend comme indispensables dans les acéphales. Soirons donc littéralement les vus ingénieuses & motivées de cet habile observateur.

« Dis que la moelle épinière, du il, commence à être dissoute, & c'est, dans l'espèce humaine, environ un mois après la conception, elle existe dans toute la longueur, y compris le bulbe supérieur ou queue de la moelle allongée; mais à cette époque le cerveau & le cervelet n'existent point encore. A deux mois, ce qui existe du cerveau est, on parait être, un liquide albumineux; à trois mois on en distingue déjà quelques parties, surtout celles qui avoisinent le plus l'extrémité supérieure de la moelle, & surtout après avoir durci le fœtus, par l'immersion dans l'alcool ou dans une liqueur acide. Dans les mois suivants on voit successivement les lobes du cerveau & du cervelet se compléter par une sorte d'épanouissement de la partie supérieure de la moelle; on plus exactement par une addition ou déposition successive de la matière nerveuse, par la membrane vasculaire du cerveau, dont la couleur rouge est, comme celle du péricrâne autour du parenchyme des os, une sorte de précurseur de la nutrition. Ces diverses parties semblent se former, creuser, ou du moins elles ont plus ou plutôt de la consistance à l'extérieur qu'à l'intérieur. Lorsque le cerveau n'existe point encore, & quand il commence à se former, la partie supérieure de la moelle & la base du cerveau & du cervelet sont évasées en entonnoir incomplet, dont le bord antérieur indique le point où le cerveau est déjà devenu solide. Il parait aussi qu'à mesure que le fœtus avance en âge, son cerveau ressemble successivement à celui des poissons, des reptiles, des oiseaux & des mammifères, & qu'enfin il acquiert par son développement le caractère qui appartient à l'espèce humaine.

« Si les centres nerveux viennent à être détruits plus ou moins complètement, ou verra en résulter divers phénomènes, & ces phénomènes qui sont tous ceux de l'encéphale, montreront des rapports entre les centres nerveux & diverses parties plus ou moins éloignées. Ainsi, la destruction du processus mamillaire dans les animaux ou du nerf olfactif de l'homme, déterminera l'atrophie de l'estomac, d'où le rapprochement, la confusion des oristes, & la coalition plus ou moins complète des deux yeux, &c. &c.

« Ainsi, la destruction plus ou moins complète des circulations du cerveau & du cervelet, diminuera consécutivement l'atrophie des os de la voûte du crâne.

« Ainsi, la destruction de la moelle allongée qui inclut plus ou moins complètement celle des nerfs des quatre feux de la face, des organes jugulaires & de quelques autres, déterminera la perte de la face, des organes jugulaires, &c. &c. & le développement du cerveau & du cervelet

étant empêché, par la destruction de leurs racines, la crête manquera aussi.

« Dans un très-petit nombre de ces rapports, à la fin de la première partie de ce Mémoire, la moelle allongée n'ayant pas été toute détruite, des débris des sens plus ou moins défigurés, une petite partie du cerveau ou du cervelet & du crâne ont persisté; ce qui confine une sorte d'acéphalie incomplète, dans laquelle la plus grande partie de la face & des organes jugulaires manquent, avec la plus grande partie de la moelle allongée.

« C'est la destruction complète de cette partie de l'encéphale qui détermine tous les phénomènes essentiels de l'acéphalie.

« Quand la destruction s'étend plus bas & comprend l'origine du nerf diaphragmatique, le diaphragme manque. Si elle s'étend un peu plus bas encore, les bras manquent plus ou moins complètement, quoique le thorax persiste; enfin, si elle s'étend davantage, on voit manquer les parois du thorax, celles de l'abdomen, les muscles des membres inférieurs & diverses parties des pieds, &c.

« La destruction de ces diverses parties du corps, savoir, des sens & des muscles, est dans un rapport admirable par sa constance & sa régularité avec l'absence plus ou moins étendue des centres nerveux. Il est difficile de ne pas regarder celle-ci comme la cause de la première. Le rapport est un peu différent, mais non moins constant & régulier dans l'altération & la destruction des autres organes.

« Le cœur manquant dans tous les acéphales, quoique dans un assez grand nombre les parois de la poitrine persistent en grande partie ou en totalité même, cela exclut l'idée d'une destruction consécutive à son déplacement. Quelques observations même semblent indiquer positivement qu'il se détruit par atrophie. Son absence coïncidant toujours avec la destruction de la moelle allongée, & sa présence ayant été constatée dans des cas d'acéphalie incomplète, où la moelle allongée existait aussi que le nerf pneumogastrique, on doit considérer sa destruction, ainsi que celle des sens & des muscles, comme une conséquence de celle du centre d'où part son nerf, savoir, celle de la moelle allongée & du nerf de la huitième paire; il n'est pas probable aussi que dans une destruction très-étendue de la moelle, qui entraîne la destruction des parois du thorax, la destruction ne puisse dépendre de son déplacement.

« Il est difficile de trouver la loi à laquelle se rattache la destruction des poumons & la manœuvre dont elle s'effectue. Est-elle par l'absence du nerf de la huitième paire, ou bien est-elle par celle du cœur, qui en est la conséquence, ou le poumon se détruit, & dans l'un comme dans l'autre cas il se détruit par atrophie.

• bien est-ce par la destruction des parois & par le déplacement qu'il disparoit? Cette dernière cause n'est pas la vraie, car on l'a trouvée dans des cas où les parois étoient entières : on l'a même vu exister dans des cas où il n'y avoit pas de cœur; ce qui indique, d'une part, qu'il peut exister sans cet organe, & d'un autre côté, que les causes qui produisent l'absence de cœur, n'agissent pas nécessairement sur les poumons.

• Il n'est pas de même du foie & de la rate : leur absence coïncide si constamment avec celle du cœur, dans des cas même où les parois de la poitrine sont entières, & même aussi dans des cas où le cœur manquant, la moelle allongée n'est pas sensiblement altérée, qu'on peut regarder leur absence comme une conséquence de celle de cœur; & si, dans ces cas, l'on ne rencontre ordinairement quelques autres glandes dans l'abdomen & dans le bassin, l'on seroit tenté de rattacher ce fait à la loi générale d'anatomie comparée des animaux, d'après laquelle on peut conclure, *a priori*, de l'absence du cœur à celle de tout organe sécrétaire glanduleux.

• Faute de descriptions exactes, il est difficile de dire si l'absence de l'ellomac coïncide avec celle du nerf de la huitième paire seulement, ou avec celle d'une partie plus ou moins longue de la moelle épinière en général; c'est suivant cette dernière loi qu'on voit en général manquer les diverses parties du canal intestinal, les organes urinaires & les organes génitaux, sans qu'ils paroissent liés à un point déterminé de la moelle, si ce n'est à ce point plus ou moins élevé relativement à leur propre situation, & sous ce rapport le testicule & l'ovaire paroissent liés à un point de la moelle aussi élevé que celui qui est inséré sur le rein, plus élevé que celui qui régit la fin du canal intestinal, la vessie & les autres organes génitaux. Elles suivent, d'après les faits qui commencent ce Mémoire, du moins dans divers autres cas de difformité, l'ordre occasion de voir la difformité attaquer tout un côté du corps, & le rein & le testicule participer aux effets de l'influence latérale. Cette observation semble indiquer l'action d'un organe pair comme les centres nerveux.

• Outre les altérations communes à tout le corps, que l'on rencontre dans les membres inférieurs comme ailleurs, & qui portent surtout sur les muscles, & beaucoup moins sur les os & sur la peau, on rencontre souvent dans les pieds des difformités particulières, qui sont : 1°. la kylose interne ou le pied-bot en dedans 2°. des mutilations plus ou moins étendues. Elles se rattachent très-bien à la même cause que les autres phénomènes. La kylose interne, très-fréquente chez les enfans qui ne sont point acéphales, dépend toujours chez eux d'un affaiblissement de l'action nerveuse & d'affaiblissement qui, quand il est général, se manifeste, comme on le fait,

• principalement dans les nerfs postérieurs du tronc & des membres inférieurs, & dans les muscles auxquels ils donnent l'irritabilité. Cet affaiblissement ne doit point surprendre lorsqu'il ne se passe qu'une partie plus ou moins altérée de la moelle épinière. Quant aux mutilations des oreilles, elles s'expliquent & par la diminution de l'action nerveuse, qui doit être plus marquée dans les parties qui reçoivent le plus de nerfs, & par la diminution de la circulation, qui doit surtout le faire sentir sur les parties les plus éloignées du centre.

Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, tom. V, pag. 502 & suivantes.

(L. J. MOREAU DE LA SARTHE.)

MONSTRUOSITÉ. (Médecine légale.) L'application des notions renfermées dans l'article précédent, la conséquence directe mais suffisamment étendue de ces notions, feroient sans doute pour répondre à toutes les questions, pour éclaircir toutes les difficultés sur lesquelles les médecins pourroient être consultés, relativement aux monstres considérés sous le point de vue de la médecine légale; toutefois nous croyons devoir consacrer quelques remarques à cette application particulière, & dans ce dessein nous avons jugé convenable d'employer l'article MONSTRE (*médicine légale*), publié dans la grande Encyclopédie par Lussolte, moins connu peut-être, mais non moins estimable que Loois, & qui mérite également d'être regardé comme le promoteur des travaux dont la médecine légale a été l'objet en France, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.

• Si jamais le pyrrhonisme fut utile dans une question physique, c'est sans doute dans celle qui considère l'existence & l'origine des monstres. A ne considérer que l'immense variété des faits ou des histoires rapportées par une foule d'auteurs, on seroit tenté de croire qu'il n'y a point de limite entre les espèces les plus difformables; que les règnes de la nature se confondent, & que l'ordre primitif est souvent perverti par les pures combinaisons du hasard. (Bartholin, Licetus, Paré, Zacchius, Rivière, &c., les Recueils des journaux ou de quelques Académies.) On assure qu'il est sorti des hommes bien formés du sein de différents animaux (1) (Bartholin, *Hist. anat.*, cent. V; Schenckius, *Hist. monstros.*; Elian, de *Animal. miscell. natur. curios.*; Licetus, de *Monstr.*; Gaspar a Reies, *Carpus vryus futund. quæst.*), & réciproquement on a vu des animaux plus ou moins difformes, & même très-combus & bien caractérisés, engendrés par des femmes (2): On a poussé le ridicule jusqu'à rechercher les causes

(1) Bartholin, *Hist. anat.*, loc.

(2) Salsgar Vande-Wiel, *Observat. rarior.*

Paulini, *Observat. physic. med.*

Paré, *Rivière, Observat. medicæ*, cent. 2.

physique

physiques ou surnaturelles de ces prétendues productions; & ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que l'on a souvent abusé des bûchers pour exterminer les malheureux que l'opinion publique, si souvent téméraire & cruelle, déclaroit auteurs d'une chose impossible. Le désir superstitieux de ces temps de barbarie rendoit tout possible par l'entremise des démons; & de graves ignotans, qui le croyoient physiciens, accumuloient les disquisitions & les preuves pour expliquer comment la chose s'étoit faite. Grâce aux connoissances des derniers siècles, nous ne voyons plus, depuis long-temps, ces scènes absurdes & sanginales; mais si nos progrès vers l'équité & l'humanité sont avancés sur cet objet, il faut avouer que la raison qui les dirige élit bien lente à pénétrer dans les esprits. Il ne faudroit pas remonter bien haut pour trouver des exemples de cette crédulité qui précédoit à tant de meurtres. Il n'y a pas long-temps qu'une femme fit croire à un médecin de réputation, que sa sœur étoit accouchée d'un poisson. *Raderer, Dissertat. couronné, à Pétersbourg.*

« Ce n'est pas du détail de ces absurdités que je prétends grossir cet article; je ne considère sous le nom d'*accouchemens monstrueux*, que ces productions qui s'écartent plus ou moins de la forme ordinaire de l'homme, tant qu'elles présentent une organisation qui se rapproche en partie de celle de l'espèce humaine, & qu'elles ont vie. On sent bien que je suppose ici la ressemblance qui se trouve dans les parties extérieures, car l'organisation des viscères nous est commune avec plusieurs animaux.

« Toutes les parties du corps peuvent être mutilées ou défigurées au point de ne présenter aucune ressemblance à leur état ordinaire. Le volume, le nombre, la situation & la conformation des organes souffrent des variétés qu'il est impossible d'assigner, & c'est par de bonnes observations bien constatées, que nous savons qu'il existe des exemples de productions monstrueuses; il n'est personne qui n'ait vu des fœtus ou des accouchemens monstrueux; les *Mémoires de l'Académie des sciences* en présentent mille exemples, & les meilleurs journaux en rapportent assez souvent. Les organes intérieurs destinés aux principales fonctions de la vie ne sont pas à l'abri des vicissitudes qui déforment l'extérieur. Le cerveau, le cœur, les poulmons & les autres viscères, varient par le siège, le nombre ou le volume; & l'on peut même ajouter, sans craindre d'exagérer, que la même variété qui s'observe dans la proportion des membres & la disposition des traits dans chaque individu, peut encore s'observer dans la conformation ou l'arrangement de ses parties intérieures. M. Engenbard, fameux médecin de Paris, n'a-t-il pas senti le battement du cœur d'un malade dans l'Hôtel-Dieu; & l'ayant quitté après en avoir témoigné un mauvais pronostic, un garçon chirurgien courut après lui, & dit qu'il

MÉDECINE. Tome X.

venoit de trouver le battement, non pas sous la mamelle gauche, mais sous la droite. (Winflow, *Mém.* de 1743.) J'ai vu la position de l'estomac varier considérablement sur différentes personnes. Tout le monde connoît la variété de la division des vaisseaux de quelques muscles; la multiplication ou la diminution des côtes, quelquefois des vertèbres, &c. Ces différens jeux de la nature ont souvent arrêté les physiciens les plus éclairés; lorsqu'ils ont voulu en rechercher la cause & nous ne sommes pas vraisemblablement sur le point de pénétrer encore ce mystère. Nous connoissons une foule de causes accidentelles qui peuvent s'opposer aux développemens de l'embryon, qui peuvent en défigurer les parties; mais la réunion partielle de deux embryons à la fois, la duplication de quelques organes seulement, tandis que tout le reste élit dans l'état naturel, présentent des difficultés insurmontables lorsque l'on veut les expliquer par la même voie. L'insuffisance des causes accidentelles a fait penser à quelques physiciens anatomistes, que le germe de ces derniers monstres étoit primitivement formé, & qu'il se développoit par le même mécanisme qui développe les germes ordinaires. Du Verney fut le premier qui conçut cette idée hardie, d'un germe monstrueux préexistant. Winflow, dont l'exaltitude & l'habileté sont si connues, adopta son opinion, & combattit long-temps Lemery, qui tenoit que le fœtus monstrueux ne devenoit tel, que par les accidens qui lui arrivent dans le sein de la mère. (Voyez les *Mémoires de l'Académie des sciences*, années 1738, 1740, 1743 & 1745.)

« L'opinion des germes primitivement monstrueux (dit de Mailran), tranche tout d'un coup la difficulté peut-être insurmontable, de concevoir que les débris de deux corps organisés & composés de mille millions de parties organisées, puissent en produire un troisième par cette voie. Mais l'opinion commune a aussi cet avantage, que ceux qui la regrettoient sont contraincts d'avouer qu'il y a des monstres & des parties monstrueuses dont la formation est visiblement due à un contact accidentel, ou que du moins on explique assez heureusement par-là, & sans remonter jusqu'à l'œuf. Les plantes en fournissent encore des exemples, & c'est ici que l'analogie, en faveur du système des accidens, élit portée par Lemery au plus haut degré de vraisemblance dont elle étoit susceptible.

« Laissons les savans se combattre sur les explications des phénomènes naturels; & en attendant que du choc des opinions il résulte, s'il se peut, quelque lueur qui nous éclaire, bornons-nous à l'examen des conséquences qui découlent de l'observation, & qui ont quelques rapports à la justification.

« Presque tous les auteurs de jurisprudence médicale qui ont parlé des monstres, s'accordent

Et

l'humanité qu'à ceux qui ont une tête qui présente une forme humaine; la mutilation des autres parties; leur nombre ou leur conformation extraordinaire, ne suffisent pas, selon eux, pour les déclarer indignes de la qualité d'animaux raisonnables, pourvu néanmoins qu'on aperçoive une ressemblance frappante quant à la tête. Il en est encore dans ce nombre, qui n'entendent pas cette grâce si loin, car ils refusent d'associer à l'espèce humaine les individus monstrueux qui, n'ayant d'humain que la tête ou le visage, se rapprochent par la conformation de quelques autres parties de différentes espèces d'animaux. La grande raison des premiers, c'est que le siège de l'âme étant dans la tête, il est clair que ceux qui sont sans tête, ne jouissent point de la prérogative accordée à l'homme, & que d'ailleurs, si l'on suppose qu'ils ont une tête, & qu'elle ne ressemble en rien à celle de l'homme, il n'est pas probable qu'une âme raisonnable & pensante soit dégradée au point d'être unie à un individu si différent de nous. La divine Providence sensible, selon les derniers, se refuse à cette allocation; & par une pitié de principe bien commune, ils concluent qu'il ne seroit pas digne de la bonté, d'unir une âme faite à son image, avec un corps si difforme, & conséquemment que de pareilles monstres ne fassent point hommes.

Il est aisé de sentir le vide & l'inconséquence de ces raisonnemens. Personne ne conteste que l'âme immatérielle dont l'existence est prouvée par la raison, & surtout par la révélation, ne soit le moyen de distinction entre l'homme & les bêtes: mais a-t-on dit ce qu'étoit l'âme? peut-on donner des idées claires au point de ne pouvoir se méprendre? Si nous admettons que les opérations auxquelles elle préside fussent pour l'annoncer, ne sera-t-on pas forcé de convenir que dans un homme qui vient de naître, ces opérations sont encore trop obscures, & qu'il n'y a rien dans ce moment qui le distingue des autres animaux? Supposons même que ces raisons ne fussent pas pour détruire un des principaux argumens, quel est le siège de cette âme? est-on bien d'accord sur le lieu ou la partie du corps qu'elle habite? Les uns la font résider dans le corps calleux; d'autres dans la glande pinéale; plusieurs la mettent dans le cœur & la font circuler avec le sang; d'autres, peut-être plus raisonnables ou mieux fondés, la placent dans le centre épigastrique ou vers le diaphragme; enfin, l'ellomac & les organes des sens ont été successivement regardés comme le point de réunion vers lequel toutes les sensations alloient aboutir. Les uns & les autres s'appuient sur des raisonnemens plausibles, sur l'observation, sur l'expérience; est-on en droit, dans cette incertitude, d'affirmer dogmatiquement que l'âme doit être dans la tête, & qu'elle manque dans un individu sans tête? N'est-il pas vraisemblable (puisque elle est indivisible, qu'elle s'étend toute en-

tière partout) de croire qu'elle ne manque qu'avec la vie, & que tant que cet individu est vivant, il a comme nous, une âme immatérielle, puisqu'il la tire d'une même source? Qu'importe la forme extérieure dans cette question? Trouve-t-on deux individus qui se ressemblent parfaitement en tout? On ne s'est pas encore avisé de nier que les géans, les nains, que les triorchides, monorchides, amorphes, que ceux qui ont deux corps, deux têtes ou plusieurs membres, que ceux qui naissent sans pieds, sans mains, &c., fussent privés d'une âme, parce qu'ils ne nous ressemblent pas parfaitement. Quelle prodigieuse distance de l'Européen à l'Africain, de celui-ci au Japonais aux Esquimaux! Nous ignorons jusqu'où peuvent se porter les variétés de la nature; sa fécondité est insaisissable à cet égard, & des millions de circonstances ignorées peuvent rendre les individus d'un même genre entièrement méconnaissables. Nous n'avons que l'observation & l'expérience pour dévoiler ces obscurités; tout autre guide est infidèle, & notre imagination, qui s'impatiente de la lenteur de nos progrès, est le plus grand ennemi que les sciences aient à combattre. *Homo naturae minister & interpreter, tantum fuit & intellegit, quantum de ordine naturae opere vel mente observavit, nec amplius fecit aut potest.* (Bacon.)

N'est-il pas téméraire d'intéresser la sagesse de Dieu pour des choses de controverse? Peut-on se flatter de pénétrer dans ses vnes? & peut-on demander une preuve plus positive de la volonté, que l'origine humaine de ces êtres si dissimilables de l'homme ou apparence? Respectons les décrets de la Providence, & en humiliant notre faible raison qui ne peut le concevoir, imitons la retenue de l'Eglise, qui accorde à ces êtres le privilège du baptême, sous condition.

Un enfant monstrueux qui a vie, peut donc, d'après ces considérations, jouir des privilèges que la loi accorde à tout citoyen; il a droit de réclamer en sa faveur la protection qu'elle accorde à l'homme faible. Il peut donc hériter & faire valoir toutes les dispositions testamentaires qui s'opposeroient à ce droit. Sa vie est un dépôt contre lequel on ne peut attenter sans crime; & s'il parvient à l'âge où les lois conviennent qu'il peut prêter serment ou expliquer ses volontés, je ne vois pas, ce qui pourroit s'opposer à ce qu'elles fussent exécutées. Il suit encore que la mère de cet enfant doit jouir des privilèges attachés à l'enfantement; ce droit est plus clair (s'il est possible) que celui de la progéniture.

L'organisation difforme d'un enfant monstrueux, la rend cependant moins propre à remplir certains devoirs de la société que le commun des hommes; aussi les lois qui l'écartent de l'emploi public & quelquefois du mariage, n'ont rien d'insulte, puisqu'elles n'ont pu prévenir la cause de son incapacité, & que le bien général de la société est leur

premier objet. (*Article de M. Lafosse, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier.*)

(L. J. M.)

MONTAGNANA (Barthélemi). Il y a eu plusieurs Montagnana, dont celui-ci professa la médecine à Padoue, sa patrie, en 1446. Il a laissé l'ouvrage suivant :

Selectionum operum, in quibus ejusdem confilia, varique tractatus alii, tum proprii, tum astituti, continentur, liber unus & alter. Venet. 1497, 1567, in-fol. Lundg. 1530, in-4°. Francf. 1604, in-fol. Noriberge, 1652, in-fol.

(R. GROSSIOT.)

MONTAGNE, f. f. *Mont*. Éminence plus ou moins considérable, ou partie saillante du globe, qui s'élève plus ou moins au-dessus des terrains contigus & domine les contrées voisines.

Les diverses prominences dont la surface du globe est irrégulièrement bécillée, & auxquelles on donne le nom de *montagnes*, s'élèvent à des hauteurs plus ou moins grandes au-dessus du niveau de la mer. Leurs flancs, quelquefois à pic, le plus souvent inclinés, sont diversement exposés aux aspects du soleil : elles présentent des pointes plus ou moins saillantes, des crêtes plus ou moins aiguës, de larges plateaux, des gorges, des enfoncements, des déchirures, des cavités, des bassins ; elles sont parsemées de sources, sillonnées par des ruisseaux & traversées par des rivières ou par des torrents. D'énormes masses de glaces amoncées par les siècles, gisent éternellement sur leurs sommets les plus élevés ; des neiges temporaires & annuelles recouvrent périodiquement leurs flancs, & par leur fonte régulière, deviennent la source intarissable des rivières qui vont fertiliser les plaines, & des fleuves qui resistent sans cesse à l'Océan l'immense quantité d'eau qui lui est sans cesse enlevée par l'évaporation. Enfin, de tous les points de l'horizon, les montagnes attirent sans cesse les nuages qui, avec des échanges continuels d'électricité, y apportent la grêle & le tonnerre, & qui parfois le précipitent avec fracas dans leurs anfractuosités, y versent des torrents de pluie & y développent les vents, les orages & les tempêtes.

Les géologues divisent les montagnes en *primaires* & en *secondaires* ; les premières ont une structure généralement homogène : elles sont composées de granits, de porphyres, de marbres aussi anciens que la terre, & autres roches primitives, contemporaines de la formation du globe. En s'unissant entr'elles, elles forment de vastes chaînes qui traversent les continents en différents sens ; elles sont souvent escarpées, s'élèvent à de grandes hauteurs & se terminent par des rochers nus & arides qui projettent dans l'atmosphère leurs pointes & leurs crêtes dépourvues. Les montagnes secondaires, ainsi nommées parce qu'elles sont d'une origine postérieure à celle du globe, ont une structure

hétérogène ; elles sont composées de matières calcaires, ichthyales, carbonées & sulfureuses, de pierres-ponce, de laves, de grès, de trapp & autres substances diverses, soit irrégulièrement entassées, soit disposées en couches régulières & superposées, dans lesquelles on trouve les débris de toutes sortes de corps organisés ; elles sont parfois isolées, le plus souvent groupées d'une manière irrégulière, aux pieds des montagnes primitives ; jamais elles ne forment de chaînes comme ces dernières, & leur élévation est constamment beaucoup moins grande.

Ces parties saillantes de la terre sont considérées par les géographes sous le point de vue de leur situation & de leurs rapports, soit entr'elles, soit avec les autres parties du globe. Les naturalistes les étudient relativement aux minéraux, aux fossiles qu'elles renferment, & aux productions, soit végétales, soit animales, qui s'y développent ; enfin, sous le rapport des nombreux phénomènes météoriques dont elles sont le théâtre, elles fixent spécialement l'attention des physiciens. Pour nous, qui dans nos études avons constamment l'homme pour objet, nous devons envisager les montagnes sous le rapport de l'influence qu'elles exercent sur l'économie animale, & principalement sur la vie & sur la santé.

De tous temps, les naturalistes, les médecins & les voyageurs ont signalé la bonne constitution, la structure vigoureuse, la force, l'énergie & l'agilité des montagnards. Leur tempérament, dans lequel on trouve toutes les modifications organiques compatibles avec la prédominance du cœur & des vaisseaux sanguins ; la facilité & la régularité avec lesquelles s'exercent toutes leurs fonctions ; la vivacité de leurs mouvements, l'activité de leurs sensations, la rectitude de leurs facultés intellectuelles, ainsi que l'énergie de leurs passions, sont connues. La simplicité de leurs mœurs agrestes, leur gaieté, leur sobriété, leur industrie & leurs vertus hospitalières ne sont pas moins célèbres que leur cordialité & leur franchise, quelquefois voisine de la rudesse. Un caractère qui les distingue encore, & qui n'a point échappé aux observateurs, c'est leur attachement inviolable à leur pays, & leur ardent amour pour la liberté. Tels furent les anciens Spartiates, & tels sont encore de nos jours les modernes habitants de la Laconie, dont l'invincible persévérance & le courage héroïque n'ont jamais pu être domptés par les féroces Mafulmans ; tels sont encore parmi nous, les Suisses, les Biscayens, les Écossais, les Irlandais & autres peuples qui n'ont jamais subi complètement le joug de la servitude, ou qui ont su du moins conserver quelques vestiges de leur liberté, malgré la force, l'astuce, la perfidie & tous les moyens de corruption qui ont été sans cesse dirigés contre eux. Or, la source de toutes ces qualités propres aux montagnards doit être recherchée naturellement dans les conditions phy-

riques, sous l'influence desquelles ils sont placés au sein des montagnes, & plus particulièrement, 1°. à la pureté de l'air qu'on y respire; 2°. à la température qui y règne; 3°. aux phénomènes hygrométriques auxquels on y est exposé; 4°. à l'état électrique qu'on y éprouve; 5°. aux aspects solaires; 6°. enfin, aux impressions diverses qu'on y reçoit.

La pureté de l'air des montagnes est connue; de tous temps elle a été chantée par les poètes & constatée par les physiciens. Il n'y a pas de doute qu'elle ne soit une des principales causes de la salubrité des lieux élevés. Ce n'est pas que l'oxygène, ainsi que quelques chimistes l'ont supposé, soit plus abondant dans les couches supérieures de l'atmosphère, que dans les couches inférieures. D'après les expériences positives de MM. de Humboldt & Gay-Lussac, l'air atmosphérique, quelle que soit la hauteur à laquelle on le prenne, contient les mêmes proportions de gaz oxygène et de gaz azote. Mais en s'élevant au-dessus du niveau de la mer, les montagnes s'éloignent nécessairement dans le même rapport, des matières pulvérolentes, des vapeurs aqueuses, des gaz, des substances odorantes, des exhalaisons, des miasmes & de toutes les émanations diverses qui se dégagent sans cesse de la surface de la terre, du sein des eaux, des nombreux produits des arts ou de l'industrie, & de cette innumérable multitude de végétaux & d'animaux qui vivent, meurent & se décomposent continuellement sur le globe. Toutes ces exhalaisons minérales, végétales & animales, toutes ces émanations, soit pondérables, soit impondérables, cette foule de substances solides, liquides ou gazeuses, ne s'élèvent en effet, pour l'ordinaire, qu'à une faible hauteur; souvent même elles ne dépassent pas les couches les plus inférieures de l'atmosphère. C'est ainsi que les brouillards épais & plus ou moins irritants qui enveloppent souvent Paris, surtout en automne, restent ordinairement au-dessous de la coupole du Panthéon, dont la hauteur n'est que de soixante-dix-neuf mètres au-dessus du niveau de la mer; les nuées de poussière & de sable pénétrant qui parfois obscurcissent l'air & menacent de suffoquer les voyageurs dans les vallées désertes de l'Afrique & dans certaines plaines arides, dépourvues de végétaux, ne s'élèvent pas à une plus grande hauteur. Les miasmes délétères qui, dans la saison des chaleurs, se dégagent des parties basses & fangeuses du littoral de l'Amérique & des Antilles, & deviennent la source de la fièvre jaune, n'atteignent point à la hauteur des monts ou montagnes les plus voisines; de sorte que, suivant la remarque des observateurs, les individus qui y habitent ou qui s'y réfugièrent, sont exempts de cette terrible maladie (à moins qu'elle n'y soit introduite par des objets infectés); lors même qu'elle fait les plus grands ravages dans les plaines environnantes. On fait enfin que les fièvres intermittentes, généralement

endémiques dans les contrées marécageuses de l'Europe, sont extrêmement rares sur les montagnes. Or, cette circonstance tient indubitablement à ce que les exhalaisons impondérables auxquelles elles sont dues, restent dans les couches inférieures de l'atmosphère, sans jamais s'élever jusqu'à la hauteur des montagnes, dont l'air conserve ainsi toute sa pureté & toute sa salubrité. On objectera peut-être que les fièvres dont je parle, ne sont point aussi rares sur les montagnes que je le prétends. Mais je ferai remarquer que si elles le manifestent en effet dans les montagnes, ce n'est jamais que dans les gorges & dans les vallées profondes, où la stagnation des eaux, le défaut de ventilation & l'influence des ombres épaisses qu'y projettent sans cesse les pics & les crêtes environnantes, placent les hommes dans des conditions analogues à celles dans lesquelles se trouvent les habitants des contrées humides & marécageuses, & qu'on ne les rencontre réellement point sur les coteaux, les flancs découverts & les parties élevées des montagnes, où nous reconnaissons seulement les circonstances de salubrité dont il est question.

La différence de température des montagnes & de celle des lieux voisins, est encore une des causes de leur influence les plus dignes de fixer l'attention des médecins. On sait que l'atmosphère reçoit sa température du globe qu'elle enveloppe & des vapeurs qui sont suspendues dans son sein, lesquelles, ainsi que nous venons de le voir, se bornent aux couches inférieures de l'air. Or, il résulte de cette double circonstance, que la température s'abaisse, & par conséquent que la chaleur diminue à mesure qu'on s'élève; aussi, à la même latitude, & toutes choses égales d'ailleurs, la température à laquelle on est exposé sur les montagnes, est constamment inférieure à celle qu'on éprouve dans les plaines. C'est ce qui fait que, dans les saisons les plus chaudes & dans les contrées les plus brûlantes, il règne une fraîcheur délicieuse, souvent même un froid très-intensif sur des montagnes même d'une hauteur médiocre; & que ces prominenances terrestres qui mettent à l'abri des exhalaisons malfaisantes, offrent en même temps un asile assuré contre les ardeurs du climat & de la saison.

En général, le froid des montagnes est proportionné au degré de leur élévation; de sorte que celui qui règne sur celles qui sont le plus élevées, est tel que les neiges n'y fondent jamais; l'hiver y règne perpétuellement dans toute sa rigueur; la végétation y est entravée, la vie des animaux suspendue, tous les mouvements organiques s'y arrêtent en quelque sorte; & lorsque la curiosité & l'activité indomptable de l'homme le portent à visiter ce séjour éternel de frimas, il n'y trouve que le néant & l'effrayant silence de la mort. Cependant cette température des montagnes est modifiée, comme nous le verrons bientôt, par la diversité des aspects ou expositions solaires, & sur-

font par la latitude à laquelle elles sont situées. C'est ainsi que sous l'équateur, la limite inférieure des neiges perpétuelles se trouve à 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis qu'à la latitude de 20°, elle n'est que de 4000 mètres; à 45°, de 3500 mètres, & seulement de 1500 mètres à la latitude de 65°.

L'état hygrométrique de l'air des montagnes est encore un des éléments de l'influence qu'elles exercent sur l'organisation de l'homme. Par suite de leur inclination toujours plus ou moins favorable à l'écoulement rapide des eaux, le sol des montagnes, abstraction faite de sa structure géologique & de sa composition chimique, est toujours beaucoup plus sec, toutes choses égales d'ailleurs, que celui des plaines. Sous ce rapport on y est plongé dans une atmosphère naturellement plus ou moins sèche, puisque son hygrométrie dépend en grande partie de celle du sol. Toutefois cette siccité est souvent détruite par la fonte des neiges, par la fréquence des orages & par la grande quantité d'eau qu'y versent, sous toutes les formes, les nuages sans cesse attirés par elles; de sorte que, plus que partout ailleurs, on est exposé sur les montagnes, à de fréquentes alternatives de sec & d'humidité, & à de grandes & rapides vicissitudes sous ce rapport. Or, ces fréquentes changements & ces grandes variations hygrométriques que nous offrent les montagnes, fort favorables à beaucoup d'égards aux hommes robustes; aller exercez fréquemment, & dans une grande latitude, leur force de résistance, & par-là concourent à donner en quelque sorte une trempe plus vigoureuse à leur constitution; mais ils sont généralement défavorables aux sujets faibles & délicats, dont la force de résistance ne peut s'élever à la hauteur de l'influence de semblables vicissitudes, & qui, par cette raison, y peuvent souvent le principe de diverses maladies, telles que les rhumatismes & les affections catarrhales. Peut-être aussi sont-ils la principale source des scrophules; du goître & du crétinisme, qu'on attribue mal-à-propos à l'usage de l'eau de neige pour boisson.

Ces considérations s'appliquent spécialement aux parties découvertes des montagnes, & à celles qui sont pleinement exposées aux vents & à l'influence de la lumière solaire. À l'égard de celles de leurs parties qui manquent de cette dernière condition, & surtout relativement aux vallées étroites & aux anfractuosités profondes où l'air est toujours humide & stagnant, & cause du séjour des eaux d'une part, & par le défaut de ventilation de l'autre, il y règne une humidité permanente qui, associée parfois à une excessive chaleur, & le plus souvent au défaut d'insolation, amène à la longue l'altération profonde de la constitution, l'engorgement des glandes lymphatiques, des fièvres intermittentes rebelles, des empalements ou phlegmasies chroniques de l'abdomen, des scrophules, la leucophtalmie, les goîtres, le crétinisme, une vieillesse précoce; & autres désordres organiques qui règnent endémiquement dans les vallées & dans les gorges des Alpes & des Pyrénées.

Une circonstance non moins susceptible d'agir sur l'économie animale, & qui ne concourt pas moins que celle que nous venons d'examiner, à l'influence que les montagnes exercent sur la santé & les maladies; c'est l'électricité. Sans celle développée sur les montagnes par le frottement des nuages qui s'y précipitent de tous les points de l'horizon; à chaque instant prise en feu par les fréquentes vicissitudes du chaud & du froid, du sec & de l'humidité qui s'y manifestent, surtout par les décharges, soit insensibles, soit foudroyantes des nuages; les courants électriques auxquels elle donne lieu, à une certaine hauteur qui n'est autre chose que celle des nuages elle-même, exposent souvent à tous les dangers de la foudre. Cependant on peut dire au-delà de cette hauteur, loin d'avoir à redouter un semblable inconvénient, on n'est exposé qu'à un léger excès d'électricité qui, à raison de l'excitation modérée qu'il en résulte dans l'économie animale, a généralement des effets salutaires. Dans l'état le plus ordinaire, cette excitation, en effet, augmente modérément l'action des organes, régularise toutes nos fonctions, facilite les mouvements vitaux, concourt à rendre plus vif le sentiment de l'existence, & paroit conséquemment une cause de calme, de bien-être & de la gaieté, qui caractérisent la santé, & que la plupart des hommes éprouvent sur les montagnes.

Toutefois leur influence sur le corps de l'homme dépend en outre de la diversité des aspects solaires, on, ce qui revient au même, de l'exposition des lieux & du degré de leur insolation. Sous ce rapport il existe une différence totale entre le revers nord & le revers sud de la même montagne. À la même latitude, au même degré d'élévation perpendiculaire, le côté sud étant sans cesse exposé aux rayons solaires, la végétation y est plus variée & plus vigoureuse; les animaux y sont mieux développés, plus grands, plus forts & plus vigoureux; une bonne constitution, la beauté des formes, l'éclat du teint, une grande fécondité, la longévité, & tous les attributs de la santé & de la vigueur, y caractérisent l'espèce humaine. En un mot, on y retrouve toutes les qualités physiques & morales qui sont propres aux montagnards. Les revers septentrionaux, au contraire, où l'ombre, l'humidité & le froid règnent constamment à la place de la lumière, du sec & de la chaleur, se présentent qu'un sol stérile, des végétaux rabougris, des plantes sans saveur, sans arôme & peu colorées; la population clair-semée y est en proie à la malpropreté, à la misère; les hommes pâles & blafards y vivent dans l'incertitude, & sont plongés dans la paresse & dans les vices qui en sont la suite. Les femmes flâques & d'un visage triste, y sont peu fécondes; leurs couches

sont disséminés & souvent accompagnés d'accidens; les rudes de la vieillesse y montrent en quelque sorte dès le printemps de la vie; l'espece humaine y dégénère rapidement, & y est constamment en proie aux fièvres intermittentes rebelles, aux engorgemens du foie & de la rate, aux catarrhes chroniques, à la leucopneumonie, aux scrophules & au dégoutant crétinisme.

La même différence existe entre les flancs & les pyramides découvertes des montagnes & leurs enfoncemens ou anfractuosités, dont se composent les gorges & les vallées. C'est là particulièrement que l'accumulation des eaux qui résultent de la fonte des neiges, la stagnation de l'atmosphère due au défaut de courant d'air, & à l'épaisseur des ombres qu'y projettent les hautes chaînes qui les entourent, font régner endémiquement, & dans toute leur force, toutes les maladies que nous venons d'indiquer, & dont le voyageur est affligé de rencontrer des traces profondes sur presque tous les individus qui frappent sa vue dans les tristes villages du Valais & de la Savoie. D'un autre côté, lorsque, pendant l'été, le soleil est au zénith, les rayons plongent perpendiculairement dans la profondeur de ces éternelles vallées, ou élèvent momentanément, au milieu du jour, la température à une hauteur prodigieuse. Or, ce passage journalier, pendant l'été, de la chaleur excessive du milieu du jour, au froid ris de soir & de la nuit, contribue encore puissamment à produire le relâchement de tous les tissus, à produire le scorbut, le rachitisme, l'idiotisme, des hydrocéphales, & toutes sortes de vices de conformation; il dispose en outre aux irritations mequanes, aux phlegmasies gastro-intestinales & putrides ou adynamiques qui ravagent trop souvent ces parties insalubres des montagnes, dont nulle part encore les misérables habitans n'ont joui, sous ce rapport, des bienfaits de la civilisation. Cependant, si jamais les nations consentent à employer à des choses utiles à l'humanité & à l'amélioration de leur état physique & moral, les efforts & les dépenses qui, jusqu'à ce jour, ont été appliquées uniquement à leur destruction réciproque, & si les conducteurs des peuples remplacent un jour leurs guerres sanguinaires & insensées par les paisibles & glorieuses conquêtes du génie de l'homme sur la nature, on doit espérer que le premier & un des plus utiles résultats de ce changement seroit l'affaiblissement de ces contrées & l'amélioration physique de leurs tristes habitans.

D'après ce qui vient d'être dit, on peut apprécier à sa juste valeur l'opinion généralement répandue, suivant laquelle on attribue à l'eau de veige, dont les habitans des vallées font habituellement usage en boisson, les goitres, les engorgemens lymphatiques & le crétinisme qui y sont endémiques. Ces accidens, ainsi que la détérioration de l'espece, qui marchent de front, ne se rencontrent en effet sur les montagnes, que dans

les fonds, dans les gorges, dans les vallées profondes & sur les revers nord très-ombragés, où l'accumulation des eaux, le défaut de ventilation, la rareté de l'insolation & la présence habituelle de l'ombre condamnent la population à végéter à l'ombre dans une atmosphère non renouvelée, saturée d'humidité, & exposée aux vents opposés du froid & du chaud.

Il faut donc séparer les effets des montagnes, considérées comme lieux élevés, secs, vivement frappés par la lumière solaire & sans cesse battus par les vents, de ceux de leurs vallées & de leurs enfoncemens généralement sombres, humides, privés de ventilation, & dont l'air stagnante la nature de toutes sortes d'exhalaisons malsaines. Ces derniers sont la cause active de la plus déplorable détérioration de l'espece humaine, & d'une foule de maladies hideuses déjà plusieurs fois énumérées. Les autres, au contraire, constituent les conditions les plus favorables au parfait développement du corps & de ses facultés, & les plus utiles à la conservation & à la ressource de la santé.

Enfin, l'étude des impressions diverses & plus ou moins profondes que nous recevons, soit au physique, soit au moral, de cette multitude d'objets variés qui frappent à chaque instant nos sens, sur les montagnes, ne doit pas être négligée, si l'on veut apprécier avec exactitude les influences qu'elles sont susceptibles d'exercer sur nous. Le premier fait qui résulte de cette étude, c'est l'impression que les montagnes font à la longue sur les hommes qui les habitent. Soit que cette impression soit due aux accidens variés que la nature multiplie à l'infini dans les montagnes, accidentés, susceptibles, par leur nature, de frapper vivement l'imagination, soit qu'elle ait pour cause leurs masses imposantes, elle est tellement vive & tellement profonde, qu'elle se efface jamais. L'habitude de vivre en présence de ces imposantes parties du globe, au milieu de leurs effrayables rochers, sur les bords de leurs éboulemens précipices, semble lier notre existence à ces grands objets d'une manière tellement indissoluble, que que si nous venons à en être séparés, nous éprouvons un vide affreux, une langueur indéfinissable, une sorte d'impossibilité de vivre qui trouble toutes nos fonctions & porte le désordre dans tous nos organes, & semble atteindre le principe de la vie jusque dans sa source. Cette séparation agit sur nous à la manière de la frustration subite de tout stimulus qu'une longue habitude a rendu nécessaire à l'exercice de nos fonctions, & sans l'action auquel la vie ne peut continuer; lorsqu'elle a lieu, il en résulte la nobelie, de toutes les monomanies la plus terrible, puisque tous les sens influent le corps maigrit, le visage devient pâle, l'appétit se perd, toutes les fonctions s'affaiblissent, les forces musculaires se détruisent entièrement, les facultés intellectuelles s'oblitèrent, toutes les sécrétions se désolent, la fièvre hec-

tique survient, & le malade, parvenu rapidement au dernier degré de marasme, & consumé de tendres regrets, meurt les yeux tournés vers le pays qu'il ne doit plus revoir. Ce funeste délire, accompagné de consomption qui caractérise la noialgie, est beaucoup plus rare parmi les habitants des plaines & parmi les citadins, parce que les impressions variées qu'ils reçoivent d'une foule insombrable de petits objets, sont trop foibles & trop variables pour que leur cessation influe ordinairement, au moins d'une manière sensible, sur les phénomènes de la vie.

Si l'on considère ensuite les impressions qu'éprouvent sur les montagnes, ceux qui les gravissent pour la première fois, on obtient de nouveaux résultats également dignes d'attention. A mesure qu'on s'élève, sans dépasser toutefois les limites inférieures des neiges perpétuelles, la plupart de nos fonctions semblent acquiescer une nouvelle activité; l'appétit augmenté, la digestion se fait mieux, on éprouve même quelquefois la boulimie ou faim canive; la circulation devient plus fréquente, on respire plus librement, les mouvements musculaires s'exercent avec plus de facilité, nos sensations paroissent plus vives, & pour l'ordinaire nos idées acquiescent plus d'étendue, de force & de profondeur; nos pensées semblent s'agrandir, & s'étendre dans la proportion de la vaste étendue de l'horizon qui s'offre alors à la vue. Placés dans de nouveaux rapports avec les objets terrestres, nous ne les voyons plus avec les mêmes yeux; les provinces, les continents, les cités populeuses, les étonnans produits de l'industrie, les plus admirables momens des arts, tant de choses variées qui nous donnent habituellement une haute idée de la puissance humaine, nous semblent tout-à-coup déchus de leur grandeur passée, & ne nous paroissent que de simples atomes qui se dissipent avec un visible acharnement une multitude d'infestes éphémères: Tous ces grands travaux des peuples, ces expéditions lointaines, ces guerres, ces conquêtes, ces invasions, ces déconvoies, ces systèmes ingénieux, ces créations du génie, ces miracles des arts, tous ces intérêts forts, toutes les grandeurs humaines en un mot, s'abaissent devant la majesté immuable de la nature, & ne nous paroissent plus dignes que d'occuper une bien petite place dans l'économie de l'Univers. En nous dégageant des liens qui nous tiennent attachés à la terre, il semble que le séjour des montagnes calme les passions, épure le cœur, agrandit l'esprit, fortifie la raison, & que l'âme, rendue à elle-même, se remplit d'un sentiment religieux qui semble nous rapprocher du créateur, & nous inspire une sainte admiration pour l'impasable majesté de ses œuvres.

Aussi le séjour des montagnes doit-il être considéré comme un des plus puissans moyens dont la philosophie & la médecine puissent disposer, pour ramener le calme dans une âme oppressée par le

malheur, tourmentée par des passions furieuses ou déchirée par des regrets amers. Les maladies de l'âme ne sont cependant pas les seules causes pour lesquelles ce moyen soit un remède efficace. On l'emploie avec le plus grand avantage, & quelquefois même avec un succès inespéré, dans le traitement d'un grand nombre d'affections pathologiques contre lesquelles échoue la toute-puissance des drogues de la pharmacie. Mais c'est surtout contre les maladies chroniques & dans les affections nerveuses en particulier, que l'on peut en retirer de grands avantages.

En général, les voyages dans les montagnes sont très-salutaires aux individus d'un tempérament lymphatique, bilieux ou nerveux; aux personnes d'une constitution lâche, à celles qui sont surchargées de graisse ou disposées à l'obésité; ils sont extrêmement avantageux aux convalescens, aux sujets affaiblis par le vie sédentaire des études forcées & des travaux du cabinet. Ceux qui sont épuisés par l'abus des plaisirs éphémères, des veilles prolongées, des chagrins profonds ou des passions oppressives, en retirent le même avantage. On s'en trouve bien à la suite des maladies catarrhales de longue durée & après de longues suppurations. Chaque jour on voit le scorbut, les scrophules & des fièvres intermittentes rebelles, guérir radicalement par ce seul moyen, après avoir résisté opiniâtrement à toutes les méthodes curatives; mais c'est surtout dans l'hypocondrie, l'hystérie, la mélancolie & autres névroses pulmonaires, gastro-intestinales & génitales, que le séjour & les voyages dans les montagnes offrent un avantage précieux. Ils ne font point à beaucoup près aussi avantageux aux individus affectés de gonthe & de rhumatisme. La pureté extrême de l'air qu'on respire sur les montagnes, est plus nuisible qu'utile aux phthisiques, aux personnes disposées aux phlegmasies aiguës, aux hémorragies actives. On sait aussi que leur séjour est spécialement dangereux pour celles qui sont sujettes à l'hémoptysie.

Pour que les individus auxquels le séjour des montagnes est utile, puissent en retirer les avantages qu'ils ont droit d'en attendre, il ne faut pas qu'ils y apportent la mollesse & les mœurs efféminées de la ville. Il faut qu'ils renoncent à leurs habitudes sédentaires, à leur glotonnerie, à leurs excès accoutumés; il faut qu'ils y fassent usage de leurs bras & surtout de leurs jambes; qu'ils remplacent le luxe de leur table & leurs mets recherchés & succulents, par les alimens simples du montagnard, qu'ils imitent la sobriété, la tempérance, son activité modérée & la simplicité de ses mœurs agrestes.

Il est reconnu que les habitants des montagnes s'acclimatent plus difficilement que les autres hommes dans les contrées équatoriales. Transportés dans les climats chauds & humides, ils résistent beaucoup moins aux pernicieuses influences

que son climat exerceoit sur les Européens, que les habitans des plaines, & devenaient aussi beaucoup plus souvent que ces derniers, victimes de la fièvre jaune, du choléra-morbus, de la dysenterie, qui dévorent les étrangers dans les contrées brillantes de la zone torride. On a remarqué aussi qu'en Europe même, les montagnards transportés dans les lieux marécageux, à bord des vaisseaux, dans les hôpitaux & les prisons, y sont plus facilement affectés de fièvres intermittentes & de typhus, que les autres individus. Cette circonstance est due, sans doute, à ce que, habitués à vivre dans un air extrêmement pur & loin de toutes les causes d'insalubrité, leurs organes, doués d'une vive sensibilité, sont plus susceptibles que ceux des personnes qui sont dès long-temps accoutumées à l'action des émanations dangereuses, de recevoir l'impression des miasmes qui sont la source de ces maladies. Mais ce léger mouvement que présente le séjour des montagnes, est amplement compensé par les nombreux avantages que nous avons signalés.

Aussi ce sont les montagnes qui furent le berceau du genre humain; ce sont les montagnes qui, à l'époque des grandes inondations qui ont bouleversé la terre, ont servi d'asile aux hommes échappés à ces terribles catastrophes: c'est sur les montagnes que le corps de l'homme acquiert la beauté des formes, la force, la souplesse & la vigueur dont il est susceptible; que son tempérament se développe sans obstacle, que ses facultés prennent sans efforts la direction voulue par la nature; c'est là que la santé est aussi robuste que florissante; que l'homme, obligé de lutter sans cesse contre les vicissitudes atmosphériques, acquiert cette force de résistance qui le met à l'abri des maladies; qu'obligé de combattre sans cesse contre les éléments, sa voix devient sonore, son ouïe très-fine, sa vue étendue & pénétrante, & que tous les mouvemens acquièrent beaucoup d'exacitude, de force & de précision; c'est là que le travail assidu qu'exige un sol stérile, rend l'homme laborieux; que la nécessité de surmonter sans cesse de nouveaux obstacles, de braver de nouveaux dangers, le rend patient, actif & courageux; que la modicité des récoltes l'instruit à être sobre & économe, & que la nécessité de suppléer à leur insuffisance, le rend industrieux. C'est là que des besoins peu nombreux & faciles à satisfaire, rendent l'homme gai, doux, obligeant, ennemi de la servitude & hospitalier.

Enfin, tandis que l'aspect continuel de ces masses imposantes, antiques témoins des révolutions du globe, grave profondément dans l'âme des montagnards l'image chérie du pays natal; que la vaste étendue de l'immense tableau qu'elles déroulent aux pieds du voyageur, nous porte au recueillement, fortifie en nous le sentiment religieux & semblo nous rapprocher du créateur; la facilité que donnent les montagnes à leurs habitans,

pour résister à l'oppression, leur fait aimer l'indépendance, & les charmes d'une vie simple & d'une nature saine, âpre & sauvage, leur font chérir la liberté. (CHAMBERLAIN.)

MONTAIGU (Eaux minérales de). C'est une commune du Coteatin, à une lieue de Ville-Vieille. On y trouve dans une prairie qui appartient au château, une source minérale froide, que Polignière dit martiale. (MACQUART.)

MONTALBANI (Ovidio), médecin de Bologne, où il professa avec réputation pendant trente-deux ans. Ce savant s'étant beaucoup plus occupé de botanique que de médecine, nous ne donnerons point la notice de ses nombreux ouvrages. (R. GORRAIO.)

MONT-BOSC (Eaux minérales de). C'est une commune à trois lieues de Viré, qui a une source minérale froide, au milieu d'une bruyère, sur le revers de la montagne dite *Butte du Mont-Bosc*. On croit ces eaux ferrugineuses: on y a trouvé une terre rousse, du sel qui avoit une faveur de sel commun & un goût ferrugineux (Duclos, p. 129). Cette analyse est à refaire.

MONTBRISON (Eaux minérales de). Montbrison est la ville capitale du Forez. On y trouve trois sources minérales: 1^{re}, la romaine, voisine d'un ancien temple de Cérès; 2^{de}, celle de l'hôpital ou des ladres; 3^e, celle de la rivière, près du Vexize. Ces eaux sont froides. Richard de la Pèze, qui les examina en 1778, les regarde comme apéritives, résolatives, absorbantes & laxatives. (MACQUART.)

MONTBRUN (Eaux minérales de). Montbrun est un village situé à quatre lieues de Carpentras nord-nord-est; & à quatre nord-est de Saint-Satur-nin. Il y a près de ce lieu plusieurs sources d'eaux minérales froides, qui sourdent dans une petite plaine, au bas de la montagne. M. Empereur les dit purgatives, & a assuré qu'elles déposent du soufre dans tous les endroits où elles passent. (MACQUART.)

MONT-CENIS. (Voyez CAGLIOSOL.)

MONTCONTOUR (Eaux minérales de). Montcontour est une ville à cinq lieues sud-sud-ouest de Saint-Brieux; à quatre également de Lamballe, où se trouve une eau minérale nommée *boîte*, qui est froide, & qui sourde dans une prairie marécageuse, à une lieue de cette ville. On la croit légèrement martiale. (MACQUART.)

MONT-DAUPHIN (Eaux minérales de). C'est une ville de guerre, sur une montagne, à quatre lieues

heues d'Embrun, dont on fait seulement que les eaux sont tièdes & gazeuses. (Macquart.)

MONT-DE-MARSAN (Eaux minérales de). Situé à cent quatre-vingt-douze lieues de Paris : elles sont prises pour boisson, à la dose d'une pinte chaque matin, principalement dans les cas d'atonie gastrique, d'engorgement du foie ou de la rate, à la suite de certaines fièvres quartes; enfin dans l'altération de la sécrétion urinaire, qui est caractérisée par la présence de graviers dans l'urine. (Voyez la Dissertation de M. Beider, in-12, sur ces eaux. Bordeaux, 1750.) (M.)

MONT-D'OR (Baux minérales de). Ces eaux, qui sont assez souvent conseillées, & dont l'effet ne peut jamais être indifférent, ont été, au commencement de ce siècle, le sujet d'un excellent ouvrage publié par M. Bertrand, médecin du Gouvernement pour leur administration. C'est d'après l'expérience éclairée & les judicieuses observations de ce savant, que nous traiterons, de ces eaux d'une manière abrégée, & sous le point de vue qui convient à un simple dictionnaire.

La réputation des eaux du Mont-d'Or parait fort ancienne : un auteur qui écrivait à la fin du seizième siècle, a consacré quelques recherches à l'examen d'un monument dont quelques parties se retrouvent encore au Mont-d'Or, & que l'on attribue aux Romains. L'auteur d'une thèse soutenue à Paris à la même époque, parle avec un éloge exagéré de ces mêmes eaux, dont Chomel fait la description avec plus de détail, dans son *Traité des eaux de Vichy*, imprimé en 1734.

D'autres écrivains, & principalement Lemmonier, de l'Académie des sciences, l'auteur d'une thèse soutenue à Montpellier en 1768 (*de aquis Montis aurei*), Raulin, Macquart, M. de Briande, M. Mollet, médecin de Clermont, &c., ont consacré quelques recherches & quelques considérations à l'analyse & aux effets de ces mêmes eaux. Peyronnet, qui a été le prédécesseur immédiat de M. Bertrand, lui a transmis le résultat d'une expérience très-étendue & d'excellentes traditions, dont notre savant confrère se plaît à lui faire hommage.

M. Bertrand, dans l'ouvrage que nous venons de citer, s'occupe d'abord, & dans une première partie, de la topographie de la vallée & du village où les eaux du Mont-d'Or se trouvent situées, exposant à ce sujet des recherches & des observations dont le simple extrait, quoique très-intéressant, nous éloiignerait nécessairement du but que nous devons nous proposer dans cet article; il s'occupe ensuite, & dans une seconde partie, de l'analyse des sources principales, savoir, de la fontaine de *Sainte-Marguerite*, du bain de *César*, du grand bain & de la fontaine de *la Magdelaine*, qui toutes sortent de la base de la montagne, &

traversent le village en se portant du nord au sud-ouest.

La fontaine de la Magdelaine donne quatre-vingt-huit litres d'eau par minute, en été comme en hiver, sans aucune variation : les eaux sont limpides, inodores, sapides & chaudes, montent d'une manière constante à quarante-deux degrés au thermomètre centigrade; elles contiennent de l'acide carbonique, du carbonate de chaux, du carbonate de soude, du carbonate de magnésie & du carbonate de fer.

D'après les expériences nombreuses que M. Bertrand a faites sur ces mêmes eaux, on peut conclure que vingt-huit litres d'eau de la Magdelaine, & vingt-huit pintes de Paris, contiennent :

	gramm.	millig.	grain.
1 ^{re} . Acide carbonique libre. . .	10	905	ou 136
2 ^{de} . Carbonate de soude. . .	10	040	189
3 ^{de} . Sulfate de soude. . .	3	008	57
4 ^{de} . Muriate de soude. . .	7	602	145
5 ^{de} . Alumine. . .	3	203	62
6 ^{de} . Carbonate de chaux. . .	6	162	116
7 ^{de} . Oxyde de fer. . .	0	564	11
8 ^{de} . Carbonate de magnésie. .	2	018	58

gramm.	millig.	grain.
39	632	768

Total de tous les principes minéralisateurs, tant fixes que volatils, trouvés dans les vingt-six litres d'eau.

Les eaux du bain de César ont une température beaucoup plus élevée que celles de la Magdelaine; elles s'administrent rarement en bains entiers, mais par bains partiels. Lorsque l'intérieur de la grotte est dans cet état que l'on appelle *mauvais* ou *souffré*, on éprouve, en y entrant, un sentiment de chaleur, de formation, de pression sur les jambes, ce qui parait dépendre d'une disposition analogue à celle de la grotte du Chien à Naples. Le bain de César est d'ailleurs soufre, tantôt avec beaucoup d'agitation, & lorsque les orages le préparent; tantôt soufre & non bryant, dans les temps chauds, & lorsque les vents méridionaux dominent. Cette source fournit quarante litres d'eau par minute.

Les sources réunies du grand bain produisent trente-huit litres d'eau par minute. Leur température diffère dans les quatre caves, mais d'une manière peu importante; elles contiennent une plus grande quantité de silex que dans les eaux de la source des bains de César ou dans celles de la Magdelaine, qui sont beaucoup plus chargées d'acide carbonique & de fer en dissolution; différence qui n'est pas sans rapport avec celle que l'on a remarquée entre les propriétés médicales de ces eaux.

Les eaux de la fontaine Sainte-Marguerite contiennent 850 milligrammes de gaz acide carbonique par litre; elles forment une boisson agréable avec le vin : elles sont stimulantes, légèrement

toïques, & convenables dans le cas de débilité gastrique.

Les eaux du grand bain administrées en bain, font éminemment sudorifiques, & paroissent, en excitant directement la peau, le tissu cellulaire & les lymphatiques sous-cutané, provoquer différens phénomènes sympathiques très-étendus : la fréquence du pouls, la perspiration, augmentent sensiblement dans ces bains, où l'on a peine à se plonger la première fois; on y ressent un état de congestion sanguine, temporaire, bien manifeste, & des effets généraux proportionnés à la sensibilité de la peau & à l'irritabilité générale de l'individu.

Ce que l'on appelle les bains tempérés est un mélange d'eau de rivière avec l'eau du grand bain, la température de bains tièdes, & pour préparer à une immersion plus énergique. La douche ajoute beaucoup à l'effet du bain & doit le précéder; elle est employée seule dans le cas de paralysie qui succède à l'apoplexie: cette douche a de six à dix lignes de diamètre, cinq pieds de chute. On doit à Peyronnet s'en avoir rendu l'usage plus fréquent au Mont-d'Or, & de l'avoir fait contribuer utilement au traitement de la consomption & de l'épuisement qu'entraînent l'onanisme ou les jouissances intempestives & immodérées.

Les eaux de la Magdelaine sont plus particulièrement employées dans le traitement de plusieurs affections de poitrine: la dose peut en être portée à trois, quatre & cinq verres, qu'il faut boire, autant qu'il est possible, à l'endroit même où elles sourdent, en les coupant, s'il est nécessaire, avec un dixième de lait, d'eau gommée ou de toutes autres boissons analogues. On met une demi-heure & plus d'intervalle entre chaque verre.

Pendant les deux ou trois premiers jours, cette médication diminue l'appétit, augmente les sécrétions muqueuses, occasionne quelques nausées, des bouffées de chaleur, affaiblit les jambes, porte à la tête & accélère le pouls. Le plus léger embarras gastrique est sensiblement augmenté par leur usage, qu'il doit faire différer au suspensé.

Du quatrième au septième jour, les baux de ces eaux à qui elles conviennent, les prennent avec plaisir & avec un sentiment de bien-être. La perspiration cutanée & la sécrétion des urines, sont augmentées; il survient quelquefois des dépôts critiques sous les aisselles, un flux hémorroïdal, un retour de règles, des éruptions de boutons ou de plaques dartreuses.

L'état de la transpiration, des urines, de l'expectoration, éprouve d'ailleurs en particulier des changements, & une sorte de réaction qui attire principalement l'attention des médecins. La durée d'un traitement est de quinze à vingt-cinq jours au plus. On est averti du moment où il importe de le suspendre, par la répugnance des malades, leur sensation de chaleur à la poitrine, une difficulté

douloureuse de respiration, leur inappétence, leur agitation, leur insomnie.

La même indication, si elle dépasse certaines limites, se manifeste avec les caractères d'une irritation qui peut avoir les suites les plus dangereuses.

Sur la fin du traitement, & quelque temps après, on continue les eaux à petites doses pendant quelque temps, pour ne pas priver tout-à-coup l'estomac d'un excitant auquel il s'est accoutumé. On met au moins un mois & demi d'intervalle, après le traitement; lorsque le deuxième est nécessaire, ce dernier peut être fait à domicile, avec des eaux bouillies & portées avec le plus grand soin, & dont il importe de faire plutôt usage dans un temps mou & pluvieux, que dans un temps sec & froid.

Dans une phthisie déjà avancée, on reconnoît que les eaux réussissent, si les sueurs générales diminuent, si la peau prend plus de ressort, si, d'une autre part, les sueurs colligatives sont modifiées, tandis que les sueurs partielles se transforment en une douce moiteur. Dans le cas de suppression des sueurs colligatives, il n'est pas rare de voir survenir une congestion du poulmon ou une diarrhée féreuse très-féide & très-abondante.

M. Bertrand ne craint pas d'avancer d'une manière plus générale, que les eaux de la source de la Magdelaine, convenablement administrées, augmentent l'expectoration pendant les premiers jours, & un peu plus tard, la transpiration; qu'elles sont toniques pour tous les viscères, mais pour le poulmon en particulier, & que ce dernier est ramené d'autant plus facilement à son état naturel, que la dérivation par la peau est plus complète, comme on le voit surtout dans le phthisique, qui paroissent avoir des rapports avec les dispositions catarrhales, rhumatismales, dartreuses, &c.

Lorsque la maladie est plus avancée, & lorsque l'on aperçoit des signes de paralysie dans les crachats, les mêmes eaux doivent être données avec beaucoup plus de circonspection, en commençant par un verre, pour arriver à deux ou trois, du huitième au neuvième jour.

Les bains dits tempérés se joignent assez ordinairement à l'usage des eaux de la Magdelaine.

M. Bertrand, après avoir présenté ces différentes considérations générales, a placé à leur suite, & dans plusieurs chapitres distincts, plusieurs observations sur différentes altérations morbides, dans le traitement desquelles les eaux du Mont-d'Or des diverses sources ont été employées avec plus ou moins de succès; d'après le résumé qui termine son travail, il conclut ce qui suit, de l'ensemble de son expérience & de ses recherches.

Les eaux du Mont-d'Or fortifient les viscères, l'estomac & les poulmons particulièrement, déterminent des crises salutaires qui se manifestent au même instant par l'augmentation de la chaleur & du mouvement, des sécrétions & de quelques excrétions.

Elles rappellent au dehors les différentes affections cutanées qui se font portées à l'intérieur, rétablissent les évacuations habituelles dérivées, diminuent ou suppriment, déclenchent les maladies vénériennes, masquées ou mal guéries; de-là leur efficacité dans les maladies internes, qui dépendent de certaines métallures, des dartres, de la gale, des rhumatismes ou du virus vénérien, de la diminution ou suppression de la transpiration, des menstrues, des hémorroïdes.

Leur usage convient dans la faiblesse générale du système, dans les maladies chroniques des organes de la respiration, dans la phthisie pulmonaire, nerveuse ou métabolique, pourvu que les malades ne soient pas dans un grand état de dépérissement; dans les affections catarrhales chroniques du poudron, des intestins & de la vessie; dans les fleurs blanches qui ne sont point compliquées de vices organiques de l'utérus; dans les dartres dont la cause est due à l'altération des fonctions de la peau; dans les rhumatismes chroniques musculaires, fibreux, gouteux; dans les paralysies dont la cause ne réside point dans le cerveau ou ses dépendances; dans la faiblesse & les nombreux dérèglements que la masturbation & l'abus des plaisirs vénériens entraînent à leur suite; dans les hydrophiques qui ne sont point compliquées de vices organiques de quelque viscère; dans les rétractions & les faiblesses musculaires, les gonflements articulaires, & dans quelques luxations consécutives de cul de chémar.

Ces eaux, dont la saison commence le 25 juin & dure jusqu'au 30 novembre, ne se prennent ordinairement que pendant quinze ou vingt jours: elles sont la base & la partie la plus essentielle du traitement. « Je les administre, dit M. Bertrand, à l'exclusion de tout autre remède, à moins qu'il ne soit éminemment indiqué. Néanmoins il est beaucoup de cas où on leur associe des substances pharmaceutiques. J'aurai à parler de l'action des eaux, combinée avec celle de ces remèdes, & à examiner plus particulièrement leurs effets dans les affections scorbutiques; c'est vers ces différents points que je dirigerai principalement mes recherches, sans négliger néanmoins de recueillir de nouvelles observations & de nouveaux faits, sur les maladies dont j'ai parlé. Je continuerai mon journal avec exactitude & en soin; je ferai tout ce qui dépendra de moi pour diminuer l'imperfection de ce premier essai, & espérerai encore plus de lumière sur les propriétés médicales des eaux du Mont-d'Or. »

(L. J. M.)

MONTÉLIMART (Eaux minérales de). Montélimart est une petite ville sur le Rhône & le Jabron, à une lieue de Viviers & à cinq du Pont-Saint-Espirit. On trouve à une demi-lieue de cette ville, sur la rive australe du Jabron, une source minérale qui se nomme la *Sainte-Fontaine*.

Meunier a donné, dans un *Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires*, t. II, pag. 121, l'histoire médico-topographique de la ville de Montélimart, où il dit que les eaux de la Sainte-Fontaine contiennent un type spiritueux ou acrien très-astringent & très-abondant, un peu d'alcali fixe, une terre absorbante soluble, une espèce de sel d'Epson à base terreuse, & du fer qui y est retenu par l'air surabondant ou par son extrême division.

Selon ce médecin, les eaux de Montélimart sont efficaces dans les obstructions légères du foie, les pâles couleurs, contre la bile surabondante. Il avance qu'elles sont analogues aux eaux de Vals, qu'elles pourroient suppléer en cas de besoin.

(MACQUART.)

MONTENDRE (Eaux minérales de). C'est un bourg à cinq lieues de Blois & à neuf de Saintes, où se trouve une source d'eau minérale, dont Ducloux a parlé en peu de mots (pag. 122); conséquemment peu connue quant à ses principes & à ses vertus. (MACQUART.)

MONT-FERRAND (Eaux minérales de). (Voyez BAINS DE RENNES.) C'est un bourg à deux lieues de la Flèche, où l'on trouve une source minérale tout à côté, qui porte le nom de la *Courrière*, & que Linacrier regarde comme très-ferrugineuse. (MACQUART.)

MONTI (Jean-Baptiste), né à Vérone en 1498, d'une famille illustre en Toscane, fut destiné à l'étude de la jurisprudence par son père; mais son goût se portant vers la médecine, il s'y livra contre la volonté de ses parents, qui lui refusèrent tout secours en argent. Ce contre-temps ne fit que redoubler son zèle, & il parvint en peu de temps à se faire recevoir docteur à Padoue. Il se présenta alors à son père qui le reçut fort mal; il en fut dédommagé par une réputation brillante & les faveurs de la fortune. Différens princes cherchèrent à l'envi à l'attirer dans leurs Etats, mais il préféra la tranquillité aux honneurs dont on vouloit le combler. Les douleurs de la pierre vinrent troubler son bonheur & furent la suite de ses longs travaux. Il se retira près de Vérone, espérant voir diminuer son mal; il redoubla, & mourut en 1551. Il laissa une quantité immense d'ouvrages qui ont été publiés par ses disciples.

Interpretatio latina librorum quatuor medicorum ex veteribus contracta Editio amenita. Balli, 1535, in-fol.

Tabula in tres libros artis parva Galeni. Venet., 1546, in-fol. Patav., 1550, in-fol.

De alimentorum differentis. Venet., 1553, in-8°.

Libellus de gradibus & facultatibus medicamentorum. Witteberg, 1553, in-8°.

De excrementis, fecibus, urinis libri duo.

Ff 2

Patav., 1554, in-8°. Par., 1555, in-16, avec un traité de Morbo gallico.

Consultationes de rariorum morborum curationibus. Venet., 1554, in-8°.

De causis & accidentibus pulsibus & urinis. Ibid., 1557, in-8°.

Opuscula varia & præclara, in quibus tota ferè medicina methodicè explanatur. Basil., 1558, 1565, in-8°.

Medicina universa ex lectionibus Montani categoricè opusculis collecta. Francof., 1587, in-fol. On en doit l'édition à Martin Weindrich.

Il est encore un grand nombre d'autres Traités publiés par divers de ses disciples, ainsi que plusieurs commentaires sur les anciens auteurs grecs & arabes; mais tous respirent la théorie qui étoit alors en vogue, & qui depuis est tombée dans l'oubli, ainsi que les ouvrages qui la renferment.

(R. GODEFROY.)

MONTIGNÉ (Eaux minérales de). Ces eaux sont regardées comme ferrugineuses; elles sont peu en usage.

MONT-LOUIS (Eaux minérales de). C'est une ville & place-forte du-del de la Perche, à vingt lieues de Perpignan, où se trouve une source d'eau minérale froide, près le pont de Cerdagne. Carrère la regarde comme ferrugineuse.

(MACQUART.)

MONTMORENCY ou ENGHËN (Eaux minérales de). Enghien est une petite ville située sur une des collines les plus élevées des environs de Paris, à trois lieues de cette capitale, au nord-ouest. Dans la vallée qui porte le même nom, au-dessous de l'étang de Saint-Gratien, on trouve des eaux sulfureuses que l'odorat fait facilement reconnaître lorsqu'on en approche.

S'il est vrai que l'efficacité de cette classe d'eaux a été bien reconnue dans une foule de circonstances, il faut convenir que c'est un grand bonheur pour une ville aussi peuplée que Paris, d'avoir à sa porte une ressource d'autant plus assurée, que la proximité ne donne pas à ces eaux le temps de perdre une grande partie de leurs propriétés, qui sont dues le plus souvent à un principe fugace & incoercible promptement décomposable. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui n'auroient pu entreprendre des voyages longs & dispendieux, pour aller prendre ces eaux à leur source, trouveront à Enghien, sans se déplacer en quelque sorte, l'avantage de jouir de toutes leurs propriétés.

La Société royale de médecine, frappée de ces considérations, a cru devoir nommer plusieurs de ses membres, pour faire un examen de ces eaux, tel qu'il ne restât plus rien à désirer pour la connaissance de leur nature intrinsèque.

Elle a nommé en conséquence le chimiste Four-

croix, auquel elle a adjoint Laporte, pour lui rendre compte des travaux qu'ils auroient faits. Il résulte de leurs recherches & de l'analyse de ces eaux, qu'on peut les regarder comme un modèle en ce genre; que les principes qui caractérisent l'eau d'Enghien sont, en général, de trois natures: ce qui comprend, 1°. des êtres fugaces qui s'exhalent facilement, tels que le gaz hépatique & l'acide carbonique, auxquels l'eau doit les propriétés médicinales dont elle jouit; 2°. les principes qui ne sont solubles qu'à la faveur des précédents, & qui s'en précipitent à mesure que ceux-ci s'exhalent naturellement ou qu'ils sont absorbés par les réactifs appropriés: (telles sont les terres calcaire & magnésienne, que l'acide carbonique y tient dissoutes, & qui en troublent la transparence lorsque cet acide se volatilise par le contact de l'atmosphère); tel est aussi le soufre qui, faisant le principal élément du gaz hépatique, se dépose en partie comme insoluble, quand le gaz inflammable qui le tenoit suspendu est absorbé peu à peu par l'air pur contenu dans l'atmosphère, ou dans les acides qui en sont surchargés, ou enfin dans les chaux métalliques; 3°. les matières salines très-dissolubles, par lesquelles les principes précédents n'ont aucune réaction, qui restent dissoutes dans cette eau pendant que ceux-ci s'en séparent, & qu'on ne peut en dégager que par l'évaporation plus ou moins avancée. Ces sels sont: 1°. la sélénite; 2°. le sel d'Epsom; 3°. le muriate de soude; 4°. le muriate de magnésie.

Résultat total de l'analyse donnée par cent livres d'eau d'Enghien:

700 ponce cubiques de gaz hépatique fixe, eu 84 grains de soufre.	
Vitriol de magnésie cristallisé. 2 gros 14 grains.	
Muriate de soude.....	24
Vitriol de chaux.....	4
Craie.....	3
Craie de magnésie.....	70
Acide crayeux.....	2
Matière extractive, terre siliceuse, quelques grains inappréciables.	

Il faut voir dans l'analyse complète des eaux d'Enghien, ce que peuvent les moyens chimiques entre des mains aussi habiles. (MACQUART.)

MONTPELLIER (Médécine, École, Faculté de). Nulle autre ville peut-être n'a été aussi redoutable de sa célébrité à la médecine, que la ville de Montpellier, & ce n'est pas sans raison que quelques écrivains l'ont appelée la ville d'Hippocrate, la cité médicale (1).

Les habitants du Midi en général, & ceux de Montpellier en particulier, paroissent même avoir en de temps immémorial, un penchant, une apu-

(1) Louis XIV appeloit la mère des plus anciennes Facultés de l'Europe, la pépinière des architectes.

tude pour l'exercice de la médecine; ce qui explique leur supériorité jusqu'à l'époque où les sciences médicales ont été assez avancées pour donner tout l'avantage, soit dans la spéculation, soit dans la pratique, à la force de la raison & à l'étendue des connaissances. « Je trouve la raison de ce fait, dit Borden (1), dans la constitution naturelle des habitants. Haute, qui aqut dans nos vallées, non loin de l'Océan, & qui fut sans doute un des plus subtils philosophes de son temps, a très-bien défini, à mon gré, quelle est la constitution naturelle la plus propre à la médecine. Ses traducteurs ont appelé *astuce & malice*, ce qu'il appeloit *sagacité, vivacité, industrie & surabondance d'imagination*. »

« Or, les habitants des divers cantons d'Aquitaine sont plus ou moins fournis de ces qualités qu'ils doivent à leur climat, à leurs mœurs, à leur façon de vivre, aux peuples anciens dont ils descendent. Il ne faut donc pas être étonné que plusieurs d'entre eux se destinent à la médecine. »

« L'auteur d'un *Essai sur l'histoire de la médecine en France*, dont ces remarques n'ont pas suffisamment attiré l'attention, oublie entièrement Montpellier dans son tableau, pour n'admettre aucun détail relatif à la Faculté de Paris, dont les plus modestes badeaux ont figuré dans son histoire. « & que doit-on penser à ce sujet, dit Borden, d'une histoire de la médecine en France, dans laquelle on affecterait de garder le silence sur l'école de Montpellier (2). »

Pour ne pas mériter un semblable reproche, nous donnerons toute l'attention qu'elle mérite, à cette antique & illustre école, à laquelle en ne pourroit refuser, sans injustice, une place assez étendue dans un Dictionnaire dont les différents rédacteurs ont eu constamment pour objet de réunir à l'exposition dogmatique de la médecine, la biographie des médecins & l'histoire de la science & des institutions qui ont été consacrées à son enseignement ou à ses progrès.

Nous croyons devoir distinguer plusieurs époques dans l'existence de l'illustre compagnie dont nous allons rapidement tracer les différentes situations, depuis son origine jusqu'à la fondation de nouvelles écoles de médecine en France, à la fin du dix-huitième siècle; nous rapporterons ces époques à cinq titres, savoir :

1°. Les temps antérieurs & primitifs de la Faculté de Montpellier, avant l'établissement des Facultés ou des Universités en France.

2°. La fondation de l'Université de Montpellier, d'après la bulle obtenue par le cardinal Courard, en 1220.

3°. L'état de la même Faculté après la renaissance des lettres.

4°. La promotion, dans la même Faculté, de l'étude philosophique de l'homme & des animaux, dans les phénomènes particuliers & les lois spéciales de l'organisation.

5°. Fondation de l'école actuelle de Montpellier d'après la loi du 14 frimaire an 3, qui établit sur des bases communes cette même école, l'école de Paris & l'école de Strasbourg.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Temps primitifs ou antérieurs de l'école de Montpellier.

La période qui répond à cette première époque, comprend un espace d'environ deux siècles, depuis le onzième jusqu'au commencement du treizième.

L'exposition favorable de Montpellier, la salubrité, la beauté de son climat, les relations commerciales, les cures miraculeuses attribuées à son église de Notre-Dame de la Table, attirèrent de bonne heure, dans une cité aussi florissante, un grand nombre de malades & plusieurs médecins, dont les succès avoient déjà acquis beaucoup de célébrité dans les onzième & douzième siècles.

Plusieurs villes du Languedoc, en général, avoient été favorisées d'une manière fort remarquable pour tout ce qui concerne un commencement de culture intellectuelle, & l'étude rationnelle de l'art de guérir, par leur relation avec les Juifs & avec les Arabes. Ces derniers occupent encore une partie des provinces méridionales les plus voisines de la France au onzième siècle; ils apportèrent les objets de leur commerce à Montpellier, où, suivant un ancien auteur (Benjamin de Tudèle), l'on venoit de toutes parts pour le dégoût de Lombardie, du royaume de Rome la grande, de toute la terre d'Égypte, du pays d'Israël, de Grèce, de France.

Dans un concours de circonstances aussi favorables, la médecine fut sans doute exercee, ou du moins pratiquée par un grand nombre de personnes dans la ville de Montpellier.

Plusieurs documents historiques ne permettent pas de douter de cette existence des médecins de Montpellier, au-on deux siècles avant l'institution qui prit le nom de *Faculté*. On voit d'après ces documents, que les étrangers venoient en grand nombre à Montpellier, soit pour s'instruire, soit pour rétablir leur santé.

Saint Bernard, en particulier, cite l'exemple d'un archevêque de Lyon (Héraclius de Montbessier), qui, s'étant trouvé malade à Saint-Gilles, s'étoit fait transporter à Montpellier pour se faire traiter (1).

(1) Recherches sur l'histoire de la médecine, pag. 460.

(2) Recherches sur l'histoire de la médecine, pag. 107 & 119.

(1) Astruc, Histoire de la Faculté de médecine de Montpellier.

Jean de Salisbury, cité par le même auteur, Jean de Salisbury, qui précéda de plusieurs siècles Montaigne & Molière, dans une critique aussi spirituelle que judicieuse de la médecine, s'élève aussi que de son temps on se rendoit en foule à Montpellier, pour apprendre la médecine; quoiqu'on en ravint chargé seulement de mots barbares, & d'un appareil stérile & pédantesque de savoir.

Un autre écrivain un peu moins ancien, Mathieu Paris, en décrivant le retour de saint Louis, parle de Montpellier comme d'une ville où la médecine étoit florissante.

L'ordonnance de 1180, octroyée par Guillaume, seigneur de Montpellier, relativement à l'exercice de la médecine, qui avoit donné lieu à de grands abus, est plutôt une mesure de police, qu'une disposition qui mérite d'entrer dans l'histoire littéraire.

M. Prudelle suppose, sans appuyer sa conjecture par aucun document authentique, qu'il seroit possible que l'on se fût servi à Montpellier, dans les leçons publiques, de la langue arabe, & qu'un grand nombre de médecins auroient été formés dans l'école de Montpellier, pour se répandre ensuite dans nos provinces méridionales, que l'on connoissoit alors sous le nom général de *Provence* (1).

Tel étoit l'état des choses concernant la médecine & les premières cultures intellectuelles à Montpellier, lorsque les troubles excités dans le Midi, à l'occasion des Albigeois, y attirèrent comme légat, le cardinal Comrad. Alors parut, par l'intervention de ce prélat, la bulle d'Honorius III, à la date de 1200, qui établit d'une manière régulière l'école de Montpellier, & d'après une organisation qui nous a paru assez remarquable pour y rapporter notre deuxième époque.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Établissement de l'Université de Montpellier par la bulle d'Honorius III, demandée par le cardinal Comrad.

Cette époque s'étend du treizième au quatorzième siècle.

La bulle qui donna à l'école de Montpellier le caractère d'une Université ou d'un corps ecclésiastique, parut en 1200.

Cette Université eut cela de remarquable, qu'à l'exemple de l'école de Salerne; elle se trouva d'abord exclusivement livrée à la médecine.

Cette Académie, comme tous les établissements du même genre, adopta l'usage de conférer les degrés académiques, & plusieurs autres points de la dis-

cipline des écoles Nestoriques; elle se trouva d'ailleurs, aiosi que les autres Universités, sous la dépendance & protection des papes; subordination qui caractérisoit les corps ecclésiastiques consacrés aux études, en leur assurant des privilèges & un patronage qu'aucune autre autorité n'auroit pu leur accorder.

Lorsque la seigneurie de Montpellier fut réunie à la couronne de France, son Université obtint différents privilèges de plusieurs de nos rois, mais principalement de Philippe-le-Bel & de Philippe-le-Valein.

Plusieurs événements mémorables du treizième siècle ne furent point étrangers à l'école de Montpellier.

La persécution des Albigeois, que nous avons déjà rapportée, & qui attira le cardinal Comrad en Languedoc, lui fut favorable sous ce rapport, en lui faisant obtenir une existence régulière & académique.

Plusieurs des maladies épidémiques ou pestilentielles du quatorzième siècle, qui furent alors si fréquentes & si dévastatrices, attirèrent l'attention des médecins de cette Faculté, entre autres de Gui de Chauliac & de Raymond-Charles de Vicoaric, dont les descriptions ne ressembloient en rien aux écrits des autres médecins à cette époque.

Les travaux d'Arnaud de Villeneuve, que l'on aperçoit déjà dans le siècle précédent, commencèrent à donner beaucoup d'éclat à la couronnée Université. Ce philosophe, qui ne put repousser entièrement quelques erreurs de son siècle, possédoit des connoissances très-étendues, & avoit beaucoup vu, beaucoup observé. On lui doit le perfectionnement ou la découverte de plusieurs appareils pour distiller, la connoissance de la térébenthine, de l'esprit-de-vin, de la préparation de plusieurs remèdes chimiques, & surtout d'un grand nombre de teintures & d'eaux distillées. C'est lui, dit un écrivain moderne, qui fit connoître le premier les eaux de senteur, dont la préparation, presque exclusive à la ville de Montpellier, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. . . . Il porta surtout le soin la construction des vaisseaux distillatoires, & l'art de s'en servir dans la fabrication des eaux-de-vin; en rendant cette dernière opération d'un usage plus familier, il créa pour son pays la source la plus constante de la prospérité & de ses richesses.

Les travaux de Gui de Chauliac ne sont pas moins époque dans l'histoire de Montpellier, que ceux d'Arnaud de Villeneuve; on les conçoit à peine, les uns & les autres, dans l'époque à laquelle ils appartiennent, & avec les formes, les caractères de l'illustration dans les Universités; tout s'y bornoit, d'après un usage commun & général, à la lecture & aux commentaires d'un petit nombre d'ouvrages anciens, mal traduits, ou de Traités arabes d'un faible intérêt; système d'étude qui d'ailleurs étoit affecté à divers réglés

(1) *Influence de la médecine sur la renaissance des lettres*, 12^e édit., pag. 60 & 61.

mens, divers statuts, dont l'appareil pédantesque attira le jugement sur la médecine, la censure, & les fatrasies des philosophes & des poëtes latins.

Atrac n'a point dédaigné de nous faire connoître ces vains formalités & l'hierarchie, la combinaison des pouvoirs & des dignités académiques qui appartenaient en propre à la Faculté de Montpellier. On voit par son récit, que le chef de cette compagnie étoit un chancelier, le sous-chef un doyen. Le même document fait connoître les attributions des procureurs de la Faculté, des syndics, du trésorier, du secrétaire & même des bedaux; enfin des patrons de la même compagnie, l'évêque & le sénéchal, protecteurs & conservateurs des usages, privilèges & immunités. Il paroit du reste, que tout l'enseignement portoit sur huit Traitez, que l'on se proposoit d'expliquer après en avoir réglé le choix, à la Saint-Luc, dans une assemblée appelée *congregatio per fidem*.

Les examens étoient de deux sortes, savoir : 1°. les magistrais, comprenant le *baccalauréat*; 2°. les points rigoureux & le doctorat; 3°. les examens *per intentionem* & les *triduenas*.

L'écrivain auquel nous empruntons ces détails, & qui paroit se complaire dans une description aussi puerile, n'y a point oublié l'insigne & l'indisciplin des écoliers, leur usage de se choisir en roi, qu'il a comparé au roi de la Bazouche des clercs de procureurs.

Il traite aussi, & très-longuement, du privilège de scholarité, assez étendu d'ailleurs, des épreuves pour les différentes dignités académiques, soit avec la robe de drap ordinaire, soit avec la robe de drap rouge, les grandes manches & le petit capuchon; ce qui rappelle à l'historien comme à ses lecteurs, la fameuse robe de Rabelais, connue dans toute l'Europe, & regardée comme le symbole du doctorat de Montpellier.

Les cérémonies du doctorat, ajoutés le même historien, consistent, 1°. à donner le bonnet; 2°. à mettre au doigt une bague d'or; 3°. à ceindre le docteur avec une ceinture d'or; 4°. à lui présenter le livre d'Hippocrate; 5°. à le faire asseoir dans la chaire, à côté du professeur; 6°. à l'embrasser; 7°. enfin, à lui donner le *bénédiction*.

S'il faut en croire certaines relations, on doit en outre au nouveau docteur, & par une espèce d'acclimation, *vide d'accorde Cais* (1).

Bordeu, qui a parlé de ces anciennes coutumes, dans des vues d'un esprit philosophique, n'a point oublié l'usage des médecins de la Faculté de Montpellier, d'avoir pris saint Luc pour leur patron, & de se désigner eux-mêmes sous le nom de *médicins orthodoxes*, sans doute pour le distinguer & le se parer des médecins juifs & arabes de la même

époque. Il est une autre coutume plus singulière, ajoute le même auteur, & qui durait depuis plusieurs siècles.

La Faculté de Montpellier, après avoir, au frontispice de ses thèses, invoqué Dieu, la Vierge & saint Luc, patron des médecins orthodoxes, terminoit le titre de ces thèses par cette bizarre période : *Cette thèse sera soutenue dans le sacré temple d'Apollon*. Extrange & barbare formule, qui confondoit le sacré & le profane, & qui a pris fin de nos jours.

La pratique de la médecine répondait dans plusieurs points au cérémonial d'une initiation aussi frivole; quelques médecins en particulier, parmi lesquels on cite Bernard Gordon (ou plutôt de Gordonio), Gérard de Solo, Jean de Tournemir, donnèrent en particulier dans la folie de l'*aromantie* (2); que Kerner a si vivement attaquée, sans pouvoir entièrement s'en défendre.

L'exercice de la chirurgie ne fut point séparé de celui de la médecine dans les premiers temps de l'Université de Montpellier; mais il faut aller jusqu'à Gui de Chauliac, que nous avons déjà cité, pour apercevoir une époque remarquable de progrès dans le traitement des blessures & la pratique des opérations. Cet homme célèbre & si justement regardé comme le promoteur de la grande chirurgie en Occident, avait acquis, malgré l'insuffisance des études de son temps, des connoissances d'anatomie assez étendues. On lui doit une bonne description de l'humérus, & des observations judicieuses sur la dure-mère, qu'il avait pu voir après le trépan; il pratiqua; du reste, la plupart des grandes opérations, celles de la cataracte, de la taille, de la fistule par la ligature, de l'emphyème, de la ligature des artères dans les hémorrhagies.

L'ordonnance de Louis d'Anjou (de 1376), permettant la dissection publique du cadavre d'un criminel, doit faire sans doute époque dans l'histoire de la Faculté de Montpellier, mais ne put exercer qu'une influence bien faible sur le progrès des études.

Cette dissection, autorisée par les lois, trouva même dans les maîtres ou les opinions populaires, les plus grands obstacles. On s'y livroit pendant la nuit, à la lueur des flambeaux, & pendant le plus grand silence.

Avant l'ordonnance que nous venons de citer, le moyen le plus généralement employé, pour acquiescer quelques notions d'anatomie, consistoit en une démonstration à l'aide de treize plaques, que Henri de Hermonville avait dessinées pour faire connoître les parties principales du corps

(1) Voyez Atrac, *Histoire de la Faculté de médecine de Montpellier*, pag. 88.

(2) Médecins qui prétendaient reconnaître les maladies à l'inspection des urines, ce que nous appelons aujourd'hui, dans une occupation devenue chez les peuples d'Asie, des médecins d'urines.

humain. Dans les dissections clandestines, on enseignoit l'anatomie en quatre leçons, savoir : la première pour les viscères du bas-ventre, la deuxième pour les viscères de la poitrine, la troisième pour le cerveau, la quatrième pour les membres (1).

L'ordonnance du duc d'Anjou n'apporta que de bien foibles changements à cette culture de l'anatomie, & il faut s'avancer assez dans l'époque suivante, après la renaissance des lettres, pour découvrir un commencement de progrès dans cette partie des connoissances.

TROISIÈME ÉPOQUE.

Renouvellement des connoissances & changement dans les études, après la renaissance des lettres dans le quinzième siècle.

Cette époque répond à une période de près de trois siècles. Les traductions des Anciens, faites de la deuxième main & sur des versions arabes, furent remplacées dès le commencement de cette époque, à Montpellier comme dans les autres Universités, par des traductions directes & plus exactes. On donna en même temps plus de soin au diagnostic des maladies, un peu moins d'importance à l'astrologie, qu'Arnaud de Villeneuve lui-même avoit adoptée dans toutes ses folles applications. D'une autre part, la matière médicale eut plus d'étendue, de régularité, mais elle continua de tendre à la polypharmacie, à la multiplication des spécifiques & des antidotes, comme il est facile de le voir en parcourant les écrits de Rondelet, Laurent Jobert, André du Laurens, Varrand, &c. On doit d'ailleurs rappeler à ce sujet, & pour lui donner les éloges qu'elle mérite, la conduite des médecins de Montpellier, relativement à la grande discussion concernant les remèdes chimiques. « Les médecins, dit Astruc, n'eurent garde de les approuver en aveugles, comme les empiriques, mais ils n'entreprirent point non plus de les proscrire sans les avoir examinés; ils les essayèrent avec prudence, & quand ils en eurent reconnu les propriétés & les vertus, ils s'en servirent avec sagacité. Les préjugés qu'ils gardèrent dans cette épreuve, méritent de servir d'exemple pour la manière dont on doit employer les remèdes nouveaux. On pourra s'en instruire amplement dans les ouvrages de Turquet de Mayerne, de Lazare Rivière, auxquels la France est principalement redevable de l'introduction des remèdes chimiques dans la pratique de la médecine (2). »

(1) *Précis de Chirurgie de Gui de Chauliac*, pag. 33 & suiv.

(2) *Précis Médical, Histoire de la Faculté de Montpellier*, pag. 93.

Cette affaire des remèdes chimiques fit alors une grande sensation; elle ne doit pas être en conséquence indiquée trop superficiellement dans l'histoire de Montpellier, surtout pour ce qui concerne le procès intenté à Renaudot, médecin de cette Faculté, par celle de Paris, qui passa dans cette circonstance toutes les bornes de la justice & de la modération. « Ce médecin, » dit Astruc, natif de Loudun, & docteur de la Faculté de Montpellier, avoit établi à Paris, sous l'autorité du Roi, & en vertu des lettres-patentes qu'il avoit obtenues, un bureau public des consultations charitables pour les pauvres. C'étoit le rendez-vous des docteurs de Montpellier établis à Paris, & pour ainsi dire leur maison commune; ils s'y assembloient toutes les semaines pour donner gratuitement des conseils & des remèdes aux pauvres qui en demandoient, & dont le concours étoit toujours fort grand. »

La Faculté de Paris trouva avec raison que cet établissement choquoit les anciens privilèges, & se détermina à en poursuivre la suppression; elle attaqua pour cela en justice Renaudot & ses confrères en 1644, & se fit appuyer par le corps de l'Université de Paris. Renaudot, de l'autre côté, demanda & obtint l'intervention de la Faculté de Montpellier. La cause fut plaidée solennellement au Parlement de Paris. On fit valoir contre les docteurs de Montpellier une ordonnance de Charles VI, de 1390, & l'article 87 de l'ordonnance de Blois, de 1579, qui ne regardent que les gens qui entreprennent de pratiquer la médecine sans titre; quelques statuts que la Faculté avoit faits, & qui n'avoient aucune autorité contre celle de Montpellier, & quelques arrêts du Parlement rendus contre des empiriques & gens sans aveu. Ce qu'on alléguait de plus fort, fut l'exemple même de la Faculté de Montpellier, qui prétendoit empêcher les médecins des autres Facultés de pratiquer à Montpellier, à moins qu'ils n'y prissent de nouveaux degrés.

Renaudot perdit son procès, & il fut défendu par un arrêt du 1^{er} mars 1644, tant à lui qu'aux autres docteurs-nés d'entrer avec lui, de pratiquer la médecine à Paris. Mais annonçant cet arrêt, les docteurs de Montpellier ne firent pas de se maintenir dans Paris, sous la protection du Grand-Conseil, qui leur accorda plusieurs arrêts favorables, le 10 mars 1648, le 30 décembre 1668, le 15 octobre 1672, &c. ; ils réussirent même à obtenir, au mois d'avril 1673, des lettres-patentes portant création d'une communauté ou chambre royale, où ils se réunirent tous, & à laquelle les nouveaux docteurs de Montpellier étoient agréés après quelques épreuves, & par où ils acquiescoient à leur de pratiquer dans Paris. Ces lettres furent enregistrées au Grand-Conseil, où ces médecins prétendoient avoir leurs causes commises.

« Cette chambre a porté le nom de *Chambre royale*

royale de Montpellier, parce qu'elle étoit principalement composée de docteurs de cette Faculté. On y a pourtant reçu quelquefois des docteurs des autres Facultés, dont on connoissoit le mérite & la capacité; mais ceux-là même faisoient gloire de porter dans la suite le nom de docteurs de Montpellier, comme il en a beaucoup encore aujourd'hui qui portent la même qualité avec moins de raison encore.

La chambre royale a fourni quelques bons médecins à la ville de Paris, & elle a subsisté jusqu'à l'année 1694; elle fut détruite alors par une déclaration du Roi, donnée au mois de mai, qui défendit l'exercice de la médecine dans Paris & ses faubourgs, à tous ceux qui ne seroient pas du corps de la Faculté de cette ville, & qui n'excepta d'une règle aussi générale, que les médecins employés auprès de la personne ou auprès du premier prince du sang. » (Astruc, *Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier*, pag. 101 & suivantes.)

Cette question des remèdes chimiques tenoit évidemment à des points de pratique médicale de la plus haute importance. Quant à la théorie de la médecine, elle se modifia naturellement par les découvertes qui furent faites en physique, & par les systèmes de Galien & de Descartes.

Le système de Willis prévalut toutefois dans l'école de Montpellier; tout parut à expliquer alors pour les docteurs de cette école, par expulsion & par effervescence; par l'action, le combat de l'acide & du calcaire, du soufre & du nitre.

Jusqu'alors, la même Faculté avoit du usage grande étendue de juridiction, & l'on n'a point ignoré que, dans les privilèges accordés par les papes & par les rois de France, les docteurs pouvoient exercer en tout lieu, *ubique terrarum*. Le tyllique des aggregations pour les grandes ou même pour les petites villes, & l'établissement de plusieurs Facultés d'un ordre inférieur, portèrent atteinte à ces privilèges; ce qui eût été sans inconvénient; mais il multiplia en même temps l'occasion & les moyens d'obtenir aux moindres frais d'instruction possibles, & même sans aucune instruction; le titre de docteur; abus véritablement dangereux, & que plusieurs médecins, entièrement étrangers à l'histoire de leur profession & aux véritables principes de la jurisprudence médicale, ont essayé de rétablir dans ces derniers temps, avec autant de mauvaise foi que de ignorance. Cette question, qui a été si bien examinée par Thierry, dans ses *Verux sur la médecine en France*, se présente nécessairement à l'auteur de l'histoire de la Faculté de Montpellier, qui n'a pas craint de l'attaquer, & dont les excellentes vues à ce sujet méritent d'être rappelées.

« Il ne faut pas se flatter, dit cet auteur, que l'étude de la médecine puisse jamais fleurir dans toutes les Facultés du royaume, dont la plupart sont désertes & sans aucun exercice. Le remède

MÉDECINE. Tome X.

la plus utile seroit de rédeire ces Facultés à un plus petit nombre; car, pour me servir des termes d'un auteur célèbre, *si l'on pratiquoit ce moyen, l'on verroit toujours une grande affluence d'écoliers dans les Universités, qui, par une honnête émulation, qui se plaît toujours dans la multitude, s'excitent les uns les autres à se rendre capables de leur profession. De-là il arriveroit encore, continue le même auteur, un bien inestimable; c'est que les écoliers étant enseignés par des mêmes professeurs, sous des mêmes lois & des mêmes maximes, ils en suivroient partout une conformité de doctrine, qui est la chose que l'on doit le plus désirer en toutes sortes de professions & de sciences; joint, pour suit-il, que plusieurs jeunes hommes de diverses provinces, y étant nourris ensemble des leur premier âge, ils apprendroient les mœurs les uns des autres, & contracteroient des habitudes, dont le public pourroit recevoir puis après beaucoup de fruit & d'utilité; & c'est pourquoy les empereurs Théodose-le-jeune & Valentinien III ordonnèrent que l'on n'enseigneroit la jurisprudence en Orient, qu'aux Universités de Constantinople & de Béritha, comme il est porté par la Loi I. (Cód. de studiis. Liber. urb. Rom. & Constant.)*

À suivre ce projet, trois Facultés pourroient facilement suffire pour tout le royaume. Paris pour la France septentrionale, Montpellier pour la France méridionale, & Douai pour la Flandre. Ce sont les Facultés les plus célèbres du royaume; & cependant il faudroit, pour y ramener l'étude encore davantage, & pour prévenir toute sorte d'abus, assigner à ceux qui les rempliroient des gages honnêtes, pareils à ceux dont on jouit dans les Facultés étrangères, & qui pussent attacher à leurs devoirs ceux qui en jouiroient. Il faudroit même établir des pensions plus fortes pour ceux qui se distingueroient par leur mérite ou par leur aliduité, afin d'exciter tout le monde à bien faire, par l'espoir de la récompense. Il faudroit enfin ordonner que l'on conférât des degrés sans aucune rétribution. Par ce moyen on auroit attention à bien instruire les écoliers; & comme on ne pourroit plus être porté à user d'indulgence par l'attrait d'un vil gain, qu'on tiré de leurs degrés, on examineroit avec fermeté; & l'on ne recevrait que des docteurs d'une capacité reconnue.

Je comprends que les Universités, dont il faudroit supprimer les Facultés de médecine, crieroient contre un pareil projet, & regarderoient la suppression que l'on consilioit, comme une mutilation de leur corps; mais si elles font anciennes, elles n'ont qu'à examiner leurs titres, & pour savoir que les Facultés qui les composent n'y ont pas été érigées toutes à la fois, mais en différents temps & souvent même long-temps les unes après les autres. Celle de médecine, &

G g

» particulier, est très-nouvelle, dans toutes les
 » Universités du royaume, hors celles de Paris &
 » de Montpellier. Quel tort seroit-on donc à ces
 » Universités quand on les réduiroit à l'état où
 » elles ont été à leur origine, & qu'on y suppri-
 » merait des Facultés qui y languissent & qu'on
 » ignore, pour y laisser subsister les autres Fa-
 » cultés qui y fleurissent, ou qui y sont au moins
 » plus recommandables (1) ? »

Ces détails qui semblent, au premier coup d'œil, appartenir plutôt à la chronique d'un corps qu'à l'histoire d'une science, nous ont paru mériter d'être rappelés, parce qu'ils se rattachent à des points de discipline & de police médicale, qui ne peuvent être étrangers à l'exercice de l'art de guérir, & aux progrès des sciences médicales.

En portant de nouveau notre attention sur la constitution de la Faculté de Montpellier, pour y découvrir les causes de sa juste célébrité, nous y trouvons au premier rang l'établissement de quatre régentes fixes, sollicité par Honoré Piquet, & confirmé par des lettres-patentes de 1498.

Cet établissement eut une influence très-étendue. En rendant la condition des professeurs moins dépendante, moins précaire, il contribua sans ce rapport aux progrès de l'instruction; il ne fut même point étranger à l'état florissant de la Faculté de Montpellier, dans le milieu du dix-huitième siècle, c'est-à-dire, à l'époque où une disposition contraire (la moribondité des professeurs) contribua si puissamment, avec plusieurs autres causes, à la décadence de la Faculté de médecine de Paris.

Cette institution des régentes fixes fut augmentée, dans le seizième siècle, de deux chaires, l'une pour l'anatomie & l'autre pour la botanique, d'une place de démonstrateur d'anatomie, que Cabrol exerça avec distinction; enfin, d'un jardin de botanique, & d'un nouvel enseignement pour la chirurgie & la pharmacie. A la fin du même siècle, à la suite de ces améliorations, l'enseignement éprouva alors des changements assez considérables: la doctrine qui en faisoit la base dans les premiers temps, avoit été prise en totalité chez les Arabes; elle fut remplacée par le galénisme & par la lecture de quelques écrits d'Hippocrate. Cette espèce de révolution ne paroit pas d'ailleurs avoir été très-favorable d'abord à la gloire de l'école de Montpellier; si faut aller du moins jusqu'à Guillaume Rondelet, vers le milieu du seizième siècle (1566), afin de pouvoir trouver, pour l'époque qui nous occupe, dans la suffisante nomenclature d'Afric, le nom d'un médecin de cette Faculté, qui mérite d'être remarqué dans l'histoire des sciences médicales. Il faut en excepter toutefois Balescon, dont nous avons fait valcûns, Honoré Piquet & Gabriel Miron.

Balescon vécut dans les quatorzième & quinzième siècles. Son ouvrage, publié sous le nom de *Philonium*, est un traité général de médecine en neuf livres, que l'on peut consulter pour s'instruire de l'état des connoissances à cette époque, soit pour recueillir quelques faits que l'auteur avoit observés, & qu'il désigne constamment sous le titre de *déclarations* (*declarations*). On a donné d'une manière générale, mais sans preuve suffisante, le titre de premier médecin de Charles VI, roi de France, à Balescon, qui désigne ce roi sous le titre de *Carolus albinus*, dont on ignore entièrement la signification.

Honoré Piquet n'a laissé aucun ouvrage pour honorer ou pour affirmer sa mémoire; mais on lui attribue d'avoir obtenu de Charles VIII & de Louis XII l'établissement des quatre régentes fixes dont nous avons parlé, en le considérant comme une des circonstances qui ont été les plus favorables à cette Faculté.

Les médecins de Montpellier citent encore avec honneur, parmi les médecins qui ont appartenu à leur Faculté, le fameux Michel Nissradamus & l'ingénieur & cynique curé de Meydon, dont on a tant parlé sous le nom de *Rabelais*.

Rondelet, dont l'existence est rapportée à l'année 1566, s'occupait en même temps des sciences naturelles & de la médecine. Ce savant, qui fut attaché comme médecin au cardinal de Tournon, fit plusieurs voyages avec lui, surtout en Italie, où il recueillit les matériaux d'un ouvrage très-étendu sur l'histoire naturelle des poissons. Il donna en même temps beaucoup de soins à l'étude de l'anatomie, qu'il cultiva avec un courage qui inspire bien moins l'admiration que le sentiment d'une surprise mêlée d'horreur, lorsque l'on se rappelle que ce courage; cet enthousiasme philosophique, furent portés au point de l'engager à faire lui-même du cadavre de son fils, le sujet d'une démonstration publique. Il fit du reste plusieurs découvertes de détail, & principalement celles de la valvule du cœcum, des fonctions des veines mézaraïques, des valvules des veines de la cuisse, des ventricules & des oreillettes du cœur, &c. &c.

L'anatomie comparée avoit d'ailleurs entré dans ses recherches sur l'histoire naturelle des poissons, & on lui doit d'avoir fait connoître la structure de plusieurs organes dans les différents genres de cette grande classe d'animaux, & dans plusieurs autres classes; travaux dans lesquels il a en pour successeurs trois de ses disciples, Louis Gyllus qui s'occupait des poissons marins, le célèbre voyageur Bellon, qui s'attacha à l'anatomie des oiseaux, & J. Herouald, auquel on doit une onéologie comparée du cheval & de l'homme.

Rondelet porta aussi son attention vers la botanique, qu'il enseigna toutefois d'après Ruellé, dont le commentaire parut vers le milieu du seizième siècle.

On a donné une édition du *Journal de mé-*

(1) *Afric*, *op. cit.* pag. 97 & 98.

écrite de Rondelet, en 1798, in-8°. Rabelais a parlé de ce médecin, dans le livre III de son Pantagruel, sous le nom de Rondelis, faisant ainsi allusion à son nom, à sa petite taille & à son embonpoint.

Jacques Dubois, dont les pédans ont fait Sylvius, fut reçu docteur de Montpellier, dans la seconde moitié du seizième siècle. Ce fut un des galénistes les plus passionnés : disposition d'esprit qui l'engagea dans une discussion très-vive contre Vesale, dont les découvertes anatomiques ne s'accordaient pas toujours avec les assertions du philosophe de Pergame. Il ne devoit point se porter à ces excès, dit Astruc, mais il mérite du moins d'être loué d'avoir su se débarrasser de la crédulité de l'astrologie, dont on étoit de son temps si infatué ; cela fait qu'il étoit au-dessus de son siècle, du moins à cet égard.

Sylvius fut professeur au collège de France ; il eut une grande célébrité comme professeur, & parmi ses ouvrages, dont la collection a été publiée en 1650, on doit distinguer un excellent traité sur l'ordre qu'il importe de suivre pour lire les ouvrages d'Hippocrate & de Galien.

Vieussens (Raymond). Ce médecin appartient bien plus évidemment à la Faculté de Montpellier que Sylvius. Il s'est rendu célèbre par ses travaux anatomiques, mais principalement par ses Tractés sur les nerfs, sur la structure du cœur & les causes de son mouvement, sur la structure de l'oreille, &c. Il a été membre de la Société royale de Londres.

François Roussel, qui paroît avoir le premier pratiqué l'opération césarienne sur les femmes vivantes, est compris par Astruc, & comme Sylvius, parmi les médecins de Montpellier.

Dalechamp & de l'Ecluse, dont on a fait *Clusius*, appartenent, comme les précédents, à la Faculté de Montpellier ; ils contribuèrent à sa célébrité, par la manière dont ils ont cultivé les sciences naturelles.

Laurent Joubert, beaucoup moins recommandable, & cependant aussi célèbre que Rondelet, nous est principalement connu par son livre sur les erreurs populaires, dont on a publié successivement plusieurs éditions.

André Dulaurens, en faveur duquel on créa la charge de médecin ordinaire du Roi, & qui fut ensuite premier médecin, est plus connu par ses fonctions que par ses écrits. Chargé de négocier à la cour, en faveur de sa compagnie, il écrivait qu'il avoit parlé plusieurs fois au Roi, de l'augmentation des gages des professeurs ; que le Roi y étoit porté, mais que M. de Roussy a refusé ; ce qui paroît s'accorder avec ce que l'histoire nous a fait connoître, sur le caractère facile du bon Heuri & sur la fermeté judicieuse de son ministre.

Pierre Dortmann, moins célèbre sans doute que Dulaurens, mérite cependant d'être cité, ne fût-ce que pour avoir rempli le premier, le chaire de

chirurgie & de pharmacie, qui fut instituée à la fin du seizième siècle.

Varandé ou Varandel, professeur de la même Faculté, écrit le premier on l'un des premiers, avec goût & méthode, plusieurs ouvrages consacrés à l'enseignement des différentes parties de la médecine, & à quelques points de médecine pratique.

Turquet de Mayerne. Ce médecin d'une célébrité assez étendue, à la part qu'il prit dans la grande discussion sur les préparations chimiques. Il fut redevable à l'habileté avec laquelle il employoit les préparations, d'une renommée qui le conduisit à être successivement médecin du roi Jacques & de Charles I^{er}. Son fils : situation élevée, dans laquelle il amassa une très-grande fortune.

Renaudot, dont nous avons déjà parlé, & qui vivoit en 1640, fut redevable, comme Turquet de Mayerne, d'une certaine célébrité, à la manière dont il prit part pour les remèdes chimiques, contre la Faculté de Paris.

Lazare Rivière, qui obtint parmi ses contemporains, comme Varandé, beaucoup de célébrité, publia également plusieurs écrits, que l'on ne consulte plus guère que pour y chercher quelques documents relatifs à l'histoire de la médecine (1).

Pierre Magnol, botaniste justement célèbre, succéda à Tournefort dans l'Académie des sciences. On lui doit plusieurs écrits estimables sur la partie des sciences naturelles, qu'il étoit chargé d'enseigner à Montpellier (2).

La peste de Marseille, qui est justement regardée comme un des événements le plus défastreux & le plus mémorable de la première moitié du seizième siècle, se rattache à l'histoire de la Faculté de Montpellier, par le dévouement des médecins de cette Faculté qui furent chargés de la combattre. Ces médecins, dont le courage ne doit pas être oublié dans l'histoire de la médecine, étoient au nombre de trois ; savoir : Chicoyneau (Francois), Verru & Didier. On n'oubliera jamais sans doute le dévouement & le rôle qu'ils montrèrent dans une circonstance aussi pénible ; mais on se rappellera en même temps que ces hommes, assez courageux pour s'exposer à la contagion, furent assez sages pour ne pas la reconnaître & la proclamer avec tout son danger, par égard pour le premier médecin Chirac, qui l'avoit niée d'après des vues paradoxales & d'après une hypothèse, qu'il étendoit jusqu'aux affections puerpérales & à la variole.

Ce médecin, qui appartient également à la Faculté de Montpellier, lui donna beaucoup d'éclat

(1) Ses écrits assez nombreux ont été réunis dans un seul volume in-fol., à Lyon en 1663. (*Ed. princeps.*)

(2) *Botanicum mopsellitense*, 1686, in-8°.

Prodromus historia generalis plantarum in qua familie plantarum per tabulas disponuntur. Montpellier, 1689, in-8°.

par son enseignement & quelques écrits, mais surtout par les succès d'une vie active, qui fut trop souvent employée dans les intrigues du cour, & pour des intérêts tout-à-fait étrangers aux progrès de la loience.

Da reste on doit consulter, pour ce qui concerne la biographie du *co* médecin, l'article qui lui est consacré dans *ce* Dictionnaire; nous rappellerons seulement ici, & comme un trait honorable pour la Faculté de Montpellier, que Chirac d'une part eut le premier l'idée d'une société royale, qui n'eut son exécution qu'à la fin du dix-huitième siècle, & que d'une autre part on lui doit d'avoir essayé de réunir la médecine & la chirurgie, en faisant recevoir, dans la Faculté, des docteurs chirurgiens; ce qui ne put s'exécuter qu'en réformant les statuts de cette compagnie.

Barbeyrac avoit été le maître de Chirac; Boaden lui donne de justes éloges & le compare à Sydenham, dont il étoit le contemporain : ces deux médecins, dit *ce* philosophe, n'étoient point savans, mais ils étoient sages, ce qui vaut beaucoup mieux pour l'exercice journalier de l'art. Leur esprit flexible avoit été formé d'une étincelle de celui d'Hippocrate, avec quelque mélange de celui d'Aesculapide, un peu de ressemblance avec celui de Van-Helmont, non sans quelques légères teintes de la physique des modernes. Da reste, & en nous appuyant toujours des mêmes témoignages, Chirac fut véritablement chef de école : il se déclara à Paris en faveur de la saignée, & publia sa théorie, qui captiva les Français de même que sa pratique. Il effraya tous les autres médecins de Montpellier qui avoient obtenu successivement la confiance des rois de France, depuis Henri I^{er}, jusqu'à Louis XV.

Sylva, Duret & bien d'autres appeloient Chirac *notre maître* : ceux qui l'avoient le moins goûté, & même poursuivi, adoptèrent ses opinions avec le plus de vivacité. Les enfans de ses ennemis succédèrent encore son système, qui a décliné en bien des points aux enfans de ses amis, & qui méritoit de leur déplaire, ajouterons-nous, par l'exagération avec laquelle on y applique aux phénomènes de l'organisation, le système de Descartes, & la théorie que l'on a défigurée depuis sous le nom d'*iatro-mathématique*.

La pratique, appuyée sur une pareille théorie, fut malheureusement aussi active, aussi turbulente qu'elle étoit peu fondée : ce fut l'époque où l'on produisit les émissions sanguines, & où l'on eut la prétention de guérir des saignées, *dépletives, spoliatives, dérivatives*. Un médecin de cette époque ne craignoit même pas d'avancer qu'il assujettiroit la petite-vérole à ses lois, ou bien qu'il l'accoutumeroit à la saignée.

Ce médecin, disons-nous avec un philosophe qui a répandu tant d'éclat sur la Faculté de Montpellier, n'a pas été le seul à mettre ainsi en avant ses sentimens décidés qu'il faisoit faire passer à la

laveur de quelques bons mots, moyennant lesquels le public le seroit même livré à des expériences.

C'est ainsi qu'en suivant leur principe, ils ont souvent essayé d'éteindre la fièvre, à force de saignées : il y en a même qui n'ont pas eu la patience d'attendre trois ou quatre jours, pour laisser user la rongole; ils ont prétendu la vaincre, l'éteindre par de fréquentes saignées; il y en a enfin qui ont porté leurs projets jusqu'à vouloir détruire & supprimer le venin de la petite-vérole, ou le rendre impuissant par le suet qui lui porte, à force de saignées & de lavages (1).

Il passe pour certain, ajoute ingénieusement le même auteur, que nos remèdes, notre éméétique, notre quinquina, nos saignées, nos vésicatoires, nous donnent par les anciens médecins le même avantage que les armes à feu donnaient aux militaires pour le siège des places. Nous avons changé la médecine comme on a changé la guerre.

Fixes, dont s'honore la Faculté de Montpellier, porta très-loin cette pratique turbulente & active de la médecine, & d'après des procédés qui permettent de supposer qu'il ne voyoit partout que des matières peccantes à combattre, ou des humeurs à faire couler par des purgatifs. On a vu de ce genre beaucoup vanté la grande expérience de *co* médecin, la rapidité de son coup d'œil, & nous dirions presque de l'insaisissabilité de ses pronostics. Ce médecin a publié quelques écrits qui sont peu estimés : il avoit en pour concentrer dans ses épreuves académiques, Ferrein qui devoit dans la suite membre de l'Académie des sciences.

Nul autre praticien, peut-être, n'a donné lieu à un plus grand nombre de ces petits traits & de ces anecdotes, qui appartiennent plutôt à des recueils d'ana qu'à l'histoire d'une science aussi grave & aussi importante que la médecine.

Aflic & Sauvages appartiennent encore à la deuxième époque de la Faculté de Montpellier : on doit au premier plusieurs ouvrages justement estimés, mais principalement son *Traité des maladies syphilitiques*, dont le premier volume peut être regardé comme un modèle de recherches & de discussions sur les points les plus obscurs & les plus difficiles de l'histoire de la médecine.

QUATRIÈME ÉPOQUE.

Étude de l'homme & de la médecine dans les phénomènes particuliers & les lois générales de l'organisation.

Am commencement du 18^e siècle, la Faculté de médecine de Montpellier avoit obtenu deux nouvelles chaires avec des honoraires fixes, les

(1) *Essai de Boissac, op. cit., pag. 141.*

chaires de chimie & de médecine pratique, ce qui d'existoit par la Faculté de Paris.

Cette circonstance des réidences fixes, dont nous avons déjà indiqué les avantages, l'usage du concours auquel on dérogeoit quelquefois sans l'abandonner entièrement, les accroissemens progressifs du Jardin de botanique, l'émulation entre les professeurs, tout se réunissoit pour donner à la Faculté de Montpellier, dès la première moitié du 18^e siècle, une grande & juste célébrité.

Sauvages parut en quelque sorte une nouvelle carrière de gloire & de progrès pour cette compagnie, non-seulement parce qu'il avoit essayé & beaucoup mieux qu'on ne l'avoit fait avant lui, de jeter les bases de la nosographie, mais parce qu'en même temps, il commença dans l'étude de la physique animale, une révolution qui devoit s'achever plus tard, & à laquelle des hommes plus célèbres ont attaché leur nom & leurs travaux. En effet, Sauvages, sans abandonner le langage des mécaniciens, que Boerhaave appuyoit de toute la force d'une raison supérieure & de l'esprit le plus exercé, avoit menacé les points fondamentaux de leur théorie, & fait connoître la doctrine de Stahl. « Sauvages, dit à ce sujet M. Prunelle, est le premier médecin français qui ait attaqué Boerhaave, en démontrant que l'obstruction des vaisseaux capillaires ne peut pas être la cause nécessaire & immédiate de l'inflammation; puisque cette obstruction, loin d'augmenter la force du cœur & la vitesse du sang, comme le prétend Boerhaave, tend au contraire à diminuer l'une & l'autre. Sauvages, en examinant ensuite particulièrement chaque symptôme de l'inflammation, se trouvoit amené à conclure qu'une force motrice indépendante de l'action du cœur & de celle des artères, déterminé le sang à affluer dans telle ou telle partie, & devient la cause des phénomènes de l'inflammation. Ainsi, quoique le professeur de Montpellier cherchât à expliquer, d'une manière mécanique, tous les mouvemens qui ont lieu dans l'économie animale, il en retrouvait la cause première dans l'âme pensante; & c'est ainsi qu'il cherchoit à allier la théorie de Stahl avec celle des mécaniciens. Sauvages, en suivant cette méthode, s'est opposé souvent aux théories mécaniques qui étoient généralement admises de son temps. Il me paroît donc que l'on se trompe généralement, en regardant Sauvages comme partisan exclusif de ces dernières théories (1). »

Du reste, ce ne fut pas seulement cette nouvelle direction de connoissances physiologiques & médicales, dont nous devons parler avec quelques détails, qui répandit un grand éclat sur la Faculté de médecine de Montpellier dans le 18^e.

siècle. La chimie, les sciences naturelles, la médecine pratique n'y furent pas cultivées avec moins de succès par des hommes qui méritoient d'être regardés comme les successeurs d'Arauc de V. le neuve, Gai de Chaulio, Rondelet, &c.

Ainsi Gouan, plus célèbre encore par ses disciples (1) que par ses écrits (2), & qui fut lui-même élève du grand Tinné, avoit rempli avec autant de zèle que de gloire la chaire de botanique.

Venel avoit joni également, & avec raison, d'une plus grande célébrité, en portant dans la chimie les vues d'une raison élevée & les habitudes de l'esprit philosophique, que l'on retrouve partout dans son article Chimie de l'Encyclopédie.

Leroy de Montpellier, dont la vie entière fut consacrée à la médecine, jeta, comme en passant, un coup d'œil sur une portion de la physique, qui avoit le plus de rapport avec cette science, l'hygrométrie, dont il prépara les progrès par des expériences aussi importantes qu'ingénieuses, sur les véritables causes de l'humidité & de la sécheresse de l'atmosphère. Il eut dans l'enseignement un succès dont il fut redevable à ses connoissances très-étendues & à l'usage de professer en français. Ou lui doit de bonnes observations sur les eaux de Belduc, plusieurs mémoires qui ont été recueillis en partie dans ses Mélanges de physique, & son Traité du pronostic dans les maladies aiguës.

Les savans professeurs dont nous venons de rappeler les services, furent à peu près étrangers, si l'on en excepte Sauvages, à la révolution qui s'opéra dans la doctrine de Montpellier, & que l'on doit rapporter aux systèmes de Vanhelmont & de Stahl. Il n'en fut pas ainsi de Delamure, dont les connoissances étoient fort étendues, & qui s'occupa de physiologie expérimentale, d'anatomie, de médecine pratique, &c.

Ce savant ne craignit pas de se montrer contraire à Boerhaave, & d'adopter quelques-unes des idées de Stahl : Bordieu porta plus loin, les hautes & importantes spéculations. Livré de bonne heure à la médecine pratique & à l'étude des Anciens, il ne put voir sans un esprit d'opposition, les applications intempestives & prématrices que ses plus illustres contemporains faisoient continuellement de la physique ou de la chimie, aux phénomènes de l'organisation, dans l'état de santé & dans l'état de maladie. Enceint des dogmatismes, & avec connoissance de cause, il paroît, dans la suite, n'avoir composé l'un de ses ouvrages les plus

(1) Commerson, le compagnon de Bougainville dans le voyage autour du monde, de Lamarck, qui accompagna Lapeyrouse, Ricce, Lullin, de, &c.

(2) *Methodus botanica*. — *Historia piscium*. — *Flora montanensis*.

(1) Voyez M. Prunelle, *Éloge de Dumas*.

originaux & les plus attachans, ses *Recherches sur quelques points de l'Hygiène de la médecine*, que pour le poursuivre sous toutes les formes qu'il a présentées depuis son origine, & faire ressortir les avantages d'un empirisme rationnel, ou même, dans plusieurs cas, d'un empirisme populaire.

Ces idées, cette manière de philosopher, devoient l'éloigner sans doute d'un système quelconque. Elles l'engagèrent à observer, à comparer avec plus de soin, & dans ce qui leur étoit propre, surtout au milieu des mouvemens & des révolutions qui constituent les maladies, l'état des organes, leur structure, leur propriété, l'action ou la réaction de chacun d'eux, enfin leur manière d'être ou de vivre, ainsi que le résultat d'un mouvement aussi compliqué, & dont les causes premières font si éloignées, du moins dans l'état de nos connoissances, de ce qui se passe dans les corps inorganisés.

Van-Helmont & Stahl donnoient nécessairement une grande impulsion à l'esprit de Bordeaux, lorsque des peits faits de la pratique, ou des détails de la maladie, il s'élevait à ces hautes spéculations, sans avoir jamais le désir ni l'ambition d'en former un système.

Sa prédilection pour ces deux grands chefs de sectes a été souvent exprimée dans ses écrits. Voici, fait-il dire à son docteur des Pyrénées, dont l'entretien est au moins aussi attachant, & beaucoup plus animé, plus instructif, que la confession tant vantée du vicairé favoyard, dans l'*Émile* de Rousseau : « Voici, dit-il, mes maîtres, crits & ceux de mes pères ; c'est un corps de médecins propre à notre pays ; je le destine pour mon fils : il m'a emporté de très-bons morceaux de Stahl que je regrette beaucoup : Stahl est, à mon avis, le roi des modernes, qui me paroissent avoir un peu trop loué Sydenham. »

« Il s'éleva, dit Bordeaux dans le même écrit, une secte qui attribua tous les phénomènes du corps vivant à l'âme spirituelle & raisonnée. Stahl fut auteur de cette secte renouvelée des Anciens ; il eut beaucoup de partisans, & il lui en restait encore. L'action de l'âme sur le corps, les révolutions que cette action opère dans les maladies, les effets singuliers des passions ; tout cela bien exactement combiné & établi par les faits que la pratique journalière apprend aux médecins, entraîne aisément dans les opinions de Stahl (1). »

Le penchant de Bordeaux pour Van-Helmont n'est pas moins vivement exprimé dans son dialogue avec le vieux docteur de la montagne.

« Ce Van-Helmont, selon ce vieillard, est le vainqueur de l'ancienne école : il fait mes délices : je le prends souvent le soir pour m'endormir gaiement.

« Il n'est pas possible de pénétrer un peu avant dans l'étude de la physique du corps vivant, dit ailleurs Bordeaux, sans rencontrer les traces de Van-Helmont, & sans être étonné de l'étendue des routes qu'il s'est ouvertes. Cet homme, moins éloigné de nous, & moins incompréhensible que Paracelse, n'en fut pas pour cela moins extraordinaire. Il vécut, je dirais presque, il régna dans le seizième siècle.

« Emporté par son enthousiasme, piqué des lenteurs & des vaines promesses de la médecine galénique, dont il éprouva l'impuissance par lui-même, aiguillonné par le sentiment de supériorité que son génie lui donnoit sur tous les autres médecins, il jura la perle du galénisme, & il acheva de réduire en poussière le monstre abattu par Paracelse.

« Ses bouillantes sorties contre l'école, ses analyses des systèmes de Galien et des Arabes, ses observations sur les lésions des parties, les archées ou ses êtres particuliers qu'il établit pour surveillans de chaque organe, son maître-archée qu'il plaça dans l'estomac, pour de là régir tout le corps, ou pour diriger les mouvemens de la santé & ceux des maladies : tous ces aperçus & tant d'autres de la même espèce, font autant de preuves de son génie créateur ou vraiment observateur.

« Il est certain que le salubritisme dut sa naissance à Van-Helmont ; on ne peut nier que ceux qui font de chaque partie du corps un organe, ou une espèce d'être ou d'animal, qui a ses mouvemens, son action, son département, ses goûts & sa sensibilité particulière, n'aient puisé dans la même source que les salubrités.

« Van-Helmont s'est bien mieux expliqué sur tous ces points que les Anciens, quoiqu'ils eussent regardé la matrice comme un véritable animal, ce qu'il étoit aisé d'appliquer à tous les autres viscères.

« Ceux qui pensent que l'estomac, le diaphragme & les autres parties de cette région, influent d'une manière particulière sur toutes les fonctions de l'économie animale, doivent au moins à Van-Helmont d'avoir aperçu mieux, que tous ses prédécesseurs, les faits & les observations qui démontrent cette influence, & qui lui avoit fait imaginer son archée résidant à la partie supérieure de l'estomac.

« Ceux qui sont pénétrés, comme on doit l'être, des effets singuliers que l'âme fait sur le corps, tant dans l'état de santé que dans celui de maladie : ceux à qui la pratique de la médecine & l'étude de l'homme apprennent que le physique est essentiellement lié au moral dans la plupart des fonctions de la vie, ces médecins philosophes peuvent mettre Van-Helmont à leur tête, & espérer qu'en suivant le fil de ses opinions, ils parviendront à établir, sur l'économie animale, un

(1) Bordeaux, op. cit.

ystème beaucoup plus raisonnable que tous ceux que l'on a publiés jusqu'à présent (1). »

Borden le définit, s'expose lui-même dans ces passages ; se montre encore plus à découvert dans le passage suivant, où, tout en paraissant avoir seulement en vue la doctrine de l'école de Montpellier, il fait en quelque sorte, & comme à son insu, une profession de foi physiologique, & une déclaration du petit nombre d'idées fécondes, auxquelles il rapportoit les parties les plus élevées & les plus délicates de la science de l'homme.

« Cette école (l'école de Montpellier) se distinguait toujours, dit Borden, par la liberté qu'elle laisse à ses membres, au sujet de toutes les disputes qui s'élèvent en médecine ; elle souffrait des discussions fort éloignées des principes usuels & journaliers. C'est de cette liberté de penser que font naître, il y a quelque temps ; bien des dissertations au sujet de l'opinion de Stahl, ou celle des Anciens, sur l'action de l'âme.

« On y est parvenu peu à peu à l'établissement d'une opinion mixte, également éloignée des excès de Stahl, & de ceux qui avoient pensé que les corps vivans se conduisoient par les lois ordinaires du mouvement. On y a soutenu, & plusieurs des membres de la Faculté y font encore, que le corps animal contient un principe de vie & d'action dépendant de son essence.

« Cette vie & cette action ne sont, à proprement parler, que la vertu de sentir propre aux organes & aux nerfs des animaux ; les nerfs sont les principes de tout mouvement & d'une sorte de sentiment nécessaire à toutes les actions de la vie.

« L'âme spirituelle, jointe au corps vivant, a ses fonctions particulières : elle agit sur le corps, & elle en reçoit des modifications ; mais la vie corporelle est due à l'être animal ou vivant, être distinct, par sa nature ou par ses dispositions essentielles, de tous les autres corps, être auquel les bêtes approchent beaucoup plus que les plantes, qui jouissent pourtant d'une nuance ou d'une portion de vie corporelle.

« Les Savans ont reçu avec empressement les expériences & les réflexions d'un médecin philosophe des plus distingués de ce siècle, Haller : il a pris l'irritabilité des parties du corps vivant pour un principe général, & il l'a mis à la place de la sensibilité, qui avoit même été regardée comme un principe général dans l'école de Montpellier, avant qu'il fut question de l'irritabilité considérée sous ce point de vue.

« Or la sensibilité paroît plus aisée à comprendre que l'irritabilité, & elle peut très-bien servir de base à l'explication de tous les phénomènes de la vie, soit dans l'état de santé, soit dans l'état de la maladie. Au reste, ces deux opinions se ressem-

blent beaucoup, & elles ont eu de grands partisans en Angleterre.

« Telle est donc la façon de considérer le corps vivant de la part de ceux qui, parmi les Modernes, ont porté leurs spéculations au-delà de la médecine pratique & des systèmes reçus dans les écoles du commencement du siècle. Tel est l'effort que prend la médecine philosophique dans ce qui concerne les fonctions purement matérielles du corps. Les médecins anciens n'ont pas fait de moindres efforts pour développer la cause & les phénomènes de la vie & de ses fonctions.

« Cette opinion sur les élémens du corps vivant, sensibles par leur essence, & qui ne cessent d'être les principes de la vie jusqu'à ce qu'ils aient perdu, par la pourriture ou autrement, la disposition qui les caractérise ou qui les conserve dans leur état d'être vivants ; cette opinion, dis-je, se joint fort aisément à celle dont il a été question au chapitre III.

« Il y est parlé d'une classe d'observateurs qui ramènent tous les mouvemens du corps au développement de l'action des nerfs : suivant eux, cette action a deux sources principales, la tête & la région moyenne du corps attenant le cœur, l'estomac, le diaphragme & les entrailles.

« Ces deux sources semblent être dans un contre-balancement perpétuel, & ce contre-balancement entretient les fonctions, d'autant que ces dernières ne sont, pour ainsi dire, que des traductions ou des développemens de l'action qui se répand à la faveur des nerfs, depuis les deux centres d'actions jusqu'aux extrémités.

« Mais comme l'essence de la vie du corps animal consiste dans une sorte de mouvement & de sentiment, ou bien dans une disposition à ces deux modifications, il est nécessaire que chaque fonction de la vie soit mêlée de mouvement & de sentiment ; c'est en effet ce que l'expérience démontre : il y a des fonctions dans lesquelles le sentiment domine, & alors l'âme, unie au corps vivant, sent, par son action sur le corps, le premier rang dans ces soulèvemens ; d'autres, au contraire, semblent ne dépendre que de la sensibilité purement vitale, sans que l'âme paroisse y entrer pour quelque chose.

« Il en est de même des fonctions caractérisées par ce mouvement : dans les unes il est très-sensible à l'âme le dirige, dans les autres il est sensible aussi, mais il semble indépendant de l'âme ; il en est dans lesquelles le mouvement paroît être le sensible. Cette vicissitude de mouvemens évidens, de sensations évidentes, de mouvemens obscurs & de sensations obscures, fait la chaîne des fonctions de la vie & en entretient l'usage & la durée.

« Le règne du sentiment ou de la sensibilité est des plus étendus, le sentiment revient dans toutes les fonctions ; il les dirige toutes, il domine sur les maladies, il conduit l'action des remèdes ; il devient quelquefois tellement dépendant de l'âme,

(1) Borden, *op. cit.*, pag. 383 & suiv.

que ses passions prennent le dessus sur tous les rangemens du corps; il vario & se modifie différemment dans presque toutes les parties.

« Il régit principalement l'ellomao; dont les fonctions dépendent d'un fonds de sensibilité trop connue par tous les sauteurs de physiologie ordinaire; ils n'ont considéré ce viscère que comme un réservoir presque passif, ou tout au plus un peu mobile : au lieu qu'il est doué de beaucoup de sensibilité, dont les divers degrés (ou les divers goûts) se manifestent à chaque instant, & entretiennent ou bouleversent la marche & l'écoulement de toute l'économie animale.

« Ainsi, l'ellomao ou ses appartenances, qui font un centre principal pour les mouvemens du corps, le font de même pour ses divers degrés de sentiment. Tellé est la matière & l'étendue des spéculations des médecins philosophes les plus modernes, eu égard aux principes de la vie & à l'organisation de ses fonctions, si l'on peut s'exprimer ainsi. » (Bordeu.)

Il suffiroit, pour compléter l'exposition de ce que l'on peut regarder comme la doctrine de Bordeu, d'ajouter à ces considérations quelques aperçus sur l'existence particulière des différens organes, leur département respectif ou leur sphère d'activité, l'importance, l'étendue des communications du tissu cellulaire, la structure & le mode d'action des glandes, & l'influence de la sensibilité dans toutes les sécrétions & excréctions substatées, d'après les données les plus positives de la médecine & de l'anatomie, à l'explication mécanique de ses phénomènes.

« Au reste, disoit l'auteur lui-même, après avoir retracé les principaux traits de sa doctrine dans le passage que nous venons de citer, l'organisme moderne laisse bien loin de lui les copilles & les commentateurs des Hequet, Baglivi & autres de cette espèce, qui ont tant parlé de ressorts, d'élasticité, de battemens, de fibrilles. Ces physiciens légers feroient aussi éloigner des vrais principes d'observation qui conduisent dans les détours des fonctions de l'économie animale, que des enfans qui jouent avec des morceaux de cartes pour bair de petits châteaux, sont éloignés des belles règles d'architecture.

« Qu'on nous fasse donc grâce, une fois pour toutes, de ces ressorts, de ces leviers, de ces poulons de vaisseaux, de ces fibrilles, de ces pressions comme de ces globules, de ces épaissemens, de ces pointes, de ces lymphes, de ces marteaux, & tant d'autres petits meubles des ateliers mécaniques dont le corps vivant a été rempli, & qui feroient pour ainsi dire les joujoux de nos pères. » (Bordeu.)

Bordeu, dont les idées & les aperçus sont réfléchés & comme réduits dans ces fragmens, les a développés successivement dans une suite d'écrits dont nous devons une édition récemment publiée

& justement estimée, à M. le professeur Richerand.

Cette chaîne féconde de pensées & d'observations sur les différens points de laquelle l'auteur est souvent revenu pour les fortifier & les étendre, se rattache à sa dissertation sur la sensibilité considérée en général (*de sensu generico considerato*), qu'il publia lorsqu'il avoit à peine atteint sa vingtième année. Les idées énoncées dans cette dissertation parurent avec un nouvel éclat, avec une extension & des applications qui ajoutaient beaucoup à leur prix. « d'abord dans les *Recherches anatomiques sur les glandes*, puis dans le *Traité des recherches sur les maladies chroniques & l'analyse médicale du sang* : ouvrage que l'auteur offrit en quelque sorte au public, comme le résumé & le résultat de tout ce qu'il avoit pensé, vu, examiné comme anatomiste, comme praticien, & surtout comme médecin philosophe : titre honorable & qu'il ne mérita que trop bien, puisque dans son existence médicale & dans les tribulations de sa vie privée, il fut plus à portée qu'aucun autre de voir de trop près, pour son bonheur, les ressorts les plus inépuisables & les mystères les plus honteux du cœur humain (1).

Plusieurs médecins qui ont été, comme Bordeu, l'honneur de l'école de Montpellier, se font rangés parmi ses disciples; le font principalement Fouquet, Lacaze, Moussé, Robert Desèze & jusqu'à un certain point, Cabanis, dont le bel ouvrage sur le rapport du moral & du physique de l'homme est plus rapproché des spéculations ingénieuses de Bordeu, que de l'état présent des connoissances physiologiques & médicales.

Bordeu, que nous ne craignons pas de représenter comme le médecin français qui a montré le plus de cette vivacité d'esprit & de cette fécondité d'aperçus qui constituent le génie, n'avoit pas voulu devenir un chef de secte, ni ajouter un nouveau système aux différentes hypothèses qui se sont succédées en médecine depuis les premiers dogmatiques, quatre siècles avant l'ère chrétienne, jusqu'aux théories chimiques, iatro-mathématiques & alchimiques du dix-huitième siècle.

Il n'en fut pas ainsi de Barthes, qui, avec beaucoup moins de génie & d'esprit d'observation que Bordeu, n'en a pas moins de célérité. Plus savant, plus érudit, mais beaucoup moins livré à cette méditation glorieuse, à cette étude contemplative de soi-même & des autres, qui conduisit à l'esprit véritablement philosophique, il voulut porter dans l'étude des phénomènes de l'organisation, les procédés, les méthodes d'après lesquels, dans les sciences moins compliquées, on groupe autour d'un seul ou dernier fait, que l'on

(1) Voir l'article BORDEU dans ce Dictionnaire : son auteur avoit son *Eloge historique*, par Ruffin; & la biographie imprimée que photographique dont M. Richerand a enrichi l'édition de Bordeu qui nous venons de citer.

appelle

appelle *principe*, les faits qui se trouvent alors enchaînés, & ordonnés de manière à former une véritable science ou un corps de doctrine.

Les physiiciens, conduits par Newton, étoient parvenus à rapporter à ce dernier fait, qu'ils ont appelé *gravitation universelle*, les phénomènes astronomiques. D'une autre part, suivant la manière ancienne & générale de concevoir les phénomènes intellectuels & moraux de l'homme, on les avoit rattachés également à un seul principe, l'âme.

Barthez, qui n'avoit jamais complètement abandonné les idées des anciens philosophes sur les causes occultes, suivant la remarque de M. Prunelle (1), voulut à son tour disposer en corps de science, tous les phénomènes de la vie, dans l'hypothèse d'un principe vital; sans s'apercevoir qu'en substituant ainsi ce principe aux propriétés des organes, il travailloit sur des faits trop compliqués pour les faire dépendre d'une cause unique: son hypothèse se montra bientôt avec toute son inexactitude, lorsque l'auteur & les partisans, tout en répétant que ce principe n'étoit qu'une abstraction, le personnifioient sans cesse, & parloient des actions, des opérations du principe vital, comme des affections ou de l'existence d'un être distinct de l'âme & du matériel de l'organisation.

Ce principe étoit évidemment hypothétique; le système auquel il sert de base, étoit donc lui-même dans la classe de ceux que Condillac a rangés sous ce titre, & que la saine philosophie ne peut admettre. A l'époque où il parut, on n'avoit pas encore été aussi frappé qu'on l'a été depuis, de la nécessité de tout rattacher, en pathologie, à la physiologie, à l'anatomie physiologique & médicale, c'est-à-dire, à la structure des organes, aux propriétés de ces organes, toujours modifiées par leur structure, ou aux fonctions dépendantes de ces propriétés; enfin au dérangement ou à l'altération de ces mêmes propriétés, de ces mêmes fonctions; désordre qui ne peut se concevoir sans un changement appréciable ou non appréciable des parties du corps vivant: ce qui exige toujours des explications, des connoissances de détail qui peuvent rendre, à la vérité, l'étude de la médecine moins abstraite, mais beaucoup plus compliquée, plus longue & plus difficile.

Un système où tout s'expose, tout s'explique par la synthèse, comme dans celui de Barthez, devoit être jugé sévèrement, & même paroître obscür à la lecture; mais il devoit esmer en même temps un véritable enthousiasme dans les écoles: ce qui arriva aussi, & d'une manière d'autant plus remarquable, que le professeur présentoit les développemens de son hypothèse avec toute la dialectique & l'éloquence des anciens philosophes, & les ressources d'une érudition à laquelle aucune partie des sciences naturelles n'étoit étrangère.

« Da resse, ce principe vital, dit un disciple de Barthez, qui voulut à son tour devenir chef de secte, ce principe est régi par des lois qui n'ont rien de commun avec celles de la mécanique, de l'hydraulique, de la physique & de la chimie. Il est bien distinct de l'âme pensante, & il opère d'une manière également active sur les solides & sur les fluides, par l'intermédiaire des facultés sensibles & motrices, qui sont inhérentes à chaque partie du corps qu'il anime. Barthez développa l'action de ces deux forces dans le tissu des organes & dans la masse des humeurs; il établit les caractères qui les distinguent, les rapports d'influence qu'elles ont l'une sur l'autre, & les changements qu'elles éprouvent dans les différentes circonstances d'âge, de sexe, de tempérament & de maladie. Il évalua les proportions de ces forces dans chaque système d'organes, & la nécessité pour la permanence de leur exercice, que les principaux organes communiquent ou sympathisent entre eux & avec leurs systèmes respectifs (1). » (Dumas, *Physiologie*, tom. I, pag. 154.)

L'intérêt, le succès de cette nouvelle doctrine, augmentèrent lorsque le célèbre professeur en étendit les applications, & que par elles il jeta souvent un nouveau jour sur les maladies nerveuses; la doctrine des sympathies & des tempéramens, des fluxions, des méthodes thérapeutiques.

Quelle que soit d'ailleurs la destination de l'hypothèse de Barthez, à laquelle il a dû tant de renommée pendant sa vie, il seroit injuste de la regarder comme la source unique de la gloire personnelle & de l'éclat que ce philosophe a répandus sur la Faculté de Montpellier. Sa biographie n'ayant pu entrer à son article, dans ce Dictionnaire, nous demandons qu'il nous soit permis de lui consacrer ici quelques traits, que nous regardons comme inséparables de l'histoire de la Faculté, qui le compte avec raison parmi ses membres les plus célèbres.

Barthez étoit né en 1734, & reçut sa première éducation à Narbonne, avec des circonstances qui pourroient lui donner le droit d'entrer dans l'histoire des enfans célèbres. Après avoir terminé cette éducation, il étudia la médecine à Montpellier, où il fut reçu médecin à l'âge de dix-neuf ans; il s'annonça ensuite dans la carrière littéraire, en méritant, par deux dissertations très-savantes, deux prix à l'Académie des inscriptions.

Le sujet d'un ouvrage beaucoup plus important pour lui & pour l'humanité, lui fut offert dans la maladie régnante du Contentin, en 1756, où il crut reconnoître les symptômes de l'érysipèle du pommou des Anciens, & qu'il traita d'après cette idée, par l'emploi successif ou sagement combiné des saignées plus ou moins abondantes, au début de la

(1) *Eloge de Dumas*, 1^{re} partie.
MÉDECINE. Tome X.

(1) *Orat. de princip. vital. homin. nov. doctrina*, &c.
Nouveau système de la science de l'homme.

maladie, avec l'application des vésicatoires après les saignées, & l'emploi suivi de l'oxyde d'antimoine du troisième au quatrième jour, de quelques purgatifs pour favoriser la convalescence.

Ses observations sur le traitement de cette maladie, que l'on pourroit regarder comme le début de Barthez dans la médecine pratique, furent présentées à l'Académie royale des sciences, & publiées dans le tome III des *Œuvres étrangères*. Ce premier succès le conduisit à être employé, avec le titre de *médecin consultant*, à l'armée de Hanovre, où il fut atteint lui-même d'un fièvre suppurée, dont il fut traité par Wiegand; ce qui établit entre lui & ce médecin célèbre, une liaison qui ne s'est jamais altérée. A son retour de l'armée, Barthez obtint par le concours une place de professeur dans la Faculté de Montpellier, & fut installé le 17 avril de l'année 1761.

Ce fut alors surtout qu'il voulut embrasser, dans une vue très-étendue, & malheureusement trop abstraite, les phénomènes de l'organisation; ce qui le conduisit à publier successivement sa Dissertation sur le principe vital (1), ses spéculations sur les fonctions de la nature humaine (2); enfin son *Traité de la science de l'homme*, dont le premier volume parut dès 1778, quoique l'édition entière, mais nouvelle, n'ait été publiée qu'en 1806.

Cette doctrine, dont les ouvrages que nous venons de citer ne se bornent que les bases ont le squelette, fut exposée par l'auteur, dans ses leçons, pendant vingt années consécutives. « Que ceux qui l'ont entendue, dit à ce sujet l'un de ses panégyristes, nous apprennent comment cette doctrine étoit commentée dans les cours, & enrichie de tous les détails qu'elle pouvoit comporter. Ne devoient-ils pas, ajoute le même auteur, mettre une différence entre des lecteurs instruits & des disciples qu'il falloit instruire? Des idées bien généralisées eussent suffi, dans son esprit, aux premiers; des développemens lumineux convenoient aux seconds. Pour les uns, il eût préféré l'art de bien enchaîner les faits; pour les autres, il sentoit que les aperçus n'étoient utiles qu'autant qu'ils étoient suivis par les conséquences. Comme celles-ci avoient leurs applications, c'est alors qu'à théorie recevoit la sanction de l'expérience, & que ses phrases aphoristiques perdoient toute leur ambiguïté. Une étude immense venoit prêter à sa richesse & son éclat à tout ce qu'il tiroit de son propre fond. Voilà le professeur; son talent ne se confie pas toujours à dire ce qu'il pense, mais à parler au nom de ceux qui l'ont devancé; c'est l'état de la science qu'il fait qu'il trace; c'est l'histoire des maux qui pèsent sur l'homme, qu'il doit faire; les erreurs même qu'il fouvent nous

apprennent à les éviter, demandent à être généralisées par lui; & ce qui, par une sorte d'oséogénation, pourroit prendre les formes du pédanisme pour celui qui n'a que son esprit à orner, devient, pour quiconque est chargé de l'enseignement, une tâche qui, pour être au-dessus de bien des gens, n'en est pas moins, lorsqu'elle est remplie, une des conditions aux-
quelles le génie s'attache pour mettre en évidence & ses ressources & les moyens (1).

Plusieurs des disciples de Barthez, mais principalement Ponsart & Thibault, descendirent, pour leurs épreuves inaugurales, différents thèses que le maître avoit composées; une de ces thèses traitoit de la mort, & sous ce point de vue aussi philosophique que médical.

Un trait particulier de la vie, de Barthez avoit attaché pour lui un grand prix au sujet de cette dissertation. Une grande dame à laquelle il donnoit habituellement des fous, les réclama à moment où; mais elle-même, il ne pouvoit lui montrer son empressement & son zèle. Il apprenoit bientôt que cette dame s'étoit couchée à son mal, que ses amis la pleuraient, & que son appareil funéraire se préparait. Il s'arracha alors de son lit, persuadé, d'après quelques données particulières, qu'un simple accès de léthargie hystérique n'étoit pris pour une cessation absolue d'existence. Il arriva dans cette idée auprès de la prétendue morte, & faisant couvrir de glace toute la surface de son corps, il la rappela ainsi à la vie, en paroissant opérer une véritable résurrection (2).

Quelques autres dissertations composées par Barthez, ont été défendues à différentes époques par ses disciples; quant aux divers ouvrages qu'il a publiés successivement sous son nom, ce sont, & dans l'ordre chronologique, 1°. le *Mémoire que nous avons cité*, & qui le trouve dans la collection des *Mémoires de l'Académie des sciences des savans étrangers*; 2°. les *nouvelles Elémens de la science de l'homme*, première édition & premier volume; 3°. la *nouvelle Mécanique pour les mouvemens de l'homme & des animaux*; 4°. le *Traité des maladies goutteuses*, 2 volumes in-8°; 5°. quelques mémoires dans les *Recueils de la société médicale d'émulation*; 6°. le deuxième volume des *Elémens de la science de l'homme*, & une deuxième édition du premier, ou plutôt une nouvelle édition de la totalité de l'ouvrage.

Dans la pratique de la médecine, Barthez s'attacha d'une manière toute particulière au traitement des maladies chroniques. « Plusieurs de ses méthodes curatives, dit M. Baumes, étoient aussi neuves que sa doctrine, dont elles étoient le complément; il les a si sagement appliquées au traitement des affections nerveuses, des fièvres inter-

(1) *De principio vitali humani*, 1772.

(2) *Novæ doctr. de princ. naturæ humanæ*, 1774.

(1) Baumes, *Eloges académiques*.

(2) *Eloge de Barthez*, par M. Baumes, pag. 48.

mittentes ou rémittentes pernicieuses, des fièvres malignes & autres maladies, qu'il n'est pas aujourd'hui de méthode curative pour les combattre, mieux perfectionnée. Qui a plus utilement montré la nécessité d'alterner ou de combiner les remèdes toniques & nervins, avec les excitans & les sédatifs, pour attaquer ces affections dans lesquelles les lésions organiques, permanentes ou successives de la sensibilité, déterminent de si grands désordres par l'action de causes même légères ? Qui avoit vu, avant lui, l'utilité de l'opium adouci seul & à forte dose, pendant les accès de fièvres rémittentes graves, & l'efficacité de cette substance, associée au quinquina, hors des accès de ces mêmes fièvres ? C'est par les ressources que lui fournirent ces méthodes curatives si fécondes & généralement heureuses, que Barthez se guérit d'une fièvre qui tour à tour avoit emprunté les diverses formes connues, & dont il fut attaqué à Narbonne. Il avoit été fagacièrement flêté d'un succès qui confirmoit la bonté de ses vues, & il aimoit à répéter qu'il s'étoit guéri lui-même.

La réputation & les succès de Barthez attirèrent d'abord les étrangers, qui accoururent des points les plus éloignés, réclamer ses soins & présenter à son observation toutes les chances, & les exemples des maladies les plus dignes de l'attention d'un médecin aussi éclairé. Arrivé à Paris en 1775, & pour des objets étrangers à la pratique médicale, Barthez y fut bientôt reconnu & apprécié ; il fut alors nommé médecin du duc d'Orléans, situation qui lui valoit fortement tous les autres avantages, & lui procura, dans l'exercice de la profession, les relations les plus brillantes & les plus honorables. Après neuf ans de l'existence la plus heureuse, ou du moins la plus enviable, il revint dans sa patrie pour rétablir sa santé, qui avoit beaucoup souffert, & retrouver dans le calme de la solitude, le moyen de se livrer sans distraction à ses travaux. Ce fut dans cet asyle de la paix & de l'étude, qu'il mit en ordre plusieurs matériaux qu'il avoit amassés depuis long-temps, & qu'il publia la plupart des ouvrages dont nous avons donné la nomenclature.

Dans la suite, Barthez ne fut pas compris dans la promotion des professeurs de la nouvelle école de Montpellier ; mais plus tard il fut attaché à cet établissement sous le titre de *professeur honoraire*.

Un grand chagrin & le besoin d'en adoucir l'impression par de nouveaux objets d'attention & d'intérêt, le ramènèrent, au commencement du dix-neuvième siècle, à Paris, où des infirmités déjà anciennes augmentèrent & ne tardèrent pas à se montrer avec le caractère d'une affection de vieillissement, à laquelle il a succombé, & après avoir été pour lui-même, avec une grande fermeté d'âme, un sujet d'observation & de réflexion, que la violence de ses douleurs ne détourna jamais de leur véritable

objet (le desir de savoir & l'ambit de la vérité) (1).

Grimaud, qui avoit été élève de Barthez, voulut devenir à son tour chef de secte, & fondateur d'un nouveau système de physiologie & de médecine spéculative. Personnaux certaines propriétés générales, comme l'avoit fait son maître, à l'exemple des anciens philosophes, il voulut s'approprier, avec Stahl, tous les phénomènes de l'organisation à un seul principe (l'âme, le principe intellectuel), & à deux grandes classes de forces, au moyen desquelles ce principe opère (les forces motrices & les forces digestives ou alimentaires).

Donné d'une étudionnière-tendue, d'une imagination brillante & forte, d'une facilité, d'une rapidité de conception qui n'appartient qu'à un génie, le savant disciple de Barthez s'éleva souvent dans les hautes spéculations ; mais souvent aussi il fut conduit par elles à quelques vues nouvelles, & surtout à des rapprochemens ingénieux, entre la forme, la disposition & l'usage, la nature des différents organes ; rapprochement que lui fournisoit à la vérité le dogme des causes finales qu'il avoit adopté dans toute son étendue, & dont les développemens lui servirent à jeter les bases d'une anatomie philosophique, dans ses leçons publiques de physiologie.

On compte parmi les principaux écrits de Grimaud, ses deux mémoires sur la nutrition, ses leçons sur les fièvres, 4 vol. in-8°. (1791), & un ouvrage posthume publié sous le titre de *Leçons de physiologie*. Deux de ses disciples ne l'ont pas moins honoré que les écrits : ce sont Dumas & M. Richard jeune, dont la dissertation inaugurale présentée avec beaucoup d'intérêt le développement de plusieurs points de doctrine de son maître.

CINQUIÈME ÉPOQUE.

École actuelle de Montpellier.

La Faculté de Montpellier fut comprise dans une de ces lois de proscription qui, atteignant les choses comme les personnes, supprimèrent toutes les corporations scientifiques & les académies ; elle fut rétablie sous le titre d'École de santé par la loi du 14 frimaire an 3, qui créa en même temps les écoles de Paris & de Strasbourg.

L'école de Montpellier, dans la nouvelle organisation, se trouva point aussi éloignée du système d'enseignement de la Faculté à laquelle elle succédoit, que les écoles de Strasbourg & de Pa-

(1) Voyez l'Éloge de Barthez, par Baumes, dans lequel nous avons puisé, ce grand trait, les principaux traits de cette notice biographique ; l'allocation de M. le baron Desgenettes, & les observations de M. Cernan, sur la maladie & les derniers momens de Barthez. (Journal de Sédillot.)

ris. Il ne lui avoit manqué à la fin du dix-huitième siècle, que des institutions cliniques. Les hommes les plus distingués, qui lui donnèrent alors tant de renommée, furent attachés pour la plupart au nouvel établissement; ce nouvel établissement différa donc très-peu de l'ancien; il lui succéda avec très-peu de changement; rappela souvent sa renommée pour s'en faire un titre de gloire, & conserve encore aujourd'hui, au milieu d'une nouvelle génération médicale, des prétentions appuyées sur une illustration qu'il regarde comme son héritage. Nous devons ajouter, & en comparant l'école de Montpellier à l'école de Paris, que la première étoit bornée par son insinuation à des fonctions documentales, tandis que l'école de Paris, qui réunissoit la double attribution d'un corps enseignant & d'un corps académique, devoit continuer les travaux de l'Académie de chirurgie, & de la Société royale de médecine. Toutefois l'école de Montpellier n'est demeurée étrangère à aucun des grands événements qui ont intéressé la médecine en France depuis sa fondation; mais nous ne pourrions, sans dépasser les bornes de cet article, rappeler tous les droits que cette savante compagnie s'est acquis, au souvenir & à l'estime de la postérité, dans une période de plus de vingt années d'enseignement & de travaux.

Les bases, la discipline de l'école de santé de Montpellier, lui furent communes avec les deux autres établissements, qui eurent d'abord un objet entièrement relatif à la gravité des circonstances dans notre malheureuse patrie; au besoin de repeupler nos hôpitaux militaires à cette époque, & d'attacher un nombre suffisant de médecins éclairés au service des armées.

L'école de Montpellier fut donc organisée d'abord dans cette intention; & comme les écoles de Strasbourg & de Paris, elle eut également des élèves salariés, une discipline beaucoup plus sévère que celle des anciennes Facultés, & un enseignement calculé, disposé pour former le plus promptement possible un certain nombre d'élèves instruits: enseignement dont la nouvelle école publia bientôt le programme, qui offrit à la jeunesse studieuse plusieurs noms déjà connus, ou même célèbres, mais principalement ceux de MM. Chaptal, Fouquet, Petiot & Dumas, &c.

Dès l'an 5 & l'an 6 (1797), la nouvelle école de Montpellier fit connaître, par des rapports officiels, la situation, ses travaux, les progrès & la classification de ses élèves. Au commencement de l'an 9, elle avoit déjà perdu un de ses membres, M. Petiot, auquel M. Bertho consacra une notice historique, dans une séance publique & destinée pour l'ouverture des cours de la Faculté.

A peu près à la même époque, la même Faculté s'enrichit de deux nouveaux professeurs, savoir, Barthès & Anguile Broussonet, qui ont af-

fecté leur gloire à sa juste célébrité. Plusieurs traités avoient d'ailleurs été publiés par différents membres de la nouvelle école, depuis sa fondation, savoir, un *Essai sur la nomenclature & la classification des muscles*, par Dumas; une troisième édition des *Eléments de chimie*, par M. Chaptal; un *Tableau de la constitution des six premiers mois de l'an V*, par Fouquet; un *Tableau élémentaire de féméiotique*, par M. Victor Broussonet, &c.

Au commencement de l'an 10, & pour la rentrée des études, M. Gouan prononça un discours sur les causes du mouvement de la jèvre dans les plantes, & M. Victor Broussonet un autre discours sur les travaux de l'école de Montpellier, dans le cours de l'année précédente.

Plusieurs faits remarquables & différents ouvrages estimés avoient ajouté dans les années précédentes plusieurs traits à l'antique célébrité de l'école de Montpellier. Une commission avoit été nommée pour aller observer & décrire la fièvre jaune d'Andalousie, sur laquelle M. Bertho signa dans la suite un excellent rapport; en même temps, plusieurs disciples de la nouvelle école donnèrent une preuve éclatante de leur désir d'acquiescer des connaissances, & de montrer leur dévouement, les uns en faisant partie de la première expédition d'Egypte, & les autres, en demandant au Gouvernement l'insigne & dangereux honneur de porter des secours à l'armée d'Orient.

A peu près dans la même période, l'école de Montpellier commença à faire publier par ses élèves différentes dissertations inaugurales, & obtint l'établissement d'un nouvel amphithéâtre d'anatomie, des encouragemens pour son jardin de botanique, & le don d'un buste antique d'Hippocrate, honneur dont elle consacra le souvenir par une inauguration solennelle (1).

Une nouvelle séance publique, pour la reprise des études, fut principalement remplie en l'an XI, par d'excellentes réflexions de Fouquet sur l'enseignement clinique, dont il avoit été chargé dans la nouvelle école, & auquel il avoit imprimé une impulsion & une direction qu'il se plut à rappeler dans ses Considérations.

Au commencement de l'année 1807, la Faculté de Montpellier fit une perte nouvelle & bien douloureuse, celle de Fouquet, qui, après avoir répondu tant d'éclat sur l'ancienne Faculté, avoit tout à la fois honoré & éclairé la nouvelle, qui le comptoit avec un juste orgueil parmi ses membres.

L'éloge de ce grand médecin, qui avoit été à la fois un des hommes les plus lettrés de son temps & l'un des praticiens les plus savaux & les plus

(1) Ce fut à l'occasion de cette solennité que Barthès composa & prononça son discours sur le genre d'Hippocrate.

conformément, fut prononcé par Dumas, dans une séance publique de l'école, pour la rentrée des études, au commencement de l'année 1807.

La perte de Fouquet avait été précédée de celle de Barthès, dont M. Baumes fit sentir toute l'étendue, dans une biographie que nous avons déjà citée, où il a rapproché les principaux traits de la vie de Barthès, le caractère & la série de ses travaux.

La même compagnie éprouva plus tard une nouvelle perte par la mort d'Auguste Broussard, dont M. Decandolle prononça l'éloge historique dans une séance de la Faculté. La même compagnie a fait dans la suite des pertes ou des acquisitions, soit par mort, soit par des déplacements, qui ont blessé les amis des sciences & ceux de la liberté, en se rattachant à des circonstances dont nous-mêmes avons été trop affligés, pour pouvoir les rappeler ici, sans une émotion dont l'expression serait aussi inconvenante que déplacée dans cet article.

Les séances publiques de la même compagnie, pour la rentrée des études en 1814 & 1815, furent principalement remplies par la lecture de deux ouvrages de M. Prunelle : *ouvrages d'un grand intérêt, relatifs à l'objet de son enseignement, savoir, 1°. un discours ayant pour titre : De la Médecine politique en général, & de son objet, ainsi que de la Médecine légale en particulier, de son origine & de ses progrès ; 2°. Des Études du médecin & de leur connexion.*

Le même professeur avait prononcé antérieurement, & toujours dans les intérêts de la Faculté, dans ses assemblées publiques, deux autres écrits non moins recommandables, savoir, 1°. des réflexions aussi sages que philosophiques, concernant l'influence exercée par la médecine sur la renaissance des lettres ; 2°. l'Eloge funèbre de Charles-Louis Dumas, qu'une mort inopinée enleva à la Faculté de Montpellier, au commencement de l'année 1815.

Pour compléter cette notice, pour y rassembler du moins les principaux traits concernant la Faculté de Montpellier, qui doivent entrer dans l'histoire des sciences médicales, il nous resteroit à parler avec quelques détails de la vie littéraire & des travaux de ses professeurs, de la part que cette savante compagnie a prise aux progrès de la médecine, de ses efforts pour perfectionner ses institutions médicales, de ses rapports avec le Gouvernement, dans les différentes circonstances où il a réclamé le témoignage de son zèle ou le tribut de ses lumières. Nous devrions aussi faire connaître les écrits, les recherches, les observations des différents médecins qui appartiennent à cette savante compagnie, leurs dissertations inau-

gurales, & les services qu'ils ont déjà rendus à la société, dans plusieurs circonstances aussi importantes que difficiles.

Tel seroit peut-être notre devoir ; mais une tâche aussi étendue se trouve au-dessus de nos forces, ou ne pourroit pas même se concilier avec le caractère d'un article de Dictionnaire. Nous l'abandonnons de bon cœur, après l'avoir indiquée, à l'écrivain qui en seroit l'objet d'un travail particulier, & qui pourroit d'ailleurs rassembler, pour la remplir, un certain nombre de documents qu'il nous seroit difficile, pour ne pas dire impossible de réunir (1).

(MORÉAC DE LA SARTRE.)

MONTPELLIER. On trouve à une demi-lieue de cette ville très-connue, une source minérale appelée *Foucade* ou *fontaine chaude*, parce qu'elle est thermale. Monnet y a recueilli un peu de terre savonneuse & encore moins de sel marin. (M.)

MONTPELLIER (Jurisprudence médicale de). Montpellier, à cent soixante lieues de Paris, est le chef-lieu du département de l'Hérault, qui forme la partie occidentale & méridionale de la province ci-devant connue sous le nom de *Languedoc*. Cette ville, comme son nom *Monts Pefulanus* le fait assez sentir, est avantageusement située sur une hauteur, entre la mer à son midi, & une petite chaîne de montagnes au nord. La rivière du *Lez*, qui prend sa source au pied d'une de ces montagnes, coule de nord au midi, arrose cette ville, reçoit au-dessous, à droite, le ruisseau le *Pezouillet*, & se perd ensuite dans la Méditerranée. Cette ville est le chef-lieu d'un tribunal d'appel & d'un siège épiscopal.

L'air y est pur & sain, mais vif & pénétrant, très-sec dans le régime des vents du nord, qui soufflent fréquemment ; plus humide quand le vent de mer reprend le dessus. Les vents intermédiaires sont assez rares ; il en est un qui se fait sentir quelquefois au printemps : on l'appelle dans le pays *aura rousse*. Sa chaleur porte sur le visage des impressions si vives, qu'on pourroit les comparer à des traits de flamme. Le vent de la mer est accablant dans toutes les saisons, mais surtout en été ; il ôte à l'air atmosphérique son élasticité, & jette l'économie animale dans une éravation singulière ; il se dissipe par le retour du vent du nord ou des montagnes.

Le territoire de Montpellier est très-découvert ; fort peu d'arbres ; terres maigres, sèches, légères ; beaucoup de filix ; des coquilles pétrifiées en grand nombre ; cependant il est très-fertile ; tout ce

(1) Ces Auteurs ont fait perdre à la Faculté deux hommes également recommandables, MM. Decandolle & Esquirol.

(1) M. Bérard, qui a commencé un journal sur la doctrine de Montpellier, nous parait égaré en particulier toutes les conditions qui seroient nécessaires pour présenter convenablement l'histoire littéraire de cette savante compagnie.

qu'on y recueille est parfait; excellent blé, vignobles brillans & multipliés, raisins exquis & salubres; campagnes couvertes d'oliviers fournissant une huile qui le dispute, pour la bonté, à celle qui est si connue sous le nom d'*huile de Provence*. L'eau que l'on boit à Montpellier est celle des fontaines, des puits ou des citernes. La fontaine de Saint-Clement a coûté des travaux immenses; elle coule près des murs de la ville; on en fait usage: elle est cependant moins limpide que celle de Saint-Gilles. L'eau de puits est le produit des filtrations; elle est presque toujours chargée de sels terreux qui la rendent louche, lourde, lui donnent un goût douceâtre, fade & rebutant. On a pratiqué dans différentes maisons des siteres: réservoirs vastes & commodes qui conservent, purifiés les eaux de pluie & les rendent potables.

Les productions du pays fournissent considérablement à son commerce. Il y a beaucoup de fabriques d'étoffes en laine & en soie, de mouchoirs, de siamoise, de toiles de coton. Il s'y trouve des tanneries qui ont de l'activité & de la réputation. On y fait beaucoup de liqueurs, de confitures, de parfumerie. Il s'y fabrique une grande quantité de vert-de-gris.

La ville de Montpellier est nouvelle dans l'histoire, & n'a commencé à être connue que sur la fin de la seconde race des rois de France; elle s'agrandit beaucoup dans le huitième siècle; sur la fin du dixième elle tenoit déjà son rang entre les villes les plus importantes de la Septimanie. C'est à peu près à cette époque que l'on peut faire remonter celle de l'établissement du médecin formant une espèce de corps en cette ville. Ces médecins étoient tous Arabes ou Juifs; ces deux races étant alors les seules nations savantes, surtout en histoire naturelle & en médecine. L'école de médecine a sans doute son origine à la même époque. Les monumens historiques prouvent du moins qu'elle étoit déjà florissante à la fin du douzième & au commencement du treizième siècle, & c'étoit la seule qui existât dans le royaume. La bulle du cardinal Coarard, datée du 15 août 1220, doit être regardée comme le sceau de l'établissement légal de la Faculté de médecine à Montpellier. C'étoit sans doute, avant cette bulle, un corps fort ancien, mais sans forme & sans caractère; il existoit une école médicale, mais formée par la seule émulation des médecins, & cette école étoit sans discipline & sans lois. Alors elle fut une organisation régulière & fut soumise à des statuts établis par une autorité légitime. Cette époque a été fixée comme la première des sistes de cette école célèbre, par le médecin Frumelle, dans l'intéressante brochure qu'il a publiée, en l'an g, sous le titre de *Fragmens pour servir à l'histoire des progrès de la médecine dans l'Université de Montpellier*. Le fameux Arnaud de Villeneuve, ancien régent de cette Faculté, honore cette époque; esprit vaste & pénétrant, dont l'érudition étoit immense, dont

les connoissances étoient presque universelles, mais que la passion de tout savoir plongea dans des erreurs qui ternirent sa réputation & l'ont rangé dans la classe des enthousiastes insensés de l'astrologie judiciaire, de la magie & des hérésies religieuses.

Les chroniques de ces temps concourent à prouver que la Faculté de médecine établie à Montpellier, en 1220, n'long-temps constitué seule l'Université; qu'elle a joui en particulier des prérogatives qui n'ont été accordées qu'aux Facultés réunies; que celle de droit civil & canonique a une origine beaucoup plus récente, & qu'une bulle du pape Nicolas, en 1209, a réuni à la Faculté de droit qu'elle établissait, celles de médecine & des arts qui étoient déjà fort anciennes; quant à celle de théologie, elle ne date en cette ville que du commencement du quinzième siècle. La Faculté de médecine de Montpellier a donc un rang d'ancienneté sur toutes les autres, celle de Paris même n'ayant fait un corps séparé qu'en 1270, & paroissant n'avoir en d'organisation légale que vers le milieu du douzième siècle, puisque les plus anciennes chartes ne remontent qu'au temps de Philippe de Valois, en 1356, & du roi Jean, en 1353. Cependant, on ne peut disconvenir que les formes & l'organisation publique de l'enseignement de la médecine ont une origine plus ancienne à Paris.

Voyez, à cet égard, les notes de M. Leroy sur l'histoire de la Faculté de médecine, par le docteur Astruc.

Les rois de France ont donné dans tous les temps, à cette illustre école, des témoignages d'affection particulière, en l'honneur de privilèges nombreux. L'exemption des droits d'entrée, d'impôts & de contributions de guerre a été accordée aux docteurs en médecine & à leurs écoliers, en 1364. Ce privilège fut confirmé par Charles-le-Sage, en 1379. Charles VI, en 1457, Charles VIII, en 1484 & 1496. Les travaux & le zèle des professeurs, l'émulation & le concours nombreux des élèves, la doctrine médicale qui y étoit enseignée, bien que la forme d'enseignement fut encore dans sa naissance, la réputation méritée des praticiens de cette Faculté, y attirèrent de toute part une foule d'étrangers qui venoient y puiser les connoissances qu'ils devoient ensuite répandre dans leurs patries respectives. Ce fut surtout vers le milieu du quatorzième siècle qu'elle commença à briller d'une lumière plus vive & plus pure. Ce fut alors que parurent pour la première fois en Europe les ouvrages immortels d'Hippocrate & de Galien; ils furent d'abord traduits de l'arabe en latin, qui étoit la seule langue des savans & qui devoit l'être encore. Les découvertes sur l'anatomie de l'homme se multiplièrent, & de siècle en siècle parurent à Montpellier des hommes célèbres dans cette partie première de la médecine. Sylvius, Rondet, Cabrol, Olaius Wormius, Dela-

rens, Piquet, Vieusseux, Doidier, Ferrein, Brizard, Borden, Lamure, Dumas, honorèrent, par leurs talens, l'Université qui les reçut dans son sein. La botanique ne dut pas moins à Dalechamp, Clusius, les Bauhin, Lobel, Richer de Belleval, Magaal, Tournefort, Segnier, les Jusseu, Sauvages, Cresson, Commerçon, qui ont étudié ou professé dans cette école. La chimie fut éclairée, perfectionnée par les travaux successifs de médecins célèbres; Armand de Villeneuve, Raïmond Lulle, Dörtoman, Matte-la-Favre, Venel, Leroy, jusqu'à l'époque si glorieuse pour cette science, où elle fut pour ainsi dire réyérée & placée au rang des sciences exactes, par l'esprit philosophique qui prévalut à ses brillantes découvertes & qui en dirigea l'application utile vers l'étude de l'homme vivant, dans l'état de santé ou de maladie.

Le nombre des praticiens qui ont illustré cette école est immense; de parvils détails s'éloigneroient trop de mon sujet. Le médecin Astruc n'a rien laissé à désirer à cet égard, & l'excellent ouvrage qu'il a publié doit être souvent consulté par les médecins qui veulent connoître l'histoire littéraire de la médecine.

Tandis que la Faculté de médecine de Montpellier restituoit la théorie, perfectionnoit la pratique & agrandissoit le domaine de la science médicale, la chirurgie florissoit avec éclat dans la même école: Le célèbre Gui de Chauliac, médecin du pape Clément VI, en 1348, exerçoit en même temps la médecine externe avec le succès le plus brillant. En 1363 il publia à Montpellier sa grande Chirurgie, ouvrage excellent si on le rapporte au temps où vivoit son auteur, ouvrage utile dans tous les temps, par la méthode & l'ordre qu'il établit le premier dans toutes les parties de la science chirurgicale: matière alors obscure & difficile, parce que la barbarie & la routine aveugle des siècles précédents l'avoient couverte d'épaisses ténèbres. C'est dans cet ouvrage que l'on trouve la première bonne description de la peste. Laurent Joubert, chancelier de la même Université & praticien très-renommé, publia la traduction française de ce grand ouvrage & l'enrichit de commentaires très-intéressans. Il est à remarquer que ce fut à cette époque que furent faites à Montpellier les premières démonstrations anatomiques: les médecins ayant ensui obtenu des rois de France & des seigneurs de cette ville, la permission de prendre chaque année un ou deux cadavres des criminels exécutés.

Cependant le zèle, les talens, la réputation de la Faculté de médecine de Montpellier n'avoient pu encore fixer sur elle, d'une manière utile, les regards & l'attention des rois: si l'on en excepte les privilèges qui lui avoient été accordés, elle n'avoit ni établissement assigné, ni autre caractère que celui de l'insstruction gratuite. On n'avoit point encore pensé que des hommes qui con-

croient leur vie à répandre sur un grand nombre d'élèves les connoissances qu'eux-mêmes avoient acquises à grand prix, avoient des droits particuliers à la bienveillance du Gouvernement; que les services qu'ils rendoient à leur patrie leur devenoient même préjudiciables, en leur enlevant un temps dont ils auroient pu disposer pour l'intérêt de leur famille. La gloire seule & quelques ligers émulemens, fournis par les élèves, soutenoient les écoles & récompensent les professeurs. Charles VII, informé de cet état de l'insstruction de la médecine à Montpellier, voulut la relever; il établit quatre docteurs régens, chargés de faire des leçons annuelles; & leur alligna à chacun cent *francs* d'appointemens; somme qui pouvoit suffire pour un honnête entretien (au quinzième siècle); il accorda aussi un fonds annuel de cent *francs* pour l'entretien & les réparations de l'école, mais sa mort l'empêcha de donner une forme stable à cette fondation.

C'est à Louis XII que l'on doit le véritable établissement des chargés de professeurs de Montpellier. Ce prince, par lettres-patentes de 1498, confirma la dotation annuelle de cinq cents francs pour les gages des docteurs régens & les réparations de l'école. François I^{er}, Henri II, Charles IX, donnèrent à cette Faculté des témoignages d'une bienveillance spéciale. Ce dernier ajouta deux cents francs aux cinq cents francs de l'insstruction. Henri IV fit la somme de six cents francs pour chaque professeur, ce qui a subsisté jusqu'à présent. A ce traitement, trop modique sans doute, à cause de l'augmentation du prix des denrées & de la valeur de l'argent, les rois ajoutèrent dans la suite l'immunité des tailles, aides, octrois, logement de gens de guerre & de toutes autres impositions de cette nature. Les privilèges accordés d'abord à tous les docteurs de la Faculté de médecine, furent ensuite restreints à ceux qui enseignoient; ceux-ci se trouvant alors seuls chargés de tous les soins, de tous les travaux relatifs à l'école & aux réceptions. C'est ainsi que, dès le milieu du seizième siècle, la Faculté de médecine, qui avoit été jusqu'alors composée de tous les docteurs, se trouva réduite aux seuls professeurs royaux. Bientôt de jeunes médecins, aides de recevoir & de communiquer l'insstruction, aidèrent leurs maîtres dans l'enseignement. Cette forme nouvelle, créée d'abord par l'émulation, fut régulièrement organisée, & les professeurs nouveaux obtinrent le titre légal de *docteurs agrégés*. Ils étoient d'abord en nombre égal à celui des docteurs régens: on édit de Henri IV, en 1610, les réduisit à deux. Il avoit créé, en 1599, deux charges nouvelles de professeurs, l'une d'anatomie, l'autre de botanique, ainsi qu'une charge de chirurgien anatomiste pour les dissections & démonstrations qui devoient toujours suivre les leçons du professeur. Cabrol fut le premier démonstrateur; Richer de Belleval eut la première chaire

de botanique, avec des fonds particuliers pour la construction d'un jardin royal des plantes. Ce ne fut qu'en 1606 que Louis XIII établit celui de Paris. La chaire de chirurgie tarda beaucoup à s'établir à Montpellier, à raison des dissensions qui s'élevèrent entre les praticiens & les chimistes, & des prétentions exagérées de ces derniers sur l'usage en médecine des préparations chimiques. Elle fut cependant érigée, en 1675, pour Jean Matte, chimiste habile & expérimenté; mais les médecins refusèrent de l'agréger dans la Faculté, parce qu'il étoit illétré & qu'ils ne le regardoient que comme un artiste exercé dans les manipulations.

On distinguoit quatre différentes charges entre les professeurs royaux de Montpellier, celles de chancelier, du doyen & de procureur de la Faculté. Les deux premières étoient à vie, les deux autres, biennuelles. Le chancelier étoit chef, président, recteur, modérateur de l'école; il avoit le droit de faire exécuter les statuts, suivant leur forme & teneur; de signer les lettres de grâces, d'assembler les professeurs, de présider à la réception des maîtres chirurgiens & apothicaires de cette ville; de visiter les pharmacies. Depuis 1664, le Roi nommoit seul à cette charge.

Le doyen de la Faculté avoit le second rang; il régloit le temps & la durée des vacances; prescrivait la matière des cours & des examens; dirigeoit le régime intérieur des écoles. Les places des professeurs qui se trouvoient vacantes se donnoient au concours, mais on y dérogeoit souvent en donnant des provisions en survivance. Un arrêt du Conseil de 1660, ordonna de nouveau qu'elles ne seroient à l'avenir données qu'au concours.

Je ne dois pas oublier ici une singularité dans la réception des docteurs du Montpellier. Lorsque l'on étoit reçu pour le baccalauréat, le récipiendaire revêtoit à la fin de l'acte une robe de drap rouge, avec de grandes manches, un large rochet & un petit capuchon semblable à celui de la robe de cérémonie des professeurs. C'étoit la fameuse robe de *Rabelais*, si connue dans toute l'Europe, & regardée à Montpellier comme le symbole extérieur du doctorat. On continuoient de la porter aux examens suivans jusqu'à la licence, après quoi on reprenoit la robe ordinaire. On prétend que la première robe de cette espèce fut ordonnée vers le milieu du seizième siècle, par François Rabelais, célèbre docteur de la Faculté du Montpellier, dont elle prit le nom. Elle fut renouvelée, en 1612, par François Ranchin, docteur & doyen de la Faculté. On en a fait une troisième en 1720.

Cet abrégé chronologique de l'histoire de la Faculté de Montpellier, prouve que depuis son origine, jusqu'à l'époque de la révolution, elle a répandu non-seulement en France, mais dans l'Europe même jusque dans les pays étrangers, l'éclat d'une juste célébrité; qu'elle a fourni dans tous les siècles des professeurs habiles, des praticiens d'une

expérience consommée, & des élèves dignes de tels maîtres. On fait avec quel empressement les jeunes gens se portoit à cette école; on fait qu'ils formoient dans cette ville une corporation vaine & intéressante, par les lois particulières & le régime d'étude & d'émulation qu'ils avoient adopté. On fait que les médecins qui voyageoient pour leur instruction, ne manquoient pas d'aller rendre hommage à cette Faculté pour y recevoir le perfectionnement de leur instruction médicale.

Quant à la méthode d'enseignement, elle a toujours été obligée de se conformer aux systèmes reçus. L'on ne peut disconvenir que cette méthode purement scolastique n'ait retardé le progrès de l'instruction, & ne lui ait même quelquefois imprimé une marche rétrograde, lorsque l'on a vu les écoles de médecine professer tour à tour les opinions prédominantes & les hypothèses d'une médecine tour à tour & exclusivement livrée aux chimistes, aux animalistes, aux solidistes, aux mécaniciens. Mais on doit à la Faculté de médecine du Montpellier la justice de reconnaître qu'elle a été presque toujours la première à secouer les préjugés, qu'elle a toujours favorisé la médecine d'observation, & qu'elle s'est toujours défendue de l'enthousiasme & de l'innovation. Enfin, l'esprit philosophique, la méthode d'analyse ont été substitués au langage de l'école, & la science médicale a fait dès-lors des progrès rapides. La loi du 14 frimaire an 5, en instituant des écoles cliniques, en plaçant partout la pratique à côté de la théorie, en répandant une noble & louable émulation parmi les élèves, a commencé l'ouvrage de la régénération de l'art du guérir. La loi du 19 ventôse an 11, sur l'exercice, l'enseignement & la police de la médecine dans la république, établissant un mode uniforme dans les écoles, facilita encore à celle de Montpellier les moyens d'ajouter chaque jour à son antique gloire. (Voyez l'article JOURNAL DE LA MÉDECINE.) (GILBERT.)

MONT-PEZAT (Eaux minérales de). C'est un bourg à huit lieues de Nîmes, où se trouve, dit-on, une source d'eau minérale. (MACQUART.)

MONTRICHART (Eaux minérales de). (Voy. FONT-A-MOUSON.)

MONTRIGUGNY. (Voyez SARRIGNY.)

MONTUUS ou DE MONTEUX (Sébasien), ou DUMONT, selon Georges Mathias, naquit à Rieux en Languedoc. Ses ouvrages qu'on lui attribue sont voir le temps où il a paru.

De medicis feminis sex, quorum I de febribus medicorum, II de dysplasia quæ dogmatica necessaria, III de dogmaticorum officio, IV de excellentia dogmaticorum, V de consiliis eorum, VI de stipendiis eorum. Ejusdem de humorum

hamorum differentia atque indicii epitome.
Lugd. 1534, in-8.

Dialecon medicinalium libri duo. Adjectus est de his que ad rationalis medici disciplinam, minus, luses, consilia & primum pertinent, libellus. Lugd. 1537, in-4°. De Montéux fut encore l'éditeur de plusieurs autres ouvrages. Jérôme son fils, docteur en médecine de Montpellier & conseiller médecin de Henri II, publia plusieurs ouvrages estimés par la chirurgie.

(R. GZOXHOT.)

MONT-VÉNU, ou plutôt MONT-DE-VÉNU.
Région du corps humain qui se trouve placée au-dessus des parties génitales; expression qui n'est point employée dans la langue scientifique, & qui répond à la dénomination de *pénis* ou de *pubis*, plus convenable à la gravité des médecins & des anatomistes.

L'odeur de cette région, l'état varié des poils qui la recouvrent, les infirmités particulières qui semblent s'y attacher dans quelques circonstances; enfin, certaines douleurs, certaines lésions organiques de la même région, font naître de circonstances qui méritent d'attirer l'attention du médecin. L'odeur propre au mont-de-vénus dépend d'une sécrétion opérée par des cryptes ou follicules qui se trouvent quelquefois assez abondants pour rendre les poils de cette région moussus & humides, ou d'une action pour occasionner les démangeaisons les plus incommodes.

Les infirmités que cette onduosité attire sans doute ou rendent, lorsqu'une certaine incurie ou malpropreté l'ont augmentée, se répandent quelquefois jusqu'à l'aîne, sous les aisselles & même dans les sourcils, où leur présence devint tout-à-fait insupportable.

Les poils qui recouvrent le mont-de-vénus sont plus ou moins abondants, plus ou moins foncés, plus ou moins longs, plus ou moins frisés, plus ou moins élastiques, suivant le tempérament, l'âge ou certaines dispositions individuelles.

La pliquie n'a pas toujours épargné ces mêmes poils, dont le développement est parvenu dans ces cas jusqu'à la longueur d'une aune ou d'une aune & demie; de telle sorte que cette chevelure ainsi augmentée, auroit touché le sol, si l'individu qui étoit atteint de cette infirmité n'avoit pas pris quelque précaution pour la dissimuler.

L'évret, qui avoit donné une profonde attention à plusieurs points de la pathologie spéciale des femmes, pensoit avec raison que les douleurs tenses ou congestives, au plus de l'aîne & au mont-de-vénus, sans altération locale de ces parties, devoient être regardées comme des phénomènes consécutifs ou symptomatiques, dont l'examen pouvoit conduire un observateur éclairé à reconnaître une lésion plus ou moins grave de quelques viscères de l'épigastric. Il n'est pas sans

exemple de voir au mont-de-vénus des tumeurs très-considérables & pesant plusieurs livres (1).

L'excroissance que portent quelques femmes chez les Captes, & dont Soaninck mentionne, en la comparant à l'épave de caroncules pendantes dont le bec du cug d'Inde est chargé, ne paroît être autre chose qu'une de ces tumeurs ou productions morbides, dont le retranchement constitue d'ailleurs ce que l'on appelle la *circumcision des femmes*; opération qui s'est conservée chez cette nation, suivant le même voyageur.

Ce qu'on a nommé le *tablier des femmes hottentotes*, ne doit pas être confondu avec ces tumeurs, & n'appartient pas du reste aux naturels de l'Afrique, dont il porte le nom, mais exclusivement du seullement à une peuplade particulière, celle des *Boichuans*, qui s'est réfugiée dans les montagnes. (Voyez *Vénus hottentote*.)

Dans certaines débilités organiques que l'on pourroit renvoyer à l'histoire des monstruosités, on a vu quelquefois, & par suite d'un écartement du pubis & des muscles droits, une hernie de vessie qui se manifestoit par une tumeur assez considérable, placée immédiatement sous la peau.

Une tumeur rouge plus ou moins volumineuse, offrant deux petites ouvertures par lesquelles l'urine étoit son cours, s'est montrée aussi chez quelques enfants au moment de la naissance, & dépendait à la fois de la harnie & du renversement de la vessie en dehors. (Consulter à ce sujet l'article *Interversion* de M. Brochiet, dans le quatrième volume du *Dictionnaire des sciences médicales*.) (Lc J. M.)

MOOR (Barthélemi de), professeur de médecine à Harderwick, vers la fin du dix-septième siècle, attaqua la secte chimique qui dominoit alors en Hollande, fit voir les vices de son influence sur la pratique, & s'efforça de ramener ses contemporains à l'étude des Anciens, chez qui l'observation étoit de base à la pathologie. C'est pour remplir ces différents points de réforme qu'il publia les ouvrages suivants :

Cogitationum de instructione medicorum, ad sanitatis tutelam, mortis profigandam, necnon vitam prolongandam; libri tres. Amstel., 1695, in-8°. La destruction des systèmes mis au jour par François Sylvius & Cornélius Bontekoe, est le principal objet de l'auteur. Il en propose lui-même un autre qui n'a pas fait plus de fortune. Il veut que la pression que le sang exerce sur les artères toujours pleines, à la sortie du cœur, soit la cause de presque tous les phénomènes que l'on observe dans l'homme sain ou malade. Il assigne cependant une cause particulière, pour le sommeil, & il la déduit du

(1) Voyez dans les *Annales de médecine de Montpellier*, l'observation de M. Fournet de Nîmes, sur une de ces tumeurs qui pèsent trente livres.

mélange du chyle qui retarde le cours du sang dans les vaisseaux du cerveau.

Veteris æconomæ animalis, seu potius humanæ, principia innier pathologiæ cerebri delineatio practica, in quâ morborum sporiorum per notas characterificas distinctio, necnon spasmorum accuratior distributio traditur. Amstcl., 1703, in-4°. Il établit la source des maladies dans les vices de la pression du sang combinée avec la structure de chaque partie du corps.

Oratio de hypothesebus medicis. Ibid., 1706, in-4°.

Oratio de methodo discendi medicinam. Ibid., 1707, in-4°. (*Extr. d'Ély.*) (R. GLOTTOR.)

MORALE. (Le moral, le système moral de l'homme.) L'ensemble des facultés intellectuelles & des affections de l'âme, considéré comme un état opposé à l'état matériel ou physique, comme une manière d'être distincte & séparée dans la nature humaine, un homme dans l'homme, suivant l'acception la plus généralement répandue, & d'après l'habitude si familière à l'esprit humain, de personifier les notions abstraites & générales.

MORAL. *Influence réciproque, rapports du physique & du moral de l'homme.*

Un philosophe moderne a désigné sous ce titre, & en le présentant comme un corps de doctrine; les points de vue les plus élevés & les plus importants de l'histoire physiologique & médicale de l'homme. L'intérêt d'un pareil sujet, la belle imagination de l'écrivain qui s'en est emparé, son esprit étendu, ses connaissances variées, sa juste équilibre, tout s'est réuni pour donner un grand éclat à ce nouveau genre d'études.

Depuis cette époque, le nom de cet écrivain, P. J. G. Cabanis, & l'exposition des rapports du physique & du moral de l'homme, soit dans l'état de santé, soit dans l'état de maladie, sont devenus inséparables dans la pensée de tous les hommes d'une raison supérieure & d'un esprit cultivé.

Ne divisons point ce qui se trouve rapproché par une affecation aussi remarquable, nous serons entrés dans cet article les principaux traits de la biographie de Cabanis, & l'exposition abrégée du nouveau genre de connaissances dont il a jeté les bases : ce qui doit comprendre l'extrait d'un ouvrage de ses remarques sur la liaison du système intellectuel ou moral de l'humanité, avec les affections physiques ou corporelles que l'on rapporte aux différents organes.

Première partie, ou Notice sur la vie & les ouvrages de Cabanis.

Celui qui va tracer rapidement cette notice, s'est livré pendant long-temps, & avec le sentiment d'une préférence très-marquée, aux parties attachantes

& élevées de la médecine & de la physiologie, qui avoient attiré toute l'attention & tout l'intérêt de Cabanis. Il a eu l'avantage d'être précédé & guidé dans une pareille carrière, par ce philosophe. Il en fut accueilli à l'époque du plus grand éclat de son talent & de la renommée; il y eut ensuite dans son intimité, pendant les dernières années d'une vie qui, toute incertaine & languissante qu'elle étoit devenue, après une maladie grave, suffisoit encore aux affections les plus tendres & au développement du plus noble caractère. Il devint plus tard l'ami de ses amis, de sa famille, de tout ce qui lui fut cher, & c'est en leur nom, comme au sien, qu'il exprime ici des sentiments très-bien motivés, pour se pas s'accorder avec la justice & l'impartialité de l'historien.

Pierre-Jean-Georges Cabanis étoit né en 1707, dans une petite ville du département de la Corrèze; son aïeul & son père avoient été hommes de loi; mais ce dernier s'occupait en même temps des travaux de l'agriculture, & dans son propre domaine son fils a rappelé cette circonstance dans quelques notes biographiques qu'il avoit rédigées, avec le dessein de recueillir, dans sa propre famille, plusieurs traits qui ne lui paroissent pas sans intérêt & sans utilité.

On apprend dans ces mémoires que Cabanis père donna beaucoup d'étendue, beaucoup d'activité à ses travaux agricoles; que le ministre Turgot employa utilement son zèle, & qu'il lui accorda une amitié que le fils eut le bonheur d'obtenir dans la suite, comme la meilleure partie de son héritage.

L'enfance & les circonstances de la vie scolaire de Cabanis ne présentèrent rien de remarquable; il pensoit toutefois, si l'on l'avoit observé avec un peu de sagacité à cette époque, on auroit pu découvrir les principaux traits, & comme le fond de son caractère : une grande sensibilité dans les habitudes, un esprit de suite, une instabilité que des figures déplacées porteroient au plus haut point; enfin une tendre & une âpreté, dont il ne parvint à triompher dans la suite que par le sentiment habituel du bonheur & de la bienveillance.

À l'âge de quatorze ans, Cabanis fut conduit à Paris & livré à lui-même par son père, qui croyoit pouvoir tenter avec succès une pareille épreuve, à la suite d'une première éducation, qui n'avoit eu que très-peu de succès, & de moins en apparence. Le résultat de l'expérience fut complet; & dans l'état de liberté & même d'abandon, auquel on l'avoit livré, Cabanis se reconstruisait à-coup, & sans aucune impulsion étrangère, un goût pour l'étude, qui se montra bientôt avec tous les caractères de la passion & de l'enthousiasme; de telle sorte que l'on pourroit sûrement remonter jusqu'à cette époque, le commencement de sa vie littéraire.

Deux ans s'étoient à peine écoulés, au milieu

d'une suite non interrompue de travaux pleins d'activité & de charmes, lorsqu'il se vit obligé de les interrompre, ou du moins de les suspendre, par un retour prématuré dans sa famille, on par un voyage en Pologne, avec la qualité de secrétaire d'un évêque de Wilna (1), qui s'y rendoit comme agent diplomatique.

Ce voyage eut lieu dans l'année 1775. Il fit connaître à Cabanis, & dans les moindres détails, la trop célèbre diète, où tous les moyens de l'intrigue & de la corruption furent mis en usage, pour faire adopter & consacrer, par des Polonois, la honte & le déshonneur de la Pologne. Les impressions qu'il en reçut, quoiqu'agées de seize ans, furent décourageantes & pénibles : il vit de près des crimes révoltants & des vices honteux ; l'oppression du peuple, l'avidité des grands seigneurs, inutilement raréties par le courage de la petite noblesse ; l'abus de la force, la honte de la faiblesse ; mais surtout la facilité d'effrayer ou de corrompre les hommes ; & ces impressions éprouvées par une imagination vive, portèrent dans son âme une disposition féroce & mélancolique, qui seroit devenue dans la suite une véritable misanthropie, sans la bonté naturelle de son caractère.

Après ce voyage, qui dura deux ans, Cabanis eut l'occasion de se lier à Paris, d'une manière intime, avec plusieurs hommes de lettres recommandables, & en particulier avec Roubaud, auquel il communiqua plusieurs fragmens d'une traduction en vers de l'*Iliade*. Il lui présenta à peu près dans le même temps au ministre Turgot, qui l'accueillit avec une grande bienveillance, mais au moment où une injuste disgrâce venoit d'arrêter tout-à-coup ce ministre citoyen, au milieu d'une administration qui devoit porter au plus haut point la gloire industrielle & la prospérité agricole de la France. Ces honorables liaisons, le succès de ses premiers travaux littéraires, & l'existence pleine de charmes qui en fut la suite, n'engendrèrent point Cabanis ; malgré son extrême jeunesse, ces avantages ne purent le retenir longtemps parmi ses nouveaux amis. Une mélancolie dont il ne pouvoit se défendre, & le dérangement de sa santé, que son voyage & ses études avoient altérée, l'éloignoient du monde, & lui firent chercher, dans les environs de Paris, un genre de vie plus calme & un air plus salubre.

Ce fut à cette époque & dans la retraite qu'il eut le bonheur de se lier avec l'un des hommes les meilleurs & les plus éclairés, avec Dubreuil, l'ami de Ponceau, qui ne put survivre à sa perte. Dans cette douce intimité, il sentit le besoin de choisir une profession ; & se décida pour la médecine. Il en reçut les premières leçons de son ami,

qui dès ce moment devint son maître ; il studia & observa avec lui, le suivit dans son hôpital & au lit de ses malades ; recueillant les paroles, se dirigeant par ses exemples ; trouvant ainsi dans la plus douce intimité, tous les avantages de cette éducation domestique, que le grand Hippocrate avoit reçue de ses ancêtres, qu'il transmit lui-même à ses disciples, & que tout le savoir de nos écoles modernes ne peut remplacer que d'une manière très-incomplète, du moins pour certaines parties.

Cabanis n'oublia rien pour se rendre digne des soins & de l'attachement de son excellent maître. Ses premiers travaux littéraires, qui avoient eu tant de charmes pour lui, son goût pour la poésie, & l'attrait, les suffrages d'une société aimable & choisie qui avoit admiré & encouragé ses premiers succès : tout fut sacrifié sans restriction, comme sans partage, à l'étude sévère & grave de la médecine.

Les personnes qui ont bien connu Cabanis, ne seroient pas étonnées sans doute de cette sévérité & d'une dévotion. Dirigé par ses réflexions, par sa bienveillance naturelle, & par les exemples de vertu qu'il avoit trouvés dans sa famille, il adopta de bonne heure, comme principe de conduite, l'idée que tout homme, quel qu'il soit, doit faire, dans la position où il se trouve placé, le plus de bien qu'il lui est possible, le meilleur emploi pour les autres, & dans l'intérêt de la société toute entière ; de son travail, de ses connaissances & de ses facultés : opinion aussi sage que généreuse, qu'il appliqua d'abord à l'étude de la médecine, & qui devint dans la suite, le principe, la véritable source, de ce désintéressement, dont la vie publique & la vie privée ont offert de si touchans & de si nombreux exemples.

Malheureusement pour Cabanis, & plus malheureusement encore pour la médecine, à laquelle sa manière si délicate de sentir & la pénétration naturelle de son esprit le rendoient infiniment propre, les premiers travaux qu'il lui consacra, furent plutôt littéraires & spéculatifs que pratiques. Les sciences naturelles, l'anatomie, la chirurgie, la clinique, dans les grands hôpitaux, n'y eurent alors que très-peu de part.

L'étude des livres l'occupa presque exclusivement ; & pendant cinq ou six années consécutives, il s'attacha à connaître dans un ordre chronologique, les classiques des différents âges de la médecine, depuis Hippocrate, Celse, Arétée, chez les Anciens, jusqu'aux plus célèbres médecins du dix-huitième siècle, en accordant une prédilection marquée aux membres de la Faculté de Montpellier, les plus illustres de cette époque.

Les connaissances qu'il puisa dans ces différentes sources, ces connaissances réunies à quelques notions de chimie & de médecine pratique, composèrent dans la suite le fond très-incomplet sur lequel Cabanis travailla, lorsqu'il vint à s'oc-

(1) Massalsky, qui fut peodu dans l'insurrection de 1794, comme une des créatures de la Russie.

cuper de ses recherches sur les rapports du physique & du moral de l'homme ; ouvrage que lui seul peut-être, étoit capable d'établir sur des bases aussi sages & aussi incertaines. Il paroît avoir senti lui-même, & de bonne heure, l'insuffisance de cette première éducation médicale ; & c'est ainsi du moins qu'on peut expliquer la résolution qu'il prit de se rapprocher de Paris, afin de donner plus d'activité à ses travaux & plus d'étendue à ses espérances.

« C'est là, dit-il, qu'il fit connoissance de la veuve d'Helvétius, de cette excellente & respectable femme, qui depuis lui servit toujours de mère, & qu'il a chérie comme un fils tendre & dévoué. »

En cultivant cette nouvelle relation, qui eut bientôt pour lui l'intimité & le charme de la famille, Cabanis vit souvent Turgot, d'Holbach, Franklin, Jefferson, Condillac, Thomas, Diderot, d'Alembert, & plusieurs autres hommes distingués, quo la France pouvoit enorgueillir à cette époque.

Au moment du dernier voyage de Voltaire à Paris, Cabanis lui fut présenté par Turgot, & fut en sa présence quelques morceaux de la traduction d'Homère. L'illustre vieillard, quoique très-fatigué & déjà malade, l'écouta avec tous les signes de l'intérêt & de la bienveillance ; il loua beaucoup sa traduction, en laissant voir cependant qu'il n'admirait pas l'original sur parole, & avec ce respect religieux de tous les siècles, trop sensible pour lui aux superstitions qu'il avoit combattues avec tant de constance & de force, pendant plus d'un demi-siècle.

Cabanis, qui parloit de lui-même, des hommes ou des choses de son temps avec le plus grand intérêt, éprouvoit un plaisir particulier à raconter les différentes particularités de cette entrevue avec Voltaire.

La physionomie expressive & spirituelle de cet homme célèbre, l'éclat de ses yeux, que les glaces de l'âge n'avoient pas encore éteints, son regard d'aigle ; la mobilité si expressive de sa physionomie & la vivacité de son esprit, qui se faisoit apercevoir dans les actions les plus indifférentes : toutes ces choses étoient constamment présentes à Cabanis ; il aimoit encore à les raconter dans les derniers temps de sa vie. Alors il étoit facile de remarquer qu'il n'avoit pas moins le desir d'intéresser les autres, que de se donner à lui-même un véritable plaisir. On voyoit son visage devenir plus animé, plus expressif ; & rarement il manquoit de faire passer dans l'âme des autres, le charme, la force des impressions qu'il avoit si vivement reçues, & qu'il avoit si bien conservées.

Le séjour de Cabanis à Auteuil, les entretiens avec les hommes les plus distingués qui venoient continuellement visiter madame Helvétius de tous les points du monde civilisé, donnèrent rapidement à son esprit un mouvement, une étendue

qui manquent ordinairement aux gens de lettres & aux savans, quand ils n'ont pas vécu de bonne heure dans le grand monde, & qu'ils n'ont point habité, au moins pendant quelque temps, les régions supérieures de la société.

Une intimité aussi douce & aussi distinguée servit en même temps à développer de plus en plus ses qualités les plus naturelles & les plus aimables : c'est-à-dire, la vivacité de l'imagination, la simplicité & la grâce des manières, l'heureux mélange de la candeur & de la pénétration, le goût le plus exquis, le talent d'observer les nuances les plus légères ou les circonstances les plus délicates des objets ; enfin, une aptitude admirable à donner ou à recevoir des impressions, & une élégance facile & continue de langage, qui répandoit un si grand charme dans sa conversation, & que nul autre de ses contemporains n'a peut-être porté au même degré.

Avec des dispositions semblables, Cabanis auroit nécessairement obtenu beaucoup de succès dans la pratique de la médecine, qui se borne le plus souvent à une manière adroite & bienveillante de traiter avec les hommes, & de gouverner dans leur plus grand intérêt leur imagination & leurs passions, dans les circonstances les plus affligeantes & les plus difficiles. Il eût sans doute rempli cette tâche, & fait ainsi un usage très-utile de ses qualités & de ses connaissances, si les premiers orages de la révolution n'avoient pas changé tout-à-coup le cours de ses idées & la direction de ses études. Alors, comme il le dit lui-même dans son *Journal biographique*, « alors chacun se trouva jeté hors de ses occupations habituelles, & il ne fut permis à personne de se tenir à l'écart, tandis que de si grands intérêts appeloient aux fonctions publiques toutes les lumières & tous les efforts. »

Conduit par une semblable opinion & par des vues étrangères à tout sentiment personnel, Cabanis ne craignit point de compromettre sa sécurité ou ses intérêts en s'engageant dans la nouvelle carrière qui venoit de s'ouvrir, & où se précipitèrent avec lui un si grand nombre d'hommes éclairés & généreux, qui se tardèrent pas à devenir les victimes de leur enthousiasme ou de leur dévouement. Il n'étoit connu dans le monde littéraire, à cette époque, que par les fragmens d'une traduction d'Homère, & par le *Serment du médecin*, opuscule dans lequel l'auteur lit ses adieux à la poésie, au moment où il vouloit se consacrer exclusivement à la médecine.

Ses observations sur les hôpitaux, qui furent publiées en 1789, ouvrirent la série des écrits en prose, qu'il successivement consacra à la philosophie & aux sciences médicales, dans une période de vingt années. Il avoit principalement pour objet, en publiant cet ouvrage, d'introduire plusieurs réformes importantes dans l'administration des secours publics ; & de faire substituer,

dans l'intérêt de l'humanité, les hospices aux grands hôpitaux.

Les liaisons de Cabanis avec Mirabeau, l'ayant engagé, ainsi que plusieurs gens de lettres, à lui consacrer ses travaux avec le dévouement le plus absolu, il s'occupa de plusieurs autres questions d'économie sociale, & c'est au désir de cette généreuse coopération, que l'on a été redevable de son travail sur l'éducation publique.

Les derniers momens de l'homme célèbre dont il étoit à la fois l'ami & le médecin, lui fournirent dans la suite le sujet d'une notice, qu'il publia sous le titre de *Journal de la maladie & de la mort de Mirabeau*.

Cet écrit, qui produisit une si grande sensation lorsqu'il parut, ne ressemble en rien aux oraisons funèbres des grands personnages, ni aux éloges des gens de lettres. Il faut le rapporter au genre des mémoires historiques, qui antecèdent souvent un nouveau degré d'intérêt, s'ils étoient rédigés par des médecins plus à portée que les autres hommes, dans plusieurs circonstances, de recueillir sur les personnes & les choses mémorables de leur temps, des détails & des particularités qui manquent presque toujours à l'historien.

Le journal de Cabanis donne parfaitement l'idée des avantages que pourroit offrir ce genre de Mémoires historiques : les impressions qu'il éprouve, les sentimens dont il est pénétré, les faits qu'il observe, les circonstances qu'il rapproche & qu'il enchaîne, les réflexions qui lui sont suggées, rien n'est publié dans son attachante narration. Après l'avoir lue, & quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on adopte sur la conduite politique de Mirabeau, que Cabanis jugeoit encore avec l'enthousiasme de l'admiration & l'aveuglement de l'amitié, on voudroit qu'il eût transmis de semblables documens sur ceux de ses contemporains qu'il avoit été à portée de bien connaître, & dont le caractère public ou la vie privée méritoit d'avoir un observateur aussi judicieux & un historien aussi éclairé. On regrette surtout qu'il n'ait rien publié sur Condorcet, avec lequel il avoit été également lié, dont il épousa la belle-sœur, mademoiselle Charlotte de Grouchy, qui eut le malheur de lui survivre.

Dans les temps affreux où Cabanis fut privé d'une manière si déplorable des deux hommes qu'il avoit le plus aimés, c'est-à-dire, pendant les années 1792 & 1793, il s'échappa lui-même, que par une espèce de miracle, à la persécution révolutionnaire, qui le fit trembler un moment pour les jours de madame Helvétius : persécution qui continua de se porter sur ses amis les plus chers, principalement sur M. Debut de Tracy, avec lequel il venoit de former un attachement fondé sur les bases les plus solides, une mutuelle estime, & l'accord le plus parfait dans les sentimens & les opinions.

Cabanis ayant été appelé, dans ces momens difficiles, à la commission des hôpitaux de Paris, présenta à cette occasion les observations dont nous avons déjà parlé, & quelques rapports d'où il a extrait dans la suite ses considérations sur les *secours publics* : ouvrage dans lequel il avoit principalement pour objet de s'élever contre le fléau de la mendicité, qui ne peut être détruit, ainsi qu'il en étoit convaincu, que dans la source; c'est-à-dire, dans les lois défectueuses, dans les opinions erronées, ou dans des vices d'administration, qui l'ont engendré & qui le perpétuent chez les peuples modérés.

Un ouvrage de Cabanis d'un autre genre, les *Mélanges de littérature allemande*, eut pour objet d'occuper un moment madame Helvétius, qui, profondément affligée des crimes & des malheurs de 1793, s'étoit abandonnée à une mélancolie assez grave pour avoir méprisé des iniquités à ses amis.

« Ceux de vos amis, lui dit Cabanis en lui adressant cet écrit, ceux de vos amis qui ne vous avoient pas été enlevés par les brigands révolutionnaires, cherchoient à détourner doucement, & comme à votre insu, vos regards de ces tableaux qu'ils ne pouvoient vous dérober. Leurs tendres soins, seul genre de consolation auquel vous fussiez restée accessible, sont parvenus plus d'une fois à calmer l'horreur & l'indignation dont vous étiez saisie.

« Les traductions qui composent le volume suivant, sont du nombre de ces lectures que vos amis faisoient avec vous & pour vous. »

Ces fragmens de Cabanis sont traduits en grande partie de Meissner & de Goëthe; l'auteur y a joint sa traduction de la célèbre *Églogue de Gray, le Cimetière de campagne, & l'Idylle grecque de Byron sur la mort d'Adonis*.

Presque dans le même temps, Cabanis fut occupé d'un sujet bien différent, mais plus analogue à la nature de ses travaux habituels, de la question de savoir s'il existe une perte absolue de la sensibilité, & une consommation de la mort après le supplice de la guillotine.

Ces doutes élevés tout-à-coup, dans un moment où cet horrible supplice venoit de moissonner de si angustes & de si intéressantes victimes, avoient vivement ébranlé les imaginations déjà si émus & si effrayés. Il fallut les dissiper entièrement, ou faire supprimer, si la question demouroit indécise, un genre de supplice entièrement opposé, dans cette hypothèse, à l'esprit d'une législation humaine & judiciaire.

On doit à Cabanis d'avoir porté dans une pareille discussion, & pour la négative, toute la clarté & toute la conviction dont elle étoit susceptible, d'après des vues que l'état présent des connaissances & d'ailleurs étendues ou confirmées.

Toutefois, en terminant son Mémoire, l'auteur n'en formoit pas moins des vœux pour l'abolition

du supplice de la guillotine, qui lui paroissoit contraire au but d'une saine législation & trop respectable d'ailleurs de rappeler les temps affreux dont on doit vouloir effacer jusqu'aux dernières traces.

Un autre écrit de Cabanis, la *Dissertation sur le degré de certitude en médecine*, auroit dû paroître, comme il l'annoncé, dès l'année 1788, & ne fut publié que dans le cours de l'année 1808.

Dans cette Dissertation, comme dans les autres écrits, l'auteur étoit dirigé par les intentions les plus généreuses & par des vues d'utilité publique.

Du reste, sans traiter d'ailleurs le fond de cette question, il s'est borné à discuter les principales objections que les esprits froids de son temps & de nos pays ont employées pour attaquer la médecine ou les médecins, avec plus ou moins de force & d'avantages.

La partie la plus importante de ces considérations a été reproduite dans la suite par Cabanis, à la tribune législative, soit pour motiver, soit pour consolider l'organisation des trois grandes écoles de Paris, Montpellier & Strasbourg, soit pour agrandir l'école de Paris en particulier. On lui doit en outre d'avoir jeté les bases des écoles secondaires de médecine, dans les départements, d'après des vues qui n'ont été réalisées que longtemps après la mort, mais qu'il seroit injuste de ne pas attribuer au promoteur éloquent de ces institutions.

A l'époque où paraissent les différens ouvrages que nous venons de rappeler, Cabanis avoit lucifiquement obtenu plusieurs emplois & plusieurs titres littéraires & académiques : d'abord une place de professeur à l'école centrale, une chaire dans l'école de médecine de Paris, & dans la suite son admission à l'Institut pour la classe des sciences morales & politiques.

Un peu plus tard il fut nommé membre du conseil des Cinq-Cents, & prit, en cette qualité, une part très-active au grand événement du 18 brumaire, entraîné par les malheurs du temps, & subjugué par une illusion qu'il ne s'est jamais pardonnée ; trop éclairé qu'il étoit dans son amour des hommes & de la patrie, pour penser que l'état de la gloire, ou les avantages de la conquête, puissent jamais faire accepter, par des âmes généreuses, le fléau de la guerre & l'établissement du despotisme.

Afin d'échapper, au moins par intervalle, aux préoccupations douloureuses & aux regrets amers qui le poursuivaient depuis cette époque jusqu'à la mort, Cabanis se livra avec un nouveau zèle à ses études chéries & aux travaux littéraires. Alors commencèrent à paroître ses premiers mémoires sur les rapports du *physique & du moral dans l'homme*, qu'il lut à la deuxième classe de l'Institut. Nulle autre question ne pouvoit attirer plus vivement l'attention, ni trouver dans l'esprit des lecteurs éclairés une curiosité plus empressée que le sujet d'un semblable ouvrage.

Un très-petit nombre de personnes, à la vérité, attache des idées exactes à ces mots, *physique & moral* de l'homme ; mais chacun croit avoir mérité le reconnoître des facultés intellectuelles, des penchans, des passions, & une liaison de toutes ces choses avec les variations de la santé & les symptômes de plusieurs maladies.

Cette admirable alliance de l'esprit & du corps ne peut avoir entièrement échappé, dans certains momens de mélancolie & de souffrance, aux personnes qui joignent une grande délicatesse dans la manière de sentir à l'habitude de la réflexion : tel est le fond sur lequel Cabanis a travaillé, & les parties secrètes du cœur humain qu'il s'est proposé de découvrir en publiant ses observations ; il ne faut donc pas s'étonner que ce soit la celui de ses ouvrages dont on a le plus parlé, & dont on parle le plus dans le monde, & celui qui par cela même a contribué davantage à la célébrité de l'auteur, quoiqu'il n'ait été donné qu'à un très-petit nombre de lecteurs de l'apprécier, ou même de le comprendre, de le louer, de le critiquer sans prévention, avec le sentiment d'une judicieuse impartialité.

Un aussi grand succès n'avoit peut-être jamais été accordé à un ouvrage aussi grave & aussi exclusivement destiné aux perceptions éclairées. En effet, cet écrit de Cabanis fut en même temps critiqué avec violence, admiré avec enthousiasme, traduit en plusieurs langues, répandu dans toutes les parties du monde civilisé, & jusque dans la demeure souterraine d'un pauvre Polonais, chez lequel un voyageur français le trouva, avec autant de surprise que de plaisir, sur les frontières de la Prusse & de la Russie.

Cet ouvrage, si justement célèbre, doit être considéré sans le rapport du style, & dans le fond même des idées, sous le point de vue de la doctrine de l'auteur, qui, nous ne craignons pas de l'affirmer, a véritablement enrichi la médecine & la philosophie, d'un nouveau genre de connoissances.

On trouve dans les Recherches sur les rapports du moral & du physique dans l'homme, comme dans les autres écrits de Cabanis, toutes les qualités qui distinguent sa manière d'écrire, mais peut-être à un plus faible degré, l'auteur n'étant placé dans une position aussi désavantageuse ; en effet, dans ces recherches, qui sont rédigées sous la forme de mémoire, Cabanis s'adressant à ses collègues de l'Institut, pour la classe des sciences morales & politiques, ne se trouve pas dans l'état de recueillement d'un homme qui écrit, mais bien plutôt dans la situation d'un homme qui parle, qui développe les idées avec tout le charme de la conversation, ou l'abondance de l'enseignement. Cette position véritablement défavorable, même continuellement des développemens quelquefois très-étendus, des préparations, des formules oratoires, des répétitions,

des résumés, qui pouvoient convenir sans doute dans une communication orale, & la rendre même plus attachante, sans produire le même effet dans un livre; de telle sorte que cette belle suite de mémoires, rédigés avec les formes du style de la chaire ou de la tribune, ressemble plutôt à une suite de leçons, qu'à des dissertations académiques.

Quant au fond, à la doctrine du même ouvrage, ils font tout ce qu'ils pouvoient être, à l'époque où l'auteur a écrit, & sans le secours de plusieurs espérances, de plusieurs documents auxquels il a été obligé de suppléer par ses aperçus, en faisant usage de tout ce qu'il a pu tirer de son expérience personnelle ou de ses méditations; & nous l'avouons, lorsque l'on a donné aux *Considérations* sur la liaison du physique & du moral dans l'homme, toute l'attention qu'elles méritent, on ne peut se défendre d'un certain regret, en voyant tout ce qu'un pareil ouvrage auroit pu devenir, si l'auteur avoit possédé des connaissances plus exactes en physiologie, ou s'il se soit eu à sa disposition un plus grand nombre de faits tirés d'une pratique très-étendue de la médecine, & telle qu'elle peut être, en traitant, avec les hommes de toutes les classes, de tous les rangs, de tous les états, dans une grande ville, comme Londres ou Paris.

Du reste, les idées les plus neuves & les plus importantes de l'auteur, que l'on pourroit regarder comme le fond de sa doctrine, sont développées dans son deuxième & son troisième mémoire, consacrés à l'histoire des *sensations*: expression qu'il emploie dans l'acception la plus étendue, en l'appliquant à tous les organes qui, se trouvant liés entre eux & avec le cerveau, par le système nerveux, doivent être regardés comme des organes des sens; & qui répond à cette pensée ingénieuse de Montaigne, que toutes les parties ont leurs passions qui les excitent & les endorment.

Les sensations intérieures & générales que Locke & Condillac avoient entièrement oubliées dans leurs systèmes analytiques, ont leur siège dans tous les organes, mais principalement dans tous les viscères. Elles se développent dans l'exercice plus ou moins facile des fonctions, sous l'influence des maladies, à l'époque des changements ou des révolutions qui constituent les âges; enfin, dans tous les cas où plusieurs causes occasionnelles de trouble, d'irritation, sont assez puissantes pour modifier l'état des sentimens, les opérations de l'esprit, la marche & le cours des idées.

Après avoir exposé cette première partie de la doctrine, Cabanis demande quels sont les genres de pensées ou d'affections qui dépendent d'une manière plus directe, des sensations intérieures; & cette question le conduit à trouver dans l'application la plus heureuse de la physiologie à la philosophie de l'esprit humain, la théorie de l'influence

des sympathies, des penchans primitifs, & des déterminations primordiales de la sensibilité.

Il s'occupe ensuite, & d'une manière aussi nouvelle qu'ingénieuse, de plusieurs phénomènes qui permettent de supposer une action spontanée & primitive du cerveau, dans plusieurs modifications de l'entendement: question importante, & dont l'auteur répand une vive lumière sur les causes de la catalepsie, de certains délires, de l'aliénation, & de l'effet du plusieurs narcotiques ou des spiritueux, lorsqu'ils agissent à un faible degré.

Les mêmes questions sont examinées de nouveau, mais avec développement, & sous plusieurs autres points de vue, dans le dixième mémoire, qui est consacré à des recherches sur la vie animale, sur les premières déterminations de la sensibilité, de l'instinct, de la sympathie, & sur les phénomènes du sommeil & du délire: sujets de méditations très-importans, sans doute, mais qui trop souvent ont entraîné Cabanis dans plusieurs digressions purement théoriques, & dans une sphère de spéculations qui ne se rattacherent que par des liens à peine sensibles à son objet principal, la connaissance des rapports du physique & du moral dans l'homme.

Cette grande question, dont l'examen se rapporte dans ses développemens, aux parties les plus délicates de la morale, & aux sujets les plus élevés & les plus inaccessibles de la physiologie, & du sentiment, l'entraîne en effet dans certaines idées, dans certaines opinions qui ont paru contraires aux points de dogme & de croyance religieuse les plus répandus parmi les hommes. En faire un reproche à l'auteur, l'accuser vaguement d'athéisme & de matérialisme, & affecter de croire qu'il a en pour but principal d'attaquer les bases sacrées de la morale, seroit une injustice; & malheureusement cette injustice a été commise, & avec toute la partialité de la haine & le zèle de l'intolérance. Nous ne croyons pas devoir la combattre: il nous suffira de remarquer que ceux qui s'en sont rendus coupables, ne paroissent pas avoir aperçu que le caractère des agitateurs & des sectaires auxquels Cabanis s'est adressé, la gravité de la discussion, les formes imposantes de son style, enfin la nature des questions dont il s'est occupé, & qui toutes ou presque toutes ne sont pas à la portée des esprits vulgaires, lui ont permis d'avancer sans péril comme sans imprudence, quelques assertions hardies & contraires en apparence aux croyances religieuses. Nous ajoutons que les détracteurs de Cabanis, pour être conséquens & complets dans les hostilités dirigées contre lui, devoient y comprendre, sans exception, les philosophes qui, depuis Galilée jusqu'aux savans les plus illustres de notre âge, ont travaillé, soit dans l'étude générale de la nature, soit dans l'étude particulière de l'homme, des faits & des vérités qui semblaient en

opprobrium avec les idées religieuses les plus généralement admises & les plus révérées.

Dés plaintes, des reproches aussi son fondés, & sur lesquels peut-être nous aurions dû garder le silence, ne troublent en rien la gloire & le bonheur de Cabanis; mais le malheur & la plus profonde tristesse lui arriveront d'un autre côté, & le frapperont à l'endroit le plus sensible. Madame Helvétius, qui occupoit une si grande place dans ses affections, lui fut enlevée, & sans doute il n'aurait jamais été consolé d'une perte semblable, si l'attachement de ses autres amis, & le bonheur dont il étoit comblé dans sa famille, ne l'avoient protégé contre les suites d'une si grande infortune.

Depuis cette époque, Cabanis publia quelques ouvrages, qui se rapportent d'une manière directe à la médecine, quelques *observations médicales*, & un autre écrit, ayant pour titre : *Révolution de la médecine*; tableau naïf & rapide de cette partie des connaissances humaines, aux différentes époques de son histoire.

Quelques autres ouvrages qui n'ont pas été imprimés & qui sont partie de ses manuscrits, sont relatifs à différents devoirs académiques : tel est un *éloge historique de Fico-d'Ayres*, dont il avoit été chargé par l'Académie française, & dont la lecture nous a paru aussi intéressante qu'instructive. Tels font encore deux discours, un discours d'ouverture & un de clôture, pour les leçons d'*histoire de la médecine*, dont il étoit chargé à la Faculté de Paris.

Le discours d'ouverture est une savante & éloquentة allocution, considérée en totalité à la manière d'Hippocrate; on y distingue, parmi plusieurs aperçus très-ingénieux, cette opinion que les savans, les philosophes, les poètes, les grands orateurs & les grands artistes de l'antiquité ont tous excellé également dans l'observation assidue & la contemplation éclairée de la nature : ce qui explique leur supériorité, & donne à leurs ouvrages ce caractère, cet air de famille que tous les hommes de goût savent aisément reconnoître dans leurs productions.

Dans le discours de clôture, l'auteur s'attachant à une question plus générale, à un objet plus étendu, retracée d'une manière rapide; mais éloquentة, les devoirs du médecin dans la société. Nous avons plus particulièrement remarqué dans ce discours, un passage sur la transition de la vie sensuelle, pour les jeunes médecins, à leur existence active & compliquée dans le grand monde. Il nous a paru également impossible de ne pas donner notre attention à une digression sur le caractère du médecin, qui doit se former essentiellement par l'étendue des connoissances, l'élevation, la pureté des sentimens, l'indépendance de l'esprit & le mépris des idées populaires.

Parmi les autres manuscrits de Cabanis que nous avons parcourus, se trouvent la biographie

de son père, dont nous avons déjà parlé, la traduction en vers de *l'Iliade*, & une lettre fort remarquable sur les *causes premières*, adressée à M. F..., qui s'occupoit alors de l'histoire du matérialisme. Rien ne pouvoit inspirer un intérêt plus vif à Cabanis, que cette philosophie si imposante des épiciète & des Marc-Aurèle; de ces hommes si vertueux & si sages, qu'il faut admirer lorsqu'ils nient la douleur & qu'ils refusent d'admettre la réalité du mal & du plaisir physique, parce qu'ils avoient évidemment pour objet, dans cette exagération de leur doctrine, de subjuguier les affections corporelles par l'empire de l'intelligence, & de développer chez l'homme, une puissance intérieure assez forte, pour maîtriser, dans toutes les occurrences de la vie, les accidens de la nature & les caprices de la fortune.

Ces philosophes s'étoient occupés, dans leurs spéculations, des causes premières & de la destinée de l'ame humaine.

L'examen de leurs idées, sur ces grandes questions, parut important à Cabanis, & c'est de-là qu'il est parti pour s'en entretenir avec son savant ami, en lui faisant avec lui de réflexions, dans lesquelles différentes conclusions, échappées à la plus haute philosophie, ne peuvent être regardées comme le dérivé des opinions & des principes que l'auteur a exposés dans les autres ouvrages.

Les philosophes modernes; dont il a partagé d'ailleurs le sentiment sur les véritables bases de la morale, & les sources du bonheur & de la vertu parmi les hommes; ces philosophes ne s'étoient guère occupés que de ce qui leur avoit paru erroné ou véridique, dans les opinions & les croyances religieuses, pour rejeter les unes & conserver les autres.

Cabanis s'est placé dans un point de vue beaucoup plus élevé; il s'est bien moins occupé de la réalité de ces opinions ou de ces croyances, que de leur origine & de leur origine : s'attachant dans cette intention à découvrir la marche que l'esprit humain a suivie à travers mille détours, pour trouver la liaison des effets & des causes, & pour se faire une notion plus ou moins justifiée de la puissance ou des puissances créatrices de la nature, & du principe universel qui gouverne les mondes.

Ces premières notions, sur les causes premières de l'esprit humain, se sont perfectionnées avec le temps : elles ont été évidemment servies de base aux différentes religions, & furent l'objet des plus célèbres systèmes des anciens philosophes.

Ces premières notions ont exercé une grande influence, sur elles-mêmes, & par leurs rapports avec la morale pratique, que l'on a voulu y rattacher dans tous les temps; on méconnoît la véritable source; la nature même de l'homme & les rapports naturels qu'elle établit entre eux, par leurs besoins & par leurs facultés & par leurs rapports constants, universels, parce que l'organisation humaine est fixe, ou que du moins les changemens dont elle est susceptible,

ne peuvent modifier ces rapports d'une manière remarquable.

Après avoir développé ces premiers aspects, Cabanis est conduit à reconnaître, à proclamer ce qui a pu être véritablement utile, dans les institutions ou dans les croyances religieuses, non-seulement à l'origine des sociétés, mais encore à une époque très-avancée de la civilisation, & lorsque leur influence s'exerce plus particulièrement sur les esprits timides qui ont besoin d'appui, & sur les âmes ardentes, sur les imaginations passionnées qui ont besoin d'aliments.

Du reste, les réflexions de ce genre ne sont qu'accessoiries dans son sujet; ce qui l'occupe d'une manière principale, c'est la question du savoir, si ce qu'on appelle les idées religieuses, qui se rattachent aux notions les plus anciennes sur les causes premières, ne tiennent point essentiellement dans l'homme, à sa manière de sentir; & à l'opinion qui résulte de cette manière de sentir, relativement aux forces motrices de l'Univers?

Cette recherche est plutôt historique que dogmatique; elle a rien moins pour but que de saisir, quo de suivre la notion des causes premières, depuis le fétichisme le plus grossier, jusqu'au dessein le plus rationnel, au milieu de toutes les modifications qu'elle a éprouvées, à mesure que la curiosité des hommes a été plus active & plus éclairée; discussion qui convenoit éminemment à un esprit aussi étendu, aussi élevé que celui de Cabanis, aussi habité surtout à pénétrer, par de savantes analyses, dans les parties les plus secrètes & les plus profondes du cœur humain.

La rédaction & la publication successive des différents ouvrages de Cabanis, que nous venons de passer en revue, feroient, à la fin du dix-huitième siècle & au commencement du dix-neuvième, les seuls événements mémorables de sa vie, qui fut alors exclusivement remplie par les occupations littéraires & le bonheur de la vie domestique. Pour goûter plus complètement une existence aussi douce, & pour fuir, autant qu'il étoit possible, le spectacle de l'asservissement de son pays, auquel il avoit si involontairement contribué, il se retira à Auteuil, dans l'habitation où il avoit passé une partie si heureuse de sa jeunesse, & dont le testament de son excellente mère, madame Helvétius, lui avoit assuré la jouissance pendant sa vie.

Jusqu'à la première atteinte de la maladie, qui le fit périr dans la suite, il habita cette charmante retraite, dont il conserva la célébrité, & que tous les hommes éclairés de tous les pays & de toutes les classes continuèrent de visiter avec empressement; attirés, les uns par les souvenirs attachés à cette habitation, les autres par le désir de voir un philosophe éloquent, & l'un des plus habiles écrivains de son siècle, tous par le espoir de s'instruire dans sa conversation, qui étoit aussi lumineuse, aussi précieuse, & peut-

être encore plus attachante que la lecture de ses ouvrages.

Je n'oublierai jamais cette demeure charmante d'Auteuil, dans laquelle, bien jeune encore, je fus accueilli avec tout de bienveillance, où je rencontrai les contemporains de Cabanis les plus recommandables, M. Deffout de Tracy, M. Garat, Ginguené, Gallois, Laromiguière, Thuret, Saint-Aubin, Poniel, Jacquemont, Andrieux, Richerand, Pariset, Alibert, qui lui ont survécu, & qui, après l'avoir admiré pendant la vie, ont consacré un respect religieux à sa mémoire.

Son genre de vie, dans un pareil état de choses, n'offrit pas l'isolement d'un solitaire, mais la retraite souvent fréquentée d'un sage, qui auroit pu se passer des hommes pour son propre compte, mais qui avoit conservé l'habitude de les aimer, & qui trouvoit plus conforme à ses devoirs, à sa mission philanthropique, de s'en rapprocher, ou pour les servir, ou pour les instruire.

Dans cette disposition d'esprit, & ne le croyant pas le droit de se montrer philanthrope, parce que certains hommes qu'il avoit estimés étoient laissés corrompre, & que le crime d'un ambitieux avoit trahi ses vœux & ses espérances, Cabanis fit deux parts de son temps; la première, celle d'une vie domestique & méditative; la seconde, celle d'une vie active & consacrée aux devoirs qui lui semblaient imposés par sa situation & par la nature de ses connaissances.

Le commencement du jour étoit ordinairement consacré à cette première part, à cette douce habitude de cultiver ou d'exercer son esprit, & d'arrêter, dans une rédaction définitive, le résultat des idées & des réflexions auxquelles il s'étoit livré pendant la nuit ou dans le cours de la journée précédente. Quant à la seconde, celle des devoirs & de la vie active, Cabanis, malgré son goût pour l'étude, lui donna toujours une grande étendue; & nul autre avant, nul autre homme de lettres ne fut aussi disposé que lui, à accorder son temps au profit de tous ceux qui en réclamoient l'usage, & à suspendre ses occupations chéries, pour les servir ou pour les entendre; persuadé, comme il l'étoit, que l'importance des spéculations les plus élevées ne peut jamais être un prétexte pour refuser de rendre un bon office, & pour employer son activité dans l'exercice d'une bienveillance journalière.

Son grand principe du moral, que nous avons déjà rappelé, cette opinion que tout homme, quel qu'il soit, doit faire dans la position la plus de bien qu'il lui est possible, le meilleur emploi pour tous, de son temps & de ses facultés; ce principe, Cabanis ne l'appliqua pas seulement aux devoirs de la vie publique & aux choix, à la direction de ses travaux, il l'étendit scrupuleusement aux plus minces détails de la vie privée, & aux rapports les moins importants, en apparence, avec la société. C'est à une heure aussi pure, à un

mouvement aussi droit de son esprit, qu'il faut rapporter son humanité si constante, son desir si vrai d'être utile & de se rendre agréable; mais surtout la tendresse de cœur pour tous les genres de souffrances, & son empressement débiteur pour les pauvres malades, par lesquels il aimait à être consulté, même dans les derniers temps d'une existence, dont il vit approcher le terme, sans se replier avec effroi sur lui-même, & sans se laisser abattre par le découragement & la personnalité.

C'étoit sans doute au même principe, à la même cause, que le rattachement peut-être, par un lien plus délicat & moins visible, chez Cabanis, les qualités que l'on estimait & que l'on recherchait le plus dans sa société; le charme & la simplicité des manières, une obligeance si aimable, si soutenue, une politesse si affectueuse, & un respect pour la dignité humaine, qu'il portait dans ses moindres relations avec les hommes, au point de n'avoir jamais laissé sans réponse l'offrande d'un simple opuscule ni la demande d'un conseil ou d'un service.

Sa tolérance extrême pour toutes les façons de penser ou de sentir, & son indulgence sans bornes, sa commutation pour les coupables, ne pouvoient d'ailleurs être attribuées chez lui, ni à l'égoïsme ni à l'indifférence, mais à des vues très-délicates, à des aperçus très-élevés sur les motifs souvent inaperçus des actions des hommes, sur la liaison secrète de leur tempérament, de leurs sentimens, de leurs maladies & de leurs vices.

« Vous vous étonnez, disoit-il un jour à l'un de ses amis, de cette indulgence de mon caractère; & s'il en étoit autrement, à quoi m'auroit servi de m'être consacré à l'étude & à la pratique de la médecine ? »

Cabanis concilioit cette indulgence si remarquable pour les fautes ou la travers des hommes, avec une admiration passionnée pour toutes les actions bienfaisantes & généreuses.

Il possédoit également deux ordres de qualités qui paroissent s'exclure; la candeur, la simplicité, la confiance d'une part, & d'une autre part, une connaissance approfondie du cœur humain, une finesse d'esprit, une délicatesse de goût, que nul autre homme peut-être n'a porté au même degré; heureux assemblage qu'un observateur exercé pouvoit aisément découvrir dans sa physionomie, d'ailleurs si expressive, si mobile, toujours si bien d'accord avec toutes les manifestations de ses sentimens & de ses pensées, ou avec les modulations, les inflexions de sa voix & la variété de ses intonations.

De reste, son organisation en apparence si parfaite, si favorable au développement de la vie intellectuelle, appartenait cependant aux complexions délicates & morbides, & devoit, après avoir gâté sa vie par des souffrances habituelles, en abrégé le cours; & amener pour lui,

dans la force de l'âge & du talent, une mort soudaine & prématurée.

Cette disposition malheureuse de ses organes qui ne fut bien connue qu'après ce funeste événement, étoit caractérisée par un défaut de proportion entre le cerveau, qui se trouvoit dans un état naturel, & le cœur qui avoit un excès de volume & de force; d'où devoient résulter nécessairement une irritation habituelle, une congestion sanguine vers les parties supérieures, & un sentiment pénible de l'existence qui ressembloit à la faiblesse.

Une pareille situation, qu'il auroit fallu modifier par un régime particulier, & dont quelques hommes célèbres avoient déjà présenté l'exemple, auroit dû être soupçonnée, jusqu'à un certain point, pendant la vie de Cabanis, si l'on avoit considéré, sous leur véritable point de vue, & d'après les données d'une saine physiologie, différents symptômes qu'il observoit habituellement sur lui-même. La dureté habituelle & la vibratilité de son ton, par exemple; la coloration animée & presque ardente de son visage, ses insomnies fréquentes, surtout à Aureuil, dont l'air étoit évidemment trop vif pour sa complexion; enfin, un sentiment de prostration illusoire, de faiblesse indircète, sur lesquels il se trompa, & trompa les autres jusqu'à son dernier moment.

Cette impression de faiblesse & d'accablement, qui ne s'étoit jamais présentée à lui comme l'effet d'une oppression de forces & d'un obstacle dans les mouvemens de la vie, lui paroissoit plus insupportable que la souffrance; & toutes les particularités, toutes les dispositions de son régime, qu'il combinait dans le dessein de la combattre, tenoient nécessairement à l'augmenter & à développer de plus en plus l'état morbide de son organisation.

Une première attaque d'apoplexie, évidemment liée à cette cause, ne lui fut point attribuée, & ne parut à Cabanis lui-même que le premier degré de l'une de ces apoplexies nerveuses, que la nature accorde quelquefois aux philosophes, comme une récompense de leurs travaux.

Cette première attaque eut lieu au mois d'avril 1807, d'une manière inattendue, & au moment où Cabanis se promenoit à Aureuil avec M. Richerand, qui lui fit administrer les secours les mieux indiqués & les plus convenables.

L'attaque avoit été faible en apparence, & Cabanis, qui en avoit bien jugé la gravité, parut cependant disposé à le rétablir; mais au moment où les suites de cette première atteinte commencent à se dissiper & à laisser sa famille & ses amis se livrer à de douces espérances, une seconde attaque survint au commencement de l'automne, avec paralysie, & fut bientôt suivie d'une troisième.

Depuis cette époque, la vie ne fut plus pour lui qu'un bien toujours prêt à s'échapper, & que sa famille & ses amis sembloient retenir par les soins les plus empressés; trop persuadés de ne pou-

voir le conserver qu'à ce prix encore quelques instans, & un ménage & en soutenant, par les attentions les plus délicates, une existence aussi fragile.

Un mois de mai de l'année 1808, une nouvelle attaque qui fut mortelle, arriva pendant la nuit, à la suite d'une journée pendant laquelle Cabanis s'étoit entouré de sa famille, avec un redoublement de tendresse; comme si de tristes pressentimens l'avoient averti qu'il jouissoit de ce bonheur pour la dernière fois, & qu'il devoit employer toutes les forces de son ame pour en joindre sans distraction & sans partage.

L'espace si court d'une année, qui sépara cette dernière & funeste attaque de la première, est une des parties de la vie de Cabanis, dans laquelle on a vu le mieux, combien cet excellent homme méritoit d'être aimé & estimé.

Pendant tout ce temps, il observa alors sur lui-même, avec la curiosité d'un savant & le stoïcisme d'un sage, toutes les variations, toutes les nuances de la situation nouvelle, & leur liaison avec l'état de son esprit & les habitudes de son ame; faisant à ce sujet, & au milieu de ses amis, les observations les plus spirituelles & les remarques les plus judicieuses. Sa raison, qui ne fut pas moins inaltérable que la bonté, s'attachoit à cette étude, & cette contemplation, & sans jamais en être détournée ou troublée par l'idée du danger attaché à la position.

Il sentoit très-bien d'ailleurs la nécessité de renoncer à ses études chéries, & à tous les efforts un peu suivis d'attention ou de méditation; mais dans quelques circonstances, l'intérêt de sa conservation ne lui parut pas assez fort pour l'empêcher de se livrer furtivement à quelques travaux qui lui paroissent nécessaires pour mettre la dernière main à sa traduction d'Homère. Ces écarts du régime, qui pouvoient être si dangereux, furent toutefois assez rares; & ce que la crainte d'avancer le terme de sa vie n'avoit pu faire, la tendresse de sa famille réunie aux prières de ses amis, l'obtint, & lui fit consentir à ménager sa fragile existence, dans leur intérêt & pour goûter plus long-temps le bonheur de les aimer & d'en être aimé.

La mort vint le frapper sans le surprendre dans ses dispositions, & au milieu d'une retraite qui lui avoit choisi près de Meulan, sur le territoire du petit village de Reuil, où il lui a fallu de séjourner pendant plusieurs mois pour y faire éclore à jamais sa mémoire.

Ceux qui furent ses amis, & dit-on de ses plus chers panégiristes, dont nous emprunterons les paroles pour terminer cette notice; « ceux qui furent ses amis, furent quelle généralité, quel désintéressement il portoit dans le sentiment de l'amitié; mais qui peut mieux attester ses vertus privées que la douleur profonde de l'épouse qui lui fut si chère, que la tendresse inaltérable de cette femme, douée de toutes les perfections & de toutes les vertus de son sexe; que le culte touchant & pieux qu'elle

a voué à sa mémoire..... le digne compagnon d'un excellent homme! Adieu à nous! au moins le souvenir de tout le bonheur dont elle l'a environné jusqu'au dernier moment, adoucit l'amertume de ses regrets! Puissent ses aimables enfans être toujours par leurs vertus, les vivantes images d'un père si chéri, & la consolation d'une mère adorée!

Retiré dans une campagne éloignée, depuis son premier accident, & forcé de s'interdire toute occupation laïque, tout travail qui eût exigé une application soutenue, Cabanis conserva du moins l'habitude des sentimens affectueux & des idées de bienfaisance. Il étoit sans cesse occupé à soulager les malheureux habitans des villages voisins du lieu où il avoit fixé sa demeure. Combien de fois il les aida dans leur détresse! combien de fois le payan pauvre & couché sur le lit de douleur, le vit apparaître dans sa chaumière, comme un ange de paix & de consolation, à la voix duquel les souffrances sembloient s'apaiser, & les vaines terreurs se dissiper! Aussi, à la nouvelle de ce qui l'a enlevé, des hommes simples & reconnoissans sont accourus de toutes parts; ils ne pouvoient le séparer de lui; ils l'ont reconduit loin de leurs demeures, & leurs larmes sincères avoient long-temps arrosé le cercueil de l'être bienfaisant, & bon, avant qu'une pompe solennelle l'accompagnât à son dernier asyle les restes réservés du savant illustre, du grand écrivain & du magistrat élevé à l'une des premières dignités de l'Empire. » (Voyez le discours de réception à l'Académie française, de M. de Tracy; in-4°, pag. 21.)

DEUXIÈME PARTIE.

Rapports du moral & du physique de l'homme, considérés dans ce qui concerne les sensations & les premières déterminations de la sensibilité.

Les rapports du physique & du moral de l'homme sont aujourd'hui le sujet d'un nouveau genre de connaissances dont Cabanis a véritablement enrichi les sciences morales & la médecine, & leur exposition; d'après son ouvrage, nous a paru inséparable, dans un Dictionnaire encyclopédique, d'un ouvrage rendu à la mémoire de ce philosophe. Après avoir rempli cette tâche, nous croyons devoir donner à cette exposition toute l'importance, toute l'étendue qu'un pareil sujet exige, sans oublier de rappeler à un lecteur que nous allons lui faire parcourir une carrière que Cabanis a ouverte, & dans laquelle la médecine & la philosophie continuellement rapprochées l'aide de l'autre, s'éclaircissent & s'agrandissent par leurs mutuelles communications.

Les rapports du moral & du physique, considérés sous le point de vue le plus étendu & le plus général dont ils soient susceptibles, embrassent l'histoire philosophique des sensations & tout ce qui concerne les déterminations de la sensibilité.

Ce point de vue très-étendu fut le sujet de plusieurs mémoires de Cabanis, qui renferment en grande partie les fondemens de sa doctrine, & sur lesquels nous arrêterons d'abord notre attention.

Le premier de ces mémoires a pour objet particulier, la partie la plus vaste de cette question, l'*histoire physiologique des sensations*; il nous paroît former comme l'introduction d'une suite de réflexions du même genre, sur la vie animale, les premières déterminations de la sensibilité, l'instinct, la sympathie, le sommeil & le délire : réflexions qui ne se trouvent rejetées à la fin de son travail, que parce qu'elles se présentent plus tard à son esprit, & comme le dernier résultat de ses méditations.

Nous rapprocherons ici, & pour en faire ressortir les résultats principaux, ces différentes discussions qui portent sur le même fonds d'idées, & qui tendent à répandre une lumière nouvelle sur un même genre de phénomènes.

Pour la physiologie, l'ame, le moral, ne sont rien autre chose qu'un ordre particulier de fonctions; qu'un genre particulier de phénomènes, dont il lui importe de développer les différentes circonstances, sans vouloir d'ailleurs comprendre leurs causes premières, dans ses investigations.

La sensibilité qui se montre comme le point de départ & comme la véritable origine de ces fonctions, ouvre pour nous, dans les développemens successifs, la vaste carrière de l'observation & des connoissances. Lorsque déjà on a pu s'assurer que les causes qui existent, qui développent cette sensibilité, se trouvent placées en dehors de l'organisation, on a fait le premier pas dans la nature, & l'existence humaine est déjà très-avancée.

Cet exercice de la sensibilité dans les organes particuliers que l'on a désignés sous le nom de *senon d'organes des sensations*, a été, depuis Locke, le sujet d'une suite d'observations & de remarques que l'on a regardées, du moins en France, comme les véritables bases d'une saine métaphysique; en reconnoissant ainsi ces deux philosophes comme les promoteurs de la psychologie d'observation, on ne peut s'empêcher de voir avec Cabanis, qu'ils ont trop resserré les idées que l'on doit attacher aux mots *sens* & *sensations*.

Toutes les parties qui sont liées, soit entr'elles, soit avec le cerveau, sont des organes des sens, & contribuent souvent, par des impulsions spontanées & involontaires, à nos déterminations. Le jeu, l'éclat, les fonctions plus ou moins difficiles, les lésions plus ou moins graves des différents organes, donnent lieu à une foule d'impressions diverses, & Montaigne a dit avec raison, que toutes les parties ont leurs passions qui les travaillent & les endorment; penées que nous avons déjà citées, & qui répondent à celles de Locke.

*Spécies juniores omnis
Furibiles, nervis, visis, quæcumque videmus
Mollis, naturalis consistit corporis essentia.*

Les faits, les preuves de tous genres, dont Cabanis appuie cette doctrine, ne laissent aucun doute; ainsi, à l'époque de la puberté, lorsqu'un appareil d'organes, qui s'est fait remarquer à peine depuis sa naissance, sort tout-à-coup de son engourdissement, & que les opérations cachées dans la structure délicate ont retenu de toutes parts, des idées nouvelles, d'autres déterminations naissent en foule; & si la nature n'a point été précipitée dans sa marche, on voit se former, indépendamment de toute expérience, un nouveau moral & un nouvel ordre de sentimens & de pensées.

« L'adolescent, dit Cabanis, cherche ce qu'il ne connoît pas; mais il le cherche avec l'inquiétude du besoin, il est plongé dans de profondes rêveries; son imagination le nourrit de peintures idéelles, source inépuisable de ses contemplations.

« Son cœur se perd dans les contemplations les plus douces, dont il ignore encore le but; il les porte en attendant sur les objets qui l'environnent. Chez les jeunes filles, le passage est encore plus brusque, & le changement plus général, quoique marqué par des traits plus délicats. C'est alors que l'Univers commence véritablement à exister; que tout prend une ame & une signification pour elles; c'est alors que le rideau semble se lever tout-à-coup aux yeux de ces êtres incertains & étonnés; que leur ame reçoit en foule tous les sentimens, toutes les pensées relatives à une passion, l'affaire principale de leur vie, l'arbitre de leur destinée, & dont elles répondent quelquefois sur la nôtre, le charme & les douleurs.

Des changemens moins remarquables produisent souvent une foule de différences dans les idées. L'état des entrailles, les maladies des organes abdominaux, troublent quelquefois les sentimens & les pensées, donnent d'autres penchans, font naître dans l'esprit des images inconnues. De tous ces faits, & d'un grand nombre d'observations analogues, il faut donc conclure avec Cabanis, que les idées & les déterminations morales ne dépendent pas uniquement de ce que l'on nomme *sensations*, mais que les impressions résultantes des fonctions de plusieurs organes y contribuent plus ou moins, & dans certains cas, paroissent les produire impunément.

Quelles sont ensuite les idées & les affections qui tiennent à chacun des deux genres d'impressions qu'il faut distinguer dans les sensations?

Cabanis répond à cette question, avec beaucoup de détail; & par un enchaînement de faits & d'observations du plus grand intérêt, il arrive à conclure : 1°. que les idées dépendent plus particulièrement des sensations proprement dites ou extérieures; 2°. que les déterminations confuses, imprécises, qui portent le nom d'*instinct*, dépendent des impressions internes; 3°. que le sentiment & le mouvement sont liés l'un

à l'autre; 4°. que, pour sentir, l'organe nerveux paroit réagir sur lui-même (1), tandis que pour mouvoir, il réagit sur d'autres parties; 5°. que les facultés instinctives peuvent se développer presque sans le concours du cerveau; 6°. que la formation de la pensée est dépendante de cet organe, qu'elle s'y rapporte, que ce viscère en est le théâtre & l'instrument.

Le système nerveux en général, & le cerveau en particulier, sollicités, mis en action par les impressions internes & externes, peuvent-ils éprouver des impressions directes, par l'effet des changements qui s'opèrent dans leur intérieur? Cabanis croit pouvoir répondre affirmativement à cette question, & admettre des sensations qui se développent uniquement dans le sein du système cérébral, & qui ont souvent une grande énergie. Les exemples les plus curieux des effets produits par la méditation & la contemplation, plusieurs folies produites par les maladies du cerveau; les symptômes si extraordinaires de l'hypochondrie & de la mélancolie, sont les preuves dont Cabanis appuie cette seconde partie de sa doctrine : genre de faits dont la simple indication suffiroit pour mettre hors de doute, que l'étude des rapports du physique & du moral de l'homme est véritablement une physiologie transcendante, & appliquée à des objets que le double flambeau de la médecine & de la philosophie peut seul éclairer d'une manière convenable. On fera les mêmes remarques dans le passage très-étendu que Cabanis consacre encore à l'examen des sens, & dans lequel, répandant le charme de son style sur quelques détails d'anatomie & de physiologie, il prouve évidemment que ces sciences, sous la plume d'un écrivain aussi habile, pourroient aisément inspirer le plus vif intérêt, à tous les lecteurs d'un esprit cultivé.

L'organe particulier du cerveau, les sentimens intérieurs & les impressions diverses qui ré-

sultent des changemens de la sensibilité & de la disposition des organes propres aux différens âges, & dans les différens modes de tempérament & de complexion, sont regardés plus raisonnablement comme un des objets qui importent le plus dans une histoire physiologique de ces différens états de la vie. Suivons les points les plus saillans de ce beau sujet, dans une rapide analyse des considérations du philosophe que nous venons de citer.

Chaque saison de la vie est caractérisée par des changemens & des révolutions trop remarquables dans l'organisation, pour ne pas modifier le système des facultés intellectuelles & des affections. Ainsi, dans l'enfance, une grande mobilité, des opérations tumultueuses, des déterminations rapides, une activité de sensation insatiable, sont naturellement une suite de l'action vive & prompte du système nerveux sur les autres organes; de la prédominance de l'irritabilité, de la flexibilité & de la souplesse qui résultent du développement des vaisseaux lymphatiques, du tissu cellulaire & des glandes.

La même liaison entre le physique & le moral s'observe de sept à quatorze ans, & J. J. Rousseau conduit Cabanis à parler ainsi de J. J. Rousseau, qui a si bien observé & décrit cet âge.

J. J. Rousseau s'est attaché particulièrement, dans son plan d'éducation, à tracer l'histoire & à montrer la véritable direction de cette époque importante de la vie. Il en a suivi le développement avec une attention scrupuleuse; il l'a peinte avec la plus grande vérité, & les leçons pratiques dont il a donné des exemples, sont des modèles d'analyse; on ne retrouve cette méthode, portée au même point de perfection, dans aucun autre de ses écrits; à peine pourroit-elle même avoir quelque degré de précision de plus, entre les mains des philosophes les plus exacts, & l'admirable talent de l'auteur prête aux vérités qu'elle lui dévoile, une vie, un charme & même une lumière qui les font passer tous ensemble dans l'esprit & dans les cœurs.

Arrivé à l'époque de la jeunesse, Cabanis s'attache plus particulièrement au nouveau foyer de chaleur & d'énergie, qui répand alors ses irradiations, en montre les premières étincelles, l'éclat, la plénitude, & remarquant l'énergie & l'abondance des sentimens qui remplissent cette période de la vie, il laisse entrer toute l'influence de cet âge sur les âges suivans.

Cette adolescence, cet âge où l'on sent le plus, où l'imagination jouit de la plus grande activité, est sans contredit aussi celui où l'on recueille le plus de ces idées & de ces sentimens, qui ne sont encore, pour ainsi dire, que de vagues impressions, mais qui forment la collection la plus précieuse pour l'avenir; & quand la réflexion vient enfin prédominer sur toutes les opérations de l'organe cérébral, elle s'exerce principalement sur les matériaux qui lui ont été fournis à cette époque intéressante.

(1) Cette action, ce mouvement prétendu du système nerveux sur lui-même; dans la sensibilité, sont bien loin d'être démonstrés — en adoptant des semblables idées, Cabanis s'est laissé entraîner, à son tour, par des réminiscences de la doctrine de Collen, que les physiologistes modernes s'ont peine adoptées. L'action d'où résulte la manifestation de la sensibilité, & qui entraîne nécessairement l'exercice d'un mode de contractilité, ou de mobilité, ne peut être résoluée en doute; mais nous ignorons complètement la nature, c'est à dire, la modification matérielle ou corporelle, d'une semblable action & la conséquence habituelle & légitime.

La réaction du système nerveux pour produire le mouvement musculaire, s'offre pas moins de doute & d'obscurité, & si l'on est porté à la supposer, dans les mouvemens volontaires, & dans tous les phénomènes qui concernent les rapports de l'action nerveuse avec les grands mouvemens de locomotion, on ne peut s'empêcher de reconnaître en même temps, que plusieurs autres exercices de la contractilité s'exercent, soit dans les animaux, soit dans les plantes, sans l'influence de cette même réaction nerveuse.

Des sensations moins actives, des passions moins naturelles, l'ambition & l'avarice, d'autres habitudes intellectuelles, la sagesse & la circonspection, la tristesse & l'inquiétude, &c. &c., se succèdent dans les âtres âgés, & par une suite de différentes révolutions dans les organes, mais principalement dans les organes de l'abdomen & dans les vaisseaux à sang noir ou *veineux*.

La mort, qu'amènent nécessairement toutes ces révolutions, & qui les précède souvent, est ordinairement accompagnée de divers genres de sensations, suivant l'âge auquel elle arrive & le caractère des maladies.

a Dans la mort *senile*, dont la description doit former le dernier trait de l'esquisse que nous venons d'offrir, le malade n'éprouve que cette difficulté d'être, dont le sentiment fut en quelque sorte la seule agonie de Fontenelle. On a besoin de la repoſer de la vie, comme d'un travail que les forces ne sont plus en état de prolonger. Les erreurs d'une raison défaillante ou d'une sensibilité qu'on égare, en la dirigeant vers des objets imaginaires, peuvent seules, en ce moment, empêcher de goûter la mort comme un doux sommeil.

Dans l'enfance, on dirait que les deux sexes ne font que deux exemplaires d'un même modèle. C'est en avançant en âge, que l'homme & la femme acquièrent de la physiologie, & qu'ils présentent cette série d'oppositions & de contrastes, que la civilisation augmente, & qui donne tant de puissance à l'amour. Cette marche de la nature dans la femme, a été exposée avec autant de charme que d'exactitude par Jean-Jacques & par Roussel; & Cabanis avoue que l'on ne peut plus rien ajouter de bien important à leurs observations sur la véritable place que la femme doit occuper dans le monde, & sur l'emploi de ses facultés les plus propres à faire son bonheur & celui de l'homme.

Enfin, l'empire des organes de la reproduction dans l'autre sexe, fixent également la destinée & les caractères physiques & moraux de tout genre, & les suites de leur privation, laissent assez voir combien cette influence est puissante & étendue.

Nature, dit Cabanis, est peut-être la seule exception remarquable que l'on puisse opposer à cette règle, d'ailleurs véritablement générale. C'est du moins le seul grand-homme parmi les écrivains, dont le nom vive encore dans l'histoire.....

Quand la destruction des facultés génératrices est le produit tardif des maladies ou de l'âge, elle n'a pas, à beaucoup près, la même influence; la disposition des fibres & la sensibilité de l'individu sont déjà modifiées profondément par les habitudes de son sexe particulier, &c.

Ces réflexions, que nous rappellerons en les ajoutant à peine, ces réflexions & plusieurs autres considérations générales sont terminées par une

conclusion dans laquelle on cherche à diriger par l'art usuel de la vie, quelques traits de la lumière qui a été répandue sur les objets précédemment exposés. On distinguera sans doute dans cette conclusion, un passage sur l'amour qui nous a vivement frappés, & qui respire partout la sagesse & le sentiment. En voici quelques fragmens.

« L'amour tel que le développe la nature, n'est pas ce torrent effréné qui renverse tout; ce n'est pas ce fantôme théâtral qui se nourrit de ses propres éclats, se complait dans une vaine représentation; & s'enivre lui-même des effets qu'il produit sur les spectateurs; c'est encore moins cette froide galanterie qui se joue d'elle-même & de son objet, dénature, par une expression recherchée; les sentimens tendres & délicats, & n'a pas même la prétention de tromper la personne à laquelle ils s'adressent.

..... non ce n'est rien de tout cela. l'amour fera la consolation & non l'abbaye de la vie, il l'embellira, mais il ne la remplira pas. » Bacon disoit de son temps que cette passion est plus dramatique qu'usuelle, *plus senex quam vitæ prodest*. Il faut espérer que dans la suite on dira le contraire, &c.

Le Mémoire sur la liaison des tempéramens & la formation des idées & des affections morales, offre un aussi bel accord de la philosophie & de l'éloquence, & une application peut-être plus savante & plus approfondie des vérités physiologiques à la métaphysique.

Cabanis admet six tempéramens, quatre tempéramens des Anciens, & deux autres tempéramens qu'il rapporte à la force sensitive du système nerveux & à sa réaction sur les muscles; addition que nous devons faire ressortir, & qui est un des points remarquables de la doctrine de l'auteur. On doit porter le même jugement sur l'extension des rapports qu'il attribue au tempérament mélancolique, & qu'il peint avec autant de vérité que d'éloquence.

« Les appétits, ou les desirs de mélancolique prennent plutôt le caractère de la passion que celui du besoin; souvent même le but véritable semblera totalement perdu de vue; l'impulsion sera donnée avec force pour un objet, elle se dirigera vers un objet tout différent. C'est ainsi, par exemple, que l'amour, qui est toujours une affaire sérieuse pour le mélancolique, peut prendre chez lui mille formes diverses qui le dénaturent, & devenir entièrement méconnaissable pour des yeux qui ne sont pas familiarisés à la suite dans ses métamorphoses. Cependant le regard observateur fait le reconnaître partout; il le reconnoît dans l'insévérité d'une morale exaltée, dans les excès de la superstition, dans ces maladies extraordinaires qui jadis conduisoient certains individus de l'un & l'autre sexe, prophètes, anges ou pythoïsses,

& qui n'ont pas encore cessé d'attirer autour de leurs tréteux, le peuple ignorant de toutes les classes; il le retrouve dans les idées & les penchans qui paroissent les plus étrangers à ses impulsions primitives; il le signale jusque dans les privations superflues ou sentimentales qu'il s'impose lui-même, &c. &c.

Ces divers rapports entre l'organisation & le système intellectuel ont été développés avec autant de sagacité qu'd'éloquence par Cabanis, & son ouvrage, considéré relativement à cet objet, présente de riches matériaux pour la médecine morale; cependant, en faisant usage de ce travail, il sera nécessaire d'en retrancher & d'en étendre quelques parties, d'entrer plus avant dans la réalité des choses, & de frapper le lecteur par ces résultats que l'on tire d'une connoissance pratique de l'humanité; il importerait fort peu de compléter cette partie par quelques remarques sur les caractères de l'espèce humaine & ses variétés, ses particularités individuelles, envisagées dans leur liaison avec le caractère moral & les habitudes intellectuelles.

Plusieurs philosophes dans le dernier siècle, tels que Daubenton, Camper, Blumenbach, Vicq-d'Azyr, ont donné une grande attention aux caractères extérieurs qui distinguent l'espèce humaine, des animaux, avec lesquels on a voulu quelquefois la confondre, sous le rapport corporel ou physique, en croyant faire mieux ressortir ainsi dans toute la force, l'éminence de la nature spirituelle, comme si jamais on pouvoit cesser de dire avec Montaigne : *« Ce n'est pas une ame, ce n'est pas un corps, c'est un homme. Il n'en faut pas faire à deux. »*

Cette considération des caractères extérieurs de l'homme, doit s'étendre aux dispositions, aux particularités intérieures de son organisation, qui sont également propres à le séparer, par un immense intervalle, des différentes espèces d'animaux les plus voisines de la sienne en apparence, & dont l'observation détaillée fait ressortir les principaux traits de la nature. (*Voyez dans ce Dictionnaire, NATURE HUMAINE, NATURE DE L'HOMME.*)

Les méditations auxquelles Cabanis s'étoit livré, en considérant les sensations sous le point de vue général & nouveau qu'il a si bien développé, conduisirent nécessairement un esprit aussi actif & aussi étendu que le sien, vers les questions les plus hautes, & peut-être les plus inaccessibles de la physiologie. C'est aussi du moins que l'on conçoit qu'après avoir exposé les idées & les aperçus que nous venons de faire connoître, il se trouva entraîné très-loin & vers d'autres objets, pour développer ses idées sur l'étude de l'instinct, de la sympathie, du sommeil, du délire & sur la formation des divers penchans. Nous allons le suivre dans cette excursion, pendant laquelle nous aurons souvent à regretter qu'il ait manqué de ces données positives qui ne peuvent se trouver que

dans la médecine pratique & dans l'étude de la physiologie, dégagée de toute espèce d'hypothèse, & considérée comme une partie des sciences naturelles.

Dans toutes ses considérations sur la vie animale; Cabanis s'est jecté bien loin de ces données, pour se placer dans une sphère de spéculations qui ne se rattache que par des liens à peine sensibles avec son point de vue principal, l'étude du rapport du physique & du moral dans l'espèce humaine.

Il s'écarte ensuite de ce point de vue, mais pour s'en rapprocher plus tard dans l'examen des premières déterminations de la sensibilité.

Lorsque Cabanis s'occupoit de cette question, les nouvelles vérités qui sembleraient servir aujourd'hui de base aux sciences chimiques, & par cela même à l'histoire générale de la nature, n'avoient pas encore été établies; alors régnait encore la doctrine de l'attraction élastique, qui s'étoit maintenue dans les sciences physiques par l'influence insipide d'un mysticisme philosophique. On ne sera donc pas surpris que l'éloquent promoteur de l'étude des rapports du physique & du moral de l'homme, admette cette attraction, & que, sous sa plume, elle devienne un principe fécond qui s'étend & paroit s'appliquer aux formations, aux reproductions, soit végétales, soit animales, au jeu de la vie dans tous les corps organisés, & à ses différences suivant la diversité des structures organiques. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, tenir, & par suite de la sensation ou de l'impression, se trouver porté à tel ou tel genre de mouvement, est une manière d'exister qui est propre à toutes les parties d'un corps vivant.

On ne peut sans doute refuser d'admettre cette façon d'être dans les plantes, ni dans les derniers rangs de l'animalité, sans pouvoir d'ailleurs la rapporter à un organe particulier.

Dans les animaux vertébrés, elle est constamment associée à un système nerveux, dans lequel on distingue plusieurs centres ou foyers d'irradiations.

On ne peut refuser d'admettre dans les détails des fonctions de la vie, plusieurs impressions qui, sans avoir le caractère d'une véritable sensation, s'en distinguent, d'une impression perçue, n'en excite pas moins des élémens, des mouvements dont les animaux n'ont pas la conscience, qui sont indépendants de la volonté de l'homme, & qui échappent à son observation.

Les sécrétions diverses, la nutrition, le mouvement, la transpiration, la circulation d'un grand nombre de substances liquides ou fluides, répondent à ces impressions locales, dont la faculté est véritablement une sensibilité sans sensations proprement dites. Ces phénomènes sont bien loin d'ailleurs d'être étrangers aux opérations de l'intelligence & à la formation des penchans. « La machine, dit Cabanis, dont la circulation mar-

« che, dont la digestion se fait, dont la bile se filtre, dont les muscles agissent, dont l'absorption des petits vaisseaux se conduit; tous ces mouvements, auxquels la conscience & la volonté de l'individu ne prennent aucune part, & qui s'exécutent sans qu'il en soit informé, modifient cependant d'une manière très-sensible & très-prompote, tout son être moral, ou l'ensemble de ses idées & de ses affections. »

L'exercice de la sensibilité, les besoins & les instincts, se développent avec le système nerveux & dans l'ordre suivant : 1°. *l'instinct de la conservation*; 2°. *l'instinct de la nutrition*; 3°. *l'instinct du mouvement*.

Au moment de la naissance, le cerveau déjà sollicité & mis en exercice par les sensations intérieures, n'est pas table rase comme on l'a supposé; ce qu'il importe de remarquer dans les analyses psychologiques, & ce qui force en même temps à voir que rien ne ressemble moins à la nature que ces statues dont on anime successivement les sens & les facultés.

Ces vues sont suivies d'un examen de l'instinct, de la sympathie, du sommeil & du délire. L'instinct n'est autre chose que l'ensemble de certaines habitudes, de certains appétits qui se manifestent & se développent dans les animaux, indépendamment de toute expérience. Ces penchans originaux & les déterminations qui en dépendent, se manifestent à deux époques : 1°. au moment de la naissance, d'où l'instinct primitif; 2°. par la suite & par un effet des changemens organiques, réguliers ou accidentels, d'où l'instinct consécutif ou secondaire. Les déterminations des cailloteaux ou des perdreaux, qui, traînant encore les débris de l'œuf dont ils viennent de sortir, courent après les grains & les insectes, appartiennent à l'instinct primitif; les nouveaux penchans que développent la puberté, ou les appétits accidentels quelquefois si bizarres des femmes enceintes, se rapportent à l'instinct secondaire. Comme tendance d'un être vivant vers d'autres êtres, la sympathie rentre dans le domaine de l'instinct & tient aux besoins de l'animal, à son organisation. Elle dérive d'ailleurs en général du sentiment du moi, de la conscience au moins vague de la volonté; elle est même inséparable de cette conscience & de ce sentiment; & pour nous associer à un être quelconque, il faut supposer qu'il sent & lui prêter un moi.

« Quand les poètes veulent nous intéresser plus vivement aux fleurs, aux plantes, aux forêts, ils les douent d'instinct & de vie; quand ils veulent peupler une solitude d'objets qui parlent de plus près à nos cœurs, ils animent les fleurs, les montagnes & les grottes de leurs rochers. »

Quoiqu'indépendantes, dans leur origine, de toute expérience, les sympathies s'exercent par le moyen des organes des sens auxquels elles sont liées d'avance par les lois primordiales de l'organisation; elles s'associent à leurs impressions, & s'ex-

clairent & se dirigent par eux. Il en est de même de l'instinct. Ainsi dans l'oiseau, dont la vue est le sens qui prédomine, les déterminations de l'instinct se rapportent plus particulièrement à l'œil; chez la plupart des autres animaux, les déterminations paroissent beaucoup plus liées avec l'odorat, & il n'est pas douteux qu'il ne se forme autour de chaque être animé, une atmosphère particulière qui attire ou repousse d'une manière sympathique.

A l'ouïe se rapportent également plusieurs impressions purement instinctives. Le toucher est moins lié aux sympathies, & n'y contribue que par l'impression de la chaleur animale, qui ne doit pas être confondue avec une autre chaleur quelconque.

Les sympathies & toutes les habitudes instinctives s'associent donc aux opérations des sens, & par suite avec celles de l'entendement, qu'elles modifient, & par lesquelles elles sont modifiées à leur tour; & bientôt on ne peut plus séparer ce qui n'est que simplement organique dans la sympathie, de ce qui vient & mêle sans cesse les relations de l'individu avec ses semblables & avec tous les êtres de l'Univers.

La grande difficulté de rapporter à cette époque de développement, les sympathies à leur cause première & organique, a pu en faire attribuer les effets à des causes inconnues. Ces tendances sympathiques ou antipathiques ont fourni alors ce que l'on a appelé la *sympathie morale*, principe célèbre dans la philosophie écossaise, dont Smith a fait une analyse pleine de sagacité, mais cependant incomplète, & que madame de Condorcet, par de simples considérations rationnelles, a fait tirer en grande partie du vague où le laissoit encore la théorie des sentimens moraux.

Du reste, cette sympathie morale consiste dans la faculté de partager les idées & les affections des autres, ainsi que dans le désir de les intéresser à sa propre situation, & dans le besoin d'agir sur leur volonté; tendance qui suit à peu près les mêmes lois que la sympathie originelle ou purement instinctive. Il y a cependant quelque chose de plus dans la sympathie morale, & qui dépend de la faculté d'imitation qui caractérise toute nature sensible, & plus particulièrement la nature humaine. Par un effet de cette faculté, on ne se borne pas à une simple association, on répète toutes les opérations intellectuelles qui s'y rapportent, à peu près comme on répète certains gestes, certains mouvemens à la vue des personnes qui exécutent ces mouvemens & ces gestes : imitation qui est d'autant plus impérieuse, que l'on est doué d'une constitution très-mobilité & très-sensuelle.

La sympathie morale exerce son action sur les regards, par la physionomie, par les mouvemens extérieurs, le langage articulé, &c. Produisant son effet par tous les signes, elle agit sur toutes

tes,

sont, & il reste toujours dans les impressions qui la font naître, surtout dans les regards, un mélange d'influence organique, qui semble indépendant de la réflexion.

Les phénomènes du délire & du sommeil se rattachent à ce qui précède par leurs circonstances les plus importantes. Le jugement, l'esprit, peuvent être troublés d'une manière directe, par un désordre, par une maladie des organes des sens. Une ophthalmie, l'inflammation d'une partie quelconque de l'œil, une congestion sanguine vers la tête, troublent nécessairement l'ordre, la nature des sensations de la vue, & il en résulte des erreurs qui, reconnues pour telles, n'occasionnent point le délire. Une perturbation consécutive du même sens, ou de ceux de l'ouïe ou de l'odorat, dans plusieurs névroses abdominales, a beaucoup plus d'influence, s'étend jusqu'à un cerveau & devient quelquefois une cause de délire ou d'aliénation; les différents narcotiques ont un effet analogue à ce genre de perturbation, & l'action de quelques-uns d'eux est le plus souvent accompagnée de quelques désordres particuliers dans les sensations. Ainsi, par exemple, la jusquiame trouble immédiatement la vue; le napol & l'extrait de chanvre, la vue & le toucher; la digitale, les sensations de l'ouïe dans certaines circonstances. Du reste, dans tous ces cas, le désordre, l'incohérence dans les sensations, ainsi que le développement des perceptions morbides ou erronées, doivent être bien plutôt rapportés à l'état du cerveau qu'à celui des organes des sensations.

L'effet primitif des irritations nerveuses, des concentrations spasmodiques, des perturbations de sensibilité dans quelques viscères du bas-ventre, mais principalement dans les gros intestins chez les hommes, dans la matrice chez les femmes; cet effet peut occasionner les nombreux symptômes de l'hypochondrie; chez les êtres faibles ou mobiles, & même chez les hommes d'un esprit supérieur, d'une raison forte, lorsque ces altérations de la sensibilité se prolongent & prennent le caractère de maladies chroniques. Dans ces cas, quelques malades deviennent tout-à-coup sensibles aux odeurs, ou croient en sentir de nouvelles, & qui leur avoient été jusqu'alors inconnues; d'autres sont continuellement tourmentés par le bourdonnement le plus incommode, comme si les oreilles étoient malades ou remplies de corps étrangers.

Un plus grand désordre, une plus grande perturbation a fait croire quelquefois aussi à plusieurs personnes, qu'elles avoient tout-à-coup une *légèreté singulière*, au point de craindre d'être emportées dans les airs; & d'autres, que tous les objets se déroboient sous leurs mains, qu'il n'existoit aucun rapport entre elles & les objets environnans; que leur nez ou leurs lèvres avoient acquis tout-à-coup un volume considérable qu'une odeur désagréable & dangereuse les pourrivoit sans cesse: variété insupportable de symptômes,

Médecine. Tome X.

dont la considération particulière appartient à l'histoire détaillée des maladies secondaires ou consécutives de l'entendement.

Portés jusqu'à un certain degré, ces égaremens de la raison & les perceptions erronées qui les produisent, constituent différents délires chroniques, surtout lorsque, quel que soit d'ailleurs le siège primitif de l'irritation, le cerveau se trouve profondément affecté.

On a du reste beaucoup exagéré l'influence des lésions organiques de ces viscères, considérées comme cause de maladies mentales; Cabanis lui-même ne s'est pas défendu de cette exagération, & on peut lui reprocher d'avoir accordé trop d'importance aux résultats des observations de Morgagni, qui prétend avoir presque toujours vu dans ses nombreuses dissections du cerveau des fons, augmentation, diminution, ou plus souvent grande inégalité de consistance dans cet organe; ce qui sembleroit expliquer directement le défaut d'harmonie des fonctions, par celui des forces toniques, propres aux diverses parties de leur organe immédiat. Sans doute il n'est pas impossible que les lésions organiques du cerveau bien déterminées, telles que différentes altérations de tissu, diverses tumeurs squirrueuses, des excroissances variées, n'altèrent avec le temps les facultés intellectuelles; mais le plus souvent on les a rencontrées sur le cadavre de personnes dont la raison n'avoit jamais éprouvé aucune atteinte; & le cancer du cerveau lui-même, sur lequel on a fait d'excellentes observations depuis quelques années, n'occasionne pas une maladie mentale caractérisée, & ne commence à produire l'abolition graduelle de l'entendement, que lorsqu'il est déjà très-avancé.

Dans les folies essentielles ou primitives, & qui sont plus directement intellectuelles, suivant la remarque judicieuse de Cabanis, on ne peut méconnoître quelque chose de général ou de constitutionnel, dans les différentes fonctions du cerveau, qui ne paroissent altérées ou dérangées que par des habitudes vicieuses, par des mouvemens contraires, qui remontent souvent à des impressions violentes, à des aberrations ou à des penchans que le concours de circonstances défavorables a fait naître: espèce de folie plus intellectuelle que les autres, dit judicieusement notre auteur, & dont le traitement se réduit à changer la manière d'être du malade, & à rompre soudain, par des commotions, par des impulsions vives, la série désordonnée de ses pensées & de ses affections. Telles sont, ajoute-t-il, les folies qu'on a guéries dans tous les temps par les voyages & par les déplacements de toute espèce; par l'emploi de tous les moyens d'impression sur les organes des sens & sur l'imagination; enfin par la série plus étendue & plus régulière des pratiques ou des procédés qui constituent un nouveau mode d'éducation, c'est-à-dire, le *traitement moral* des aliénés, dont l'application convient du

LI

reflé à tous les genres de folies ou de vifanies, quelles que foient d'ailleurs leur nature & les léfions plus ou moins évidentes de l'organisation qui paroiffent les occafionner.

Cette manière de confidérer l'aliénation conduit naturellement Cabanis à fe livrer, fans pouvoir les écarter de fon fujet, à quelques réflexions fur le fommeil & fur les rêves. Certaines idées de Calles, qu'il étud & qu'il modifie, l'amènent à vouloir reconnoître une forte de gradation dans le fommeil : ces mêmes idées lui font admettre un fommeil particulier pour chacun des fens, qui ne lui paroiffent pas s'endormir ni fe réveiller au même infiant, ni de la même manière : opinion qu'il veut étendre à tous les organes, mais principalement aux vifcères du bas ventre & de la poitrine.

Les cas particuliers des fonnambules, des cataleptiques, des perfonnes qui dorment au parlant ou en marchant, ces phénomènes que l'on ne doit pas embraffer dans une hiftoire naturelle du fommeil, & que Cabanis veut y comprendre, lui font admettre un refle de volonte dans le fommeil, & attribuer à cette difpofition plusieurs actions que l'on exécute fous le fommeil, quoiqu'elles s'expliquent plus directement par une affociation mécanique, entre ces actions & les impreffions qui les occafionnent; ce qui eft évident pour plusieurs mouvements qui s'exécutent en dormant (les mouvements pour fe couvrir, pour échapper une meilleure fituation, pour prendre un vafe de nuit, ou pour fe livrer même à des opérations beaucoup plus compliquées).

En ne rapportant pas ces différentes actions à une caufe auffi fimple & auffi naturelle, & en les confondant avec les effets de plusieurs difpofitions morbides, telles que les irritations nerveufes ou inflammatoires du bas-ventre, qui occafionnent des pollutions, Cabanis paroît oublier que pendant le fommeil, comme pendant la veille, différents états d'indifpofition ou de maladies déterminent différents phénomènes, que la fommeil modifie, & qu'il ne convient pas de lui attribuer d'une manière générale ou exclusive, comme on le voit dans plusieurs rêves.

« Les fpafmes des inteftins, fuivant Cabanis, ceux du diaphragme & de toute la région épigaftrique, la plénitude des vaiffeaux & de la voute, ou les angoiffes d'une digeftion pénible, confentent d'autres images dans le cerveau, pendant le fommeil & pendant la veille. »

Mais, en outre, cette fiabilité, cette prédominance exclusive de certaines impreffions & de certaines fentations, que l'on a regardées, avec raifon, comme formant le trait caractéristique d'un genre d'aliénations mentales, s'obfervent également, & pendant le fommeil, & dans le cours de différentes maladies, ou même dans quelques états particuliers qui s'éloignent fuffi-

plement de l'ordre naturel. Les vifcères, dont la difpofition à partager l'affouffiffement des fens extérieurs eft le plus manifefte, peuvent devenir eux-mêmes le foyer de cette action furabondante. Il eft des affections nerveufes qui impriment, dans le temps du fommeil, à l'eftomac & aux inteftins, une activité que ces organes n'ont pas dans tout autre temps. J'ai connu plusieurs perfonnes qui fe trouvoient dans cette fituation. Les individus qui ne prennent pas une quantité fuffifante de nourriture, ont prefque toujours, en dormant, le cerveau rempli d'images relatives au befoin qu'elles n'ont point fatisfait. Trenck rapporte que, mourant prefque de faim dans fon cachot, tous ces rêves lui rappeloient chaque nuit les bonnes tables de Berlin; qu'il les voyoit chargées des mets les plus délicats & les plus abondans, & qu'il fe croyoit affis au milieu des convives, prêt à fatisfaire enfin le befoin important qui le tourmentoient.

« On voit donc, fuivant Cabanis, que des trois genres d'impreffions dont fe compofent les idées & les penchans, il n'y a dans le fommeil que celles qui viennent de l'extérieur, qui foient entièrement ou prefqu'entièrement endormies; que celles des extrémités internes confervent une activité relative aux fonctions des organes, à leur fympathie, à leur état préfent, à leurs habitudes; que les caufes dont l'action s'exerce dans le foin même du fyftème nerveux, n'étant plus diftraites par les impreffions qui viennent des fens, doivent fouver, lorsqu'elles le trouvent alors mifes en jeu, prédominer fur celles qui réfident ou qui agiffent aux diverfes extrémités fentantes internes. Ainfi, l'on rêve quelquefois qu'on éprouve une douleur à la poitrine & dans les entrailles, & le réveil prouve que c'eft une pure illufion. L'on peut rêver auffi qu'on a faim, même dans les momens où l'eftomac eft furchargé; & fi l'excitation directe des organes de la génération eft fous la véritable fource des tableaux voluptueux qui fe forment dans le cerveau pendant le fommeil, c'eft auffi très-fouvent de ces tableaux feuls que l'excitation des mêmes organes dépend. »

Peut-on véritablement admettre l'opinion exprimée dans ce paffage, & les conféquences que l'auteur prétend en déduire?

Il n'exifte d'abord aucune parité entre les impreffions qui font éprouvées pendant le fommeil, & les impreffions qui font éprouvées pendant la veille. On ne peut donc pas les comparer, relativement à leur effet fur les fonctions intellectuelles. Il eft également contraire à l'obfervation d'admettre, avec Cabanis, que les impreffions & les idées qui viennent de l'extérieur, font les feules qui fe trouvent ou prefqu'entièrement endormies pendant le fommeil, puifque le plus fouvent les rêves n'ont d'autres caufes, d'autre origine que ces impreffions, qui agiffent alors fur l'entendement par une fimple affociation mécanique, &

sans exciter l'attention. Toute l'erreur vient ici, de n'avoir pas vu que le sommeil dépend essentiellement d'un changement dans la manière d'être du cerveau : changemens auxquels les différens états des autres organes sont subordonnés ; de telle sorte, que les actions de chaque sens & les mouvemens des différentes parties ne se suspendent, qu'à mesure qu'une façon d'exister nouvelle pour eux s'établit, comme une suite de la nouvelle situation du cerveau, qui la produit & la précède.

Certaines folies, mais principalement celles qui ont des rapports avec la catalepsie ou avec l'exalté, se rapprochent à la vérité de la manière d'être de l'entendement pendant un sommeil morbide, & d'un genre particulier de rêves que l'on doit raisonnablement attribuer à l'irritation du cerveau, sans les confondre avec les rêves les plus fréquens ou les plus habituels, dont la marche & le développement n'ont rien de commun avec les phénomènes de l'association & du délire.

Cabanis se retrouve sur le chemin de la saine psychologie & de l'observation, lorsque le demandant qui peut être l'état de l'économie animale, qui occasionne les rêves en général, il accorde une très-grande part dans le développement de ces phénomènes, à l'association des idées.

Suivant la remarque à ce sujet, « les associations des idées qui se forment pendant la veille, se reproduisent aussi pendant le sommeil. Voilà pourquoi telle idée en rappelle si facilement & si promptement beaucoup d'autres ; pourquoi telle image en amène à sa suite un grand nombre, qui lui semblent tout-à-fait étrangères. Des impressions très-fugitives se lient également à de longues chaînes d'idées, à des séries étendues de tableaux. Il suffit que l'association se soit faite une fois, pour qu'elle puisse se reproduire à tout temps, surtout lorsque le silence des sens externes diminue considérablement les probabilités de nouvelles associations.

Une impression particulière venant à retentir, pendant le sommeil, dans l'organe cérébral, soit qu'elle ait été reçue par lui directement, ou sans même de sa pulpe nerveuse ; soit qu'elle arrive des extrémités lentes qui vivent les organes extérieurs ; il peut s'ensuivre aussitôt de longs rêves très-détailés, dans lesquels des choses qui semblaient presque effacées, du souvenir, se retracent avec une force & une vivacité singulière. La compression du diaphragme, le travail de la digestion, l'action des organes de la génération, rappellent souvent, ou des évènements anciens, ou des personnes, ou des raisonnemens, ou des images de lieux qu'on avoit entièrement perdus de vue ; car il n'est pas vrai que les rêves ne soient relatifs qu'aux objets dont on s'occupe habituellement pendant la veille. Sans doute, les associations de ces objets

avec des impressions dont l'accoutumance rend le retour plus probable, fait qu'ils doivent eux-mêmes se représenter plus facilement à l'esprit. Mais il est certain que les rêves nous transportent souvent loin de nous-mêmes & de nos idées, ou de nos sentimens habituels.

Ce n'est pas tout : nous avons quelquefois en songe des idées que nous n'avons jamais eues. Nous croyons converser, par exemple, avec un homme qui nous dit des choses que nous ne savions pas. On ne doit pas s'étonner que, dans des temps d'ignorance, les esprits crédules aient attribué ces phénomènes singuliers à des causes surnaturelles. J'ai connu un homme très-sage & très-éclairé, qui croyoit avoir été plusieurs fois instruit, en songe, de l'issue des affaires qui l'occupaient dans le moment. Sa tête forte, & d'ailleurs entièrement libre de préjugés, n'avoit pu le garantir de toute superstition, par rapport à ces avertissemens intérieurs. Il ne faisoit pas attention que la profonde prudence & la rare sagacité dirigeoient encore l'action de son cerveau pendant le sommeil, comme l'on peut l'observer souvent, même pendant le délire, chez les hommes d'un moral exercé. En effet, l'esprit peut continuer les recherches dans les songes, il peut être conduit par une certaine suite de raisonnemens, à des idées qu'il n'avoit pas ; il peut faire à son insu, comme il le fait à chaque instant durant la veille, des calculs rapides qui lui dévoient l'avenir. Enfin, certaines séries d'impressions internes, qui se coordonnent avec des idées antérieures, peuvent mettre en jeu toutes les puissances de l'imagination, & même présenter à l'individu une suite d'événemens, dont il croira quelquefois entendre, dans une conversation régulière, le récit & les détails.

Nous ne suivrons pas plus loin Cabanis dans ses recherches délicates & profondes sur les rapports entre l'intelligence & les différens organes pendant le sommeil : rapports qui sont si difficiles à saisir on à comprendre dans une pareille situation, & qui vont nous paraître beaucoup plus sensibles, beaucoup plus évidens, pendant la veille, au milieu des dispositions ou des révolutions qui caractérisent les différens âges, on qui se rattachent aux diversités de constitutions propres aux tempéramens, au sexe, à plusieurs maladies, à l'effet du régime & du climat.

TROISIÈME PARTIE.

De l'influence de l'état moral sur l'état physique.

L'état moral, quels que soient les organes dont il dépend directement, n'agit pas avec moins de puissance sur l'état physique, surtout lorsqu'il se manifeste sous la forme d'émotions énergiques & de passions vives ou concentrées, que l'état physique sur l'intelligence & les différentes affections

de l'âme. Cabanis, qui ne s'est pas attaché à suivre cette influence dans ses détails, & relativement à la part si fréquente & si variée qu'il faut lui reconnaître dans le développement d'un grand nombre d'infirmités & de maladies, n'a consacré qu'un seul mémoire assez peu étendu, à ce sujet important de recherches & de méditations.

Un ensemble particulier d'organes, le visage, les organes de la physionomie, paroît plus particulièrement destiné à recevoir, à manifester cette influence (1), & la physionomie, considérée sous ce point de vue & rapportée à la physiologie, doit être regardée comme une branche de l'étude des rapports du physique & du moral dans l'homme : genre de connoissances qui devroit se trouver placé dans une bonne table encyclopédique, entre les sciences morales & les sciences physiques, dont il remplit l'intervalle (2). On regrette que cette réflexion ne se soit pas présentée à l'esprit de Cabanis. La conformation du crâne, les caractères de l'espèce humaine qui s'y rapportent, la structure du visage, la délicatesse & la multiplicité de ses muscles, les ramifications de ses vaisseaux, le nombre de ses pores, leur liaison avec le cerveau, les caractères mêmes du tissu cellulaire & de la peau, l'arrangement des organes des sens ; enfin, la réduction de toutes ces parties, les changements qu'elles éprouvent, soit par l'influence immédiate des passions, soit par l'effet que ces mêmes passions ont préalablement exercé sur les viscères du bas-ventre & de la poitrine : tous ces objets, considérés sous le point de vue de l'expression morale, de l'influence des passions ou des opérations de l'esprit, sur l'organisation, méritoient d'être traités par un écrivain aussi ingénieux & aussi éloquent.

L'influence du moral sur le physique, examinée par ce philosophe, sous un point de vue beaucoup plus élevé & beaucoup plus général, ne lui paroît qu'une conséquence, qu'une suite de l'espèce de commerce ou d'association qui lie tous les organes. « En effet, dit-il, nous voyons les organes partager les affections les uns des autres, entrer en mouvement de concert, s'exciter mutuellement, ou se balancer ou se contrarier dans leurs fonctions respectives. Un lien commun les unit ; ils font partie du même système. Le degré de leur sensibilité, la nature & l'importance de leurs fonctions, certains rapports de liaison, de structure, de but ou d'usage, déterminent le caractère & fixent les limites de cette influence réciproque. Mais, en outre, des liens accidentels & particuliers peuvent s'établir entre eux :

» des sympathies, qui ne sont pas communes à tous les individus, peuvent résulter fortuitement d'une différence proportionnelle, ou de force ou de sensibilité respective des organes ; soit que cette différence dépende de l'organisation primitive, soit que certaines maladies ou d'autres circonstances éventuelles l'aient introduite postérieurement. Or, les lois qui régissent, par exemple, tous les viscères abdominaux, leur sont évidemment communes avec les organes de la pensée ; ces derniers y sont également soumis, & cela sans aucune restriction. Si le système de la veine-porte influe sur le foie & la rate, la rate & le foie sur l'estomac, l'estomac sur les organes de la génération, les organes de la génération sur les uns & sur les autres, & réciproquement ; l'organe cérébral, considéré comme celui de la pensée, & par l'état habituel ou passager qui résulte pour lui de cette fonction, n'est pas lié par des rapports d'influence réciproque avec le foie, la rate, l'estomac ou les parties de la génération ; & si quelquefois les symptômes des viscères présentent divers phénomènes entièrement nouveaux, si ces organes agissent les uns sur les autres, à des degrés très-différens, & même s'il s'établit entre eux des rapports rares & singuliers ; quelquefois aussi leur influence sur l'organe pensant, & la sienne sur eux, est totalement invertie ; de sorte que, tantôt le même viscère semble faire tous les frais de la pensée, & tantôt il n'y prend aucune part : voilà des faits constants, qui s'offrent sans cesse à l'observation.

La grande influence de ce qu'on appelle le moral, sur ce qu'on appelle le physique, est un fait général incontestable : des exemples sans nombre le confirment chaque jour ; & tout homme capable d'observer en a retrouvé mille fois les preuves en soi-même. Plusieurs auteurs de physiologie & plusieurs moralistes, ont recueilli les traits les plus capables de mettre dans tout son jour cette puissance des opérations intellectuelles, & des passions sur les divers organes & sur les diverses fonctions du corps vivant. Il n'est aucun de nous qui ne puisse ajouter de nouveaux traits à ces recueils. Les hommes les plus grossiers & les plus crédules parlent eux-mêmes des effets de l'imagination ; s'ils en sont plus foyeux que d'autres les jougs & les victimes, ils savent du moins quelquefois les observer & les reconnaître dans autrui.

Il est de fait que, suivant l'état de l'esprit, suivant la différente nature des idées & des affections morales, l'action des organes peut tout à la fois être excitée, suspendue ou totalement invertie.

Un homme vigoureux & sain vient de faire un bon repas ; au milieu de ce sentiment de bien-être que répand alors dans toute la machine la présence des aliments au sein de l'estomac, leur digestion s'exécute avec énergie, & les sucs di-

(1) Voyez *Physionomie*, Villars.

(2) Voyez la *Physiologie*, par Lavater, nouvelle édition, par L. J. Moreau de la Sarthe, & Vicaire, peintre de l'Institut national. (Discours préliminaire de l'éditeur, pag. 39, 40.)

» gelifs les dissolvent avec aisance & rapidité. Cet
 » homme reçoit-il une mauvaise nouvelle, ou des
 » passions tristes & fâcheuses viennent-elles à é-
 » lever tout-à-coup dans son ame ? aussitôt son es-
 » tomac & ses intestins cessent d'agir sur les ali-
 » mens qu'ils renferment. Les sucs eux-mêmes,
 » par lesquels ces derniers étoient presque caté-
 » ment dissous ; demeurent comme frappés d'une
 » mortelle stupeur ; & tandis que l'influence ner-
 » veuse, qui détermine la digestion, cesse entière-
 » ment, celle qui sollicite l'expulsion de ces résidus,
 » acquiert une plus grande intensité, toutes les
 » matières contenues dans le tube intestinal sont
 » chassées en dehors en peu de momens.

» On fait qu'il n'est point d'organes plus soumis
 » au pouvoir de l'imagination que les organes de
 » la génération. L'idée d'un objet aimable les excite
 » agréablement ; une image désolante les glace.
 » La passion peut presque toujours accroître beau-
 » coup la puissance physique de l'amour, même
 » dans les individus les plus foibles. Cependant
 » son excès peut aussi quelquefois, comme l'a voit
 » observé Montagne, la détruire ou la paralyser
 » momentanément, chez les hommes même les
 » plus forts.

» Ces deux effets contraires ne sont pas les seuls.
 » J'ai connu un jeune étudiant en médecine, qui,
 » dans un violent accès de jalousie, éprouva pen-
 » dant plusieurs heures le prinpsime le plus invin-
 » cible & le plus douloureux, accompagné tout à
 » tour de pertes de sensence & d'émissions d'un
 » sang presque pur.

» La crainte abat & peut anéantir les forces
 » musculaires motrices. La joie, l'espérance, les
 » sentimens conragieux en décuplent les effets ; la
 » colère peut les accroître en quelque sorte indé-
 » finiment.

» Mais l'action même de la sensibilité n'est pas
 » moins soumise à l'empire des idées & des affec-
 » tions de l'ame. Sur un homme attristé d'idées
 » chagrines, agité de sentimens cruels, les objets
 » extérieurs produisent d'autres impressions, que
 » si le même homme étoit docement occupé d'i-
 » mages agréables, & son ame dans un état de sa-
 » tisfaction & de repos.

» Les impressions font dans nous-mêmes & nous
 » dans les objets ; ceux-ci n'en peuvent être que
 » l'occasion. La manière de sentir leur présence &
 » leur action, tient surtout à celle dont on est dis-
 » posé. La volonté peut même quelquefois déna-
 » turer entièrement les effets qu'ils produisent sur
 » l'organe sentant. Enfin, mettant à part ces illu-
 » sions des sens, si communes chez les hommes &
 » l'imagination, & que les ennemis de la philoso-
 » phie de Locke ont si souvent présentées comme
 » une objection puillante ; mettant surtout à part
 » cette autre influence ; bien plus singulière encore,
 » de l'imagination de la mère sur le fœtus renfermé
 » dans la matrice (influence attachée par une foule
 » d'observations dignes de foi, & dont on a aussi peu

» philosophique que de nier absolument la réalité, que
 » d'admettre avec étonnement tous les exemples rap-
 » portés dans leurs écrits) ; la connaissance la
 » plus superficielle de l'économie animale, suffit
 » pour montrer l'empire très-étendu qu'exerce
 » l'état moral sur tous les organes & sur toutes
 » leurs fonctions. »

Cabanis réduit à ce petit nombre de conside-
 » rations, l'exposition du fait même de l'influence
 » du moral sur le physique ; il n'a en sans doute
 » d'autre objet, dans l'examen d'une question aussi
 » importante & aussi étendue, que d'exposer, d'une
 » manière générale, comment toutes les parties du
 » corps humain communiquent par des sympathies
 » & par des associations multiples, & comment
 » le cerveau en particulier se distingue par des sym-
 » pathies & une sphère d'actions plus étendue, font
 » dans la part qu'il prend à la vie générale, font
 » dans les fonctions spéciales qu'il exerce, le même
 » organe de la pensée, comme point de départ
 » des idées & des affections. » Nous ne pouvons
 » donc plus être embarrassés, dit l'auteur dans ses
 » conclusions, pour déterminer le véritable sens de
 » cette explication, influence du moral sur le physi-
 » que. Nous voyons clairement qu'elle désigne cette
 » même influence du système cérébral, comme or-
 » gane de la pensée & de la volonté, sur les autres
 » organes, dont son action sympathique est capable
 » d'exciter, de suspendre, & même de dénaturer
 » toutes les fonctions : c'est cela, ce ne peut être
 » rien de plus.

» S'il en étoit besoin, cette conclusion pourroit
 » être confirmée encore par la considération des cir-
 » constances qui donnent quelquefois accidentelle-
 » ment à l'influence du système cérébral, un sur-
 » croît d'étendue & d'intensité. On peut en effet
 » réduire toutes ces circonstances : 1^o, à son ac-
 » croissement d'action ou de sensibilité ; 2^o, à sa dé-
 » bilitation ; 3^o, à ses maladies ; & par conséquent il
 » est, dans tous ces cas-là mêmes, soumis à des lois
 » qui lui sont communes avec toutes les autres
 » parties du corps vivant.

» Ainsi donc, tous les phénomènes de la vie
 » sans nulle exception, se trouvent ramenés à une
 » seule & même cause ; tous les mouvemens, soit
 » généraux, soit particuliers, dérivent de cet unique
 » & même principe d'action.

» Telle est partout la simplicité de la nature ;
 » elle prodigue les merveilles, elle économise les
 » moyens ; mais l'esprit hypothétique de l'homme,
 » partout où les effets lui paroissent compliqués ou
 » différens, croit toujours, au contraire, devoir mul-
 » tiplier les ressorts : c'est ainsi que le cours des
 » astres, les météores aériens, le mouvement des
 » eaux de l'Océan, la germination, la fructification
 » des végétaux, en un mot tous les phénomènes de
 » l'Univers, furent d'abord soumis à autant de causes
 » différentes. Apollon conduisit le char du soleil,
 » Diane, celui de la lune ; Jupiter gouverna l'Élé-
 » phante, déchaîna les orages, alluma la foudre ;

Neptune souleva les mers, & Pan, Cécès, Flore, Pomone se partagèrent l'empire des troupeaux, des moissons, des fleurs & des fruits : il fallut un temps fort long pour arriver à s'admettre dans la nature qu'une seule force : peut-être faudrait-il un temps plus long-encore pour bien reconnaître que ne pouvant la comparer à rien, nous ne pouvons nous former aucune idée véritable de ses propriétés, & que les vagues notions que nous avons de son existence, étant uniquement formées sur la contemplation des lois qui gouvernent toutes choses autour de nous, la faiblesse de nos moyens d'observation doit resserrer étroitement ses notions, dans le cercle le plus étroit & le plus borné. »

La même question, l'influence de moral sur le physique, en admettant même les vues spéculatives de Cabanis, qui se trouvent d'ailleurs bien éloignées de l'état présent des connaissances physiologiques ; cette question, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, n'a donc pas été traitée par ce philosophe, sous le point de vue qui intéresse le plus tous les hommes sensibles & éclairés, sous le point de vue expérimental ou empirique, dont quelques parties appartiennent du reste à plusieurs articles de ce Dictionnaire, l'article *МѢДЪЦИНЪ ДѢЛА*, la cinquième partie ayant pour titre : *De l'influence de la contenance d'esprit sur le système physique de l'homme*; les articles *АТРОКТОРЪ* de l'AME, dans le même Dictionnaire; *РАСИОНЪ*, *ПРИРОДОУМЪ*, *СЕНТИМЕНЪ*.

QUATRIÈME PARTIE.

Rapports des situations morales avec l'état de l'organisation, suivant les âges, les tempéramens, l'effet du régime ou des climats, &c. &c.

Un grand nombre de circonstances nouvelles & divers changements dans l'organisation, qui arrivent souvent à notre insu, quoique l'analyse physiologique ou la simple habitude de l'observation parviennent parfois à les saisir, modifient pendant un certain temps la sensibilité intérieure & l'intelligence, les affaiblissent ou les exaltent, changent leurs cours, leurs objets, leurs directions : de telle sorte que le même homme, dans ses diverses mutations, paraît se succéder à lui-même, & présenter tout à tour différents caractères. Des recherches sur ces révolutions qui arrivent dans l'existence humaine, pendant le cours de la vie, & quelquefois dans l'espace d'une même journée, sont principalement l'objet d'une étude suffisamment étendue, des rapports du physique & du moral dans l'homme.

Les divers âges, les différentes espèces de complexions ou de tempéramens qui les caractérisent, doivent être placés au premier rang parmi les causes qui donnent assez d'expression à ces rapports, pour frapper à la fois les intelligences

les plus communes & les esprits les plus exercés. Ces phénomènes si curieux & si faciles à constater, se présentent d'abord à l'analyse de Cabanis, qui porte dans leurs recherches & leur exposition toute la sagacité de son discernement & la richesse de la belle imagination.

Ces complexions, ces tempéramens propres aux différents âges sont trop étendus pour ne pas embrasser le système des facultés intellectuelles & des affections morales; ainsi dans l'enfance, une grande mobilité, des opérations tumultueuses, de rapides déterminations, une activité insatiable, sont une suite nécessaire de la susceptibilité nerveuse, de l'irritabilité surabondante, de la souplesse & de l'élasticité de tous les organes. Il seroit à souhaiter que Cabanis fût borné à développer & à démontrer cette relation par des exemples, sans arriver d'une manière assez peu directe à cet objet de ses méditations, par des vues si peu détournées, sur la fluctuation continuelle des corps, les formes, les isomorphoses qu'ils présentent successivement, la durée de leur existence, la nature, les éléments de l'organisation dans les plantes & dans les animaux (1).

Quoi qu'il en soit, l'auteur s'étant livré à ces considérations, qui s'éloignent de son sujet, & d'autres vues physiologiques du même genre, sur l'accroissement & la nutrition pendant le premier âge, arrive enfin à ce qui devoit l'intéresser, & à ce qui nous intéresse le plus dans cette partie de son travail, à l'histoire naturelle de l'enfant, lorsque les parties souples & dociles de son corps commencent à essayer la vie, & à en confirmer l'exercice par des mouvemens vifs, rapides, peu durables, mais fréquemment renouvelés.

Au milieu d'impressions qui sont toutes également neuves pour lui, l'enfant semble courir rapidement de l'aise à l'aigre. Quand il ne dort pas, ses muscles excités par les plus faibles stimulations, par l'aise le plus fugitif de sa volonté naissante, sont dans un mouvement continu, & soit qu'il dorme ou qu'il veille, les fibres musculaires des organes vitaux se contractent avec la même vitesse, ces organes exécutent des mouvemens toujours également rapides & précipités.

Avide de sentir & de vivre, son instinct lui fait prendre toutes les attitudes, dirige son atten-

(1) Ces épisodes que l'on trouve trop souvent dans l'ouvrage de Cabanis, n'auroient pas eu lieu sans doute, si, traitant directement son sujet, il n'avoit pas été obligé de s'en écarter dans des digressions continuelles, par cela même qu'il rédigeoit ses mémoires pour une classe particulière de personnes très-éclairées sans doute, mais qui se trouvoient pour la plupart touchées d'écarts de ses doctrines physiologiques & médicales. (Le état des sciences morales & politiques, qui faisoit encore partie de l'Institut national à cette époque.)

tion vers tous les objets; ses sens encore embarrassés, incertains, se développent de moment en moment, se familiarisent avec leurs propres opérations. C'est en réitérant les observations & les tentatives, c'est en revenant sans cesse sur les objets auxquels elles s'appliquent, qu'il apprend à se servir des instrumens qu'elles mettent en usage, qu'il perfectionne ces instrumens eux-mêmes. Or, de la seule multiplicité des impressions, doivent résulter alors nécessairement des déterminations tumultueuses, changeantes, embarrassées, pour ainsi dire, les unes dans les autres. Mais en même temps l'organe cérébral, dans lequel les principes mêmes de la vie se préparent & s'élaborent, moins ralenti par ses membranes cellulaires qui l'embrassent, ou qui se glissent dans ses divisions, entre facilement en jeu. Les moindres impressions qui lui viennent de ses extrémités sentantes, les moindres stimulis dont il éprouve l'action directe dans son sein, excitent de la part des opérations d'autant plus faciles & plus promptes, qu'elles tiennent encore de près à celles de l'instinct, & d'autant plus favorables au développement de tout le corps, qu'elles sont plus générales & dissolues, qu'elles se fixent plus rarement dans un point particulier; de sorte que la vie s'exerce partout & sans cesse d'une manière égale, y prend chaque jour une nouvelle consistance.

• En conséquence, on voit qu'à ces impressions vives, nombreuses, sans stabilité, doivent correspondre des idées rapides, incertaines & peu durables. Il y a quelque chose de convulsif dans les passions, aussi bien que dans les maladies de l'enfant. Les objets de ses besoins & de ses plaisirs sont simples, immédiats; il n'est point distrait de leur étude par des pensées qui ne peuvent assiler que plus tard dans son cerveau, par des passions qui lui sont entièrement étrangères. Tout ce qui l'environne éveille successivement son attention. Sa mémoire neuve reçoit facilement toutes les empreintes, & comme il n'y a pas de souvenirs antérieurs qui puissent les affaiblir, elles sont aussi durables que faciles; c'est le moment où se forment les plus importantes habitudes. Les idées & les sentimens les plus généraux de la nature humaine se développent, pour ainsi dire, à l'insu de l'enfant, pendant cette première époque; ils se développent par le même artifice que plusieurs déterminations instinctives l'ont déjà fait pendant son séjour dans le ventre de la mère, & ils acquièrent dans l'ensemble de l'organe nerveux, leur consistance & leur maturité, de la même manière que la vie s'établit & se consolide dans les organes particuliers par la répétition fréquente des impressions & des mouvemens.

La période de la vie, à laquelle tous les traits de cette manière d'être appartiennent, se termine à l'apparition des dents de sept ans, avec une érudition suffisante pour embrasser un développement assez avancé des facultés intellectuelles;

& si tous les peuples civilisés, dit Cabanis, placent à cette même époque l'âge de la raison, il ne faut pas croire que ce soit au hasard & sans motif. Du reste, la même liaison entre la physique & le moral s'observe de sept à quatorze ans, s'entend, dans la seconde période climatérique adoptée par les Anciens, & dont le tableau, plus animé que régulier, conduit Cabanis à parler ainsi de J. J. Rousseau, qui a si bien observé & si bien décrit cet âge.

Le régime, sans agir aussi puissamment sur l'état moral que certaines maladies, agit cependant, lorsqu'il est employé long-temps, & dans une direction bien déterminée, les mœurs, l'intelligence des individus, & la destinée politique ou le caractère national des différens peuples. On débute sous cette dénomination de régime avec les Grecs, la gymnastique, & l'usage des alimens & des boissons combinés avec des vues particulières, & d'après des habitudes douces, des réglemens qui ne font souvent partie des institutions les plus mémorables des différens peuples. On fait aussi sentir dans le régime, tout ce qui tient aux habitations, aux vêtemens, & même à une sorte de médecine diététique, ainsi que cela se pratiquait chez les Egyptiens & dans quelques ordres religieux.

Les grands effets du régime sur le système intellectuel de l'homme, sont bien évidens pour celui qui s'est familiarisé avec la connoissance de la vie privée ou des mœurs chez les nations les plus célèbres, chez les certains sectes philosophiques, & dans les ordres monastiques les plus connus par l'austérité de leurs privations. (Les Hébreux, les peuples de l'Egypte ou de Lacédémone, les Romains, la secte de Pythagore, les solitaires de la Thébaïde, de la Trappe, &c. &c.)

La règle, les observances dans la mesure, la quantité des alimens & l'ordre des repas, avoient évidemment pour objet d'exercer une influence morale, d'augmenter la constance ou l'enthousiasme, d'exalter l'imagination & le courage, d'aiguillonner le caractère, de disposer à une sorte de mysticisme, ou même de rendre la pratique de certaines vertus plus assurée & plus facile. On ne peut méconnoître en outre, dans les fondateurs de plusieurs ordres religieux, le dessein d'affaiblir certains hommes souvent trop robustes, & que différentes circonstances forçaient à la vie monacale dans la force de l'âge & la plénitude des passions.

On ne se bornoit pas alors à interdire l'usage de la chair; on défendoit le poisson, tous les produits quelconques tirés des animaux, même ceux qui sont moins employés comme aliment que comme assaisonnement; on alloit même plus loin, & pour réprimer une surabondance d'énergie, on prescrivait des saignées à différentes époques, ce qui s'appeloit amoindrir la moine. (Minuere monachum.)

En parcourant d'une manière rapide les différentes actions ou habitudes hygiéniques, il sera facile de se convaincre pour chacune d'elles, ou par des faits de détail, ou par de grands exemples tirés de l'histoire, qu'elles exercent une influence sensible sur les affections de l'âme ou sur les opérations de l'entendement. Par exemple, la pesanteur ne laisse pas peut-être pas diminuer d'une manière notable, Gas que la santé & le sentiment, ainsi que toutes les autres propriétés de la vie, en soient modifiées, surtout à l'approche des changements de temps & des grandes agitations météorologiques. Le froid ou la chaleur de l'atmosphère agissent encore d'une manière plus évidente, soit par leur effet habituel ou prolongé, soit lorsqu'ils se succèdent rapidement & par des transitions brusques & peu interrompues.

Les observateurs ont recueilli en outre plusieurs exemples frappants de l'influence particulière des saisons & de certains vents, qui changent tout-à-coup les dispositions morales de plusieurs hommes, dont la complexion mobile ou malade ne peut résister à ces impressions fondaines.

Les peuples dans le régime desquels dominent les nourritures animales, diffèrent éminemment des hommes qui vivent de lait ou de végétaux.

Nous venons d'indiquer l'effet particulier que l'on se proposoit par le régime maigre & débilitant dans plusieurs ordres religieux. Les aliments grossiers, de difficile digestion, nuisent, à la longue, à l'activité de l'esprit ou à la délicatesse des sensations. Ainsi les habitants des provinces où l'on se nourrit presque exclusivement de châtaignes, de blé farrafin, tout beaucoup plus stupides, plus incertains, plus recués dans tous les genres d'industrie & de civilisation, surtout s'ils ne font pas usage de boissons fermentées.

Les habitudes morales des peuples idyophages & des peuples chasseurs, sont bien moins l'effet de leur nourriture que de leur genre de vie, de leurs exercices & de leurs impressions. La diète haineuse dans les cas particuliers de maladies ou d'indispositions qui on indiquent l'usage, paroît produire un calme particulier, rendre les idées plus nettes, mais moins actives, & diminuer sensiblement l'énergie des caractères les plus irritables. Il ne faut pas oublier que certains aliments comme certains médicaments ou certains poisons, agissent d'une manière plus directe sur certaines parties de l'organisation; que les uns, par conséquent, donnés dans une certaine mesure, tels que le café ou le vin à petites doses, excitent le cerveau, tandis que quelques autres, les substances amères, par exemple, ou les substances aromatiques, porteront leur action spéciale sur les fonctions digestives.

Les narcotiques en général, & l'opium en particulier, qui, après avoir excité le cerveau, troublent ou épuisent son action, quand ils sont donnés trop souvent ou à des doses trop fortes, produisent

à la longue cette apathie, cette indolence, cette vague rêverie des Orientaux, qui perdent, dans un pareil usage, le besoin d'une activité morale & du développement de toute espèce d'industrie.

Les liqueurs fermentées occasionnent l'ivresse par leur excès, & d'une manière qui n'est pas sans analogie avec le narcotisme; l'ivresse cependant est beaucoup plus passagère que le narcotisme, & si elle n'est pas souvent répétée, elle ne laisse qu'un léger désordre dans le système nerveux; il faut même que l'abus du vin soit porté jusqu'à dernier terme, pour donner une atteinte profonde aux facultés mentales. L'effet modéré de la même liqueur a paru suffire à plusieurs observateurs, pour expliquer certaines différences nationales, auxquelles plusieurs autres circonstances pouvoient avoir contribué; on a pensé aussi qu'il étoit extrême de ces mêmes boissons étoit le plus souvent associé avec une férocité extraordinaire de caractère, & que les plus grands scélérats, naturellement très-robustes, très-ardens, étoient devenus davantage par un usage immédiat des stimulans alcooliques; on a remarqué encore que ce genre d'influence physique, sur le système moral des peuples, étoit assez puissant pour que la découverte de l'Amérique, qui l'a sensiblement affibilo, en lui substituant des boissons excitantes d'un autre genre, devoit être comptée par elle-même parmi les événements qui ont le plus contribué à changer les mœurs & la tournure d'esprit des nations. Parmi les nouvelles boissons dans cette grande circonstance répandit l'usage, on a placé, avec raison, locat au premier rang. Qui n'a pas connu par une douce expérience, l'effet heureux de cette infusion sur les dispositions de l'âme? Ce n'est pas sans raison, dit notre auteur, que quelques écrivains ont appelé le café, une boisson intellectuelle. L'usage pour ainsi dire général qu'en font les gens de lettres, les savans, les artistes, en un mot, toutes les personnes dont les travaux exigent une activité particulière de l'organe pensant; cet usage ne s'est établi que d'après des observations multipliées & des expériences très-sûres. Rien n'est plus propre, en effet, à faire cesser les angouilles d'une digestion pénible. L'action stimulante de cette boisson, qui se porte également sur les forces sensibles & sur les forces motrices, loin de rompre leur équilibre naturel, le complète & le rend plus parfait. Les sensations sont à la fois plus vives & plus distinctes, les idées plus actives & plus nettes, & non-seulement le café n'a pas des inconvéniens des narcotiques, des esprits ardents, ni même du vin; il est au contraire le moyen le plus efficace de combattre leurs effets pernicieux.

Le thé, bien inférieur au café sous ce rapport, prit d'abord faveur chez les Hollandais, mais plutôt par calcul de la part de ce peuple, que par enthousiasme, comme on le voit par la

manière

munificence avec laquelle les États récompensent Boutekoé, dont la Dissertation en faveur du thé, exerce une si grande influence.

Le développement de l'exercice musculaire & sa prédominance par des exercices violents, par un genre de vie qui demande un grand emploi de forces physiques, établissent une manière d'être contraire à l'exercice facile de l'intelligence, & surtout aux travaux littéraires, principalement chez les personnes robustes & d'une complexion habituellement athlétique.

Une locomotion très-active, l'exercice en plein air, peuvent sans doute donner un certain mouvement à l'esprit, ainsi que Plin & Montaigne l'ont remarqué, mais sans favoriser la réflexion & la méditation. Chez quelques personnes, à la vérité, certaines séries de mouvements musculaires semblent exciter, par association, des idées & des impressions d'un ordre assez élevé; mais cette manière d'être s'applique bien plutôt à des objets d'imagination ou de sentiment, qu'à des sujets sur lesquels il faut rassembler tous les efforts d'une profonde méditation. Il ne faut pas oublier que la prééminence de la force physique ou musculaire écoule la sensibilité morale; que le sentiment de cette prééminence n'est guère propice au recueillement, à la sympathie; que cette même disposition occupe d'une manière exagérée, sans proportion, l'action cérébrale; & que, considérée sous ce rapport même, elle est contraire à la longévité; remarque qui, d'ailleurs, ne s'applique point à l'habitude que certaines personnes ont contractée de penser en marchant ou en se livrant, d'une manière quelconque, à des opérations corporelles. La disposition opposée, un genre de vie languissant, un état habituel d'engourdissement & de repos, peuvent éteindre toute espèce de facultés intellectuelles chez les personnes d'une complexion molle ou lymphatique. Elle peut aussi occasionner ou favoriser chez les sujets d'un tempérament nerveux & d'une sensibilité très-développée, le trouble des entrailles, la concentration spasmodique dans plusieurs points de concentration qui n'est pas quelquefois sans rapport avec l'éclat des talents, la force de l'imagination, l'élévation & la délicatesse des sentiments. La pratique de la médecine fait rencontrer quelques personnes, qu'il suffirait de guérir & de fortifier, pour leur enlever une grande douceur de caractère & les qualités les plus attachantes (1).

Le sommeil, lorsqu'il augmente l'inertie de l'estomac, s'oppose, par sa trop grande durée, au libre exercice de l'entendement.

En général, si l'excès de force que développe une gymnastique particulière est contraire à la santé & à la raison, les habitudes laborieuses, le développent d'une heureuse industrie, les fa-

vorisent, & font occuper au peuple qui s'y livre, un rang très-élevé parmi les nations. Du reste, la partie mécanique & manuelle des travaux de l'homme, considérée dans le détail des opérations propres aux différents métiers, présente de nombreuses variétés dans son influence morale ou intellectuelle, soit lorsque ces occupations s'exécutent en plein air ou dans l'intérieur des ateliers, soit lorsqu'elles sont sédentaires ou actives, pénibles, faciles, douces, & exigeant moins de force que d'industrie; cette dernière différence est la plus importante, en ce qui concerne les rapports du physique & du moral dans l'homme. On peut placer sur la même ligne les diversités qui se rapportent au caractère des instruments, à la nature des impressions; ce qui paraît surtout remarquable pour les professions qui ont pour objet de verser le sang des hommes ou celui des animaux, en admettant d'ailleurs les nombreuses restrictions dont une pareille remarque est susceptible.

L'habitude de la chasse, surtout pour les peuples dont elle fait le principal moyen d'existence, se prête, plus qu'aucun autre genre de vie, à la férocité du caractère; & quelques philosophes n'ont pas craint d'avancer que l'anthropophagie étoit beaucoup plus fréquente chez les peuples qui s'étoient trouvés forcés à ce genre de vie. Les peuples chasseurs, les nomades eux-mêmes n'ont pas des mœurs beaucoup plus douces. « Certaines traditions, dit notre auteur, prétendues historiques, les fictions des poètes, les rêveries même de quelques philosophes, ont représenté la vie pastorale comme le modèle des vertus & du bonheur. Mais ces brillants tableaux ne sent que des illusions démenties par tous les faits. Les peuples purement pasteurs n'ont été & ne sont encore aujourd'hui que des hordes de brigands & de pillards. Dans leur vie vagabonde, ils regardent tous les fruits de la terre comme leur appartenant de droit. Ils n'ont aucune idée, ni de la propriété territoriale, dont les lois sont la source de presque toutes nos lois civiles; ils ignorent surtout ces conventions postérieures, qui sont venues bientôt, dans les sociétés agricoles & commerçantes, consacrer indistinctement, & d'une manière égale, tous les genres de propriété. Dans leur séparation forcée des autres peuples, les peuples pasteurs s'habituent à traiter en ennemi tout ce qui leur est étranger. Cette haine constante & générale de leurs semblables, s'entretient nécessairement dans leurs cœurs des sentiments iniques, cruels & malheureux. C'est uniquement sur quelques coins du terre favorisés de la nature & d'ailleurs très-bien cultivés, c'est au sein de quelques fortunés vallons, dont les habitants riches & tranquilles pouvoient donner un soin particulier à l'éducation de leurs troupeaux, que la vie pastorale, tournant les esprits vers la culture de la pousse ou vers l'observation des astres, put réellement donner aux goûts de

(1) Optimus non esse dum infirmus sumus dit Plin, d'une manière trop générale, dans la lettre à Maxime.

» l'homme social plus d'élégance, à ses mœurs plus
 » de pureté ; encore même faut-il retrancher des
 » images sous lesquelles on aime à se représenter les
 » pasteurs babyloniens, & ceux de l'Arcadie ou de
 » la Sicile, tout ce que l'enthousiasme des poètes
 » bucoliques n'a pas craint d'ajouter à la vérité de
 » la nature, & tout ce que l'imagination des lec-
 » teurs ajoute encore elle-même ordinairement
 » aux inventions de ces poètes. Peut-être alors
 » ces charmantes peintures pourroient-elles se
 » rattacher à quelques objets véritables. Mais, au
 » reste, ce n'est point de cette manière qu'il faut
 » aujourd'hui louer la campagne ; la vie pastorale
 » n'est pas la vie qu'on y retrouve, n'est pas celle
 » qu'on doit vouloir y retrouver ; & de faux ta-
 » bleaux ne peuvent qu'en faire méconnoître les
 » véritables charmes à ses habitants.

» Les peuples agriculteurs ne sont pas seule-
 » ment ceux dont la subsistance est le mieux assurée ;
 » ils sont encore, & par la même raison, ceux qui
 » jouissent d'un état social plus stable, chez les-
 » quels on trouve plus de bon sens, plus de vertus.
 » Lorsque ensuite le commerce vient effacer peu à
 » peu les préjugés, & multiplier les lumières ; lors-
 » qu'il éveille tous les talents, en offrant à l'homme
 » industrieux de nouvelles sources de richesse, à
 » l'homme riche de nouveaux moyens de puissance ;
 » qu'en rendant le premier tous les jours plus indé-
 » pendant du second, il lui fait naître & développe
 » toutes les idées, tous les sentiments, toutes les ha-
 » bitudes de la liberté, alors dis-je, la nature hu-
 » maine voit s'ouvrir devant elle une belle & vaste
 » carrière d'amélioration, de bonheur véritable :
 » alors il ne reste plus au philanthrope qu'un vœu à
 » former, c'est que la consolidation d'un gouverne-
 » ment fournisse à l'influence de la raison publique,
 » fasse toujours passer immédiatement dans les lois
 » tous les progrès réels des idées, que les législa-
 » teurs & les premiers magistrats de la nation
 » soient toujours aussi soigneux à recueillir les
 » fruits des lumières, & à les propager elles-
 » mêmes de plus en plus, que les despotes & les
 » charlatans le sont à les étouffer, à les calomnier.
 » Et pour le dire en passant, cette seule considé-
 » ration suffit pour montrer quels sont les avan-
 » tages d'un système de gouvernement fondé sur
 » l'égalité & la liberté ; c'est donc bien en vain
 » que les tyrans & les d'clamatateurs qu'ils tiennent
 » à leurs gages, s'efforcent de renverser ou de
 » flétrir ces principes éternels.

» La puissance des différents climats, considérée
 » comme la cause principale des variétés de l'espè-
 » ce humaine, est une vérité de fait qui n'auroit
 » jamais dû être mise en question. Depuis les belles
 » observations d'Hippocrate, l'influence de cette
 » même cause sur les habitudes morales des peu-
 » ples, cette influence admise par ce philosophe
 » n'est pas aussi généralement reconnue, surtout de-
 » puis le milieu du dix-huitième siècle. Ainsi, par
 » exemple, plusieurs parmi nous a partagé l'opi-

nion d'Hippocrate, tandis qu'Helvétius s'est at-
 taché, dans la même question, à une opinion
 contraire. Cette différence ne se ferait peut-
 être pas étalée, si l'on s'étoit accordé pour
 comprendre dans l'acception des climats, non-
 seulement les degrés de latitude ou de longitude,
 mais l'action des airs, des eaux & des lieux, &
 si en même temps on avoit regardé les habitudes
 morales comme le produit des impressions re-
 çues dans un concours quelconque de circon-
 stances ou de localités, & finissant par établir des
 séries d'affections ou de penchans d'idées, d'opini-
 ons & de déterminations, où personne ne s'avi-
 seroit de douter de toute l'influence que peuvent
 exercer sur l'homme, le milieu dans lequel il vit,
 les choses dont il se nourrit, les objets qui s'ap-
 pliquent à la surface de son corps, les résistances
 qui sollicitent son industrie, les grands phéno-
 mènes qui excitent diversément son intérêt ou son
 attention.

» L'opinion de Buffon, qui regardait les va-
 riétés de l'espèce humaine, dans les différents
 climats, comme accidentelles, me paroit beau-
 coup plus vraisemblable, dit Cabanis, 1°. parce
 que d'un climat à l'autre on voit les races
 qui leur sont propres, s'unir par une chaîne
 d'intermédiaires, dont les nuances ou les dégrés
 dations insensibles se confondent toujours au
 point de contact ; 2°. parce que la même lati-
 tude présente souvent divers climats, c'est-à-dire,
 de grandes variétés dans l'ensemble des circon-
 stances physiques, propres à chaque canton ; &
 qu'alors, non-seulement chaque nature de sol
 produit sa race particulière, mais que, si par
 hasard, quelques cantons ressembloient exacte-
 ment à des régions éloignées, les hommes des uns
 pourroient même être formés sur le modèle de
 ceux des autres, & que l'analogie de climat
 triomphe de l'influence du voisinage, & de cette
 confusion du sang & des habitudes, qu'amène
 irrésistiblement la fréquence des communi-
 cations ; 3°. parce qu'on observe chaque jour, dans
 les pays dont le climat a des caractères pronon-
 cés, qu'un boët d'un petit nombre de géné-
 rations, les étrangers reçoivent plus ou moins son
 empreinte (1) ; 4°. enfin, parce que les défen-
 seurs de cette théorie sont obligés, pour la sou-
 tenir, de se livrer à une foule de conjectures.
 » J'ajoute que presque tous les arguments sont né-
 gatifs, & que la ténacité de quelques caractères
 propres à certaines races, qui paroissent résister
 à leur transplantation & à leur dissémination

(1) Je citerai ici le fait attesté par plusieurs voyageurs, touchant ces familles portugaises établies dans les îles du Cap-Vert, depuis la fin du quatorzième siècle jusqu'à nos jours, lesquelles, dans cet espace de temps que nous devons regarder comme très-court, sont devenues physiquement semblables aux nègres indigènes du pays, & à ceux du continent voisin. Ce fait semble fournir une preuve directe contre la théorie de la diversité des espèces.

« parmi les autres peuples, ne prouve absolument rien. En effet, les observations & les expériences nécessaires pour rendre cette remarque solide & concluante n'ont point été faites. La courte durée des individus permet trop rarement d'apprécier au juste, la part que peut avoir le temps, dans toutes les opérations de la nature ; & rien cependant ne seroit plus nécessaire : car, disposant à son gré de cet élément, comme de tous les autres moyens, la nature l'emploie aussi bien qu'eux tous avec une étonnante prodigalité. »

Du reste, ce n'est pas seulement d'une manière directe, immédiate, que les différens climats exercent leur influence sur l'homme ; les productions du sol, qui sont employées comme alimens, comme boissons, comme médicamens, ajoutent indirectement à cette influence. La vasse peu aisée, qui dans tous pays est toujours la plus nombreuse, ne pouvant guère se nourrir que de productions indigènes, est plus particulièrement dépendante, sous ce rapport, de la nature du sol & de la différence des localités. Nous avons déjà fait cette remarque pour les habitans des provinces où l'on fait presque exclusivement usage d'alimens farineux.

On ne peut méconnaître un caractère national bien marqué chez les habitans des antres provinces riches en vignobles, & qui produisent plutôt une grande abondance de vin, que des vins précieux & recherchés ; il en est ainsi des habitans de plusieurs contrées de l'Asie & de l'Afrique, relativement à l'usage de l'opium & même du café, quoique cette dernière substance exotique soit aujourd'hui généralement répandue chez tous les peuples civilisés.

La nature, le genre des travaux, des occupations, nous offre un autre effet immédiat ou indirect du climat sur les habitudes morales. La preuve de cette influence des travaux sur les mœurs, se trouve pour ainsi dire à chaque page de l'histoire des peuples ; ainsi, on la rencontre dans tout ce qui concerne le genre de vie des Spartiates, des Romains, des Grecs, des Phéniciens, des Carthaginois. Si l'on vouloir poursuivre dans le détail de toutes les influences l'action du climat, il faudroit reprendre, & sous un point de vue semblable à celui qui vient de fixer notre attention, les différens effets du régime. Du reste, cette influence de climat n'est pas sans doute la même pour les différentes classes de la société, le degré de civilisation, les riches & les pauvres, les hommes attachés à des professions différentes.

D'une autre part, si des hommes très-éclairés ont refusé d'admettre cette influence, leur conduite ne peut être expliquée ou motivée que par l'exagération des philosophes qui avoient admis une opinion contraire.

Hippocrate, aux belles observations duquel il faut faire remonter le sentiment de ces dern.

tout en admettant que l'effet des climats, c'est-à-dire, des airs, des eaux & des lieux sur l'homme, soit une des causes les plus actives ou les plus générales des différences que l'on observe dans le caractère, le gouvernement, les mœurs des nations, n'avoit point méconnu, tout ce qu'une force semblable pouvoit recevoir d'accroissement du caractère national lui-même & des institutions.

Après avoir décrit le climat de l'Asie & déterminé les effets moraux qui en résultent nécessairement, il poursuit en ces mots : « Mais ici, les institutions politiques ont fécondé puissamment l'action des circonstances locales ; elles en ont singulièrement aggravé les mauvais effets. »

« La plus grande partie de l'Asie vit sous la domination des rois. Or, des hommes qui n'ont point contribué aux loix d'après lesquelles ils ont régné, qui ne s'appartiennent point à eux-mêmes, dont la tête est courbée sous un joug despotique, n'ont aucun motif de cultiver les armistices ; ils ont au contraire de trop bonnes raisons pour ne point paroler belliqueux. Rien de commun entre eux & leurs chefs ; ni les travaux & les dangers que les premiers supportent seuls, ni les avantages & la gloire qui devroient en revenir aux uns comme aux autres, mais auxquels le simple soldat a presque aucune part. Lorsque ces malheureux esclaves, forcés de quitter leurs foyers, leurs femmes, leurs enfans & leurs amis, vont chercher dans les camps les fatigues & le carnage, toutes les victoires obtenues par leurs efforts ne servent qu'à grossir les richesses de leurs maîtres avides, & pour eux, les périls, les blessures, la mort, font les seuls fruits qu'ils en recueillent. Ainsi donc, indifférens sur le succès de la guerre, ils sont incapables de la soutenir ; ils sont même absolument inhabiles à cultiver un sol, où nulle jouissance certaine, nulle espérance vraisemblable, n'excite leur activité. De tels hommes laissent tomber effricher, & se dépeupler à la longue, la terre ingrate qu'ils habitent ; ou s'il se trouve parmi eux quelques âmes douées par la nature de quelque courage & de quelque énergie, elles maudissent & rejettent des loix qui ne méritent que leur haine. »

« Un autre grand fait vient à l'appui de ce que j'avance. Les peuples les plus belliqueux de l'Asie sont des Grecs ou des barbares, qui, soutenant aux pieds toute espèce de pouvoir despotique, conservent encore leur indépendance naturelle. Comme ils ne forment que des entités de leur choix, ils en recueillent tous les fruits. S'ils affrontent les dangers, c'est pour eux-mêmes, c'est pour eux seuls. Ils reçoivent donc toujours la récompense de leur courage, & toujours ils portent la peine de leur lâcheté. » Les considérations qui précèdent, & qui ont eu pour objet, de retracer rapidement l'influence de l'organisation & de ses modifications éven-

tuelles sur l'état moral; ces considérations & l'ouvrage lui-même, dont elles ne sont que l'abrégé, laissent beaucoup de questions à décider & ne contenteront pas entièrement les lecteurs, qui ne peuvent être satisfaits que par des idées positives & des notions complètes sur les sujets que l'on a soumis à leurs méditations. Cette remarque a dû se présenter naturellement à notre esprit, & sans doute elle a été faite par Cabanis. Nous l'exprimons avec franchise, mais en reconnaissant, que c'étoit beaucoup, en faisant les premiers pas dans une carrière aussi vaste & aussi nouvelle, d'avoir soigné avec justice, quelques traits généraux, quelques aperçus seconds, qui engageront dans la suite à réfléchir sur les mêmes questions, & à porter dans leur examen, les lumières que l'on doit attendre, soit d'observations plus nombreuses, soit d'un progrès plus avancé dans les sciences physiologiques & médicales.

(MORAU DE LA SARTHE.)

MORAND (Jéao-François-Clement), fils du célèbre chirurgien Sanveur Morand, naquit à Paris en 1726, fut reçu docteur dans la Faculté de cette ville en 1750, & fut chargé d'y professer l'anatomie, qui fut toujours une de ses principales occupations. Son mérite lui valut le titre de médecin ordinaire du roi Stanislas, & son agrégation à plusieurs sociétés savantes, telles que l'Académie des sciences de Paris, celle de médecine du Madrid, la Société royale de Londres, &c. Il a publié les ouvrages suivans :

Histoire de la maladie singulière & de l'examen d'une femme devenue en peu de temps contrefaite par un ramollissement général des os. Paris, 1732, in-12. Il est question de la femme Supiot, dont le squelette est conservé dans le Musée anatomique de l'Ecole de médecine de Paris.

Recueil pour servir d'éclaircissement détaillé sur la maladie de la fille de Saint-Georges près de Langres. Paris, 1754, in-12.

Lettre sur l'instrument de Roonhuyzen. Paris, 1755, in-12.

Lettre sur la qualité des eaux du Luxeuil en Franche-Comté. Jourey, de Verluin, mars, 1756.

Il a encore donné quelques autres petits traités moins importants (1). (R. GÉORGOV.)

MORATE. On désigne sous ce nom les sels que l'acide du muriel ou acide murique, découvert par Klaproth en 1803, forme avec différentes bases salubiles. Ces sels ne paroissent avoir aucune propriété médicale bien reconnue. (Voyez Moxique (acide).) (L. J. M.)

(1) Morand est l'auteur du rapport qui fit fermer le charnier des bonshommes, & cesser les miracles attribués à ses M. de Paris.

MORBIDE, adj. Qui se trouve disposé à la maladie, qui en manifeste l'effet habituel, les suites, les traces, en s'éloignant sensiblement de l'acception du mot morbidesse, *morbidesse*, qui appartient à un vocabulaire des beaux-arts, sans être absolument étranger aux sciences médicales.

Cette dénomination de morbide, qui n'est guère en usage que depuis quelques années, a été plus particulièrement employée par M. le professeur Chaussier, dans les locutions suivantes :

Est morbide d'un organe; habitude, disposition morbide générale; changement, altération morbide des propriétés vitales.

Une acception plus importante & plus étendue de ce même mot, est celle de complexion ou de constitution morbide, considérée comme une dégénérescence, acquise ou primitive, qu'il est nécessaire de ne pas confondre avec l'ensemble des différences organiques, qui consistent, parmi les hommes, les diversos espèces de tempéramens, dont l'exagération peut à la vérité disposer à certaines maladies, quoiqu'il soit de leur essence, dans l'état naturel, de se concilier avec le genre de santé propre à chaque individu.

Les constitutions morbides présentent de nombreuses variétés, & sont pour la plupart susceptibles de se transmettre par voie de génération. Dans l'état présent de la société, dont les habitudes impriment des directions & des modifications si diverses aux différens organes, suivant le genre de vie, le caractère des métiers ou des professions, ces complexions morbides sont nécessairement la manière d'être la plus fréquente parmi les hommes. On peut les rapporter à deux types principaux; savoir : 1°. les dégénérescences ou altérations générales (complexions scrophuleuses, gouteuses, ataxiques, syphilitiques, cancéreuses, herpétiques, &c.); 2°. les détachements partiels (la constitution anévrysmaïque, la phthisie pulmonaire, &c.), qui rentrent dans les lésions organiques, soit congéniales, soit acquises & secondaires. (Voyez ces mots.)

Lorsque l'on veut employer l'expression morbide dans une grande liberté de langage, & sans la regarder comme synonyme des mots *maladie* & *morbifiques*, il faudroit ne s'en servir que pour exprimer la disposition, l'aptitude, la tendance à la maladie, l'état des organes ou de l'organe dont cette maladie est nécessairement la conséquence.

(L. J. M.)

MORBIDESSE, f. f., de l'Italien *morbidesza*. Les artistes attachent à ce mot l'idée d'une souplesse, d'une douceur de carnation, que l'on desire surtout dans les figures des femmes & des enfans, & dont l'expression donne un si grand charme aux tableaux du Corrège.

Le marbre lui-même peut offrir cette heureuse

apparence, comme on le voit plus particulièrement dans les chefs-d'œuvre de Canova.

Le mode de complexion, dans lequel la morbidité se rencontre le plus ordinairement & le caractérise, se rapproche sensiblement du tempérament qui résulte d'un développement égal du système sanguin & des vaisseaux lymphatiques. Il se reconnoît à l'extérieur, par une certaine apparence de faiblesse & de flexibilité qui, en excluant l'idée de tout effort, de toute résistance, exprime de la manière la plus gracieuse le besoin de l'amour & de la protection.

Dans la réalité des choses, la morbidité doit être plutôt réprimée qu'augmentée, pour ne pas rentrer dans les constitutions morbides. Une vie régulière, un régime tonique, les bains froids, particulièrement les bains de mer convenablement employés (voyez Mer (bains de)), un exercice modéré, mais surtout les habitudes de la famille & les occupations les plus propres à prévenir le trouble & la vivacité de certaines passions, sont les moyens les plus convenables pour s'opposer à la mobilité & à la faiblesse des organes, inhérentes à la morbidité, & dont la plus légère augmentation deviendrait nécessairement une cause de maladie. (L. J. M.)

MORBIFIQUE. Expression que l'on prend souvent dans la même acception que celle de morbide, mais dans un sens un peu moins étendu. (Voyez MORBIDE, MORBILLEUX, POUVOIR.) (L. J. M.)

MORBUS (Cholera-). f. m. Le nom barbare de *cholera-morbus*, composé de deux mots grecs *χολη*, bile, & *moros*, je coule, & du mot latin *morbus*, maladie, a été appliqué à une affection de l'appareil digestif, qui se manifeste par des vomissements & d'abondantes évacuations alvines, accompagnés d'anxiété extrême & de l'abattement rapide des forces.

Les diverses dénominations de *passio cholericæ*, *diarrhea cholericæ*, *cholera*, *débordement de bile*, *miserere*, *trousse-galant*, &c., qui lui ont été imposées, dérivent tout de la nature bilieuse des évacuations qui en sont le principal caractère, soit du danger imminent qui l'accompagne, & de la sinistre rapidité avec laquelle elle enlève souvent les malades.

Le cholera-morbus est quelquefois précédé de malaise, de perte de l'appétit, d'une soif insatiable. D'autres fois il s'annonce quelques jours à l'avance, par la céphalalgie, un sentiment de chaleur ou de l'anxiété à l'épigastre, l'amertume de la bouche, des éructations vides ou fétides, des horborygmes & des nausées. Le plus souvent il survient inopinément sans aucun signe précurseur.

Alors il se manifeste tout-à-coup, & débute par de violentes vomissements bilieux & de fréquentes évacuations alvines, accompagnés des plus grands efforts & d'une prolifération rapide des forces.

Le ventre est tendu, chaud & très-douloureux, surtout aux hypochondres & à l'épigastre; la région précordiale en particulier, il le siège d'une ardeur brûlante & d'une douleur profonde plus ou moins vive. Le malade est en proie à une fièvre très-intense; il éprouve des cardalgies, des tranchées violentes, & souvent un téneusme considérable. Au milieu des efforts douloureux & sans cesse répétés qui accompagnent les vomissements & les selles, le pouls devient petit, fréquent, inégal & souvent même intermittent; la respiration est irrégulière. Il survient des tintemens d'oreilles, des éblouissements, des vertiges, des défaillances; beaucoup de malades éprouvent le hoquet, des grimaces de dents, des crampes douloureuses, des tortions & des contractions spasmodiques des membres, & même de violentes convulsions, soit générales, soit locales. La peau, qui d'abord étoit sèche & brûlante, se couvre de sueurs; les membres deviennent froids; l'ardeur des entrailles, l'anxiété & les angoisses font inexprimables; le visage pâlit, les traits éprouvent une profonde altération, les formes s'affaissent, l'abattement des forces est porté au dernier degré; & si l'irritation violente de l'estomac & de l'intestin, qui est la source de ce trouble universel de toutes les fonctions, n'est pas promptement calmée, le malade est conduit rapidement au tombeau.

Les matières évacuées, soit par les vomissements, soit par les selles, sont loin d'offrir constamment le caractère bilieux que semble indiquer la dénomination de *cholera-morbus*; le plus souvent elles présentent un mélange de sérrosité, de bile, de mucosité, de résidus alimentaires, & quelquefois d'une plus ou moins grande quantité de sang noir. La nature de ces matières, dans certains cas, est tellement acre, qu'elle irrite ou enflamme & corrode même à son passage les parties du gosier, de la bouche & de l'anus, avec lesquelles elle se met en contact.

Le cholera-morbus peut donner la mort dans l'espace de quelques heures; toutefois il se termine rarement avant la fin du second jour, & quelquefois il se prolonge jusqu'au septième.

En général, plus il débute avec violence, plus ses symptômes parviennent rapidement au plus haut point d'intensité, & plus il est de courte durée. Au contraire, lorsque ses symptômes sont modérés, il a pour l'ordinaire une durée plus longue.

On peut espérer qu'il se terminera favorablement, lorsque les vomissements diminuent de fréquence & d'intensité, & que les selles deviennent plus rares & s'opèrent avec moins d'efforts. La diminution successive de la douleur épigastrique, des coliques & de l'anxiété générale, sont aussi des signes qui annoncent une heureuse terminaison; il en est de même de la régularité du pouls & de l'absence des hypothermies. Au contraire, la fréquence des évacuations, la violence des efforts qui les accompagnent, la cardialgie, l'intermittence du

pouls, sont des signes d'un pronostic fâcheux; la fréquence & la longueur des syncopes, les sueurs froides, le froid des extrémités, l'altération profonde des traits de la face, la couleur noire & l'odeur fétide des déjections, annoncent une mort prochaine.

Chez les sujets qui succombent à cette redoutable maladie, on trouve la touique interne de l'estomac & de l'intestin parsemée de taches ou de larges plaques rouges, brunes ou noires, & quelquefois même une véritable gangrène de diverses parties de ces organes; alors les veines enterrées, gâtées & hépatiques sont ordinairement très-dilatées & remplies d'un sang noir. Dans certains cas, une grande quantité de bile brunâtre afflue dans le duodénum, remplit les canaux cholédoque, cystique & hépatique; quelquefois même le foie présente des traces plus ou moins profondes d'inflammation.

A tous ces traits, qui pourroit méconnoître dans le choléra-morbus une violente irritation de l'estomac & des intestins? qui pourroit se refuser à admettre cette irritation gastro-intestinale, comme cause directe & immédiate des symptômes locaux & pathognomoniques de cette redoutable affection, & à considérer comme autant de phénomènes sympathiques qui en découlent indirectement, cette foule de symptômes secondaires & d'accidens variés & plus ou moins généraux qui en forment l'étrayant cortège?

Ainsi, les vomissemens & les déjections alvines, la chaleur des hypocondres, la tension du ventre, les vives douleurs de l'épigastre, les tranchées, les ténésmes & les épreintes douloureuses du malade, résultent immédiatement de l'irritation violente dont l'estomac & les intestins sont le siège. L'étroite sympathie qui tient les fonctions de ces impuissans organes avec le cerveau, le cœur, la peau & les muscles, & leur influence prodigieuse sur l'économie animale toute entière, expliquent de la manière la plus satisfaisante la céphalalgie, l'atténuation du pouls, les syncopes, la chaleur de la peau & les sueurs, ainsi que les tremblemens musculaires, les crampes & les convulsions, & autres accidens consécutifs qui ne sont évidemment que des phénomènes sympathiques, résultat de l'irritation gastro-intestinale. La transmission également sympathique de cette irritation, qui peut être portée quelquefois jusqu'à l'inflammation la plus aiguë & même jusqu'à la gangrène: cette transmission étendue jusqu'aux radicules des canaux biliaires, par la continuité de la membrane muqueuse qui tapisse le duodénum & les canaux hépatiques, donne également la raison des évacuations bilieuses qui se manifestent dans le choléra, & de l'inflammation concomitante du foie, qu'on y a souvent observée.

Les causes qui produisent le choléra-morbus, & leur manière d'agir, concourent encore à prouver que cette maladie n'est qu'une simple modification de la gastro-entérite, ou inflammation de l'estomac

& de l'intestin. Toutes ces causes, en effet, portent, soit directement, soit sympathiquement, leur action sur l'appareil de la digestion.

Ainsi, remarquez que le tempérament bilieux, l'âge adulte, les climats chauds, la saison des chaleurs, l'usage des alimens excitans & des boissons stimulantes, l'ivrognerie & l'habitude de la gourmandise, sont les causes prédisposantes les plus ordinaires de la maladie qui nous occupe.

Au rang de ces causes excitantes, il faut placer l'impression d'une température froide & humide, qui succède rapidement à une chaleur vive, comme on le voit dans les contrées brûlantes de l'équateur, & en Europe, à la fin de l'été, lorsque des soirées & des nuits froides succèdent à la vive chaleur qui a régné pendant le jour; une ondée de pluie, un bain froid immédiatement pris pendant que le corps est en sueur; une boisson très-froide, des alimens aqueux, pulpeux & réfrigérans, pris en trop grande quantité, dans l'intention de le rafraîchir lorsqu'il fait très-chaud; un repas trop copieux, des alimens difficiles à digérer, quoique pris en petite quantité, & plus particulièrement les champignons, les melons, les concombres & autres cucurbitacées, les ananas, les pêches, les prunes & les abricots, le lait & la viande de porc frais, ainsi que les œufs de poissins, l'occasionnent souvent; une course immodérée, des fatigues extrêmes, des veilles prolongées, une forte contention d'esprit, un accès de colère, & les excès vénériens, y donnent lieu dans beaucoup de circonstances.

L'abus des vomitifs, des purgatifs, des toniques & de tous ces prétendus stomachiques, qu'un dégoûtant empirisme prodigue en tous lieux & de toutes parts, en font encore très-souvent la cause occasionnelle.

Cette maladie peut se manifester sporadiquement dans tous les pays & dans toutes les saisons de l'année; mais le plus souvent elle affecte un caractère épidémique; c'est plus particulièrement sous cette forme que Sydenham l'a observée: alors elle se manifeste vers la fin de l'été, au mois d'août & dans les premiers jours de septembre, & disparaît ordinairement avec les chaleurs de l'été. Elle paroit être endémique dans certaines contrées de l'Inde; mais c'est épidémiquement qu'elle se manifeste pour l'ordinaire dans ces contrées brûlantes, ainsi que dans les autres pays chauds, où elle fait quelquefois de si épouvantables ravages.

Dire que des vomitifs & des purgatifs, les astringens & les spiritueux, le diacondium de Proscator, la thériaque d'Andromaque, les prétendues poudres absorbantes & autres monstruosités pharmaceutiques, ont été tour à tour employés & préconisés contre le choléra-morbus, c'est rappeler la futille influence que des hypothèses énoncées & un empirisme aveugle ont exercée long-temps sur les docteurs médicaux, & signaler les maux incalculables qui en sont résultés pour l'humanité.

Il étoit réservé à Sydenham de souffrir le

cholera-morbus au succès empire de la polypharmacie. Uniquement dirigé par l'expérience & la raison, ce grand observateur reconnut que les purgatifs & les laxatifs, qui de son temps étoient les principaux moyens employés contre cette maladie, ne faisoient que l'aggraver, la rendre plus meurtrière, & devoient par conséquent être complètement exclus de son traitement. Il vit que la chose la plus importante, la seule utile à faire dans cette maladie, étoit d'abord de calmer l'irritation des organes digestifs & de faciliter l'expansion des matières qu'ils contiennent, par des boissons délayantes & adoucissantes, & d'avoir ensuite recours aux potions opiacées pour calmer l'excitation de la sensibilité de l'estomac & des intestins, & arrêter leurs mouvements déordonnés.

D'après ces vues judicieuses, dans le premier temps de la maladie, il se bornoit à administrer une ample boisson adoucissante & de fréquents lavemens de même nature; & après que le malade avoit pris, pendant plusieurs heures, une grande quantité de cette boisson & beaucoup de lavemens, si les accidens ne se calmoient pas, il administroit la préparation liquide d'opium, qui a conservé le nom de *laudanum liquido* de Sydenham.

Il ne se départoit de cette méthode que dans les seuls cas où les vomitemens & les déjections alvines, ayant eu lieu déjà pendant plusieurs heures avant l'arrivée du médecin, la prostration des forces, le froid des extrémités, l'altération des traits de la face & les sueurs froides annonçoient le plus grand danger. Alors, sans renoncer préalablement aux boissons délayantes, il se hâtoit d'administrer le laudanum, dont il continuoit même l'usage pendant quelques jours après la cessation des accidens, afin de prévenir leur retour.

Les succès de cette méthode curative, dans le traitement du cholera-morbus, ont été si souvent constatés par les praticiens, soit en Europe, soit aux Indes, qu'on doit à juste titre la considérer comme devant servir de règle dans la maladie qui nous occupe. Toutefois l'étude des phlegmasies de l'estomac & de l'intestin, dont le cholera n'est qu'un cas particulier, beaucoup mieux approfondie aujourd'hui qu'elle ne l'étoit du temps de Sydenham, permet d'associer aux remèdes, dont l'utilité est suffisamment constatée, différents moyens dont l'action est également avantageuse, & quelquefois même plus énergiquement efficace.

La boisson que Sydenham prescrivoit au début, & dans tout le cours du cholera-morbus, étoit une simple décoction d'un jeune poulet dans sept pintes d'eau, ou, à son défaut, du petit-lait; il faisoit prendre ces boissons tièdes, & à très-grande dose. On peut, comme on le voit, remplacer sans inconvénient l'eau de poulet par un soule de boissons analogues également adoucissantes, souvent plus agréables aux malades, & pour l'ordinaire plus faciles à se procurer sur-le-champ. Ainsi, l'on peut prescrire une légère décoction d'orge, d'avoine

ou de gruau, ou bien une dissolution de gomme arabique, soit simples, soit légèrement acidulés, soit édulcorés avec le sucre ou un sirop quelconque. L'eau du rivièrè seule, associée avec le lait, unie à l'acide du citron, édulcorée avec un sirop agréable, peuvent remplir la même indication. On donnera en lavemens un mélange d'eau & de lait, une décoction de racines de guimauve ou une infusion de graines de lin.

Lorsque le malade est jeune, fort, robuste, d'un tempérament sanguin, il est utile, au début de la maladie, d'associer aux boissons adoucissantes & aux lavemens émoulliens, une forte application de sangsues à l'épigastre, sur les parois du ventre ou à l'anus, selon que l'irritation paroît plus particulièrement fixée sur l'estomac ou les intestins, de manière à opérer une abondante saignée capillaire. Si le sujet étoit très-fort & très-phéorique, une ou plusieurs saignées générales seroient même nécessaires. Mais c'est surtout dans les premières heures de la maladie que ces moyens peuvent avoir un grand avantage.

L'application des sangsues à l'épigastre & à l'abdomen est encore très-utile dans les cas où l'anxiété épigastrique & la douleur d'entrailles sont extrêmes. Dans ces cas aussi, les bains chauds, & à leur défaut les fomentations tièdes émoullientes sur le ventre, sont d'un très-grand avantage, & doivent être associées à l'emploi des boissons & des lavemens adoucissans.

On peut également recourir avec fruit à l'usage des bains, lorsqu'il survient des convulsions, des contractions spasmodiques & des crampes. Mais alors ils doivent être tièdes, comme dans les circonstances précédentes. Quelques auteurs, il est vrai, les prescrivent froids, soit dans le cas qui nous occupe, soit dans le cas de tranchées violentes & de cardialgie intolérable. Mais l'expérience n'a pas définitivement prononcé sur la préférence à donner alors aux uns ou autres.

Souvent l'excitation de l'appareil digestif est telle, que les boissons & les lavemens empoisés avec les substances les plus douces sont expulsés à l'instant par les vomitemens & les selles. La plupart des auteurs, pour s'opposer aux vents, recommandent alors l'administration de l'acide carbonique, que l'on dégage instantanément du carbonate de potasse, à l'aide du suc de citron; mais, sans erreur, j'ai peine à croire qu'un estomac assez irrité pour repousser l'eau de poulet, l'hydrogène, &c., puisse supporter un semblable mélange.

Il est beaucoup plus certain, dans cette circonstance, à l'exemple de Sydenham, d'administrer le laudanum à doses fractionnées, dans une petite quantité de véhicule approprié.

Lorsque la maladie existe déjà depuis plusieurs heures, au moment où l'on est appelé, sans perdre un temps précieux en donnant des adoucissans, il faut à l'instant chercher à arrêter les évacuations par l'administration de l'opium. On peut

donner vingt à vingt-cinq gouttes de laudanum liquide de Sydenham, dans quatre onces d'eau édulcorée, ou tout autre liquide analogue, à doses fractionnées & répétées à de courts intervalles.

Si, après avoir diminué l'intensité de la maladie, les selles & les vomissements se prolongeoient du quatrième jour au septième jour, il faudrait donner des boissons moins abondantes & plus concentrées, s'en abstenir même, si le malade n'a pas de lait, insister sur les lavemens à l'eau tiède, & continuer l'usage du laudanum. Dans ce cas on peut aussi avoir recours avec avantage à l'application des ventouses & aux saignées scarifiées sur le ventre; quelquefois même à celle des rubéfiés.

Sydenham, continuoient ordinairement l'emploi du laudanum pendant plusieurs jours après la cessation des vomissements & des selles. Je crois que lorsque ces symptômes ont cessé, & que les autres accidens du cholera-morbus ont disparu avec eux, on doit surtout compter sur le régime pour prévenir le retour de cette redoutable maladie : il importe surtout de régler les rapports du malade avec tout ce qui l'entoure, pour le prémunir contre les influences qui pourraient arrêter directement ou sympathiquement l'appareil de la digestion, & pour éviter les causes de la maladie. (CHAMBERZ.)

P. S. Le laudanum donné à une dose trop forte, & pour faire cesser le vomissement spasmodique, suffiroit pour prouver contre l'opinion de l'auteur de l'article qui précède, que le cholera-morbus est bien moins une modification de la gastro-entérite, qu'une irritation convulsive de tout l'appareil nerveux abdominal. (L. J. M.)

MORCEAU DU DIABLE. (Voyez Trompes de Fallope, Trompes utérines, dans le Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie.)

MORDEIN. (Nosographie, médecine pratique.) On désigne sous ce nom une maladie qui paroît endémique, ou du moins très-fréquente aux Indes orientales, & qui est caractérisée par un dérangement des fonctions digestives.

«**MORDEXIN.** (Nosographie, médecine pratique.) Maladie endémique, ou même assez fréquente parmi les habitans de Goz; elle se manifeste tout-à-coup par des nausées suivies promptement de vomitemens opiniâtres, qui sont très-souvent funestes. (P. Sauvages, tom. II, p. 349, Mémoires de la Chine. Hoffmann, tom. VI, p. 307.)

MORICANT, MORICANTE (Chaleur). (Pathologie générale, fémiotique.)

MORDICATION. Picotement, sensation incommode qui se trouve exprimée par les mots chaleur, douleur mordicante. (Voyez Mordicant.)

MORDRE. Action de blesser en serrant, presant avec les dents, soit de la part de l'homme, soit, & plus particulièrement, de la part des animaux, qui déposent dans la blessure une humeur, un virus qui la rend plus ou moins grave. (Voyez Monsieux.)

MOREAU DU MOULIN (Réné), né à Montreuil-Bellay, en Anjou, de Mathieu Moreau, médecin du duc d'Alençon, & docteur en médecine de l'Université d'Angers.

Réné Moreau prit de bonne heure du goût pour la profession de son père; il studia avec distinction les belles-lettres & la philosophie, & se livra à l'étude de la médecine. Il vint à Paris pour se perfectionner dans cette science, suivit les leçons de Simon Frère & de Claude Charles, qui josisoient alors de la plus haute réputation. Moreau se mit sur les bancs en 1616, & fut reçu bachelier le 16 avril, licencié au mois de mai 1618, & docteur le 29 novembre de la même année.

En 1616 il prononça les paraymèmes de la Faculté de théologie & celles de médecine; en 1618 il fut nommé médecin de l'Hôtel-Dieu; il devint doyen de la compagnie en 1630 & 1631, & en 1632 il fut nommé professeur royal en chirurgie. Son discours d'inauguration fut imprimé la même année, in-4°, chez Jean Libert. Il est intitulé : *De manu regis oratio panegyrica & inauguralis habita in collegio Cameracensi regio, de jovic 21 aprilis, à Renato Moreau, medicinar & chirurgie professore regio.* — Ce discours est un panegyrique de Louis XIII, & ce panegyrique a le mérite d'être vrai, quoique la flatterie n'y soit pas épargnée. Moreau y parle aussi avec honneur de ses collègues au Collège royal. Le 2 septembre 1631, Moreau fut mandé au Châtelet, en qualité de doyen de la Faculté; pour donner son avis, aux magistrats assemblés, sur la maladie pestilentielle qui régnoit alors dans la capitale; & le 10 septembre suivant, d'après l'avis de la compagnie, il présenta un Mémoire sur les causes qui entretenoient cette maladie, & sur les moyens d'y remédier. Ce mémoire est intitulé : *Remonstrance de M. Moreau, doyen de la Faculté de médecine, à M. le lieutenant civil, touchant les défauts de police qui fomentent & augmentent la maladie contagieuse, tels que sont les boues & les égouts, qui, à faute d'être nettoyés, corrompent l'air; la vente des mauvais fruits, melons, concombres, qui servent de Matière à allumer le feu de tant de fièvres que nous voyons dégénérer en pestilentielles & contagieuses; la foule des pauvres aux églises & aux rues, qui sortent le plus souvent mal guéris de la maison de santé; un nombre infini de charlatans qui font de la médecine avec des drogues pestilentielles, & autres abus & manquemens, desquels ils font prêts de dresser les avis.*

Moreau s'acquiesça l'estime & l'amitié de tous les confrères pendant son décanat, & soutint avec zèle & dignité les droits de sa compagnie. Il eut

une égale réputation dans la pratique de son art & dans la littérature. Il possédoit la plupart des langues étrangères & avoit des connoissances très-étendues en chirurgie, en botanique & en pharmacie. Guy-Patin, qui en parle beaucoup dans ses lettres, en fait les plus grands éloges. Il lui reproche de trop travailler. « Son immédiation » à l'étude, dit-il, l'a fait paroître vieux avant le » temps. » *Immodicus brevis est aetas & hanc senectus.*

Moreau mourut le 17 octobre 1656, âgé de soixante-neuf ans, & de soixante-douze suivant Guy-Patin.

Il possédoit une bibliothèque magnifique & beaucoup de manuscrits curieux; entr'autres, un exemplaire des ouvrages de Henri de Mondeville (V. Naudé, p. 61, *de antiqu. & dignit. scholae med. Paris.*). Toutes ces richesses littéraires furent enlevées après sa mort par différents libraires; & Pouquet, alors procureur-général, depuis surintendant des finances, acheta dix mille livres tout ce qui avoit rapport à la médecine.

Moreau étoit lié avec tous les savans de son temps. Gabriel Naudé étoit en correspondance avec lui; le recueil de ses lettres, dans lesquelles il en parle avec honneur, fut imprimé à Genève en 1687, chez Widenhold, petit in-12. — Bayle, dans son Dictionnaire, article *Sylvius*, fait l'éloge de la vie de ce médecin, donné par Moreau. « Cette vie, dit-il, est d'une si bonne main, qu'il » seroit à souhaiter que l'ouvrage d'où elle est tirée » fût imprimé. »

Les imprimeurs des *Œuvres de Seméris*, édition de 1641, lui firent la dédicace de cet ouvrage. — L'édition latine de Duréon lui fut aussi dédiée. C'est dans cette dédicace qu'il est fait mention des voyages que Moreau fit en Allemagne, en Pologne & en Danemarck, pour s'instruire dans la botanique & dans la connoissance des corps naturels. — Guy-Patin lui donna des *Aphorismes & des pronostics d'Hippocrate*. — Et François Landrey, docteur en médecine, son *Histoire notable sur les effets merveilleux de la saignée*. Ce petit ouvrage fut imprimé in-4°. à Paris, chez Varinquet, en 1748. Il est précédé d'une lettre de Moreau à l'auteur.

Guy-Patin fit graver le portrait de Moreau, avec ces vers :

*Exprimit ars; Morelle tuam sub imagine fontem
Euboeae ingenuum bibliotheca tuam.*

Les ouvrages donnés par Moreau sont en très-grand nombre.

1°. Il fit paroître, étant encore fort jeune, un poème latin contre l'usage de porter la calotte, qu'il prétendoit mal faire. Ce poème est intitulé : *Renati Morelli melioris, ad arguendum anti-callota, ad Joannem scholae romensis commissarium, pro Medicinæ. Tome X.*

tamque laureatum. Paris, Jean Libert, in-4°. p. 16. Il opposa ce petit poème à celui de Jean Morel, en faveur de la calotte. La réponse de Moreau est suivie de quelques vers de Pierre Citois, poitevin, & de François Pomain d'Angers.

2°. Deux *Paranymphes*, l'un pour les licenciés en théologie, l'autre pour les licenciés en médecine, 1616.

3°. *Avertissement à Théophraste Renaudot, contenant les mémoires pour justifier les anciens droits & privilèges de la Faculté de médecine de Paris*, 1641, in-4°, de cinquante-huit pages. — *La défense de la Faculté de médecine de Paris contre son calomniateur, dédiée à monseigneur l'éminentissime cardinal duc de Richelieu.* Paris, 1641. — *Ibid. Defensio Facultatis medicæ parisiensis adversus calumniatorem, per Renatum Moreau, doctorem medicum*, in-4°.

4°. *Remerciement à Michel Le Meste, abbé des Roches* (qui avoit donné trente mille livres pour le rétablissement de la Faculté de médecine), 1643, in-4°.

5°. *Petri Bristoti doctor. medicis parisiensis præstantissimi apologetica disceptatio, in qua docetur per quæ loca sanguis multum debeat in viscerum inflammationibus, præsertim in pleuritide.* Editio nova, à Renato Moreau, doctore medico parisiensi, illustrata qui prælo de missione sanguinis in pleuritide subiunxit. Adjuncta est Petri Bristoti vita, cum duplici indice auctorum & rerum memorabilium. — Le *Traité De sanguinis missione*, dans lequel Moreau rapporte l'avis de tous les auteurs qui ont écrit sur le choix qu'il faut faire du côté où il faut saigner dans la pleurésie, est rempli d'érudition. La vie de Bristot est très-bien faite. Moreau a dédié l'ouvrage en entier à MM. les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, dont il étoit médecin depuis quatre ans. Ce bon ouvrage fut imprimé à Paris en 1622, chez Abraham Pacard, in-8°. Il promet à la page 80 du *Traité De sanguinis missione*, un *Traité de la dérivation & de la révulsion*, mais cet ouvrage n'a pas paru. Les additions de René Moreau & la vie de Bristot ont été imprimées séparément à Hales, in-8°, 1742. *De missione sanguinis in pleuritide, ubi demonstratur ex quâ corporis parte tractus ille fuerit à duobus annorum milibus, ex omnium penè medicorum grecorum, latinorum, arabum, barbarorum exactâ enumeratione juxta temporum quibus florere seriem instructa. Adjuncta est vita Petr. Bristoti, doctoris medici parisiensis, auctore Renato Moreau, doctore medico parisiensi.* Ad exemplum Parisiis, apud Samuelum Celsium, 1650. Recusum Hales, 1742, impensis Carol. Herm. Hommerde, in-8°.

6°. *Scholæ Salernitanæ, hoc est de valetudine curanda opus, nova methodo instructum, infinitis versibus auctum, commentariis P'rianovani, Curionis Cretelli & Costanconi illustratum. Adjecta sunt animadversiones novæ & copiosæ.* Na

Renati Moreau, Parisiens, Thomas Blaise, 1625, in-8°, & 1672, apud J. Billaine. — Cet ouvrage est dédié au cardinal de Richelieu. Outre le commentaire qui est fort ample, Moreau a donné aussi des préleçons, dans lesquels il fait connaître le but de Jean de Milan (qu'on en regarde comme l'auteur), la forme de son livre, l'antiquité & la dignité de l'école de Salerne, &c. Pailin dit qu'il peusait à donner un second volume de son école de Salerne; mais la mort l'en empêcha.

7°. *La Vie de Jacques Sylvius d'Amiens*. Cette vie se trouve à la tête des ouvrages de ce médecin, avec son portrait, Genève, 1650, in-fol. Moreau a dédié cette édition à Charles Bouvard. *Jacobi Sylvii Ambiani, opera medica, jam demum in sex partes digesta, vestigata, & indicibus necessariis illustrata. Adjuncta est ejusdem vita & jam opera & studio Renati Morei, doctoris medici parisiensis*. Genevæ, 1650, in-fol.

8°. *La vie de Guillaume Bailhou*, à la tête des ouvrages de cet auteur. Paris, 1655, in-4°. *Guillelmi de Bailhou vita*.

9°. *Epistola eretica ad Clariss. Baldum de affecto loco in pleuritie*. Paris, Cramoisy, 1641, in-8°. — *Rumæ*, apud Fr. Caballum, 1643, in-8°, avec l'ouvrage de Baldi, médecin & professeur en l'Université de Rome. L'ouvrage de Baldi est adressé à René Moreau, & est intitulé: *Baldi de loco affecto in pleuritie disceptationes*. L'épître de Moreau est du 15. septembre 1640.

10°. *Epistola de laryngotomia*. Paris, chez Olivier de Varennes, 1646, in-8°. Elle se trouve avec l'ouvrage de Th. Bartholin: *De angini puerorum Campanie Sicilique epidemici*. La lettre de Moreau est du premier mars 1646. — Il dit dans cet ouvrage, que l'on peut guérir la plupart des esquinancies par le moyen des saignées répétées au bras; & lorsqu'elles ne réussissent pas, il veut qu'on ait recours à la trachéotomie. Il recommande l'usage de plusieurs opérations, telles que celle de la taille, trop négligée de son temps, & la saignée à la jugulaire, à laquelle on ne recourait que très-rarement; il assure que cette saignée n'est ni plus difficile à pratiquer, ni plus dangereuse que celle du bras ou du pied. (Voyez *Morhien*. *Opelike, Histor. chirurgica*, p. 162.). *Portus, Histoire naturelle de l'anatomie*, t. H.)

11°. *De Chocolate*. Discours curieux, divisé en quatre parties, par Antoine Golmenero de Ledesma, médecin & chirurgien de la ville d'Ecija de l'Andalousie; traduit de l'espagnol en français, sur l'impression faite à Madrid, l'an 1631, & éclaircie de quelques annotations par René Moreau, professeur du Roi, en médecine, à Paris. Plais, est ajouté un *Dialogue* de Barthélémy Narraudon, médecin de la ville de Morchena (bourg de l'Andalousie), touchant le même *Chocolate* (c'est-à-dire un médecin, un Indien & un bourgeois), dédié au cardinal de Lyon (Alphonse-Louis de

Richelieu, grand-aumônier de France, Paris, Sébastien Cramoisy, 1643, in-4°. L'épître dédicatoire est du dernier octobre 1642.

12°. *Prælecciones in librum Hippocratis Cōi, medicorum principis, de morbis internis*; auctore M. Joanne Martino, doctore medico parisiensi, professore regio, &c. Editore M. Renato Morello, doctore medico parisiensi, &c. Paris, Joann. Libert, 1639, in-4°. Moreau dédia cet ouvrage à Pierre Seguin. Dans l'avis de l'imprimeur, on voit que Moreau promettoit de donner les annotations de Jean Martin: 1°. sur le livre *De aere, aquis & locis*, qu'il a donné en 1646; 2°. sur le livre *Des plaies de la tête*; 3°. sur les *Aphorismes d'Hippocrate*. Ces deux derniers traités n'ont pas paru.

13°. *Prælecciones in librum Hippocratis Cōi, medicorum principis, de aere, aquis & locis*; auctore M. Joanne Martino. Paris, apud Petrum & Matthæum Guillemot, 1646, in-4°. Cet ouvrage est dédié à Jacques Coustout.

14°. *Centonis Kæmpferi diffibulationi, in quâ plerique diplomata Academicæ Monspeliensis saluti conuncuntur*. Paris, 1646, in-4°, de trente-neuf pages. Moreau y relève les anachronismes de Simon Courtaud, neveu d'Héroard, & docteur de Montpellier. Il est aussi auteur de l'ouvrage suivant: *Appendix ad Centonis Kæmpferi diffibulationem*, in-4°, de onze pages, 1746, *mensis junio*.

15°. *Bartholomæi Prædicti vita*. Cette vie se trouve au commencement des œuvres de Prædicti, & parut dans l'édition des ouvrages de ce médecin, publiée par G. Sauvageon, médecin de Lyon. Paris, Jean Bessin, 1659, in-4°.

16°. *Gabrielis Nauclæ, parisiensis missegetæ epithimium ætemitati-ficrum*, in prole, dans le *Tamulus Nauclæ*, 1659. Moreau étoit lié d'amitié avec Nauclæ, qui lui avoit dédié quelques ouvrages, & étoit aussi avec lui en commerce de lettres. Il perdit cet ami le 19 juillet 1655. Il avoit entrepris son éloge; cet ouvrage étoit même fort avancé, mais la mort l'empêcha de le finir.

17°. *Medicina præctica, in quatuor libros digesta*, Francisci Faynet, doctoris & professoris regi Monspeliensis, nunc primum est bibliotheca Cl. V. Renati Morei, gladiosissimi usus benignè concessa. Lugduni, apud Joann. Antonium Huguetan, 1650, in-4°. (Voyez *Riolan*, p. 277 de ses curieuses Recherches.)

18°. *Tabule methodi generis curandorum morborum, quæ septem sectionibus explicantur; à viro clarissimo M. Renato Moreau, saluberrima Facultatis medicinæ Parisiensis doctore celeberrimo, & professore regio, in gratiam & utilitatem studentium exarata*. Parisius, prostant *agymplariæ apud Nicholam Brisset*, 1755, in-4°.

— On voit d'après la titre, que cette table, qui étoit destinée au Collège royal par René Moreau, ne fut pas publiée par lui; ce fut un de ses disciples qui la fit imprimer.

Morcan avoit en l'idée de publier la vie des médecins illustres de la Faculté de Paris, mais il changea ensuite d'avis. Cependant une partie de l'ouvrage existe à la Bibliothèque du Roi. Les seuls articles qui parurent, furent les vies de Brissot, de Sylvius, de Baillou & de Perducus. Naudot fit ses vers en l'honneur de Morcan, à l'occasion de cet ouvrage.

*Illos medicæ proceros dâni pingis in ore
Glossæque tot procerum nobilitatis doctos:
Sic tibi per meritis reddetur gratia, vita
Tot tibi debetur quos tua penna dabat.*

(ANDRY.)

MORELLE, f. f. *Solanum nigrum*. Ce genre de plantes, qui fait partie de la grande famille des solanées, possède, à un faible degré à la vérité, les propriétés narcotiques ou sédatives qui caractérisent cette famille. M. Dunal a remarqué en outre, que plusieurs *solanum*, de la section des morelles, avoient de l'analogie dans leurs effets, avec l'action de la belladone, *atropa belladonna*.

Les parties usitées de cette plante sont principalement ses feuilles employées comme cataplasmes, ou préparées pour des décoctions, des eaux distillées.

L'odeur de ce médicament est légèrement oléaceuse. On emploie la morelle avec avantage dans les inflammations très-intenses, en cataplasmes, en lotions, fomentations, soit seule, soit avec des émulsions.

La douce-amère, qui est aussi une morelle (*solanum dulcamara*), a des propriétés beaucoup plus étendues que la morelle noire. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Botanique.)

Il est probable, du reste, que la plupart des empoisonnements occasionnés par la morelle noire, doivent être attribués aux fruits de la belladone, quel'on avoit pris pour ceux de cette plante. Il faut cependant savoir que l'extrait aqueux de cette dernière agit comme poison sur les animaux, en la donnant à des doses assez fortes (1).

Les feuilles de morelle ne sont plus guère employées qu'à l'extérieur; leurs décoctions, leurs souductions, leurs cataplasmes, conviennent plus particulièrement dans les cas d'hémorrhoides, de catarrhe inflammatoire du vagin, de fluxion rhumatismale très-douloureuse, &c. &c.

Les mêmes feuilles entrent encore dans la composition du baume tranquille & dans l'onguent populeum.

La pomme de terre, les tomates, le melon &c. & plusieurs autres plantes sont rapportés à la section des morelles, & fournissent des aliments ou des médicaments. (Voyez ces mots, soit dans le Dictionnaire de Médecine du dâns celui de Bo-

tanique, & particulièrement l'article SOLANUM, dans lequel on trouvera l'abrégé des excellentes observations que M. Dunal a consignées dans sa dissertation ayant pour titre : *Histoire naturelle médicale & économique des solanées*, in-4°. Montpel., 1813.) (L. J. M.)

MORÈNES, f. f. *Hydrocharide*. On désigne sous ce nom une famille de plantes de la classe des monocotylédones, qui croissent dans les eaux tranquilles. Aucune espèce de cette famille n'a été employée jusqu'à ce jour en médecine. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Botanique.) (L. J. M.)

MORFONDURE, f. f. (*Médecine vétérinaire*.) La morfondure est une inflammation catarrhale de la membrane pituitaire; tous les animaux domestiques, & principalement le cheval, sont exposés à cette maladie. Les signes qui la caractérisent sont l'écoulement, par les naseaux, d'une matière d'abord limpide, & qui, en très-peu de temps, acquiert de la densité; la rougeur de la membrane pituitaire, de fréquents écoulements, une toux grasse, quelque altération dans le pouls. Si ces symptômes ont peu d'intensité, on doit en conclure que la maladie est récente & qu'elle cédera facilement aux secours de l'art. Si, au contraire, ils offrent un caractère plus grave, si le pouls est vite & dur, la respiration laborieuse, le flanc très-ahéré, si les naseaux donnent issue à une matière épaisse & abondante, & que l'animal éprouve une toux fatigante, le pronostic est beaucoup plus fâcheux. On doit craindre, dans ce cas, que l'affection ne devienne chronique; il est même possible qu'elle dégénère en morve. L'affection prétend que la morfondure qui subsiste plus de quinze jours, donne lieu à l'engorgement des glandes situées sous la ganache, & que l'adhérence à l'os maxillaire inférieur peut faire confondre cette maladie, surtout d'après les autres signes, avec la morve proprement dite. Ce qui les distingue néanmoins, c'est la marche des deux affections, qui est très-différente; l'altération sensible de la santé qui accompagne la morfondure, caractérisée par la fièvre, la toux & le défaut d'appétit. La morfondure d'ailleurs n'a aucun caractère contagieux.

Les causes de la morfondure sont : l'action subite d'un air froid sur un animal échauffé, le contact d'une eau très-froide sur la membrane de Schneider. Dans le cheval, l'organe pituitaire étant l'égoût du tissu cellulaire, il en résulte que la suppression de la transpiration est presque toujours suivie d'une augmentation de l'excrétion muqueuse du nez; telle est d'ailleurs l'indolence de ce qu'on appelle, que presque toutes les maladies s'accompagnent d'un flux nasal, plus abondant & d'une autre nature que celui qui coule dans l'état naturel.

La morfondure n'est souvent qu'une légère indisposition, un rhume éphémère, qui se dissipe

Na 2

(1) Toxicologie générale de M. Orfila, vol. 12, pag. 191.

fans remède ; mais l'intensité ou la continuité de l'action des causes qui l'ont déterminée, un traitement contr'indiqué, ou certaines dispositions du système, peuvent aggraver cette fluxion catarrhale, au point de la faire dégénérer en des maladies très-rebelles, telles que la fausse péripneumonie, la phthisie pulmonaire ; il n'est pas impossible que le système lymphatique ne subisse des altérations assez profondes pour produire le farcia ou la morve.

Les maréchaux ne savent traiter la morfondue que par un traitement incendiaire, l'administration des aromatiques & des spiritueux, qui conviennent dans ce cas presque toujours aux bêtes à cornes, & très-rarement aux chevaux. Au lieu de cette méthode aveugle, le sage praticien consulte l'état du système : si l'inflammation est vive, le pouls violent, il débute par la saignée. Ordinairement cette opération n'est pas nécessaire ; il suffit le plus souvent de rappeler à la surface l'humeur perspirable par des fumigations émollientes, & en tenant l'animal dans une température chaude. On lui fera prendre encore des breuvages tièdes d'infusion de fleurs de sureau, de tilleul ou de violette, édulcorés de miel, pour calmer la toux. Les gargarismes d'hydromiel seront administrés plusieurs fois par jour dans le cours de la maladie. On diminuera la quantité des aliments solides, on substituera la paille de froment au foin, on donnera du foin avec du miel.

Cu la matière muqueuse acquiert un mauvais caractère, que le pouls s'affoiblit, que les glandes s'engorgent, on se hâtera de placer les sétons ou les véicatoires, & de combattre la disposition prédominante par la méthode fortifiante & tonique : ainsi la décoction de gentiane, de gémmandrée, les baies de genièvre, données avec du foin, rempliront cette indication.

Les moyens diététiques, tels que les frictions sèches, un exercice modéré, la respiration d'un air pur, seconderont puissamment la méthode curative. (GAZONIER.)

MORGAGNI (Jean-Baptiste), l'un des plus habiles anatomistes & des plus savans médecins du dix-huitième siècle, doit être mis au nombre de ces hommes rares, dont l'apparition marque une grande époque dans l'histoire des sciences. Né à Forlì, dans la Romagne, le 25 février 1682, il manifesta dans sa jeunesse un ardent desir de s'instruire, & les succès qu'il obtint dans ses premières études préférent ceux qui s'attendoient dans les sciences médicales.

En 1698, âgé seulement de seize ans, il se rendit à Bologne, où l'enseignement de la médecine brillait du plus vif éclat, & bientôt il devint l'inséparable ami de H. F. Albertini & de Valsalva, qui l'initia à l'étude de l'anatomie, avec un soin particulier. Malgré son assidue à méditer les ouvrages des grands médecins, parmi lesquels

il devoit un jour occuper une des premières places, le jeune Morgagni trouvoit encore le moyen de profiter des leçons de plusieurs professeurs de philosophie. Dans ce temps, où le nom des auteurs célèbres avoit plus d'autorité que les faits, les candidats ne se présentoient, pour soutenir leur thèse, que munis d'une foule de notes couvertes de citations. La mémoire prodigieuse de Morgagni lui permit de s'affranchir de cet usage, & lui mérita le titre de docteur en philosophie & en médecine, qu'il obtint, après trois ans d'étude, dans le cours de l'année 1701.

Une ophthalmie, qui fut le produit d'une application trop assidue à des lectures pénibles & multipliées, le détermina à se rendre pour quelque temps dans sa ville natale, où le repos & le régime le rétablirent promptement. De retour à Bologne, il devint l'aide inséparable de Valsalva, & ce fut lui qui prépara presque toutes les pièces anatomiques qui servirent de base à la composition du *Traité De aere humano*. Valsalva le chargea même de professer en son absence, pendant un voyage qu'il fit à Parme, & lui fournit ainsi l'occasion de se préparer à l'enseignement de l'anatomie.

A l'âge de vingt-deux ans, Morgagni fut nommé président de l'Académie *Degh inquisiti*, dont il étoit membre depuis plus de cinq ans : trop éclairé pour trouver des charmes aux discussions oiseuses qui faisoient alors retentir les chaires savantes, il imprima la plus benoîte direction aux travaux des académiciens qui l'avoient placé à leur tête ; il leur peignit avec force l'inutilité des disputes de mots, & des discussions subtiles qui tenoient encore la place des discussions basées sur les faits ; & joignant à ces bons préceptes un meilleur exemple, il commença la publication des innombrables remarques qu'il avoit faites dans ses recherches anatomiques.

Pour ajouter à ses connoissances, déjà fort étendues, Morgagni se rendit à Venise, puis à Padoue, & pendant son séjour dans ces deux villes il ne cessa d'étudier la chimie, la physique, l'histoire naturelle & la pharmacie. Aussi, ces voyages ne furent pas pour lui, une de ces courses vagabondes destinées seulement à satisfaire la curiosité. Partout il travailla, & partout il devint l'élève des maîtres qu'il eut occasion de rencontrer. Peu de temps après son retour à Forlì, thésaur trop restreint pour les vails talents, il revint à Padoue, où il obtint, en 1711, la chaire de Valsalviani venant de quitter pour occuper celle de Gulielmini, mort en 1710. Il se lia d'amitié avec Lancisi, & l'aïda dans l'explication des fameuses tables anatomiques d'Enslachi. Il fut appelé, en 1715, à la première chaire d'anatomie de la Faculté de Padoue, en remplacement de M. A. Molinetti.

Morgagni fut successivement nommé membre de l'Académie des curieux de la nature, en 1708, de la Société royale de Londres, en 1724, de

L'Académie royale des sciences de Paris, en 1731, en remplacement de Ruysch, de l'Académie impériale de Saint-Petersbourg, en 1735, de l'Académie de Berlin, en 1754. En même temps que l'abandon de son caractère & l'agrément de son commerce lui faisoient des amis de tous ceux qui l'approchoient, la célébrité la moins contestée devoit la juste récompense de ses immenses travaux; il fut l'objet des attentions les plus délicates de plusieurs souverains, du roi de Sardaigne Emmanuel III, de l'empereur Joseph II, des papes Clément XI, Clément XII & Benoît XIV, qui lui loué par Lancisi, Heister, Ruysch, Boerhaave, Leclerc, en un mot, par tous les grands médecins qui furent ses contemporains, & l'équitable postérité n'a rien retranché des éloges qui lui furent accordés pendant sa vie. En 1763, ses concitoyens placèrent son buste dans l'hôtel-de-ville de Forlì, avec cette inscription: *Effigiem adhuc viventis*. Il jouit donc de son vivant de toutes les distinctions que souvent l'envie dispute au mérite; même après la mort.

Morgagni étoit d'une stature élevée; la douceur de ses traits annonçoit celle de son caractère. Il fut exposé à deux grands périls, dans son enfance: une fièvre grave exposé ses jours, & plus tard il tomba dans un canal & fut sauvé par un homme qu'avertit le bruit de sa chute. Sa constitution, originellement foible, s'étoit fortifiée, malgré son séjour habituel dans les amphithéâtres. Il vécut sans maladies & sans infirmités, & mourut en 1771, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans neuf mois & dix jours. Il avoit eu quinze enfans, dont huit vivoient encore à l'époque de sa mort.

Les ouvrages de Morgagni sont nombreux, & malgré ses travaux importants sur les sciences médicales, qui ont occupé toute sa vie, il fut encore trouver quelques momens de loisir pour se livrer à diverses recherches de philologie & d'archéologie (1). La collection complète de ses écrits a été imprimée sous le titre d'*Opera omnia*, par les soins de A. Larber, à Bassano, 1764, 3 vol. in-fol. Elle comprend :

1°. *Adversaria anatomica, prima*. Bologne, 1706, in-4°; Leyde, 1714, in-8°; Padoue, 1719, in-4°; Leyde, 1723, in-4°; 1741, in-4°.

(1). *De genere mortis Cleopatrae epistola*, dans le recueil des appendices de Lancisi, ou *Metastoliceae variorum de Mercurio*, Rome, 1716, in-fol.

De arduis et frontis conspectu epistola, Padoue, 1723, in-4°.

De quidam librorum M. Varrois particula, ut legitur in veteri ceteris epistola; dans *Recueil d'épigrammes scientifiques & historiques*, Venise, 1730, in-12.

An Plinyus locutus, et tempus quo se scripsit, antequam se in alium mense autem composu architecturae epistola, dans la collection des œuvres de Morgagni.

Laudationes habita olim à Morgagni quam, gratulatioque alterius doctoris insignis oratio.

Dans cet ouvrage, qui fut son début dans la carrière, Morgagni amonça ce qu'il devoit être un jour, & l'on y trouve déjà tout ce qui a caractérisé ses autres écrits : exposition lumineuse de ce qui a été dit avant lui sur le sujet qu'il traite; judicieuse critique des opinions des auteurs, mises en parallèle avec les faits; descriptions remarquables par une exactitude scrupuleuse; réfutation solide des erreurs échappées à plusieurs anatomistes; indication d'un grand nombre de particularités que n'avoient pas encore été observées. Ce travail a été exploité avec beaucoup d'avantage & de profit, par tous les anatomistes qui ont écrit après Morgagni & qui l'ont trop peu cité.

2°. *De lumbricis epistola*, imprimée dans l'ouvrage de Vallisneri, intitulé : *Considerationes & experientia intorno generazione de Vermi nel corpo umano*, Padoue, 1711, in-4°, & dans la collection des œuvres de ce naturaliste, Venise, 1703, in-fol.

3°. *Novae institutionum medicarum idea*. Padoue, 1712, in-4°; Leyde, 1740, in-4°, & avec la collection des *Adversaria*, Padoue, 1741.

Dans cet opuscule académique, Morgagni s'attache surtout à relever l'importance de l'anatomie dans l'étude & la pratique de la médecine.

4°. *De anatomicis Eustachii tabulis epistola*, ed. Lancisio. Rome, 1714, in-fol. — Genève, 1717, in-fol., dans le *Thésaurus anatomicus* de Manget. Rome, 1728, in-fol.

5°. *De lacrymalibus ductibus eorumque obstructione epistola*, imprimée avec l'ouvrage d'Asel, intitulé : *Suite de la nouvelle méthode de guérir les fistules*, De. Turin, 1714, in-4°.

6°. *De vitâ & scriptis D. Gulielmini commentariolum*, dans les *Ephémérides des curieux de la nature*. Nuremberg, 1715, IV^e. centurie; avec les écrits de Golicmius, Genève, 1717; dans la *Bibliotheca scriptorum medicorum* de Manget.

7°. *Adversaria anatomica altera & tertia*. Padoue, 1717, in-4°. — Leyde, 1723, in-4°. — Ibid., 1741, in-4°.

Cet écrit est en grande partie une agamen critique & sévère du théâtre anatomique de Manget, dont Morgagni relève les nombreuses erreurs, en même temps qu'il ajoute une foule de remarques intéressantes sur un grand nombre d'organes.

8°. *De aëri intra vesicam intrusi & de eærescentia membranae adiposæ epistola*, dans les *Ephémérides des curieux de la nature*. Nuremberg, 1717, V^e. centurie.

9°. *Adversaria anatomica quarta, quinta & sexta*. Padoue, 1719, in-4°. — Leyde, 1723, in-4°. — Ibid., 1741, in-4°.

Dans ces trois dissertations, Morgagni continue à réfuter Manget. La collection complète des *Adversaria* a été imprimée avec le titre d'*Adversaria omnia*, sous les yeux de l'auteur, Padoue, 1741.

10°. *De glandulis epistola*, imprimée dans l'ob-

vrage de Michellou, intitulé : *De separatione fluidorum*. Venise, 1721, in-4°.

11°. *In A. E. Celsum & Q. Serenum Samonitum epistola quatuor*. Padoue, 1721, in-8°.

12°. *De venarum varicibus epistola*, publiée par A. C. Cocchi, avec ses *Epistola physico-medica*. Rome, 1725, in-4°; Venise, 1762, in-fol.

13°. *Epistola anatomica duæ*. Leyde, 1728, in-4°.

Morgagni traite dans ces lettres de la structure du foie & de ses attaches; il admet l'existence des conduits hépatocystiques, indique la manière de les trouver, & se livre à des recherches historiques du plus haut intérêt sur les canaux demi-circulaires, le canal thoracique, la capsule dite de *Gilson*, la cloison du crâne & les muscles transverses du périmé.

14°. *De calculis felleis epistola*, dans le tome second des *Ephémérides* des curieux de la nature. Nuremberg, 1730.

15°. *De iis que à Valsalva in Bononiensis Academiâ instituti scientiarum recitata fuerant epistola*. Bononie, 1731, in-4°.

16°. *Responsum medico-legale circa obsecrationem fœdum de muliere virginitate*. Rome, 1739, in-4°.

Responsum medico-legale alterum super feminæ emittendi impotentia;

Responsum medico-legale tertium : an post septem à conceptione menses infans nasci possit vitalis & perfectus?

Ces deux dernières consultations ne se trouvent que dans la collection complète des Œuvres de Morgagni.

17°. *De philologo Ravennate & de Angelo Bolognino epistola*, dans le tome second de la deuxième édition de l'ouvrage d'Allrué, *de morbis veneris*. Paris, 1740, in-4°.

18°. *De vitæ & scriptis Antonii Maria Valsalvæ commentatio*, dans la collection des Œuvres de Valsalva. Venise, 1740; 1741, in-4°.

19°. *Epistola anatomica viginti quæ ad scripta pertinent celeberrimi viri A. M. Valsalvæ*, avec les notes de Valsalva; Venise, 1740, 1741, in-4°.

Ces lettres sont la suite des écrits anonymes de Morgagni. On ne de ces lettres forment le commentaire du Traité de Valsalva, *De vitæ & scriptis*; mais ce commentaire n'a rien de l'espace de soixante-huit que l'on remarque ordinairement dans les ouvrages de ce genre. Morgagni confirme les découvertes de son maître par l'exposé de ses propres travaux; il résume avec franchise les erreurs échappées à cet homme célèbre, & concède aussi les droits de la reconnaissance avec l'amour de la vérité. Parmi ces onze lettres, quatre sont relatives aux muscles de la lèvre & du pharynx, aux glandes qui avoisinent ces parties & à l'œsophage. Dans les neuf dernières lettres, Morgagni commente les découvertes de Valsalva, relatives aux

intestins, aux artères & au cœur, aux nerfs & au grand sympathique en particulier, à l'est, à la cataracte & aux capsules surrénales.

20°. *De viâ atque ordine in tradendis publicâ medicinâ & anatome, epistola;*

Premia quædam, anatomiarum prælectionum;

De vesicæ calculis à fratre J. Beaulieu Pittavii factis & de casu Cornelia Bandier epistola;

Experimenta circa aquam calcis vivæ;

De Prospero Alpino epistola duæ.

Tous ces opuscules ont été imprimés pour la première fois dans la collection complète des Œuvres de Morgagni.

21°. *De sedibus & causis morborum per anatomen indagatis libri quinque*. Cet ouvrage est celui qui a mérité à Morgagni la gloire impérissable que cet habile anatomiste s'est acquise; & malgré les progrès récents de l'anatomie pathologique, c'est encore aujourd'hui le Traité le plus complet que nous possédions sur cette matière. Il ne ressemble en rien aux écrits qui ont été publiés sur le même sujet. En vain y chercherait-on un plan bien combiné, tel qu'on en trouve dans un grand nombre d'ouvrages modernes, remarquables par leur méthodicité; celui de Morgagni est simplement divisé en cinq parties consacrées à des recherches d'anatomie & de physiologie, sur les maladies de la tête, du tronc & des membres.

Le premier livre se compose de douze lettres qui traitent de la douleur de tête, de l'apoplexie & des autres affections soporeuses, de la frénésie, de la paralyse & de délire, de la manie, de la mélancolie & de l'hydropisie, de l'épilepsie; des convulsions, de la paralyse; de l'hydrocéphale & de l'hydrocrânie, du catarrhe & des maladies des yeux, des maladies des oreilles & des narines, & du bégaiement. Le deuxième livre renferme l'examen des maladies du thorax, les dyspnées, les calculs du poulmon, l'hydro-pneumonie, les anévrysmes du cœur & des gros vaisseaux, la suffocation, la toux, la douleur du poulmon, du dos, du côté; le crachement de sang, le crachement de pus, l'emphyème & la pleurésie, les palpitations & la douleur du cœur, la hypochondrie, la syncope, la mort subite par rupture du cœur ou des gros vaisseaux. Le troisième livre comprend des recherches sur les affections morbides qui ont leur siège dans le bas-ventre. Les fièvres, les tumeurs, les plaies, les ulcères, les maladies des os, la maladie vénérienne, sont la matière du quatrième livre, & le cinquième est rempli par des additions importantes aux quatre premiers.

La simple énumération des divers sujets sur lesquels Morgagni a porté ses vues, étonne par son étendue, & parait plus étonnante encore quand on réfléchit qu'il n'y a pas un seul de ces objets auquel il n'ait attaché son nom pour toujours. Nous allons essayer de donner une idée de la manière dont il a procédé à l'occasion de chaque maladie,

ne pouvant donner ici une analyse détaillée de son immortel ouvrage.

Morgagni avoit bien vu que l'anatomie pathologique ne consiste pas, à proprement parler, une science, & il n'a pas pensé un instant à isoler les différends que les maladies laissent dans les organes, & que l'on trouve après la mort, de l'exposition des symptômes, & par cette méthode il a envisagé son sujet sous un rapport tout-à-fait pratique; on ne le voit pas débiter par la description d'un tissu morbide, puis glisser rapidement sur les phénomènes malades qui en font presumer l'existence. Il procède toujours, au contraire, du connu à l'inconnu, du symptôme ou ébatement apparent, à la lésion cachée qui le produit, & c'est en remontrant philosophiquement de l'effet à la cause, qu'il est parvenu à de si beaux résultats: Ainsi, par exemple, dans la seconde lettre du livre premier, il s'applique d'abord à résoudre la question de savoir si l'apoplexie étoit plus commune de son temps qu'elle ne l'avoit été auparavant; & sans nier que cette maladie eût été très-fréquente au commencement du siècle où il écrivoit, il fait la judicieuse remarque que les conditions atmosphériques, la nature & la disposition du sol, le genre de vie des individus, & d'autres circonstances qui sont susceptibles de devenir causes de maladies, peuvent le modifier dans tous les temps, & qu'on auroit tort, par conséquent, de tirer des conclusions trop générales, relativement à une espèce de maladie en particulier, de l'apparition subite de cette maladie à une certaine époque qui pourroit être fertile en maladies de plusieurs sortes. Morgagni voulant ensuite déterminer si la division de l'apoplexie en *serena* & en *sanguinea* est fondée en raison & doit être admise, commence par citer les divers auteurs qui, depuis Hippocrate jusqu'à lui, ont successivement admis ou rejeté cette division. Elle ne lui paroit pas inadmissible, car l'ouvrage de Bonet prouve que dans certains cas on trouve du sang dans les ventricules, & que dans d'autres cas on y trouve de la lésion. Pour venir à l'appui de l'autorité de Bonet, Morgagni cite plusieurs auteurs qui disent avoir trouvé du sang dans les ventricules; il fouille même dans les annales de l'histoire, & rappelle qu'un rapport de Sextus Aurelius Victor, & de Julius Capitolinus & d'Epianus, la mort de l'empereur Vercas fut considérée comme ayant été produite par un coup de sang. Il résulte de là qu'aux troisième & quatrième siècles, l'apoplexie sanguine étoit déjà connue.

Après avoir ainsi invoqué les autorités avec une érudition étonnante par la solidité & par son étendue, fusent chez un médecin qui passoit les jours & les nuits dans les amphithéâtres du lit des malades, Morgagni a recouru au témoignage plus important des faits: ceux dont il donne l'histoire sont puisés dans les propres observations & dans les écrits de Valsalva, ou dans ceux des autres

médecins connus par leur exactitude. En général, cet ouvrage immortel n'a d'autre défaut que d'être écrit d'un style peu correct, quelques-unes même obscures, & d'offrir quelques traces des théories généralement reçues à l'époque où l'auteur écrivoit; mais quel autre ouvrage pourroit-il dispenser l'honneur d'être cité comme le plus beau monument d'érudition & d'observation médicale qui on ait élevé depuis la renaissance des lettres?

Lorsque Morgagni parut, tout sembloit favoriser le développement de son génie. Soignées enfin de l'état d'abaissement où elles étoient trop longtemps demeurées, les sciences physiologiques commençoient à fleurir en Europe; l'Italie sembloit s'être consacrée de sa grandeur déchue, par la gloire des lettres, & dans ce mouvement général des esprits, les sciences n'avoient pas été dédaignées. Mais le rôle de commentateurs & de traducteurs de l'antiquité auquel s'étoient bornés d'abord les Italiens, cessa bientôt de plaire à leur imagination vive; ils voulaient porter la célébrité des grands hommes, qu'ils faisoient connaître aux autres nations, & de l'étude de la médecine antique, ils passèrent à un examen attentif & plus fructueux de la nature elle-même. En parcourant le champ encore vierge de l'observation, ils s'aperçurent que les Grecs, leurs dévanciers, privés des moyens d'étudier les parties intérieures du corps humain, & obligés de s'en tenir à la dissection des animaux, n'avoient pu élever à la reconnaissance exacte de la structure & des fonctions des organes de l'homme. L'examen approfondi de plusieurs cadavres fit promptement découvrir à Beniveni & à Mupdani une foule de particularités inconnues aux Anciens, ou mal décrites par eux. Dès-lors commença à décliner ce respect superstitieux qu'on lent avoit voué; on vit qu'ils avoient, comme tous les hommes, payé tribut à l'erreur; & c'est de cette époque que date en Europe l'ère du scepticisme dans les sciences.

Les abondantes moissons de faits recueillis par les deux anatomistes que nous venons de citer, enflammèrent d'une vive ardeur contemporains; & bientôt on vit les Béranger de Carpi, les Montagnani, les Benedetti, les Falloppio, les Eustachi, les Aranzi, les Varoli, les Vicoliniani, animés d'un zèle infatigable, poursuivre dans les cadavres humains des connaissances nouvelles. Le reste de l'Europe ne demeura pas étranger à ce grand mouvement; la France fut les Rondelet, les Riolan, les Simon Pierre, les Delaure; la Suisse, Flacur & Baulin; la Hollande, Ruysch, Fechin, Cabrol; en Allemagne, Döderlein, Platen, Schenck, Fabricius de Hilden, agitèrent le domaine de l'anatomie; Thomas Bartholin, Rhodius, Olaius Borrich, Brunner, contribuèrent en Danemarck, aux progrès de cette science. En Angleterre, le célèbre Harvey mit hors de doute la circulation du sang, prescrivit par Michel Setret & par Celsus. Tous les nos

tomistes que nous venons de citer excitoient l'attention de l'Europe par le nombre & l'importance de leurs découvertes, tandis qu'en Espagne l'anatomie au berceau étoit encore enseignée d'après la méthode de Galien, malgré les travaux de Lacuna, de Collado & de Valverde.

Les recherches anatomiques ont été loin cependant de porter dans la pathologie les lumières qu'on en attendoit : quelques médecins finirent même par en dédaigner l'étude comme inutile, & se préjuger le succès de l'autorité imposante de Stahl. Mais si l'anatomie fut long-temps étrangère aux progrès de la médecine, si même elle a fourni fréquemment un aliment fâcheux à l'imagination des médecins, c'est qu'ils ont voulu, hors de propos, appliquer au corps vivant les calculs dont on fait usage avec succès dans l'appréciation des forces physiques & du mouvement considérés dans les produits de l'art.

Mais quelques esprits judicieux dédaignant les hypothèses prodigées pour remplir les vides nombreux que laissaient dans toute théorie l'observation la plus attentive, & satisfaits de coordonner des phénomènes sensibles sans chercher à en pénétrer les causes cachées & conjecturales, se mirent à étudier soigneusement la conformation des organes, remarquer les variétés singulières que leur structure peut quelquefois offrir, & de l'étude de ces cas de conformation extraordinaire, ils passèrent à celle des traces que les maladies laissent dans les organes après la mort. On alla même jusqu'à rechercher la raison qui pouvoit exister entre l'état des organes altérés dans le cadavre, & les dérangemens observés dans les fonctions pendant la vie : ce point de vue nouveau devoit changer la face de la science; il a donné naissance à l'anatomie & à la physiologie pathologiques, entièrement inconnues aux Anciens. La finit la médecine antique & commence la médecine moderne, fondée en grande partie sur les profondes recherches de Morgagni.

Jusqu'à ce grand-homme, plusieurs anatomistes avoient publié des remarques isolées sur l'état pathologique des organes; aucun n'avoit encore offert le tableau général des altérations morbides que présentent les cadavres. Morgagni osa entreprendre cet immense travail, & après soixante ans de recherches, soit dans les hôpitaux, soit dans les amphithéâtres, après les méditations les plus profondes sur la correspondance établie entre les actions organiques & les phénomènes extérieurs des maladies, il termina son immortel *Traité De sedibus & causis morborum*, qui marque une époque si importante de l'art. De tous les anatomistes, Morgagni est donc celui qui a fait le plus pour l'avancement de la médecine; c'est lui qui a jeté les premiers fondemens de la pathologie moderne, & sous ce dernier rapport, son nom doit être placé avant les noms des anatomistes de tous les siècles & de toutes les pays. (COTTAARD.)

On vient de publier récemment, & par souscription, une nouvelle édition de Morgagni, dirigée par MM. Chausser & Adelon, & une traduction française du même auteur, par MM. Déroremieux & Desfont.

MORGE LINE, f. f. On emploie les fenilles & les tiges de cette plante en decoction, en cataplasme, pour calmer les douleurs des hémorroides & de certaines ophthalmies. L'usage interne de la même plante, qui fut quelquefois recommandé dans les crachemens de sang, est tombé en désuétude. (L. J. M.)

MORGUE, f. f. Vieux mot français qui signifie *visage*. On a donné d'abord ce nom, par figure, à l'entrée ou vestibule d'une prison, où l'on reliait momentanément les criminels que l'on écroue, afin que les guichetiers puissent saisir leur signalement. Le même nom a été ensuite appliqué plus tard à un local dans lequel on expose en public les cadavres des personnes qui ont incombé à une mort violente ou accidentelle, afin qu'on puisse les reconnaître.

Quoique la Morgue ne reçoive que des corps dont la mort est évidente & même déjà ancienne, elle est cependant pourvue des principaux appareils nécessaires pour rappeler les moeurs & les alphysiologiques à la vie. Les gardiens de cet établissement, qui s'y trouvent employés depuis long-temps, ont fait plusieurs observations de détails, qui ne sont pas sans intérêt sous le rapport de la médecine légale. (L. J. M.)

MORIBOND, adj. de *moribundus*. Qui est sur le point de mourir, & la suite d'une longue infirmité, d'une maladie chronique quelconque. (*Voyez MORBART.*) (L. J. M.)

MORIENUS, ancien alchimiste qui étoit de Rome, & se retira à Jérusalem pour y vivre en ermite. Il passe pour un des meilleurs écrivains qui nous restent, sur la métallurgie. Les adeptes ont toujours fait beaucoup de cas de ce qu'il a laissé sur la transmutation des métaux. Suivant Boerhaave, ses ouvrages ont été traduits de l'arabe en latin, en 1182. Le docteur Shaw fait mention des deux suivans :

Libro de distinctione mercurii aquarum.
Libro de compositione alchemie. Bibl. chim. de Nunges, tom. I, pag. 509. (*Extrait d'Éléy.*) (R. Gervais.)

MORILLES, f. pl. *Morchellas*. Les morilles, qui appartiennent à la famille des champignons, diffèrent beaucoup des phallus, avec lesquels on les avoit long-temps confondus. Ces parasites sont visqueux & fétides, & sont poivreux d'une espèce de sève ou d'un liquide gluant & fétide qui recouvre leur chapeau. Les morilles font dépourvues de l'un & de l'autre; elles sont en

autre

entre une odeur agréable, & sont toutes salubres & comestibles.

On fait un usage fréquent de la morille faccolente (*morchella esculenta*), dans la plus grande partie de l'Europe. (Voyez le mot *MORILLIS* dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

MORIN (Jean-Baptiste), né à Villefranche en Beaujolais, en 1563, fut reçu docteur en médecine à Valence, donna dans l'astrologie judiciaire, & gagna par ce moyen la confiance des cardinaux de Richelieu & Mazarin. Il dut sa grande réputation à quelques prédictions qui se trouvèrent justifiées par le hasard. On prétend qu'il ne se trompa que de pen de jours dans le pronostic de la mort de Gustave-Adolphe; qu'il recontrâ, à dix heures près, le moment de celle du cardinal de Richelieu; que, sans connoître Cinqmars, il prédit sur sa phyronomie qu'il auroit la tête tranchée.

Rassoné & poursuivi par Gassendi, il lui prédit qu'il mourrait à la fin de juillet ou au commencement d'août 1650. Gassendi étoit parti pour la Provence, fort malade; l'air du pays rétablit sa santé, & jamais il ne se porta mieux que cette année. L'astrologue tomba en discrédit & mourut en 1656, à soixante-treize ans. Il a donné :

Astrologia gallica.

Nova mundi sublanaris anatomia. Par., 1619, in-8°.

Epistola pro restituendâ astrologiâ. Par., 1628, in-8°.

Refutatio libri de preadamitis. Par., 1656, in-12. (R. GROSSEYOT.)

MORIN (Nicolas), du diocèse de Châtillon-sur-Indre, en Touraine, docteur en médecine de Montpellier, bachelier le 28 mars 1634, licencié le 3 juillet 1636 & docteur le 9 janvier de l'année suivante. Il devint médecin des princes de Condé & de Conti. Morin étoit très-versé dans les langues grecque & latine, & grand partisan de la doctrine d'Hippocrate, dont il avoit tous les ouvrages par cœur. Il fut un des plus célèbres praticiens de son temps, & laissa beaucoup de richesses. Il mourut l'ancien de la Faculté, le 18 juillet 1659, & fut enterré à Saint-André-des-Arcs. On a de lui les ouvrages suivans :

1°. *Panegyris seu agôn studii parisiensis, heroico carmine designatus, & in scholis medicorum propofitus die 1. X. januarii, anni MDCLVII, à N. Morino à Castellione ad Indrum Biturigum, dum rude donatus est*. Parisius, ex typographiâ Edmândi Martini. MDCLVII. in-4°. — Ce poëme latin est dédié à la Faculté de médecine, & l'auteur fait cette apostrophe à son ouvrage :

*Incipe parve liber caus cognoscere matrem,
Et fac ad tantum ridere ille tuum.*

MÉDECINE. Tome X.

*Nem cui nascens non arvisse parentes
Hinc nec Juno culti, nec deus aliter opum.
Velle nec incultas quid sit verare, decentes
Natorum nervos mæser amica puar.*

Ce poëme bien fait, & dans lequel Morin fait l'éloge de Rainsant, de Mentel, & de Riolan, de Lecomte, de Tulloue, de Landrieu & d'Allain, est suivi d'un autre poëme que l'auteur prononça à Montpellier lorsqu'il y reçut le bonnet.

2°. *Soteria, sive poema eucharysticon ob restitutam invictiss. Galliarum regi Lâdorico XII^e sanitatem : ad illustrissimum virum D. Franciscum Guenaltum, doctorem medicum parisiensem, regis non semel sospitatorum, Nicolaum Morin, doctor medicus parisiensis*. Parisius, MDLVIII, in-4°. — Morin, après l'éloge de Louis XIV & de ses victoires, parle de la maladie dont ce prince fut attaqué à Calais, en 1658, & de la douleur des Français. Tout y est peint de main de maître. Morin parle ensuite de Valot, d'Esprit, d'Ivelin, de Daguin & de Duffandry, médecin d'Abbeville. Enfin Guenalt arrive de Paris, rassure les esprits, & change le traitement; il propose l'émétique; le Roi le prend & guérit.

— Guy-Patin parle souvent de Morin dans ses lettres, & entre autres, dans la trois cent soixante-quatrième, t. III, p. 164. (ANDRY.)

MORINGA (*Hygiène & matière médicale*.) Le moringa est un arbre des Indes orientales, qui ressemble au lentisque par sa grandeur & par ses feuilles. Il est nouveau, & peu de branches & est très-cassant. Ses fleurs sont d'une couleur verdâtre & brune, avec le goût du navet.

Cette plante donne un fruit de la grosseur d'une rave; il a un pied de longueur, est blanc, moelleux en dedans; & renferme de petites semences vertes & âcres. Ce fruit se mange crut. La racine de l'arbre est regardée comme un puissant contre-poison dans la morsure des bêtes venimeuses, & comme un remède dans les maladies contagieuses.

(MACQUANT.)

MORIQUE (*Acide*). Klaproth a donné ce nom à l'acide que l'on tire du mûrier blanc, *morus albus*, qu'il avoit voulu appeler *acide moraritique*. On le retire du morate de chaux, que contiennent certaines concrétions noirâtres, formées dans l'écorce du mûrier.

Cet acide se présente sous la forme de cristaux légèrement colorés. Il est soluble dans l'eau & dans l'alcool. Il n'est d'aucun usage en médecine. (L. J. M.)

MORISOT-DESLANDES (Pierre-Joseph) naquit à Walli en Champagne, le 2 janvier 1716. Il se présenta en licence en 1754, & soutint, le 13 novembre 1755, une thèse en faveur de l'inoculation. *Ar. Parvius variolarum inoculatus?* et conclut pour l'affirmative.

Oo

Cette thèse, dit l'auteur du *Recueil des pièces concernant l'inoculation de la petite-vérole*, est écrite avec autant d'énergie que de solidité; elle met dans un grand jour les avantages de l'inoculation; elle est digne d'être lue de tous ceux qui cherchent sincèrement à se déterminer sur ce sujet avec connoissance de cause. Deux éditions réitérées font une preuve de l'accueil qu'elle a reçu du public, & donnent lieu d'affirmer qu'elle a fait beaucoup de partisans dans cette salutaire pratique. (Voyez aussi le *Journal de Médecine*, t. IV, 1736, p. 153 & suiv., & le *Journal économique*, déc. 1755, p. 115 & suiv.)

Morisset eut le premier lieu de sa licence le 9 août 1756. Dans ces temps, le chancelier de l'Université présidoit à la distribution des lieux; il faisoit ensuite une question à celui qui avoit obtenu la première place. Thierry, chancelier de l'Université, proposa la question suivante: *An pestis sit contagiosa?* & Morisset y répondit avec beaucoup d'érudition & d'éloquence, & conclut pour l'affirmative.

Le 29 octobre suivant, il reçut le bonnet de docteur.

Le 14 novembre 1763, Morisset prononça, comme professeur de chirurgie, un discours dans lequel il prouva combien les médecins & les chirurgiens ont contribué aux progrès & à la perfection de la chirurgie.

En 1769, Morisset fut l'éditeur du *Traité des accouchemens* de Paros. C'est à lui que le public est redevable de cet excellent ouvrage, qui, sans les corrections qu'il y a faites, seroit tombé dans l'oubli. Cet ouvrage est précédé d'une dissertation de l'éditeur sur un point intéressant, relatif aux accouchemens, & suivi d'une traduction d'une dissertation latine du célèbre Grant, médecin allemand, sur la rupture de la matrice.

Morisset n'a rien publié depuis ce temps: il s'occupa entièrement de la médecine; il eut des succès brillans, acquit en peu de temps la confiance d'une quantité de malades, & fut bientôt obligé de refuser bonnement ceux qui s'adressoient à lui, dans la crainte qu'il avoit de ne pas donner assez de temps aux malades qui l'appeloient. Il se maria au bout de quelques années, & employoit à l'étude le temps qui lui restoit: sa seule récréation étoit de causer au repas avec sa famille. Il étoit humain, charitable, généreux envers les pauvres; il donnoit avec plaisir son avis aux jeunes médecins qui venoient le consulter, & a été utile à plusieurs. Il ne se démentit jamais des principes de vertu qu'il avoit puisés dès l'enfance. Il avoit une grande idée de sa profession, & répétoit souvent ce mot de Ciceron:

*Hominem ad Deos nulli in re propius accedant, quam
solum hominibus dandis.*
Cic. pro Ligario.

Morisset est mort âgé de soixante-seize ans; en 1792. Il avoit épousé N. Langlois, dont il eut une fille.

MORNE. Ce mot s'emploie ordinairement en médecine pour indiquer un caractère de tristesse ou d'accablement, qui annonce une prostration extrême ou la contention d'esprit la plus profonde, la séparation des choses extérieures, indifférence à tout ce qui peut arriver de ce côté. Les grands écrivains, les grands poètes emploient cette expression à peu près dans le même sens, comme dans ces beaux vers de Racine:

Ces superbes coursiers,
L'œil morne maintenant & la tête baissée,
Sembloient se consoler à la triste proie.

Cette même expression ne doit pas s'employer indifféremment en séméiotique, comme synonyme de *sombre*, de *triste*, de *chagrin* (*morbus*, *morosus*).

L'idée de *morne* semble toujours entraîner avec elle l'idée du découragement, de la faiblesse, ou d'un défaut d'activité ou de couleur, incompatible avec la violence des grands caractères. On a quelquefois l'air triste & la contenance *morne*: l'air d'un tyran est sombre, farouche; celui de Telcave, accablé, *morne*; enfin, on est *morne* dans le malheur & sombre dans le crime.

Le médecin doit connoître plus qu'aucun autre toutes ces nuances, toutes ces finesses de langage, sans lesquelles il seroit souvent difficile de tracer les symptômes, ou les effets des symptômes & des maladies. (L. J. M.)

MOROSE, MOROSITÉ. (*Pathologie générale, nosographie*.) On désigne sous cette dénomination, qui se trouve plus employée dans le langage du monde que dans celui des médecins, les personnes tristes ou chagrines, avec une sorte de taciturnité & de bizarrerie, qui dépend ordinairement, soit d'un caractère particulier, ou de certaines affections exclusives, & même d'un état de maladie. Plusieurs aliénés sont alternativement moroses & joyeux dans le même accès; quelques-uns présentent au contraire une disposition habituelle & constante à la morosité, que l'on doit regarder comme un caractère principal de leurs vésanies. (Voyez MÉLASCOLIE, MOROSANIE.) (L. J. M.)

MOROSITÉ. L'habitude d'être morose. Sauvages a désigné sous le nom de *morositas* ou de *bizarrie*, le deuxième ordre de ses vésanies, en donnant à cette dénomination une acception trop étendue, & en considérant, comme des maladies essentielles, différens symptômes qui se rencontrent dans un grand nombre de maladies mentales & corporelles, telles que la faim exagérée ou canine (*bulimia*), la soif excessive (*polydipsia*), l'antipathie, la panopobie ou frayeur nocturne (voyez ce mot), le satyriasis, la nymphomanie,

le tarentulisme, l'hydropobie. (Voyez ces différents mots.)

La postulage ou mélancolie helvétique mériterait seule d'être désignée sous le nom de *morfosité*. (Voyez Sauvages, tome II, édit. lat.)

La morosité purement symptomatique se rencontre dans plusieurs maladies, soit mentales, soit corporelles; elle est souvent inséparable de la vieillesse, surtout dans les cas de surdité, de certaines maladies chroniques, & principalement des affections abdominales, des digestions lentes ou laborieuses, de la tension douloureuse des hypochondres ou de l'hypogastre, du catarrhe de la vessie, des maladies du foie, d'une menstruation difficile ou laborieuse.

Toute morosité brusque accidentelle, & sensiblement opposée au caractère habituel des individus, doit être attribuée à l'une de ces influences de l'état physique ou corporel, dont la médecine pratique fait si souvent rencontrer des exemples.

On pourrait même dire qu'une morosité semblable, si elle se prolonge, après s'être manifestée avec le caractère d'une espèce d'accès ou de paroxysme, annonce une altération profonde de l'organisation, le début, l'augmentation, ou la transformation d'une maladie quelconque.

(L. J. M.)

MORPHEE. *Morphæa*. Ce mot, qui paraît avoir été employé pour la première fois au dix-huitième siècle, par Henri Étienne, indique une maladie de la peau, de l'ordre des maculations (*maculæ*) de Sauvages.

La morphee, ou *vitiligo morphæa*, est caractérisée par un affaiblissement de petites taches de la peau avec dépression, disposées en corymbe, & pouvant se manifester indistinctement sur toutes les parties du corps.

Le même nomenclature comprend dans ce genre le *vitiligo albus*, le *vitiligo leuco*, le *vitiligo melas* & le *vitiligo hepatica* (éphélide hépatique de M. Alibert). (Voyez VITILIGES, VITILIGO.)

Il paraît du reste que, dans le moyen âge, on reconnoît deux principales espèces de morphee, savoir, la morphee blanche & la morphee brune.

La morphee blanche, appelée *albugo* par Avicenne, & *alunda* par Lanfranc, a été bien décrite par plusieurs auteurs du treizième & du quatorzième siècle, mais principalement par Balescent & Guy de Chauliac. Elle se montre sur différents points de la surface de la peau, sous la forme de gouttelettes éparées & luteuses, sans aucune altération sensible au toucher; c'étoit *albugo* des Grecs, *albus*, la vitiligo blanche de Celse, qui fut quelquefois appelée *lepra de l'épiderme*, & que M. Alibert désigne comme le premier degré de la lepra squameuse.

L'histoire de la morphee blanche appartient, dans ses détails, au tableau des affections lépreuses du moyen âge. La peau étant ordinairement in-

sensible dans le lieu occupé par cette maladie, l'anesthésie étoit regardée comme un de ses principaux symptômes, & on constatoit ce symptôme par l'épreuve de l'épingle.

La morphee brune n'a pas été décrite aussi exactement que la morphee blanche: il paraîtrait qu'elle n'étoit distinguée de cette dernière que par une couleur plus sombre, une chaleur désagréable, un picotement ou des démangeaisons à la peau. C'est la *vitiligo melas* de Celse.

(L. J. M.)

MORPHINE, de *μῆψα*, forme. Apparences, fonges, rêves.

On est toujours frappé, quand on étudie l'histoire de la matière médicale, de la diversité prodigieuse d'opinions qui a régné sur chaque substance. Qu'on parcoure les sables de la science, ou ne trouvera pas de médicaments qui n'aient été le sujet de contestations plus ou moins longues, & même à l'époque où nous vivons, je ne fais si l'un en pourroit citer un seul sur les propriétés duquel les médecins soient absolument d'accord.

Si cette incertitude n'avait porté que sur des médicaments peu actifs, on du moins sur ceux dont les effets ne doivent être appréciés qu'à la longue, on auroit sans doute moins de sujets de s'étonner. Dans tous ces changements qui s'opèrent si lentement, il est bien difficile de déterminer précisément quelles étoient l'influence du traitement, & tel imputera à l'action du remède, les effets qu'un autre, avec non moins d'apparence de raison, attribuera aux seuls efforts de la nature. Mais pour ces médicaments énergiques, dont l'action presque instantanée produit dans notre organisation, sous l'œil même de l'observateur, les changements les plus manifestes, conçoit-on qu'on ait disputé si long-temps, & que, pendant deux mille ans, on ait pu rester dans le doute ?

Tel a été pourtant le sort des substances les plus énergiques, & tel a été celui de l'opium en particulier. Est-il un médicament dont il semble plus facile d'observer l'action & de constater les effets ? & pourtant en est-il un qui ait donné lieu à des assertions plus opposées ?

Vainement d'abord à l'égard par la secte des empiriques, les méthodistes le rejettent avec dédain, & Galien balance pour en permettre l'emploi dans les cas même où il ne reste plus aucune autre ressource. En vain, après la chute de cette école, les Arabes essayent de le remettre en honneur; la doctrine de Galien l'emporte, & pendant plusieurs siècles l'opium reste dans la désuétude à laquelle il l'avait condamné. Paracelse vient, & par cela seul qu'il le voit désigné, il l'adopte & le classe au premier rang. Chassé de son pays, ce fougueux médecin va prononcer par toute l'Europe & ses nouvelles idées & son nouveau remède, son laudanum dont il fait un mystère.

Van-Helmont célèbre l'opium comme un des

O o 2

plus beaux dons du créateur. Sylvius juré que sans lui il renonceroit à la médecine. Boerhaave, Dehaën, repoussent, par des expériences, les vaines théories de ceux qui veulent le proscrire, & Van-Swieten démasque leur charlatanisme en montrant l'opium dans un grand nombre de leurs remèdes secrets.

Cependant les anciennes préventions contre l'opium ne sont point encore détruites, & dans les différens pays cette substance trouve de nombreux antagonistes. A Leyde, Etmoller en condamne l'emploi dans tous les cas : il ôte la douleur, dit-il, mais s'est eu tuant & non en guérissant.

Stahl, son disciple, ne se montre pas moins passionné ; il rejette indistinctement tous les narcotiques, remèdes d'autant plus pernicieux, dit-il, que, donnant au malade comme au médecin la joie d'une fausse guérison, ils font perdre le moment favorable pour agir. Partout, dans ses ouvrages, il exprime le desir & l'espérance de les voir proscrire entièrement de la médecine, & il ne craint pas d'invoquer contre ceux qui les emploient, l'intervention de l'autorité. Cependant en Angleterre, on a de l'opium une bien autre opinion. Alison, Pringle, Mead, le vantent comme le plus efficace des remèdes. Sans lui, dit Sydenham, la médecine est *doctuse & manchotte*. Freind, en convenant des mauvais effets qui ont suivi quelquefois son administration, ne balance pas à les attribuer, dans tous les cas, à la faute du médecin.

En France, Hequet plaide la cause de l'opium avec d'autant plus de chaleur, qu'il avoit alors contre lui presque tous les médecins de Paris ; il voit en lui cette panacée universelle que l'incertitude avoit mise en problème : car, dit-il, *qu'est-ce que maladie ? trouble, fougue, emportement ; l'opium est donc le remède certain, puisqu'il en brise & en arrête les causes.*

Cependant la plupart des médecins continuent à regarder l'opium comme un médicament illusoire, dangereux même dans le soulagement, qu'il procure. Tissot, Lorry, trouvent cette opinion établie, & dans le cours d'une longue & heureuse pratique, ils parviennent non-seulement à ramener les médecins, mais encore à détruire en partie, chez les gens du monde, ces antiques préventions contre l'opium, qui s'étoient transmises d'âge en âge depuis le siècle de Galien.

Il est bien remarquable que dans toutes ces alternatives de faveur & de discrédit, ce n'est point aux effets sensibles que se font attachés les fanatiques comme les antagonistes de l'opium. Leurs raisons pour l'admettre comme pour le rejeter, ont presque toujours été fondées sur les vaines théories qu'ils lui ont appliquées. Et quelles différences dans la manière dont ils ont envisagé son action & ses effets sur l'économie animale !

Suivant Van-Helmont, l'opium est chaud de sa nature, suivant Galien, il est froid au quatrième

degré. Haller en fait un cardiaque, & Barbier un débilitant ; Sydenham, Freind, Boerhaave, le regardent comme excitant ; Brown même, va jusqu'à lui refuser toute propriété sédative, & prononce le fameux *opium me hercle non sedat* ; tandis que Hequet ne voit en lui qu'un calmant d'un effet inmanquable, quels que soient l'âge, la saison, la maladie. Suivant Geoffroy, il agit sur le sang, & suit avec Etmoller sur les esprits animaux. Quelques-uns pensent qu'il affecte directement les extrémités nerveuses ; d'autres, qu'il n'agit qu'après avoir été absorbé. Enfin, l'un ne veut reconnaître en lui qu'une action locale, tandis que l'autre fait dépendre tous ses effets de la seule modification qu'il imprime au cerveau.

Avec des idées si différenciables par la nature d'un médicament, il n'est pas étonnant que les médecins aient différencié beaucoup dans la manière de l'administrer. Aulli voit-on que l'un, pour corriger sa froideur, le combine avec des aromates, tandis que l'autre, qui craint son action débilitante, l'associe aux vins les plus gracieux ; celui-ci le fait macérer dans l'eau, celui-là le bouillir dans le lait. Le chimiste veut qu'il fermenté, & l'unit au levain, au miel, au suc, de coing ; enfin, les préparations varient, & suivant les divers systèmes particuliers, & suivant les théories générales en faveur aux différentes époques ; elles se sont ainsi multipliées à tel point, qu'il n'est pas à présent de praticien en peu connu, qui n'ait la recette particulière, qu'il emploie exclusivement, & au moyen de laquelle il espère élever à l'opium toute propriété malaisante.

Grâce à ces divers procédés, l'usage de l'opium est maintenant général en Europe, où nous le voyons donner comme le plus efficace des calmans. Si maintenant nous voulons savoir ce qu'on en pense dans le pays où on le recueille & où l'on s'en sert de temps immémorial, nous reconnaissons que l'opinion n'a jamais varié sur la nature de ses effets : partout on l'emploie comme stimulant, & l'excitation qu'il produit, remplace, pour les Orientaux, celle que en Occident nous obtenons des liqueurs alcooliques.

Par l'usage de l'opium, le Musulman recouvre pour quelques instans les forces qu'il a perdues ; il oublie ses peines, il devient accessible à la gaieté, ses forces sont accrues & son courage augmenté.

A ce premier degré, les effets de l'opium ne présentent rien que de doux & d'agréable, mais bientôt ils augmentent d'intensité, & semblent changer de nature ; la gaieté, qu'ils ont provoquée, va jusqu'à la soûle, l'audace souvent devient fureur.

Un état si violent ne peut être de longue durée, & bientôt l'économie animale, épuisée par cet effort, retombe dans l'anéantissement le plus profond. La loquacité a disparu pour faire place à un silence morose ; à ces bruyans éclats de gaieté, succède une stupidité morne ; au lieu de cet homme si fier, si audacieux, on ne trouve plus qu'un être

triste, souffrant, pusillanime, & qui semble avoir acheté bien cher ce bonheur dont il a joui si peu de temps.

Comme les changemens opérés par l'opium sont plus grands que ceux qui sont produits par les liqueurs fermentées, les traces qu'ils laissent dans l'économie sont aussi plus profondes, & ne se bornent pas, comme pour ceux-ci, aux premiers momens qui suivent l'ivresse. Une pâleur habituelle, un air triste & stupide, & souvent une espèce de rachitisme qui leur est particulier, rendent faciles à reconnoître les hommes qui en font abus; leur intelligence s'affoiblit de plus en plus, & leur esprit devient si languissant, qu'ils n'osent plus se montrer qu'après avoir pris de l'opium. Cette vieillesse anticipée, pleine de douleurs & d'infirmités, ne leur permet guère d'atteindre à un âge avancé, & l'on en voit très-peu vivre au-delà de cinquante ans.

Au reste, si leur vie est plus bornée que celle des autres hommes, elle est d'un autre côté moins exposée, & n'est un fait qui semble bien constaté, que les maladies pécuniaires qui désolent si souvent ces contrées, épargnent presque toujours les terribles. C'est ainsi qu'on nomme ceux qui font abus de l'opium.

On a vu quelques-uns en Europe l'opium produire les mêmes effets qu'en Orient. Ainsi Van Swieten raconte que pour en avoir pris un seul grain, il passa la nuit entière sans dormir, & dans un état parfait de béatitude. Cependant il faut avouer que dans presque tous les cas où les phénomènes d'excitation ont paru, ils se sont manifestés d'une manière peu agréable & souvent peu utile pour le malade.

C'étoit en parlant d'effets de cette nature, que triomphoient les antagonistes de l'opium, & les plus zélés partisans, quelque aveuglés qu'ils fussent par la passion, ne pouvoient s'empêcher de remarquer parfois dans leur pratique quelques-uns de ces phénomènes si différens de ceux qu'ils annoncoient : témoin chaque jour des bons effets de ce médicament, & pourtant ne pouvant se dissimuler la vérité des faits qu'on leur opposoit, ils furent conduits à soupçonner que l'action de l'opium n'étoit point nulle. Ce point une fois reconnu, il étoit naturel qu'il cherchassent à y remédier; mais alors, privés de moyens d'analyse, ils ne pouvoient marcher qu'en tâtonnant. On devoit donc se attendre à voir leurs efforts couronnés par le succès.

A cette époque, deux propriétés différentes, opposées même dans un médicament, ne faisoient point naître l'idée de deux substances distinctes; aussi, d'abord on s'imagina point, pour remédier aux mauvais effets de l'opium, de le priver de quelques-uns de ses élémens, mais de tempérer son action par des *correctifs*. Ces premières tentatives ne donnèrent aucun résultat satisfaisant.

Cependant son odeur vireuse avoit frappé, &

sans trop savoir pourquoi, on desira l'en dépouiller. On y parvint après quelques tentatives, mais on obtint en même temps un résultat qu'on n'avoit point cherché, & qu'on ignora même encore long-temps après. Dans les manipulations auxquelles on le soumettoit, on lui enlevait une partie de ses élémens, & on le dépouillait ainsi plus ou moins complètement de son principe excitant. L'opium préparé de cette manière avoit donc réellement un grand avantage sur l'opium brut; mais comme on n'en connoissoit pas la raison, on ne s'en tint pas là, on le travailla encore en mille manières, & l'on ne parvint à rien faire de mieux jusqu'au temps où la chimie put veuve éclairer ces recherches.

On avoit plusieurs fois cherché à connoître quels étoient les principaux élémens. Neuman, Wedelius, Hoffmann & Tralles, avoient parlé d'un sel bien cristallisé, qu'ils obtenoient de l'opium. Le dernier de ces auteurs assuroit que ce sel étoit acide, & qu'il faisoit effervescence avec les carbonates alcalins. Tous encore faisoient mention d'une espèce de graisse qu'on trouvoit constamment, mais qu'ils croyoient introduite par la sophistication.

Banmé, en préparant l'extract gommeux par la longue digestion, procéda d'abord à la connoissance d'un chimiste Homberg, fit de l'opium une analyse plus exacte; il y reconnut une matière extractive gommeuse, une résine, un sel essentiel terreux, tantôt aiguillé, tantôt micacé, une huile & une ténacité.

Voici les proportions qu'il assigna à ces diverses substances :

Fécule & débris de végétaux.....	265
Résine qui se précipite pendant la digestion.....	188
Extract gommeux à la consistance ordinaire.....	482
Sel essentiel.....	2
Huile essentielle & matières volatiles qui disparaissent pendant la digestion.....	65

1000

En 1803, M. Derofne entreprit de nouvelles recherches sur l'opium. Quoique ses procédés différaient en plusieurs points de ceux de Banmé, il y reconnut les mêmes élémens & dans des proportions semblables, à l'exception toutefois du sel essentiel, dont il trouva quarante parties où Banmé n'en avoit reconnu que deux. Le Mémoire qu'il publia à ce sujet, contient des recherches fort intéressantes sur la nature & les propriétés de ce sel. Tout en lui donnant ce nom, M. Derofne reconnoît qu'il n'a d'autres caractères salins que la faculté de cristalliser, & ne se sert de ce mot que pour éviter les circonlocutions. Il pense que la manière dont il se conduit dans diverses circonstances où on le place, doit le faire regarder comme une

substance particulière & un nouveau principe immédiat des végétaux.

M. Derosne ayant donné cette substance en poudre, à la dose de quarante-quatre grammes, à plusieurs chiens, observa des vertiges, des convulsions, des vomissemens. Il pensa que cette substance si énergique étoit la seule cause de l'action médicamenteuse de l'opium. On a lieu de s'étonner qu'il ait une telle idée, puisqu'il reconnoît que l'extrait aqueux, qui est la préparation dont on se sert avec le plus d'avantage, est toujours dépourvu plus ou moins de ce principe, & produit d'ailleurs des effets tout différens.

Un an après la publication de ce travail, M. Seguin lut à l'Institut un Mémoire qui n'a été imprimé que long-temps après (en 1814) ; il signaloit dans l'opium cinq substances fort différentes : 1°. de l'acide acétique ; 2°. une matière cristalline non encore observée ; 3°. un acide nouveau qui jouit de propriétés particulières ; 4°. une matière insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, les acides, les alcalis ; 5°. une substance soluble dans l'eau & dans l'alcool, qui n'est précipitée par aucun résidu.

A peu près à la même époque, un jeune pharmacien de Hanovre, M. Sertuerner, s'étant aussi occupé de la composition de l'opium, obtint des résultats qui, très-différens de ceux de M. Derosne, se rapprochent sous plusieurs points de ceux de M. Seguin. Il reconnut comme celui-ci la présence d'un nouvel acide, qu'il nomma *acide méconique* ; il décrit d'ailleurs, avec beaucoup de soin, une substance que M. Seguin n'avoit fait qu'entrevoir, & qu'il désigna par le nom de *morphine*. Cette substance, qu'il annonçoit comme une base alcaline végétale, eût dû dès-lors attirer l'attention des chimistes, puisqu'on ne connoissoit encore rien de semblable ; cependant ce travail fit peu de sensation, & quelques personnes même ayant entrepris de répéter ces expériences, ne parvinrent pas à obtenir les résultats qui avoient été annoncés. M. Sertuerner, bien convaincu de leur exactitude, recommença à opérer sur des quantités plus considérables d'opium ; il confirma presque tout ce qu'il avoit d'abord avancé, & découvrit encore plusieurs propriétés nouvelles. Cette seconde partie de son travail n'eut pas le sort de la première, elle fut connue de toute l'Europe, & excita un intérêt général. M. Robiquet, qui s'occupait de vérifier ces résultats, confirma tout ce qui avoit rapport à la morphine ; il rectifia quelques erreurs relativement à l'acide méconique, & enfin arriva à la voir que la substance observée & décrite par M. Derosne n'étoit point un méconate de morphine, comme l'avoit cru M. Sertuerner ; il la désigna sous le nom de *narcotine*, & y reconnoît toutes les propriétés que M. Derosne avoit annoncées.

M. Robiquet, outre l'acide méconique, trouva

dans l'opium un autre acide dont il traça les principaux caractères.

D'après les travaux de ces derniers pharmaciens, on doit considérer l'opium comme composé : 1°. d'une huile fixe ; 2°. d'une matière analogue au caoutchouc ; 3°. d'une substance végétale animale qui n'a pas encore été étudiée ; 4°. de mucilage ; 5°. de fécule ; 6°. de résine ; 7°. de débris de fibres végétales ; 8°. de narcotine ; 9°. d'acide méconique ; 10°. de l'acide découvert par M. Robiquet ; 11°. de morphine.

Ce n'est pas ici le lieu de décrire les propriétés de ces diverses substances ; la dernière seule doit nous occuper.

Préparation.

Pour l'obtenir, M. Robiquet emploie la méthode suivante : il fait bouillir une dissolution très-concentrée d'opium, avec une petite quantité du magnésie (dix grains par livre d'opium) ; il soutient l'ébullition pendant un quart d'heure ; il se forme un dépôt grisâtre assez abondant, qu'il filtre & lave à l'eau froide ; il traite le précipité bien lavé par l'alcool faible, qu'il laisse quelque temps macérer à chaud, sans porter à l'ébullition ; il culève ainsi très-peu de morphine & beaucoup de matière colorante ; il filtre & lave avec un peu d'alcool froid ; le dépôt est ensuite repris par une plus grande quantité d'alcool rectifié, qu'il pousse jusqu'à l'ébullition bien soutenue, & filtre de nouveau la liqueur encore bouillante, & par le refroidissement il obtient la morphine, qu'il dépouille de la matière colorante par plusieurs cristallisations.

Propriétés.

La morphine pure est solide, incolore, inodore, plus pesante que l'eau, cristallisable, transparente. Chauffée dans des vaisseaux clos, elle ne donne point de carbonate d'ammoniaque ; soluble en très-faible proportion dans l'eau bouillante ; très-soluble, surtout à l'aide de la chaleur, dans l'alcool & dans l'éther, se déposant en partie par le refroidissement. Ses dissolutions sont d'une saveur très-amère ; elles rougissent le papier de curcuma & surtout celui du rhubarbe, verdissent le sirop de violettes, & ramènent au bleu le papier du tournesol rougi par les acides.

La morphine, en se combinant avec les acides, forme différens sels, dont trois seulement nous occuperont, parce qu'ils sont les seuls qu'on ait employés jusqu'ici en médecine. Ces sels sont : l'acétate, le sulfate & l'hydrochlorate de morphine.

Acétate de morphine.

On le forme directement en saturant la morphine avec un léger excès d'acide acétique affaibli, & en faisant évaporer avec précaution pour chasser

l'excès d'acide; on concentre la dissolution jusqu'à consistance de sirop, & on achève à l'étuve la dessiccation du sel, qui, selon M. Serturner, cristallise en petits rayons & est très-soluble.

Le sulfato de morphine s'obtient aussi directement & cristallise en ramifications.

L'hydrochlorate de morphine s'obtient plus difficilement, parce que l'acide agit plus lentement. C'est le plus soluble de tous les sels de morphine. Si on pousse l'évaporation trop loin, il se prend, par le refroidissement, en une masse brillante d'un blanc argenté. M. Thomson vient de publier (*Annal. of Philosophy*, juin 1820) la composition élémentaire de la morphine, & de faire connoître en même temps une méthode qui lui parait facile, pour se procurer cette base à l'état de pureté. Il précipite une infusion forte d'opium, par l'ammoniaque caustique; sépare, au moyen du filtre, le précipité blanc-brunâtre qui se forme, évapore l'infusion au sixième de son volume & y mêle une nouvelle quantité d'ammoniaque; il obtient par-là un nouveau précipité de morphine pure; il la laisse se former le dépôt qu'il reçoit sur un filtre, & la lave à l'eau froide: lorsqu'il est bien égoutté, il l'aspérge avec un peu d'alcool & laisse passer le liquide alcoolique à travers le filtre. Ce fluide enlève une grande partie de la matière colorante & aussi un peu de morphine. Il dissout ensuite la morphine dans l'acide acétique, & afin de décolorer la dissolution, il la traite avec un peu de noir d'ivoire. Le mélange est fréquemment agité pendant vingt-quatre heures, & il est ensuite jeté sur un filtre. Le liquide passe dans le vase tout-à-fait décoloré; il le traite alors par l'ammoniaque, & la morphine se dissout sous la forme d'une poudre blanche. Si alors on dissout cette base dans l'alcool & qu'on la laisse évaporer spontanément la dissolution, la morphine cristallise sous forme de beaux cristaux réguliers.

M. Thomson annonce que ces cristaux sont d'un blanc parfait, d'une transparence légèrement opaline, tout-à-fait privés d'odeur, mais d'une faveur très-amère & représentant des prismes rhomboidaux à quatre pans.

Un grain de morphine pure, chauffée au rouge, dans un tube rempli de peroxide de cuivre, ne donne que de l'eau & de l'acide carbonique. La quantité d'eau obtenue, dans quatre expériences différentes, a toujours été de 0,5 gr. Celle de gaz acide carbonique s'élevait à 3,58 pouces cubiques, supposant le baromètre à 30 pouces & le thermomètre à 60° F.

Maintenant 0,5 gr. d'eau contiennent..... 0,055 gr. d'hydr.
3,58 pouc. cub. de gaz ac. car. 0,458 gr. carb.

Total..... 0,563

Ce qui fait un déficit de..... 0,097 gr.

Sur le poids original de morphine..... 1,000 gr.
que l'on trouve soumis à l'expérience. Cette

perte se retrouve en l'attribuant à une quantité égale d'oxygène contenue dans la morphine.

Il suit de-là que les principes constitutifs de la morphine peuvent être représentés ainsi qu'il suit :

Hydrogène.....	0,055
Carbone.....	0,458
Oxygène.....	0,497

Total..... 1,000

Maintenant, si on change les poids en volumes, ou a les rapports suivans :

18 volumes d'hydrogène,
24 carbone,
10 d'oxygène,

ce qui équivaut à

18 atomes d'hydrogène. =	2,25...	5,59
24 de carbone.. =	18,00...	44,72
20 d'oxygène... =	20,00...	49,69

40,25... 100,00

Si les résultats des analyses précédentes sont exacts, le poids d'une molécule intégrante de morphine doit être de 40,25.

On apercevra facilement que cette substance peut être considérée comme composée de la moitié seulement du nombre précédent d'atomes, ou de

9 atomes d'hydrogène. =	1,125
12 de carbone.. =	9,000
10 d'oxygène... =	10,000

20,125

D'après cette supposition, le nombre équivalent de l'atome serait seulement de 20,125: peut-être cette dernière estimation est-elle plus correcte; mais les analyses des sels de morphine, publiées par MM. Robiquet, Pelletier & Caventou, donnent un nombre équivalent pour la morphine, qui n'est pas au-dessus de quarante. C'est ce qui a porté M. Thomson à considérer cette base comme un composé de 62 atomes, plutôt que 31, quoiqu'on ou l'autre de ces nombres soient également indiqués par ces analyses.

Action de la morphine sur l'économie animale.

Les effets de la morphine sur l'économie animale, quelque faciles qu'ils soient à observer, l'ont été pourtant d'abord assez mal, & les premiers qui s'en sont occupés ne se font point généralement accordés sur l'opinion qu'il en falloit avoir, tandis que les uns l'annonçaient comme une substance, extrêmement active, qu'on n devoit donner qu'à très-petites doses & avec les plus grandes précautions; les autres soutenaient qu'elle n'avait qu'une action très-foible & qu'on pouvoit la donner impunément à doses bien plus fortes que l'opium. Cette discordance d'opinions vient sans

droite de ce qu'on n'a point tenu compte de la nature de l'excipient & de l'influence qu'il exerce pour la production des effets. La morphine étant, comme nous l'avons dit, très-peu soluble dans l'eau, & ceux qui l'ont administrée avec un véhicule aqueux, n'ont pas dû observer d'action bien sensible, tandis que ceux qui la donnoient avec les acides, voyoient se produire tous les effets & étoient à portée de les bien apprécier.

La morphine portée pure & sans excipient dans l'estomac, se dissout lentement dans les sucs qui s'y trouvent, & produit son effet à mesure qu'elle est absorbée. On conçoit que son action, dans ce cas, doit être bien moins tranchée que si, au moment même de l'ingestion, la substance toute entière se trouvoit dans les circonstances nécessaires à l'exercice de l'absorption.

M. Sertuerner ayant pris en trois fois, dans moins d'une heure, un grain & demi de morphine, éprouva bientôt les symptômes d'un véritable empoisonnement. Il imagina, pour y remédier, d'avalier six à huit onces de vinaigre, qui le firent vomir violemment & à plusieurs reprises. A partir de ce moment, les phénomènes d'empoisonnement cessèrent d'augmenter d'intensité, & bientôt décroissant progressivement, ils finirent par disparaître entièrement. M. Sertuerner conclut de ce fait, un peu légèrement, peut-être, que le vinaigre étoit l'antidote de la morphine. Cette opinion, qu'il avoit émise en passant, fut adoptée par un M. Ridolphi, qui, voulant y joindre quelque chose de sien, avança (*Journal de Brugnotelli*, décembre 1817) qu'on pouvoit faire avaler à des animaux des combinaisons de morphine & d'acide acétique nitrique ou hydrochlorique, sans qu'il en résultât pour eux aucun inconvénient. De pareilles assertions, qui ne sont le résultat d'aucune expérience, mais qui sont bien évidemment des spéculations de cabinet, ne valent pas la peine qu'on les réfute. Il n'en est pas de même de l'opinion de M. Sertuerner; elle s'appuie sur un fait bien constant & demande à être discutée.

Il faut observer d'abord, que de toute la morphine qui avoit été avalée, la première partie seulement, dissoute dans l'alcool, étoit dans les conditions nécessaires pour pouvoir être absorbée, & qu'elle seule produisoit ces effets généraux que M. Sertuerner observoit avec tant d'inquiétude. Quand il eut avalé le vinaigre, les deux dernières parties qui n'avoient point encore été attaquées, furent dissoutes subitement, & agissant toutes alors à la fois sur les parois de l'estomac, elles déterminèrent le vomissement par une action locale, analogue sans doute à celle qu'exercent les acides concentrés.

Par l'effet du vomissement, les deux derniers tiers de la morphine furent rejetés, & peut-être en même temps une grande partie du premier. Il n'y eut donc réellement à agir que la petite quantité qui avoit déjà été absorbée, & les effets qui

avoient été d'abord produits durent bientôt, la cause ne pouvant plus s'en renouveler, diminuer d'intensité & disparaître enfin entièrement.

Il est donc vrai de dire, quelque paradoxal que cela puisse paraître d'abord, que si, dans cette circonstance, le vinaigre a produit d'heureux effets, ce n'a pas été en diminuant l'activité du poison, mais bien en l'augmentant & excitant ainsi le vomissement d'une manière plus efficace.

Les sels de morphine étant plus ou moins solubles dans l'eau, sont d'un usage bien plus facile que la morphine pure : aussi sont-ils bien plus souvent employés. Jusqu'ici on ne s'est servi que de trois de ces sels; je crois les avoir déjà indiqués : ce sont l'acétate, le sulfate & l'hydrochlorate de morphine.

Des expériences nombreuses, variées de toutes les manières sur les animaux d'espèces différentes, m'ayant convaincu que ces sels, administrés à dose convenable, procuroient un sommeil profond & exempt des inconvénients qui accompagnent le sommeil produit par l'opium, je dus songer à substituer l'une à l'autre dans le traitement des maladies. Voici le compte que je rends de mes premiers essais, en janvier 1818.

Note sur l'emploi de quelques sels de morphine comme médicaments.

Si, dans la plupart des cas, le médecin doit être très-réservé quand il s'agit d'essayer sur un malade un médicament nouveau, il exile aussi des circonstances où le malade & le médecin sont également intéressés à faire de semblables essais.

Quel praticien n'a pas rencontré, dans la classe aisée de la société, de ces êtres malheureux, donés d'une imagination active, d'un esprit cultivé, & atteints d'une maladie chronique qui les mène à la mort par des progrès à peine sensibles? Pendant les premières années de leur mal, leur confiance se place successivement dans plusieurs médecins, qui tentent chacun des moyens différents de traitement. L'inefficacité des remèdes fait encore choisir d'autres médecins, dont les conseils n'ont pas plus de succès. Plusieurs années s'écoulent de cette manière, & la maladie n'en continue pas moins sa marche progressive. Les malades rebutés se livrent aux charlatans, qui ne manquent pas de promettre une prompt guérison, & qui, après avoir échoué, sont chassés comme ils auroient dû l'être avant d'avoir agi. Viennent ensuite les remèdes de famille, les recettes, les pratiques magnétiques, les plaques aimantées, &c. Enfin, les malades tourmentés par les douleurs aiguës & autres accidents graves qui accompagnent l'accroissement de leur maladie, en reviennent à prendre les avis d'un médecin.

C'est alors que la conduite de celui-ci est difficile! Quel traitement mettra-t-il en usage? Toute espèce de moyens hygiéniques, d'eaux minérales, de

de médicaments, de préparations pharmaceutiques, ont été déjà employés sans succès & on perdit toute confiance de la part du malade; cependant il faut calmer les accidents qu'il éprouve, ou du moins tenter de le faire; il faut s'emparer de son esprit & fixer, s'il est possible, son imagination, dont les écarts font presque aussi douloureux que le mal lui-même.

Ne sera-t-on pas heureux d'avoir à essayer sur un tel malade une substance dont on puisse raisonnablement attendre quelques bons effets?

Telle est la position où je me suis trouvé l'année dernière, pour une demoiselle âgée de vingt-quatre ans, & atteinte depuis dix ans d'une maladie que je crois être un anévrysme de l'aorte pectorale.

Traînée tour à tour par des médecins instruits & par d'autres qui devoient l'être, par des commères, des charlatans, des pharmaciens, des magistriciens, & des herboristes; &c., elle a, rigoureusement parlant, épuisé toutes les ressources de l'art & de l'empirisme, & qui pis est, il n'en est aucune sur laquelle son opinion ne soit arrêtée, & qu'elle ne regarde comme insignifiante ou qu'insoluble.

Cependant, cette demoiselle étoit tourmentée par des insomnies continuelles, des douleurs extrêmement vives dans la région du diaphragme & dans les membres inférieurs, qui font en partie atrophiés.

J'employai d'abord l'acide prussique avec quelque avantage, mais je fus obligé de le cesser après environ six semaines, parce qu'il occasionnoit des rêves pénibles & fatigans.

Je me décidai alors à essayer ses sels de morphine, que les expériences sur les animaux m'avoient fait connaître comme puissans narcotiques; je fis préparer chez M. Planché, pharmacien, quatre pilules contenant chacune un quart de grain d'acétate de morphine, avec quantité suffisante d'excipient. Je conseillai d'en prendre une le soir en se mettant au lit, & une seconde le matin, au moment de son lever.

Dès le soir elle prit une pilule en se couchant; mais n'éprouvant pas de sommeil sensible, au bout d'une demi-heure, elle crut pouvoir en prendre une seconde. Quelques minutes après l'avoir avalée, elle s'endormit profondément, ce qui ne lui étoit pas arrivé depuis plusieurs mois. Son sommeil fut paisible pendant trois ou quatre heures; vers le milieu de la nuit elle se réveilla, se plaignant d'avoir des nausées, mais se rendormit aussitôt. La même chose arriva plusieurs fois. Vers les six heures, elle fit quelques efforts de vomissement & rejeta une petite quantité de mucus & de bile; elle ne dormit plus, mais elle resta plongée dans un état de calme & de bien-être qu'elle n'avoit pas encore éprouvé. J'omets de dire qu'elle ne ressentit aucune douleur pendant la nuit.

Je la vis dans la matinée; elle étoit, ainsi que

ses parents, dans une satisfaction fort grande du sommeil & du calme de la nuit, & de l'état paisible qui devoit encore.

Toutefois je ne me mépris pas sur les effets du sel de morphine. Il étoit évident que la dose en avoit été poussée trop loin, & que la malade avoit éprouvé un véritable narcotisme; mais je reconnus en même temps, qu'on pourroit retirer de bons effets de cette substance, en graduant la quantité, d'une manière convenable.

En conséquence, je fis faire des pilules où entroit seulement : de grain d'acétate de morphine, & je recommandai d'en prendre tout au plus deux à vingt-quatre heures. De cette manière l'obtention des effets sédatifs tels que je pouvois les désirer.

La malade fit usage de ces pilules depuis six mois, & toujours avec avantage; elle en déterminait elle-même maintenant le nombre, d'après les effets produits; & ce qui pourra paraître remarquable, c'est qu'elle n'en voit pas l'action s'affaiblir aujourd'hui même, elle n'en pourroit pas prendre au-delà de quatre ou vingt-quatre heures, sans éprouver quelque inconvénient, tels qu'une céphalalgie violente ou des nausées.

J'ai essayé sur cette même personne de remplacer l'acétate de morphine, dont je viens de parler, par le muriate à la même base; mais je n'ai pas eu à me louer de cet essai, car il a fallu jusqu'à un grain & demi de ce sel pour produire un effet narcotique, encore étoit-il très-imparfait; aussi la malade n'a-t-elle pas voulu en continuer l'usage.

Le sulfate de morphine, que j'ai aussi essayé sur la même personne, a une action plus faible que l'acétate, mais beaucoup plus forte que celle du muriate; sa puissance narcotique est aussi plus complète. Le sommeil qu'il procure est plus exempt de rêves; en un mot, sa manière d'agir se rapproche de celle de l'acétate, bien évidemment moins énergique.

La malade continue d'en faire usage depuis plus de quatre mois, conjointement avec les pilules d'acétate. Elle nomme celles-ci les pilules fortes; & celles de sulfate les pilules faibles. Les unes & les autres continuent, comme je l'ai dit plus haut, chacune un huitième de grain de ce sel & quantité suffisante d'excipient; selon qu'elle souffre plus ou moins, qu'elle a plus de peine à s'endormir, elle prend les pilules fortes ou les faibles, & quelquefois elle en combine l'usage.

Il y a environ trois semaines que la malade, pressée par ce désir de changer de remède, qui s'observe si fréquemment dans le cours des maladies chroniques, me pria de lui donner d'autres pilules. Je lui proposai l'extrait gommeux d'opium, dont j'aurais été bien aise de comparer les effets avec ceux des sels de morphine. Mais elle s'y refusa formellement, m'assurant, ce qu'elle m'avoit déjà dit plusieurs fois, que les préparations d'opium lui avoient toujours été nuisibles & ne lui

avoient procuré aucun soulagement. Soupçonnant que son imagination pouvoit l'avoir trompée à cet égard, je lui proposai le sel essentiel de Berofne, sans lui dire que ce fût une substance opiacée. Elle consentit à en faire usage; mais je pus me convaincre qu'elle avoit dit vrai relativement à l'opium, car un demi-grain de sel essentiel, qu'elle prit en quatre pilules, dans le courant de vingt-quatre heures, excita une agitation extrême & une céphalalgie des plus intenses; la malade put le parti de revenir aux pilules de morphine; & le continue dans ce moment.

Avant acquis ces données sur les propriétés des fels de morphine, je les ai employés en diverses autres occasions avec un avantage marqué. J'ai pu constater aussi les différences indiquées dans le mode & l'intensité de leur action. Je citerai entr'autres une dame qui est atteinte d'un squirrhe à la mamelle droite, & qui a le bon esprit de se refuser à toute espèce d'opérations: elle prend depuis deux mois un quart de grain d'acétate de morphine par jour, & ne fait d'ailleurs aucun autre remède. Les douleurs lancinantes tris-rives & très-fréquentes qu'elle éprouvoit se sont calmées en grande partie, & ne se montrent plus qu'à des intervalles assez longs.

Je pense donc que l'acétate & le sulfate de morphine peuvent être employés avec avantage comme médicamenteux. (MAGENDIE.)

MORPION, f. m. C'est le nom vulgaire de la variété pustulaire du pou qui s'attache au pubis, où son développement & sa nutrition paroissent être favorisés par une malpropreté extrême, ou par une cause quelconque d'irritation, qui change le mode de perspiration de cette partie. (Voyez, pour plus de détails, le mot *Pou*.) (L. J. M.)

MORSURE, f. f. Mot à mot, le résultat de l'action de mordre. On désigne sous ce nom les différentes espèces de plaies qui ont été faites par les animaux venimeux ou non venimeux.

Les morsures font simples & diffèrent peu des autres plaies contuses, lorsque l'animal qui les a faites n'est point irrité, qu'il est dans l'état sain, & qu'il n'a point versé dans la plaie un virus particulier, que l'on désigne le plus ordinairement sous le nom de *venin* ou de *poison animal*. (Voyez *Morsure* dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.)

Les morsures compliquées, ou plutôt les morsures qui sont faites par les animaux enragés ou venimeux, sont rangées avec raison parmi les maladies les plus graves & les plus dangereuses.

Dans le premier cas, & lorsque la morsure est faite par des animaux enragés, le virus qui se trouve versé dans la plaie, & dont l'effet occasionne un véritable empoisonnement, est accidentellement formé par l'influence d'une irritation morbide, qui change le mode de sécrétion de la

saive, au point de lui imprimer des qualités venimeuses. (Voyez *HYDROPHOBIE*, *RAGE*.)

Dans les autres circonstances, le poison que l'animal verse dans la plaie ne se trouve point ainsi formé par une irritation accidentelle & morbide, mais par une sécrétion habituelle ou régulière, dont le produit est ordinairement renfermé dans un réservoir particulier.

La vipère dans nos climats, & plusieurs serpents dans différentes contrées de l'Amérique, possèdent cette singulière propriété, de former & d'avoir toujours en réserve un venin pour attaquer ou pour se défendre. (Voyez *SARPE*, *VIPÈRE*.) (L. J. M.)

MORT (*Histoire naturelle & physiologique*), f. f. *Mors*. Fin, cessation de la vie ou des propriétés qui la caractérisent, dont elle est le dernier terme, ou la dernière nuance, suivant Buffon.

CHAP. I^{er}. Considérations générales.

Il y a deux grandes classes d'êtres ou de corps; les uns non vivans, dits *inorganiques*; les autres vivans ou *organisés*. La durée des premiers n'a point de bornes que l'on puisse assigner. Résultats des aggregations chimiques, ces corps persistent dans le même état aussi long-temps que de nouvelles attractions ne viennent pas combiner autrement leurs élémens, ou que des agens mécaniques n'en séparent point les parties.

Au contraire, aucun des végétaux & des animaux, en un mot des corps vivans que nous voyons, ne peut compter au-delà d'un certain nombre d'années d'existence, & la mort les dévorera tous avant qu'un même nombre d'années se soit écoulé. Si leurs générations ne succédoient à leurs générations, bientôt tous les signes de la vie disparaîtroient de dessus la terre; mais les espèces sont éternelles; c'est une des lois de la nature qui a voulu que tout ce qui vit mourût, mais auparavant se reproduisit. Les espèces fossiles dont on observe plus d'individus vivans, n'y sont pas d'exception réelle.

On ne jette point l'ancre dans le fleuve de la vie; il emporte avec la même rapidité celui qui lutte contre son cours & celui qui s'y abandonne (1).

Unus interitus est hominis, & jumentorum, & argus utriusque conditio: sicut moritur homo, sic & illa moriuntur: similiter spirant omnes, & nihil habet homo jumento amplius. Telles sont les pro-

(1) Bernardin de Saint Pierre, *Étude de la nature*: ouvrage qui peut être un dessein pour se trouver cité dans un Dictionnaire de médecine, & par un auteur qui s'est consacré à des études rigoureuses & à des connaissances positives. (L. J. M.)

pres paroles de l'Ecriture (*Ecclesiastique*, chap. III, vers. 19) ; elles sont dignes d'être recueillies par la philosophie, car elles sont conformes à l'observation ou à ce qui tombe sous les sens. C'est aussi que nous devons envisager la mort ; considérée autrement, elle cesseroit d'être du domaine de la médecine.

On attribue aux Anciens d'avoir dit que la vie est la mère de la mort, & que la mort, à son tour, éplante & étend la vie. Cette ingénieuse métaphore doit s'entendre des principes matériels continuellement employés à la nourriture de nouvelles créations ou à des corps vivans. Ainsi l'animal se nourrit des animaux ou des plantes, les plantes s'accroissent de l'humus, qui n'est autre chose que les débris décomposés & jetés à la surface du globe, de plantes & d'animaux qui ont cessé de vivre ; ainsi, par la putréfaction, des principes se dispersent dans les airs, entrent dans de nouvelles combinaisons ; & vont ensuite nourrir pareillement d'autres animaux & d'autres végétaux. C'est là la métamorphose de la matière, qui passe successivement d'un état, d'une transformation à une autre, de la vie à la mort, & de la mort à la vie ; c'est le cercle d'éternel mouvement, dans lequel il n'y a de mort que pour les individus.

Malgré je dois énoncer ces choses, je ne dois pas m'y arrêter : mon objet est l'histoire de la mort de l'homme. Avant de montrer celui-ci à son dernier moment, perdant sans retour la pensée, le sentiment, le mouvement, la chaleur, l'exercice de toutes ses fonctions, tous les attributs, tous les caractères de la vie, il faut distinguer la mort finie de la mort anticipée. La première, & souvent la seconde, sont appelées *naturelles*. Mais la mort, qu'elle soit dite *naturelle*, *subite*, *violente*, ou qu'elle soit amenée plus ou moins lentement par une maladie, doit toujours être considérée comme un résultat des lois de l'organisme ; seulement rien ne la précipite, lorsqu'à proprement parler elle est finie.

CHAP. II. De la mort finie.

§. 1. Age auquel arrive la mort finie.

Il n'est donné qu'à un très-petit nombre d'hommes de parvenir au bout de la carrière physiologique, c'est-à-dire, de vivre aussi long-temps que peut le permettre leur constitution, sans maladie ou accident qui rapproche l'époque de la mort de celle de la naissance : une grande vieillesse est même un phénomène très-rare ; car sur un million d'individus qui naissent en France, il n'y en a que 15, 175 qui atteignent 84 ans, & 207 qui aillent jusqu'à 100 ans ; ce qui fait, terme approché, des premiers, à pour 66, & des seconds, 1 pour 4375.

Encore, dans cette proportion, il y en a beaucoup qui succombent à toute autre cause qu'à

celle des ans. Parmi ceux chez lesquels la mort arrive, on ne paroit arriver que par cette seule cause, le plus grand nombre d'achève pas la révolution féculaire. Il en est même qui, avec l'apparence d'une bonne constitution, meurent de décrépidité dès leur quarante-quinzième année. Quoi qu'en disent certaines personnes peu au fait de la vraie physique, & qui croient que ce monde vieillit à la longue & se détériore comme chacun de nous, la durée de la vie paroit avoir toujours été communément estimée de 70 à 80 ans ; les exemples de longue vie que Plin producit comme très-extraordinaires, ne seroient pas davantage aujourd'hui, & l'histoire atteste que Platon, qui mourut, il y a plus de vingt-un siècles, le jour même qu'il eut 81 ans, étoit regardé comme un vieillard favorisé des dieux.

Si l'on cite des hommes qui ont vécu 120, 130, 140, 150 & même 160 ans, on peut en citer d'autres dont la vieillesse précoce s'est éteinte à un âge où à peine l'homme est ordinairement dans sa force & dans sa vigueur. Pour n'en rapporter qu'un exemple, le nom Nicolas Firy, connu sous le nom de *Bébé*, étoit déjà un vieillard ; dès la vingt-deuxième année. Cinq luthiers, lisait-on sur son épitaphe, furent au besoin pour lui : au essai, il mourut avec tous les signes de la caducité la plus avancée, à 24 ans. J'ajouterai à cela que j'ai vu & touché plusieurs fois, dans le cabinet d'anatomie comparée de Paris, le squelette de ce naif, & que, outre les traces de rachitisme qu'il offre, j'ai reconnu dans la plupart des pièces de ce squelette, & particulièrement dans les os des membres & des mâchoires, les courbures, les saillies & d'autres caractères que l'on remarque dans les os des vieillards très-avancés en âge. On a négligé de consigner les exemples plus ou moins analogues de *brusquitude* dans les archives de l'observation ; mais ils sont constants. Il y a dans la société plus de jeunes vieillards qu'un ne pense. P. J. G. Cabanis dit avoir eu l'occasion d'observer deux ou trois fois la mort fébile sur des sujets d'un âge peu avancé, qui succombèrent, du moins en apparence, à l'abolition, survenue graduellement, des fonctions nerveuses, comme on le voit dans toutes les morts fébriles, mais sans que les cadavres aient ensuite présenté aucun vestige d'ossification extraordinaire ou d'endurcissement des solides. (*Rapports du physique & du moral de l'homme.*) Toujours est-il que, quand la mort survient, sans blessure, sans maladie, sans accident qui la hâte, à une époque peu avancée de la vie pour la plupart des hommes, il faut se accuser la constitution primitive ; comme elle doit à leur constitution que les centenaires obtiennent le privilège de doubler quelquefois le nombre des années que la nature concède aux autres vieillards. Il seroit curieux d'examiner quels sont les climats, les genres de vie & les conditions de température & de conformation favorables à une longue existence,

comme aussi d'examiner les circonstances qui conduisent, ou paraissent conduire promptement notre vie; mais ce seroit sortir du domaine légitime de cet article que d'en parler ici. (Voyez L'ORGANITE & PROBABILITÉ DE LA VIE.)

§. 2. Signes précurseurs de la mort sénile.

Ce sont ceux de la décrépitude ou du dernier degré de la vieillesse, pendant laquelle la vie acommence à s'éteindre, long-temps avant l'époque marquée pour qu'elle s'éteigne entièrement. Ainsi, sans citer la chute des poils & des dents, on observe chez les vieillards un affaiblissement des forces toujours progressif; celles des sens, du cerveau, des nerfs & des muscles, qui constituent la vie animale du Bichat, diminuent & cessent les premières. Les yeux perdent peu à peu la vivacité & le feu du génie; ils deviennent ternes & comme assés; leur cristallin devient opaque; ils distinguent à peine, ou même il y a cécité. L'ouïe se perd, ou son organe perçoit difficilement les sons. La peau seche, plus dense, rude, écailleuse, sillonnée de rides, colle aux os ou aux chairs, & laisse saillir d'une manière désagréable à la vue les os; son tendons, les veines, n'ont plus le siège d'un toucher délicat, que d'ailleurs des mains tremblantes & des doigts sans destination rendent encore plus imparfait. L'odorat est obtus, mais moins cependant que les sens dont je viens de parler. Le goût se soutient, parce que sans doute ce sens est nécessaire à la fonction de la digestion; aussi, dit Bichat, lorsque toutes les sensations agréables suivent le vieillard, celle-ci lui reste encore; elle est le dernier fil auquel est suspendu le bonheur d'exister.

Les sens n'étant plus susceptibles que de trop faibles impressions, les facultés intellectuelles s'évanouissent aussi; le caractère perd son énergie, se rapetisse pour ainsi dire; nous devenons égoules, nous craignons la mort, nous faisons tout pour prolonger notre existence. C'est peut-être dans cet amour de la vie, autant que dans les autres circonstances de l'organisation, qu'il faut chercher la source du plaisir qu'ont les vieillards à boire du vin ou à prendre des substances qui semblent les rajeunir, en les faisant jouir momentanément de plus de vigueur. Or, qu'il en soit, l'un & l'autre nous quitte peu à peu, la raison nous abandonne, nous tombons dans un état de raptus & d'apathie; nous descendons à une seconde enfance, bornés à quelques souvenirs qui, bientôt confus, finissent même par disparaître. Quelques vieillards cependant, quoique très-avancés en âge & presque décrépits au physique, paraissent encore, par une heureuse exception, dans la virilité pour les facultés de l'âme. Tel, dit Fontenelle mourant à cent ans moins un mois, n'ayant connu de la vieillesse que la faiblesse & l'insolubilité de la vue. Tel encore, si l'on peut le citer pour exemple, le

vieux Nestor qu'Homère nous représente, au siège de Troie, prifant les conseils, & le plus éloquent de l'armée des Grecs.

L'observation des anatomistes semble établir qu'avec ces altérations progressives du moral, le cerveau devient plus consistant. Quelques-uns soutiennent encore que le nerf de tous les nerfs devient plus dur, & les ganglions nerveux plus solides & moins volumineux.

En même temps, les muscles, suivant la belle observation de Haller (*Elementa Physiologiae*, t. VIII, lib. 3o), diminuent de volume, se décolorent, deviennent plus mous, plus flasques, moins susceptibles de contractions, & font de fortes contractions. Aussi nos mouvements sont chaque jour plus lents, plus rares, plus défilés, plus mal assurés, & tout tend à nous ramener de plus en plus au repos. Le vieillard, accablé par les années, déjà plus ou moins abandonné par ses sens, à peine à se soutenir; ses muscles ne s'équilibrent plus, son dos se courbe toujours davantage lorsqu'il est debout ou qu'il marche, le bassin fléchit sur les cuisses, celles-ci sur les fesses, & les jambes sur les pieds; il est penché en avant; son cou semble se refuser à soutenir le poids de sa tête vacillante, comme les membres inférieurs à soutenir le tronc; son menton s'appuie sur la poitrine. Il fort difficilement de l'attitude dans laquelle il se trouve; il reste immobile & paisible; il ne peut guère sentir que l'action du froid; il ne supporte bien l'insensibilité que par un temps chaud & ordinairement au soleil.

« Allis près du feu qui le réchauffe, il y passe les jours concentré en lui-même; étranger à ce qui l'entoure, privé de desirs, de passions, de sensations, parlant peu; paier qu'il n'est déterminé par rien à rompre le silence, » ou, lorsqu'il répond aux questions qu'on lui adresse, c'est, autant qu'il le peut, par monosyllabes. Tout de cet ordinairement on lui a fait, le dégoût, l'ennui, l'indifférence & l'insensibilité; il peut même perdre très-souvent la conscience de son être. Circonstances bootiques, qui lui enlèvent qu'il descend dans la tombe!

Cet état s'accompagne d'engourdissement & du besoin de dormir; mais le sommeil n'est ni bien continu, ni réparateur, comme il l'est à un âge moins reculé. Haller cite l'exemple d'un vieillard de 88 ans qui, dans la dernière année de sa vie, dormoit vingt heures par jour. (*Elem. Physiol.*, lib. XXX, §. 12.)

L'homme à presque cessé de vivre au dehors & dans ses rapports avec ce qui l'environne; dans sa volonté, dans ses fonctions dites du système nerveux (je ne parle pas de celles des organes de la reproduction, qui depuis long-temps n'en exécutoient aucune); qu'il vit encore fréquemment avec une sorte de plénitude dans ses autres fonctions, ou au dedans de lui; toutefois la décomposition continue à l'emporter sur la con-

position; la nutrition est en moins ce qu'elle étoit en plus dans l'enfance; la poitrine diminue de capacité, les membres perdent de leur épaisseur & de leur embouppant, la face & le crâne se rétrécissent, les dimensions & le poids des os diminuent (Thomas Soemmerring, *De fabricâ corporis humani, de ossibus.*)

Tous les organes, à l'exception des reins peut-être, & avec eux le corps entier, se rapetissent ou semblent se rapetisser; le cœur bat chaque jour avec plus de faiblesse & plus de lenteur; & souvent avec irrégularité & intermittence. C'est surtout dans les veines, qui augmentent de calibre; principalement celles des parties inférieures, que la circulation paroît être moins rapide, ou s'exécute avec plus d'embarras. Beaucoup d'artères & de vaisseaux capillaires s'oblitérent ou semblent s'oblitérer. L'absorption dans les membranes séreuses paroît être plus difficile; & les hydropisies y sont plus communes. D'un autre côté, les tumeurs synoviales sont moins humectées de synovie, & le tissu cellulaire plus sec; on droit même souvent que ces parties s'accroissent par une sorte de rigidité la difficulté des mouvemens. Ce dernier effet se renforce encore par l'état des ligamens, des parties fibreuses, des cartilages, des fibres cartilagineuses, des parois des artères, qui deviennent de plus en plus dures, moins flexibles, & dans lesquels il se dépose du phosphate calcaire; & par un phénomène contraire, mis hors de doute & bien développé dans ces dernières années par mon ami M. Ribes (*Mém. de la Soc. méd. d'émulation de Paris*, tom. VIII); voyez encore le travail commun à M. Breschet & à moi, sur l'ossification du cœur), la substance osseuse diminue de quantité dans les os; dont les cavités médullaires deviennent chaque jour plus amples.

En même temps qu'un vieillard avance dans la décrépitude, ou même long-temps auparavant, la membrane muqueuse de l'appareil urinaire s'affaiblit souvent de catarrhe chronique. Après les poils & les dents, la vessie est communément l'organe par lequel nous commençons à vieillir.

Les digestions sont longues, bientôt laborieuses, & d'autres fois faciles; & dans tous les cas, par lo défaut de dents & par la difficulté de rapprocher les mâchoires, si ce n'est par la partie antérieure & moyenne des bords alvéolaires, la mastication & l'insalivation ne s'opèrent plus que d'une manière lente & même imparfaite. Le foie & les reins sont peut-être les seuls organes importants qui n'ont rien perdu & ne perdent rien de leur activité.

La diminution des forces peut parvenir à un tel point; qu'il aiguillon des besoins les plus fréquens ne se fasse plus sentir; & que les plans musculéux des organes digestifs & de la vessie participent, par les seuls progrès de l'âge, à l'inaction des muscles de la locomotion. Alors les matières continuent dans les cavités de la vessie & du rectum

sont difficilement expulsées; il y a, ou bien des rétentions; les sphincters paralysés ne retiennent plus l'urine ni les fèces, & les matières s'échappent sans qu'on s'en aperçoive; enfin, les seuls mouvemens volontaires, mais comme automatiques, qui persistent, sont ceux de la mâchoire inférieure; le vieillard tout-à-fait décrit, qu'on est obligé de faire manger, ne demande plus d'alimens; il ouvre la bouche à tout ce qu'on lui présente; ou quand il s'occupe de lui.

C'est là le dernier terme de notre dégradation. Dans cet état, l'homme est réduit à une condition qui le place au-dessous de celle des moindres animaux; ses organes sont usés; ce n'est qu'à force de soins que l'on peut prolonger de quelques mois, de quelques jours, de quelques heures, son existence; il a épuisé, pour ainsi dire, tous les matériaux de sa vie; il faut bien qu'il meure comme jino l'âme s'éteint sans aliment; & telle est la loi invariable de la nature. Il faudroit, pour empêcher la mort, empêcher aussi les vaisseaux d'un vieillard de s'oblitérer, en un mot, empêcher tous les organes de passer par la série d'altérations, de modifications qu'ils éprouvent nécessairement.

Que croiroi-je donc de cette opinion présentée d'une manière si absolue, qui veut expliquer la mort des vieillards seulement par l'endurcissement, la siccité & la rigidité progressive de tous ces organes, dont, à la fin, ils arrêteraient le jeu? On peut consulter, à ce sujet, les ouvrages de Galien (*De sanitate tuenda*, lib. VI), de Bacon (*Hist. vit. & mortis*), de Van-Svieten (*Comment. in. Hugn. Boerhaave, Aphor.*, tom. I, pag. 68 de la troisième édit.), de Balfon (*Hist. nat. de l'homme*, chap. intitulé *De la vieillesse*), de Haller (*loc. cit.*), de Fischer (*lib. de Senia*), de Guillaume Serret (*Anat. corp. humani senilis specimen*), &c. &c.; de MM. Desferrière (*Argumens. des vieillards*), *Collect. des thèses*, n. 80., Paris, an 10), Elparon (*Essai sur les âges de l'homme*), *Collect.*, id., an XI), &c. &c.

On remarque que la détérioration que subissent les vieillards, est, pour l'ordinaire, lente d'abord, & qu'à mesure qu'ils s'avancent vers l'époque fatale, elle s'accroît rapidement. Il est à noter, d'après les observations de plusieurs auteurs, & particulièrement de quelques-uns de ceux que je viens de nommer, que cette détérioration progressive s'arrête souvent, pour ainsi parler, tant elle se ralentit; lorsque le vieillard a franchi le terme ordinaire de la vie humaine. (*Voyez Dictionnaire.*)

§. 3. Phénomènes de la mort finale.

Quand l'homme qui succombe au poids des années est à son heure dernière, le pâleur couvre son visage; les yeux sont obscurcis, la pupille est

dilatée, la cornée comme séchée, les paupières se ferment, les joues sont affaissées, son nez estille, ses lèvres sans coloris; sa voix s'éteint; les pieds, les mains, les oreilles se refroidissent; la respiration s'embarasse; le pouls devient encore plus faible, plus lent, plus irrégulier, plus intermittent; il se réfugie dans les artères voisines du cœur; enfin, les battements de cet organe & les mouvements du diaphragme cessent, & avec eux les fonctions cérébrales, & successivement toutes les autres. On croit que, quelques instans avant la mort, la circulation commence à s'arrêter dans les vaisseaux capillaires, surtout dans ceux qui sont éloignés du centre (phénomène que le refroidissement des extrémités montrait assez), & que ce n'est que progressivement qu'elle se suspend dans les troncs au voisinage du cœur. Quoi qu'il en soit de cette opinion, dans les dernières minutes de la vie, le pouls n'existe plus aux endroits où on le cherche ordinairement, & aux efforts impuissans du diaphragme, succède une grande & souvent bruyante expiration, le dernier soupir.

C'en est fait, le flambeau de la vie est éteint; mais ne supposons rien : ne disons que ce que nos sens perçoivent, c'est-à-dire, que les fonctions ont cessé.

Le corps de l'homme n'est plus dès-lors qu'un cadavre qui sera froid & livide dans quelques heures, & dont la putréfaction sera bientôt après dissolue les chairs avec une effreuse puanteur, dissipera dans l'air une portion de ses élémens matériels, & réduira le reste à quelques principes terribles & salins. (Voyez PUTRÉFACTION.)

La mort sénile ne survient pas ordinairement aussi paisiblement; presque toujours elle est précédée, durant quelques jours, durant quelques heures, par une sorte de petite fièvre ératique, qui s'est peut-être elle-même que l'effet de l'effort de la vie, si je puis m'exprimer ainsi, au lieu d'être la cause de la mort : ce seroit alors un genre d'agonie. D'autres fois aussi, des vieillards qui ne paroissent succomber qu'à leur âge extrêmement reculé, ne suffisent pas toutes les détériorations dont j'ai parlé dans le paragraphe précédent; mais, pour cela, ils ne voient pas plus la mort, & l'insultant où elle les étend, lors même qu'ils conservent leurs facultés intellectuelles jusqu'au dernier jour. Ils descendent dans la tombe comme les autres, ou la plupart des autres; sans douleurs, sans angoisses, sans en avoir la conscience; comme les autres ils semblent moins mourir que s'endormir d'un sommeil tranquille. *Mors miseris non est, aditus autem ad illam miser.*

C'est ainsi que nous nous éteignons de vieillesse. Quand la saix de la Parque, dit Buffon, est levée pour trancher nos jours, on ne la voit point, on n'en sent point le coup. ... Cet état de choses nous effraie de loin; mais quand il se prépare, nous sommes assourdis par les gradations qui nous y conduisent, & le moment déçuif

arrive sans qu'on n'en doute & sans qu'on y réfléchisse. Qu'on interroge, dit encore le même écrivain, les médecins des villes & les ministres de l'Eglise, accoutumés à observer les mourans; ils conviendront qu'à l'exception d'un petit nombre de maladies aiguës, dans toutes les autres on meurt doucement & sans douleur; & même ces terribles agonies effraient plus les spectateurs qu'elles ne tourmentent les malades; car, combien n'en a-t-on pas vus, qui, après avoir été à cette dernière extrémité, n'avoient aucun souvenir de ce qui s'étoit passé! Ces observations sont vraies de personnes qui avoient été sur le point de mourir de maladie, & surtout de fièvre dite ataxique, de typhus, &c., les entres-souvent confondues. Dans l'ordre ordinaire, la mort n'est donc pas aussi formidable que nous nous l'imaginons : c'est un spectre qui nous épou-vante de loin & qui disparaît lorsqu'on y touche. Il est plus cruel d'appréhender la mort que de la souffrir, ont dit beaucoup d'auteurs, parmi les médecins qui se sont attachés à vouloir le prouver, je dois citer principalement Barthez.

Laissons cette digression, & concluons que la mort sénile paroît marcher de la circonférence vers le centre, au contraire de ce qui arrive dans la mort subite ou violente, qui frappe le centre avant les extrémités. Une autre remarque non moins importante, qui paroît devoir être commune à la mort sénile comme à la plupart des autres morts, c'est que ce sont les parties dans lesquelles la vie se manifeste d'abord chez l'embryon, qui la perdent les dernières. Ainsi, les battemens du cœur, & particulièrement de l'oreillette droite, qui semblent la commencer, la suivent. Ainsi, la nutrition & quelques fonctions subsistent encore quelque temps après que toutes ses fonctions de relation & de sensibilité sont considérablement diminuées ou même anéanties.

Une autre conclusion : dans la mort sénile, on finit de vivre comme on commence, c'est-à-dire, par degrés.

Je ne développerai point, dans ce paragraphe, la manière dont l'arrêt de la circulation (en admettant, sur la foi des auteurs, ce qui est assez vraisemblable; que ce soit par lui que commence la mort sénile) entraîne la cessation des autres fonctions. Les faits qui se rattacheront à ce sujet, à la dissolution des derniers phénomènes de la vie & à l'histoire des dernières suites de la mort, n'ont guère été bien étudiés que quand la mort est subite ou presque subite. C'est dans le chapitre suivant (S. 1) qu'on doit les chercher.

CHAP. III. De la mort anticipée ou accidentelle.

Les maladies, les accidens, nous font mourir à tout âge, & même le jour de la naissance.

La mort peut aussi atteindre le fœtus dans le ventre de sa mère. Je n'examinerai point ici quel est, dans une quantité donnée de personnes qui viennent au monde, le nombre de celles qui meurent à tel âge, le nombre de celles qui vont jusqu'à tel autre, &c. C'est à l'article MORTALITÉ ou à celui PROBABILITÉ DE LA VIE (voyez ces mots), que ces détails seront mieux placés.

La mort non seule arrive lentement, graduellement, ou par une maladie qui l'annonce assez long-temps, ou tout-à-coup & de manière à mériter l'épithète de *subite* qui lui a été donnée. Je vais devoir commencer par cette dernière.

SECTION I^{re}. De la mort subite.

Le cœur, le poumon & l'encéphale ont été nommés *le trépied de la vie*. En effet, toutes les fonctions s'enchaînent tellement à la fonction de chacun de ces organes, qu'il n'y a point pour nous de santé sans leur intégrité d'action, & de vie sans interruption tant soit peu prolongée, soit de la circulation, soit de la respiration ou de l'action cérébrale. Nos autres fonctions peuvent cesser momentanément, & notre existence n'est point compromise; mais qu'on suppose pendant très-peu d'instans l'une de ces trois fonctions principales, les deux autres seront subitement arrêtées, & successivement toute la vie. Telle est la manière suivant laquelle la mort subite paroit toujours s'accomplir. Je vais examiner les causes qui la produisent à l'ordre de la cessation des fonctions, selon que ces causes portent, ou sur le cœur, ou sur les poumons, ou sur le cerveau. Les travaux de Bichat (*Recherches physiologiques sur la vie & sur la mort*), de qui j'adopte les divisions, sont ceux que je mettrai le plus à contribution pour la rédaction de ce chapitre. En réduisant la question à reconnoître lequel de ces organes, le cœur, l'encéphale ou le poumon, cesse le premier ses fonctions, il a, pour ainsi dire, posé trois centres autour desquels doivent venir se ranger toutes les espèces de mort.

S. 1. A. Mort subite dont les causes portent directement sur le cœur & sur la circulation.

La connexion étroite & nécessaire du cœur avec l'encéphale, ou de la circulation avec l'action cérébrale, se démontre parfaitement par la ligature des deux artères carotides & des deux artères vertébrales. L'animal, qui paroit peu affecté lorsqu'on n'a lié que les uns ou les autres de ces vaisseaux, tombe à l'instant qu'on les lie tous quatre, & meurt au bout de quelques secondes. Un semblable effet est produit par la ligature du tronc même de l'aorte ascendante. Le sang que le cœur pousse au cerveau, ou l'action du premier organe sur le dernier, est donc indispensable pour l'en-

tretenir de la vie. Quel est le mode de cette action? Nous n'en avons eu ab pourvue en avoir aucune idée; mais, ce qui est bien certain, il est dû à la nature du sang artériel, & la mort, dans les cas qui nous occupent, vient de l'interception de ce sang. L'action de celui-ci doit-elle être attribuée en outre aux contractions du cœur, communiquée à la masse encéphalique? Bichat le soutenoit, & M. Richerand (voyez *Mémoires de la Société médicale d'émulation*, 3^e année, p. 206 & suiv.) prétend le contraire. Quoi qu'il en soit, c'est encore par le sang, mais par le sang veineux, que s'exerce l'influence directe du cœur sur la respiration. (Voyez, pour les preuves de cette assertion, le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*.)

Quand, par une hémorrhagie, tant interne qu'externe, par une syncope, &c., l'action du cœur diminue considérablement tout-à-coup, celle du cerveau diminue dans la même proportion, ou quand l'action du cœur cesse, celle du cerveau cesse également. L'action du dernier n'étant plus entretenue par l'afflux du sang en assez grande quantité, il y a à l'instant cessation de la sensibilité, de toutes les fonctions de relation, de la voix, des mouve mens volontaires & de ceux du diaphragme; par là même, les phénomènes mécaniques de la respiration sont interrompus d'une manière soudaine, quoiqu'indirecte, & cette interruption des phénomènes mécaniques occasionne inévitablement celle des phénomènes chimiques.

Cet ordre est changé dans le cas où c'est une partie principale du système circulatoire à savoir ou veineux, comme l'oreillette & le ventricule droits, ou l'artère pulmonaire, dont la fonction se trouve arrêtée la première; alors le sang n'arrivant plus au poumon, les phénomènes chimiques de la respiration cessent; & c'est consécutivement lorsque le cerveau, qui ne reçoit plus de sang, n'excite plus les muscles intercostaux & le diaphragme, que les phénomènes mécaniques cessent à leur tour.

Tel est le lien réciproque qui maintient la fonction du cœur unie à celle de l'encéphale & des poumons, que ce lien ne peut être rompu en quel qu'endroit que ce soit, sans qu'aussitôt les trois fonctions soient affectées. La mort générale se continue ensuite, mais d'une manière graduelle, par la cessation des sécrétions, des exhalations, de l'absorption & par la perte de toutes les propriétés vitales.

C'est dans l'un ou dans l'autre ordre que je viens d'indiquer, que s'enchaînent les phénomènes de la mort produite par une plaie au cœur, par la déchirure d'une partie de cet organe, par une plaie aux gros vaisseaux, par les ligatures qu'on applique sur ces derniers, par des dégénéres-

cenees de lens tissu, des anévrysmes ou d'autres maladies qui amènent à la longue des ruptures, par des compressions, par des syncopes prolongées, &c. &c.

Si l'on excepte les maladies qui viennent d'être nommées, dans toutes les autres les fonctions du cœur finissent après celles des poumons, de l'encéphale, des sens, des nerfs & des muscles, qui sont sous l'empire de la volonté.

Des expériences sur les animaux & sur les suppliciés, ont appris que le cœur est encore le siège de quelques contractions après la mort apparente, & que, dans tous les cas où une blessure ou bien une rupture spontanée ne vide point les cavités droites du cœur & l'artère pulmonaire, ces cavités ne cessent de battre qu'après les gauches, parce que, ainsi que l'a fait voir Haller, elles sont plus long-temps stimulées par la présence du sang, qui, leur arrivant de toutes parts & ne pouvant traverser les poumons, s'y accumule. Dans tous les cas, l'oreillette du côté droit conserve ses contractions un peu plus long-temps que les autres parties du cœur; c'est donc très-judiquement que, sous ce rapport, on l'a désignée comme *l'ultimam moriens*. Galien & Harvey lui avoient déjà donné ce titre (Vid. Haller, *Elem. Physiol.* t. I, de cordis motu; & le *Supplément du premier Mémoire sur la cause du mouvement du cœur*, imprimé à Lausanne.) Les veines caves paroissent aussi, d'après les mêmes expériences, se contracter sur le sang aussi long-temps que l'oreillette droite.

Beaucoup de physiologistes & de médecins ont fait une application des expériences dont je viens de parler, à la mort fécale; mais j'avoue que j'ignore absolument jusqu'à quel point cette application est exacte. Seulement je rappellerai ici que la mort fécale paroît commencer par le cœur; je dis, paroît, car si l'on a souvent observé l'agonie de ce genre de mort & examiné, sous le rapport qui nous occupe actuellement, les cadavres de ceux qui y avoient succombé, on a négligé d'en mentionner les détails dans les salles de la science.

Quant à la manière dont l'action du cœur, considérée en elle-même & sous les conditions qui l'entretiennent, finit dans le plus grand nombre des cas, Louis paroît en avoir tracé un tableau fidèle. Si cette action est très-foible, dit-il, le sang ne pourra être poussé dans les vaisseaux de la circonférence du corps, & le diamètre de ces vaisseaux diminue; de-là le froid & la pâleur des extrémités. Le sang se concentre donc dans les parties intérieures; il y est refoulé, & si les vibrations du cœur ne peuvent surmonter la résistance de son poids, le cœur sera bientôt opprimé; il cessera d'agir, & dès-lors la machine cessera d'être animée. (Voyez *IP^e. Lettre sur la certitude des signes de la mort.*)

S. 2. B. *Mort subite dont les causes portent directement sur les poumons ou sur la respiration.*

Je viens de dire qu'il y a deux ordres de phénomènes dans l'acte de la respiration: la mort est également le résultat de l'interruption des phénomènes chimiques.

La cessation des phénomènes mécaniques arrête les autres en ne permettant plus au sang de traverser les poumons. Ce fluide stagne alors dans l'artère pulmonaire, le ventricule droit & les principaux troncs veineux, d'où il n'est plus transmis dans les cavités gauches du cœur, ou ne l'est que dans une quantité beaucoup trop petite. D'un autre côté, l'encéphale n'étant plus stimulé par le sang artériel, les muscles intercostaux & le diaphragme ne peuvent plus se contracter, & pour quelques instans que cet état dure, lors même que la cause vient à cesser, la mort en est l'effet. C'est ainsi qu'elle arrive dans les compressions très-fortes exercées en même temps sur le thorax & sur l'abdomen, lors de la rupture du diaphragme, & quand la poitrine se trouvant ouverte de l'un ou de l'autre côté, les poumons s'affaissent, parce que l'air contenu dans ces organes ne peut faire équilibre avec l'air qui les presse au dehors.

Si nous cherchons à savoir comment le cœur cesse d'agir par l'interruption des phénomènes mécaniques de la respiration, nous trouvons que c'est surtout d'une manière indirecte par l'arrêtissement des phénomènes chimiques. Si donc, dit Bichat, nous parvenons à déterminer comment, lorsque ces derniers phénomènes sont anéantis, le cœur reste inactif, nous aurons résolu une double question.

Or, diverses expériences de cet anatomiste & de Haller, prouvent que la cause de la suppression de l'action du cœur n'est pas uniquement, comme le croyoit Godwin & comme le pensent beaucoup de personnes, le simple contact du sang noir, ou non respiré, avec la surface interne du ventricule à sang rouge. Ce que je dirai un peu plus loin des causes de mort subite éclairera ce sujet. La cause assignée par Godwin existe bien en partie, mais seule, elle ne suffiroit pas, du moins dans les premiers momens. Pourtant, il est bien certain que le sang noir, poussé dans le tissu de tous les organes, y porte l'asphyxie & la mort, ou, pour parler plus exactement, qu'il est très-impropre à entretenir les fonctions; en sorte que ce n'est pas faute de recevoir du sang, mais faute d'en recevoir du sang artériel, que les organes cessent alors d'agir. Il en seroit probablement de même du cœur, qui ne recevrait dans son tissu, par les artères couronnaires, que du sang noir, indépendamment de ce qu'il n'est plus soumis à l'influence du cerveau & des nerfs.

Dès que les phénomènes chimiques de la respiration sont interrompus, le sang noir ou veinoux arrête aussitôt l'action de l'encéphale, en pénétrant

pénétrant dans son tissu. Des expériences multipliées établissent ce fait, que dûment renoué d'aillieurs facilement les symptômes de l'asphyxie produite par le gaz hydrogène sulfuré, ou par tout autre gaz qui frappe tout-à-coup d'arrêt l'écoulement des forces, toutes les fonctions de la vie.

Mais l'expérience la plus concluante que l'on puisse citer à l'appui de ce que je viens de dire, est celle qui consiste à suppléer à la respiration naturelle (sur un animal dont on vient de couper la moelle épinière, ou sur la tête duquel on vient d'asseoir un violent coup, &c.), par l'insufflation de l'air dans les poumons. On fait renaitre ainsi, dans le premier cas, & parvenir à un degré pressenti, & cela à plusieurs reprises, l'apparence du sentiment & le mouvement qui ont cessé, & de plus, dans les deux cas, l'on rétablit la circulation arrêtée. C'est ainsi que Fontana, M. Brodie, Le Gallois, M. A. P. Wilson Philip, & tout récemment M. Charles Cloëtta, ont vu, chez des animaux qu'ils venoient de tuer autrement qu'en faisant écouler le sang, l'action du cœur devenir à volonté languissante ou active, cesser & se renouveler, suivant que l'on interrompoit ou que l'on recommançoit l'insufflation pulmonaire ou la respiration artificielle.

On peut donc conclure, lorsque la respiration commence à s'arrêter par les phénomènes mécaniques ou par les phénomènes chimiques, que c'est toujours l'interruption des derniers qui fait cesser la vie.

Lorsque ce sont les phénomènes chimiques de la respiration qui cessent les premiers, on trouve, après la mort, l'artère pulmonaire, le ventricule à sang noir, son oreillette, les veines caves & les troncs qui se rendent à ces dernières, remplis, gorgés de sang, tandis qu'il n'y en a presque point dans les voies de la circulation destinées au sang rouge ou respiré, parce que c'est dans l'artère pulmonaire ou les poumons que cette fonction s'est d'abord arrêtée, & que de proche en proche, le sang ne circulant plus, s'accumule dans le système veineux. Cette assertion est pleinement justifiée par les ouvertures de cadavres, & principalement dans la suite de l'asphyxie. Cependant les résultats de ces ouvertures varient suivant que la mort a eu lieu plus ou moins rapidement : ainsi, chez les animaux que nous faisons mourir par une asphyxie lente & graduelle, chez les hommes qui ont été quelque temps dans un état de gêne & d'angoisses avant la cessation de la respiration, le poumon est extrêmement engorgé de sang & comme carnifié, disposition analogue à ce qu'il offre après les péripneumonies interstielles.

Voici l'ordre dans lequel Bichat décrit la cessation successive des fonctions qui commencent par les phénomènes mécaniques de la respiration : 1°. plus de phénomènes mécaniques ; 2°. plus de phénomènes chimiques, suite d'air qui les entretient ; 3°. plus d'action cérébrale, suite de sang rouge qui

excite le cerveau ; 4°. plus de vie animale, de sensation, de locomotion & de voix, suite d'excitation dans les organes de ces fonctions, par l'action cérébrale & par le sang rouge ; 5°. plus de circulation générale ; 6°. plus de circulation capillaire, de sécrétions, d'absorption, d'exhalation, suite d'action exercée par le sang rouge, sur les organes de ces fonctions ; 7°. plus de digestion, suite de sécrétion & d'excitation des organes digestifs, &c. &c.

Les phénomènes de la mort s'enchaînent différemment lorsque ce sont les phénomènes chimiques qui sont interrompus les premiers. Alors, dit Bichat, à la cessation des phénomènes chimiques, succède : 1°. celle de l'action cérébrale ; 2°. de la vie animale, des sensations, des mouvements, & par conséquent de la voix & des phénomènes mécaniques de la respiration ; 3°. de l'action du cœur & de la circulation générale ; 4°. de la circulation capillaire, de l'exhalation & de l'absorption ; 5°. de la chaleur animale qui est le résultat de toutes les fonctions, & qui s'abandonne le corps que lorsque tout a cessé d'être en activité.

Il résulte de plusieurs observations, qu'aux approches de la mort, l'air sert des poumons avec une très-grande partie de son oxygène, & tel, à peu près, qu'il étoit entré.

On a regardé comme probable, que le dernier effort des muscles respirateurs, lorsque la mort est produite par une asphyxie, une éruption ou un accès d'asthme, est un mot lorsqu'elle commence par le poumon, est pour opérer l'inspiration, & qu'au contraire la mort s'accomplit tousjours dans l'expiration lorsqu'elle est amenée par d'autres causes. Ce que j'ai rapporté, d'accord avec l'opinion générale, porte bien à croire que nous finissons constamment, ou presque constamment, par une expiration. Cette opinion que Nathanaël Hyegbaum a peut-être le premier voulu établir (*Dissquis. anat.*, lib. II, *corp. hum.*), est aussi la conséquence naturelle des ouvertures de cadavres, qui font toujours voir le diaphragme faisant saillie vers la poitrine, comme dans l'expiration. Cependant il me semble que cette dernière circonstance ne lève pas tous les doutes, parce qu'à la mort, les viscères abdominaux, dans lesquels d'ailleurs il se dégage des gaz, doivent selever plus ou moins le diaphragme sur les poumons, qui sont incapables, par leur tissu très-mou & par leur communication avec l'extérieur, de résister à cette pression.

S. 3. C. Mort subite dont les causes portent directement sur l'encéphale & le prolongement rachidien, ou sur les fonctions nerveuses.

Les causes de mort subite qui portent directement sur l'encéphale & sur son prolongement rachidien, non moins nécessaire à l'entretien de la vie, sont les fortes commotions de ces parties,

Qq

produites par des chutes de haut, par des coups sur la tête; &c., qui en affaiblissent, en déchirent ou en lèvent le tissu; des plaies profondes, des compressions diverses qui ont lieu par une apoplexie, par un épanchement sanguin dû à une autre cause, par une esquille lors d'une fracture, &c.; le saignement, encore mal éteint, qu'on éprouve en tombant dans une eau très-froide, qui jette tout-à-coup dans une fièvre générale, & suspend toutes les puissances de la vie; les excès de douleurs qui font mourir quelquefois les malades dans les opérations qu'on leur pratique, ou très-peu d'instans après; la section de la moelle épinière, la destruction, &c.; certains poisons ou principes délétères, tels que ceux qui produisent le scorbutisme, l'asphyxie, avec des symptômes spasmodiques & nerveux, &c. &c. C'est par l'absorption dans le torrent de la circulation, & en privant le sang de la qualité propre à exciter les organes, à entretenir la vie, on en altérant subitement cette qualité, que ces principes agissent sur le système nerveux. Il y a des cas cependant où les poisons & les gaz délétères produisent la mort avec une telle rapidité, qu'on dirait d'abord que l'absorption & la circulation n'y font pour rien.

Nous avons vu que le cerveau se trouve placé directement sous l'influence du cœur, ou du moins sous l'influence du sang rouge, & par conséquent des phénomènes chimiques de la respiration. Lorsque l'action cérébrale & les fonctions nerveuses sont tout-à-coup anéanties par l'une de ces causes énoncées, la fonction des poumons ou la respiration est aussitôt arrêtée par la paralysie des muscles qui y servent, & la circulation paraît s'être principalement par l'intermédiaire de la respiration, & ainsi qu'il a déjà été dit.

Voici l'ordre suivant lequel Bichat assigne la cessation des fonctions quand la mort commence par le cerveau :

1°. Anéantissement de l'action cérébrale; 2°. cessation subite des sensations & de la locomotion; 3°. paralysie simultanée des muscles diaphragme & intercostaux; 4°. interruption des phénomènes mécaniques de la respiration, & par conséquent, de la voix; 5°. annihilation des phénomènes climatiques; 6°. passage du sang noir dans le système vasculaire à sang rouge; 7°. ralentissement de la circulation par le contact de ce sang avec le cœur & les artères, & par l'immobilité absolue où se

trouvent toutes les parties, la poitrine en particulier; 8°. mort du cœur & cessation de la circulation générale; 9°. interruption simultanée de la vie organique, surtout dans les parties où pénètre habituellement le sang rouge; 10°. abolition de la chaleur animale, qui est le produit de toutes les fonctions.

Quelques-unes des idées de Bichat paraissent devoir être modifiées. Néanmoins il se place, avec Haller, au premier rang parmi les physiologistes qui ont cherché à connaître l'ordre suivant lequel nos divers organes cessent d'agir, ou comment la cessation d'une fonction entraîne celle d'une autre, & la perte successive de ce qu'on nomme les propriétés vitales: Les travaux les plus importants qui viennent ensuite, sont ceux de M. Brodie, de Londres (*The croonian lecture*, &c. Voyez les *Transact. philosophiques* de 1811), A. P. Wilson Philip (*An experimental inquiry into the laws of the vital functions, with some observations on the nature and treatment of internal diseases*), & de feu Legallois (*Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvemens du cœur*).

Selon ce dernier, qui est antérieur de quelques années à M. Philip, la puissance nerveuse (le siège constitué à lui seul l'individu comme être animal), la puissance nerveuse, dis-je, & en particulier celle du cerveau, est due à une impression du sang artériel sur l'encéphale & sur la moelle épinière: la mort résulte de la cessation de cette impression.

Cette donnée étant appuyée sur l'opinion de Legallois, disons comment il a vu des lésions de la moelle épinière, qu'il déterminait lui-même, amener la mort. Ses expériences ont été faites sur des animaux de toutes les espèces; mais comme il ne doit être parlé dans cet article que de la mort de l'homme, on de faits qui répandent du jour sur elle, je vais rapporter brièvement les seules expériences pratiques sur quelques espèces de quadrupèdes; & en particulier sur des lapins, auxquels Legallois a coupé, aux uns, la moelle épinière entre l'occipital & la première vertèbre cervicale; aux autres, tranché entièrement la tête; à ceux-ci, détruit toute la moelle épinière, au moyen d'une lige de fer qu'il enfonçoit dans toute la longueur du canal vertébral; à ceux-là, détruit seulement la moelle cervicale, la moelle dorsale ou la moelle lombaire.

EXPÉRIENCES.

ÂGES DES ANIMAUX.

RÉSULTATS.

Section de la moelle épinière à la sortie du crâne.	1 jour.....	} La circulation continue quelque temps.
	10 jours.....	
	20 jours.....	
Décapitation.....	1 jour.....	} La circulation continue quelque temps dans le tronc & dans les membres seulement.
	10 jours.....	
	20 jours.....	

Destruction de toute la moelle épinière.	1 jour..... 10 jours..... 20 jours.....	Circulation subitement arrêtée.
Destruction de la seule moelle cervicale.	1 jour..... 10 jours..... 20 jours.....	
Destruction de la seule moelle dorsale.	1 jour..... 10 jours..... 20 jours.....	
Destruction de la seule moelle lombaire.	1 jour..... 10 jours..... 20 jours.....	La circulation continue. Elle s'arrête au bout de deux minutes. Circulation subitement arrêtée. La circulation continue. Idem. La circulation cesse au bout de deux minutes.

A un âge plus avancé, les résultats sont les mêmes qu'à vingt jours.

Notre ingénieux expérimentateur, croyant avoir réussi avec le plus grand succès, par l'insufflation de l'air dans les poulmons, c'est-à-dire, parla respiration artificielle, un lapin décapité, détruisit la moelle épinière dans toute sa longueur avec la tige du fer, & tous les phénomènes de la vie disparurent à l'instant même, sans qu'il fût possible de les rappeler par aucun moyen; la seule contractilité musculaire subsista encore quelques instans. Les résultats sont les mêmes si, au lieu de décapiter l'animal, on fait simplement une ouverture au canal vertébral près l'occiput, & si l'on détruit toute la moelle épinière. Dans ce dernier cas, selon Legallois, la vie subsiste encore, mais seulement dans la tête, comme l'indiquent les bâillemens. Déjà MM. Elsuier, Semmerring & quelques Français, notamment Sue, avoient pensé que dans la décapitation, la tête, séparée du corps, survit au supplice; & éprouve, durant quelques momens, les douleurs les plus atroces; mais, d'un autre côté, Cabanis & M. Leveillé ont combattu ce sentiment, & comparé les mouvemens comme convulsifs que l'on remarque dans une tête qui vient d'être coupée, à ceux qu'on observe quelquefois dans un membre nouvellement amputé. (Voyez *Mém. de la Soc. méd. d'émulation*, t. I, p. 266 à 302.)

Quoi qu'il en soit de ces opinions, toutes les fois que l'on décapite un animal, ou que l'on commence près l'occiput la destruction de la moelle épinière, les mouvemens inspireurs du thorax font anéantis à l'instant où la moelle est déformée, avant que la circulation soit arrêtée; & il semble résulter des expériences de Legallois, disent les savans auteurs d'un Rapport fait à la Société de la Faculté de médecine de Paris, 1°. que la section de la moelle épinière produit des phénomènes analogues à ceux de l'asphyxie; 2°. que dans cette section de la moelle épinière, le seul défaut de respiration arrête les phénomènes de la sensibilité & des mouvemens volontaires, puisque la respiration artificielle peut

les rétablir (ou du moins leur apparence) pendant un temps considérable; 3°. que l'on peut commencer par détruire à volonté la vie dans la tête ou dans le tronc, en détruisant la moelle épinière dans l'une ou dans l'autre de ces parties; 4°. que le principe du sentiment & du mouvement, pour le tronc, réside dans la moelle épinière, & en général, pour chaque partie, dans cette portion de la moelle, d'où naissent les nerfs de cette partie; mais que ceux des nerfs qui président aux phénomènes mécaniques de la respiration, empruntent leur principe d'action de la moelle allongée; 5°. enfin, quo pour faire vivre isolément la tête, le tronc ou un segment quelconque du corps, ayant la portion correspondante de la moelle épinière intacte, il suffit qu'un sang doué de qualités artérielles porte son influence sur ce segment, & principalement sur la moelle. » (*Rapport de MM. Chaussier & Duméril sur le Mémoire de Legallois. Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, cahier n°. IV, 1809.*)

J'ajouterai cette autre conclusion: une portion quelconque de la moelle épinière a sur la vie deux modes d'action bien distincts: par l'un elle paroît constituer essentiellement la vie dans toutes les parties auxquelles elle fournit des nerfs; par l'autre, elle contribue à l'entretenir dans toutes celles qui reçoivent les leurs, non-seulement du reste de la moelle, suivant Legallois, mais encore de l'encéphale. Selon le même physiologiste, par exemple, quand on détruit la moelle lombaire dans un lapin de vingt jours, c'est en vertu du premier mode d'action que la mort paroît avoir lieu instantanément dans le train de derrière, & c'est en vertu du second qu'elle tarde environ trois minutes à arriver dans le reste du corps.

Il faut observer que ce que j'ai dit ne doit s'appliquer d'une manière absolue qu'à l'homme & aux animaux à sang rouge & chaud, qui s'en rapprochent par leur organisation.

On n'étoit aucun doute sur les faits observés par Legallois, & sur les conséquences qu'il en avoit tirées; mais M. Wilson Philip, ayant répété

les expériences de Legallois, ou fait d'autres expériences analogues, il a cru pouvoir annoncer aux physiologistes que, contre leur opinion, la *puissance du cœur & celle des vaisseaux sanguins sont indépendantes de l'encéphale & de son prolongement rachidien.* (Ouv. cité, deuxième conclusion.)

Les raisons qu'il donne, méritent bien qu'on les rapporte. Je vais les exposer.

Il a privé d'abord des lapins de tout sentiment & de tout mouvement volontaire, en leur assénant sur l'occiput un grand coup qui faisoit cesser subitement les mouvements de la respiration; & ensuite, il mettoit à nu la moelle épinière depuis l'occiput jusqu'aux vertèbres dorsales, & il l'emportoit ou bien il la traversonoit dans cette étendue, ou même dans toute sa longueur, avec une petite verge métallique, chanéllée & poussée dans le canal rachidien. Après ces opérations préalables, il ouvrait la poitrine, découvroit l'artère carotide ou la fémorale, & il voyoit ces vaisseaux & le cœur qui continuoient à battre. La circulation devoit, encore long-temps, & si l'on entretenoit artificiellement la respiration au moyen de l'insufflation pulmonaire, le cœur battoit avec régularité & beaucoup de force. (Exp. 1, 2, &c., p. 70, 71, &c.)

Après tous ces essais, la masse entière du cerveau fut même enlevée une fois à l'aide d'une ouverture pratiquée au crâne, & le cœur ne continua pas moins à battre avec plus ou moins de force, suivant que l'on recommençoit ou qu'on arrêtoit la respiration artificielle. (Exp. 1, p. 70.) Une demi-heure après avoir vidé le crâne de la masse cérébrale, & assez long-temps après avoir interrompu l'insufflation pulmonaire, les ventricules cessèrent de battre; mais en recommençant l'insufflation, on rendoit leur action manifeste.

Quand, dans toutes ces expériences, on ouvrait des grosses artères, le sang en jaillissoit par jets, avec les caractères veinoux si l'on n'entretenoit pas la respiration artificielle, & d'un beau rouge, ou avec l'apparence artérielle, si l'on pratiquoit l'insufflation (exp. 6 & 7, p. 72 & 73), ou bien alternativement brun & rouge, suivant qu'on interrompoit & qu'on reprenoit cette insufflation. (Exp. 8, p. 74.) Une demi-minute de celle-ci suffisoit pour redonner au sang sa couleur vermeille.

Déjà Haller avait annoncé que le mouvement du cœur paroît à peu près indépendant de l'influence nerveuse. « L'irritation des nerfs qui vont au cœur, assure-t-il, celle de la moelle de l'épine, le retournement de la tête, ne changent pas le mouvement du cœur, ne l'augmentent pas, & ne le réveillent pas quand il a cessé d'agir. Il arrive quelquefois que l'irritation de la moelle de l'épine cause une secousse dans les muscles, qui, pour un moment, troublent la circulation; mais cette secousse ne dure pas, &

le mouvement du sang reprend bientôt sa régularité. » (Supplément à l'art. SANG de l'Encyclopédie de Diderot & d'Alembert.)

M. Brodie avoit aussi annoncé, en rendant compte d'expériences qui confirment ces observations & celles de Kruikshank & de Bichat, que le cerveau n'est pas directement nécessaire à l'action du cœur, & que quand les fonctions du premier organe sont détruites, la circulation ne s'arrête qu'en conséquence de la cessation de la respiration.

M. Philip, qui a vu les mêmes phénomènes durer plus long-temps dans les grenouilles (exp. 10 & 11, p. 75 & 76), ne les a pas toujours observés pourtant sur les lapins; car il a vu très-souvent, au contraire, la circulation cesser entièrement dès que la moelle épinière avoit été tout-à-coup désempennée (exp. 9, p. 74). Il attribue cette cessation de la circulation à la perte du sang dans les opérations, & à l'excès du chaleur, & lorsqu'on n'a pas préalablement détruit la sensibilité par un coup porté sur l'occiput. Il pense que c'est au peu du grossier de la verge métallique dont il se servoit, qu'est due la différence des résultats obtenus par Legallois (exp. 22, p. 88), & il rapporte des faits à l'appui de cette opinion (p. 89 & 94).

M. Philip se trouve quelquefois en contradiction avec lui-même. C'est ainsi qu'après avoir écarté la privation subite de l'influence de l'encéphale & de son prolongement rachidien, pour expliquer la cessation de la puissance du cœur & de celle des vaisseaux, il affirme & conclut tout de suite que, *pendant l'influence nerveuse est susceptible d'agir comme un stimulus de ces derniers organes* (3^e conclus.), & encore comme *sedative*, même jusqu'au point de détruire leur puissance (4^e conclus.). (Voyez d'ailleurs les exp. 14 - 23 inclusiv., p. 80 - 90, & 26 - 28, inclusiv., p. 92 - 94.) Parmi les faits que rapporte notre auteur, pour prouver ces dernières assertions, je ne citerai que les suivants, parce qu'ils paroissent jeter du jour sur la mort subite produite par certains principes extrêmement délétères. Des lapins ayant été privés des sensatious & des mouvements volontaires par un coup porté sur l'occiput, & l'action du cœur étant entretenue alors par la respiration artificielle, le cerveau & la portion cervicale de la moelle épinière ou même toute la moelle épinière se trouvant à nu, & le thorax ouvert, on vit le cœur battre avec force & régularité; on appliqua alors de l'esprit-de-vin, d'abord sur la portion dépouillée de la moelle épinière, ensuite sur la surface du cerveau, & l'action du cœur fut immédiatement beaucoup augmentée, sans qu'elle le parût plus dans un cas que dans un autre: seulement elle l'étoit moins lorsque l'application se faisoit sur la portion lombaire de la moelle épinière (exp. 14 & 15). On obtient un résultat tout aussi marqué en agissant sur la seule par-

tie antérieure du cerveau. Mais si l'on enlève l'esprit-de-vin, pour appliquer une solution aqueuse d'opium ou de tabac, l'on observe que l'augmentation d'action du cœur a lieu à un bien moindre degré. Cette augmentation d'action est plus sensible quand elle est l'effet de l'opium que quand elle est celui du tabac; mais aussitôt ou presque aussitôt, l'action du cœur devient plus languissante que dans l'état ordinaire, surtout lorsqu'on emploie la dernière substance. Il suffit, pour redonner de l'activité au cœur, d'enlever, au moyen d'une éponge humide, la dissolution de dessus la surface cérébrale. (Exp. 16.)

Une expérience bien remarquable par son résultat, impossible à concilier avec les observations de Legallois, est celle-ci : le prolongement rachidien étant coupé près de la tête, & détruit dans toute sa longueur, au moyen de la verge métallique, l'esprit-de-vin appliqué à la surface du cerveau, avec les mêmes précautions que dans les expériences précédentes, produit sur l'action du cœur un effet tout aussi prompt & tout aussi marqué que si le prolongement rachidien étoit dans son état d'intégrité. (Exp. 23, p. 99.)

Depuis quelques années, plusieurs physiologistes croient que, lors de la mort, les sécrétions s'arrêtent autant par la privation de l'influence nerveuse que par toute autre cause, & qu'il suffit même d'interrompre cette influence dans un organe, pour en faire cesser la sécrétion. Comme les faits sur lesquels on veut fonder cette conjecture, éclairent la manière dont s'enchaînent les phénomènes de la mort, quand ses causes portent directement sur l'encéphale & le prolongement rachidien, je vais les énoncer succinctement, & je laisse au lecteur le soin de juger par lui-même.

Si on lie ou si l'on coupe les nerfs qui se distribuent à une partie où la circulation, entretenue par une respiration libre, conserve encore son activité, les sécrétions de cette partie, sa température propre & la plupart des phénomènes regardés comme chimiques diminuent ou s'affoiblissent. M. Brodie, de Londres, a particulièrement remarqué l'influence de la décapitation sur les sécrétions & sur la chaleur propre des animaux; & M. Charles Chossat, qui vient de répéter en partie les expériences du chirurgien anglais, & d'en vérifier, dit-il, l'exactitude, annonce pour résultat général des observations qu'il a pu faire à cet égard, que toutes les lésions du système nerveux qui affoiblissent le dégagement de la chaleur animale, agissent sur les sécrétions d'une manière analogue. (*Mémoire sur l'influence du système nerveux sur la chaleur animale. Collection des thèses, in-4°, de la Faculté de Paris, 1820.*)

Willis, Baglivi, Valsalva, Legallois; MM. Brodie, Dupuy, &c. &c., ont vu que la section ou la ligature des nerfs de la huitième paire (pneumogastrique), anéantit ou diminue la faculté de digérer, lorsque la section ou la ligature est pratiquée

au col, au-dessus des rameaux qui vont aux organes respiratoires; car, aussi que l'a découvert M. Magendie, & que l'a vu depuis M. Brodie, la digestion s'effectue très-bien encore quand on a en la précaution de couper les nerfs ou de les lier dans le thorax, au-dessus de ces mêmes rameaux; de sorte que la cessation de la digestion, dans le cas qui nous occupe, pourroit n'être qu'une suite de la lésion de la respiration. Quoi qu'il en soit, M. Dupuy fait mention particulière d'une abolition des sécrétions dans le canal alimentaire. (Voy. *Bulletins de la Société médicale d'émulation*, déc. 1816.) M. Wilson Philip rapporte aussi avoir coupé les nerfs de la huitième paire, & trouvé chez les animaux, après la mort, les aliments non digérés & distendant l'estomac & la portion voisine de l'oropharynx; mais ce qui doit surprendre, c'est qu'il prétend qu'on peut établir, au moyen du galvanisme, la fonction de la sécrétion abolie dans un organe par le fait de la section des nerfs. (Ouv. précité, conclus. XX.) Il faut, dit-il, pour obtenir ce résultat, après avoir coupé les nerfs de la huitième paire, que l'administration du galvanisme soit ménagée avec beaucoup de soin : alors les aliments sont trouvés, au bout de quelques heures, beaucoup mieux digérés qu'au bout de quelques jours, quand on a coupé un seul nerf; alors la dyspepsie est bien moins forte que dans les animaux que l'on abandonne, & la membrane muqueuse des poumons, trouvée plus rouge, plus injectée que dans les cas ordinaires, l'est moins cependant que dans les animaux qu'on n'a pas soumis au galvanisme. (Exp. 71 à 74.) Mais ces faits, s'ils sont bien exacts, prouvent-ils que l'influence nerveuse produit par le fluide galvanique rassemblé par le cerveau & la moelle épinière, & cavoyé dans les nerfs qui en faisoient les véritables conducteurs? J'avoue que j'ai de la peine à me le persuader, en admettant même qu'il existe un fluide galvanique. Pourtant je sais que le galvanisme réveille la contractilité musculaire après la mort, & je eroirai sur la foi de M. Philip, que cet agent fait développer du calorique dans les animaux, & que M. Brodie, qui a répété, sans en obtenir les mêmes résultats, les expériences relatives à l'influence du galvanisme sur la digestion d'animaux auxquels on a coupé les nerfs de la huitième paire à la région cervicale, n'a point suivi en tous points le procédé de M. Wilson Philip. (Voyez *The medico-chirurgical Journ. of London*, &c.; conducted by James Johnson. April 1820, vol. 2, p. 637 & suiv.)

Quoi qu'il en soit, la section ou la ligature des nerfs de la huitième paire, pratiquée au col, occasionne la mort par la lésion de toutes les fonctions des organes dans lesquels ces nerfs se distribuent, & en particulier parce que l'hémistase ne se fait plus ou ne se fait que très-imparfaitement. Telle est du moins la conclusion qu'il faut tirer des expériences faites par les auteurs que j'ai nommés, par

M. Duguytren, & par un grand nombre d'autres physiologistes.

On croyoit depuis long-temps que la température propre des animaux, qui est en raison de l'activité de leur respiration, dépendoit de la respiration. Mais M. Brodie a combattu ce sentiment par une suite d'expériences qui semblent y former une objection formidable, & dont l'exaditude a été vérifiée depuis par plusieurs physiologistes. Il annonce que lorsqu'on décapite un animal, & que, par des moyens artificiels, on maintient la respiration, il se forme dans les poumons la même quantité d'acide carbonique, & que cependant la chaleur ne se produit plus, & diminue plus vite dans cet animal que dans un autre de la même espèce qui a été tué de la même manière, mais dans lequel on n'a pas entreteçu artificiellement la respiration. Enfin, il me semble bien résulter des expériences de M. Brodie & de celles de MM. Willon Philip & Chiffart, que la température propre des animaux est plus intimement liée avec l'influence perçue ou de l'encéphale, qu'avec celle de tous les autres organes. Néanmoins on ne peut admettre que la chaleur animale se trouve sous la dépendance unique du cerveau ou de la substance nerveuse. (*Voyez CAUSEUR ANIMALE.*)

§. 4. D. *Mort subite dont les causes portent à la fois sur deux ou au moins de ces organes, le cœur, le poumon & l'encéphale.*

Quand on observe la mort des animaux sacrifiés pour nos tables, ou celle des hommes qui succombent très-rapidement, il est aisé de se convaincre, par les phénomènes qui se développent, lorsqu'on peut les distinguer & en suivre la succession, qu'il n'y a qu'un petit nombre de cas où la mort commence exclusivement par la cessation de la fonction de l'un de ces trois organes désignés. Toujours, avant la mort, l'atteinte portée à l'action de l'un, est ressentie par les deux autres; & par une influence réciproque, sur laquelle nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'ici, elle s'en trouve fortifiée, & accroît d'autant l'atteinte portée aux derniers.

Je m'explique. Supposons une asphyxie produite par un gaz très-peu respirable, c'est-à-dire, qui n'a point la propriété de donner au sang veineux, par l'acte de la respiration, les caractères & les qualités du sang artériel. Après avoir traversé les poumons & le cœur, le sang, dont l'élaboration a été très-imparfaite, n'est plus un stimulus suffisant pour le cerveau & les nerfs. Ces organes, à leur tour, ne permettent que des mouvements de respiration beaucoup trop foibles, & le cours du sang, embarrassé dans les poumons, en est considérablement ralenti. De cette manière le cerveau ne reçoit plus qu'un sang moins capable encore de l'exciter, qui, en le traversant leste ment & en s'y saturant, si je puis m'exprimer ainsi, des qualités veineuses, paralyse tout-à-fait

son action : dès-lors cesse tout mouvement de la respiration, & la mort s'effectue par la perte simultanée des influences nerveuses & artérielles. Voilà comment l'une des trois fonctions sur lesquelles repose à chaque instant la vie, ne s'exécute pas avec plénitude, les deux autres peuvent être tout-à-coup considérablement affaiblies, d'où la première n'est encore davantage, &c.

Je pourrais singulièrement multiplier les exemples, mais cet aperçu suffit à mon objet; d'ailleurs ils ont été indiqués dans les paragraphes précédents. Les fonctions du cœur, des poumons & du cerveau ne sont pas les seules qui soient dans une telle dépendance l'une de l'autre, que la suppression de celle-ci entraîne la perte de celle-là : chaque fonction se trouve ainsi liée à une autre, & la cessation d'une première en aine une seconde qui, à son tour, fait bientôt sur une troisième un effet analogue, jusqu'à la perte de toutes les fonctions, ou la mort complète. Ce lien est facile à concevoir quand on se rappelle que, dans l'état de santé, les aliments sont nécessaires pour que la digestion ait lieu, que celle-ci prépare l'hématose, l'hématose la nutrition, &c. &c. Les organes qui sont fournis à la triplex action, 1^o. du cerveau par les nerfs qu'ils en reçoivent; 2^o. du cœur, par la manière dont celui-ci leur envoie le sang, & 3^o. du poumon, par le degré variable d'élaboration que subit le sang dans son tissu, ont aussi une influence sur le cerveau par les nerfs, sur le cœur & sur le poumon gauche par le sang, en vertu de laquelle ils modifient les trois organes principaux & en font ensuite modifiés eux-mêmes.

La conclusion de cette section du chapitre, est que la vie ne peut subsister que par l'influence du sang artériel & par celle de l'encéphale.

SECTION II. *Mort accidentelle non subite.*

C'est celle qui n'est ni mort subite, ni mort sénile. Elle n'est point le résultat des progrès de l'âge comme la première, ni, comme la seconde, elle ne surprend pas tout-à-coup quand la santé paroit affermie ou le danger éloigné; mais elle est la suite ou la terminaison de différentes maladies, & elle arrive lorsque les symptômes & les accidents de celles-ci sont parvenus progressivement & ordinairement à un haut degré. Je dis ordinairement, parce que, dans un anévrysme de l'aorte, par exemple, il n'est point très-rare qu'elle surviene par la rupture du sac anévrysmal, lorsqu'on pouvoit encore ne pas la regarder comme imminente. Elle doit être alors autant attribuée à l'anévrysme qu'à la joie vive, qu'à l'accès de colère, &c.; qui a déterminé la rupture. Néanmoins, dans ce cas, la mort qui est produite comme il a été dit dans le chapitre précédent, doit être rapportée aux morts fulminantes dont les causes agissent directement sur le cœur.

La mort qui termine les maladies aiguës a lieu fréquemment dans le temps qui suit immédiatement

ment le période aligné aux crises, ou du moins elle commence à s'annoncer pour le médecin, à cette époque de la maladie, lorsque celle-ci, extrêmement grave de sa nature, ne marche point vers la guérison. Selon les partisans de la doctrine des crises, on observe souvent que la mort arrive lorsqu'il ne se fait aucune crise : *Est primum & maximum in morbis lethalis signum, quod sine crisi mors sit subsecutura, virum undeculitas,.... secundum verò, si nullum adfit signum vel minimum coctionis; & preter hæc si magnus sit morbus atque malignus, atque etiam celeriter moveatur: quum enim hæc adserunt, omnino absque crisi mors sequetur.* (Galen, *De Crisib.*, lib. III, cap. 10.)

Dans les fièvres intermittentes, c'est pendant le frisson que la mort survient presque toujours. Quelquefois néanmoins c'est durant la chaleur; mais alors cette chaleur ne parvient jamais à un degré considérable. Si Lind a vu arriver la mort dans ce dernier stade des fièvres pernicieuses, Cullen n'a vu mourir aucun malade lorsque l'accès de chaud étoit complètement formé; ce qui est confirmé, dit Boissacq, l'observation des Anciens, qu'il n'y a pas de danger tant que le pouls est plein & fort, comme on le remarque dans l'accès du chaud. (Voyez *Elem. de méd. pratique*, traduits par Boissacq, n°. 25.) Les Anciens avoient aussi remarqué que dans les maladies dont les accès se redoublent, viennent à des époques périodiques, c'est à l'heure de ces accès ou de ces redoublements que les malades sont le plus exposés à périr.

J'ai observé que, dans les maladies marquées par une exaspération régulière ou irrégulière des symptômes, c'est, en général, dans le paroxysme même que la mort arrive, au commencement si le malade est tout-à-fait épuisé, au milieu en vers la fin s'il l'est moins.

Toutes les maladies aiguës peuvent se terminer heureusement ou d'une manière funeste à toutes leurs périodes; & la justesse de cet aphorisme d'Hippocrate, *morbum acutorum non omnino tunc sunt prædictiones, neque salutis, neque mortis*, se trouve confirmée par la pratique journalière des médecins.

Il n'en est point de même pour les maladies chroniques; elles se terminent presque toujours par la mort dans les périodes avancées, & l'on peut pronostiquer cette fin quand la maladie, parvenue au terme de sa plus grande intensité, est le résultat d'une lésion organique connue. On voit fréquemment la mort arriver, lorsque les symptômes redoublent ou viennent de redoubler, & lorsque l'affection a repassé au caractère aigu. Telle est du moins la marche ordinaire dans les inflammations chroniques ou les maladies dans lesquelles l'inflammation entre comme élément principal; tandis que, dans plusieurs autres, les malades paroissent être continuellement entraînés par la même pente vers le

tombeau, & se succombent qu'après un long épuisement des forces, qui marche chaque jour, pour ainsi parler, d'un pas égal, sans qu'aucun mouvement apparent précipite ou retarde la funeste terminaison.

Parmi les maladies chroniques, il y en a plusieurs dans lesquelles la mort arrive brusquement, par une étreinte qui vient compliquer & aggraver considérablement la première affection, ou bien quelquefois qui arrête la respiration & la circulation. J'en ai déjà cité deux exemples, en parlant de la rupture d'une anévrysme de l'aorte, du cœur, &c.

Dans presque tous les cas de la mort accidentelle non subite, la respiration est la fonction qui cesse la première, même lorsque la mort est produite par ces maladies, telles que le typhus, qui paroît consister principalement dans une atteinte profonde de la puissance nerveuse. Aussi, dans l'agonie, un des phénomènes qui annoncent le plus sûrement les derniers efforts d'une vie qui va succomber, est le râle qui se fait entendre dans les mouvements d'inspiration & d'expiration, & dont le son est produit par le passage de l'air à travers des mucosités qui obstruent les voies aériennes. L'obstacle mécanique que ces mucosités apportent au passage de l'air, rend toujours de plus en plus difficile l'entrée de celui-ci dans les poumons, & la sortie de la poitrine. (Voyez *Râle*, *STERTOR*.) En même temps toutes les forces diminuent, les extrémités se refroidissent, les poumons se gorgent de sang, celui-ci ne les traverse plus avec la même facilité qu'auparavant: dès-lors le pouls est faible, ralenti, irrégulier, intermitte; les mouvements de la respiration sont tantôt lents & petits, & d'autres fois grands & convulsifs. Dans le dernier cas, ils peuvent faire disparoître momentanément la suffocation; en chassant avec l'air une partie des mucosités; mais bientôt de nouvelles mucosités s'amassent, des mêmes efforts ont lieu pour les expulser, & ainsi de suite jusqu'à ce que ces efforts soient insuffisants, & que, tout-à-coup, après ordinairement une grande & bruyante expiration (le dernier soupir), le cœur paroisse avoir cessé de battre, tout seulement & tout mouvement soient perdus, & le visage qui, pendant les convulsions de la respiration, pouvoit être rouge & injecté, se contre de la pâleur de la mort.

Le râle se manifeste principalement dans la pneumonie, le catarrhe suffocant & dans une violente apoplexie. Il n'est point très-rare que, dans la première de ces maladies, il se développe, lorsqu'on ne remarque encore aucun autre signe fâcheux, & qu'au bout de quelques heures cependant, la mort ait lieu. Lorsque le râle reconnoît pour cause une forte attaque d'apoplexie, il paroît tenir à la faiblesse des mouvements respiratoires; peut-être tient-il aussi à une paralysie plus ou moins complète des muscles du larynx. Quoi qu'il en soit, il est alors un des symptômes les plus redoutables;

& précède de peu la mort. Enfin, le râle ou la respiration stertoreuse qui n'est point spasmodique, & qui s'accompagne de la suppression de l'expectoration, annonce ordinairement une mort très-prochaine.

Dans tous les cas dont je viens de parler, l'ouverture des cadavres prouve, en montrant du sang accumulé dans les veines, dans les cavités droites du cœur & l'artère pulmonaire, que la cessation de la respiration a précédé la cessation de l'action du cœur.

Il est encore des maladies qui occasionnent la mort, sans qu'on puisse dire quel est celui des trois organes principaux par lequel elle commence à s'effectuer, ou celui qui se trouve principalement attaqué; il ne faut pas conclure; par exemple, que dans tous les cas d'apoplexie, la mort commence par l'encéphale, ou même qu'elle a lieu parce que cet organe est principalement attaqué. Je ne revendrais pas à cet égard sur ce qui a été dit ailleurs. J'ajouterai seulement que sur ce point, comme sur tant d'autres, il faut rester très-sévère dans le doute.

Il se présente ici une question importante. La mortalité qui est la conséquence de nos maladies, est-elle uniforme à toutes les époques de l'année & à toutes celles du jour? C'est à l'article PROSAUTRES DE LA VIE (voyez ce mot) que sera examinée la première partie de cette question; mais la seconde rentre nécessairement dans mon sujet, & je dois dire qu'on a reconnu que la mortalité est toujours plus considérable le matin, après le lever du soleil, ensuite le soir, aux heures du son coucher; qu'en été elle augmente un peu vers deux à trois heures après midi; qu'on meurt moins souvent de dix heures du soir à trois heures du matin; & enfin qu'il meurt plus de personnes le jour que la nuit. Cette dernière circonstance doit être en partie attribuée aux accidents indépendans de la marche de nos maladies, & qui nous font périr subitement. On peut enlever à ce sujet la thèse inaugurale de M. Viré, laquelle est intitulée : *Ephémérides de la vie humaine, ou Recherches sur la révolution journalière & la périodicité de ses phénomènes dans la santé & dans les maladies* (in-4°, Paris, 1814).

On croit avoir observé sur les côtes de l'Océan continental, que la plupart des malades qui succombent à leurs affections, expirent dans le temps du reflux ou des marées descendantes.

CONCLUSION.

Il faut toujours considérer la mort comme produite par un changement dans les conditions nombreuses voulues par la nature, pour l'intégrité des organes & l'entretien des fonctions ou propriétés qui caractérisent la vie. Ainsi, dans l'asphyxie, les organes cessent leurs fonctions parce que le sang noir, qui les pénètre alors, les prive

d'une condition nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Si le sang rouge ou respiré leur est rendu à temps, elles recommencent, parce que les organes le trouvent replacés dans les conditions nécessaires pour qu'elles puissent avoir lieu. Ce sont donc les actions organiques qui se réveillent, se raniment, & non cet être abstrait fantaisique, nommé principe vital, supposé cause unique, première de tous les phénomènes de la vie, & imaginé pour les expliquer. Ainsi lorsque, pour secourir un asphyxié, on l'expose au grand air, on exerce sur lui des frictions, on lui injecte de l'air dans ses poumons, on remet le sang dans les conditions prescrites pour que ce fluide exerce & entretienne l'action des organes, particulièrement celle du cerveau & des nerfs; voilà pourquoi les phénomènes de la vie recommencent. Si, dans les cas de mort apparente, produite par la strangulation ou par une congélation sanguine vers l'encéphale, sans extravasation de sang dans la substance de celui-ci, la saignée de la jugulaire, employée de suite, est plus efficace que celle du bras ou du pied, c'est parce qu'elle remet plus promptement le cerveau dans les conditions dans lesquelles il ne peut exercer ses fonctions. Si la lésion est trop grave, & pour peu qu'on attende, il est impossible de rétablir ces conditions, & la mort est irrévocable.

Il est rare qu'un accès fébrile soit suivi de syncope; cependant, le cœur auroit bien à dire d'être fatigué qu'après une palpitation; mais la syncope n'a pas lieu, parce que, dans la fièvre, le système capillaire, aussi actif que le cœur, lui renvoie autant de sang qu'il en avait reçu. Les frictions, les éloques dans les mains, &c., employées dans la syncope, ne peuvent rien pour ranimer l'action du cœur, & cependant leur succès est souvent évident; c'est qu'elles raniment l'action des capillaires, & que, consécutivement, le cœur recevant plus de sang, reconvoit peu à peu sa contractilité; il pourroit bien être même que la syncope qui suit un bain froid, &c., dépend primitivement d'un manque d'action des capillaires, & par suite, de l'inaction du cœur. (De la vie, par Ph. Loret, in-8°, Paris, 1818.) Je cite avec plaisir, sans cependant l'adopter absolument, ce passage d'un jeune médecin, prématurément enlevé à la vie & à la science, & qui pensoit que beaucoup de syncopes qui suivent certaines palpitations ne dépendent pas, comme on le dit, de la fatigue de cet organe, mais bien de ce qu'il ne reçoit plus par les veines autant de sang qu'il vient d'en envoyer par les artères.

Je pourrais rapporter ici un très-grand nombre d'autres faits, desquels il résulteroit toujours que la mort est produite par un changement dans les conditions voulues par la nature pour l'intégrité des organes, & qu'elle ne dépend pas, comme on le répète partout, de ce que le corps est abandonné par le principe vital.

CHAP. IV. Effets ou suites de la mort.

Dès que la circulation, la respiration & la puissance nerveuse ont cessé d'animer le corps d'un animal, ou, en d'autres termes, dès que les fonctions du cœur, des poumons, de l'encéphale & de ses dépendances (ou bien des parties qui, dans les animaux inférieurs, représentent ces organes) viennent de s'éteindre, l'animal est mort : toutes les autres propriétés qui caractérisent la vie cessent entièrement dans un laps de temps très-court ; Il n'a été parlé jusqu'ici que de l'ordre dans lequel s'arrêtent les phénomènes de la vie ; mais il faut déterminer la progression suivant laquelle les dernières traces de celle-ci disparaissent.

On peut diviser les suites de la mort sous deux titres, 1°. les phénomènes qui commencent immédiatement après la cessation de la circulation, de la respiration & de la puissance nerveuse, & cessent en quelque sorte la diminution graduelle d'un restant de propriétés vitales, inhérentes à divers tissus ; & 2°. les phénomènes qui se manifestent plus tard, & sont le résultat de causes purement chimiques.

§. 1. Sur la contractilité musculaire.

Quoiqu'il tous les phénomènes nerveux & cérébraux cessent instantanément & simultanément lors de la mort, la contractilité musculaire néanmoins peut toujours être rappelée dans quelque temps. P. II. Nysten a entrepris une série d'expériences, afin de connaître l'état & la durée de cette propriété après la mort. (Voy. *Expér. galvaniques sur les org. musculaires*; *Collect. des thèses in-8°. de la Faculté de Paris, en M.D. Recherches de Physiol. & de Chimie pathologiques*, in-8°. Paris, 1814.) Il résulte de ses expériences, que chez l'homme sain, soumis au supplice de la guillotine ou de la décapitation, les organes musculaires ou pressurés tels ; cessent de se contracter ; sous les stimulus galvaniques, dans l'ordre suivant :

- 1°. Le ventricule aortique du cœur.
- 2°. Les intestins & l'estomac. Le gros intestin perd la faculté contractile quarante-cinq à cinquante-cinq minutes après la mort ; l'intestin grêle, quelques minutes plus tard ; l'estomac ; peu de temps après l'intestin grêle.
- 3°. La vessie urinaire, qui, quelquefois, cependant, perd la contractilité aussitôt que l'estomac.
- 4°. Le ventricule pulmonaire du cœur, sous les contractions se contractant, en général, plus d'une heure après la décapitation.
- 5°. L'œsophage, qui cesse de se contracter environ une heure & demie après la décapitation.
- 6°. L'iris.

7°. Les muscles de la locomotion. En général,

ceux du tronc perdent leur contractilité avant ceux des membres, & les muscles des membres abdominaux avant ceux des membres thoraciques. Mais cette propriété s'arrêtant dans ces organes d'autant plus tard qu'ils ont été moins exposés au contact de l'air. Lorsqu'ils ont été à l'abri de celui-ci, ils ne perdent leur contractilité que plus de quatre heures après la mort, & quelques-uns qu'après sept à huit heures. L'air extérieur domine aussi beaucoup, quoique d'une manière moins marquée, la contractilité des autres organes musculaires.

8°. Les oreillettes, & particulièrement l'oreillette pulmonaire ou droite. La portion de la veine cave qui avoisine cette dernière, se contracte aussi par le galvanisme, & quelquefois pendant aussi long-temps que l'oreillette elle-même.

Nysten a étendu ses expériences à plusieurs espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles & de poissons, qu'il décapitoit, ou chez lesquels il coupoit le prolongement rachidien, entre l'occipital & la première vertèbre. L'ordre dans lequel les organes ont perdu leur contractilité, différait peu, si l'on excepte les oiseaux à gesser ; l'estomac cessait de se contracter avant les intestins. Dans toutes les classes, le conduit alimentaire perdoit sa contractilité avant les muscles de la volonté, & l'oreillette pulmonaire ou la seule oreillette, quand elle est unique, étoit l'*ultimum moriens*.

Il résulte des recherches du même médecin, assez conformes dans leur résultat à des recherches précédemment faites par M. le professeur Hallé, que l'aphysie par le gaz acide hydro-sulfurique (hydrogène sulfuré) porte à la contractilité une atteinte très-forte, surtout à celle du cœur. M. Hallé avoit aussi constaté que l'aphysie occasionnée par le gaz ammoniac & la vapeur du charbon, affoiblit sensiblement la contractilité des organes musculaires, plus que l'aphysie par strangulation, par privation d'air, & par les gaz hydrogène, hydrogène carboné, acide muriatique oxygéné, &c. Un des phénomènes les plus constants, observé par mon ami F. Delaroché, chez les animaux qui venoient de succomber dans une étuve, a été l'extinction presque complète de la contractilité du cœur ; des intestins & des muscles soumis à l'empire de la volonté. (Voyez *Expér. sur les effets qu'une forte chaleur produit sur l'économie animale*; *Collect. des thèses in-4°. de la Faculté de médecine de Paris*, 1806.) John Hunter avoit remarqué la même chose chez des animaux rendus à la vie, & depuis, cette observation a été confirmée par beaucoup d'autres. Il a été impossible à M. Magendie de trouver aucun trace de la contractilité musculaire dans les muscles locomoteurs d'un chien vigoureux qu'il fit tomber roide mort, en touchant la langue avec l'extrémité d'un petit tube de verre trempé dans

Rr

rement dans un flacon contenant quelques gouttes d'acide phosphorique pur.

Un résultat général & important des expériences de Nysten, c'est que la durée de l'excitabilité après la mort, est, pour les diverses classes d'animaux, en raison inverse de l'énergie musculaire développée pendant la vie : ainsi, les oiseaux, par exemple, perdent leur excitabilité très-peu de temps après la mort ; & les reptiles & les poissons, beaucoup plus longtemps.

Nysten est encore le seul qui ait examiné avec l'encre de son influence des maladies sur la contractilité musculaire de l'homme après la mort. Il n'a pu pouvoir tirer des faits qu'il a observés, les conclusions suivantes :

1°. Les maladies influent sur la contractilité musculaire, plutôt par leur marche & leur durée que par leur nature.

2°. Plus les maladies sont longues ; moins cette propriété dure après la mort ; & , parmi les maladies chroniques, ce sont celles dans lesquelles la nutrition est le plus lésée, qui y portent la plus forte atteinte : telles sont surtout les phthises pulmonaires, les squirres de l'estomac, &c., qui épuisent lentement & progressivement les forces, & font périr dans le marasme. Lorsque la pleurésie, une fièvre grave, &c., viennent accélérer la terminaison funeste de ces maladies, la contractilité est beaucoup plus forte après la mort ; & persiste bien plus long-temps que dans le cas où ces mêmes maladies suivent la marche lente qui leur est ordinaire.

3°. L'infiltration qui accompagne beaucoup de maladies n'a aucune influence sensible sur la contractilité, lorsqu'elle n'occupe que le tissu cellulaire sous-cutané ou étranger aux muscles ; mais, lorsqu'elle s'étend entre les fibres musculaires elles-mêmes, elle peut être plus nuisible, si elle est considérable, à la force & à la durée de la contractilité, que le marasme lui-même.

4°. A la suite des maladies les plus funestes à la nutrition, & par conséquent à la contractilité, celle-ci ne se conserve souvent que pendant une ou deux heures après la cessation de la vie générale ; mais lorsque la mort est déterminée par des maladies très-aiguës ; comme les hémorrhagies, l'asthme convulsif dans l'hydrothorax, &c., la contractilité se conserve aussi long-temps qu'après des morts violentes.

5°. Il y a des maladies qui portent une atteinte particulière à la contractilité de diverses parties du cœur. Nysten a vu, dans quelques cas où la ténacité des cadavres à la putréfaction permet de les ouvrir plus promptement que de costume, les mouvements de cet organe cesser sous l'influence du galvanisme, lorsque les muscles de l'appareil locomoteur se contractoient encore avec force.

6°. Les sujets dont les muscles sont les plus volumineux ne sont pas, en général, ceux qui conservent le plus long-temps leur contractilité

après les maladies très-aiguës qu'un mort, pour ainsi dire subite, a terminées. Dans ces sujets on ne peut ordinairement ramener l'action musculaire douze à treize heures après la mort, tandis qu'on le peut souvent au-bout de quinze à vingt heures dans les cadavres des personnes qui ont succombé à des maladies beaucoup moins aiguës, dans lesquelles il y a eu un commencement d'amaigrissement.

7°. A la suite des maladies dites *fièvres adynamiques*, la contractilité présente beaucoup d'énergie, & persiste aussi long-temps que chez des sujets morts d'autres maladies aiguës, qui n'avoient pas été accompagnées de la prostration des forces : conclusion opposée à l'opinion générale.

8°. A la suite des apoplexies, les organes contractiles, sans en excepter ceux qui reçoivent directement leurs nerfs du cerveau, sont aussi sensibles au galvanisme du côté paralysé que du côté sain.

Cette dernière observation, que la théorie n'aurait pas fait pressumer, est une des plus intéressantes. Ce phénomène rapproché de l'énergie des contractions, après les fièvres dites *putrides* ou *adynamiques* ; de la longue durée des contractions que déterminent des stimulans mécaniques appliqués aux muscles, de la très-courte durée des contractions, qui résultent des mêmes stimulans portés sur les nerfs, &c. &c., & enfin de la sensibilité au galvanisme, que l'on dit avoir observée dans la lymphe du sang ; cette dernière observation, dis-je, tend à prouver que la contractilité est une propriété inhérente à la fibre musculaire.

Quelle que soit la maladie à laquelle ait succombé une personne, c'est en vain que l'on voudrait réveiller la faculté contractile, lorsque le temps nécessaire pour le développement de la roideur cadavérique s'est écoulé. (Voyez Mour & Nysten.) Nysten a remarqué que cette faculté s'acquiescit plus promptement dans un milieu humide & froid, que dans un milieu sec & d'une température moyenne. Mais on ne peut encore, à cet égard, poser des règles générales : fixer la dépendance mutuelle de la contractilité dans les cadavres & de la chaleur (simple des organes) sera un objet nouveau de recherches. Toutefois on peut avancer, comme vérité générale, que l'aptitude des muscles à se contracter, subsiste tant que le corps conserve sa chaleur & sa mollesse naturelles.

On croit que la contractilité musculaire se conserve en général plus long-temps dans les cadavres des enfans que dans ceux des adultes, & dans ces derniers plus que dans ceux des vieillards. Ce qui vient d'être dit ne confirme pas cette conjecture, du moins pour ce qui concerne les enfans, dont le corps, après la mort, se refroidit plus vite que celui des grandes personnes.

S. 2. Sur la circulation.

La circulation n'est-elle arrêtée d'une manière soudaine & absolue dans tout le cercle circulatoire, par la cessation des contractions du cœur? Plusieurs physiologistes, qui regardent cet organe comme le seul mobile de la circulation, le pensent; d'autres, au contraire, veulent que dans les vaisseaux capillaires, le mouvement du sang soit indépendant de l'action du cœur, & même que ces vaisseaux conservent quelque temps leur action après la mort.

La vérité de cette dernière opinion semble démontrée pour les reptiles, tels que les grenouilles & les salamandres, dont on arrache le cœur & dont on voit néanmoins le cours du sang se poursuivre toujours bien pendant assez long-temps, non-seulement dans les capillaires, mais encore dans des artères & des veines d'un très-petit calibre. On ne pense pas qu'il en soit de même chez les mammifères. Toutefois, M. Wilson Philip, rapporte avoir lié sur un lapin, les troncades artérielles au voisinage du cœur, & avoir ensuite fait l'analyse de cet organe; au bout de six quarts d'heure, si l'on le voit, on voyoit distinctement, à l'aide du microscope, le sang se mouvoir fortement dans quelques vaisseaux très-déjà de la cavité retirée de l'abdomen. (*Ann. ch., expér. 65, p. 193.*)

M. Philip a-t-il bien observé ce qu'il raconte? Cela étant, on est bien porté à croire que la durée du phénomène varie suivant le genre de mort & les circonstances qui l'accompagnent & la suivent. Ainsi l'on doit présumer que la circulation capillaire ne dure pas aussi long-temps après la mort sentie ou après la mort qui termine le scorbut & les maladies d'épuisement, supposé qu'elle persiste alors quelques instans, qu'après la mort foudroyante; encore, lors de cette dernière, certaine asphyxie, une hémorrhagie, la suffocation rapide du calvaire, &c. &c., doivent bien cesser plus tôt le phénomène.

S. 3. Sur l'absorption; la transfusion & l'imbibition.

L'absorption se continue-t-elle quelque temps après la mort? Morgagni, Grævius, Malpighi, Bichat; M. le professeur Delgouttes; &c., ont observé, au voisinage des cavités hydropiques, sur des sujets morts depuis quelques heures, des vaisseaux lymphatiques remplis ou qui se remplissent d'un fluide transparent semblable à celui qui forme l'amas de sérosité. Mais de pareils faits, auxquels on pourroit ajouter qu'il est plus difficile d'apercevoir & d'inspicer les vaisseaux lymphatiques sur des cadavres un peu isolés que sur d'autres, permettent-ils que l'absorption se continue absolument par des mêmes fibres & de la même manière que pendant la vie?

Qu'il en soit, M. Magendie vient de lire, à l'Institut de France un Mémoire extrêmement curieux, duquel il résulte que, même pendant la vie, l'absorption générale, & en particulier celle des veines, se fait en partie par le mécanisme de l'attraction capillaire ou par imbibition. Quelque temps auparavant, M. Edwards avoit tiré, de ses expériences sur les Extractions, la conclusion que, dans ces animaux vivans, tous les tissus mous sont susceptibles d'une sensible absorption. J'ai très-souvent vérifié sur des salamandres aquatiques, qu'elles fussent vivantes ou qu'elles fussent mortes, qu'on peut à volonté voir augmenter ou diminuer considérablement le volume de leur corps, en les plongeant dans l'eau ou en les retirant pour les mettre dans un air sec; & en moins d'une heure, la différence est très-sensible.

M. le professeur Claudius admet que la ténacité persiste quelque temps après la mort, dans les vaisseaux artériels & dans les vaisseaux capillaires; ce qui, dit-il, les rend susceptibles d'exercer encore quelque action sur la progression des fluides. (*Table synoptique des phénomènes cadavériques.*)

Il paraît donc résulter de ce qui précède, que l'absorption (considérée abstraction faite de son mécanisme) continue à s'exercer quelque temps après la mort; mais, en résumé, il n'en faut de beaucoup que nous ayons lu ce point des données satisfaisantes.

Les fluides renfermés dans des vaisseaux ou réservoirs ne paroissent pas se transfuser pendant la vie, & ce finissent cependant aussitôt après la mort. Ainsi, lorsque la vie est anéantie, la bile colore bientôt en jaune-vertâtre la portion de l'intestin colon, qui est en contact avec la vésicule biliaire. Moins d'un jour, suffit quelquefois pour produire le phénomène, qui est purement cadavérique, puisqu'on le cherche en vain dans les animaux vivans & dans ceux qu'on vient de tuer. On observe encore quelquefois sur l'estomac des cadavres, une large tache d'une couleur rougeâtre ou d'un brun clair, qui correspond à la portion de foie ou de la rate qui appuie sur ce viscère & en trace exactement la forme. Mais ces effets & tous ceux analogues, dus à la porosité des tissus, trouvent dans la vie un obstacle à leur production. On les remarque principalement lors de la putréfaction commençante: Avant que cette dernière se manifeste, le trajet des veines superficielles est souvent déjà indiqué par des lignes rougeâtres ou brunes.

La flaccidité des yeux qui commence très-tôt, vient à se manifester très-peu d'heures après la mort, et aulli un effet de la transfusion des humeurs de ces organes à travers leurs membranes. Il en est de même des épanchemens fibreux ou sanguinolens qui se font dans le tissu cellulaire des parties les plus molles, on dans les cavités splanchniques des cadavres; ils sont

l'effet de l'imbibition des tissus & de la pesanteur des fluides, qui tendent toujours à se porter dans les parties les plus basses. Ou fait que, pendant la vie, beaucoup d'infiltrations de sérosité dans le tissu cellulaire des membres, sont dues aux mêmes causes.

§. 4. Chaleur animale ou température propre.

Elle diminue progressivement à dater de l'instant de la mort, & bientôt elle est tout-à-fait dissipée. Dans quelques cas, la diminution de température, dont il sera aussi parlé à l'article MORT APPARENTE (voyez ce mot), s'observe déjà dans les derniers instans de la vie, ainsi que j'en ai rapporté des exemples. Est-il vrai que les jeunes gens conservent plus long-temps que les autres, après leur mort, des restes de chaleur vitale? M. Richerand l'assure, & il cherche à l'expliquer en disant que les tonicités s'éteignent moins rapidement chez eux dans les vaisseaux capillaires, & que les combinaisons, d'où naît le dégagement du calorique, se continuent encore quelque temps après que la vie est éteinte. La même cause, ajoute-t-il, fait que les cadavres des personnes mortes subitement sont encore chauds, tandis qu'un froid placé à l'aisselle ou qu'une longue maladie a conduits à la mort, par la destruction lente, graduée & enfin totale des propriétés vitales. (*Nov. Elem. de Physiol.*, t. I, p. 429 de la 7^e édit.)

La chaleur se produirait donc encore quelque temps, mais toujours à un moindre degré, après que les fonctions du cerveau, du poumon & du

cœur sont éteintes. Quoiqu'il en soit, il est bien certain que, toutes choses égales d'ailleurs, les cadavres de ceux qui ont succombé à une apoplexie, à une asphyxie par strangulation, par la vapeur du charbon, & l'on prétend, à la peste & à certaines fièvres, perdent leur chaleur bien moins vite que les autres. C'est le contraire pour les animaux qui meurent d'hémorrhagie.

Selon M. Brodie (*Transact. philosoph.*, année 1811 ou 1812), Wilson Philip (*Ouv. précité*) & Charles Chossat (*Mém. sur l'influence du syst. nerv. sur la chaleur animale; Collect. des thèses in-4^e de la Faculté de Paris*, 1820), qui regardent la chaleur animale comme placée sous l'influence immédiate du cerveau & des nerfs, les animaux qui périssent par la décapitation, par la section de la moelle épinière, par un coup violent porté sur le crâne, par le narcotisme, se refroidissent très-promptement après la mort, & d'autant plus vite que celle-ci est moins subite. M. Chossat a même cru observer, dans ces derniers cas, que les animaux périssent avec tous les caractères de la mort par le froid.

Ce dernier médecin a cherché à déterminer la marche du refroidissement après la mort, pendant toute la durée auquel il plaçoit à demeure, dans le rectum, un thermomètre centigrade enfoncé à une profondeur de quinze à dix-huit centimètres. Les résultats d'une expérience faite sur un vieux chien de vingt-quatre pouces de long, tué par une syncope à la suite d'une section de la moelle épinière, entre les deuxième & troisième vertèbres dorsales, ont été les suivans :

Température de l'animal. Température du lieu.

A l'instant de la mort.	40° 5.	16° 5
Fin de la 1 ^{re} heure.	38° 7.	18° 7
— 2 ^e	36° 1.	19° 5
— 3 ^e	35° 9.	20° 0
— 4 ^e	31° 7.	20° 7
— 5 ^e	29° 7.	20° 7
— 6 ^e	28° 3.	20° 9
— 7 ^e	27° 4.	20° 8
— 8 ^e & 9 ^e	25° 7.	20° 0
— 10 ^e & 11 ^e	25° 9.	19° 8

Ce tableau offre donc une grande différence dans la vitesse du refroidissement, entre les premières & les dernières heures de l'expérience. En partageant en deux parties à peu près égales la totalité de l'abaissement, on trouve que pour s'abaisser de 40° 5 à 31° 7 (= 8° 8), il a fallu 5 heures 50, & de 31° 7 à 25° 9 (= 7° 8), il a fallu 7 heures.

§. 5. Sur le sang.

Immédiatement après la mort on trouve encore du sang liquide dans le cœur, les artères & les

veines; mais, à mesure que les cadavres perdent de leur chaleur & de leur souplesse, la quantité du sang diminue & il se coagule; enfin, lorsque le corps est refroidi & roide, on ne peut guère apercevoir de sang, excepté toutefois dans les ventricles, les oreillettes & les veines caves, où il est en fillos.

Puis suit, en général, les changemens qui arrivent au sang dans les quinze premières heures après la mort. Ils sont loin d'être uniformes, car ils offrent des différences dans tous les sujets. On peut avancer, à cet égard, que l'état du sang participe toujours de celui dans lequel il était

pendant les derniers momens de la vie, & de la tendance qu'il a à perdre la couleur vive, à devenir brunâtre & si le coagulum des qu'il est d'être soumis à l'action circulaire.

Je vais indiquer les divers états sous lesquels il se présente dans les cadavres d'hommes qu'on ouvre vingt-quatre heures après la mort.

A. Si la mort a été produite par de longues maladies; qui avoient amené la diathèse scorbutique, on trouve dans les cadavres un sang très-fluide & décoloré. Il est également fluide, mais noir, assurément, chez les personnes mortes avec le scorbut ou de maladies dites *febriles putrides*. On dirait, dans tous ces cas, qu'appauvri, dégénéré par la maladie, l'espace de dissolution a toujours été déterminée par lui. Ce qui tend encore à confirmer cette idée, trop répétée peut-être aujourd'hui, c'est qu'on voit très-fréquemment, à l'ouverture des personnes qui ont succombé à une maladie de courte durée, surtout à une violente inflammation & si la mort a eu lieu dans les premières périodes, tout le sang pris en caillots consistans comme ceux-ci. (Voyez particulièrement moi Morgagni, *de sedibus & causis morb. epist. VII. art. 15*; XX, 11, 4^{re} XXI, 19; 27, 34, 35, 45, &c.) *Sanguis rubiginosus confusus, debilius autem tenuis*, est un axiome en médecine. On prétend que le sang est plus épais dans les cadavres de ceux qui sont morts, durant le frisson de la fièvre; qu'à une autre période de maladies fébriles: j'ai lu quelque part, que Schwilghe avait reconnu que l'usage des saignées fixes donnoit au sang une liquidité telle qu'il ne se coaguloit plus par le refroidissement, ni dans les cadavres ni dans le vase qui l'avoit reçu pendant la saignée. Quoi qu'il en soit de ces deux dernières assertions, les espèces offrent fréquemment de l'analogie entre l'état du sang dans les cadavres qu'il couvrait, & celui du sang qu'ils avoient fait couler de la veine ou vu sortir par différentes hémorrhagies, dans les derniers temps de la maladie.

Dans la plupart des vaisseaux sanguins, particulièrement des artères, on ne voit plus ou presque plus de sang; une sorte de rosee ou d'humidité terreuse lubrique seulement, la surface interne vasculaire. On trouve toujours cependant du sang accumulé dans les grosses veines, dans les cavités droites du cœur & dans toutes les branches de l'artère pulmonaire, jusqu'à l'arrêt durant les derniers instans de la vie, & où il se présente très-souvent des caillots blancs & tremblotans, sur lesquels je reviendrai un peu plus loin. Toutes les fois que l'agonie est longue, vive dissipée & suffocation, il y a, ainsi qu'a été observé, M. Cœussier, indiqués dans les veines de l'encéphale & du rachis. Mais dans tous ces cas le sang est ordinairement si peu quantifié, relativement à sa quantité totale pendant la vie, qu'il faut bien admettre qu'une portion de sa partie la plus fluide, la plus aqueuse, l'on figuri, s'est évacuée, a pu être trouvée men-

branes des vaisseaux. Néanmoins le tissu cellulaire environnant n'en offre pas d'abord de traces certaines; plus tard, surtout lorsque l'apoplexie & la putréfaction ont commencé, ce tissu est rougeâtre autour des veines, & l'on trouve souvent, dans les cavités planchéniques, une floraison comme fongueuse.

Le couleur du sang, si différente pendant la vie, dans les systèmes vasculaires à sang respiré & à sang non respiré, c'est-à-dire à sang rouge & à sang noir, n'y offre point de différence sensible bien constante après la mort. Il est même souvent de voir du sang caillé avec des couleurs variées dans le même vaisseau; mais en général, caillé ou non caillé, sa couleur est brunâtre ou noirâtre.

B. Si la mort est subite, l'état sous lequel se présente le sang dépend principalement de l'espèce de maladie ou d'accident qui cause la mort. Est-ce une hémorrhagie? le cadavre est, pour ainsi parler, ex-sanguis. Est-ce une apoplexie sans épileptique? les vaisseaux du cou, de la tête, mais surtout de l'encéphale, artères & veines, sont distendus d'un sang ordinairement pris ça & là en masses molles, de consistance de gelée, & disséminés entre les dugis. Est-ce une asphyxie? J'ai dit plus-haut, dans cet article, que le sang se trouve accumulé en grande quantité dans l'artère pulmonaire, les deux droites de cœur, les veines crurales & celles qui s'y rendent. On peut alors en trouver dans toutes les parties. Si l'asphyxie a été produite par les gaz oxyde de carbone & hydrogène sulfuré, il est très-noir & très-fluide, &c.

On a, de puis long-temps, signalé la mort subite par la foudre, comme n'étant point suivie de la coagulation du sang.

Est-il vrai, ainsi que l'assure J. Hunter (*Traité sur le sang, l'instantanéité*, &c., traduit de l'anglais par J. Deber, 1783, p. 45), qu'il en soit de même à la suite d'une mort subite causée par un coup violent porté sur l'épigastrique? J'en doute; mais la célèbre chirurgien anglais a fait une belle observation, en constatant la correspondance qui existe, d'un côté, entre la fluidité du sang après la mort, l'état de relâchement des muscles & l'impossibilité de réveiller la contractilité des organes, & de l'autre côté, entre l'état contracté des muscles & l'état coagulé du sang. (T. cit., p. 166 & 167.)

Après les affections qui sont périodiquement, autres cependant que l'asphyxie par le gaz hydrogène sulfuré, &c., le sang paraît toujours avoir subi qu'à la suite des maladies de quelconque, & il présente des caillots assez consistans dans les gros vaisseaux & le cœur. Celui qui engorge la tête & la veine-porte est souvent comme fongueux, même lorsque la mort n'a pas été subite.

Enfin, après les morts subites qui n'ont pas été précédées par une hémorrhagie, ni par l'apo-

plexie, la strangulation, l'asphyxie, on trouve ordinairement beaucoup de sang dans les veines & les voies du système circulatoire à sang noir, & point du peu dans les artères. On soutient que les caillots sont plus conglutins dans ces dernières vaisseaux que dans les autres. Mais les faits varient tellement, qu'il n'en est presque aucun que l'on puisse approuver comme constant.

C. Pour résumer, diminution bien notable de la quantité du sang, absence dans la plupart des vaisseaux, & principalement des artères, couleur brune-noirâtre générale partout où il est accumulé, & coagulation, tels sont les premiers phénomènes que nous voyons qu'il présente après la mort.

D. Les caillots du sang, après la mort, s'offrent dans les vaisseaux sous des apparences & avec une consistance très-différentes. Quand ils ont une consistance dense, ou les a nommés *polypes*, ou mieux *tumeurs polypiformes*, parce qu'ils ont souvent alors des prolongemens comme rameux, qu'ils se composent aux branches des polypes. Ces tumeurs ont beaucoup disposé pour faire que les dernières contractions se font forcées pendant la vie, ou si elles sont au contraire un effet de la mort. Quand ces caillots sont mous & très-faciles à décoller, comme les caillots du sang tiré des vaisseaux par une saignée, on les a toujours regardés comme l'effet purement cadavérique d'un simple épaississement du fluide sanguin.

M. Corvisart a divisé tous les caillots qu'on trouve dans les voies de la circulation, en trois espèces, d'après la disposition est loin d'être toujours touchée à l'inspektion, mais qu'il semble néanmoins souvent contraindre par la pratique.

1°. Caillots ou concrétions d'une date plus ou moins ancienne, reconnaissables à leur couleur de chair pâle, à leur densité, à leur organisation comme fibreux ou fibrilleux, & enfin à la force de leur adhérence à quelques parties du cœur.

2°. Caillots ou concrétions formés dans les derniers jours, les dernières heures de la vie des malades, reconnaissables à leur couleur lymphatique jaunâtre; quelquefois rougeâtre, à une disposition tout-à-fait peu fibrilleuse par place, mais essentiellement coagulée, à des adhérences infiniment faibles d'application légère plutôt que d'implantation. Ces concrétions sont moins denses, moins opaques, & ordinairement moins épaisses, moins rameuses que les premières. (Voyez *Polyrétroflux* (Concrétion).)

3°. Coagulations formées, après la mort, par le rapet & le refroidissement, ou produites tout au plus pendant l'agonie, molles, tremblantes, qu'on peut rompre à de la pelle de grosseur, qui s'écoulent sous les doigts, qui ne tiennent à rien, qui n'ont rien de fibreux ou d'apparence analogue. (Voyez *Effet sur les maladies du système artériel organique du cœur & des gros vaisseaux*, Voyez encore le *Traité de l'infarction*, médiate, par

M. Laennec, t. II, p. 589 & suiv.; Van-Swieten, *Commentaire sur Boerhaave*, Aphorisme 8. 10. 20. &c.)

Ce sont ces derniers caillots qu'on a vu quelquefois oblitérer entièrement la veine cave inférieure, & dans une longueur de plusieurs travers de doigt, la veine cave supérieure, l'artère aorte, les artères du cœur, &c. Les mailles qu'ils forment ont ordinairement leurs couches extérieures plus consistantes que leur centre qui s'écoule alors comme le caillé récent du lait; & d'autres fois on observe le contraire.

Je terminerai ce qui est relatif aux premiers changemens que subit le sang dans les cadavres; en disant que M. J. Davy prétend avoir observé que les membranes inégales & même les fibres, rougissent quelque temps après la mort, & que les organes parenchymateux s'agrandissent, deviennent plus ou moins livides & acquièrent plus de poids, par la concentration du sang dans les vaisseaux capillaires, & par l'absorption & l'insufflation d'une sérosité sanguinolente à travers les parois des petits vaisseaux. (Voyez *Revue médicale*, 1^{re} ann. 5^e livraison, pag. 71.) Ce phénomène, présenté d'une manière beaucoup trop générale, du moins dans l'extrait cité, doit le rapporter, ce grand partie, au sujet du paragraphe suivant & à celui qui suit la fin de celui-ci.

E. Lorsque la rigueur cadavérique cesse, & avant la putréfaction bien prononcée, le sang & les caillots les plus mous le liquéfient. Cette liquéfaction peut être considérée comme le commencement de la putréfaction. Il suffit ici de rappeler ce fait, que quelques médecins confondent avec les premiers phénomènes de la séparation spontanée du sérum, & ont regardé à tort comme l'un des suites les plus immédiates de la mort. Quand le sang reprend la fluidité, il n'est plus qu'une sorte de sang rouge-brunâtre; il s'écoule alors à travers les parois des vaisseaux, colore particulièrement les veines & peut se ressembler en quelques moelles au-dessous de la peau des parties les plus déclives, ou au pouton de celles par lesquelles porte le cadavre. Alors on voit très-souvent les vaisseaux, particulièrement les veines, dissolus, & à la par des gaz, sont les bulles, quelquefois abondantes, peuvent faire jaillir le sang par des plaies ou des injections faites après la mort.

S. 6. Taches, lividités & varicelles.

L'histoire de ces effets de la mort se place naturellement à la suite du paragraphe précédent, car ils sont dus à la concrétion du sang arrêté dans les petits vaisseaux de la peau. Les lividités qui nous occupent sont de larges, taches superficielles de la peau, plus ou moins étendues, d'une couleur brune, rougeâtre ou violacée, qui se forment plus ou moins promptement après la

mort. On les observe le plus ordinairement au dos & aux fesses, & aux parties par lesquelles le corps étoit couché lorsqu'il s'est refroidi. Les lividités cadavériques s'étendent souvent au cou, à la tête, & quelquefois aux parties génitales; elles peuvent étre diffusées à toute la surface du corps, & disposées, dit-on, comme par taches lenticulaires. Souvent elles sont marbrées, & souvent aussi elles sont entrecoupées par des raies blanchâtres enfoncées, produites par des plis des linges qui enveloppent le cadavre, ou par des failles du plai sur lequel il est posé, raies que l'on a comparées, à tort, à l'impression que seroit sur la peau la percussion avec des verges, & qu'à cause de cela on a nommées *vergetures*.

Le plus ordinairement la lividité de la peau ne commence que quelques heures après la mort; lorsque le cadavre commence à se refroidir, & que les membres, en devenant roides, expriment le sang encore fluide dans les vaisseaux capillaires; mais, dans quelques cas, la lividité commence même avant que la mort soit complète. Ainsi, dans l'angine de diverses maladies, les ongles, les mains, les pieds, le nez, les lèvres, les lobes des oreilles, prennent une teinte livide violacée; d'autres fois, ce qu'il faut bien remarquer, ces lividités ne surviennent que deux, trois ou quatre jours après la mort, quelquefois même plus tard. On observe principalement ce dernier phénomène lorsque le sang a perdu sa cohsistence, qu'il s'est accumulé dans l'oreilletle droite du cœur, le trou des veines caves, &c. que l'abdomen se distend par les gaz qui s'y développent; dans ce cas, & d'après la disposition anatomique des parties, le sang coule dans l'oreilletle droite & les veines caves est exprimé, répandu dans les veines de la tête; les vaisseaux du cerveau s'engorgent; la face prend successivement une teinte foncée; les yeux, qui auparavant étoient ternes, s'assombrissent, paroissent se remplir. Dans ce cas aussi, on voit parfois le sang être répandu des têtes veineuses aux parties génitales; le seroit-on, le pennis prendrait en peu de temps une teinte noirâtre. (Considérations médicales sur l'œchymose, la suffusion, &c. par J. J. Gerni. Aïen & Colmar, de thèse de la Faculté de Médecine, 1814.)

Ce n'est pas dans les seuls vaisseaux capillaires de la peau que le sang fait coagulation après la mort; s'emplissant les vaisseaux des poumons où il est poussé pendant l'agonie par les derniers efforts du cœur, il s'y distend, & s'engorge la partie la plus déclive de l'organe; mais il augmente d'opacité, & à laquelle il donne une teinte livide plus ou moins foncée; quelquefois comme avarié. Ces altérations diffèrent de degré, selon la situation dans laquelle le corps s'est refroidi. Ainsi, si un homme meurt étant couché sur le ventre, les lividités de la peau & l'engorgement des poumons se r'ouvrent du côté antérieur; si c'est la tête ou un

membre qui soit dans une situation élevée; les vaisseaux de cette partie se remplissent, s'engorgent de sang, & on y observe une lividité plus ou moins marquée, &c. Lorsque la mort semble être l'effet d'une syncope prolongée, quelle que soit la cause de celle-ci, les vaisseaux du pennis sont très-souvent troués comme dans un état de vacuité, surtout après de grandes émbryonies.

S. 7. Pâleur de la peau & altération de la face.

S. 8. Couleur jaunâtre de la paume des mains & de la planté des pieds. Descent de demi-transparence des chairs; &c.

S. 9. Assouplissement & obscurcissement de la cornée.

S. 10. Roideur cadavérique.

Ces derniers effets devant être discutés avec plus de détails qu'ici, à l'article *Mort apparente*, je renvoie à ce mot.

S. 11. Diminution du poids du corps.

M. le professeur Chaussier indique, justement cet effet dans sa Table des phénomènes cadavériques. Dans les circonstances ordinaires, il devient toujours plus marqué à mesure que le cadavre s'éloigne de l'heure de la mort. Il dépend uniquement de l'exhalation, de la vaporisation qui se fait à la surface du corps, soit par le calorique, soit par l'air, soit par les substances environnantes. On conçoit qu'une atmosphère sèche, & chaude, & des corps absorbans, peuvent le rendre promptement très-sensible.

S. 12. Diffusion de l'abdomen par des gaz. Comme insensuelle qui s'échappe par la bouche & les narines, &c.

Je réunis ces phénomènes, parce qu'ils tiennent à une même cause, le dégagement du gaz, & soit dans le pennis, soit, ce qui est le plus ordinaire, dans l'estomac; l'intestin; dégagement qui dépend souvent de matières alimentaires, fermentescibles, contenues dans ces viscères. Cette espèce de tympanite ne se remarque pas dans tous les cadavres, à moins toutefois que la putréfaction ne soit déjà avancée. Dans tous les cas, elle débute par le diaphragme & les intestins situés au-dessus des cavités, & donne naissance, 1°. à une éoume incommode qui s'échappe par la bouche, les narines du cadavre, & provient des poumons; 2°. au tœux du sang contenu dans les veines caves, dans les veines du cou & de la tête, & qui résulte une teinte plus foncée de la face, & quelquefois une forte élévation des yeux; 3°. à une excretion, par l'anus,

de gaz & de matière fécale; 4°. au reflux du sang de l'abdomen dans les organes génitaux, dont il remplit les plexus veineux en déterminant la lividité & une sorte d'érection. M. le professeur Chaussier, que j'ai eu devoir en grande partie copier, dans ce paragraphe; ajoute encore aux effets de la dissolution générale de l'abdomen, l'excrétion de sang & de matières parles-narines; le reflux, par l'œsophage, de matières saboteuses ou alimentaires contenues dans l'estomac, & par-fois, entrée de ces matières dans le larynx; les bronches, surtout si la tête est élevée & le menton incliné sur le cou; un certain nombre d'accouchemens après la mort, & enfin la présence de vers observés plus d'une fois dans la bouche, dans les fosses nasales & même dans les bronches. (*Table des phénomènes cadavériques.*)

§. 13. Putréfaction.

Tout corps animal, une fois privé de la vie, est sous l'empire absolu des lois physiques & chimiques: il se décompose ou se purifie conformément à ces lois.

Ici devoit peut-être se terminer l'histoire de la mort: elle est pleinement consommée. Mais, cependant, si l'on fait attention que la putréfaction a pour fin de faire disparaître toutes les traces de la mort, dont elle est une suite nécessaire, l'on verra que l'histoire de la putréfaction forme naturellement le dernier chapitre de l'histoire de la mort.

La putréfaction ne commence que lorsque la rouille cadavérique se dissipe. Son premier degré est l'altération & la perte des propriétés du tissu. Elle est annoncée par une légère odeur fade, & de relent. Elle se montre presque toujours, d'abord, par le gonflement de l'abdomen & par la couleur bleu-verdâtre de la ligne blanche, & quelquefois par un emphyème général, particulièrement après les morts promptes & violentes. Mais bientôt il s'y joint la fétidité cadavérique & tous les autres signes.

La putréfaction ne s'établit que par l'action de l'air, de l'humidité & d'une chaleur modérée. On ne l'observe que dans les substances mortes, c'est-à-dire, qui ont été animées par la vie. Lorsqu'elle se développe dans un membre d'un animal vivant, il ne faut pas la confondre avec la gangrène, ou la privation de la vie de cette partie, qui toujours la précède. Ainsi la putréfaction ne peut s'opérer qu'après la mort, de même que celle-ci ne peut avoir lieu qu'après la vie. Les caractères qui distinguent la gangrène de la putréfaction sont évidens: dans la première, les parties sont pleines de fermeté, celle inflammatoire qui la borne, &c.; dans la seconde, ni plénitude, ni tension, le gonflement, l'épiderme se ride, une fiente blanchâtre devient bientôt verte, puis noire, se mar-

Dans tous les cas, la putréfaction résulte d'actions chimiques extrêmement nombreuses, modifiées par une foule de circonstances extérieures. En dissolvant nos osiers, en dissolvant dans l'air une partie de nos diemens matériels, & en réduisant le reste à quelques principes terribles & salins, elle a pour résultat d'effacer à la longue tout ce qui peut rappeler l'idée de notre existence. Comme elle sera le sujet d'un article important de ce Dictionnaire, & que d'ailleurs je ne devrais la considérer ici que sous des rapports moins étendus que dans ce même article, j'y renvoie le lecteur. (*Voyez Putréfaction. Voyez aussi MORTE & SÉPULTURE.*) (L. R. VILLAMÉ.)

MORT APPARENTE. Est dans lequel les fonctions & les propriétés qui, sont reconnues la vie, sont suspendues ou affaiblies au point de faire croire à la mort.

Dans cet état, la vie s'échappe ou peut s'échapper aux sens de ceux qui ne regardent pas avec attention, ou qui sont étrangers à la connaissance de l'économie animale. Tantôt les organes sont encobés propres à recommencer leur jeu; tantôt aussi cet état est véritablement le passage de la vie à la mort: la première n'est pas entièrement anéantie, mais elle ne peut être rappelée. Malouin (non *Malvinus* & *Malvinus*, comme on le lit dans plusieurs ouvrages composés en latin en d'après ceux-ci, sans consulter les sources), Malouin & quelques autres, ont donné à l'apparence de la mort, la vie continuant toujours d'avoir lieu, le nom de *mort imparfaite*, par opposition avec la mort proprement dite, qu'ils ont appelée *mort absolue*, *mort parfaite*. (*Voyez Encyclopédie de Diderot & de d'Alambert*, édit. de Genève, tom. XXII, pag. 275.)

§. 14. Personnes vivantes prises pour mortes & traitées comme telles.

Il semble qu'il ne soit pas possible de se méprendre aux signes de la mort. Cependant la plupart de ceux qui ont écrit sur ce sujet, soutiennent qu'elle n'a d'autre signe certain que la putréfaction non partielle, mais générale. Ainsi, selon Paul Aesculapius, Avicenna, Bruhier, Barthès, Portal, &c., la pâleur du visage, le froid du corps, la rigidité des membres, la cessation de tout mouvement & en apparence, de tout sentiment, &c., en sont des signes équivoques. On cite, à l'appui de cette opinion, une infinité de faits auxquels il résulterait que des personnes qu'on croyoit mortes, ont été enterrées vivantes, ou sont revenues à la vie, soit au moment où l'on alloit les ensevelir, soit même quand elles étoient déjà dans le tombeau. Un témoin fort en parcourant le *Traité sur l'incertitude des signes de la mort*, par Bruhier, où cet auteur a recueilli, dans deux volumes, des exemples pour prouver que chaque

jour, pour ainsi dire, au enterre des personnes dans un état de mort apparente. Sans ajouter foi à tout ce qu'il raconte, parce que sa crédulité perce à chaque page, toujours est-il vrai qu'il y a eu & qu'il y aura encore beaucoup de victimes des infortunes précipitées. On en trouve même des preuves dans les Anciens : témoin le Traité *magi res ævi*, cité par Galien, par Pline, &c., & qui fut fait, dit-on, à l'occasion d'une femme qui reprit l'usage de la vie après avoir été sept jours sans en donner la moindre marque; témoin encore ce que rapporte Celse, & ce qu'il dit d'Asclepiade reconstruisant le convoi funèbre d'un homme qui s'étoit pas mort. (*De re medicâ*, lib. II, cap. 1, sect. 5.) Pline a écrit un chapitre intitulé, *De his qui elati revixerunt*, dans lequel il prétend que de toute antiquité & chez toutes les nations, on a rendu les honneurs funèbres à des personnes qui n'étoient pas encore descendues chez les morts. Entr'autres faits, il parle d'un certain Acilius Aviola, qui, ayant été jugé bien mort & placé sur le bûcher, fut ranimé par les flammes & étouffé par elles avant qu'on pût le sauver (lib. VII, cap. 52. Voyez encore Valerius Maximus, lib. I, cap. 8), &c. &c.

Quel horrible supplice que celui d'un malheureux mis vivant dans un cercueil! Eh! qui ne s'affligeroit pas en pensant que toutes ces résurrections que l'on raconte n'ont été l'effet que du hasard? Ainsi fut sauvé l'homme dont je viens de parler d'après Celse. Ainsi, si nous croyons Brubier ou les auteurs qu'il cite, une pauvre femme étant exposée fur de la paille, le feu prit à celle-ci, & au moment même, la morte, qui vécut encore long-temps, se ranima en poussant un cri perçant; une jeune fille regardée également comme morte, revint à la vie, parce que le bœuf qui la portoit laissa tomber la bière, dont les ais se défilèrent; plusieurs personnes enterrées avec des bijoux, échappèrent à la mort par l'avidité de fossoyeurs ou de domestiques, descendus dans leurs tombeaux pour les dépouiller. (*De l'incertitude des signes de la mort*, tom. I, pag. 53, 61, 68, 98, 134, 153, 170.) Une jeune dame détournée par son amant la nuit du jour qu'elle s'attendoit à mourir, vécut ensuite au grand nombre d'années (*ibid.*, tom. II, p. 60), &c. &c. On peut encore trouver des exemples nombreux de malheureux enfermés dans le cercueil, lorsqu'avec des soins on auroit pu les rappeler à la vie : les ouvrages de Pechlin (*De aëris & aliment. defect.*), de Kirchmann (*De funibus Romanor.*), de Bacon (*Hist. vit. & mort.*), de Kornmann (*De miraculis mortuor.*), de Garman (*De mirac. mort.*), de Lancisi (*De morte subit.*, lib. I, cap. 15), de Winslow (*An morte inertia & chirurgici quam ab aliis experimentis?*), &c. en contiennent un grand nombre.

On est épouvanté, surtout en apprenant qu'on a quelquefois ouvert des personnes vivantes en

croisant ouvrir des cadavres, & que ces personnes ont perdu la vie sous le couteau anatomique.

Ainsi, sans fonder cette assertion sur l'histoire peu certaine du cardinal d'Espinoza, premier ministre de Philippe de Castille, qui, lorsqu'on l'ouvrit pour l'embaumer, porta, dit-on, la main au raifort du chirurgien, je puis citer celle du célèbre abbé Prévôt, l'auteur de *l'Histoire générale des voyages*, trouvé sans sentiment & sans mouvement dans la forêt de Chantilly, le 23 octobre 1763, & qu'on ouvrit par ordre de justice. A peine le scalpel fut plongé dans le corps du malheureux Prévôt, qui avoit été frappé d'apoplexie, qu'un cri, arraché par la douleur, arrêta l'instrument & glacia d'effroi les spectateurs. Mais le coup mortel étoit déjà porté! L'infortuné ne rouvrit les yeux que pour voir l'appareil qui l'environnoit, & sentir toute l'horreur du genre de mort par lequel on lui arrachoit la vie. Tous les médecins furent que Vésale, le plus grand anatomiste de son temps, eût à se reprocher une méprise non moins funeste, & combien cruellement il eu fut puni. Phil. Peu, habile accoucheur, étant appelé pour pratiquer l'opération césarienne à une femme que l'on croyoit morte depuis quelques instans, & qu'il jugea morte lui-même, la vit trembler & grincer des dents sous son bistouri. (Winslow, *ouv. précité.*)

Je ne me sens pas le courage de faire un plus grand nombre de citations; j'ajouterai seulement que Winslow raconte qu'il avoit été deux fois jugé comme mort, & deux fois enseveli vivant, la première dans son enfance & la seconde dans sa jeunesse; & que c'est surtout dans les temps calamiteux ou une épidémie extrêmement meurtrière répand l'effroi avec la dépopulation, & après les batailles, qu'on enterre des personnes regardées comme mortes quoiqu'elles ne le soient pas. Ce que rapporte Paul Zaccarias d'un jeune homme attaqué de la peste à Rome, tombé deux fois en syncope & porté deux fois au Tibre, parmi des cadavres, puis revenu à la vie & à la santé (*Quæst. med. leg.*, t. III), a dû se renouveler plus d'une fois, au moins dans les premières circonstances de cette histoire. C'est ainsi qu'à Haguenau, en 1813, j'ai reconnu à côté d'un cadavre que je voulois ouvrir, & étendu sur la même table, un homme encore vivant : il reuint le dernier soupir dans l'intervalle nécessaire pour le transporter dans une salle de l'hôpital.

Mais c'est trop de semblables faits. S'il est un sujet digne de la sollicitude des médecins, des philanthropes & des gouvernements, c'est sans doute celui qui a pour but de les prévenir. Diminuer un peu la douleur que leur lecture occasionnera, en disant que dans la multitude des histoires compilées, rapportées par Brubier, on n'en voit que deux ou trois qui prouvent que des médecins aient quelquefois jugé à tort, par ignorance ou plutôt

par précipitation, qu'une personne étoit morte. Néanmoins les apparences de la mort ont donné lieu à trop d'erreurs, & quoiqu'elles nient été commises presque toujours par des gens sans discernement, sans capacité & étrangères à la médecine, je n'en apporterai pas moins d'attention à mettre en garde contre elles.

Rapportons encore, particulièrement dans cette vue, un exemple de suspension des fonctions, qui en a imposé pour la mort. Il est extrait du *Journal des sçavans* (janvier 1749), où Brubier l'a inséré; & il est dans son genre le fait le plus remarquable.

Rigaudeau, chirurgien de Douay, fut appelé le 8 septembre 1745, pour accoucher une femme qui demeuroit aux environs de cette ville. On étoit venu le chercher à cinq heures du matin, mais il n'arriva chez la malade qu'à huit heures & demie. On lui dit, lorsqu'il entra, qu'elle étoit morte, & qu'on n'avoit pu trouver de chirurgien pour lui faire l'opération césarienne; que dès quatre heures du soir de la veille, la morte avoit commencé à ressentir les douleurs d'enfantement; que pendant la nuit les douleurs avoient été si violentes, qu'il en étoit resté des foiblesse & des convulsions, & qu'enfin, vers six heures du matin, il étoit survenu une nouvelle convulsion avec écume à la bouche, & que la malheureuse femme y avoit succombé. Rigaudeau demanda à voir son corps, qui étoit déjà enseveli; il lui fit ôter le linceul; il tâta le poulx au bras, sur le cœur, au-dessus des clavicules, & il ne sent aucun battement; il présente un miroir à la bouche, qui contenoit beaucoup d'écume, & le miroir n'est point terni; il trouva le ventre prodigieusement gonflé. Obéissant à un heureux pressentiment, Rigaudeau porte la main dans le vagin, trouve l'orifice de la matrice très-dilaté & la poche des eaux formée: alors il perce celle-ci, & sent la tête de l'enfant dans une bonne position. Ayant mis son doigt dans la bouche de l'enfant, qui ne donne aucun signe de vie, il le retourne, l'amène par les pieds avec assez de facilité, le remet entre les mains des femmes qui sont présentes, & , quoique cet enfant paroisse mort, il les exhorte cependant à le réchauffer & à lui jeter du vin chaud sur tout le corps. Déjà, au bout de trois heures de soins continus & en apparence inutiles, on alloit ensevelir l'enfant, lorsqu'une femme s'écrie qu'elle lui a vu ouvrir la bouche; aussitôt le zèle se ranime, le vin, le vinaigre, l'eau de la reine de Hongrie ne sont pas épargnés, & l'enfant ne tarde pas à donner des signes de vie bien manifestes. On court avertir Rigaudeau qui étoit chez le curé du village, & en moins d'un quart d'heure, après son arrivée, l'enfant pleure avec autant de force que s'il étoit né heureusement. Rigaudeau voulut voir la mère une seconde fois; on l'avoit encore enseveli & même *bouché*. Il fait enlever tout l'appareil funèbre, il examine bien cette femme, & la juge morte comme la pre-

mière fois. Cependant il est surpris que, bien qu'elle fût morte depuis près de sept heures, *les bras & les jambes fussent restés flexibles*. Il fait quelques tentatives inutiles pour ranimer la vie, & il repart pour Douay, après avoir recommandé aux femmes présentes de l'ensevelir la morte que quand les bras & les jambes auroient perdu leur souplesse, & de la laisser dans son lit. Il étoit une heure lorsque Rigaudeau partit, & à trois heures & demie ces loins avoient resuscité la prétendue morte. L'enfant & la mère étoient sous deux pleins de vie le 10 août 1748; mais la mère resta paralytique, sourde & muette.

Cet exemple prouve combien, dans certaines circonstances, une hypothime sensible à la mort peut durer, & combien la conduite du médecin, dans ce cas, peut être rendue difficile. Ce trait est beaucoup plus vraisemblable & beaucoup plus curieux, sous le rapport des signes de la mort, que l'histoire également répétée partout de lady Roussel, qui, pendant un voyage, passa pour morte & fut huit jours entiers sans que son corps présentât le moindre signe d'altération, mais aussi sans qu'il donnât signe de vie. On raconte que durant tout ce temps, son mari s'opposait à son enterrement, & qu'enfin, au fond des cloches d'une église voisine, ou du moins pendant qu'elles sonnoient, lady Roussel se réveilla comme en sursaut, & dit en se levant sur son séant : *Voilà le dernier coup de la prière, il est temps de partir*. L'histoire, de la vérité de laquelle on ne s'est pas avisé de douter, ajoute que cette dame guérit parfaitement & vécut encore beaucoup d'années.

Ce sont les exemples que j'ai rapportés, & d'autres analogues, qui ont fait admettre, particulièrement par les médecins dits *lygistes*, une mort véritable & une mort apparente. Je n'examinerai pas si, en bonne logique, on peut distinguer deux sortes de mort, la vraie & la fausse; je dirai seulement quels sont les signes de la mort, & ce qui les a fait admettre quelquefois avec trop de précipitation.

La mort étant la cessation de la vie, les signes doivent se tirer principalement du l'abolition des propriétés & des fonctions vitales. L'absence, parmi ces propriétés & ces fonctions, du sentiment, du mouvement, de la respiration, de la circulation, de la chaleur animale; la rigidité dite *cadavérique*, & enfin une altération des yeux qui se couvrent d'une sorte de toile glauque, deviennent mous & flasques, sont aisément jugés, par leur ensemble, qu'une personne est réellement morte. Les autres signes indiqués, tels que la dilatation de la pupille, qu'une lumière vive ne fait plus contracter, la pâleur de la peau, &c., sont, à l'exception de la putréfaction, beaucoup trop illusoires. Chacun de ces premiers signes, considéré seul, n'indique, pour le plus grand nombre, rien d'une manière positive; mais ils sont tellement certains par leur réunion, que, dans les

cas où la vie peut être regardée d'abord comme problématique, un médecin instruit ne courra jamais le risque de se tromper, s'il ose de prudence & d'attention.

On peut conclure de ce que je viens de dire, que non-seulement les figures de la mort diffèrent par leur valeur, mais encore par l'époque à laquelle on peut commencer à les observer. Sous ce dernier rapport, il y en a de deux sortes : les uns, tels que l'abolition du sentiment, du mouvement, &c., sont immédiats, primitifs ou manifestes dès l'instant de la mort ; & les autres, comme la rigidité cadavérique, la putréfaction, sont consécutifs.

S. 2. *Maladies qui peuvent simuler la mort.*

Je démontrerai dans la suite de cet article, que la mort peut toujours être reconnue par le médecin, & que l'opinion de l'incertitude de ses signes est erronée. Néanmoins beaucoup de maladies entraînant la suspension ou une diminution considérable des fonctions auxquelles tout le monde attache l'idée de la vie, on a souvent cru à la mort lorsque l'événement a ensuite prouvé qu'on s'étoit trompé. Les maladies qui en ont ainsi imposé à des yeux peu éclairés ou peu attentifs, sont ordinairement, ainsi que le prouvent les faits déjà cités, celles qui, portées à un haut degré, causent les morts subites.

Parmi elles, il semble qu'on ne devrait pas oublier l'apoplexie, la catalepsie, l'extase, le narcotisme, le *cataphors coma* & l'épilepsie, parce que la respiration & la circulation sont encore manifestes & que la chaleur continue ; toutefois les auteurs rapportent que ces affections ont donné lieu à plus d'une méprise. Les seules maladies qui excusent l'erreur, sont la syncope & les diverses espèces d'asphyxie.

Aucune maladie ne produit plus parfaitement les apparences de la mort, qu'une syncope très-intense : plus de sentiment, plus de mouvement, plus de respiration, plus de circulation, du moins sensible ; la chaleur paroît éteinte, la peau est décolorée ; c'est une véritable image de la mort, & celle-ci devient inévitable si l'accident se prolonge. Pourtant les muscles conservent leur souplesse, les membres toute la flexibilité possible ; la pâleur de la peau n'est pas ternie, & les traits du visage ne sont pas profondément décomposés. Mais dans cet état on ne peut se tromper long-temps ; il faut qu'il cesse, ou la mort le remplace. Il y a cependant, du moins on l'assure, des cas d'hystérie dont l'accès dure un jour ou même plusieurs, & se complique, pendant tout ce temps, d'une syncope dans laquelle la circulation, la respiration, tous les sens & tous les mouvements, se trouvent suspendus ou comme suspendus. (Voyez HYSTÉRIE & SYSCOPE.)

L'asphyxie par submersion, celle par privation d'air, par strangulation, par divers gaz non respirables ou délétères, enfin l'asphyxie des nouveau-nés, offrent également le tableau de la mort, lorsque les accidents sont poussés jusqu'à la suspension complète des fonctions. Que cette suspension se continue, & la mort ou l'abolition sans retour des fonctions, en sera l'effet inévitable. Ici le passage de la vie à la mort dépend d'un instant très-court ; mais quand la dernière est arrivée, la chaleur du corps diminue, les traits du visage paroissent davantage altérés, & la rigidité cadavérique se manifeste. (Voyez ASPHYXIE.)

Le froid extrême amène, avant la mort, toutes les apparences de celle-ci. Mais il en est de ce cas comme des précédents : les apparences ne peuvent durer un peu sans l'aneantissement de la vie ; seulement il paroît que le degré d'intensité du froid, & plusieurs circonstances individuelles, feront que la mort irrévocable sera produite plus ou moins lentement : ainsi, des individus presque gelés, tout-à-fait engourdis & roides, & comme tels jugés morts, ont été rendus à la vie, dit-on, après des soins bien dirigés & continués pendant vingt-quatre heures ou même deux jours.

Après ceux qui, par le froid, offrent les apparences de la mort, viennent, pour la longue durée de ces apparences, les noyés : ainsi, sans nous autoriser de ces exemples d'autant plus répétés dans beaucoup de livres, qu'ils sont plus incroyables, il paroît bien certain que des malheureux qui étoient restés dans l'eau durant trois heures, & l'on dit même durant six, ont pu être rappelés à la vie, & souvent il a fallu de deux à quatre heures de soins administrés avec beaucoup d'intelligence, d'activité & d'adresse, pour obtenir cet heureux résultat. (Voyez NOYÉS.) Je ne dois point examiner ici si ceux qu'on a sauvés de cette manière, avoient été asphyxiés par l'eau, ou s'ils avoient éprouvé, à l'instant d'y tomber, une forte de syncope par saisissement, qui avoit suspendu toutes les fonctions sensibles à nos sens, en conservant cependant une vie latente.

Examinons maintenant chaque signe de la mort en particulier.

S. 3. *Absence du sentiment.*

La perte de toute sensibilité extérieure a particulièrement été observée dans l'apoplexie, la catalepsie, l'extase, l'épilepsie, le narcotisme, l'asphyxie, la syncope, l'hystérie. Mais je viens de le faire voir, il est peu de cas où, dans ces maladies, on puisse regarder cette perte comme une preuve de la mort. Dans la suppression du doute, on a, pour réveiller la sensibilité, conseillé diverses épreuves, telles que les incisions, les brûlures, les vésicatoires, les ventouses, &c. On conçoit tout ce qu'ont souvent d'inhumain & de barbare ces épreuves, parmi lesquelles le vésicatoire n'agit

jamais d'une manière instantanée, & peut d'ailleurs, ainsi que les sinapismes, ne produire aucun effet sensible dans beaucoup de maladies très-intenses, lors même que deux ou trois jours après avoir été enlevé comme inutile, son action accoutumée aura lieu par suite d'une amélioration dans l'état du malade.

On a quelquefois multiplié les incisions avant que de pouvoir rappeler les signes de la vie. On parle d'un négociant qui, revenant d'un voyage deux jours après la mort de sa femme, la trouva exposée à sa porte au moment où le clergé alloit l'enterrer, & qui, pour mieux s'assurer de la mort, lui fit faire des scarifications & appliquer des ventouses; déjà il y en avait en vingt-cinq sans le moindre succès, lorsqu'une vingt-sixième fit crier à celle que l'on croyoit morte : *Ah ! que vous me faites mal !*

La brûlure, considérée comme agent de douleur, n'est peut-être pas un meilleur moyen; car elle a, selon plusieurs auteurs, été mise en usage nombre de fois sans que ce soit elle qui ait rappelé le sentiment. Peut-être même seroit-ce en consistant immédiatement la peau, phénomène qui ne peut être produit sur les cadavres, qu'elle seroit particulièrement utile pour reconnoître la vie : dans ce cas, c'est avec de l'eau bouillante qu'il faudroit presque toujours brûler.

Les piqures, les ventouses, ne sont pas plus efficaces. On répète en plusieurs endroits que Rhafes rappela à la vie un homme de Cordoue que la mort paroisoit avoir abattu subitement, en le faisant frapper de verges sous la plante des pieds. Je m'occupai tout-a-l'heure, en parlant de l'absence des mouvements musculaires, de l'effet de l'électricité & du galvanisme.

On conçoit que quand il s'agit, dans les cas qui nous occupent, de réveiller la sensibilité par la douleur, il faut préférer les moyens qui en causent le plus, mais aussi éviter avec le même soin tous ceux qui pourroient être de quelque danger si le sujet étoit encore vivant. « Les épreuves chirurgicales, dit Louis, sont moins certaines que les autres épreuves. Des femmes hystériques, des noyés, &c., qui n'avoient pu être rappelés à la vie par elles, l'ont été par d'autres. On ne peut pas même, ajoute-t-il, conclure de leur insensibilité, l'insensibilité des fujets; car ils pourroient être sensibles aux douleurs que » ces épreuves occasionnent, & être hors d'état » de le témoigner par aucun signe. » (Quatrième lettre sur la certitude des signes de la mort.)

C'est ici le lieu de prouver que ce ne sont pas toujours les moyens les plus violents qui réussissent le mieux. On cite des guerriers qui n'avoient point donné de marque de sensibilité à toutes les irritations portées sur la peau, & qui ont été rappelés à la vie par le son du tambour. Dans une de ses Lettres sur la certitude des signes de la mort, Louis rapporte une histoire assez curieuse

pour trouver place dans cet article : un chirurgien attaqué d'une maladie comateuse, ayant été secondé plusieurs fois & appelé par son nom sans donner signe de sensibilité, lorsqu'un qui connoissoit sa passion pour le jeu de piquet, s'avisa de prononcer vivement ces mots : *quante, quatorze & le point*; le malade en fut tellement frappé, que dès cet instant il sortit de sa léthargie. Louis tenoit cette histoire de Ledran. On lit dans la dissertation inaugurale de M. Anguste Durand, l'observation d'une dame que l'on tira d'une affection soporeuse qui durait déjà depuis quelque temps, en faisant jouer sur le piano des airs chéris de la malade. (*Influence de la musique considérée dans ses rapports avec la médecine*; Coll. des thèses in-4^o. de Paris, 1819.)

Ces exemples, auxquels je pourrais en ajouter beaucoup d'autres, prouvent la justesse de cette remarque, que fréquemment l'âme se conserve dans les hypothermies, & qu'il seroit imprudent de hasarder alors quelques propos indiscrets qui, entendus par le malade, pourroient aggraver son état. Calmet parle, dans sa *Dissertation sur les revenans*, d'une femme qui ne donna aucune marque de vie durant trente-six heures, & qu'on vouloit ensevelir malgré son mari; quand elle fut revenue à elle, elle dit avoir tout entendu sans pouvoir se remuer (p. 393). Entr'autres faits presque pareils, je rapporte les suivans, parce que ce sont des médecins eux-mêmes qui racontent ce qu'ils ont éprouvé, & je citerai textuellement leurs propres paroles : *Cum post copiosam sanguinis à naribus effluxum, dixit le docteur F. C. F. Anselmi, in syncope incidissem, repente ejulatus audivi & vocem : FILII ! — REPTITUSCIT ! — sensim postea me colligens, totam me circumstantem familiam, hominumque commum cognovi, atque matrem, me pro mortuo habito, in isto iactu acerbo exclamasse percepi, patrem autem corpus meum manibus suis tenentem motus aliquor iterum expertum, filium suum reviviscere, dixisse. (Thanatologia, sive in mortis naturam, causas, &c., disquisitiones. Goettingen, 1795, in-8^o, p. 53.)* M. le professeur Richerand dit, en parlant d'une défaillance qu'il éprouva, & dans laquelle la syncope n'étoit pas complète : « Je conservois encore la » mémoire & la faculté de sentir; j'entendois dis- » tinctement les personnes qui étoient autour de » moi, dire : *il s'évanouit*, & s'agiter pour me faire » sortir de cet état, qui, ajouta-t-il, n'étoit pas » sans douleur. » (*Nov. élim. de physiologie*, VII^e. édit. tom. II, p. 558.) Brubier rapporte l'observation d'un homme de soixante ans, qui, regardé mort & gardé par deux carés, raconta ensuite ce qui s'étoit passé entre ces derniers, qui se disposèrent à côté de lui. (*Ouv. précité*, II^e. partie, pag. 504 & suiv.)

Ces faits, parmi lesquels ceux qui ont été publiés par MM. Anselmi & Richerand méritent toute notre confiance, doivent être rapprochés de l'observa-

tion faite par beaucoup de médecins, que souvent, dans l'agonie, l'ouïe devient très-fine.

Je termine ce qui est relatif aux moyens de réveiller la sensibilité, qu'on ne peut reconnaître par la simple inspection, en rappelant qu'on a obtenu d'heureux succès d'une très-vive lumière approchée des yeux, & qu'on fait encore tous les jours cesser une syncope, en mettant sous le nez des substances volatiles très-irritantes, telles que l'ammoniaque.

Les histoires que j'ai rapportées, d'hommes qui furent ouverts tout vivans, semblent attester combien est sage cette règle établie par les médecins légistes, lorsqu'on ouvre le corps d'un homme avant que la putréfaction s'en soit emparée, ou avant le délai prescrit par la loi pour l'inhumation, de porter les premiers coups de scalpel de telle manière qu'ils ne puissent compromettre la vie, si l'on avoit eu le malheur de se tromper dans l'appréciation des indices de la mort. Les mêmes histoires, dans lesquelles il est dit que le cœur a été trouvé encore palpitant, doivent faire recommander aussi, d'après Pabbé Desfontaines (voyez l'ouvrage de Brubier, tom. II, pag. 3), &c., une précaution mise autrefois en usage par Foubert, alors chirurgien-major de l'hôpital de la Charité à Paris; ce chirurgien faisoit préalablement une incision entre deux côtes du côté gauche, à l'endroit où se pratique l'opération de l'empyème; il portoit ensuite un doigt sur le cœur pour s'assurer si cet organe avoit absolument perdu ses mouvemens. Quand la roideur cadavérique a commencé à se développer, semblables précautions sont inutiles.

S. 4. Absence du mouvement.

Ce signe n'est pas plus caractéristique de la mort, que l'abolition apparente de la sensibilité. Il s'observe dans les mêmes circonstances, & simultanément avec cette dernière: les mêmes épreuves lui sont applicables. C'est surtout pour constater l'absence irrévocable des mouvemens musculaires, qu'on a proposé l'emploi de l'électricité & du galvanisme. On pense que cette opinion a pour elle toutes les probabilités, que, dans un cas douteux de mort, on pourroit mettre à découvert un aufile locomoteur, & le soumettre au galvanisme; son insensibilité à l'influence de cet agent autoriserait à prononcer que la vie est éteinte. Dans un ouvrage publié dernièrement à Londres, M. Jean Aldini insiste sur l'emploi du galvanisme pour les cas d'asphyxie, & propose un appareil particulier. (Voyez *General views on the application of galvanism to medical purposes*. London, 1819.) Je ne suis jusqu'à quel point l'électricité ou le galvanisme seroit utile; mais ce qui est certain, c'est que les uns ont trop vanté ces moyens, & les autres les ont trop dépréciés. Dans tous les cas, on ne sauroit trop se hâter, s'ils sont néces-

saire, & il faudroit, en les appliquant, beaucoup de prudence, & se rappeler que, même dans la supposition de la mort, ils seroient obtenus des signes de contractilité musculaire, si l'on ne tarde pas à les mettre en usage; mais que ces signes cessent dès que les mêmes agens n'agissent plus, & qu'ils finissent par diminuer & ne plus se renouveler sous leur influence. (Voyez à l'article Mort (Hist. naturelle & physiologique de la), ce qui a été dit de la contractilité musculaire.)

S. 5. Absence de la respiration.

C'est à l'absence de tout mouvement musculaire que ce signe doit être rapporté. Consultez à ce sujet l'article Mort, cité dans le paragraphe précédent.

Il est des cas où la respiration continue seulement par les contractions lentes; peu étendues du seul diaphragme, & n'est cependant pas sensible. On a proposé diverses épreuves pour s'éclaircir alors. « Les uns présentent la flamme d'une bougie » à la bouche & aux narines; si la flamme vacille » sans qu'on puisse attribuer ce vacillement à » quelque autre cause, ils jugent que la vie » n'est point entièrement éteinte; ils pressent le » contraire si la flamme n'est agitée en aucun » sens. D'autres font la même expérience avec un » brin de laine cardée ou de coton. Il n'y a per- » sonne qui ne puisse se convaincre de l'inutili- » tance de cette épreuve en modérant la resp- » ration. Ces signes ne sont donc rien moins que » certains. Nous en disons autant de l'épreuve » avec le miroir, puisqu'il s'exhale de la bouche » & des narines d'un cadavre encore chaud, des » vapeurs capables de ternir la glace. Quelques- » autres placent un verre rempli d'eau sur le » cartilage xyphoïde, le sujet étant couché sur le » dos; & s'ils aperçoivent du mouvement dans » l'eau, ils jugent que la personne n'est pas morte. » Cette expérience réussiroit mieux, au dire de » Winslow, si l'on mettoit le sujet sur le côté, & » si l'on plaçoit le verre sur le cartilage de l'avan- » dernière côte. » (M. F. E. Pédère, *Traité de méd. lég. & d'hyg. publique*, tom. III, p. 256 de la 1^{re} édit.)

Les exemples de beaucoup de personnes asphyxiées, chez lesquelles toute respiration a bien certainement été suspendue durant plusieurs heures, même après qu'on les avoit retirées des milieux asphyxiants, devroient toujours empêcher de conclure de semblables épreuves, qu'une personne n'est de vivre. Galien, qui avoit observé des femmes hystériques & des noyés, regardoit déjà l'absence comme un signe équivoque de mort. (*de locis affect.*, lib. VI, cap. 5.) Quant aux personnes que l'on affirme être restées durant un jour, même trois jours sans l'eau, sans mourir, & même, comme il en finit n'étoient pas encore assez nombreuses, durant huit jours, au bout duquel temps,

on les a retirés, & elles sont revenues à la vie ; il faut avoir une bien grande crédulité pour admettre de semblables histoires, quels que soient d'ailleurs les personnages qui en sont attestés la vérité.

Un moyen fort bon de reconnoître la mort dans les cas d'asphyxie, seroit l'insufflation pulmonaire. Qui ne sait qu'on a souvent ranimé la respiration des asphyxiés, par conséquent leur vie, par cette épreuve, qu'il faut quelquefois prolonger durant quelque temps avant qu'on puisse la regarder comme décisive ?

§. 6. Absence de la circulation.

Il ne faut pas croire à la mort parce qu'on ne sent battre ni les artères, ni le cœur, & parce qu'on ouvrant une veine, le sang ne coule pas ; l'observation prouve fréquemment que la vie n'est pas toujours éteinte, lorsqu'il paroit que la circulation a cessé ; ainsi dans la syncope, l'asphyxie, &c., la mort n'est qu'apparente. Morgagni rapporte beaucoup d'exemples de la cessation de toute pulsation sensible des artères, dans des maladies autres que celles que je viens de nommer & que l'hystérie. (*De sed. & caus. morb.*, epit. IV, art. 3 ; XIV, 3 ; XXIV, 6 ; XLII, 13 ; XLIX, 14.) On prétend que Ramazzini (*Consultat. epidem. Mutinensis*, §. 53), Luc. Schroëck (*Ephem. nat. curios.*, dec. I, ann. 9), Pecklin (*Obs. phys. med.*, lib. XI, obs. 5), &c., en ont également rapporté. Je n'ai point fait de recherches dans les ouvrages de ces docteurs, mais je puis assurer qu'il m'a quelquefois été impossible de sentir le plus faible battement du cœur comme des artères, même assez long-temps avant la mort. On ne peut donc toujours affirmer que tel individu sur lequel on vient de jeter le drap mortuaire, a réellement cessé d'exister, quoique certainement il soit privé de l'usage de ses sens & qu'il ne pense plus, ne se meuve plus, ne parle plus, ne respire plus, & paroisse sans circulation.

Lorsqu'on a cherché à s'assurer de l'existence ou de l'absence de cette fonction, il faut appliquer les mains ou les doigts sur la région du cœur & sur le trajet des artères, principalement de celles où se réfugie le pouls dans les derniers instans de la vie. Ainsi, si l'on ne sent pas battre l'artère radiale, on explorera le pouls aux artères axillaires crurales & carotides. Ces dernières, suivant Legallois, pourroient fournir, en pratiquant une incision sur leur trajet, des signes qui méritent une grande attention, surtout chez les jeunes sujets, chez lesquels il seroit plus aisé de reconnoître la plénitude ou la vacuité de ces vaisseaux. Il assure que la vacuité des carotides est une preuve infaillible de la mort, lors même que les battemens du cœur sont encore distincts à travers les parois de la poitrine (*Exp. sur le principe de la vie*, p. 155). D'où il s'ensuivroit que le dernier terme de la vie ne s'étendrait pas,

comme on l'a dit, jusqu'à l'abolition complète de la contractilité du cœur.

Les expériences du physiologiste que je viens de nommer, celles de Syllén, de Bichat, de Haller, de Senac, &c. &c., prouvent assez que chez les personnes qui ont pu être rappelées à la vie, malgré les apparences de la mort, le cœur n'a jamais cessé de battre, quoiqu'on n'ait senti sur ces mêmes personnes aucun pulsation des artères, aucun frémissement dans la région du cœur. Ce que j'avance ici a particulièrement été soutenu par Loniis, dans la quatrième Lettre sur la certitude des signes de la mort. « Dans un grand nombre de cas, dit-il, le sang ne pourra être poussé dans les vaisseaux de la circonférence du corps : alors.... le diamètre des vaisseaux diminue ; de-là le froid & la pâleur des extrémités. » Le sang est pour ainsi dire concentré dans les parties intérieures, où un reste de chaleur est retenu par les frémissemens du cœur, empêché de l'immobilité parfaite des liqueurs. Si les vibrations du cœur ne se révélaient point, s'il acquiesce pas un mouvement nécessaire pour surmonter la résistance du puits du sang, il sera bientôt opprimé par cette force résistante ; & dès qu'il cessera d'agir, la machine cessera d'être animée. Mais comme le cœur peut rester assez de temps dans cet état languissant, & avec des mouvemens imperceptibles, il ne faudra pas conclure qu'une personne est morte, parce que toutes les recherches pour s'assurer de l'état des organes qui servent à la circulation du sang, auront été infructueuses. »

Lorsque l'on fait de semblables recherches, il peut être nécessaire d'appliquer la main sur toute la poitrine, au *empyème*, une transposition des viscères, faisant quelquefois que le cœur est à droite. Pour rapprocher autant qu'il est possible le cœur de la main & en rendre les pulsations sensibles, on doit faire pencher la corps sur le côté que l'on touche.

Quelques individus possèdent-ils la singulière faculté de suspendre à volonté les mouvemens du cœur, ou du moins de les diminuer de telle sorte qu'ils ne puissent être reconus ? Je ne le crois pas, sans cependant nier de tous points une histoire citée dans une foule d'ouvrages, & rapportée, dit-on, par Cheyne. La voici : le colonel Townshend, malade depuis fort long-temps, fait un jour appeler Cheyne & Baynard, & Shrine son apothicaire, pour être témoins de l'expérience étonnante de lui faire mourir & de resusciter en leur présence. Ils viennent : le colouel se couche sur le dos ; Cheyne met les doigts sur le pouls, Baynard sur le cœur, & Shrine présente au miroir à la bouche. Un moment après on ne sent ni pulsation de l'artère, ni battement de cœur, & la glace n'est point ternie. Cet étrange phénomène dura au-delà d'une demi-heure, & déjà les spectateurs étoient sur le point de se retirer, persuadés

que le malade avoit poussé trop loin son expérience, lorsqu'en l'examinant de plus près, ils aperçoivent un mouvement. On sentit alors les battemens du poulx & du cœur revenir par degrés, ainsi que la respiration. Enfin, le malade parle & est resuscité. Quand ils sont sortis, il fait venir un notaire, ajoute un codicille à son testament, & il meurt paisiblement huit heures après l'expirécion. D'autres exemples d'individus qui commandoient jusqu'à un certain point aux mouvemens de leur cœur, ont été cités; mais il y a loin de cra faire à celui présenté par le colonel Townshend.

Pour résumer, lorsqu'on ne sent pas les battemens des artères, ni même ceux du cœur, on ne peut, par cela seulement, assurer que la circulation est éteinte, ni même qu'elle est suspendue.

Toutefois on a observé des hémorrhagies sur les cadavres de personnes qui venoient de succomber à une apoplexie, à une asphyxie, à des blessures, &c., dit-on encore, à des fièvres malignes ou pestilentiennes, &c. Mais le sang, rendu spontanément par la bouche, le nez, l'anus, ou même par la petite plaie d'une saignée, est toujours facile, dans ce cas, à distinguer du sang de ceux qui vivent encore, soit par son état coagulé de dissolution, soit par son défaut ou son peu de chaleur, soit par sa couleur, soit parce qu'il n'est point laqué, &c. Je lis dans le *Traité de médecine légale* de M. Fodéré, qu'il y a quelques années, une semblable hémorrhagie eut lieu par la veine ouverte du bras du prince royal de Suède, mort quelques heures auparavant d'une apoplexie foudroyante (II^e édit., t. III, p. 585 & 597). On peut voir dans l'ouvrage de Gurmman (*De miraculis mortuorum*, p. 541 & seq.), que si de pareilles hémorrhagies se font quelquefois montrées, on a souvent pris pour telles, ou même pour des sueurs de sang, ce qui étoit un effet de la putréfaction, ou du moins d'un dégagement de gas. (Voyez l'article MORT (Hist. naturelle & physiologique de la), chap. VI, §. 5.)

Les recherches sur l'état du sang pourroient offrir des données aussi coullantes que celles que l'on tire de l'examen de l'existence ou de la non-existence de la circulation. Ce qui a été dit à l'article MORT, le prouve assez; mais l'épreuve la plus simple est peut-être celle qui consiste à reconnaître la fluidité ou bien la concrétion du sang: pendant la vie, les chairs & la peau ont une demi-transparence rosée que leur donne le sang fluide qui les parcourt; après la mort, ces parties sont, au contraire, opaques. (Voyez le paragraphe 9.)

S. 7. Absence de la chaleur.

Les cadavres de ceux qui ont succombé à une apoplexie, à une asphyxie par strangulation, par la vapeur du charbon, &c. l'on prétend, à la peste & à certaines fièvres, perdent leur chaleur

bien moins vite que les autres. Quelques heures suffisent quelquefois pour produire le refroidissement du corps, comme on le voit chez les noyés & chez ceux qui périssent d'hémorrhagie, ou dans un état d'émaciation extrême; mais, le plus ordinairement, il n'est complet, pour les cadavres d'adultes, que dans l'espace de vingt heures. On répète partout que Samuel Ledelius a vu un cadavre qui resta chaud pendant quatre jours; mais il est bien probable que la mort n'avoit pas eu lieu aussi-tôt que le croyoit Ledelius. La chaleur ne fucioit donc pas un signe certain de vie?

D'une autre part, le froid extérieur ne suffit pas toujours pour caractériser la mort. Ainsi, les noyés peuvent être ramassés lorsqu'ils sont déjà très-froids: l'observation en a recueilli de nombreux exemples. Elle nous apprend également que beaucoup de personnes, sur prises par les neiges, &c., & trouvées sans mouvement, les membres rigides & le corps comme glacé jusqu'à la région précordiale, ont néanmoins été rappelés à la vie. Enfin, dans certaines syncopes, le froid est extrêmement remarquable.

Quel degré de refroidissement est encore compatible avec la vie? On n'en fait rien; seulement il est certain que ce degré est variable & dépend de circonstances antérieures & actuelles, telles que la santé habituelle, l'espèce de milieu dans lequel on se trouve, &c. &c. M. Charles Choffat a vu, dans le bain froid, périr un chien, lorsque le thermomètre centigrade, plongé dans son rectum, marquoit 26° (la température des chiens est représentée par 40°); & dans des expériences d'un autre genre, la mort n'est survenue que quand le même instrument étoit descendu à 17°. (*Mémoire sur l'influence du fœt. nerv. sur la chaleur animale*; Coll. B. des thèses in-4^o de la Faculté de Paris, 1820.)

Si le froid de la surface du corps faisoit naître quelques doutes sur l'existence de la vie, on pourroit aisément s'assurer de la température intérieure, à l'aide d'un thermomètre enfoncé dans le rectum. A défaut de thermomètre, on pourroit mettre le doigt dans cette partie, ou même dans l'arrière-bouche. C'est dans la cavité abdominale que la chaleur se conserve le plus long-temps.

Dans tous les cas, lorsque la mort est réelle, la chaleur du corps va toujours en diminuant. (Voyez MORT (Hist. nat. & physiol. de la), chap. VI, §. 4.)

La conclusion à tirer de ce que j'ai rapporté, est que la grande diminution de la chaleur propre, je ne dis point le manque absolu, est un signe équivoque de la mort. Mais, quelq'illusoire qu'il soit, il peut cependant, dans presque toutes les circonstances, aider à porter un jugement certain. Il faut, pour cela, se rappeler, 1^o, que la chaleur persiste quelque temps après l'arrêtissement de la vie, ou après le dernier soupir; 2^o, qu'elle s'éteint graduellement en suivant la marche indiquée dans l'article MORT, précité; 3^o, enfin, qu'elle n'est

entièrement dissipée que quand le cadavre est dans la plus grande roideur. Si le corps est mou & à la température de l'atmosphère, on ne peut élever aucun doute sur la mort : c'est ce qui sera bientôt prouvé à l'examen de la roideur cadavérique, §. 10 de ce chapitre.

La considération du degré de chaleur, comparé avec la masse du cadavre, avec la matière sur laquelle celui-ci est étendu, avec l'état d'embonpoint du sujet, avec le temps qui s'est écoulé depuis la mort, avec la maladie qui a fait mourir, avec la température de l'atmosphère, &c., peut quelquefois devenir d'une grande importance en médecine légale, pour la question qui nous occupe. Dans tous les cas, elle pourra fournir des résultats plus ou moins fidèles.

§. 8. Obscurcissement, affaïssissement de la cornée & dilatation de la pupille :

Quelques instans après la mort, les yeux ont presque toujours perdu leur brillant ; ils s'obscurcissent alors par la formation d'une espèce de couche ou d'enduit, appelée communément *toile glauqueuse ou muqueuse*. Cette couche est très-mince, elle se fend dès qu'on y touche, & elle s'enlève par un léger frottement. Winslow la croyoit produite par les humeurs du globe oculaire, transsudant à travers les pores de la cornée. Quoi qu'il en soit, on commence déjà à l'apercevoir aux yeux de la plupart des agonisans ; c'est même un signe qui fait regarder la mort comme imminente. J'ai quelquefois observé l'œil se ternir & offrir, au premier aspect, comme le premier degré de cette toile, dans la syncope prolongée. On cite des exemples d'un enduit comme glaireux sur la cornée, dans certaines maladies des panpières, & chez des malades qui, paroissant sur le point de mourir, ont recouvré la santé. D'un autre côté, on voit des personnes mortes d'apoplexie, de phthisie, d'apoplexie par la vapeur du charbon, &c., qui ont les yeux aussi brillans que pendant la vie, & cela, durant au, deux ou même trois-jours : c'est ce que nous attestent d'ailleurs P. Camper, J. P. Frank, F. C. F. Anselmi, M. Portal, &c. &c. J'ai souvent fait la même remarque sur les champs de bataille. L'obscurcissement de la cornée, par la formation de la couche glauqueuse ou muqueuse, est donc un signe qui n'existe pas constamment ; mais il n'est point pour cela aussi illusoire qu'on veut bien le dire. Quelques jours après la mort, la couche est plus ou moins fendillée, ce qui donne à l'œil un aspect comme pulvérulent : dès ce moment la mort ne peut être douteuse ; mais on enterre les cadavres avant que le phénomène soit bien manifeste. J'ai quelquefois détourné cet état comme pulvérulent en quelques minutes, sur des cadavres qui n'étoient point encore avancés, par les mouvemens répétés que j'imprimois aux panpières.

La pupille est toujours dilatée dans les cadavres, mais aussi elle l'est fréquemment dans l'agouie & dans l'amaurose. On observe souvent, dans les apoplexies, la dilatation extraordinaire d'une seule pupille, tandis que l'autre reste resserrée ; mais dans ce cas, à l'instant de la mort, la dernière pupille se dilate comme la première.

Une autre altération des yeux, produite par la mort, est leur affaïssissement, leur flaccidité, qu'on peut aisément reconnoître au bout de quelques heures, & qui paroît donc entièrement à la transfiguration cadavérique qui vide les globes. Louis, qui a fait ses observations durant plusieurs années sur un grand nombre de sujets morts de maladies différentes & dans toutes les saisons, regardoit ce signe comme une preuve certaine de la mort, & Barthès, comme un de ceux qui la rend le plus probable. M. Desgranges, de Lyon, prétend au contraire qu'on a rappelé à la vie des noyés & d'autres asphyxiés qui l'avoient présenté (*l'at. Mémoire sur les noyés*, pag. 58). Je puis assurer avoir connu des vieillards, dont les yeux presque ternes offroient une demi-flaccidité, comme ce l'est qu'on observe d'ordinaire quelques heures après la mort. Quand la cornée est tellement flaccide, qu'elle est enfoncée ou comme enfoncée dans le globe oculaire, phénomène qu'on remarque parfois vingt-quatre ou trente six heures après la mort, il n'est plus possible de douter de celle-ci ; mais alors d'autres signes, aussi on encore plus frappans, la font aisément reconnoître.

§. 9. Pâleur, couleur plombée ou livide de la peau ; éruption cadavérique de la face ; relâchement des sphincters ; vergetures ; lividités ; couleur jaunâtre de la paume des mains ou de la plante des pieds ; défaut de demi-transparence des chairs ; disparition des exanthèmes ; pouls qui se dirige vers le creux de la main, &c.

La pâleur de la peau, mise au nombre des signes de mort par plusieurs auteurs, ne mérite aucune confiance. Dans la syncope, elle se joint au froid & à des phénomènes qui pourroient aisément tromper, tandis que d'autres fois, comme chez ceux qui meurent d'apoplexie, qui pèsent subitement ou qui succombent à une maladie très-courte, quand ils sont dans un état de plethore extrême, la face reste injectée malgré la mort. Néanmoins, immédiatement après celle-ci, & même quelques temps auparavant, dans l'agonie, la pâleur, mais une pâleur jaunâtre, est communément très-remarquable.

Je lis dans la dernière Lettre de Louis, sur la certitude des signes de la mort, qu'Ambroise Paré ayant été appelé pour deux hommes réputés morts, qui étoient sans sentiment, sans apparence de pouls, avec une froidure universelle & la face livide, fut déterminé principalement par la face teinte de couleur plombée, à s'informer si ces hommes

hommes n'avoient point été exposés à la vapeur du feu du charbon; ce qui étoit effectivement, & que par les rapports à la vie. La teinte livide s'observe dans toutes les apoplexies, & même après la mort qui en est l'effet; mais on voit souvent aussi, qu'à l'instaut de la mort elle diminue tout-à-coup, & que la pâleur augmente dans la même proportion.

L'expression cadavérique de la face, l'écume qui sort de la bouche, le relâchement des sphincters, les vegetures, les taches d'un rouge-brun, nommées *hydatides cadavériques*; qui se manifestent à la peau de la région sur laquelle s'est refroidi un cadavre, sont des phénomènes qui, par eux-mêmes, ne méritent non plus aucune confiance pour établir la certitude de la mort. Ils peuvent tous se retrouver dans les derniers instans de la vie, & ils ont été observés sur des personnes noyées, apoplexiques, apoplectiques ou en syncope, qui ont recouvré l'usage des sens. D'un autre côté, on a vu le visage conserver, durant un jour ou deux, son expression naturelle, comme si la vie l'animoit encore, quand la mort a été faite. On a prétendu, & cette opinion est au moins vraisemblable, que quand les sphincters de l'anus & de la vessie laissent sur l'urine & des matières fécales, quelques temps après qu'il n'y a plus de signe de vie, on doit considérer celle-ci comme certaine sans retour.

On a dernièrement, dans les journaux de médecine, attaché beaucoup d'importance à deux signes de la mort, 1°. la couleur *jauneâtre* que prennent la paume des mains & la plante des pieds, & qui, au dire de quelques personnes, est très-différente de la lividité & de la pâleur des autres parties du corps; 2°. le défaut de la demi-transparence rosée qu'on observe, sur une personne vivante, aux bords des doigts rapprochés les uns des autres; ou à toute autre partie mince que l'on plice entre l'œil de l'observateur & une lumière. On peut consulter, sur ces moyens de distinguer la mort réelle de la mort apparente, une notice de M. Mahol, de Toulouse (voyez *Journ. général de méd.*) & une autre de Bonalox de Malet. (Voy. *Journal de méd., chirurg.*, Dec., t. XI, pag. 29.) Mais les premiers des signes dont je parle, le remarque dans l'écrite, & est loin d'être toujours sensible. La plupart des médecins reconnoissent bien mieux la *lividité des ongles* & celle *de l'extrémité des doigts des pieds & des mains*. Quant au second, il est un effet constant de ce que le sang s'est retiré de la surface ou s'est coagulé dans les vaisseaux. On ne sauroit nier son effet quand il s'agit de pronostiquer sur la mort. On est donc étonné qu'il n'ait pas été indiqué plus tôt.

Bonalox parle aussi, dans la note citée, d'un autre moyen de reconnoître la mort. Lorsqu'on brûle, dit-il, une partie de la peau d'un animal

vivant, cette brûlure est suivie de plusieurs phénomènes qu'on n'observe pas sur le cadavre; car ce phénomène n'est le produit d'une réaction, & un cadavre ne s'agit pas. Louis avoit entrevu la valeur de ce signe, puisqu'il dit que le vésicatoire, appliqué selon les règles de l'art, excite des *ressies*, la vie existe; car, ajoute-t-il, le vésicatoire n'agit point sur des parties mortes. Il paroit, au surplus, qu'un certain Fodéré, médecin de Padoue, regardoit les moyens de réaction comme les plus certains de ceux qu'on pouvoit mettre en usage; & l'on ne peut assez s'étonner de l'espèce d'oubli dans lequel ils sont tombés. Le médecin, le plus simple de tous ces moyens, seroit d'appliquer ou de laisser tomber de l'eau bouillante sur la peau. Si des phylloènes & la rougeur qui accompagnent celle-ci en étoient les résultats, point de doute sur la vie. Il arriveroit même souvent que la vie existât encore, mais étant prête à s'éteindre, la phylloène & la rougeur commençantes, qui auroient été produites instantanément, dimenseroient & disparaîtroient, surtout la dernière, avant la mort. J'ai eu le malheur d'observer particulièrement ce dernier fait chez des personnes que j'aimois le plus.

M. le professeur Fodéré regarde comme décidant complètement la mort, sans qu'il soit besoin d'attendre d'autres signes, les deux suivans : 1°. au lieu d'acquiesce une température plus élevée & de se colorer un peu, le corps du noyé qui est mort (cela est applicable à tous les cadavres récents) devient toujours plus froid, même sous les frictions, & se rembrunit de plus en plus des couleurs cadavériques; 2°. si l'induridu avoit été marqué de la goutte rosée & d'autres rougeurs au nez & au visage, lesquelles ont évidemment leur siège dans le système capillaire des parties, ces couleurs se conservent tant que la mort ne sera qu'apparente; tandis que si la rosée du corps se décolore; si elles disparaissent, dès que la mort sera réelle (*Dict. des sci. méd.*, tom. XXXVI, art. MORTE, pag. 449 & 450). M. Fodéré cite un exemple fort remarquable en faveur du dernier signe, qui avoit déjà été reconnu & signalé, puisque l'on sauroit que les exanthèmes disparaissent fréquemment à l'instaut de la mort.

J'ajouterois que quand la mort est réelle, les quatre derniers doigts de la main sont rapprochés & fléchis, & le pouce reconvert par eux, presqu toujours dirigé dans le creux de la main, vers la racine du petit doigt, & que les deux phalanges, dont la première se trouve seule dans la flexion, sont ordinairement étendues l'une sur l'autre. Lorsqu'une force extérieure accidentelle a écarté le pouce des autres doigts ou étendu ceux-ci, ils n'ont plus cette disposition. J'ai observé le signe que j'indique, mais sans y attacher d'importance; c'est mon ami M. Brouchet qui a appelé mon attention sur la valeur. Les

pointes n'ont donc pas consulté la nature, quand le représentant des cadavres doit les doigts, & surtout le pouce, sont écartés & tendus.

§. 10. *Roi deur cadavérique.*

Peu de temps après la mort de l'homme & des animaux, leur corps devient constamment roide. Louis avoit toujours remarqué ce phénomène (*voyez quatrième Lettre sur la certitude des signes de la mort*) ; mais c'est Nylien qui a fait voir, de la manière la plus positive, par une série d'observations nombreuses faites sur l'homme, sur des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des poissons, des mollusques & des vers, que cette roideur doit être considérée comme un signe caractéristique de l'aucantissement de la vie, pourvu toutefois qu'on sache la distinguer de celle qu'on observe quelquefois lorsque la mort n'est qu'apparente. (*Recherches de Physiol. & de Chim. pathol.*, pag. 384 & suiv.) Ce que je vais dire, sera extrait, en très-grande partie, du travail de ce physiologiste.

« La roideur commence toujours, dans l'homme, par le tronc & le cou, gagne ensuite les membres thoraciques, & de-là se porte aux membres abdominaux ; de manière que ceux-ci sont encore souples lorsque les autres parties sont déjà roides. Elle suit la même marche en se dissipant, qu'en se développant : ainsi elle diminue & cesse d'abord au tronc & au cou, ensuite aux membres thoraciques, enfin aux membres abdominaux ; & ceux-ci demeurent encore souvent roides en un grand nombre d'heures après que les autres parties ont entièrement repris leur souplesse. »

Cette roideur se produit toujours dans l'attitude que l'on donne au corps. L'époque où elle commence, celle où elle cesse, sa durée & son énergie, varient d'après des circonstances qui sont assez bien déterminées. Ainsi, chez des hommes dont le système musculaire est complètement conservé, on n'a éprouvé que peu d'altération au moment de la mort, particulièrement chez des hommes d'une constitution athlétique, & chez ceux qui périssent d'une manière violente, par le glaive de la loi, & la suite de certaines apoplexies, de l'ouverture d'une grosse artère, du narcotisme, de l'empoisonnement par des substances retrofives, d'une tumeur, d'un tétanos, d'une apoplexie, d'une fièvre aiguë, la roideur commence très-tard, quelquefois seize à dix-huit heures après la mort : elle parvient à un grand degré d'intensité, diminue ensuite graduellement, & peut ne cesser tout-à-fait que six à sept jours après la mort. Au contraire, chez les sujets qui succombent épuisés par une maladie chronique, qui a porté une forte atteinte au système musculaire & à la nutrition des organes, la roideur survient très-promptement, acquiert peu de force & dure peu de temps, comme on l'observe sur les cadavres de ceux qui meurent dans le ma-

risme le plus complet, ou d'une phlébite pulmonaire, d'une affection cancéreuse de l'estomac, du scorbut, &c. Cela est surtout remarquable lorsqu'il y a mollesse, pâleur, humidité des solides : la roideur commence souvent alors une heure ou deux après la mort & se dure que quelques heures ; tandis que si l'atteinte à la nutrition musculaire a été moindre, cette roideur est plus éternelle & peut durer trente-six à quarante-huit heures, même lorsqu'il y a infiltration, pourvu cependant que celle-ci n'occupe pas les muscles eux-mêmes ou les interstices des fibres charnues.

La roideur cadavérique survient rapidement & dure très-peu de temps chez les animaux asphyxiés par le gaz hydrogène sulfuré, ou qui meurent d'une fatigue excessive, tels que ceux qui sont rendus à la course. On a dit que les corps des individus qui sont frappés par la foudre, conservent la flexibilité des membres. Quoi qu'il en soit de cette assertion, vraisemblablement hasardée, une observation curieuse, c'est que, dans les cadavres des personnes qui ont succombé à l'apoplexie, elle devient aussi forte du côté de l'hémiplegie que de l'autre. La destruction ou la lésion même de la moelle épinière ne l'empêche pas de se développer, & n'appporte aucune modification dans la force ni dans la durée.

Le signe exclusif de cette roideur est dans les muscles. Pour s'en assurer, Nylien a enlevé la peau des membres où elle étoit bien développée, a coupé les ligaments de leurs articulations, & poussé de l'eau tiède dans les cavités de celles-ci, pour rompre l'adhésion que la synovie épaisse avoit pu avoir déterminée entre les surfaces articulaires : la roideur a persisté avec la même énergie. Il a fait la section transversale des muscles, & elle s'est cassée. Ces expériences, dont j'ai constaté l'exactitude, prouvent, de concert avec la dureté & la rigidité des muscles, que c'est bien à ces organes qu'il faut rapporter la roideur qui s'épaise du corps après la mort. Tous les muscles y participent : quand la roideur est survenue dans la plus forte flexion ou extension d'un membre, dans le premier cas les fléchisseurs, dans le second les extenseurs, sont raccourcis & épaissis comme lorsque la volonté les tient en contraction pendant la vie.

Ce phénomène de la roideur cadavérique, que Nylien a attribué à un mode de contractilité organique insensible, indépendante de l'influence nerveuse, commence, dit-il, au moment où la chaleur vitale parait s'éteindre. J'observerai néanmoins que c'est presque dans les parties où la chaleur perd le plus, que la roideur commence ; que c'est dans celles où la chaleur se perd le plus vite qu'elle se montre en dernier lieu, & que, d'après les observations de Louiz, la chaleur artificielle n'empêche pas la roideur des cadavres de se développer. (*Quatrième lettre précitée.*) Il résulte des expériences de Nylien, que le moment où commence la roideur, correspond, dans les

manifestes & dans les aiséaux, avec celui de la contractilité des muscles locomoteurs, peut en être le point de perdre la faculté d'être mis en mouvement d'une manière sensible par les stimulans artificiels.

L'apparition & la durée de la rigidité cadavérique sont plus ou moins subordonnées à l'influence de l'atmosphère : ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, un cadavre deviendra plutôt rigide, & le sera plus long-temps que si l'air est froid & sec, que dans un air chaud & humide. Ceux qu'on laisse dans leur lit, & sous leurs couvertures, deviennent rigides plus-tôt que ceux qu'on en a fait sortir aussitôt après leur dernier soupir.

Les auteurs qui ont regardé la rigidité cadavérique comme un signe incertain de mort, se sont fondés sur ce que ce phénomène peut se confondre avec la rigidité qu'on observe quelquefois lorsque la mort n'est qu'apparente. Nous allons voir qu'avec de l'attention on ne peut confondre les deux espèces de rigidité, si l'on a suivi leur marche & leur développement.

Les circonstances qui peuvent occasionner la rigidité du corps pendant la vie, sont la congestion & quelques affections graves du système nerveux ; telles qu'un état ataxique, l'inflammation cérébrale, l'apoplexie, la tétanos & autres maladies convulsives ; enfin, l'asphyxie.

Lorsque la rigidité dépend de la congélation, on la reconnoît au froid glacial du corps & des membres, à ce que toutes les parties, même les plus molles, les plus imprégnées de liquides, sont également dures ; à ce que la peau est très-rouge ; à ce que les végétaux conservent l'impression du doigt d'une manière fort apparente & beaucoup plus durable que dans l'adème, & à un petit bruit comparable au cri de l'étain, qu'on entend lorsque l'on met un membre. Si tout le corps est devenu ainsi par le froid, nul doute sur la mort ; s'il n'y a que les extrémités, on peut espérer de rappeler à la vie par des moyens que je ne dois pas rapporter ici. (Voyez CONGÉLATION.)

Lorsque, dans les affections nerveuses graves, les membres deviennent rigides, le corps reste toujours mou, ainsi que Louis l'a voit déjà remarqué, d'un certain degré de chaleur très-sensible au thermomètre, & la rigidité précède toujours la mort réelle ou apparente ; tandis que la rigidité cadavérique est constamment précédée de l'agitation & de tout mouvement vital. Dans les affections dites nerveuses, la rigidité est beaucoup plus forte que celle qui suit après la mort, & tous les muscles & en font des ordinairement le siège, comme lors de la dernière. « Quand on parvient à faire cesser à un des membres devenus rigides par les convulsions, un mouvement opposé à la direction dans laquelle il s'est rendu, & le membre retourne promptement, & souvent avec violence, à la même direction. Si l'affection est assez grave pour déterminer la mort, la ri-

gidité contractile peut persister après l'extinction de la vie ; mais dans ce cas elle cesse au bout d'une heure ou deux. « On observe parfois même le caraspisme particulier aux deux espèces de rigidité chez les personnes qui meurent de réténus. En effet, dans cette maladie, le premier rigide persiste malgré les efforts qu'on peut faire pour la vaincre ; si elle paraît céder un instant à ces efforts, elle reprend bientôt toute l'énergie qu'elle avoit auparavant ; elle cesse avec la vie ou peu de temps après ; le corps reste souple pendant quelques heures ; ensuite, la seconde espèce de rigidité s'en empare, & c'est-à-dire, celle qui se se développe qu'après la mort. « On ne voit plus dès qu'on a employé une force suffisante pour la faire cesser, à l'instant qu'elle parvient à vaincre cette dernière, le membre reste souple, & devient indifférent à tel ou à tel mouvement. On a voit déjà proposé, pour l'usage de la mort, d'abaissier la mandibule, mais si la mort n'est qu'apparente, la mâchoire spontanément, disoit-on, de la mâchoire supérieure. « Une affection morale très-vive, une fureur, &c., déterminent quelquefois une syncope ; & en même temps une rigidité remarquable du corps & des membres, que l'on pourroit peut-être confondre avec la rigidité cadavérique. Mais quand la rigidité est syncopale, lorsque les phénomènes qui l'ont précédée se sont succédés avec la plus grande rapidité ; le moment où les membres deviennent rigides, n'est séparé que par un intervalle extrêmement court de celui où l'action du cerveau, du cœur & des poumons, a été suspendue ou considérablement diminuée ; la chaleur est très-sensible au tronc, & les membres sont froids ; la rigidité acquiert tout-à-coup le degré de force que comporte l'état convulsif des muscles ; enfin, cette rigidité disparaît bientôt, avec la syncope. Si cette dernière amenoit la mort, la rigidité ne tarderoit pas non plus à cesser, les membres resteroient souples pendant quelques heures, & ensuite la rigidité cadavérique se développeroit progressivement.

On ne peut non plus s'en laisser imposer par la rigidité qui accompagne l'asphyxie, car cet accident détermine très-promptement la mort, & nous avons vu que la rigidité cadavérique se développe d'autant plus tard, que la mort a été plus rapide. Il faut pourtant, jusqu'à un certain point, excepter les cas d'asphyxie par l'hydrogène sulfuré. On peut manquer absolument de doutes sur l'heure précise à laquelle la respiration a été arrêtée ; & alors, si l'asphyxie a été produite par des gaz non respirables ou par la strangulation, & que le corps soit froid, c'est-à-dire, que la température soit descendue au degré de celle de l'atmosphère, on est autorisé à conclure que l'accident est arrivé depuis long-temps, & que le principe de vie est éteint ; car un corps qui a subi ces sortes d'asphyxies, conserve encore

« beaucoup de chaleur deux heures après la mort réelle ; & un homme asphyxié depuis deux heures est absolument hors d'état d'être rappelé à la vie. Au reste, en faisant abstraction de la chaleur du corps, on reconnoît toujours la poëture convulsive au caractère que nous lui avons assigné..... On seroit donc porté à admettre des membres roides une direction opposée à celle dans laquelle il s'est roidi : si la roideur étoit convulsive, le membre reprendroit sur-le-champ la première direction, & si la roideur dépendoit de la mort, ce membre resteroit souple. On auroit recours au même moyen quand l'asphyxie a été produite par submersion : car un corps que l'on sort de l'eau dans un état complot de suspension des fonctions vitales, se trouve à peu près à la température du liquide avec lequel il a été en contact. »

Ainsi, la roideur cadavérique, signe certain de la mort chez l'homme, pourra être facilement reconnue par le médecin : tant que les membres sont flexibles, si leur flexibilité n'a pas succédé à la roideur ; on peut présumer un reste de vie.

§. 11. Putréfaction commençante.

A mesure que la roideur cadavérique abandonne les parties, celles-ci cessent de résister aux forces chimiques, & la putréfaction, c'est-à-dire, la décomposition spontanée, commence à s'en emparer. Cette putréfaction, dont je ne dois examiner ni les agents ni les circonstances qui la facilitent, s'annonce d'abord par une odeur fade, nauséabonde, qui n'est point ce qu'on appelle ordinairement putride, mais qui s'élève, & par une augmentation légère dans la couleur de la peau & dans la consistance des chairs. Le ventre se gonfle, & présente de larges taches bleuâtres qui deviennent rapidement verdâtres ; il est et de même des parties qui étoient ecchymosées ou contuses ; l'épiderme se détache, les chairs se ramollissent, le gonflement en même temps une pesanteur très-prononcée s'exhale, la couleur de la peau devient livide, les traits du visage se déforment, &c. &c. (Voyez Putréfaction.)

Il n'est pas si positif de reconnoître la mort, & ce seroit sortir de mon sujet que de parler avec plus d'étendue de la putréfaction. Je ferai remarquer cependant que des personnes étrangères à la médecine pourroient être trompées par la mauvaise odeur qu'exhalent quelques malades, par l'apparition de taches livides ou plombées que présente quelquefois la peau, & (prenant ces phénomènes pour un commencement de putréfaction) faire enlever vivans des individus que des soins bien administrés rendroient à la vie.

Ainsi qu'il a déjà été dit, les circonstances qui accompagnent promptement la putréfaction sont celles proprement la roideur cadavérique, & tel est souvent un air humide parquant 25 à 30° degrés de

chaleur au thermomètre centigrade. Si la congélation a surpris un corps, & importé à quelle époque après la mort, dès que le degré d'opère, quel que soit le degré de congélation, la putréfaction s'en empare.

Beaucoup de médecins regardant la putréfaction comme le seul signe caractéristique de la mort, ont recommandé d'attendre la manifestation de ce phénomène pour donner la sépulture. C'est ce qui a lieu chez plusieurs peuples. Mais moins respectueux qu'eux pour les dépouilles mortelles de nos semblables ; moins attachés aux tristes restes de nos parents ou de nos amis, nous nous empressons de les éloigner comme des objets importans ; dans plusieurs contrées de l'Europe même, aussitôt qu'un malheureux paroit avoir expiré, un usage barbare fait tamponner ses narines, sa bouche, en un mot toutes les ouvertures, fait garotter les membres, envelopper tout son corps d'un linceul ferré, & on l'abandonne sur le carreau dans cet état, quelle que soit la rigueur de la température. Certes, semblable manœuvre a plus d'une fois arraché un reste de vie ; mais faut-il pour cela attendre la putréfaction pour rendre aux morts les derniers devoirs ? Non, dans les villes où des hommes instruits peuvent constater les décès ; pourvu que d'ailleurs on se conforme à notre loi, qui veut que l'inhumation ne puisse être faite que vingt-quatre heures après.

Mais dans les campagnes, dénuées de médecin ou de chirurgien, il faudroit peut-être exiger de l'officier civil qu'il attendit un commencement de putréfaction, & dans tous les cas, défendre d'étouffer ceux qui ne seroient pas tout-à-fait morts, en empêchant non-seulement de leur tamponner la bouche & les narines, mais encore de leur couvrir le visage.

§. 12. Conséquences.

La certitude des signes & l'insaisissabilité des moyens que nous avons passés en revue, dépendent surtout de leur durée & de leur durée, aussi, tel signe qui est douteux quand on le considère isolément & pendant un instant, cesse de l'être s'il le patient avec les autres & depuis quelque temps. Supposons, par exemple, que l'on ne fasse aucune attention à la température du corps & l'observe seulement à l'assaisonnement des yeux, & la roideur du tronc & des membres, & la putréfaction (la seule durée prolongée de tous les autres signes dont il a été parlé précédemment) si l'on pouvoit les examiner sans aucun de ces autres, pour faire passer alternativement sur l'attention de la vision, indépendamment des autres signes, on reconnoît encore au deux des derniers, la mort ne peut être incertaine. Les circonstances corroboratives, telles que celles qui se sont de l'état qui a précédé la mort ou seulement les apparences, peuvent aider encore à porter son jugement.

Je crois pouvoir conclure :

1°. Que si le mort a été précédé des circonstances qui le font dire tel, il ne peut y avoir qu'un seul rattachement des doutes sur la réalité. Néanmoins il parait que dans ces cas même, des erreurs ont été commises : je lis dans l'ouvrage déjà cité de F. C. F. Anschel (*Thapatalogia*, &c., p. 215), qu'un vieillard de cent un ans qui était en léthargie, mais que l'on croyait mort, revint à la vie pendant les obsèques, & qu'un autre de cent ans fut tiré du cercueil & vécut encore quatre semaines. Nous aurons cité ces faits d'après Pisoni (*Mém. sur les inhumations précipitées*) & Prévinaire (*Traité sur les asphyxies*).

2°. Que si la mort est le suite d'une maladie qui a peu à peu amené une grande décoloration, un épaississement extrême du corps, surtout si cette maladie est une lésion organique, on doit, pour les mêmes raisons, regarder également la mort comme réelle ou définitive, dès qu'il n'y a plus signe sensible de vie. Mais cependant n'oublions pas qu'il n'y a point de maladies, point de circonstances dans les maladies où la syncope ne puisse arriver, & qu'il n'y a point de cas, par conséquent, où l'opinion dispensée de faire toutes les recherches nécessaires pour s'assurer de la mort.

3°. Que lors des apparences de la mort subite, on même de celle qui termine beaucoup de maladies aiguës, de maladies dites convulsives, hystériques, hypochondriques, la manifestation des signes qui caractérisent indubitablement la mort, tarde souvent quelque temps. Aussi, dans ces cas, on ne doit jamais se hâter de conclure que la mort est véritable : avant de prononcer affirmativement, on mettre en usage tous les moyens pour s'en assurer.

4°. Enfin, que l'usage de devoir admettre l'incertitude des signes de la mort, parce que des personnes chez lesquelles la vie n'étoit pas encore éteinte, ont été regardées comme mortes & traitées comme telles, le mort ou l'état de cadavre offre, au contraire, des signes certains au moyen desquels, en quelques heures, & avec de l'attention, on peut toujours la reconnaître, sans qu'il soit besoin d'attendre le développement de la putréfaction ; la perte de la chaleur intérieure, dont on peut s'assurer par un thermomètre posé dans le rectum, l'obscureissement & l'affaiblissement de la parole après à un certain point, le dessèchement de la transparence rosée de la peau, le flexion & le rapprochement des doigts de la main repoussant le pinceau, & la rigueur cadavérique, seroient toujours suffisants dans cette circonstance.

Disons, avec Louis, que l'opinion de l'incertitude des signes de la mort est trop injustifiée à la médecine pour être vraie. L'observation, l'expérience, les faits sur lesquels on a voulu appuyer cette opinion, démontrent que si tant d'erreurs fâcheuses ont été commises, c'est parce qu'on a, dédaigné sur des fausses apparences & sans examen, la médecine est trop souvent incertaine : on le

redonne pas plus incertaine encore en admettant des erreurs grossières pour des preuves, & des faits sans application pour règle de notre conduite.

Je terminerai ce qui concerne la mort apparente par les considérations suivantes :

1°. Le terme de vingt-quatre heures exigé par la loi pour les inhumations, suffit quand le mort est sensible ou produite par une longue & grave maladie ; mais il peut être quelquefois trop court quand le mort est subite, comme dans les cas de submersion, d'asphyxie par le froid, &c. L'administration publique qui doit veiller à ce que jamais la santé des personnes ne soit compromise en conservant un mort dont la putréfaction s'empare, doit aussi, dans les cas qui paraissent douteux, prolonger pendant tout le temps nécessaire ce délai de vingt-quatre heures.

Mais il y a des cas où il faut constater l'état du cadavre sur lequel on trouve des blessures, & qui ne permettent pas d'attendre un commencement de décomposition, parce qu'ordinairement celle-ci se manifeste d'abord aux plaies, & que des plaies en seroient changées & dénaturées. Alors il faut évaluer toutes les signes qui peuvent faire croire à la mort, peser toutes les circonstances qui ont accompagné & suivi les blessures, & prendre une détermination d'après ces données.

2°. On a émis le vœu (Bruhier) d'élever des dépôts publics pour la conservation des morts, pendant un certain temps, & de les entourer de toutes les précautions que réclame l'hygiène. Sans doute ce projet pourroit être mis à exécution dans les villes ; mais il est exécutable dans la plupart des bourgs, & à plus forte raison dans les villages. Je lis dans le *Dictionnaire des sciences médicales*, à l'article NORMA, de M. Fodéré, qu'à Drepde & dans quelques autres villes, on établit une maison dans laquelle sont transportés tous ceux que l'on croit avoir expiré, & où, après les avoir déposés dans des charniers où l'on entretient un hiver une douce température, on leur fait passer chaque jour dans des anneaux suspendus à des fils de fer qui abondissent à une longueur, de manière que le gardien peut accuser ou moins mouvement. La même institution, ajoute-on, se trouve à Francfort, & à Strasbourg ; ville qui a adopté plusieurs des bons usages de l'Allemagne ; il y a des hommes chargés de visiter la réalité des décès, & il leur est permis d'interdire qu'un mort de quarante-huit heures ou même plus tard, sans avant le genre de maladie auquel le sujet a succombé. Ce dernier usage, qui est suivi dans beaucoup de villes d'Allemagne, & généralement en Angleterre, a été établi à Gœttinge par Levin.

3°. Il faudroit par conséquent, ainsi que l'avait proposé Bruhier, des inspecteurs chargés spécialement de la visite des morts & comme ces fonctions sont répugnantes, on devroit y attacher de la considération, ou des avantages qui pussent engager les hommes habiles à les accepter. De ces

habiles inspecteurs existent bien dans la plupart des grandes villes d'Europe; mais il doit en être dans beaucoup d'endroits comme à Paris, où, si l'on compte parmi eux des médecins reconnoissables & d'un mérite distingué, ils font en général peu infensibles, se contentent d'aller dans la maison du défunt porter le certificat demandé par sa famille, & négligent très-souvent de s'assurer par toutes les recherches convenables si la mort est réelle. Non-seulement il faudroit attendre l'autorisation de ces inspecteurs pour enterrer un mort, mais même pour l'ensevelir: jusque-là il devroit toujours être tenu le visage découvert. On empêcherait ainsi quelques malheureux d'être étouffés par un usage mal entendu & barbare; quoiqu'ils fussent respectueux, & l'on auroit une garantie de plus contre le crime. Quant aux compagnes; rien ne pourroit ordinairement prévenir les fâcheuses méprises que cause parfois la précipitation à inhumier, & à ensevelir celui qu'on croit privé de la vie; c'est pourquoi, dans celles où il ne peut y avoir d'inspecteurs des morts, il faudroit toujours attendre un commencement de putréfaction non équivoque. (Voyez SÉVIERUS.)

Beaucoup de personnes pensent que les femmes restent plus longtemps que les hommes les apparences de la mort lorsqu'elles sont encore vivantes. Ceux qui partagent cette opinion, disent que Galien fait mention d'une femme dont on n'eût affirmé ni la vie, ni la mort; Forestus parle d'une autre qui fut dans un état de syncope pendant vingt-quatre heures, à la suite d'un accès de nymphomanie; Ambroise Paré cite l'exemple d'une femme dont l'asphyxie dura trois jours, &c., &c. Ce sont de semblables observations rapportées par les auteurs, ajoute-t-on, qui ont fait recommander à Avicenne, à Alexandre Benedicti & à quelques autres, d'attendre soixante-douze heures après la mort pour enterrer les femmes. S'il étoit vrai que des syncopes eussent duré six jours, sans que les malades démontrent le moindre signe de vie, & des léthargies huit jours & plus, il n'y auroit d'autre marque certaine de la mort que la putréfaction; mais on ne peut, dans un sujet aussi grave, s'autoriser de faits aussi mal observés que ces derniers.

4°. C'est ici le lieu de dire que les médecins ne doivent pas toujours croire à la mort de ceux qu'ils traitent, sur la parole des parents ou des gardes. Plus d'une fois, on découvrant le visage de celui qu'on avoit caché avec le drap, ils ont aperçu des signes de vie. Je pourrais nommer quelques médecins de cette capitale qui ont eu le bonheur de voir guérir des personnes dont ils avoient voulu visiter le corps après qu'on leur en avoit annoncé la mort. On peut lire à ce sujet, dans l'ouvrage de Bruhier, une observation intéressante du médecin Falconet. (Sec. part., pag. 71.)

C'est encore ici le lieu de dire que dans le plupart des hôpitaux, dès qu'un malade paroit avoir

exhalé le dernier soupir, on s'empresse, sans avoir consulté avec soin son décès, de le porter dans la salle des morts, où on étend sur une table ou bien sur le pavé, & entouré d'un feuil drap. Or, je demande s'il y a un moyen plus infaillible, surtout en hiver, d'achever de faire mourir. C'est avec raison qu'on a avancé qu'en le pressant ainsi d'éteindre un reste de chaleur, on pouvoit étouffer quelques uns de ceux de vie dont elle est un attribut, un ligne essentiel. Il seroit aisé de prévenir les dangers d'un aussi barbare usage, en déposant pendant quelque temps; & jusqu'au développement de la roideur cadavérique, les corps de ceux que l'on croit morts, dans une pièce suffisamment chauffée.

Dans un ouvrage dicté par la philanthropie, son respectable auteur révérend Walter Whiter, veut le soutenir, avec Bruhier, qu'on doit effayer pendant long-temps de rappeler à la vie ceux qui paroissent morts, surtout quand la cause du décès, réel ou apparent, est une de celles qu'on nomme violentes. (Voyez *A dissertation on the disorder of death; or, that state of the frame under the signs of death, called suspended animation*, &c., in-8°. London, 1819.) Je crois avoir assez indiqué, dans le cours de cet article, le terme auquel il n'est plus permis à un médecin insensit, de continuer une semblable tentative.

(L. R. VILLERMÉ.)

MORT (Signes de la). (Voyez l'article MORT APPARENTE, où ils ont été expliqués.) (L. R. V.)

MORT (Priorité ou non priorité de la), dans les cas qui peuvent donner lieu à une discussion juridique. (Voyez SERVIL.) (L. R. V.)

MORTAGNE (Eaux minérales de). C'est un bourg à deux lieues de Cholet, dans la ci-devant Bretagne. A un demi-quart de lieue on trouve une source minérale froide, que Gallot, d'après l'analyse, regarde comme contenant très-peu de fer, peu d'alcali & de gypse, & encore moins de muriate de soude. Il vante les bons effets dans la cachexie & les obstructions. (MACQUART.)

MORTAIN (Eaux minérales de). C'est une ville sur le petit rivièr de Lances, à quatre lieues de Vire & de Domfront, où le tocaut une fontaine d'eau minérale dite *Barbe-Rouge*, qui est froide, & que l'on croit ferrugineuse. C'est de Saint-James, qui a établi tout près des sources les très-importantes & très-utiles, doit me mettre à portée de rendre un compte plus exact de ces eaux. (MACQUART.)

MORTALITÉ, f. f. *Mortalitas*, *lethalitas*. Ce mot a plusieurs significations bien distinctes. Il exprime, 1°. la condition commune à tous les êtres vivants qui, comme tels, sont sujets à la

mort, &c. la circonstance d'une maladie, d'un accident, &c., qui les rend causes de mort; 3°. la mort de quantité d'hommes ou d'animaux qui succombent à la même maladie; 4°. enfin, la quantité proportionnelle des individus qui, sur une population donnée, meurent dans un intervalle de temps également donné. C'est seulement dans les deux derniers sens que nous devons considérer ici la mortalité. Mais voyez l'ANALYSE des LA VIE. (L. R. V.)

MORTALITÉ DES BLESSURES. (Médecine légale.) Dans le langage médical, une blessure est la solution de continuité des parties molles; en médecine légale on entend par *blessure*, toute espèce de violence exercée sur le corps humain, soit qu'il en résulte plaie ou contusion, fracture, brûlure, dislocation, torsion, luxation, &c.... Je n'entrerai point ici dans les détails relatifs au diagnostic & au pronostic des blessures; à leur classification judiciaire, aux rapports & procès-verbaux d'ouvertures de cadavres qui peuvent être ordonnés par les magistrats; tous ces objets ont été traités aux articles BLESSURES, CONTUSIONS, &c., de ce Dictionnaire. Mon dessein est de présenter ici un travail plus circonscrit, mais non moins important.

La mortalité des blessures en matière judiciaire, c'est-à-dire, la détermination précise des cas dans lesquels une violence exercée sur un individu lui a nécessairement causé la mort, est une des matières les plus importantes de la médecine légale. L'homme de l'art appelé auprès des tribunaux pour des faits de cette espèce, doit bien se pénétrer de cette idée essentielle, qu'il se prononce sans appel sur la fortune, la vie, l'honneur de ses semblables, & que si sa décision peut établir la conviction du coupable, elle doit aussi conduire l'innocence au triomphe. Que de vertus lui sont nécessaires pour remplir dignement ce ministère sacré! que de connaissances profondes pour faire sortir la vérité du sein des nuages dans lesquels la perversité humaine ou de fautes circonstancielles l'enveloppent si souvent! En effet, il doit examiner avec la plus scrupuleuse attention, & dans les plus minutieux détails, l'espèce de violence exercée, toutes les circonstances qui l'ont accompagnée, tous les effets qui l'ont suivie de jour en jour; l'âge, la force, les passions de l'agresseur & du blessé, la situation mutuelle lorsque le coup a été donné & reçu, la nature de l'arme, la forme, sa composition, sa matière, la pureté ou son mélange avec des substances étrangères. Le concours de tous ces faits sert de base au raisonnement, qui doit établir entre la cause & les effets une connexion telle, que l'événement qui a succédé au délit ne puisse être attribué qu'à ce dernier; c'est ce raisonnement qui servira de motif à l'application des lois. Les criminalistes s'accordent à déclarer qu'en pareille matière, plu-

sieurs témoins déposeroient inutilement qu'un individu est mort de la blessure qu'il a reçue; le rapport négatif de deux hommes de l'art rend nulles toutes les dépositions, & détermine l'ajournement du magistrat.

Les docteurs en médecine & en chirurgie n'ont pas seulement alors à prononcer sur la nature mortelle ou non mortelle, mortelle au premier chef ou mortelle par accident, d'une violence exercée; ils doivent encore faire connaître si la mort qui a suivi la blessure n'a pas été l'effet, soit par la nature du malade ou des circonstances, soit par la négligence ou l'impéritie de l'homme de l'art, soit par la non-exécution des moyens qui, convenablement employés, auroient pu sauver le vis du blessé; nouveau genre de délit, qu'ils sont obligés de caractériser & de prouver.

Zacchias rappelle à ce sujet un cas qu'il est utile de consigner ici; il fera connaître la sagacité & la juste fermeté de ce médecin légiste.

Un jeune homme, insulsi par un individu, le frappa à la tête d'un coup de sabre; il tomba sous le coup; un chirurgien appelé reconnut une solution de continuité des parties molles, avec fracture de l'os. Son rapport déclara la blessure mortelle, & l'agresseur fut traduit devant les tribunaux comme coupable d'homicide; cependant le malade se trouve de mieux en mieux chaque jour, sans fièvre, sans douleur, sans accident quelconque. Le chirurgien laissa la plaie se former; elle marche vers une prompte cicatrisation. Le quatorzième jour, des convulsions surviennent, une fièvre forte s'allume; l'homme de l'art dilate alors la plaie pour traiter la fracture de l'os; il étoit trop tard; le malade meurt le dix-huitième jour. Le procès continue à instruire l'agresseur; il sur le point de se voir condamner; son défenseur expose que la blessure n'étoit pas nécessairement mortelle au premier chef; puisque le malade a passé plusieurs jours sans aucune espèce de danger, & que si la mort eût survenu, elle peut être plus vraisemblablement attribuée à l'impéritie ou à la négligence de l'homme de l'art qui a traité cette maladie. Le tribunal suspendit son jugement & consulta le médecin Zacchias; voici le résumé de sa réponse.

Une plaie, quoique très-dangereuse par elle-même, peut n'être pas mortelle de la nature & le devenir par l'erreur de l'homme de l'art. Les blessures de la tête sont un impie font souvent à cet égard aux hommes les plus exercés; elles marchent insidieusement, dit Hippocrate; elles présentent, dit Galien, la plus favorable apparence, & tuent au moment où l'on y pense le moins. Fortuiter Fidelis présente plusieurs exemples faucelles de ce genre. Que dis-je? le législateur de l'art de guérir, le divin Hippocrate, n'avoue-t-il pas lui-même avec une sorte de candeur admirable, s'être trompé dans un cas semblable, en prenant une fracture pour une simple

du crâne, & laissant périr, le seizième jour de la blessure, une malade qu'il aurait pu sauver s'il avait reconnu la lésion ?

La blessure à la tête que l'individu a reçue, ne parait pas avoir été mortelle de sa nature, mortelle nécessairement ou au premier chef. En effet, aucun accident grave ne s'est manifesté au moment où le coup a été porté, & quoiqu'il y ait eu fracture, il y a lieu de penser que ni les méninges qui enveloppent le cerveau, ni cet organe, n'ont été lésés; nul signe, ni de commotion, ni d'épanchement; le malade n'a point vomî à l'instant du coup, il n'a point perdu connaissance, il ne s'est déclaré aucun phénomène d'inflammation, aucune douleur, aucun accident nerveux; la fièvre ne s'est pas montrée; il n'y a eu, en un mot, aucun symptôme primitif alarmant. Du reste, la douceur de la saison, la constitution de l'air de Rome, favorable en général aux plaies de la tête, la qualité de l'air qui a porté le coup, qui n'étoit qu'un simple instrument tranchant, la jeunesse, le bon tempérament & la santé du blessé, le régime convenable qu'il a observé pendant son séjour à l'hôpital, tout sont les renseignements dont le médecin semble prouver que cette blessure, quoique très-grave, n'étant pas nécessairement mortelle; n'a eu cette terminaison malheureuse que par quelque circonstance étrangère à la gravité de l'écoulement. Or, tout porte à croire que cette circonstance étoit l'erreur de l'homme de l'art: il a été trompé par les apparences, & les fautes de la médecine ne présentent que trop d'exemples de pareilles méprises; il n'a pas suivi le traitement convenable à cette espèce de blessure; il devoit cependant y faire d'autant plus d'attention, que lui-même avoit déclaré la blessure mortelle. Son art lui prescrivoit de prévenir les accidents consécutifs, en dilatant la plaie, en favorisant la suppuration, en avisant aux moyens de traiter la fracture elle-même, sans négliger les secours des remèdes internes, si nécessaires en pareil cas. Je me trouve donc dans la cruelle nécessité de déclarer que je regarde la mort du blessé comme l'effet de l'erreur de l'homme de l'art. Si la blessure avoit été mortelle nécessairement, le malade n'eût pas survécu si long-temps. C'est donc en vain que la défense du blessé s'appuie sur la déclaration du chirurgien qui, dans son rapport, a jugé la maladie mortelle, pour en conclure que l'homme qui a porté le coup est coupable d'homicide; en vain pourrait-il se plaindre de cette mort, sur ce que le blessé a tombé sous le coup au moment où il étoit porté; si cette chute avoit été l'effet d'une éruption subite au cerveau ou à ses membranes, cet accident n'eût pas été le seul d'autres non moins alarmans: il seroit tombé sur-le-champ prononcé, comme le vertige, l'absarcissement de la vue, le vomissement bilieux, la syncope, la perte de la voix, des hémorrhagies par les narines, par les oreilles ou la bouche, accidents primitifs qui accom-

pagent toujours les blessures de tête, mortelles au premier chef.

Par tous ces motifs, le docteur Zacchia conclut & estime que la mort de ce blessé ne peut pas être regardée comme un homicide par le fait; l'appuie son prononcé sur la loi Aquilia, *Si quis ex placito*; & sur plusieurs rapports en justice de Romanas & Italiens; sur la Clélie, sur le Digelle, *Si ex hostibus*, &c.

L'accusé fut absous.

Lorsqu'une blessure est déclarée mortelle au premier chef, les circonstances accessoires, telles que l'impéritie ou la négligence de l'homme de l'art, les imprudences du malade, les fautes des assistants, le malheur des circonstances, ne peuvent atténuer le délit ni basculer le empesé; ainsi l'ont déclaré la plupart des criminels, & la raison qui s'ordonne, c'est que la présomption de la mort du blessé est toujours contre l'agresseur volontaire.

Mais si la blessure n'est pas mortelle au premier chef, si elle n'est mortelle que par accident, & que cependant la mort ait suivi la blessure, soit par la faiblesse du malade, soit par celle des hommes de l'art ou des circonstances, il n'y a point lieu à accusation homicide, parce que la présomption est toute entière alors en faveur de l'accusé. (Voyez les ouvrages des plus sages criminels.) Le rapport des gens de l'art doit donc spécialement désigner le genre de mortalité de la blessure.

Dans le cas où le procès-verbal rejette sur l'homme de l'art qui a traité de la blessure, la mort qui l'a suivie, il est essentiel d'observer qu'il faut que la négligence ou l'impéritie soient circonscrites, précises, prouvées de manière à ne laisser aucun doute à cet égard, & que ne peut se dissimuler que le talent le plus reconnu suffit à peine pour prononcer une décision aussi importante, & qui ne tend à rien moins qu'à couvrir d'opprobre & qu'à faire citer devant les tribunaux, comme coupable, un homme enjumeant jacent.

La mortalité au premier chef, d'une blessure, ne doit pas se fonder sur le plus ou moins de temps qui s'est écoulé entre la violence exercée à la mort qui l'a suivie, & l'homicide n'en peut tirer aucune indication en sa faveur; il suffit que la conservation de la vie du blessé ait été reconnue absolument au-dessus des secours de l'art. Une plaie est mortelle, dit Celse, quand elle est presque nécessairement suivie de la mort. Ce principe nécessairement est un hommage rendu à la puissance de la nature, qui opère quelquefois des miracles; mais des exceptions si rares n'appartiennent point à l'art, *non sunt artis*, elles ne peuvent servir d'excuse légitime au meurtrier. Cependant les hommes chargés de rapporter des procès-verbaux sur des objets aussi importants, doivent être imprudents comme la loi; ils ne doivent

vu

vent pas oublier qu'une négligence, une réticence, une inexactitude, même la plus légère, dans l'observation des faits & dans l'exposé des conséquences qu'ils entraînent, peuvent sacrifier l'innocent, & à plus : des blessures le plus souvent mortelles, ne peuvent pas toujours être déclarées mortelles au premier chef, s'il n'est pas de toute impossibilité que le malade eût survécu, ou puissu survivre. L'ouverture de la carotide externe est mortelle de sa nature; cependant cette plaie a été guérie par la ligature. (*Voyez la Jurisprudence médicale* d'Alberti, p. 445.....) Meiller rapporte avoir sauvé la vie par le même moyen à un individu qui avoit l'artère crurale ouverte dans une assez grande étendue.

D'un autre côté, la mort survient très-promptement à la suite d'un violent exercice : il ne faut pas toujours en conclure que cette mort a été l'effet de la blessure. On est surtout obligé de différer son prononcé à cet égard, lorsque l'on croit pouvoir observer que les effets qui ont suivi la blessure, ne répondent pas entièrement à l'espèce, à la gravité, à la nature de la cause qui semble les avoir produits, lorsque surtout l'inspection légale du cadavre ne présente point de lésion très-marquée entre l'acte de la violence & l'état des organes qui ont été atteints. Combien d'individus, immédiatement après une blessure, sont morts par des causes tout-à-fait étrangères à cette blessure ! La colère, l'ivresse, la frayeur ne peuvent-elles pas imprimer sur l'individu blessé des mouvements propres à causer la mort ? Ces individus sont-ils à l'abri des morts subites qui frappent tous les hommes, à tous les âges, dans toutes les circonstances ? Les officiers de santé chargés de rapports judiciaires en crime, doivent avoir toutes ces réflexions présentes à la pensée. Ils se rappelleront aussi qu'il y a des blessures légères en apparence, qui, par les circonstances qui les environnent, sont vraiment mortelles au premier chef, & doivent être déclarées telles ; mais dans la plupart de ces cas, l'ouverture du cadavre peut seule confirmer le diagnostic & motiver le rapport. Ainsi, une plaie légère au scrotum, chez un homme qui a un oschecocèle, devient tout-à-coup mortelle par cette circonstance. Une blessure à peine sensible à l'extérieur, entre dans l'orbite, pénètre le cerveau & occasionne une mort prompte. Un coup d'épée dans le ventre, déchire la portion tendineuse des muscles droits, met le diaphragme en convulsion & est suivi d'une mort prompte ; mais il est vrai que les actes de violence exercée de dessein prémédité, ne présentent jamais de cas de cette espèce.

Il y a des circonstances particulières qui sembleroient devoir atténuer la nature du délit, & conséquemment le degré de la peine qui le suit. Deux hommes reçoivent du même adversaire un coup appliqué avec une égale violence sur la poitrine ; mais l'un, d'une constitution robuste, en

éprouve à peine un crachement de sang léger, tandis que l'autre, foible ou déjà malade, meurt par l'effet de cette blessure. L'agresseur est ici coupable d'homicide de fait. Un individu en frappe un autre à la poitrine ; le blessé meurt : l'infirmité du cadavre prouve que la mort a été l'effet d'une vomique qui s'est ouverte par l'effet du coup. Bohlius uroit que dans cette circonstance, l'agresseur n'est pas coupable d'homicide, puisqu'il n'est que la cause médiate de la mort du blessé. Cette opinion n'a point été adoptée par les criminalistes ; ils soutiennent qu'une violence, quelle qu'elle soit, exercée contre un individu foible, cacochyme, malade, est un acte homicide, quelque légère qu'elle soit en apparence, si la mort en est l'effet, bien que de sa nature elle ne fût pas nécessairement mortelle. (*Voyez Dambrond, Encycloirid. rerum criminali.*, cap. 87, n°. 40.) Ils se fondent sur ce que, dans cette circonstance, l'agresseur a véritablement été la cause de la mort du blessé. Zacchias ne se prononce point sur ce cas difficile, & en abandonne la solution à la sagacité des magistrats.

Comme il arrive très-souvent que les accusés d'homicide, ou leurs défenseurs, sont des distinctions formelles de la mortalité au premier chef, de la blessure, & rejettent la mort sur des causes étrangères, telles que la mauvaie santé du blessé, ses imprudences, ou traitement mal entendu, la négligence à appeler les premiers secours, &c., les juriconsultes ont pensé qu'il étoit prudent d'établir à cet égard une série de présomptions propres à diriger l'homme de l'art dans ses rapports & le magistrat dans ses jugemens. Farinacius est entré dans des détails intéressants à cet égard (*Quest.* 127, §. 2). Zacchias s'est arrêté à la considération des objets les plus importants ; & tous les ouvrages de médecine légale qui ont paru depuis cet homme célèbre, ont été calqués sur le sien.

Parmi les présomptions, celle qui naît du temps écoulé entre la blessure & la mort qui l'a suivie, doit être mûrie par la réflexion avant d'être établie. Les décisions de cette nature sont toujours d'une extrême difficulté. La mort se rapproche plus ou moins de l'acte de violence exercée, non-seulement en raison de la blessure elle-même, mais je l'ai déjà dit, mais par une foule de circonstances & de moyens qui peuvent avoir plus ou moins de rapport avec la blessure, & qui retardent ou accélèrent l'époque fatale. Les médecins ne se font point trouvés, sur ce point, d'accord avec les criminalistes ; ceux-ci mettent, pour ainsi dire, en principe l'impossibilité d'établir une présomption sur la détermination de la mortalité au premier chef, en raison du temps de la mort plus ou moins rapproché de celui de la blessure ; ceux-ci ne consultant que l'expérience commune, sans approfondir la question, établissent des données, ils pensent que dans les plaies de tête, par exemple, lorsque la mort ne survient pas dans les qua-

rante ou quarante-six premiers jours qui suivent la blessure, il n'y a plus lieu à accusation d'homicide pour ce fait; d'autres ont porté en temps à cent trente jours; d'autres à huit mois, un ou quelques-uns à trois ans. L'indétermination de ces époques prouve assez combien ces opinions sont vagues & peu propres à établir une présomption. Aussi, Parinacius ne craint-il pas d'avancer que le temps n'établit aucune induction favorable ou défavorable à la cause, & que si, à la suite d'une blessure infligée à dessein prémédité, la série des accidens s'est continuée sans interruption jusqu'à la mort, quelle que soit l'époque de celle-ci, il y a homicide. Quelques jurisconsultes veulent que dans ces cas difficiles le juge seul prononce; mais comment le magistrat osera-t-il se décider pour ou contre l'accusé, dans ces circonstances, où les connoissances les plus approfondies du médecin le plus consommé peuvent à peine établir une présomption légitime? Voilà pourquoi les Facultés de médecine ont presque toujours été consultées en corps par les tribunaux dans les faits de cette espèce. (Voyez les Consultations de Zacchias, d'Alberti & de Valentin, & les excellens Mémoires de J. L. Petit & de plusieurs autres médecins-légitimes français.)

Les médecins & les jurisconsultes se font cependant accordés pour établir que si la mort arrive dans le terme de trois jours après la blessure, elle peut en être considérée, dans les tribunaux, comme l'effet, pourvu que dans cet espace de temps aucune cause étrangère à la blessure ne se soit manifestée.

La raison qu'ils donnent de leur opinion à cet égard (*Constitut. criminal.* 100, n°. 6), c'est qu'il n'est pas naturel de penser que dans ce court intervalle, une maladie étrangère à la blessure se déclare, suive son cours & se termine par la mort, sans s'être manifestée par des phénomènes qui lui soient propres. Zacchias prolonge ce terme jusqu'au septième jour; il se fonde sur ce que l'hémorrhagie qui survient ordinairement après les blessures, les soins que nécessite le traitement, la diète & le régime que le blessé doit suivre, sont des moyens propres à écarter les maladies aiguës qui pourraient survenir, ou du moins à les rendre bénignes, tandis que celles qui se présentent malgré les secours, annoncent la gravité ou la mortalité de la blessure & lui sont spécialement attachées. Cette opinion de Zacchias est très-sage sans doute, & doit servir de guide aux gens de loi dans la rédaction de leurs rapports; cependant elle a peut-être besoin d'être circonscrite, dans la crainte de confondre une seule fois l'homme malheureux emporté par la passion, avec l'assassin. Ne fait-on pas qu'une fièvre inflammatoire, une fièvre nerveuse, des accidens convulsifs peuvent se déclarer à tous les momens de la vie, & sont quelquefois impossibles à distinguer des fièvres inflammatoires vésicaires, des mouvemens convulsifs dépendans de la blessure? Dans les trois, & à plus forte raison dans les sept premiers jours d'une

blessure, qui de sa nature n'est pas mortelle au premier chef, les circonstances ne peuvent-elles donc développer tout-à-coup des causes de mort, étrangères à la blessure? Les jurisconsultes français (dit Foderé) ont reconnu, depuis long-temps le néant de cette législation, relative au temps qui s'écoule entre la blessure & la mort qui la suit. Lacombe & Serpillon, parlant de la coutume établie en France, qui fixoit cette époque à quarante jours, l'appellent un préjugé. Le président Faber pense qu'à quelque époque que ce soit, pourvu que les secours aient été appliqués à temps, si les accidens ont continué jusqu'à la mort, on peut la regarder comme l'effet de la blessure & condamner l'auteur du délit, comme coupable d'homicide. (*Cod. leg.* IV, liv. 1, tit. 1, délin. 64.)

La présomption de la mortalité au premier chef, d'une blessure, doit donc se fonder d'abord sur la gravité apparente de cette blessure & sur l'importance des fonctions de l'organe blessé pour la conservation de la vie. (Voyez l'article BLESSURE.)

D'autres fois elle se fonde sur ce que l'on appelle la rumeur publique, & le témoignage d'un grand nombre d'hommes présents. Combien de fois elle a sauvé le coupable & fait périr l'innocent! On apporte sur la place publique un homme blessé, sans connoissance & baigné dans son sang; l'agresseur est connu & poursuivi: si le blessé meurt quelques jours après, personne ne doute de l'assassinat, & cependant l'inspection cadavérique peut présenter d'autres causes de mort, telles qu'elles n'aient aucune liaison avec la blessure qu'on aura reconnue n'être pas mortelle au premier chef. Quelle carrière ouverte contre les hommes de l'art, rapporteurs, par la juste douleur de la famille du mort, les passions & la rumeur publique!

La présomption de la mortalité d'une blessure se fonde encore sur l'apparition, au bout d'un certain temps, d'accidens qui ne s'étoient pas encore montrés, & qui ont une liaison directe avec la blessure. Telles sont les douleurs vives, les fièvres d'irritation, les spasmes, les convulsions, les syncopes, les vomissemens, &c. Ces phénomènes ne se présentent jamais dans les blessures qui ne sont pas mortelles, reu lent la présomption légitime en pareil cas. Ces événemens arrivent particulièrement à la suite des plaies de tête, lorsque l'inflammation du cerveau ne s'est formée que peu à peu, lorsqu'un épanchement qui ne se faisoit que goutte à goutte s'est augmenté au point de suspendre des fonctions organiques nécessaires à la vie.

La mort succédant à une maladie aiguë ou chronique qui se trouve être un effet immédiat de la blessure, est encore une présomption de sa mortalité & donne lieu à l'accusation d'homicide. Telle est l'étiologie mortelle à la suite d'une hémorrhagie considérable, telle est la phlébite pulmonaire à la suite d'une plaie de poitrine, &c.

Je pourrais étendre ces détails, mais les généralités suffisent ici. Les différents articles BIZARRIERS, INFAMIEUX, &c., du *Code pénal*, fournissent tout ce qu'on peut désirer à cet égard. Je me permettrai de terminer cet article par l'exposition analytique de la marche de la jurisprudence française sur cet objet.

« S'il est prouvé que l'accusé en venoit à la vie de celui qu'il a blessé, il est puni comme assassin, quoique la mort n'ait pas suivi la blessure ; s'il n'y avoit pas de dessein prémédité & que la mort n'ait pas eu lieu, il n'y a que la partie civile à poursuivre ; si la mort s'ensuivoit, il falloit des lettres de grâce pour être relevé de l'homicide ; mais dans ce cas il étoit nécessaire de prouver qu'anparavant que la blessé étoit mort de sa blessure ; qu'il n'y avoit eu ni de sa part, ni de celle des personnes qui l'avoient entouré, ni faute ni négligence, c'est-à-dire, que la blessure étoit mortelle au premier chef. S'il en étoit autrement, on ne pouvoit condamner comme homicide l'auteur du délit. Il suffisoit ainsi que le traitement mal entendu ou le défaut de soins fussent légalement constatés, pour soustraire le prévenu, même en cas de blessure mortelle par elle-même : car on doit présumer équitablement, disent les jurisconsultes, que la blessure eût été guérie si elle eût été bien traitée. (*Collection de Jurisprudence*, de Camus & Bayard, article *Blessures*, §. 1.) »

Lorsque la mort ne suit pas la blessure, les lois françaises ont fixé le temps pendant lequel le blessé est hors d'état de vaquer à ses affaires ordinaires.

Lorsqu'il est constaté par les attestations légales des gens de l'art, que la personne maltraitée se trouve, par l'effet du la blessure, rendue incapable de vaquer, pendant plus de quarante jours, à aucun travail corporel, le coupable de cette violence sera puni de deux années de détention.

Lorsque, par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, ou une jambe, ou une cuisse cassée, la peine sera de trois années de détention.

Lorsque la personne maltraitée aura perdu l'usage d'un oeil, d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie du la tête ou du corps, la peine sera de quatre années de détention.

Elle sera de six années de fers, si la personne maltraitée s'est trouvée, par l'effet des blessures, privée de l'usage absolu de la vue, ou des deux bras ou des deux jambes. (*Code pénal*, 2^e partie, titre II, sect. 1.) (GUSTANT.)

L'article que l'on vient de lire & que nous avons trouvé dans les archives du *Dictionnaire de Médecine* de l'*Encyclopédie*, renferme plusieurs vues & plusieurs observations très-importantes, non-seulement pour les médecins, mais pour les ci-

toyens qui peuvent être appelés à remplir les fonctions de jurés, ou à méditer utilement sur l'insuffisance & la réforme de plusieurs dispositions du *Code pénal*. Toutefois, cet article n'ayant pas embrassé toute l'étendue de la question, nous croyons devoir y joindre les remarques suivantes, sans nous attacher trop rigoureusement au sujet unique de la mortalité des blessures, qui est tout-à-fait inséparable de leur gravité, considérée relativement à leur nature ou relativement aux causes accidentelles qui peuvent l'augmenter, & cela d'une manière tout-à-fait étrangère à la nature du délit dont elles ont été la suite.

MORTALITÉ DES BLESSURES, ou plutôt, & d'après une manière de s'exprimer plus exacte, *létalité des blessures*, article qui a été omis dans les premiers volumes de ce Dictionnaire.

Les blessures sont mortelles pour le vulgaire, lorsqu'elles ont été suivies de la mort, & sans avoir égard à une foule d'accidents ou de dispositions particulières qui peuvent en avoir aggravé les effets physiques, tels qu'un état antérieur de maladie chez le blessé ou même une lésion organique déjà très-ancienne, une disposition extraordinaire des viscères de la poitrine ou du bas-ventre, une transposition de viscères ou une situation extraordinaire de l'estomac, de la vessie, des reins, une hernie, le défaut de secours ou l'effet d'un traitement peu convenable, &c. : circonstances qui ne peuvent être convenablement appréciées que par des médecins très-instruits, & non moins familiarisés avec les principes les plus élevés de la science, qu'avec les détails de la pratique. Ce qui concerne la mortalité ou la létalité des blessures, ne fait qu'une partie de la question relative à leur gravité, suivant les effets physiques qui en sont la suite directe & nécessaire. La constitution Carolino en Allemagne, ayant établi des peines proportionnées à cette gravité des blessures, l'attention des médecins de cette nation se porta naturellement sur un sujet de recherches, dont les dispositions du *Code criminel* augmentent l'importance.

Sebizius établit le premier on l'an des premiers, à ce sujet, une distinction entre les blessures mortelles par elles-mêmes, & les blessures mortelles par accident (1).

Welfch traite ensuite, *ex professo*, de la létalité des blessures (2), qui devint bientôt, pour un auteur plus célèbre, le sujet d'un ouvrage demeuré classique (3).

Plusieurs écrivains ont continué, soit en Allemagne, soit en Italie, de s'occuper de la même

(1) *Examen vulnorum, pro ut letalia sunt, vel sanabilia, vel incurabilia*, 1638, in-8^o.

(2) *Rationale vulnorum letalium judicium*, 1660, in-8^o.

(3) *Bobn, de vulnorum remanentibus*. Leipzig, 1689, in-8^o.

question, qu'ils ont trop souvent embarrassée par des divisions & des sous-divisions scolastiques ou spéculatives.

L'établissement des jurés en France, & l'usage de prononcer sur la question intentionnelle des scélérats, plutôt que sur l'effet physique des blessures, expliquent comment les médecins sont moins souvent consultés sur ce genre de phénomènes. Toutefois quelques articles particuliers du Code pénal en France exigent encore, soit pour être corrigés, soit pour être appliqués, l'intervention des médecins, qui n'ont jamais cessé d'élever de justes réclamations contre plusieurs titres de ce Code; & les décisions des plus célèbres criminalistes, relativement à l'espace de temps qui s'écoule entre une blessure, la guérison & la terminaison funeste, considérés comme la mesure de la gravité de cette blessure & de l'étendue du délit qui l'a occasionnée (1). Il n'est donc pas indifférent ni inutile de s'occuper encore aujourd'hui de la mortalité des blessures & de leur gravité, dont cette fatalité n'est que le plus haut degré. Nous demandons en conséquence qu'il nous soit permis de nous arrêter ici à quelques considérations qui ont échappé à l'auteur, aux articles BLESSURES & MORTALITÉ DES BLESSURES de ce Dictionnaire, & qui sont tirées en grande partie d'une dissertation présentée à la Faculté de Paris par M. Haard, & qui est attribuée à M. le professeur Chabacier.

La mortalité ou la gravité des blessures ne peut être bien recounue que par une application, & le développement de quelques vus que l'on doit attacher en médecine légale au mot *blessure* & aux différentes dénominations sous lesquelles on a désigné les principales différences ou variétés dont les blessures sont susceptibles.

Le mot *blessure*, dit le savant professeur que nous venons de citer, « se mot à une acception bien plus étendue dans la médecine légale que dans la chirurgie proprement dite, tandis que dans la chirurgie, ce mot exprime une solution de continuité, une entamure faite dans le tissu des parties molles du corps, par quelque instrument piquant, coupant ou contondant; ce mot, en médecine légale, est une expression collective, désignant toute altération locale de quelque organe ou tissu, produite immédiatement, soit par des coups, des percussions, des tractions, torsions, secousses, piqûres, coupures ou autres

actes de violence, soit par l'application extérieure du feu, des corps brûlans ou caustiques. Sous ce titre sont donc compris plusieurs genres de lésions très-différentes, que l'on confond souvent dans le public, mais que dans les rapports juridiques, le médecin expert doit exactement spécifier & désigner par le nom qui leur est propre. »

Ces lésions diverses, qui sont comprises sous le titre ou nom collectif de *blessures*, sont, d'après le même auteur que nous venons de citer, rapportées à sept genres, savoir : la *contusion*, la *commotion*, la *fracture*, la *luxation*, l'*entorse*, la *brûlure* & la *plaie*. Voici les traits qu'il alligne comme caractères à chacun d'eux.

» La *contusion* consiste dans le froissement, l'écrasement, l'attrition du tissu d'une partie, avec rupture d'une certaine quantité de ses vaisseaux, de ses fibres, mais sans entamure à la peau. Tousjours accompagnée d'ecchymoses, parfois de thrombus ou d'épanchement de sang, cette lésion est produite par la percussion, le choc d'un corps dur & obtus; par l'impulsion, la pression, la chute d'une masse pesante; & si ne faut pas la confondre avec la rupture totale ou partielle d'un muscle, d'un tendon, d'une aponeurose, ou la crevasse d'un viscère creux ou musculéux, qui peut être produite tout-à-coup par une contusion violente, incomplète, inégale, ou la distension excessive par un fluide accumulé dans la cavité.

» La *commotion* est un état d'engorgement, de stupeur, immédiatement produit par une secousse, un ébranlement, un choc de la tête, une chute sur les fesses, les talons, les genoux, les lombes, & même par une percussion violente aux membres ou à quelque partie du torse. Cette lésion, qui arrête ou suspend tout-à-coup l'action nerveuse, ne laisse pas de trace apparente de ses effets dans le tissu des organes; elle est seulement caractérisée par la suspension ou interruption de la sensibilité; interruption qui peut être momentanée, plus ou moins persistante, locale, générale & même absolue & mortelle dans l'instant même. Ainsi, ce genre de lésion peut se rapprocher des lipothymies, syncopes ou morts subites, qui, dans certains cas, sont produites par une surpente, une frayeur excessive.

» La *fracture* est la rupture d'un os, d'un cartilage en deux ou plusieurs morceaux, parfois avec esquilles ou éclats plus ou moins volumineux; toujours produite par un coup, par un effort, une chute, une violence extérieure qui agit sur les solides en les pliant, les courbant, les portant au-delà du degré d'élasticité, de flexibilité qui leur est propre; est accompagnée de phénomènes qui surviennent plus ou moins promptement, selon la cause, le siège, le mode de fracture; savoir, de changement dans la forme de la partie fracturée, de flexibilité dans cette partie, qui étoit auparavant inflexible, de crépitation, &c.

» La *luxation* est la disjonction, ou déplac-

(1) Les dispositions qui établissent que les scélérats pour castration, & les officiers ou les agents de l'autorité publique, entraînent la peine de mort, si le blessé périt dans l'intervalle de quarante jours des suites de les blessures. Voyez l'art. 309 du Code, & l'art. 311 ci-dessus.

» Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie, ou l'incapacité de travail personnel, mentionnée à l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, & d'une amende de 10 francs à 200 francs. »

ment des surfaces articulaires, un changement dans la position naturelle, le contact mutuel des os, immédiatement produit par un coup, une chute, une violence extérieure & toujours accompagnée de douleur, d'une altération plus ou moins grande de la forme, de la longueur de la partie, de l'impossibilité ou difficulté de ses mouvements. Ainsi, par la cause, ce genre de lésion diffère essentiellement de cette affection chronique que l'on nomme *luxation consécutive ou spontanée*.

« L'entorse le rapproche de la luxation; c'est un genre de lésion qui est caractérisé par un gonflement douloureux, la gêne, la difficulté des mouvements de la partie, & qui résulte d'une torsion, renversement ou autre violence subite quelconque, qui distend, force, tire les ligaments, les capsules d'une articulation, lâche & détermine parfois la rupture de quelques vaisseaux, de quelques fibres ligamenteuses; qui d'autres fois enfin, dans les articulations ferrées, produit la distase, la distorsion ou léger écartement des surfaces, qui auparavant étoient en contact.

« La brûlure est l'altération du tissu des parties, qui est produite par le feu ou les cautiques. Cette lésion présente de grandes différences suivant la nature de l'agent, la durée, l'étendue de son application: quelquefois elle est bornée à la rubéfaction, à la vésication, à l'inflammation; d'autres fois, elle est accompagnée d'escarres plus ou moins larges & profondes, de la carbonisation ou de la destruction totale des tissus.

« Enfin, la plaie est une solution de continuité extérieure & accidentelle, une entaille apparente, produite par une cause mécanique; qui, de la surface du corps, s'étend plus ou moins profondément dans le tissu des parties sous-jacentes, & est accompagnée de phénomènes qui diffèrent suivant la cause vulnérante, la nature, les usages ou fonctions des parties lésées; la situation, la forme; l'étendue, le nombre des plaies, leur complication ou association avec les autres genres de blessures. Du reste, les différences des plaies sont nombreuses, & M. Chaulier les rapporte aux articles suivants: 1°. relativement à la cause vulnérante, à son mode d'action: elles sont des *coupures* quand elles sont faites par des instrumens tranchans, compans; des *piqûres* quand elles sont faites par un instrument aigu, étroit; enfoncé dans le tissu d'une partie; des *égratignures*, lorsqu'elles consistent en des entames linéaires, faites par un corps dont l'action a été bornée à la surface de la peau; des *plaies contuses*, c'est-à-dire, faites par le choc d'un corps contondant, qui divise le tissu des parties en les écartant, les déchirant; des *plaies d'armes à feu*, quand elles sont faites par une balle, un boulet, tout corps dur lancé par la poudre à canon, & qui, dans son explosion, écrase, déchire, emporte le tissu des parties; des *morsures*, lorsqu'elles sont produites par les dents d'un animal; des

arrachemens, lorsqu'elles le sont par la dissection, la rupture avec séparation par une cause mécanique quelconque; des *excoriations*, quand leur cause est un corps dur, qui, en glissant sur la surface de la peau, en détache l'épiderme; enfin des *plaies vénéneuses*, quand elles sont faites par un corps imprégné d'un poison ou d'une substance délétère: toutes ces distinctions ne sont point indifférentes; & ces dénominations diverses ayant toutes un sens précis, ne doivent pas être indistinctement employées dans les rapports; 2°. relativement à la situation, les plaies peuvent être à la tête, au cou, au thorax, à l'abdomen, aux membres thoraciques ou abdominaux, à la partie antérieure, aux parties latérales ou postérieures de ces régions; 3°. relativement à leur étendue, elles sont *grandes, moyennes, petites, longues, larges, superficielles*, c'est-à-dire, bornées aux téguments; *profondes*, ou comprenant le tissu des parties sous-jacentes; *pénétrantes* dans une cavité splachnique, avec ou sans lésion des organes qui y sont contenus, avec ou sans issue & déplacement de ces organes, avec épanchement de sang ou non; *perforantes*, c'est-à-dire, traversant de part en part l'épaisseur d'un membre, d'une cavité splachnique; 4°. relativement à la direction: les plaies considérées sous ce rapport, sont *longitudinales, transversales, obliques*, &c.; 5°. relativement à leur forme & figure, il en est de *longues ou linéaires, cruciales, triangulaires, rondes, irrégulières*: les unes sont avec lambeaux; d'autres avec perte de substance, ou séparation totale ou incomplète d'une partie; 6°. relativement aux parties lésées, les plaies attaquent la *peau*, les *nerfs*, les *artères*, les *os*, les *veines*, les *muscles*, les *viscères*; 7°. relativement à leurs temps ou périodes; les plaies peuvent être *récentes, sanglantes, enflammées, suppurantes*, &c.

« Du reste, & suivant toujours le même auteur, c'est surtout relativement aux suites ou effets qui résultent des plaies; que ces plaies ont donné lieu d'établir, en médecine légale, des distinctions, nombreuses & variées, & qui cependant doivent toujours être exprimées d'une manière claire & précise dans les rapports juridiques. Ainsi, d'abord les plaies sont *mortelles* ou *non mortelles*. Dans le premier cas, elles sont *mortelles nécessairement* (de *necessitate lethalia absolute aut per se*), ou bien elles ne sont qu'*accidentellement mortelles* (*lethalia per accidens, ut plurimum lethalia*). Lorsqu'elles sont mortelles, tantôt elles le sont sur-le-champ, tantôt elles ne le sont qu'après quelques jours, ou même après un long temps, lorsqu'elles ne sont pas mortelles, elles sont *curebles* ou *incurebles* (*curabilia*, aut *incurabilia*). Les premières sont celles qui sont susceptibles de guérison; elles peuvent encore offrir mille différences que le médecin expert doit mentionner dans les rapports: ainsi elles peuvent être *graves* ou *dangereuses*, lorsque la guérison en est incer-

taïne; ou bien, au contraire, *légères*, lorsqu'elles sont presque certaintement, & un peu de temps, *guérissables*. Ainsi elles peuvent être *facilement, promptement & complètement curables*, soit par les seules forces de la nature, le repos, par exemple, la seule situation convenable de la partie; soit par les moyens les plus simples de l'art, comme la seule agglutination des lèvres de la plaie: telles sont, par exemple, les plaies simples de la peau dans un sujet sain, une constitution saine, les incisions du tissu graisseux sans aucune complication; ou bien, au contraire, elles peuvent être *difficilement, lentement ou incomplètement curables*, telles que le sont par exemple les plaies compliquées de contusions, d'hémorragies, de corps étrangers, de pertes de substance: en effet, souvent alors il peut y avoir suppuration; des opérations plus ou moins difficiles peuvent devenir nécessaires à la cure; divers accidents peuvent venir l'embarrasser.

» La guérison peut être accomplie en vingt jours, ou exiger un temps plus long: & nous faisons remarquer cette différence, parce que c'est sur elle que la loi fait porter la différence des peines dont elle frappe l'auteur de la blessure. La guérison est *complète*, ou elle n'est qu'*incomplète*, c'est-à-dire, qu'alors la plaie laisse après elle, ou des difformités ou des incommodités qui peuvent être permanentes ou temporaires, ou la perte de quelques fonctions. Quant aux plaies incurables, elles le sont ou par elles-mêmes, d'une manière absolue, ou par accident, & le plus souvent cela ne s'entend que des infirmités qu'une blessure peut laisser après elle. Enfin, les plaies diffèrent encore par leur essence: elles peuvent être *simples* ou *compliquées*, c'est-à-dire, avec hémorragies, présence de corps étrangers; ou *associées*, c'est-à-dire, accompagnées de quelques-unes des autres lésions qui sont comprises sous le nom générique de *blessures*.

» Tel est le tableau des nombreuses lésions que comprend la loi sous ce nom collectif *blessures*: & l'on voit de suite à combien de considérations doit avoir égard le médecin expert qui est appelé à prononcer dans un rapport sur les effets physiques d'un acte de violence quelconque. On voit à combien de discussions délicates peut conduire la seule exposition d'un fait de ce genre, quelque simple qu'il paroisse d'abord. Nous avons cru devoir présenter cette énumération rapide de tous les objets qui se rapportent aux blessures, afin de donner plus de force aux réflexions que nous allons nous permettre sur les articles des lois qui les concernent; & encore une fois, c'est à M. le professeur Chaussier, à ce maître si célèbre par tant de travaux divers, que nous avons emprunté tout ce détail: qu'il nous soit permis de lui demander ici excuse de notre plagiat. Revenons maintenant aux deux articles du Code pénal que nous avons cités.

» Ces articles décident la peine qui doit être ap-

pliquée à l'auteur d'une blessure, d'un acte de violence quelconque. Nous ferons à ce sujet deux sortes de remarques, les unes sur ces articles considérés en eux-mêmes, les autres relatives à la difficulté dans laquelle on est souvent d'en faire l'application. Notre première remarque sera donc relative à la base, d'après laquelle le législateur a fixé la nature & la quantité de la peine: cette base est l'effet physique de la blessure: selon que la blessure a occasionné une maladie, ou incapacité de travail personnel, qui a duré plus ou moins de vingt jours, l'auteur de cette blessure est puni de la réclusion, ou de l'emprisonnement, c'est-à-dire, d'une peine infamante, ou simplement afflictive. Nous pensons que cette base est mal choisie. On nous arrêtera peut-être de suite; sur le prétexte, que nous n'avons pas ici à réformer la loi, & que cette loi étant consacrée, il ne reste plus qu'à s'y soumettre. Mais il nous semble que, sans manquer au respect que l'on doit à la loi, il est permis d'appeler l'attention des citoyens & des législateurs sur les parties de notre législation qui peuvent paroître vicieuses, & réclamer des modifications, tout en se montrant soumis à cette loi, jusqu'à ce qu'elle soit constitutionnellement changée. Or, encore une fois, la base d'après laquelle on a fixé, dans les articles précités du Code pénal, la peine à appliquer à l'auteur d'une blessure, d'un acte de violence quelconque, nous paroît mauvaise.

» En effet, parmi les lésions diverses qui sont comprises sous le titre générique de *blessures*, déjà il en est plusieurs qui ne peuvent jamais être guéries en moins de vingt jours, & qui, conséquemment, réclament l'application de l'article 309. Telles sont, par exemple, les fractures, les fortes contusions, souvent les entorses, les fortes commotions, & un grand nombre de plaies, & cependant ces lésions peuvent dépendre du même acte de violence qui aura produit une blessure qui aura été guérie en moins de vingt jours, & qui, dès-lors, ne sera passible que de l'article 311. La sanction étant moralement la même dans les deux cas, comment la loi peut-elle y appliquer des peines si différentes, & vouloir que dans l'un, le coupable soit jugé par une cour d'assises & puni d'une peine infamante; & que, dans l'autre, il soit jugé par un simple tribunal correctionnel? On ne peut nier que parmi les défordres qui résultent d'un acte de violence, il est beaucoup de particularités qui sont indépendantes de la volonté & de l'intention de son auteur. Dans un accès de colère, tout-à-coup provoqué dans une rixe soudaine & imprévue, un individu en frappe un autre, & un hasard malheureux peut faire qu'une des parties délicates du corps humain soit atteinte, & qu'il résulte de cet acte de violence, des défordres dont la gravité & la durée ne soient pas en rapport avec la violence légère qui avoit été exercée. Le même coup, par exemple, peut, ou n'occasionner qu'une

légère contusion, ou, en renversant le blessé, lui causer une fracture; & encore une fois, dans les deux cas, la culpabilité est la même; pourquoi donc la loi inflige-t-elle des peines différentes, ou au moins si grandement disproportionnées? Il nous semble qu'il ne devrait pas suffire d'apprécier les effets d'un acte de violence quelconque pour en régler la peine, mais qu'il faudrait encore avoir égard à toutes les circonstances concomitantes, & surtout à tout ce qui fonde le caractère moral de l'action.

» On objectera peut-être que l'appréciation de la volonté, de l'intention de l'auteur d'une blessure, ne changent rien aux effets malheureux qui en sont le résultat. Cela n'est que trop vrai, sans doute; mais de même que la loi ne frappe que de peines légères les blessures qui ont été faites involontairement & par accident, & même l'homicide; de même il nous semble qu'elle ait pu ici avoir plus d'égard à ce qui est de volonté, de l'intention du coupable; & en séparant ce qui est de son fait personnel strictement, de ce qui est d'un hasard malheureux, établir plus de gradation dans les peines. Est-il de la justice, par exemple, qu'un individu soit pour le même acte frappé de deux peines différentes? & cependant cela pourra être, si un homme exerçant lui-même une violence sur deux individus, a fait à l'un une simple contusion qui fera guérie en quelques jours, & produit chez l'autre une fracture dont le mal ne sera fait qu'après un mois. A la vérité nous reconnaissons que la moralité de l'action ne devait pas à elle seule servir de base à la fixation de la peine, & que celle-ci devait aussi être un peu proportionnée à la gravité du désordre produit; mais nous pensons aussi que ce désordre ne devait pas nous plus à lui seul constituer cette base, mais qu'il falloit que la loi eût à la fois égard à ces deux circonstances, & qu'elle eût, d'après elle, gradé convenablement la peine.

» Ce que nous disons est si vrai, que souvent des jurys ont trouvé l'article 309 trop sévère, & ont été affligés de frapper d'une peine infamante l'auteur d'une blessure qui, à la vérité, étoit condamnée par la lettre de la loi, mais qui, par des considérations morales & des circonstances atténuantes, étoit d'autre part absous en partie dans leur conscience. Souvent même alors, effrayés par un excès de sévérité qu'ils trouvoient injuste, ces jurys ont préféré ne pas croire aux faits, pour échapper au texte de la loi, & ne pas trop punir un homme qui leur paroîtait plus malheureux que coupable. Nous en lisons l'exemple suivant dans l'ouvrage de médecine légale de M. Foderé. « Un honnête laboureur du département de l'Ain avoit déjà prié plusieurs fois une de ses voisines de ne plus mettre le pied dans sa maison, parce qu'elle donnoit de mauvais conseils à sa femme, & l'empêchoit de remplir ses devoirs; la voisine n'en avoit pas moins continué ses visites. Un jour que

le laboureur étoit aux champs, son dîner ne lui fut pas apporté selon la coutume, & il se détermina à l'aller chercher. En entrant chez lui, il trouve sa femme à table avec la voisine, & l'une & l'autre occupées à boire & à manger. Cet homme, dans un mouvement de colère, prit la voisine par le bras, & la poussa dehors en lui donnant un coup de pied dans le derrière; malheureusement la voisine, en recevant le coup, alla heurter du front contre un des angles de la porte, d'où résulta une plaie avec effusion de sang. Elle porta la plainte en aggravant l'offense comme de coutume, & se met entre les mains d'un chirurgien qui fait durer le traitement pendant deux mois, & qui déclare dans son rapport, que cette femme a été empêchée de tout travail corporel pendant plus de vingt jours; d'où une demande de 10,000 francs de dommages & intérêts. La cause, par suite du rapport du chirurgien, est portée au criminel, & jugée par la cour d'assises du département de l'Ain, dans la session de janvier 1812. Le jury, considérant qu'il s'agissoit d'un accident malheureux qui alloit faire condamner un citoyen honnête à cinq années de réclusion, & d'après l'audition de quelques témoins qui avoient déclaré avoir vu la plaignante sortir de nuit pendant les vingt premiers jours de la maladie, infirma le rapport du chirurgien, & déclara que la femme n'avoit pas été malade & incapable de travail personnel pendant plus de vingt jours. La cause, en conséquence, fut portée au correctionnel, & le laboureur fut condamné à un mois de prison, à 300 francs de dommages & aux dépens. » Sans doute on ne peut blâmer moralement le subterfuge qu'employa ici le jury; mais néanmoins ce fut toujours une transgression à la loi, & on ne peut nier que ce soit un malheur que la loi soit faite de manière à ce que l'on ait quelquefois le désir & comme raison de la violer.

» Dans ce cas, le jury trouva l'article 309 trop sévère: dans beaucoup d'autres, au contraire, il trouva l'article 311 trop doux, à jager d'après la moralité de l'action, & n'ayant malheureusement à en punir que les effets.

» Nous concluons donc à ce que les articles 309 & 311 du Code pénal, qui ne prennent pour base de la fixité des peines à appliquer à l'auteur d'une blessure, que le temps qu'a duré la maladie qui en est résultée, auroient besoin d'être modifiés & de contenir quelques clauses qui eussent trait à la partie morale de l'action. »

En nous attachant toujours à la même autorité, nous affirmerons que l'on ne peut prononcer sur la gravité & la durée des suites de certaines blessures, sans avoir égard aux diverses circonstances qui peuvent prolonger les effets d'une lésion au-delà du terme naturel où ils devroient aller. « Savoir, ou à ce que le blessé portoit en lui-même quelque disposition matérielle & organique qui

a donné à la blessure plus de durée, on a été que la saison, la constitution atmosphérique régnante, ont déterminé l'explosion d'accidens qui ont retardé la guérison, on a ce que l'on n'a pas opposé, dès le principe, à la blessure, un traitement rationnel & propre à en déterminer la guérison aussi promptement que possible; ou bien enfin, à ce que le blessé, dans la vue de faire illiger à son ennemi une peine plus forte, & pour en obtenir des dommages & intérêts plus considérables, s'est livré secrètement à des pratiques qui ont prolongé la durée de son mal. »

D'après un grand nombre de faits, & suivant les considérations judicieuses de M. le professeur Chaulhier, on doit conclure que très-souvent une blessure peut prolonger un temps considérable par suite de dispositions organiques que le blessé porte en lui; & que, toutes les fois qu'on est appelé à juger des suites d'une blessure, il faut faire la part de ce qui tient à la blessure d'une manière absolue, & de ce qui tient à la constitution particulière du blessé. Mais d'abord cela suppose déjà que ce médecin expert est habile, & trop souvent les magistrats sont peu judicieux dans le choix qu'ils font des hommes de l'art auxquels ils demandent des rapports. En second lieu, il faudroit que le blessé voulût bien se prêter à l'examen que l'on fait de sa constitution propre, qu'il répondît avec franchise aux questions qui lui sont faites sur sa vie passée; & trop souvent, par sentiment de vengeance contre l'auteur de sa blessure, il dissimule tout ce qui peut venir de son fait, pour charger davantage son adversaire. En troisième lieu, le plus souvent les débats de ce genre s'agitent après que le blessé est guéri, & lorsqu'on n'a plus sous les yeux qu'un rapport écrit, & qui, presque toujours, est imparfait; enfin il faut convenir que quelquefois rien n'annonce à l'extérieur, dans un blessé, le germe de la maladie qui va se développer en lui, & qu'on sera disposé à attribuer à la blessure, parce qu'elle coïncide avec elle : & en effet, les maladies ne surviennent-elles pas souvent au milieu de la santé la plus parfaite en apparence? Lorsque, par exemple, un érysipèle ou une éruption cutanée quelconque éclate, n'est-ce pas souvent au milieu de la plus parfaite santé, & lorsque rien n'annonçoit dans l'économie le besoin de la dépuración qui va se faire? Qui peut dès-lors assurer qu'un blessé dont la guérison se fait attendre plus qu'on ne pourroit raisonnablement le supposer, ne se trouve pas dans cette disposition secrète?

« Nous aurions pu ajouter beaucoup d'autres considérations à ce premier point, mais celles-là suffisent pour prouver que quelquefois c'est une question fort délicate de savoir, si le temps pendant lequel a duré une blessure, doit être attribué à la blessure elle-même, ou à quelque disposition constitutionnelle du blessé. Toutefois c'est un précepte de rigueur pour le médecin expert, que de cher-

cher toujours à apprécier dans les effets d'une blessure, ce qui tient à l'une & à l'autre de ces deux causes.

2^o. « Le médecin expert doit aussi avoir égard à la saison dans laquelle la blessure a été faite, aux circonstances atmosphériques dans lesquelles s'est trouvé le blessé au moment où il a reçu sa blessure, & pendant tout le temps qu'il a employé à se guérir. Très-souvent il trouvera dans ces circonstances extérieures, la cause des phénomènes qui ont aggravé le mal & retardé la guérison. Ainsi, supposez qu'un blessé soit apporté dans un hôpital où règne la gangrène d'hôpital, & que ce blessé en contracte la contagion : le mal fera considérablement aggravé, & aura surtout plus de durée; seroit-il juste des-lors d'en rapporter les suites à l'auteur de la blessure? De même supposons que la blessure ait été faite dans le cours d'une saison chaude, à l'époque de l'année où la constitution atmosphérique prédispose aux affections bilieuses, seroit-il bien extraordinaire alors de voir la maladie se compliquer d'un érysipèle bilieux, & avoir alors une durée qu'elle n'auroit pas eue sans cette complication? Il est mille remarques de ce genre qui doivent être faites, & qui viennent compliquer la question que l'on doit résoudre.

« Cette observation a été faite par Paré : Pour bien juger des suites d'une blessure, a dit cet auteur, & assurer si elle doit être considérée comme légère, grave, mortelle, ou si le traitement en sera long & difficile, il faut considérer : 1^o. la nature de la blessure; 2^o. ses complications; 3^o. la cause; 4^o. les accidens dont elle a été accompagnée dans les premiers instans. Il faut plus encore, il faut considérer l'état de la saison & des maladies qui régnent alors. Pour faire sentir l'importance de cette observation, Paré ajoute qu'*au temps de la bataille de Saint-Denis & au siège de Rouen, pour l'indisposition & malignité de l'air, ou pour la cacochymie des corps & perturbation des humeurs, presque toutes les plaies, surtout celles faites par armes à feu, étoient mortelles. Ainsi, en considérant la constitution actuelle, nous pouvons prononcer que les hommes blessés étoient en danger de mort.*

3^o. « Ce qui n'est pas moins important à considérer, c'est de savoir si l'on a opposé à la blessure le traitement convenable, & cela non-seulement au moment même où elle a été faite, mais encore dans tout le cours de la maladie qui en a été la suite. Avons-nous besoin de dire que s'il est telle blessure qui ne réclame en quelque sorte aucun soin, & qui peut guérir d'elle-même, il en est beaucoup, au contraire, qui réclament des soins appropriés, & dont la guérison est considérablement hâtée par le secours de ces soins? Un individu, par exemple, reçoit un coup de fabre sur la tête : il en résulte une plaie énorme en apparence, surtout pour les gens du monde, & cependant

dant cette plaie, réunie par première intention, c'est-à-dire, par l'approximation de ses bords, peut être guérie en quelques jours. Si, au contraire, on ne lui applique pas les procédés de l'art, cette plaie suppurera, & sa cicatrisation dépassera le terme de vingt jours, au-delà duquel le coupable est passible de l'article 309 du Code pénal. Or, est-il juste de faire porter à celui-ci la peine d'un retard qui est dû à ce qu'on n'a pas opposé à la plaie le traitement convenable ? Ceci est donc un troisième ordre de considérations auxquelles il faut avoir égard lorsqu'on est appelé à juger la temps qui a été nécessaire à la guérison d'une blessure. Mais s'il y eût eu de l'injustice à rapporter à l'auteur d'une blessure le retard qui est dû à ce qu'on n'a pas employé le traitement approprié, combien n'y en aurait-il pas davantage à lui attribuer tout le mal qui anroit résulté de l'emploi d'un traitement mauvais ! Supposons une fracture, par exemple. S'il est évident que la fracture, quoique facile à réduire & à maintenir, n'a été ni réduite, ni maintenue ; si aucun chirurgien n'a été appelé, ou bien que ce chirurgien inhabile ait fait l'opposé de ce que son art lui prescrit dans cette circonstance ; si conséquemment le cas est bien plus long-temps à se former, & que, par suite, le blessé, non-seulement soit plus long-temps à guérir, mais encore reste estropié & difforme, on conçoit de suite qu'il y aurait de l'injustice à rapporter à l'auteur de la blessure toutes les suites fâcheuses, & qu'il faut encore ici faire la part de ce qui tient à la blessure elle-même, & de ce qui appartient au vice du traitement. De même que dans les cas précédents, il faut analyser la part qui avoit à la production des effets observés, & la blessure en elle-même, & les dispositions individuelles du blessé, & les circonstances extérieures dans lesquelles il est placé : de même encore ici il faut se représenter ce qui seroit vraisemblablement arrivé sans l'influence d'un traitement rationnel, & quels désordres nouveaux, quel retard a dû amener un traitement intempestif & dangereux.

Non-seulement les reproches à faire au traitement peuvent venir de l'ignorance, & de l'inhabileté des chirurgiens qui a été appelé, mais ils peuvent aussi être dus au malade lui-même. Ce malade peut n'avoir pas voulu se soumettre, dans l'origine de la maladie, à certaines opérations qui auroient bû de beaucoup fa guérison, en bien il peut n'avoir pas voulu suivre les règles de conduite qui lui étoient imposées. Ainsi, qu'il y ait une blessure, une plaie avec présence de corps étrangers, par exemple ; mais que l'extraction de ces corps étrangers ne puisse pas se faire sans quelques écorchemens, un malade timide peut s'y refuser ; les corps étrangers par sa présence amènent la formation de plusieurs abcès qui s'il sont successivement ouverts ; la maladie acquiert ainsi une durée qu'elle n'auroit pas eue, si on avoit fait de suite les incisions nécessaires. De même un individu, à

MÉDECINE. Tome X.

la suite d'un acte de violence, & qu'une contusion, une foulure ; le repos lui est impérativement prescrit ; mais il ne veut pas s'y soumettre ; il survient une maladie de l'articulation, & une lésion qui n'étoit que légère, & surtout peu durable, est ainsi devenue très-grave. Un homme a reçu un coup de fabre qui lui a fendu nos des lèvres : on ne tente la réunion par la suture entortillée ; mais on lui prescrit en outre le silence ; le malade ne veut pas s'y soumettre ; l'inflammation développée oblige de couper la pointe de suture, la plaie se le guérit plus que par la voie seule de la suppuration, & surtout laisse après elle une énorme difformité. Qui accuser dans tous ces cas, de l'auteur de la blessure, ou du blessé ?

La mesure dans laquelle le blessé s'est montré docile à ce qu'exigeoit sa blessure, pour la guérison la plus prompte possible, peut s'étendre à bien d'autres points : il ne s'agit pas seulement de savoir si les moyens chirurgicaux convenables ont été employés, mais si le régime intérieur a été observé, si le blessé ne s'est pas livré à des excès de table, s'il n'a pas abusé des travaux de l'esprit, s'il n'a pas été en proie à quelques affections morales un peu vives, &c. Tout concourt en effet dans l'économie animale ; & que pourroit espérer l'homme de l'art, si, tandis qu'il agit dans un sens, le malade agit dans un autre ? Supposons, par exemple, un individu avec une forte contusion, dans une partie quelconque du corps ; le chirurgien, dans la vue de prévenir l'inflammation, pratique des saignées, recourt à des émolliens ; mais réussira-t-il, si en même temps le blessé use de liqueurs fortes, ou est sans cesse excité par l'explosion de passions haineuses & colériques ? Combien ne voit-on pas de simples plaies tarder à se cicatriser, par cela seul que le blessé mange trop, & que l'estomac dérive à son profit les forces que la partie atteinte a besoin de développer pour la cicatrisation ?

Cette appréciation du traitement qui a été opposée à la blessure, est donc très-importante aussi, & comme on voit, il faut, pour la faire équitablement, rassembler un assez grand nombre de données. Il faudroit en quelque sorte qu'on eût pu visiter le blessé chaque jour & à des heures imprévues, de manière à ce qu'on ne pût rien ignorer de sa conduite. C'est ainsi que cette indication, seule du temps qu'a mis une blessure quelconque à guérir, lorsque cette indication est matière à procès criminel, devient un problème assez délicat à résoudre, & qui va en se compliquant de plus en plus, à chaque considération nouvelle par laquelle nous disons que doit se porter l'attention.

4°. Enfin, ce n'est pas seulement par suite des dispositions morbides dans lesquelles peut être le blessé, ou à raison des circonstances atmosphériques défavorables dans lesquelles il est placé, ou parce que le blessé n'a pas été soumis au traitement convenable, ou n'a eu ni le courage ni la

Xx

sagesse de suivre les préceptes qui lui ont été donnés, qu'une blessure quelconque se prodige au-delà de terme auquel elle auroit guéri naturellement. Il peut arriver encore que le blessé, dans la vue d'obtenir des dommages & intérêts plus considérables ; & de faire infliger une peine plus forte à l'auteur qui l'a offensé, entretienne secrètement son mal. Ou a vu quelquefois des chirurgiens indignés de ce leur titre, servir ainsi la vengeance des blessés, & retarder la guérison des blessures par l'opposé d'une réfrigération & d'humoraires plus considérables. Il est du devoir du magistrat, peut-être plus encore que du médecin expert, de rechercher si une pareille fraude n'est pas commise ; & pour y échapper, il faudroit en quelque sorte que le chirurgien expert fût autorisé à visiter le blessé à différentes époques pendant le cours de son traitement ; & toujours à des intervalles où il ne seroit pas attendu. Le professeur qui pressé à cet acte public, nous a dit avoir vu plusieurs fois, dans le cours de la longue pratique, des blessés recourir à des applications d'acide nitrique ou de caustiques, dans le but de prolonger la durée de leurs plaies, & il reconnoît la fraude à ce que, dans le cas de l'emploi de l'acide nitrique, toute la surface de la plaie étoit entachée d'une couleur jaune particulière, avec pustules érythémateuses dans le pourtour.

« **Telles** sont les différentes considérations auxquelles il faut avoir égard, quand il s'agit de prononcer sur le temps qu'a duré la maladie d'une blessure, & pour savoir s'il y a lieu d'appliquer à l'auteur de la blessure l'article 309 ou 311 du Code pénal. On voit que le nombre des données à embrasser est considérable, & que souvent alors la question ne peut être résolue que d'une manière approximative. Pourroit-il en effet en être autrement, puisqu'il s'agit de faits médicaux ? & dans ces questions où il s'agit d'indiquer d'une manière rigoureuse quelle est la cause incontestable de l'effet qu'on observe, peut-on n'être pas embarrassé à préciser la part que nous offre dans la reproduction de cet effet, chacune des nombreuses causes qui agissent toujours en même temps sur l'homme ? De plus, toutes ces considérations s'appliquent de même à tous effets quelconques qui peuvent résulter de blessures. Nous étant attachés surtout aux articles 309 & 311 du Code pénal, nous les avons appliqués surtout au temps qu'emploie une blessure quelconque à guérir ; mais il est important aussi d'y avoir égard lorsqu'il s'agit de prononcer si la mort a été la suite d'une blessure, si la difformité qu'a laissée après elle une blessure quelconque, en a été une suite nécessaire & inévitable, &c. Ce qui ajoute à la difficulté, qu'on trouve surtout à répondre à ces diverses questions, c'est que le plus ordinairement, quand on les agit, on a plus le blessé sous les yeux, on n'a pour base de son opinion qu'un rapport écrit, qui presque toujours est incomplet, & laisse beau-

coup de points dans l'ignorance & dans le doute. »

Le fait suivant, rapporté dans la même Dissertation, semble ajouter un nouveau poids & un nouvel intérêt aux considérations dont elle se compose.

« Le 31 décembre 1814, le nommé *Jenquin* revenoit tranquillement à son domicile en suivant le sentier le plus battu & le moins mauvais de la route, lorsqu'il fut rencontré par un homme à cheval qui avoit pris le même sentier. Quoique la route fut large, l'homme à cheval, au lieu de se démanier, ce qu'il auroit pu faire facilement, voulut que Jenquin lui cédât le pas, & pour l'y forcer, il lui donna un coup de bâton noueux, qui porta sur la partie gauche & supérieure du front, & y fit une plaie de la longueur de deux pouces. Le cavalier s'enfuit aussitôt, & le pauvre Jenquin, ensanglanté, grièvement blessé, & déjà souffrant de la tête, regagna hâtivement son logis ; & au lieu de réclamer les secours de l'art, cet homme vigoureux & plein de courage se passa lui-même, & continua chaque jour ses travaux ordinaires. Cependant les douleurs de tête & les accidents augmentèrent à un tel point, que le quinzisième jour il fut obligé de s'aliter & mourut le dix-huitième. »

On apprend par ce rapport, que la pression de la tête avoit donné lieu à une plaie du cuir chevelu, à la fêlure du crâne, & à un épanchement entre les membranes du cerveau. Il nous parut démontré, disoient les médecins experts, que ces lésions étoient l'effet de la même cause. Il est reconnu, ajoutoient-ils, « qu'une simple fêlure au crâne est plus dangereuse qu'un fracas plus grand de ses os, parce que la commotion a été plus forte & Plus des fluides épanchés impossible. Il demeure également constant qu'un épanchement entre les membranes du cerveau est presque toujours mortel, si l'on n'y fait l'application des saignées de l'art. Il est certain que toutes les parties ont été lésées & reconnues par nous dans un état absolument sain, excepté quelques légères adhérences de la pèvre au pavillon droit.

« **Considérant** enfin que cet individu n'a opposé à son état ni précaution, ni traitement médical, nous déclarons que nous ne pouvons attribuer la mort à d'autre cause qu'à l'épanchement consenti produit dans le cerveau par suite du coup qu'il reçut le 31 décembre.

« Nous observons cependant qu'un traitement régulier & commencé à temps, auroit peut-être prévenu la mort.

« En foi de quoi, &c. »

Les considérations qui précèdent, & qui sont relatives à la durée des effets physiques des blessures, considérées comme la mesure de leur gravité, s'appliquent également à toutes les circonstances dans lesquelles les magistrats & les jurys doivent être éclairés sur leur légalité.

Les blessures dont les effets physiques sont avérés, de rapport, peuvent être rapportées à trois titres principaux ; savoir : 1°. les blessures absolument ou nécessairement mortelles, quelles que soient d'ailleurs la promptitude & l'efficacité des secours que l'on prodigeroit aux blessés ; 2°. les plaies effectivement & constamment mortelles, sans le secours de l'art ; 3°. les plaies qui ne sont mortelles que d'une manière accidentelle & par des causes étrangères à leur gravité.

Les documents que nous venons d'exposer d'après M. le professeur Chaussier, concernant les accidents nombreux & variés qui peuvent abrégier ou prolonger la durée des effets physiques d'une blessure, serviront également pour évaluer les causes purement éventuelles, capables de les rendre mortelles, sans rajouter à la gravité du lésion.

Les blessures absolument mortelles sont toutes celles qui seroient faites avec des armes imprégnées d'un poison rapidement délétère, tel que le poison de plusieurs lavages, l'extrait de la noix vomique, ou d'une autre plante de la famille des *strychnos* ; mais en s'en rapportant à l'expérience, on comprend dans cette classe les lésions du poulmon, du cœur, du diaphragme, du cerveau ; du prolongement rachidien, ayant pour résultat la commotion ou l'épanchement, les hémorrhagies, soit que le sang s'écoule à l'extérieur, soit qu'il s'épanche dans l'une des cavités splanchiques ou dans le péricardium d'un organe ; les plaies pénétrantes du bas-ventre, enfin toutes les lésions qui n'ont pas seulement pour effet inévitable l'extinction rapide des fonctions vitales, mais l'épanchement intérieur, l'inflammation, la gangrène, dont les secours de l'art ne peuvent arrêter les progrès.

Une mort soudaine & spontanée n'est pas d'ailleurs toujours la suite de ces blessures. Souvenant de l'exemple d'une fracture & d'une luxation de la colonne vertébrale, auxquelles le blessé survécut vingt mois entiers, en proie à des douleurs horribles. Dans plusieurs circonstances il devient très-difficile, comme en toutes choses égales d'ailleurs on apparence, de concevoir comment un blessé succombe soudain à une lésion, tandis qu'une lésion analogue n'est pas immédiatement suivie de la mort dans une autre circonstance ; la plus petite diversité dans ce cas peut contribuer toutelois à des résultats aussi différens. « Lorsqu'une blessure de l'espèce de celle que reçut manifestement le duc de Berry, n'atteint pas des parties essentielles à la vie, dit M. Dupuy-tren (dans l'examen d'une question qui se rattache au sujet qui nous occupe), cette blessure peut encore devenir dangereuse de cent manières ; mais ce n'est ordinairement qu'après quelques jours, & lorsque les accidents inflammatoires ont eu le temps de se développer. Au contraire, lorsqu'elle attaque les parties essen-

tielles à la vie, elle entraîne presque immédiatement la mort. C'est ainsi que mourut le duc de Berry. « La blessure de l'osmoigne le duc de Berry n'avoit suivi exactement ni l'une ni l'autre de ces marches ; il avoit survécu trop peu de temps, et n'admettant qu'elle n'eût affecté que les parties communes ; il ne sembleroit pas qu'il eût pu vivre aussi long-temps, en admettant qu'elle eût affecté des organes très-essentiels à la vie.

« L'ouverture du corps éclaircit toutes les doutes : les parois du poulmon étoient divisées entre la cinquième & la sixième côtes droites ; le poulmon, qui, par l'effet d'une variété assez commune, n'avoit que deux lobes, étoit traversé à sa partie antérieure. Ces deux lésions n'ont en presque aucune influence sur la production des accidents ; mais le péricarde & l'oreillette droite du cœur étoient ouverts ; cette dernière étoit traversée du part en part, & l'inflammation qui pour pénétrer à une si grande profondeur, avoit dû faire fléchir les parois de la poitrine, s'étoit arrêté dans le centre nerveux du diaphragme, & sans le traverser entièrement. Deux livres de sang étoient épanchées dans le côté droit de la poitrine.

« Telles étoient les véritables causes des accidents qui avoit éprouvés le prince, & de la mort qui les avoit terminés. La blessure de l'oreillette avoit donné lieu au trouble de la circulation, l'épanchement, à l'oppression & à la gêne de la respiration, la lésion du centre nerveux du diaphragme, aux vomissements.

« Il ne fut trouvé aucune autre cause de mort. « Celles qui viennent d'être exposées avoient plus que suffi pour la produire. Il ne fut pas même trouvé un seul germe de maladie. La nature sembloit s'être complue à répandre dans l'organisation du prince, les éléments de la santé, de la force & de la longévité. Toutes ces choses ont été détruites par le fer d'un assassin !

« Que si l'on demandoit pourquoi le cœur ayant été blessé, la vie a pu le prolonger aussi long-temps, on pourroit dire, peut-être, qu'il existe dans cet organe des parties plus ou moins essentielles, & dont la lésion entraîne un danger plus ou moins prochain ; que, parmi ces cavités, lesunes reçoivent le sang qui revient des poulmons, lequel est rouge, circule avec rapidité, est actuellement, & dans tous les temps, indispensable à la vie ; que les autres reçoivent le sang ramené des diverses parties du corps par les veines ; que celui-ci est noir, qu'il circule avec lenteur, & qu'il est actuellement moins nécessaire à la vie ; de telle sorte que, posée sur les ventricles du cœur ou sur les grosses artères qui en partent, on bien encore sur le côté gauche du cœur, sans lésion des parties, la blessure eût été, toutes choses égales d'ailleurs, plus promptement fatale, & eût pu entraîner immédiatement la mort.

« Henri IV, frappé comme monseigneur le duc de Berry, par un fanatisme, exprime immédiatement à sans avoir polé une seule parole. Le fer sillonné avait pourtant traversé chez tous deux les parois de la poitrine, le poumon & une oreillette du cœur; mais chez le grand & le bon roi, le coup, porté au côté gauche de la poitrine, avait atteint l'oreillette de ce côté; tandis que, chez monseigneur le duc de Berry, le coup, porté au côté droit de la poitrine, avait atteint l'oreillette droite. Cette différence, la seule qu'on trouve entre deux blessures d'ailleurs si analogues, est peut-être ce qui a permis à la vie du prince de se prolonger assez long-temps pour que le monde n'ait pas été privé du spectacle d'une si héroïque! (1) »

Dans ces derniers temps, un anatomiste célèbre, Soemmering, a élevé des doutes sur la cessation rapide & absolue de la vie, dans la décapitation; cette question ne peut pas être regardée comme indifférente pour la médecine légale, puisque, suivant qu'elle seroit décidée pour l'affirmative ou la négative, les conséquences de son examen porteroient à conserver ou à supprimer, pour la peine capitale, le mode de supplice qui a été adopté en France depuis la fin du dix-huitième siècle. Da risse, cette même question ne laisse plus de doute aujourd'hui aux physiologistes les plus éclairés, qui s'accordent tous à regarder l'action du cerveau & la circulation, qui sont également détruites dans la décapitation, comme des fonctions éminemment vitales, & dont l'abolition en conséquence doit être irrévocablement suivie d'une mort prompte & certaine (2).

Les blessures effectivement mortelles sont toutes les hémorrhagies des membres, qui sont immédiatement perir le blessé s'il n'est promptement secouru; les grandes fractures, plusieurs plaies de tête, quelques plaies pénétrantes de la poitrine ou du bas-ventre, &c.

La mort, dans le cas de léthargie absolue ou de léthargie éphémère, n'a point d'époque fixe, & les médecins éclairés ne cessent jamais d'élever de justes réclamations contre les dispositions des juriconsultes, qui ont porté les uns à deux ou trois jours, les autres à neuf, & le plus grand nombre à quarante, le terme au-delà duquel commencent la léthargie accidentelle.

Les plaies de tête surtout présentent, sous ce rapport de la durée, des différences très-remarquables, & dont l'observation ne peut se concilier

(1) Triller a rapporté l'exemple d'une blessure du cœur qui ne fut mortelle qu'au quatrième jour (le prince de la Roche-Moreau, âgé de 21 ans, fut tué par une balle).

(2) Voyez à ce sujet l'excellente dissertation de Orlans, intitulée *De la durée de la vie humaine, mortelle & non mortelle, &c.* & augmentée de plusieurs autres traits du même auteur.

avec des dispositions législatives semblables; ainsi, Valler a cité l'exemple d'une plaie de tête, absolument mortelle, aux suites de laquelle le blessé ne survécut que le quarante-deuxième jour.

M. Noël, professeur de Strasbourg, rapportoit ordinairement dans ses leçons, la circonstance d'une plaie de tête, par un coup de sabre sur le pariétal gauche, dont la léthargie ne s'éleva que quinze jours après la blessure, & lorsque le soldat qui l'avoit reçue sortoit de l'hôpital avec une apparence de guérison.

Haller cite un fait beaucoup plus remarquable, celui d'un général qui mourut après un an & un jour, des suites d'une plaie de tête qu'il avoit presque oubliée.

Si l'on vouloit donner plus détail au sujet qui nous occupe, en discutant en quelque sorte la mortalité ou la léthargie des blessures, il ne faudroit rien moins que passer successivement en revue, & pour en évaluer la gravité, les différents espèces de lésions ou de blessures; les diversités qui résultent des organes qu'elles ont affectés, de l'étendue & de l'importance des foyers de ces mêmes organes. (Voyez, à ce sujet, les *Principes de médecine légale* de Metzger, traduits de l'allemand par M. Ballard, in-8°. Paris, 1813.)

(L. J. M.)

MORT-CHIEN. Nom vulgaire du colchique automnal (*colchicum autumnale*). (P.)

MORTELL, MORTELLS, adj. (blessures, plaies). (*Médecine légale.*) Voyez **MORTALITÉ DES BLESSURES.** (A.)

MORTIFÈRE, adj. Qui porte la mort. Expression peu employée & tombée en désuétude.

(L. J. M.)

MORTIFICATION, f. f. On désigne par ce nom l'état d'une partie du corps qui a perdu sa chaleur naturelle, sa sensibilité, sa couleur, dans laquelle la circulation du sang & des humeurs ne se fait plus, & où le principe vital est éteint, ou prêt à s'éteindre. D'après cette définition, on voit qu'on doit distinguer deux degrés dans la mortification : dans le premier, elle n'est que commencent à s'opérer, & on la distingue par le mot de *gangrène*; tandis que dans l'autre, elle est parfaite & continuée, & alors elle a reçu le nom de *phagène*.

Dans la gangrène, la partie affectée de ce mal est plus molle, elle a perdu sa chaleur naturelle, sa couleur est changée, elle est livide, violette ou noire, & il s'écoule sur la peau des vésicules ou phlyctènes, d'où s'écoule une sérosité ichoreuse de mauvaise odeur. Cependant la vie n'est pas tout-à-fait éteinte dans la partie malade, il y subsiste encore un sillon de vitalité, qui peut être rasé.

Mais dans le sphacèle ou mortification parfaite, outre la perte de la couleur, de la chaleur, de la sensibilité, & les autres signes de la gangrène, les liqueurs ne circulent plus, se corrompent & tournent à la putréfaction, le tissu des solides s'altère & se décompose, la vie est totalement éteinte dans la partie, qui tombe en pourriture; elle est tout-à-fait morte, sans aucune espérance de la ranimer. (Voyez GANGRÈNE & SPHACÈLE.)

(GROSSIÈRE père.)

MORTIFICATION, f. l. L'état des parties tombées en gangrène. A peu près synonyme de GANGRÈNE sèche, ou, par extinction, abolition des propriétés vitales dans une partie. (Voyez GANGRÈNE, dans le Dictionnaire de Chirurgie.) (L. J. M.)

MORT-NÉ EN APPARENCE, adj. (Méd. prat.) On appelle de ce nom l'enfant qui ne donne aucun signe de vie au moment où il est né; cet état exclut de la qualité d'héritier; il est donc bien essentiel de faire connaître les caractères qui désignent une mort certaine d'avec une mort apparente, 1°. pour savoir quels sont les cas où l'enfant peut être conservé; 2°. pour connaître dans quelles circonstances la loi le considère héritier; c'est surtout de ce dernier objet dont je vais m'occuper dans cet article.

L'enfant comme l'adulte ne manifeste la vie que par des mouvements volontaires ou involontaires, la respiration & les cris. Les mouvements volontaires s'exécutent plus sensiblement par les extrémités; mais, en matière de jurisprudence, l'attestation de ces mouvements doit être précise & exempte de toute erreur. On ne peut donc être assuré de la réalité des mouvements volontaires, que quand un nouveau-né, placé dans une attitude commode, changera une extrémité de situation, en sorte qu'elle ne présente plus les mêmes rapports avec le corps. J'ai dit qu'il étoit nécessaire que l'enfant fût placé dans une attitude commode, parce qu'autrement le poids des membres pourroit les entrainer d'un lieu à un autre; ce qui ne seroit rien moins que la preuve d'un mouvement volontaire. L'action mécanique morte, à son principe dans la gravitation & par conséquent on ne pourra bien déterminer cette question, que lorsqu'un enfant, couché sur un plan horizontal, changera l'attitude de son corps ou celle d'une extrémité quelconque à condition encore, que les bras comme les jambes & les cuisses ne soient pas posés de manière à ce que les nas ou les autres puissent glisser en suivant les lois de la gravitation. Je ne parlerai point des mouvements de tout le corps, parce qu'ils ne laissent aucun doute sur la vie.

On appelle volontaires, les mouvements qui sont exécutés dans l'état de santé, par les organes essentiels à la vie; tels sont le cœur & les artères, les poumons & le cerveau; on pourroit joindre ceux des viscères de la digestion, dont l'examen

ne contribue point à donner des éclaircissements sur la question présente: Si le cœur se meut sensiblement, l'enfant vit; mais des mouvements de cet organe peuvent être insensibles, malgré que la vie se continue; il ne reste donc alors que l'examen des artères. Si l'on distingue leurs pulsations, le nouveau-né est vivant. Quel que soit le vaisseau artériel qui batte pendant l'examen, il offre un signe manifeste de la vie, & on doit comprendre au nombre des artères celles qu'on nomme ombilicales.

Les mouvements de la respiration, l'abaissement & l'élevation alternative du thorax, sont un signe de vie. Quant aux cris & aux gémissements, ils sont la preuve d'une fonction qui exige le secours de plusieurs autres pour être exécutés; il faut donc une force de vie considérable pour que cette fonction ait lieu.

L'action du cerveau étant insensible (si on en excepte les mouvements qu'il reçoit de la respiration), nous n'avons rien à dire sur cet objet.

Il existe une autre sorte de mouvements involontaires, qui peuvent se manifester sans le secours d'aucun autre, qui sont quelques-uns des dernières agitations de l'être vivant: je parle en ce moment des contractions convulsives, puisqu'elles ne peuvent avoir lieu que par l'influence du système nerveux: elles supposent donc encore, au moment où elles se manifestent, la continuation de la vie. Quand même le cœur & les artères n'auroient plus d'action sensible, quand la respiration n'auroit pas été commencée, un mouvement convulsif suffit pour constater la vie. Comme l'irritabilité à laquelle ils doivent leur origine subsiste long-temps après la mort, & que cette faculté ne s'éteint qu'avec la chaleur de l'animal, il ne faudroit pas croire qu'un enfant est vivant, si on avoit employé un agent mécanique pour susciter des contractions dans les chairs. Peut-être que la vie s'étend plus loin qu'on ne le croit communément; mais, quand elle subsisteroit, on pourroit la suffire encore dans une partie qui resteroit irritable; la loi fixe la mort, au moment où un enfant ne donne plus de signe de vie, qui soit le résultat de l'ensemble des fonctions. En effet, puisqu'une portion de muscle séparée du corps se contracte visiblement quand elle est agacée, elle n'est pas moins privée de la vie, puisqu'elle ne reçoit plus l'influence du liquide qui anime toute la machine, & qu'elle est soustraite à son action.

Il est donc certain, d'après les réflexions qu'on vient de lire, qu'un mouvement convulsif suppose une cause capable d'agacer le muscle ou les muscles qui l'exécutent; & quand un agent extérieur ne peut être soupçonné de lui avoir donné naissance, on doit en rapporter l'origine à l'action du fluide nerveux: or, le mouvement de ce fluide est une fonction qui suppose nécessairement l'existence de la vie.

On peut objecter que les animaux à sang chaud, dont on a tranché la tête, se meurent encore après la mutilation du tronc, & que le siège de la vie étant placé à l'origine des nerfs, le corps se meurt après qu'elle en existe plus; que, par conséquent, des mouvements tumultueux, exécutés par les organes, ne sont point une preuve de la vie actuelle de l'animal. Pour que cette objection eût quelque solidité, il faudrait supposer, 1^o. que le principe actif qui nous anime résiderait seulement dans l'origine des nerfs; 2^o. que les contractions musculaires dépendissent aussi de toute autre cause que de l'action du fluide nerveux, sans le concours d'une cause externe. Il est prouvé par l'observation, que la compression de la moelle allongée interrompt ou anéantit la plupart des fonctions; mais si quelques-unes subsistent, malgré que les organes qui les exécutent ne reçoivent plus l'esprit animal des nerfs qui partent de la tête, il faut en conclure que ceux qui tirent leur origine des ganglions cervicaux, thoraciques, & antérieurs, sont soumis à l'influence de ces corps qui, on peut regarder comme autant de cerveaux particuliers, qui font vivre & agir à leur manière les parties auxquelles ils communiquent une certaine action. Or, cette proposition est prouvée par la destruction de certains nerfs, dont la privation anéantit les fonctions des organes auxquels ils sont distribués, quoique ces mêmes organes reçoivent des nerfs étrangers.

C'est ainsi qu'on peut expliquer pourquoi la respiration se continue chez les apoplectiques, & pourquoi la circulation n'est nullement interrompue chez les mêmes malades; c'est ainsi que la ligature ou la section du nerf diaphragmatique rend la respiration difficile ou paralysant le diaphragme, quoiqu'il se muscle reçoive d'autres nerfs dans toute son étendue; c'est ainsi que les tumeurs & les filets nerveux qui partent des ganglions semi-lunaires & des plexus du bas-ventre, font continuer la digestion malgré la compression de la moelle allongée chez les personnes atteintes de maladie comateuse.

Chaque espèce de nerf a donc une influence particulière sur les parties dont il doit susciter les fonctions: or, cette influence n'est autre chose que la vie, puisqu'elle suppose plusieurs actions réelles qui sont la circulation des esprits, celle du sang, la sensibilité des organes, leur irritabilité, &c. D'ailleurs il n'y a point de comparaison à faire entre un animal dont la tête a été séparée du corps, avec celui qui n'est point mutilé, parce que si l'action du cerveau ne se manifeste pas sensiblement chez ce dernier, on ne peut pas conclure qu'elle n'existe pas. La preuve de ceci se tire des symptômes de la mort apparente de quelques nouveau-nés, auxquels on rend la santé, quoique toute espèce d'action soit absolument interrompue.

Il ne suffirait donc pas, dans l'ordre de la nature,

de constater l'existence de la vie d'un nouveau-né par les signes qui la manifestent; il faut encore savoir s'il peut être rappelé à la vie; car un état morbifique peut interrompre l'exécution des fonctions sans les détruire, & quand on n'est pas assuré de la mort des fœtus, & que les preuves qui la constateraient, & dont j'ai donné le détail en parlant des *factus mortis* dans l'intensité avant leur naissance, ou n'est pas disposé de leur donner les secours convenables.

J'appellerai cet état, *mort apparente des nouveau-nés*.

L'enfant de la naissance est un temps de troubles pour les nouveau-nés; & les causes qui se réunissent pour opérer leur destruction paroissent bien multipliées. Cependant, je vais encore donner un nouveau sujet de crainte sur leur sort, parce que la mort a presque toujours enlevé ceux qui ont été exposés aux suites de l'état dont je vais présenter le tableau. J'avertis d'avance que ces causes ont une grande activité, & qu'il est indispensable d'apporter de bonne heure obstacle à leur effet funeste. Il tue avec une promptitude étonnante, parce que les soins qu'on prend ordinairement des enfants atteints de la maladie que je vais décrire, hâtent encore leur trépas. Je n'ai pas encore dit tout ce qu'il doit inspirer de frayeur. Les mères les mieux constituées sont celles qui doivent redouter que ce genre de mort, sur lequel je cherche à fixer aujourd'hui l'attention de physicians, ne les prive de leurs descendants.

En 1766, la femme d'un particulier de Brevaux, village situé dans le Bassigny, fit appeler mon père au moment de son accouchement. Il examina la situation & laissa à une accoucheuse exercer le soin de ce travail, parce qu'il ne présentait aucune difficulté. Il fut en effet terminé promptement & sans accident de la part de la mère. On fit à l'enfant la ligature du cordon ombilical, mais il ne donna pas le plus léger signe de vie.

L'accoucheuse apprit cet événement à mon père le lendemain. Incertain sur la cause d'un accident aussi singulier, il en instruisit ses amis, en leur priant de lui communiquer ce qu'ils pourroient savoir de relatif à un cas aussi extraordinaire. Il leur fit observer que ce même enfant, au moment qui avoit précédé la naissance, avoit donné des signes de vie qui constatoient sa santé. Ils ne lui apprirent rien. Tel fut le sort du troisième enfant de cette accouchée, & les deux premiers étoient morts de la même manière.

La mère devint grosse une quatrième fois. Mon père fut témoin de la terminaison de l'accouchement. L'enfant n'éprouva aucune manœuvre fatigante; il étoit parfaitement bien conformé; il avoit donné des signes de vie, & comme les premiers, il ne fit aucun mouvement après sa naissance. Mon père prit le parti de le laisser entre les cuisses de sa mère, avant de faire l'extraction du

placenta, sans conper le cordon ombilical. Quelque temps après, l'enfant fit quelques mouvements, mais à peine étoient-ils sensibles; cependant ils acquirent plus de force. On entendit des cris, d'abord très-foibles. On ne fit la ligature du cordon que quand les mouvements & les cris prouvèrent que les fonctions s'exécutoient avec beaucoup de liberté dans ce nouveau-né.

Pour concevoir la cause de cette mort apparente, nous ne pouvons nous dispenser de considérer ici ce qui se passe dans la grossesse & lors de l'accouchement. Le mouvement qui entretient la vie des animaux varie, comme on sait, suivant le tempérament & la manière de vivre de chaque individu. Dans la campagne, l'enfance se passe dans le travail. La fréquence des mouvements fait écouler les fluides avec plus de rapidité; il y a donc de plus grands frottements, d'où une cohésion plus grande entre les molécules qui composent la fibre élémentaire, parce qu'elles se trouvent plus rapprochées; les vaisseaux sont donc d'un tissu plus serré, plus dur & plus élastique.

L'action des vaisseaux du placenta, & le mouvement des fluides qui les parcourent, seroient-ils soumis à d'autres lois? La communication des artères hypogastriques avec les veines du placenta est trop bien prouvée aujourd'hui pour que personne puisse en douter. Ce fait admis, il s'en suit que le placenta contiendra une somme de fluides relative à la quantité qui circulera dans le corps de la mère, & que la vitesse avec laquelle il sera mis, sera aussi proportionnée à celle qui le fait parcourir les canaux du Utérus. Maintenant, si nous faisons connaître comment la femme qui fait en partie le sujet de ce Mémoire, étoit devenue pléthorique pendant sa grossesse, nous aurons prouvé en même temps l'existence de la pléthore de la matrice & de celle du placenta, & par conséquent de celle du fœtus.

Cette femme étoit couturière; mais, comme presque toutes les autres femmes, elle s'occupoit des travaux de la campagne quand les saisons exigent qu'ils soient faits avec célérité. Elle jouissoit de la meilleure santé, & la grossesse ne lui procura point d'autres inconvénients que l'embarras insupportable du volume du ventre dans les derniers temps, qui gêne la liberté des grands mouvements. Il est essentiel d'observer une coutume généralement suivie parmi les particuliers qui vivent avec quelque aisance dans cette province: elle consiste à donner à leurs femmes une nourriture plus abondante & mieux choisie par la fin de leur grossesse, & de ne leur permettre alors que de légers exercices. Il arrive de là qu'une nourriture plus succulente, chez des sujets dont la santé insupportable s'entretenoit avec des aliments d'une médiocre valeur, donne lieu à une pléthore excessive qui deviendroit funeste à la mère & au fœtus, si on ne pratiquoit pas des saignées abondantes. Malgré cette précau-

tion, la pléthore subsiste toujours, parce que la quantité de sang perdue se répare avec une vitesse incroyable.

Quand la matrice entre en contraction pour chasser le fœtus au dehors, elle exerce sur lui des pressions violentes & douloureuses. Le premier effet qui s'opère dans toute l'habitude du corps de l'enfant, est une contraction vive de la part des substances irritables. Il doit donc y avoir une impulsion des fluides de la surface vers les grandes cavités. Les viscères les plus mous se trouvent ainsi surchargés de toute la quantité de sang qui devoit circuler librement dans le reste des vaisseaux. Le cerveau est le viscère qui résiste le moins; c'est aussi sur lui que se porte l'effort du liquide.

Les enfans ne sont pas plutôt soustraits aux contractions de la matrice, qu'ils se trouvent exposés au contact de l'air. Cet élément augmente la violence du spasme que les tourmens ont causé. Son action a lieu par deux causes: 1^o. par la rigidité de ses molécules, qualité qui lui est essentielle comme air simple, ce qui cause une sorte d'irritation qui dépend de la différence du contact de l'air, comparé avec celui des eaux dans lesquelles l'enfant a été retenu précédemment; 2^o. par la froidure. Les médecins qui ont observé les effets du froid, ont toujours trouvé le cerveau & les poumons remplis d'une grande quantité de sang. Dans les nouveau-nés, le sang ne traverse pas la masse des poumons, comme dans l'adulte; c'est donc la tête qui doit être opprimée par l'abord du fluide, d'où les maladies comateuses & l'apoplexie sanguine, &c.

J'ai prouvé par ce qui vient d'être dit, que certaines mères devenoient pléthoriques pendant la grossesse, que cet état se communiquoit au fœtus, que celui-ci étoit exposé par-là aux suites d'une pléthore générale & particulière; que la pléthore générale existoit avant l'accouchement, mais que la seconde dépendoit de l'effet des contractions de l'Utérus & de l'irritation de l'air, qui déterminoient le sang à passer au cerveau.

Cependant le quatrième enfant a été rendu à la vie en le laissant entre les enflures de la mère. Le cordon ombilical étoit encore une voie de communication entre elle & lui; mais quel pouvoit être son usage? c'est ce qu'il faut considérer maintenant.

Les deux artères par lesquelles le sang passe du fœtus au placenta, naissent près de la bifurcation de l'aorte; elles ont un diamètre très-considérable relativement au volume du corps du fœtus; il n'y a, au contraire, qu'un vaisseau pour porter le sang de la mère à l'enfant, & ce vaisseau est très-faible; c'est une veine, un cylindre passif qui ne peut ni retarder ni accélérer la marche du fluide qu'il contient. Quand on vient à considérer l'ordre de ces diverses parties & leur arrangement respectif,

on ne peut pas douter que la nature ne nous indique qu'il est des circonstances dans lesquelles le fœtus, exposé aux suites funestes des amas de liquides dans les viscères essentiels à la vie, ne pouvoit éviter le danger inséparable de cet état, que par une voie de décharge active & facile.

Quoique l'engorgement du cordon ait été porté au point de priver le nouveau-né de l'exercice sensible des fonctions, l'irritabilité du cœur & des artères qui subsiste même après la mort, n'a pas cessé de continuer la circulation des fluides. Si vous joignez à cet effet celui de l'élasticité dont la force s'augmente à proportion que la chaleur animale diminue, vous aurez les deux causes qui ont pu rapprocher les parois des vaisseaux artériels, en faisant passer le liquide qui les engorgoit par le canal ombilical dans le placenta. D'une autre part, les membranes qui enveloppent le fœtus, laissées en liberté dans l'utérus, après sa sortie de ce viscère, ne s'y trouvant plus comprimées d'une manière aussi violente, n'envoient pas au nouveau-né une quantité de sang qui pût égaler celle qui sortoit par les artères ombilicales. Les causes du spasme avoient perdu une partie de leur énergie par la perte du sentiment. Les premières contractions musculaires avoient chassé le sang de la superficie vers le centre; le cœur & les artères n'en recevoient dans les instans suivans, qu'une quantité toujours moindre chaque fois qu'il se présentait au passage. L'orte débarrassée de la surabondance, n'envoyoit aux extrémités du corps qu'une quantité que les veines recevoient sans résistance; ce fluide ne dilatoit plus leurs parois au-delà de leur diamètre accoutumé. C'est ainsi qu'on doit concevoir le mécanisme par lequel l'équilibre se rétablissoit dans toutes les parties.

Pour donner à cette explication le degré de croyance dont elle est susceptible, j'ajouterai le récit abrégé d'un fait que je tiens d'un célèbre professeur. M. Potit reçut un enfant qui ne donnoit aucun signe de vie; son cœur, son poulx, ne battoient point. Ce praticien laissa l'enfant attaché au cordon, & quelque temps après il sentit le mouvement du cœur; il lia le cordon, & au même instant le cœur cessa de se mouvoir; il délia la ligature, & le cœur reprit ensuite ses mouvemens, mais avec quelque difficulté. Pressé par les parens, il lia une seconde fois le cordon, & le mouvement cessa encore. Enfin il attendit, pour faire la ligature du cordon une troisième fois, non-seulement que les mouvemens du cœur eussent acquis de la force, mais que l'enfant criât, afin qu'après avoir respiré, il n'y eût plus à craindre pour sa vie.

Il suit de ces observations deux choses essentielles à considérer : 1°. prévenir la naissance de cette maladie, quand les causes qui peuvent la faire naître existent; 2°. s'opposer à ses suites

quand elle a lieu. On la prévient par les saignées que nécessitent une congestion sanguine du la part du la mère, & les accidents qui accompagnent la pléthore. Ils sont aisés à connaître, & les auteurs qui ont parlé de cet objet n'ont rien laissé à désirer. Quand le nouveau-né est privé de sentiment & de mouvement sans aucune cause manifeste, il faut examiner si cela n'est pas la preuve d'une apoplexie sanguine. Elle se reconnoît par les signes suivans : le fœtus est bien nourri, sa couleur est plus foncée qu'elle ne l'est à cette époque chez les enfans; elle est d'un rouge violet quelquefois tirant sur le noir par son intensité; la face donne des indices sûrs de la surcharge du sang. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit du tempérament de la mère, des accidents de sa grossesse, des preuves de sa pléthore, rendent le diagnostic certain. Le pronostic n'est pas fâcheux si l'accouchement a été facile, si l'enfant a fait des mouvemens fréquens avant la naissance, si on n'a pas fait promptement la ligature du cordon ombilical, & s'il ne s'est pas écoulé un temps considérable depuis la naissance : dans le cas contraire, la mort est assurée.

Quoique les deux exemples de guérison que je viens de citer nous prouvent qu'elles ont été opérées en partie par les seules forces de la nature, cependant il ne seroit pas prudent de lui confier entièrement ce soin. Le secours le plus prompt doit être mis en usage, parce qu'il est des circonstances dans lesquelles l'engorgement auroit pu causer trop d'atonie pour que les vaisseaux pussent d'eux-mêmes se débarrasser du sang qui les rempliroit. Il faut couper le cordon ombilical, laisser couler une certaine quantité de sang, dont la nature des accidens qui auront accompagné la maladie réglera la quantité. L'effusion du sang peut se faire à différentes reprises, parce qu'on est maître de comprimer le cordon à volonté. Les mouvemens doux, les frictions avec des linges chauds, ranimeront la circulation interrompue; les substances qui réveillent l'action des esprits animaux seront aussi un stimulus utile, mais il ne faudra pas les prendre dans l'ordre de ceux qui abroient trop d'énergie, parce qu'ils irriteroient violemment les nouveau-nés; on frottera les tempes avec des petita linges imbibés d'eau spiritueuse. L'insufflation d'un air pur dans la poitrine, est sans contredit le secours le plus efficace qu'on puisse employer; il ouvrira une nouvelle route au sang qui comprimait le cerveau, en facilitant insensiblement le développement des poumons. Il sera nécessaire d'envelopper l'enfant dans des linges chauds, pour rappeler le sang du centre à la circonférence, & pour diminuer par ce moyen l'obstruction des viscères. Tels sont les conseils dont l'exécution nous a parfaitement réussi dans une maladie semblable à celles dont j'ai donné l'histoire.

(CHAMBERLAIN.)
MORTON

MORTON (Richard), de la province de Suffolk en Angleterre, fut reçu bachelier-ès-arts à Oxford, & devint ensuite chapelain de la famille de Foley, dans la province de Worcester; mais comme il étoit non-conformiste, il fut forcé d'abandonner cette place, & s'appliqua à l'étude de la médecine. Il fut reçu docteur en 1670: il se fit alors agréger au collège royal de Londres, & ne tarda pas à s'acquiescer une grande réputation, surtout dans le traitement de la phthisie pulmonaire.

Phthisiologia, five exercitationes de phthisi. Lond., 1689, in-8°.

Exercitationes de morbis universalibus acutis. Lond., 1692, in-8°.

De febris inflammatoriis. Ibid., 1694, in-8°; Brema, 1693, in-8°. L'on reproche à cet auteur son attachement au régime chaud dans la cure des maladies aiguës.

Opera omnia. Amstel., 1696, 2 vol. in-8°; Lugd. Bat., 1697, in-4°; Lugd., 1737, in-4°.
(R. GZOFFROY.)

MORTS (Soins relatifs aux). Voyez SÉPULCHRE. (L. R. V.)

MORUE. (Hygiène.) *Morhuus.*

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. *Ingesta.*

Ordre I. *Alimenta.*

Section II. *Animalia.*

La morue est un genre de poisson de mer à nageoires molles, qui est extrêmement connu. Nous laissons aux naturalistes le soin de faire connoître les différentes espèces qu'on en peut décrire; nous ne nous occuperons ici que de la plus commune.

La morue vulgaire a trois ou quatre pieds de long, le corps gros, son dos est tacheté, d'une couleur olivâtre, ou brunâtre; elle a de très-grands yeux, qui ne voient pas aisément, à ce que l'on dit; plusieurs rangées de dents garnissent ses mâchoires. Elle fait une grande consommation de poissons, & surtout de harengs.

La morue, ou cabellian, est peu commune dans nos mers; leur rendez-vous le plus considérable que nous connoissions est un grand banc de Terre-Neuve, vers le Canada: c'est là que se rassemblent des pêcheurs de toutes les nations, qui les pêchent en abondance. M. Anderson, dans son *Histoire de l'Islande*, dit que ce poisson fait presque la seule nourriture des habitants de ce pays, que sa chair y est d'un goût exquis, & qu'elle y passe généralement pour un mets délicieux.

La morue est peut-être le poisson qui sert le plus abondamment à la nourriture des hommes de tous les pays. On la trouve beaucoup plus communément séchée que fraîche: elle est en général

MÉDECINE. Tome X.

très-nourrissante, convient à toute constitution, & produit de très-bons sucs, surtout lorsqu'elle n'a pas été desséchée & salée. Quand elle est desséchée, on lui donne le nom de *merlucho* ou de *stock-fish*. L'aliment qu'elle présente alors est bien moins salubre que l'autre; sa qualité dure, coriace, nutritive, la rend bien plus difficile à digérer que la morue fraîche, & elle ne convient plus en cet état aux tempéramens délicats, aux estomacs foibles, ni aux personnes qui ne font pas de violents exercices; c'est pourquoi il faut la teindre très-long-temps dans l'eau pour la ramollir & la dessaler autant qu'il est possible.

On fait peu d'usage de la morue en médecine: on a dit avec assez peu de fondement que ses dents avoient une vertu absorbante; que porphyrisées elles pouvoient arrêter les cours de ventre & les crachemens de sang.

On a donné les mêmes vertus à des espèces de pierres qui se trouvent dans la tête de ce poisson. On a aussi vanté sa faimure, comme résolutive & dissolvante à l'estérieur, & comme irritante & laxative administrée en lavemens. (MACQUART.)

MORVE. (Médecine vétérinaire. *Nosographie.*) La morve est une affection contagieuse du système lymphatique, caractérisée par l'engorgement des glandes conglobées, par l'ulcération de la membrane pituitaire & par le flux d'une matière aqueuse par les naseaux; elle tire son nom de ce dernier symptôme. Les signes généraux de la santé subsistent long-temps au milieu de ces symptômes; c'est principalement par ce caractère que la morve se distingue d'un grand nombre d'autres maladies inflammatoires ou catarrhales auxquelles sont exposés les animaux folipèdes. La morve est particulière au cheval, à l'âne & au mulet; on ne peut pas lui comparer une affection analogue par quelques signes, qui attaquent les moutons, ou le catarrhe des chiens. La syphilis dell'espèce humaine est liée par des rapports plus frappans avec la morve des folipèdes.

Pour mettre de l'ordre dans cet article important, je le diviserai en onze paragraphes.

Dans le premier je donnerai une notion succincte des principaux auteurs qui ont traité de la morve.

Dans le second je tracerai les signes & les symptômes qui l'annoncent.

Les différences qu'elle offre dans le cheval, l'âne & le mulet, feront le sujet du troisième paragraphe.

Le quatrième présentera le tableau comparatif de la morve & des autres affections analogues des folipèdes.

Le cinquième offrira les points d'analogie qui lient la morve avec des maladies lymphatiques observées dans d'autres espèces.

Le sixième contiendra l'exposé des causes de cette affection.

Y y

Le pronostic & la contagion de la morve selon le sujet du septième paragraphe.

Le huitième contiendra les observations faites à l'ouverture des cadavres.

Dans le neuvième je parlerai des moyens prophylactiques.

J'exposerai dans le dixième la méthode curative.

Dans le dernier, enfin, j'offrirai les procédés les plus sûrs de débarrasser, & serai connoître les lois qui ont été rendues sur la morve.

I. On a prétendu que la morve avoit été connue des Anciens; cependant si l'on parcourt les ouvrages que nous ont laissés les vétérinaires grecs, tels qu'Abysse, Thémiscle & Hippocrate, le médecin des chevaux, on n'y trouve aucune description qui puisse se rapporter à la morve. Aristote parle d'une maladie particulière aux ânes; il la nomme *mélide*. Elle attaque, dit-il, la tête; l'animal jette par les narines des phlegmes rous & épais; lorsqu'elle descend sur le poulmon, il périt; tant que la tête seule est affectée, la maladie n'est pas mortelle. La réflexion qu'ajoute Aristote à cette description assez vague, prouve que c'est de la morfondure qu'il veut parler: *Impatiens frigoris maxime hoc animal est*. Plinè décrit une maladie des animaux qu'il nomme *pituitis jumentorum*, il voit le symptôme pathogénomique est la difficulté d'uriner. Le traitement qu'il prescrit est l'administration de l'orge, mêlée avec de la poudre de gomme fèche. Il seroit difficile de reconnoître la morve dans cette description. Végèce, qu'on a cité si souvent pour prouver que la morve étoit connue des Anciens, s'étend beaucoup sur une maladie qu'il nomme *morbus humidus, profluvium atticum, malleus morbus*. Il donne pour symptôme de cette affection, l'écoulement par les naseaux d'une humeur puante, épaisse, blanchâtre; la pesanteur de la tête, le larmolement, le battement du flanc, le hérissément du poil, la tristesse, &c. De tous ces symptômes, les seuls qu'on puisse rapporter à la morve, sont le flux par les naseaux & le larmolement, encore lui sont-ils communs avec un grand nombre d'autres maladies.

On ne découvre dans les ouvrages de Caton, de Celse, de Varron, de Columelle, aucune description de maladies, que l'on puisse comparer à la morve. On est obligé de descendre jusqu'au temps de Ruini, qui écrivait sur la fin du quinzième siècle, pour trouver un exposé reconnoissable des symptômes pathogénomiques de la plus remarquable des maladies du cheval.

Quoique les Anciens nous aient laissé bien peu de faits précis sur la médecine vétérinaire, est-il permis de croire, qu'une affection contagieuse qui cause de si effrayans ravages, ait échappé à leurs recherches, s'il est vrai qu'elle existât de leur temps? Au reste, les bibliographes qui veulent que tout se trouve chez les Anciens, n'ont pas encore cité textuellement une histoire de maladie qui soit antérieure à Ruini, & qui appartienne plu-

tôt à la morve qu'à un grand nombre d'autres affections du cheval. Depuis le siveur de Bologne jusqu'à Laffosse père, les maréchaux, les écuers, les agriculteurs, les médecins, qui ont écrit sur l'hippiatrique, n'ont pas oublié la morve. Aucun de ces auteurs n'a donné de vrais principes sur ce sujet; les uns ont placé le siège de cette maladie dans le cerveau, d'autres dans le foie, d'autres dans la moelle épinière, &c. Le traitement qu'ils indiquent est analogue à leur théorie.

Laffosse père, établi dans un Mémoire célèbre, que la morve est une maladie inflammatoire & locale, dont le véritable & seul siège est la membrane pituitaire, & que la meilleure manière de la guérir consiste dans des injections détersives pratiquées à la faveur du trépan. Ce Mémoire parut en 1749; il eut une foule d'éditions & fut traduit dans presque toutes les langues de l'Europe. L'illustre Buffon adopta le système de Laffosse; il l'appuya par une observation erronée, empruntée de Flue, savoir, que les chevaux enfoncent, en buvant, les naseaux dans l'eau froide. Buffon en conclut qu'ils sont par-là très-exposés au rhume, qui peut dégénérer en morve, & qu'on pourroit écarter cette maladie redoutable en ne les abreuvant jamais d'eau froide, & en leur effuyant toujours les naseaux quand ils ont bu. En 1751, Laffosse publia, sous le titre d'*Observations & de découvertes faites sur les chevaux*, une suite d'expériences & de faits de pratique, parmi lesquels un grand nombre sont relatifs à la morve. L'Académie des sciences avoit nommé auparavant deux commissaires pour examiner le système de Laffosse. Mynard & Bouvard furent délégués; ce dernier fut, quelque temps après, remplacé par Teynon. Laffosse père étant mort, son fils hérita de son système. Les commissaires de l'Académie se livrèrent à un grand nombre d'expériences, desquelles ils conclurent que la morve n'est pas une maladie locale de la membrane pituitaire, & que les topiques ne peuvent pas suffire pour la guérir. Laffosse fils n'en publia pas moins la grande découverte du siège de la morve, dans une foule d'ouvrages qui ne diffèrent guère entr'eux que par le titre. Cet hippiatre donna la morve en un très-grand nombre d'espèces: il reconnoît une morve contagieuse, une morve non contagieuse; il distingue celle qui est primitive, celle qui est secondaire, celle qui est simple, celle qui est composée; & il la divise encore en morve proprement dite & en morve improprement dite, &c. Laffosse père & fils ont été copiés par la plupart des compilateurs qui ont écrit sur la morve. Le docteur Mallonin est l'auteur de plusieurs Mémoires sur cette maladie, qui sont imprimés parmi ceux de l'Académie royale des sciences pour les années 1761 & 1762. Ce médecin prétend qu'on doit diviser la morve en deux espèces, à raison des causes qui la produisent, dont l'une, dit-il, est interne & l'autre externe. Le traitement qu'il indique, consiste dans l'administration

de l'ethiops antimonial, de la perrenche & des purgans réitérés : il traita par cette méthode trois chevaux morveux, & il en guérit un seul. A peu près dans le même temps, le baron de Saut annonça sous le nom d'*électuaire*, un spécifique *infaillible* contre la morve. Cette prétendue panacée a été rejetée parmi les secrets des charlatans, dont cet écuyer distingué ne craignit pas de prendre le ton & le langage.

Browne Landrigh indiqua l'eau distillée de laurier-cerise comme *antimorveux* : l'expérience n'a pas confirmé l'efficacité de ce remède.

Bourgelat est beaucoup occupé de la morve. Il essaya un très-grand nombre de remèdes, & après avoir reconnu qu'aucun ne méritoit une grande confiance, il annonça l'eau de chaux comme un médicament qui laissoit entrevoir quelque espérance de succès. Il est prouvé par l'expérience que l'eau de chaux est, sinon nuisible, du moins inutile, donnée à l'intérieur ; elle peut servir pour déterger les ulcères morveux, & tous les ulcères malins.

Vitet rejette toutes les divisions de Lafosse ; il n'admet qu'une morve qui est une & contagieuse. Il vante, pour la guérir, les fumigations d'opiment, déjà recommandées en pareil cas par Laurent Rusc. Ce dernier s'exprime ainsi : *Item ad idem valet, si acciperis auripigmentum & sulphur, & posueris super carbonem, & in manibus equi feceris fumigium, &c.* Vitet conseille pour préservatif, des linimens d'huile essentielle de térébenthine à l'orifice externe des naseaux. La méthode curative du docteur Vitet est très-dangereuse ; sa méthode préservative est insignifiante, & la description qu'il donne de la maladie est inexacte.

Dutz, vétérinaire hollandais, auteur d'un ouvrage intitulé *l'Antimorvechal*, ou le *vrai Miroir de la maladie des chevaux*, conseille contre la morve une méthode perturbatrice, composée de bichiques en fumigations & en injections, de purgans mercuriels & de sudorifiques. Un pareil traitement ne peut que rapprocher le terme fatal de la maladie. Dutz met en problème si elle est contagieuse ou non.

Brugnone, professeur vétérinaire à Turin, a distingué judicieusement l'osème de la morve ; il a pué, au reste, ses idées sur cette maladie dans les écrits des auteurs français.

MM. Chabert & Huzard ont tracé le véritable diagnostic de la morve ; les premiers ils l'ont parfaitement distinguée de toutes les autres maladies. Les travaux de ces vétérinaires recommandables ne font très-utiles dans la composition de cet article.

Gilbert étoit d'avis que la gourme, la fausse gourme & la morve ont en général le même caractère, que l'on ne peut s'empêcher de regarder la morve comme une dégénération de la gourme, comme une gourme imparfaite : il fonde son opinion sur l'identité de ces deux maladies, sur l'ob-

servation de chevaux morveux qui font jeter la gourme aux poulains, tandis que les poulains gourmeux donnent la morve aux vieux chevaux. Il avance encore que les maladies pŕoriques, le farcin, &c., sont dus à un levain gourmeux retenu dans le corps, & que c'est pour cette raison qu'elles peuvent se transformer en morve.

II. Les signes & les symptômes, auxquels on reconnoît l'existence de la morve, sont tracés d'une manière si claire & si méthodique par MM. Chabert & Huzard, dans une instruction sur les moyens de s'affurer de l'existence de cette maladie, que je ne puis me dispenser de transcrire le diagnostic qu'ils en ont offert. Ils reconnoissent trois périodes dans la durée de cette maladie. Les signes du premier période sont :

1°. L'écoulement par un seul naseau d'une humeur blanchâtre & fluide, qui n'est rien de sensible que lorsque l'animal a été exercé pendant quelque temps ;

2°. L'engorgement & l'inflammation, caractérisés par la rougeur de la membrane qui tapisse l'intérieur du nez, surtout près de la cloison qui sépare les deux naseaux ;

3°. Le gonflement des vaisseaux sanguins de la membrane pituitaire, qu'on n'aperçoit dans l'animal sain que lorsqu'il est échauffé par l'exercice ;

4°. L'engorgement d'une ou de plusieurs glandes de la ganache du côté du naseau par lequel l'écoulement a lieu ;

5°. Le poil, le brillant du poil qui est dû au défaut de transpiration ;

6°. Le bon état apparent de l'animal avec les signes précédents ;

7°. La crudité & la transparence des urines.

Ces signes appartiennent essentiellement à la morve la plus commune, qui est celle due à la communication. La morve spontanée s'accompagne des effets de l'altération pathologique qui lui a donné naissance.

Le deuxième période s'annonce par les signes suivans :

1°. L'épaississement, la couleur jaune ou verdâtre du flux, sa viscosité, son adhérence au bord de l'ouverture du naseau ;

2°. Le gonflement & le retroussement du bord du naseau inséré dans la partie supérieure ;

3°. Enfin, la sensibilité des glandes engorgées & leur adhésion aux os de la mâchoire postérieure. Lorsque la maladie est parvenue à son troisième période, elle présente les signes que je vais tracer :

1°. La couleur griseâtre ou noirâtre du flux morveux ;

2°. L'écoulement qui a lieu par les deux naseaux ;

3°. Les traînées de sang qu'on aperçoit ordinairement dans le mucus ;

4°. Les hémorragies fréquentes de la membrane interne du nez ;

5°. Les ulcères chancreux qui corrodent la membrane pituitaire ;

6°. La sensibilité excessive des glandes tuméfiées & leur adhérence plus intime à l'os maxillaire inférieure;

7°. La chassie des yeux qui étoit moins abondante dans les autres périodes;

8°. La tuméfaction de la paupière inférieure;

9°. La faillie contre nature des os du nez & du chanfrein;

10°. Le dégoût, l'abattement, la toux, l'enflure des jambes & des testicules;

11°. La claudication sans cause externe; lorsqu'elle survient après les symptômes que nous venons de tracer, elle annonce la mort prochaine de l'animal.

III. La morve de l'âne & du mulet n'a point un caractère essentiellement différent de celle du cheval; les mêmes symptômes pathognomoniques les signalent dans ces trois espèces, mais ils n'ont pas la même intensité, la maladie n'a pas la même durée; elle n'est pas également fréquente chez les uns & chez les autres. La morve, dans le cheval, parcourt ses périodes lentement & avec régularité; abandonnée à elle-même, sa durée est communément de trois ou quatre ans; son cours peut être plus long. On a vu des chevaux garder la morve huit à neuf ans; d'autres qui l'avoient contractée à quatre ou cinq ans, mourir de vieillesse.

Il existe dans les environs de Lyon une jument qui a, depuis neuf ans, une morve constatée. On a eu soin de l'isoler pour qu'elle ne communiquât pas la contagion, & on en a retiré jusqu'ici un excellent service. On s'est hasardé à la faire couvrir par un cheval entier de vil prix; elle a conçu & a mis bas un poulain morveux. Depuis son part elle est sensiblement mieux, tous les symptômes s'adoucent de jour en jour, & on ne désespère pas de la voir guérir.

La morve du mulet est beaucoup plus rapide dans sa marche que celle du cheval; elle arrive ordinairement à son terme fatal au bout de quatre ou cinq mois. Les exceptions à cette règle sont rares.

La rapidité de la morve de l'âne est beaucoup plus remarquable; cette affection présente, dans cette espèce, le caractère d'une maladie aiguë: elle se termine le plus fréquemment par la mort dans le court espace de deux mois.

Le mucus qui découle du nez de l'âne & du mulet est beaucoup moins abondant que celui du cheval dans l'état de santé; les sinus frontaux & maxillaires des premiers sont plus étroits, l'orifice des naseaux plus rétréci, leur tempérament est plus sec & plus bilieux. Il doit résulter de ces dispositions physiologiques de très-grandes différences dans la pathologie de ces divers animaux. L'âne & le mulet étant moins exposés aux affections catarrhales, les causes qui les occasionnent éprouvent une réaction vitale assez vive pour leur donner un caractère aigu; si la fièvre ne peut triompher de ces causes, l'animal succombe en peu de temps.

Il suit de cette idiocrase spécifique, comme il est facile de le voir, que la morve de l'âne & du mulet n'offre point, comme dans le cheval, les symptômes au milieu des signes de la santé. Il y aura, dès le commencement, altération du flanc, fièvre, toux, flux par les deux naseaux, d'une matière fétide extrêmement fétide, respiration sonore, amaigrissement, larmes abondantes & épaisses, hémissement remarquable des poils du front; tous ces symptômes s'exagèrent promptement, & il surviendra des exfoliations sur différentes parties, & principalement aux os de la tête; la table du frontal se soulèvera, la respiration deviendra stertoreuse, l'haleine d'une puanteur insupportable, & l'animal succombera dans le dernier degré de l'atrophie.

Si la morve de l'âne & du mulet est beaucoup plus effrayante que celle du cheval, si elle n'offre pas le moindre espoir de guérison, elle est aussi infiniment plus rare. L'âne & le mulet résistent plus que le cheval à toutes les contagions, & peut-être ne prennent-ils jamais la morve spontanément.

Le farcin, la gourme, les eaux aux jambes, une foule d'autres maladies qui dégénèrent en morve, ou n'attaquent jamais l'âne & le mulet, ou du moins les attaquent très-rarement. Ces animaux, durs à la fatigue, extrêmement sobres, supportant avec facilité les erreurs de régime, toutes les intempéries des saisons, sont peu sensibles à l'influence des causes dont l'action lente & prolongée rend les chevaux morveux.

IV. La grande confusion qui règne dans les écrits des auteurs qui ont traité de la morve, vient surtout du vice de la dénomination, qui la fait voir dans toutes les maladies accompagnées d'un flux par les naseaux; telles sont l'oëzine, la gourme, la fausse gourme, la morfondure, la courbature, la pulmonie, la pousse humide.

L'oëzine, diffère de la morve, par des caractères si frappants qu'on ne conçoit pas comment un praticien renommé a pu établir une synonymie entre ces deux termes. L'oëzine n'est qu'un ulcère fétide de l'intérieur du nez; il est borné aux parties où il est fixé, & s'étend tout au plus aux parties les plus voisines. Il n'est pas contagieux; il est commun à tous les animaux domestiques & à l'homme; ce n'est quelquefois qu'un ulcère simple, beuin, dont le pus n'a pas la moindre causticité.

La gourme n'attaque que les jeunes chevaux; elle est caractérisée par la tristesse, le dégoût, l'abattement, la fièvre; l'écoulement se fait par les deux naseaux; le gonflement des glandes de la ganache est beaucoup plus considérable que dans la morve; elles sont douloureuses & s'abcèdent facilement. Cette maladie, qu'on a comparée à la variole de l'espèce humaine, a ordinairement peu de durée.

Dans la fausse gourme, le cheval ne reste presque point; le flux nasal est féreux ou sanguinolent; la respiration est laborieuse. Le cours de cette mala-

die n'est pas long; elle guérit difficilement; la morve ou la mort en est la terminaison la plus fréquente.

La *marfondeure* est une inflammation catarrhale de la membrane de Schneider; elle est accompagnée de l'altération du puits, de la toux, de l'écoulement par les deux naseaux, d'une matière d'abord limpide, & ensuite épaisse. La marfondeure invétérée offre la plupart des caractères de la morve, mais elle ne se transforme jamais dans cette maladie, comme on l'a prétendu: elle se distingue de la morve principalement en ce qu'elle altère visiblement la santé, qu'elle ne se communique point, & que le flux a lieu dès le principe par les deux naseaux.

La *courbature* est une véritable péripneumonie inflammatoire. Le cheval qui en est affecté touffe, ses naseaux donnent issue à une matière glaireuse, quelquefois sanguinolente; tous les symptômes inflammatoires sont intenses, tels sont une fièvre violente, une douleur vive, une chaleur brûlante, la dyspnée. Cette maladie est toujours aiguë.

La *pulmonie* a beaucoup de rapport avec la phthisie pulmonaire de l'espèce humaine & avec la pommelière des vaches. C'est une affection organique du puits, dans laquelle le cheval jette par la bouche & par les naseaux, une matière purulente & muqueuse, mêlée de filices sanguines. L'animal dépérit, il éprouve des sueurs colligatives; il a la fièvre hectique.

La *pouffe humide* enfin, est une autre affection organique des puits, formée par un embarras quelconque fixé sur ce viscère. Les signes de cette maladie, qui ne permettent pas de la confondre avec la morve, sont l'irrégularité constante du mouvement des flancs, l'émulsion d'une matière épaisse par les naseaux quand l'animal boit, s'ébroue, expectore. La pouffe n'est nullement contagieuse; on la guérit rarement, mais on peut en adoucir les symptômes par des moyens diététiques.

D'après cet exposé des maladies qui ont passé pour être la morve, il est facile d'apprécier les grands succès dont se font vanter tant de praticiens qui ont guéri, sous le nom de *morve*, des affections très-curables.

V. La morve des solipèdes a des points d'analogie avec la maladie désignée sous le nom de *morve des brebis*, avec le catarrhe des chiens & avec la syphilis de l'espèce humaine.

La morve des bêtes à laine est une maladie éminemment contagieuse, qui s'annonce par l'écoulement d'une humeur qui s'écoule des naseaux; cette matière, d'abord muqueuse, devient bientôt purulente; à ce période de la maladie, la brebis est triste, faible, dégoûtée; elle maigrit, il s'exhale de son corps une odeur fétide; elle meurt. Quelquefois la matière visqueuse est si abondante & si épaisse, qu'elle intercepte les voies de la respiration & que l'animal périrait suffoqué. Cette maladie, qui peut durer très-peu de temps dévaler un trou-

peau, ne se communique nullement au cheval. On a essayé vainement la cohabitation, l'insertion même du mucus-virus dans les naseaux de ce solipède; la mucosité morveuse du cheval jouit de la même innocuité à l'égard de la brebis. La morve de la brebis offre le même pronostic que celui de la morve des chevaux. Lorsqu'on reconnoît qu'une ou deux brebis ou sont atteintes, le plus sûr parti est de les assommer sur-le-champ, & de les enterrer à une grande profondeur.

On appelle encore *morve*, un simplement maladie des chiens, une affection catarrhale, pituiteuse, à laquelle ces animaux sont sujets depuis environ un demi-siècle. Les symptômes qui l'annoncent sont la tristesse, la pesanteur de la tête, le gonflement de la conjonctive, le larmecement, l'obscurcissement de la vue, surtout l'écoulement d'une matière puriforme, dont la consistance & la couleur varient prodigieusement; l'animal conserve ou perd l'appétit; il a souvent la marche chancelante; quelquefois il est si faible qu'il ne peut pas se tenir sur ses jambes. Il n'est pas rare que le train de derrière se paralyse, ou s'habitue à des mouvements convulsifs. Les humeurs de l'œil se troublent au point que l'animal perd l'usage de la vue. Quelquefois des chancres se fixent sur la cornée transparente & la dévorent. Le catarrhe des chiens est éminemment contagieux; il régit épidémiquement; les jeunes chiens y sont exposés d'une manière spéciale. Le pronostic est toujours fâcheux; néanmoins un grand nombre guérit sans remède, & beaucoup de ceux qui sont traités guérissent malgré des méthodes contradictoires. Il n'est pas rare de voir la maladie dégénérer en une affection nerveuse absolument semblable à la cause de St.-Guy de l'espèce humaine. On voit, d'après ce tableau de la morve des chiens, que cette maladie a quelques rapports avec la morve des solipèdes, & qu'elle en diffère par un grand nombre de caractères essentiels, tels que les anomalies nerveuses, la cécité, le défaut d'engorgement glanduleux & son degré de curabilité.

La nature essentielle de la morve n'est pas la même que celle de la maladie vénérienne de l'homme. L'homme & le cheval diffèrent si profondément dans leur organisation & leur idiosyncrasie, que les maladies des deux espèces qui paroissent les plus identiques, offrent cependant des différences marquées. Les maladies qui tiennent à un virus spécifique, & dont la nature est ignorée, sont celles qui présentent la moins d'analogie quand on les considère dans des espèces différentes. On a donc eu tort d'établir un parallèle rigoureux entre la morve des solipèdes & la syphilis de l'homme; on peut cependant remarquer, entre ces deux affections, plusieurs rapports frappants, tels que l'écoulement d'un fluide visqueux par les naseaux, & le flux gonorrhéique; l'inflammation de la membrane pituitaire & celle de la membrane de l'urètre (on sait jusqu'à quel point ces deux tissus membraneux

se ressemblent par leur structure & leurs fonctions); l'engorgement glanduleux produit par la morve & le tubon vénérien; la rénitence, la dureté de ces tumeurs dans les deux espèces; l'aspect des ulcères qui corrodent la membrane pituitaire du cheval; l'aspect des chancres vénéériens. Même causticité dans les uns & les autres, ils rongent & carient les arillages & les os; même embonpoint, même apparence de santé dans la morve & la syphilis, lorsque les deux maladies ne sont pas trop anciennes; chronicité dans les deux affections, celle de l'homme n'est plus durable qu'à cause de sa longévité. L'autopsie cadavérique découvre les mêmes ravages dans l'intérieur de l'organisation des chevaux morveux & des hommes vénéériens, morts victimes de l'affection qui les a rongés pendant long-temps. La grande différence entre ces deux maladies se tire de ce que le traitement n'est pas le même. La syphilis est aisément aux remèdes qu'on lui oppose lorsqu'on la saisi dans son principe; elle n'est pas supérieure aux ressources de l'art, même lorsqu'elle est très-avancée. La morve se guérit rarement, même dès les premiers symptômes; elle est absolument incurable lorsqu'elle a fait des progrès. On a enfin essayé vainement contre la morve le traitement antisyphilitique.

VI. Les causes éloignées de la morve sont, en général, tous les écarts de régime auxquels les chevaux sont exposés. Telle est la grande prédisposition de ces quadrupèdes à cette maladie formidable, que toutes les causes capables d'altérer profondément leur organisation peuvent donner naissance à la morve spontanée; elle marche souvent à la suite de quelques affections externes dont la nature sembleroit n'avoir aucun rapport d'analogie avec elle; il n'est pas étonnant, par conséquent, que toutes les affections lymphatiques puissent prendre le caractère de la morve.

Ainsi, les chevaux sont exposés au danger de devenir morveux lorsqu'ils souffrent de la disette d'aliments; qu'ils sont nourris de foin rouillé ou avarié, d'avoine qui fermente & germe; lorsqu'on les abreuve d'eaux croupissantes; qu'ils sont soumis à un exercice immédiat; quand on les fait passer subitement d'une température chaude à une température froide, &c.; lorsqu'on néglige le pansement de la main. Doit-on être étonné, après ce que je viens de dire, que la morve soit si commune, principalement dans les armées, où les animaux, ainsi que les hommes, sont soumis à l'influence de tant de causes de maladies? Que de propriétaires dont les écuries sont dévastées par cette contagion, en cherchant le principe dans l'introduction d'un animal étranger, tandis qu'ils pourroient le trouver dans l'ignorance des palefreniers, ou dans leur infidélité qui les porte à diminuer à leur profit, la ration des animaux qu'on leur donne à soigner!

Les maladies qui dérivent le plus fréquemment de la morve, sont toutes celles qui s'accom-

paguent d'un écoulement muqueux par le nez, & dont j'ai parlé dans un des paragraphes précédents. Le professeur Gilbert, conduit par quelques analogies, n'admettoit qu'une seule cause de la morve spontanée; il l'attribuoit à un levain de gourme mal jetée. Une pareille assertion doit être rangée parmi les hypothèses. Les ulcères profonds & anciens de l'extérieur du corps, qui ne paroissent atteints d'aucune complication de malignité, donnent souvent lieu à la morve; tels sont la taupie, le mal de garrot, les ulcères du dos, le javart, &c. C'est de la même manière que se forme la morve à la suite d'une ulcération de la membrane pituitaire. Ainsi l'osène n'est pas la morve, mais une des nombreuses causes de cette maladie; on explique par-là pourquoi ce vice est quelquefois contagieux & quelquefois ne peut se communiquer. D'après le système de Laffolle, l'affection peut rester locale de même qu'un javart ou un mal de garrot; alors elle n'est point communicative, on elle peut influencer par tout le système & produire la véritable morve.

Les maladies pforiques, dans l'ordre desquelles quelques auteurs rangent la morve, se transforment aisément les unes dans les autres; il n'est pas rare de voir la gale, les dartres pustuleuses, le farcin, les eaux aux jambes disparaître & faire place à la morve, ou se compliquer avec elle. Le farcin est presque identique avec ce virus; c'est au point qu'il est très-commun de voir l'une de ces deux maladies donner naissance à l'autre. Ne pourroit-on pas regarder le farcin comme une morve en quelque sorte aiguë, c'est-à-dire, accompagnée d'une réaction vitale?

La morve, dans le cheval, est peut-être plus souvent due à la contagion que spontanée. La contagion peut être médiate ou immédiate; cette dernière a lieu par la communication intime d'un animal sain à un animal malade; l'autre se propage par les harnois ou autres corps infectés du virus morveux. Il est prouvé que l'air n'en est jamais le véhicule.

La cause prochaine de la morve est évidemment une altération spécifique de la lymphe. L'épaississement & la coloration de cette humeur, l'embonpoint sâcheux qu'acquiescent quelques chevaux infectés, le développement des organes du système lymphatique, la lenteur de la marche de la maladie, ne laissent aucun doute à cet égard. Quand on en a fait une maladie locale, ou a volontairement fermé les yeux sur les phénomènes que présente l'autopsie cadavérique. Je reviendrai sur ce sujet dans le paragraphe VIII, qui traite de l'ouverture des cadavres.

VII. En traitant du pronostic de la morve, il est inutile de faire observer que je n'entends parler que de l'affection profonde & lymphatique qui mérite réellement ce nom. Le pronostic de celle-ci est rarement satisfaisant; il n'offre quelques chances de curabilité, que lorsque la maladie dont

il préjuge l'issue, est extrêmement récente. Les conditions d'un pronostic moins défavorable sont encore la force de l'âge, un bon tempérament, l'absence de toute autre maladie.

On a remarqué que la morve dégénérée en farcin, est ordinairement curable, tandis que le farcin qui se complique de morve, n'offre pas le plus léger espoir de guérison.

La morve, résultat de la contagion, donne un pronostic ordinairement plus grave que celle qui survient spontanément. Ne pourroit-on pas en conclure que cette dernière n'est souvent qu'une prétendue morve? On pourroit la guérir par des remèdes appropriés, mais on n'ose pas se livrer à un traitement incertain, pendant lequel on auroit trop à craindre des effets de la contagion : c'est cette puissante considération qui ne permet pas de traiter la morve, même lorsqu'elle offre le pronostic le moins fâcheux, à moins que le cheval ne soit d'un prix très-élevé, & que le propriétaire ne soit résolu à de grands sacrifices. Dans les armées on abat souvent tous les chevaux jeteurs, comme dans les villes on extermine tous les chiens vagabonds pour prévenir la contagion de l'hydrophobie.

Le vétérinaire chargé de l'inspection des chevaux de troupes, ne doit condamner que les chevaux dans lesquels il trouve les signes pathognomoniques de la morve. Les chevaux sains qui ont communiqué avec des morveux, ceux qui présentent quelques symptômes équivoques de morve, doivent être sequestrés & soumis, les uns au traitement prophylactique, & les autres à un traitement curatif. Pour que cette mesure importante produise les bons effets qu'on a droit d'en attendre, il faudroit qu'elle fût confiée à des vétérinaires instruits & dévoués.

La morve de l'âne & du mulet pouvant être réputée incurable, il seroit absurde de diriger contre elle un traitement.

La contagion de la morve, attestée par tant d'expériences désastreuses, a cependant plusieurs fois été mise en problème par des vétérinaires dont l'autorité est d'un grand poids. On lit dans le Mémoire de MM. Chabert & Fromage, *sur la garantie des animaux*, ce qui suit :

Des chevaux réunissant les trois symptômes de la morve, ont été guéris de cette maladie dans une écurie consacrée à l'habitation des chevaux morveux, dans laquelle beaucoup d'autres n'ont pas guéri.

On a mis du flux de la morve sur la membrane pituitaire de chevaux sains destinés aux expériences, & ils n'ont pas contracté la maladie.

Un cheval sain n'est pas devenu morveux après avoir failli des jeunes infectés de morve.

On a inoculé du mucus dans des plaies, on en a introduit dans les jugulaires, on en a fait prendre en breuvage, en lavement, & la maladie ne s'est pas déclarée.

Le premier fait prouve, que l'on peut guérir d'une maladie contagieuse dans une infirmerie où l'on traite sans succès des individus atteints de la même maladie. S'il en étoit autrement, il faudroit, dans toutes les maladies contagieuses, une habitation pour chaque malade.

Les autres faits prouvent qu'aucune maladie contagieuse ne peut envahir un animal sain, si ce n'est si n'est prédisposé à la recevoir. Si l'on rejetoit ce principe, la syphilis de l'homme, la gale, la clavelée, ne seroient pas des maladies communicatives.

Au reste ces vétérinaires ne croient pas avoir rassemblé assez de preuves pour que la police soit tenue de supprimer les mesures coercitives dirigées contre la morve.

VIII. L'ouverture des cadavres des chevaux morveux fait découvrir des lésions plus ou moins graves, selon le degré de la maladie.

Lorsque l'animal a été abattu dans le premier degré de la morve, toutes les lésions organiques semblent se borner aux naseaux. Cependant un examen plus attentif fait découvrir que tout l'appareil lymphatique est plus développé ; les sinus de l'os frontal, du sphénoïde, de l'ethmoïde & du maxillaire, contiennent une humeur visqueuse qui n'exhale aucune mauvaise odeur ; la membrane de Schneider est un peu engorgée.

Dans le second degré, l'anneau qui remplit les sinus, est épaisse, jaunâtre & fétide ; la membrane pituitaire est enflammée & rongée par de petits ulcères profonds, ronds ou ovales, dont les bords sont saillans, désignés sous le nom de *chancres*. Les glandes conglobées sont gonflées ou squirrueuses ; les glandes mésentériques sont d'un volume plus considérable que dans l'état naturel, ainsi que les glandes conglobées des sinues & des aisselles. Le diamètre des vaisseaux lymphatiques est sensiblement augmenté ; ils charient une lymphe épaisse & d'une légère teinte jaunâtre.

Il est rare d'observer le troisième degré de la morve ; on tue l'animal long-temps avant qu'il n'arrive. Dans les chevaux parvenus à ce période de la morve, & dont j'ai exploré les cadavres, j'ai trouvé une matière fétide d'une puanteur insupportable, remplissant les sinus ; la membrane de Schneider déformée par une vaste ulcération chancreuse dont l'aspect avoit les plus grands rapports avec les vieux ulcères vénériens ; la cloison intermédiaire du nez percée d'outre en outre, les cornets & les cartilages cariés ; toutes les glandes lymphatiques squirrueuses, les vaisseaux absorbans variqueux & remplis d'une matière jaune qui a quelque rapport avec le mucus nasal. Cette injection pathologique du système lymphatique, en facilite singulièrement l'étude, le squelette présentant, dans différents points de son étendue, & surtout vers les articulations, des exostoses, des caries profondes, & souvent des effets de l'ostéomalacie.

Les altérations observées dans l'organisation des

viscères, ne m'ont offert rien de constant. J'ai vu dans les trois périodes, des taches pétiécliales sur le poulmon, des concrétions calculeuses, des vomiques dans le parenchyme de ce viscère; le foie m'a offert dans d'autres circonstances des ulcères & des duretés. Le cerveau a quelquefois plus de consistance que dans l'état naturel, d'autres fois il en a sensiblement moins; les ventricules sont assez souvent remplis de sérosité; la plèvre & la péricarde en contiennent plus que dans l'état naturel. Ces altérations sont si peu constantes, qu'on ne peut les considérer que comme des épiphénomènes.

La nature essentielle de la morve est constatée, comme il est facile de le voir, par l'autopsie cadavérique; tel est l'avantage dont jouissent les vétérinaires, qu'ils peuvent imposer à leurs expériences, les animaux atteints d'affections réputées incurables; ils peuvent ainsi parfaitement reconnaître l'état de la maladie dans les différents périodes. Si le diagnostic a été obscur, il est éclairci par cette exploration. Comment peut-il se faire que, malgré toutes ces lumières, quelques personnes s'obstinent encore à regarder la morve comme une altération locale de la membrane de Schneider? Une pareille opinion est bien au-dessous des connoissances actuelles sur le système lymphatique. On fait que les vaisseaux absorbans, les glandes conglobées, les membranes muqueuses, les membranes diaphanes, les os, appartiennent à ce système. On explique par-là pourquoi tous ces organes font affectés simultanément dans la morve des solipèdes.

IX. La méthode de traitement contre la morve est préservative ou curative; on n'est jamais sûr d'avoir préservé des animaux exposés à cette contagion, parce qu'on ignore s'ils en ont absorbé le virus, & dans le cas où il a été introduit, on n'a aucun moyen de s'assurer qu'il y avoit suffisante prédisposition à son développement.

Je ne crois pas qu'il existe de moyens prophylactiques autres que ceux qui sont puisés dans l'hygiène.

La morve est, comme je crois l'avoir prouvé, une maladie pituiteuse; elle attaque néanmoins les solipèdes de tous les tempéramens; elle règne dans toutes les saisons & sur tous les climats: on prétend avoir observé qu'elle est plus rare dans les pays septentrionaux, & il est certain que les jeunes animaux n'en sont presque jamais affectés. Ce n'est donc pas en s'opposant à la prédominance pituiteuse par des remèdes échauffans, qu'on pourra prévenir l'invasion de la morve; les médecins qui n'ont admis que deux sortes de maladies, deux ordres de médicamens, les fortifiants & les débilitans, ne peuvent pas placer dans leur système les affections virulentes, ni les remèdes qu'on doit leur opposer. Comme nous ne connoissons pas l'action du virus morveux, nous ignorons les moyens qui peuvent empêcher son développement ou le neutraliser; il nous suffit de mettre en usage un

régime analogue au tempérament de l'animal & aux diverses circonstances qui l'entourent: régime qui aura pour but de maintenir les fonctions de son économie dans l'équilibre le plus parfait, & de les rapprocher le plus près possible du type de la santé la plus indélébile. Ainsi les moyens prophylactiques à diriger contre la morve, doivent varier suivant la saison, le climat, le tempérament, & surtout suivant la diathèse de l'individu, &c. Ainsi les chevaux qui auront communiqué avec des chevaux morveux, seront saignés s'ils sont pléthoriques; on leur donnera des toniques & des analeptiques s'ils sont faibles & maigres. Dans tous les cas, on n'oubliera point de faciliter les excréments par les frictions, par l'exercice, &c. On ajoutera à ces moyens l'application de deux sétons sur les parties latérales de l'encolure.

Les maladies qui s'accompagnent d'un flux par les naseaux, dont nous avons offert le tableau, peuvent être regardées comme causes prédisposantes de la morve; leur cure sera donc mise au nombre des premiers moyens préservatifs.

On cra qu'il étoit possible de pallier la morve; on s'est fondé sur ce qu'on peut, pour quelques instans, en faire disparaître les symptômes; ces prétendus palliatifs exaspèrent constamment la maladie en la repoussant à l'intérieur, & en rapprochant la terminaison fatale. Au reste, on ne peut élever les signes de cette maladie qu'aux yeux des personnes inattentives ou absolument étrangères aux connoissances vétérinaires. Existe-t-il des remèdes curatifs certains contre la morve? La nécessité d'affaiblir les chevaux qui en sont infectés, répond à cette question.

Depuis long-temps on a fait justice d'un grand nombre de remèdes prétendus spécifiques contre la morve, tels que les pilules de Larché, l'électuaire du baron de Sind, les tablettes de Dubousson, &c. Tous ceux qui ont suivi l'opinion de Lasalle, regardant la morve comme une affection purement locale, ne lui ont opposé que des moyens topiques, des fumigations, des injections introduites dans les sinus, par le trépan pratiqué sur le frontal. On a varié sur les substances à injecter; les uns ont proposé l'eau de chaux, d'autres la décoction d'aristoloché, quelques autres des injections adoucissantes. Quelle que soit la propriété délétère de ces substances, s'il faut les introduire au moyen du trépan, elles ne seront jamais assez de bien pour contre-balancer les inconvéniens d'une opération qui produit une irritation aussi prolongée. Il résulte de-là que si le trépan facilite l'évacuation du mucus, il attire la fluxion sur la membrane de Schneider, par l'espèce d'épispastique mécanique qu'il détermine.

Ceux qui ont considéré la maladie comme générale, ne sont pas plus d'accord que les premiers sur le mode de traitement. On en a successivement tenté un très-grand nombre, & l'on a cité des cures à l'appui de tous, même de ceux qui sont

les plus opposés. Les remèdes les plus célèbres qu'on ait administrés contre la morve, sont les purgatifs hydragogues & principalement la scammonée; les pessaires apéritifs, tels que les mercuriaux, les antimonialx & le sel ammoniac; les narcotiques les plus forts, comme la belladone & la pomme épineuse. J'ai plusieurs observations qui constatent, que ce dernier remède a quelquefois diminué les symptômes de la morve; mais par je ne sais quelle propriété singulière d'un végétal, le foin de la plupart des animaux soumis au traitement, s'est enflammé, & ils sont morts de l'hépatite. Le muriate d'ammoniaque a pareillement fait disparaître les signes de la morve, mais il a introduit dans le système une disposition cachectique dont on n'a pu triompher. D'un autre côté, des chevaux morveux, abandonnés à la nature, ont guéri sans aucun médicament.

On doit conclure de ce qu'on vient de dire, qu'il n'existe aucun spécifique contre la morve. La méthode qui me parait mériter la préférence, est l'administration sagement ménagée des apéritifs secondés par les émétiqes. On donnea successivement à l'animal morveux, le muriate de mercure corrosif, dans une décoction de bois ou de gniaë; on graduera la dose du sublimé corrosif, depuis dix-huit grains jusqu'à cinquante. On placera huit sétins, quatre de chaque côté de l'encolure, & l'on soutiendra la suppuration avec l'onguent basilicum saupoudré de cantharides. Cette pratique est fondée sur l'observation, qui nous fait voir les bons effets produits par les boutons que la nature jette quelquefois sur les parties latérales de l'encolure. On tâchera de faire suppurer, par tous les moyens possibles, les glandes de la ganache; si les topiques irritants sont inutiles, on y appliquera quelques pointes de feu.

Le régime auquel on soumettra l'animal, consistera à supprimer au tiers de sa nourriture, à lui donner de l'avoine en plus grande quantité que dans l'état de santé, à le faire travailler presque autant que s'il se portait bien, à le frictionner rudement plusieurs fois par jour; enfin, à le débarrasser avec soin de l'impression de l'humidité.

X. Il me reste à parler des moyens de désinfecter les écuries, les ustensiles & les meubles des écuries. On renouvellera entièrement la surface des écuries infestées; les fenêtres, le plafond, seront lavés avec de l'eau bouillante; on râclera avec soin ce que l'eau n'emporterait pas; on désinfectera le sol à un pied de profondeur; on remplacera la terre humide qu'on aura enlevée, avec du plâtre ou du mâche-fer. Si l'écurie est parée, on se contentera de la laver avec un balai rude; on nettoiera aussi la face extérieure du mur; on fera chauffer les anneaux de fer auxquels on assujettit la longe des chevaux, en les frottant à la flamme d'un brandon de paille; on ne ramènera les chevaux dans l'écurie désinfectée, que lorsqu'elle sera absolument sèche. Dans la désinfection des ustensiles

MÉDECINE. Tome X.

& des meubles de l'écurie, on aura l'attention de passer au feu, d'étamer ou de braser tout ce qui est de métal, de lessiver tout ce qui est de fil, de râcler, de laver & d'ondre avec de l'huile grasse ce qui est de cuir; de blanchir au sabot tout ce qui est de bois. Toutes ces précautions prises, on achèvera de purifier l'écurie par les fumigations d'acide muriatique simple ou d'acide muriatique oxygéné. L'eau de chaux, tant recommandée pour la purification des écuries & des étables, ne sera jamais employée à cet usage; elle ne décompose pas, comme on le croyait, le virus contagieux; les émanations ne font pas favorables à la cure, elle masque le mucus, & lorsque l'enduit qu'elle forme s'évaille, ce mucus reste à nu, & les chevaux sont de nouveau exposés à la contagion. (GROENIER.)

La morve a été, dans ces derniers temps, l'objet de plusieurs recherches & de plusieurs expériences, exécutées avec l'intention de faire mieux connaître la nature & le traitement de cette maladie.

M. Dupuy, médecin vétérinaire & professeur à l'école royale d'Alfort, s'est plus particulièrement occupé de cette affection morbide, qu'il désigne, dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, sous le nom d'*affection tuberculeuse*. Les lésions organiques qu'il est parvenu à découvrir, & qu'il a décrites dans plusieurs observations qui font la base de son travail, sont nombreuses.

La membrane muqueuse des fosses nasales, qui se trouve le siège principal de la morve dans les chevaux, est ordinairement recouverte d'une mucoïté épaisse & quelquefois purulente; au-dessous de cette couche de mucoïté, elle paraît enflammée. On croit qu'elle est garnie d'une quantité plus ou moins grande de tubercules miliaires ou lenticulaires, plus ou moins avancés dans leur dégénérescence, suivant le degré de la maladie. Ces tubercules ne suppurent pas avant la deuxième ou troisième période, pendant lesquelles la membrane muqueuse se trouve criblée par un assez grand nombre d'ulcérations profondes & lenticulaires sur leurs bords.

Ces ulcérations contiennent quelquefois une matière qui a l'apparence de plâtre, qui remplit souvent une partie des fosses nasales, & qui n'est autre chose que du carbonate & du phosphate de chaux, mêlés à une petite quantité de matière animale.

Cette altération organique s'observe rarement dans les sinus frontaux; elle est plus prononcée du côté gauche que du côté droit dans les fosses nasales; les glandes gutturales sont plus ou moins altérées dans la même maladie, ainsi que le pharynx, les membranes muqueuses du larynx & des bronches; ce qui d'ailleurs est encore plus constant dans la morve, ce sont les tubercules des poumons, plus ou moins gros, tantôt enkystés, tantôt

tôt sans kystes, & toujours ramollis & en suppuration dans la dernière période de la maladie.

M. Dupuy a observé aussi différentes ulcérations dans plusieurs points de la membrane muqueuse du canal intestinal. Ses recherches, qu'il a étendues aux membres, à l'appareil osseux, lui ont fait aussi reconnoître des traces d'altération tuberculeuse dans ces parties. Le même observateur a indiqué en outre, plusieurs autres lésions organiques qu'il étoit également forcé de rattacher à la maladie qui fait le sujet de son travail. Il pense que l'on a confondu quelquefois, dans la pratique, diverses maladies des fosses nasales avec la morve, ce qui a répandu beaucoup de confusion dans les opinions sur le traitement.

La morve, ou l'affection tuberculeuse des animaux domestiques, paroit dépendre, dans ses développemens, du froid & de l'humidité; elle est héréditaire, à en juger du moins d'après plusieurs observations. L'affection tuberculeuse des vaches ne s'étend pas du reste, comme dans le cheval, jusque dans les fosses nasales, & se trouve caractérisée d'ailleurs par le volume très-considérable des tubercules: elle n'est pas moins héréditaire que la morve, ainsi que M. Huzard l'a vu déjà remarqué, d'après des observations qui sont confirmées par celles de M. Dupuy. Cette même affection ne semble pas contagieuse, & il faudroit également admettre cette non-contagion pour la morve, si l'on vouloit s'en rapporter à l'opinion de M. Dupuy & aux différens faits sur lesquels il appuie cette opinion.

L'affection tuberculeuse dans les moutons est presque toujours accompagnée de vers intestinaux.

Les idées du même médecin vétérinaire sur le traitement, ont en général pour but les moyens hygiéniques, & en particulier, les résultats que l'on pourroit obtenir, par le croisement des races, pour le perfectionnement des animaux domestiques.

L'intention toute spéciale qui l'a dirigé dans son Traité, a été de prouver, par un grand nombre de faits, que la morve ne diffère point essentiellement des autres affections tuberculeuses des animaux domestiques, de la pommèlère des vaches, par exemple, & de quelques maladies du mouton. Il paroit avoir atteint son but; mais il eût été désirable, dans l'intérêt de l'auteur & pour le bien de la science, qu'il eût apporté plus de soin & mis beaucoup plus d'ordre dans un travail destiné à faire servir au médecin vétérinaire tout le prix, toute l'importance qu'il doit attacher à l'anatomie pathologique, pour le perfectionnement d'une nomenclature zoonomique. (L. J. M.)

MORVE. (*Hygiène.*) (Sécrétion.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe IV. Excrét.

Ordre II. Evacuation journalière.

La morve est un fluide visqueux, qui, après

avoir été séparé par la membrane pituitaire qui tapisse le nez, le gène souvent & l'embarasse, ce qui force à employer les mouchoirs. Ce mucus est très-utile, en ce qu'il humecte les nerfs olfactifs qui président au sens de l'odorat. Lorsque son évacuation est trop abondante, alors la membrane pituitaire se relâche & la sensation s'affoiblit. Sans la morve, souvent les nerfs de l'odorat seroient trop vivement mus, & il pourroit en résulter quelquefois des spasmes & des étourdissemens fâcheux.

Dans les rhumes, la membrane pituitaire est enflammée; avec les poudres sternutatoires elle est irritée. Ainsi, en ne s'exposant pas trop à un air vif & froid, on peut éviter la phlogose de la membrane pituitaire, & une trop grande excrétion de la morve. Mais aussi, quand on a des raisons de dégager les sinus du cerveau, dans les maux de tête opiniâtres, on voit que les poudres sternutatoires, en augmentant la sécrétion de ce mucus, peuvent débarrasser la tête & porter du soulagement.

On doit, quand on a chaud, éviter de se découvrir la tête dans un endroit froid; sans cela il arrive des plethores instantanées, qui causent les engorgemens de ces parties & des rhumes. Il faut, dans les temps brumeux & de brouillard, mettre son mouchoir devant le nez & la bouche, pour diminuer d'autant, l'impression qui pourroit être portée sur la membrane pituitaire.

(MACQUART.)

MORXY. (*Médecine pratique. Nosographie.*)

Nom populaire sous lequel on désigne, dans le Malabar & dans quelques autres parties des Indes orientales, une maladie qui règne fréquemment & d'une manière pestilentielle. (L. J. M.)

MOSCATELLE ou MOSCATELLINE, f. f. *Moscatellum*.

Plante de la famille des Saxifragées de de Jusieu, & dont les fleurs ont une odeur de musc fort agréable, qui les fait reconnoître d'assez loin.

La moscatelle n'a jamais été employée qu'à l'extérieur, & dans le dessein d'en obtenir les prétendus effets que l'on désigne sous les noms de *détergifs*, de *resolutifs* & de *vulnéraires*. (Voyez ces mots dans le Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie.) (L. J. M.)

MOSCHIFÈRE, adj. (Voyez Musc.)

MOSCHION. (*Biograph. médic.*) On trouve désigné sous ce nom, plusieurs auteurs dans les écrits des Anciens: 1°. *Moschion*, disciple d'Asclépiade, qui modifia quelques opinions de son maître; 2°. *Moschion*, cité par Soranus, qui lui attribue quelques écrits sur la cosmétique; 3°. un autre *Moschion*, dont Pline paroit seul avoir parlé; 4°. *Mos-*

chion, que Leclerc a placé parmi les derniers méthodes, sans pouvoir fixer d'ailleurs, d'une manière précise, l'époque à laquelle il appartient. L'ouvrage qui nous est parvenu, & que l'on attribue à ce Moschion, a pour titre : *De mulieribus affectibus, lib. unus* (Gaspard) & Haller penseait que ce livre fut d'abord écrit en latin & traduit ensuite en grec. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de Moschion fait partie de l'estimable collection publiée sous le titre de *Gynaeciorum libri*, Bâle, 1566. Une édition séparée fut donnée en 1538, in-8°, en grec & en latin, par Wolf.

Plusieurs auteurs pensent avec Leclerc, que ce traité n'est qu'un extrait d'un ouvrage d'un autre ou de plusieurs autres Moschion.

Le Traité de Moschion est écrit avec assez de méthode. L'auteur y rapporte son sujet à deux chefs principaux, savoir : 1°. tout ce qui concerne la conception, & la grossesse; 2°. les indispositions ou les maladies des femmes en général, qui se rapportent à la grossesse. Il a traité longuement des causes de la fécondité; & il est digne de remarque que malgré la corruption des mœurs de son temps, Moschion ait parlé avec une grande sévérité de mœurs, de l'avortement volontaire & des moyens qui peuvent tromper le vœu de la nature, dans les relations conjugales.

Le livre de Moschion est curieux & même instructif, relativement à ce qui concerne les connaissances & les coutumes des Anciens, concernant le soin, les précautions qu'exige la grossesse, le devoir & les fonctions des sages-femmes; l'époque de la naissance, les moyens à employer pour favoriser le travail de l'accouchement; quelques précautions superstitieuses relatives à la ligature du cordon ombilical; les causes des accouchements difficiles, soit qu'elles viennent de la mère, soit qu'elles viennent de l'enfant, &c.; les différentes manœuvres à employer dans le cas de ces accouchements, l'extraction de l'enfant mort, la délivrance. Il paraît, d'après ce qui est relatif à cette dernière, que les Anciens attachoient une grande importance à ne pas abandonner le travail de la délivrance à la nature; Moschion a parlé, avec assez de détail, des soins qu'exige le nouveau-né, des hémorragies utérines, de la méthode de tamponner dans ces hémorragies; de ce qu'il appelle les *hémorrhoides des parties génitales*.

Le même auteur cherche à répandre quelque lumière sur les signes qui peuvent faire distinguer la chute de l'utérus, de son renversement. Il fut guidé par les écrits de Soranus relativement à cet objet, & relativement à la hardiesse avec laquelle il propose d'amputer une portion de l'utérus, tombée en gangrène. Moschion a traité assez longuement de la fièvre néfrique. On trouve, dans les écrits, l'indication d'une coutume bien extraordinaire chez les Anciens, celle d'arrêter le développement du sein par des applications

stupéfiantes de ciguë & d'opium : mutilation dont le motif ne nous est pas connu. (L. J. M.)

MOSCHUS. (*Biograph. médic.*) Cet auteur est cité par Celse, liv. V, chap. 18, mais seulement pour donner sous son nom, la composition d'une espèce d'emplâtre que les Anciens appeloient *maligne*; composition qui avoit beaucoup moins de consistance que les emplâtres ordinaires, & que l'on employoit, comme l'indique ce nom, pour ramollir & déterger. (L. J. M.)

MOSCOUADE, f. f. (*Hygiène.*) On donne ce nom au sucre brut, lorsqu'il le trouve encore coloré par la mélasse ou par d'autres substances étrangères au corps sucré. (L. J. M.)

MOSQUITES, f. p. (*Néoplagie.*) On a désigné sous ce nom, des boutons rougeâtres dont l'éruption est suivie d'une démangeaison insupportable. (*Voyez le Dictionnaire de Médecine de JAMET.*) (L. J. M.)

MOTELE. (*Hygiène.*)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta.*

Ordre I. Aliments.

Section II. Animaux.

La motelle est un petit poisson de rivière & de lac principalement. Il est le plus souvent gros comme l'éperlan; il a la peau visqueuse, sans écailles; il est commun en Suisse & du côté d'Auxerre. Sa chair, quoique visqueuse, est estimée par son goût, mais ne convient pas aux estomacs délicats. (Macquart.)

MOTHE. (*Biograph. médic.*) Premier médecin de Frédéric III, mort en Danemark en 1670. On lui doit deux ouvrages qui méritent d'être consultés : *De pleuritide legitima, disputatio*; Bâle, 1637. *Casus chirurgici personarum thoracis*; Hafniae; 1636, 1638 & 1661, in-4°. (L. J. M.)

MOTEUR, MOTRICE, adj. Qui meut, qui remue, qui imprime le mouvement. Les muscles sont les organes moteurs des os, & sans leur action il n'y a pas de mouvement. De-là les expressions de *muscle moteur*, *puissance motrice*. Les anatomistes ont encore donné le nom de *nerfs moteurs communs des yeux*, ou *moteurs oculaires communs*, aux nerfs de la troisième paire (oculo-musculaires communs de M. Chaussier), & celui de *moteurs externes* à ceux de la sixième paire (oculo-musculaires externes de M. Chaussier). (A. J. T.)

MOTILITÉ. (*Physiologie & pathologie générale.*) *Viz motus; sivevis motus* de Galien. L'une des grandes propriétés vitales, la faculté du mouvement organique dans toutes les

parties, dont le développement consiste, suivant M. le professeur Chaussier, dans une tension des solides, dans une tendance permanente à la contraction, au resserrement, au raccourcissement; développement qui produit, entretient dans toutes les fibres, dans tous les vaisseaux, une résistance, une action d'où résulte la progression des fluides.

Cette propriété n'est pas développée au même degré, ni de la même manière dans les divers organes; différences qui paraissent dépendre de la variété des structures.

Cette diversité dans la manifestation de la motilité, a conduit Bichat, par un abus de l'analyse, à reconnaître plusieurs espèces de motilité ou de contractilité, savoir : la contractilité animale, la contractilité organique sensible, & la contractilité de tissu.

Ces distinctions subtiles, si peu d'accord avec les vues élevées de ce physiologiste, se font maintenant contre l'opinion & les représentations des hommes les plus éclairés, par l'espèce d'ascendant que conservent toujours les divisions & les formules scholastiques, quand elles sont mises en crédit par un homme qui exerce une grande autorité sur la direction des premières études.

Toutefois ces différentes espèces de contractilité ou de motilité, commencent à n'être plus regardées par les esprits exacts, comme des propriétés distinctes & séparées, mais comme différents modes, différents degrés de développement d'une seule & même propriété, qui varient & le modifient suivant la nature des parties où on les observe, & suivant la qualité des stimulans qui les mettent en jeu. M. le professeur Chaussier, dans la saine doctrine doit prévaloir dans l'examen de cette importante question, rapporte à deux modes principaux, ces divers degrés de la motilité, savoir : 1°. la tonicité ou contractilité fibrillaire; 2°. la myotilité.

Nous ne pourrions rien faire de mieux que de rapporter ici son propre texte, dont la concision & la force ne pourrout qu'être altérées par une analyse ou par un commentaire.

1°. « La Tonicité (tension vitale, contractilité fibrillaire, force tonique, *vis tecta cellularis*. (Bich.)

Ce genre de motilité, commun à tous les solides organiques, est caractérisé par un ton général & permanent, c'est-à-dire, par un certain degré de tension, de résistance habituelle, qui rapproche les molécules constitutives des organes, en affermit la cohésion, en resserre le tissu d'où résulte, par l'impulsion des fluides, un mouvement alternatif qui entretient, hâte ou retarde leur progression dans les réseaux le plus fins. Cette propriété s'observe spécialement dans les tissus lamineux, aréolaires, parenchymateux; dans les membranes, dans les papilles ou expansions nerveuses, dans les réseaux capillaires, les veines, les lymphatiques; enfin dans tous les tissus où il n'y a point de fibre

musculaire. La tonicité se manifeste par une contraction lente, graduelle, quelquefois par un resserrement, une sorte de frémissement; d'autres fois par le gonflement, la rigidité, l'érection de la partie. Ainsi l'on doit y rapporter l'action de l'iris, l'érection du penis, du mamelon, des papilles nerveuses, la corrugation du foramen, le frocement de la peau, la contraction de la rate, de la vésicule pulmonaire, le mouvement vermiculaire des canaux membraneux, des points lacrymaux, des vaisseaux absorbans. Les degrés, l'énergie de cette propriété, diffèrent beaucoup, suivant la constitution primitive, les passions, le régime, la saison, &c.; elle augmente par divers irritans, diminue dans les parties paralysées, cesse entièrement à la mort. Aussi elle tient essentiellement à la force vitale. Son état ordinaire est nommé *ton*, *eutonie*; son augmentation, *angustie*, *éréthisme*, *crispation*, *hypertonie*; sa diminution, *atonie*, *laxité*, *flaccidité* (1).

2°. « La Myotilité ou Motilité (dérivée de *myo*, *mus*), contractilité musculaire, irritabilité Hallérienne, *vis muscularis*. (Bich.)

Cette propriété aperçue depuis long-temps, nommée par Glisson, *irritabilité*, observée dans la suite avec plus de soin & démontrée par Haller, appartient uniquement à la fibre musculaire, aux organes qui en sont composés, tels que le cœur, l'estomac, l'intestin, la vessie, &c. Elle est caractérisée par une contraction prompte, rapide; sa privation est *paralyse*; son excès, *spasme* ou *convulsion*, que l'on distingue en *tonique* & *clonique*.

1°. Cette propriété subsiste quelque temps après la mort, même dans des parties détachées du corps; mais sa durée n'est pas la même dans toutes les parties musculaires; elle est plus grande, plus durable dans les organes qui reçoivent leurs nerfs des plexus, & varie par plusieurs circonstances.

2°. Elle persiste plus long-temps dans les animaux à sang froid, dans ceux qui périssent en peu de temps par une hémorragie.

3°. Elle est plus grande, plus durable, dans la jeunesse & chez la femme.

4°. Elle est excitée par le galvanisme, par l'électricité électrique; par une irritation (mécanique ou chimique) faite sur le muscle même, ou sur le nerf qui s'y distribue, ou sur la partie dell'encéphale à laquelle il correspond.

5°. Elle s'épuise peu à peu par la continuité des expériences, s'éteint promptement par les gaz hydrogènes carbonés, sulfurés, par l'opium, &c., &c.

6°. Elle est peu considérable, peu durable dans

(1) On ne doit pas confondre ce mot de *contractilité* vitale, avec l'élasticité des tissus, ni avec la résistance qui survient quelque temps après la mort, ou avec la dissolution, le raccourcissement des parties cadavériques par la chaleur, leur gonflement, par les acides, &c.; propriétés qui dépendent uniquement du mode de texture, de la disposition fibrillaire, de la sile, de la condensation des humeurs dans les artères, de leur évaporation ou d'une imbibition particulière.

les cadavres de ceux qui périssent par la phthisie, par des affections gaucréueuses, scorbutiques, pestilentielles, par un excès d'irritation ou de saignées, ou par la chaleur, &c.

7^o. Elle est détruite tout-à-coup, dans un animal vivant, par une commotion électrique. (*Van Marum.*)

8^o. Elle est diminuée & même détruite entièrement & très-promptement dans les parties d'un animal vivant, par la section, par la ligature des nerfs, par quelque affection de l'encéphale, moins promptement par la ligature ou par la section des vaisseaux sanguins.

Ainsi elle ne dépend ni du *gluten*, ni de la *gelatine*, mais dérive essentiellement du principe vital, est intimement liée à l'action du cœur, & surtout à celle de l'encéphale ou des nerfs; disposition d'où dépend la *LOCOMOTION VOLONTAIRE*, propre aux animaux. » (L. J. M.)

MOTTE (Guillaume Maquessé de la) (*Bio-graph. méd.*), appartenait au dix-septième siècle & au commencement du dix-huitième : il fit ses études cliniques à l'Hôtel-Dieu de Paris, où il commença à se livrer aux accouchemens, en s'attachant d'une manière spéciale au département qui s'y trouvoit consacré à cette partie de la médecine. De la Motte avoit eu, pour précepteur dans cette carrière, le savant & judicieux Mauriceau, qu'il n'a pas craint de censurer. Il a plus cherché d'ailleurs à recueillir & à publier des faits instructifs, qu'à se livrer à des spéculations ou à des théories. Sa dissertation, en réponse au livre d'Hecquet, sur l'indifférence aux hommes d'accoucher les femmes, n'a pas toutefois exclusivement pour objet cette question : l'auteur s'y est occupé en outre de ce qui concerne la génération en général, l'opinion des ovaries en particulier, le système des animalcules qu'il combat, l'agacement, & la superfétation, qu'il refuse d'admettre. Le traité justement estimé de la Motte sur les *accouchemens naturels, non naturels & contre nature*, &c., parut pour la première fois en 1715. L'édition de 1722 fut donnée par l'auteur, qui l'a enrichie de plusieurs notes & de plusieurs observations. On trouve dans cet écrit, le résultat d'une expérience aussi judicieuse qu'étendue. On possède aussi un *Traité de Chirurgie* de Maquessé de la Motte, dont il existe plusieurs éditions, savoir : l'édition de 1722, 3 vol. in-12; une autre de 1752; une troisième de 1763; enfin, une quatrième de 1765.

Sabatier, qui écrivit cet ouvrage, en publia une nouvelle édition en 1771, 2 vol. in-8^o avec un commentaire.

La Motte, comme tous les hommes qui ont beaucoup vu, beaucoup observé, & qui croient, par cela même, se trouver redevables de leur savoir bien plutôt à leurs méditations qu'à leur lecture, parle trop de lui peut-être dans ses écrits,

& ne rend pas assez de justice aux autres. *Laudes suos non negligit*, a dit Haller de cet auteur, *non perinde sumæ collegurum, Plautus.*

(L. J. M.)

MOU, MOI, adj. (*Anatomie & physiologie.*) Les anatomistes désignent sous le nom de *parties molles*, l'ensemble des chairs qui recouvrent directement le squelette. Ce que les peintres & les sculpteurs appellent le revêtement ou le dessus du corps humain, par opposition à ses parties dures & au squelette qui les supportent, peut être regardé comme la partie fondamentale du corps humain.

(L. J. M.)

MOUCHES. (*Pathologie.*) Nom vulgaire sous lequel on désigne les premières douleurs que la femme éprouve avant le travail de l'accouchement, & que l'on peut regarder comme l'effet des premières contractions de l'utérus. (L. J. M.)

MOUCHES. (*Insectes.*) (*Hygiène.*) MORT AUX MOUCHES, &c. La suifance que l'on emploie avec le plus d'efficacité pour tuer les mouches, est un oxyde noir d'arsenic, dont la plus légère évaporation suffit pour faire périr ces insectes, lorsqu'ils volent au-dessus du vase qui contient ce redoutable poison. On ne sauroit employer cette substance avec trop de circonspection, ni en permettre le débit sans des garanties suffisantes, puisqu'elle doit être regardée comme un poison des plus dangereux, soit pour l'homme, soit pour les animaux domestiques. (L. J. M.)

MOUCHETURES. (*Chirurgie ministrante ou petite chirurgie.*) (*Voyez* SCARIFICATION.) Les états morbides dans lesquels on pratique le plus ordinairement les mouchetures, sont l'œdème, l'anasarque, quelques inflammations, & différentes fluxions sanguines. Ce qu'on appelle vulgairement les ventouses scarifiées, n'est autre chose que des ventouses, dont l'effet est augmenté par des mouchetures plus ou moins nombreuses & d'autant plus efficaces, qu'elles font produites spontanément avec un instrument destiné pour cet usage. (*Voyez* SCARIFICATEUR.)

Une moucheture ou l'application d'une ou de deux sangsues dans l'intérieur du nez, est indiquée dans plusieurs céphalalgies, qui dépendent d'une congestion sanguine dans les fosses nasales, ou dans les sinus de la face.

Les oculistes excellent avec beaucoup de dextérité sur la conjunctive, de petites mouchetures, dans les cas d'ophtalmie chronique, avec dilatation & atonie des vaisseaux engorgés.

L'acupuncture des Japonais & des Chinois, qui a été exposée à son article & avec un détail suffisant dans ce dictionnaire, ne doit être regardée que comme une moucheture, quand elle se va pas au-delà des ligamens. (L. J. M.)

MOUCHOIR, f. m. (*Hygiène*). (Voyez VÉTÉMENT.) Partie du mobilier chez les nations policées, qui a pour objet de recueillir dans les vides d'une grande délicatesse & d'une grande propreté, le produit de la sécrétion des folles nasales, soit naturel & presque sans couleur, soit provoqué & plus ou moins coloré par les molécules du tabac, dont l'usage étoit entièrement inconnu aux Anciens.

Ce que les Anciens appeloient les *épiscutes*, ne paroît pas être l'analogue de nos mouchoirs, & relativement à cet objet, la question qui nous occupe dans ce moment, & qui paroît frivole ou indifférente, prend tout-à-coup un certain degré d'importance, puisqu'elle se rattache à des considérations d'anatomie & de médecine comparée, sur la complexion physique des Anciens & la constitution des peuples modernes.

En général, l'exercice habituel & souvent abondant des folles nasales, ne doit pas être regardé comme inhérente à la nature de l'homme. Les personnes robustes & chez lesquelles les fonctions de la peau sont très-actives & très-étendues, mouchoient très-rarement & seulement d'une manière accidentelle : tels sont les sauvages, mais surtout les individus que certains évènements particuliers & merveilleux ont séparés pendant leur enfance, ou pendant leur jeunesse, de la société, sans le secours de laquelle ils n'ont pu qu'exister avec beaucoup de peine, & dans un concours de circonstances, qui a rapproché leur organisation de celles des peuples de l'Amérique ou de la Nouvelle-Hollande. Les Anciens eux-mêmes, qui se trouvoient bien éloignés d'une pareille enfance de la civilisation, différoient beaucoup des modernes relativement à l'action de se mouchoir, & à l'excrétion des urines, qu'ils regardoient comme une infirmité. En vain du moins chercheroit-on dans les nomenclatures grecques & latines, des noms, pour les foins, ou l'entretien du visage, & pour les tissus particuliers que nous appelons *mouchoirs* : dénomination que l'on paroît devoir faire dériver du latin barbare *muccinum*, employé par Arnobe.

Le beau climat des Grecs & des Latins, mais surtout leur genre de vie, leurs nombreux exercices, la solidité de leur complexion, devoient rendre les fonctions de la peau plus actives, ralentir par cela même les fonctions des membranes muqueuses, & prévenir ainsi les dispositions éminentes aux affections catarrhales, que l'on a justement regardées comme un trait remarquable, dans la complexion des nations modernes.

L'usage du tabac a beaucoup ajouté à cette prédominance des sécrétions muqueuses, soit pour les narines, soit pour l'intérieur de la bouche, depuis la découverte de l'Amérique ; du reste quelques préceptes d'hygiène relativement à la manière de se mouchoir dans l'état présent des choses, ne seroient pas inutiles pendant les rhumes ou pen vifs des folles nasales, après l'opération de la fistule lacrymale, ou de la her-

nie, dans les cas d'hémoptysie, d'anévrysme du cœur ou des gros vaisseaux, des phlegmasies des poumons, &c.

Nous ne parlerons pas d'ailleurs ici, ni des mouchoirs bénins, ni des mouchoirs médicamenteux, parce qu'ils sont également tombés en désuétude, & que ce qui les concerne appartient plutôt à l'histoire des folles humaines & des erreurs populaires, qu'à l'étude des usages & des pratiques qui méritent d'être rappelés & conservés.

Les tissus de chanvre, qui n'ont commencé à être connus en Europe que vers la fin du treizième siècle, ces tissus & les tissus de lin sont les plus généralement employés, & les plus convenables pour l'action de se mouchoir.

Cette même action de se mouchoir & l'excitement de la sécrétion muqueuse des folles nasales par le tabac, altèrent le visage, & déforment le nez par l'abus que l'on peut en faire : mais dans plusieurs cas il ne seroit pas sage de supprimer brusquement une pareille habitude, qui, à tout prendre, peut être regardée comme un émouloire qui a ses indications & ses avantages. (Voyez NASALE (Excrétion des folles nasales), STERNUTATOIRES, TABAC.) (L. J. M.)

MOUFETT (Thomas), médecin anglais du seizième siècle, qui n'a pas été sans quelque célébrité. Après avoir exercé la profession avec beaucoup d'activité & de succès, il passa les dernières années de sa vie à la campagne, & dans un loisir dont il usa d'une manière véritablement philosophique. On cite de lui les ouvrages suivans :

1°. *Infectio-m, seu, minimorum animalium theatrum iconibus supra quingentis illustratum.* Londini, in-fol.

2°. *De jure et præstantia chemicorum medicamentorum dialogus apologeticus. Accesserunt epistolæ quædam medicinales ad m. dicos aliquot conscriptæ.* Francforti, 1584, in-8°.

3°. *Nesomantica hippocratica, seu Hippocratis prognostica cuncta.* Francforti, 1588, in-8°.

4°. *Health's improvement, or rules concerning the nature, method, and manner of preparing all sorts of food.* 1655. (A. J. T.)

MOUFLE. On a donné ce nom à des machines ou appareils que les Anciens mettoient en usage dans la réduction des fractures. (Voyez ce mot & le mot MACINE, dans le Dictionnaire de Chirurgie.) (L. J. M.)

MOULE. *Mytilus edulis*. L. (*Hygiène*.) Ce mollusque, qui appartient à la famille des mytilacées (1), est souvent employé comme aliment. On trouve les moules sur nos côtes, & leur pêche a lieu depuis le mois de septembre jusqu'au printemps.

(1) Cuvier, *Règne animal*, tome II, page 470.

Cet aliment est beaucoup plus difficile à digérer & souvent même il est nuisible pendant les mois de juin, juillet & août; ce qui a été attribué par des médecins modernes (1) à des étoiles de mer, qui sont vraiment vénéneuses, & que l'on rencontre très-confusément dans les moules pendant les temps les plus chauds de l'année. Dans tous les temps, plusieurs personnes ne peuvent manger des moules sans être gravement incommodées. L'accident qu'elles éprouvent est une espèce d'indigestion. On ressent d'abord un malaise général, une douleur gravitative à la région de l'estomac, des nausées, la gêne de la respiration, une suffocation convulsive, la tuméfaction des pampiers, le gonflement général de la face, enfin une éruption de vésicules ou de taches blanchâtres & faillantes, qui est précédée d'une démangeaison très-vive. Si les malades succombent; ils ont du délire, des sueurs froides & une angoisse inexprimable. Werlhoff a cité des exemples d'une issue aussi funeste par l'indigestion des moules.

Un vomitif donné au commencement d'une semblable indigestion, a paru avoir quelquefois des avantages; mais le moyen le plus efficace, le véritable antidote dans cette espèce d'empoisonnement, c'est l'éther (2) donné à très-forte dose, dans une potion convenable. (L. J. M.)

MOULINS (Eaux minérales de). Moulins est la capitale du ci-devant Bourbonnois, sur la rive gauche de l'Allier; on rencontre près des portes de cette ville une source minérale appelée *Bardon*. On trouve dans le *Dictionnaire minéralogique & hydrologique de la France*, une analyse de ces eaux par l'évaporation, de laquelle on infère qu'elles contiennent du vitriol, du nitre, du lithium, du fer & du soufre.

On les annonce comme résolutives & apéritives, comme utiles dans les gonflements d'estomac, les coliques, la jaunisse, la passion hystérique, les engorgements, & les maladies de la peau. Leur analyse mériterait bien d'être refaite, pour donner plus de créance à toutes les vertus qu'on préconise. (Macquart.)

MOULIN-LACOSTE (Eaux minérales de). C'est un hameau à une demi-lieue d'Arzac en Vézère. On y trouve une source minérale froide. (Macquart.)

MOULIN-LE-COMTE (Eaux minérales de). C'est une ferme entre Passy-Greniers & Vaudriens,

où l'on trouve une source minérale froide, à une lieue & demie de Châtilien-sur-Marne.

Sallement, dans sa table raisonnée des trente premiers volumes du *Journal de Médecine*, Paris, 1774, indique cette source comme ferrugineuse, & comme étant utile dans les mêmes cas que celle de Bourfaut, que l'on recommande dans les obstructions & les bouillissures, ainsi que dans la pléthore, en les coupant avec le lait.

(Macquart.)

MOULINS-LA-MARCHE (Eaux minérales de). C'est un bourg à quatre lieues de Laigle, où l'on trouve une source minérale froide, au bas d'une petite côte, à une demi-lieue de l'endroit.

Le médecin Teirède, dans l'*Examen analytique des eaux minérales de Laigle, en haute Normandie*, Paris, 1776, donne l'analyse de ces eaux, par les réactifs & l'évaporation. Il leur attribue les propriétés des eaux minérales ferrugineuses simples, mais peu énergiques.

(Macquart.)

MOULINS. (Hygiène.)

Partie III. Moyens de l'hygiène.

Classe I. Règles pour la conservation de l'homme.

Ordre II. Règles relatives aux aliments.

Quand on manque de moulins, il est bon de savoir employer le blé, & de la manière la plus avantageuse. Dans le département de la Côte-d'Or, il y a des endroits où il n'existe point de moulins à vent, & où l'on fait griller le froment, pour le concasser ensuite dans des mortiers, & en faire, à l'eau ou au lait, une bouillie qui est très-agréable. Cette méthode est infiniment préférable à celle qui a été employée dans plusieurs cantons, où, faute de moulins, on a fait crever le blé dans l'eau pour en faire une bouillie. Il faut diviser le meilage du blé par la torréfaction; autrement on a une nourriture lourde & indigeste, qui ne laisse pas d'avoir des inconvénients.

Il seroit bien essentiel que le Gouvernement prit en considération sérieuse le projet de M. Boncerf, qui consistoit à employer les moulins à bras de M. Dorsud, dans les prisons & les maisons de force. Un seul de ces moulins peut occuper successivement six ou huit personnes dans vingt-quatre heures, & elles pourroient moudre jusqu'à sept fatiers par jour. La mouture de la France revient à plus de soixante millions, en estimant qu'un fatier coûte un franc & demi.

Il y a moitié des moulins à eau qui sont nuisibles, parce que les rigues facilitent des inondations & produisent des marais qui sont enlevés à l'agriculture, & deviennent des pépinières de fièvres. Le peuple pourroit, avec le moyen proposé, gagner la moitié de la somme & on feroit des terrains précieux, on occuperoit des bras existants, & on assureroit la salubrité & l'abondance des farines. (Macquart.)

(1) De Brucelle, *Mémoires de l'Académie de Bruxelles*, tome 1^{er}, page 209.

Durondeau, dans les mêmes Mémoires, tome II.

(2) Voyez dans la *Cave de Jand*, de mars & d'octobre 1813, & mars 1815, plusieurs observations qui tendent à prouver l'efficacité de l'éther dans le cas d'empoisonnement par les moules.

MOURANT. Un mourant, a dit Cabanis, est un être sacré qu'on ne peut voir avec indifférence : ne fuyons pas son agonie, & que l'idée de notre bienfaisance vienne animer encore la dernière pensée. On ne peut que partager de tels sentimens; le médecin surtout, chargé par son noble ministère d'acquiescer la société envers l'homme qui va payer le dernier tribut à la nature, doit être dirigé par eux. D'ailleurs, un motif qui n'existe pas pour les autres a beaucoup de force pour lui : la contemplation des phénomènes que présentent les mourans, est une des sources les plus fécondes de ses connoissances.

Je diviserai ce que j'ai à dire ici en deux chapitres : le premier traitera des lignes qui annoncent que la mort va s'effectuer, & le second des devoirs du médecin envers les mourans.

CHAP. I. De l'agonie.

S. 1^{er}. De l'agonie, considérée dans les différens sensus dont elle peut être accompagnée ou immédiatement précédée.

Si l'on examine l'agonie d'une manière générale, suivant l'âge & la maladie que la mort termine, on reconnoît la vérité des observations de Cabanis. Ce célèbre médecin philosophe a vu que la mort est souvent convulsive dans l'enfance & dans les maladies aiguës, & assez ordinairement accompagnée d'un sentiment habituel d'espérance & de bien-être dans les fièvres lentes phibiques, qui semblent plus spécialement réservées à la jeunesse. En général, à cette époque de la vie, ainsi qu'il le fait remarquer, la mort n'affecte point l'âme de regrets pusillanimes ou de vaines terreurs; & même dans certains cas où l'activité du cerveau se trouve augmentée par l'effet de la maladie, l'esprit acquiert une énergie & une élévation, les sentimens de courage & d'enthousiasme prennent un ascendant, dont l'effet est de donner à cette dernière scène quelque chose de surnaturel aux yeux des assistans émus.

J'ai vu mourir des milliers de soldats sur les champs de bataille, & le plus souvent leur agonie offroit le spectacle, extraordinaire dans presque toutes les autres circonstances, d'hommes qui calculaient froidement les progrès de la mort par leur vie, & qui paroissent non moins occupés du succès de la bataille que de leur propre sort. Ainsi, il est plus d'une passion qui élève l'homme au-dessus de la grande loi sans laquelle, comme l'a dit J. J. Rousseau, toute espèce mortelle seroit bientôt détruite, je veux dire, la crainte de la mort.

La mort porte une terreur invincible dans l'âge mûr, & particulièrement dans les affections hypochondriques & mélancoliques qui lui sont propres, où elle se multiplie, pour ainsi dire, en présentant sans cesse son image à des regards qui

n'osent plus la fixer. Mais je ne puis croire, avec Cabanis, que telle est l'agonie des maladies dites fièvres malignes nerveuses; & je pense que ce n'est que dans la vieillesse très-avancée, dans la caducité & dans les maladies qui lui appartiennent, que la mort est calme, & l'âme sereinement attend sa venue. Le vieillard qui n'est point encore ramené à cet état, craint au contraire beaucoup la mort : il sent que bientôt il ne pourra plus la repousser, & tous ses efforts, toutes les pensées tendent à en éloigner l'instant. Mais lorsque cet instant est arrivé, ainsi qu'il a été dit à l'article *Mort* (*Histoire naturelle & physiologique de la*) (voyez ce mot), il ne l'aperçoit point ordinairement, & elle se conforme sans douleur pour lui comme pour les autres.

C'est principalement dans les affections chroniques que le courage s'évanouit : aussi, dans leur agonie, il n'y a que la continuité de douleurs terribles qui cache le danger. Dans les autres cas de longues maladies, l'inquiétude, l'accablement moral, le regret d'abandonner la vie, sont empreints sur la physionomie, marqués sur les rides du front, dans les gestes & par les discours. Il en est très-souvent de même à la fin des allectons aiguës qui ont duré quelque temps, quand la fièvre & les saignées répétées ont épuisé les forces. Une remarque importante, c'est que dans les maladies chroniques (autres que celles du cerveau cependant), l'on conserve l'intégrité des facultés intellectuelles; mais, hélas! c'est pour empoisonner davantage nos derniers jours, en nous privant de toutes les heureuses illusions qui cachent le tombeau. Il y a même des malades atteints d'affections chroniques, dont les facultés intellectuelles acquièrent, aux approches de la mort, un grand développement, & tel qu'elles sont toujours restées intérieures à ce qu'elles se montrent alors.

On peut dire, en général, que dans les affections lentes des poulmons, l'agonie, & l'époque qui la précède, ne sont point accompagnées de la grande anxiété morale qu'on observe dans les maladies de l'abdomen & dans l'anévrysme du cœur. Le découragement qu'on remarque dans ces dernières maladies, a lieu jusqu'au dernier instant.

En général, cependant, la mort n'arrive point sans être précédée de délire, surtout dans les maladies aiguës & inflammatoires. Dans celles-ci, le délire est loin d'être toujours mortel; mais dans les maladies chroniques autres que les folies, le délire ne s'observe guère que dans la dernière heure de l'existence. Il paroît n'être communément alors qu'une suite d'extinction de nos sensations & de notre intelligence, sans grand trouble. C'est le contraire dans le délire des maladies aiguës.

Ainsi donc, suivant les âges, le genre & le siège des maladies, l'agonie offre, en général, & indépendamment

indépendamment d'une imagination vicieusement excitée, des différences très-distinctes relativement à l'état de l'esprit & de l'âme; & par conséquent « les âges exercent encore, même dans » ce moment fatal, qui semble pourtant les éga- » liser tous & les confondre, une influence dont » on reconnoît aisément la trace dans les idées » & dans les affections morales des agonisants. » (P. J. G. Cabanis, *Rapports du physique & du moral de l'homme*, 4^e mém.) »

Avant d'examiner l'agonie dans les phénomènes physiques, citons un passage de MM. Double & Seruin, lequel se rattache à l'état moral des moribonds.

« C'est une chose, disent-ils, à laquelle on se » fait peut-être pas assez d'attention dans la pra- » tique, que l'influence d'une vive & forte exci- » tation de la volonté pour résister à la mort..... » Ce n'est pas la première fois que nous avons » l'occasion de nous livrer à ces réflexions, & » nous pensons qu'un des moyens de ne pas suc- » comber dans les maladies, seroit souvent une » volonté assez fortement promouée de ne pas » mourir. Ceci peut s'appliquer également au dé- » veloppement des maladies. Dans les méditations » auxquelles nous nous sommes livrés sur leur » imminence, nous avons vu sur nous-mêmes & » sur d'autres individus, que l'on peut prévenir » ou empêcher la naissance d'un grand nombre » d'affections, par une volonté ferme & constante » de n'être pas malade. C'est par l'action de cette » volonté, jointe à la sécurité, que les médecins » évitent les funelles influences de la contagion, » en s'exposant cependant continuellement aux » misères détestables par lesquels les maladies se » propagent. »

« On peut jusqu'à un certain point trouver le » germe ou du moins la preuve de cette opinion, » dans les ouvrages de Barthez, principalement » dans ses *Nouveaux éléments de la Science de » l'homme*. »

« L'âme, a-t-il dit (*tom. II, p. 33*), qui pos- » sède son intelligence naturelle, peut quelque- » fois, quoique très-rarement, être affectée de » fortes passions dans les derniers temps de la » vie; & l'on a des exemples singuliers de l'in- » fluence que ces passions peuvent avoir pour re- » tarder la mort. »

« Il a cité à ce sujet une observation du Pechlin » (*lib. 3, obs. 3*), d'après laquelle il est très-pro- » bable qu'un grand désir de voir, avant de mou- » rir, une personne qui nous est très-chère, peut » prolonger l'agonie & retarder la mort de quel- » ques jours. »

« Il a cité aussi, avec une forte de complaisance, » le fait de Robinson, rapporté par Gaubius, (*De » regim. mentis, obs. 2*, p. 66). Robinson a vu » un homme moribond & manquant déjà de pouls, » chez qui un accès de colère releva les forces » pendant une heure, & qui mourut très-promp-

MÉDECINE. Tome X.

tement, après que cette agitation de son âme » eut été calmée. » (Voyez *Histoire de la ma- » ladie & de la mort*, de Paul-Joseph De Bartsch, » publiée dans le *Journal général de Médecine*, » tom. XXVII.)

J'ai eu l'occasion d'observer, chez des agonisants, que le pouls, la respiration & les forces, se relâ- » vent momentanément par l'effet de passions vives, » ou par la présence attendue ou inattendue de per- » sonnes extrêmement chéries; je fais que Sé- » nèque écrivoit à Lucius : « Tout ce qui élève » l'âme fortifie le corps..... » c'est à la philosophie » que j'attribue mon rétablissement & ma conva- » lescence, je lui dois ma vie. » Je fais encore, » pour l'avoir observé sur une foule de personnes, » ce que peuvent, d'un côté, le courage & la tran- » quillité d'âme, pour préserver de certaines ma- » ladies; & ce que peuvent de l'autre, le chagrin, & » une imagination frappée, pour les faire développer, » & même pour leur donner une terminaison fu- » nelle : mais je crois néanmoins, tout en accor- » dant beaucoup de valeur à l'opinion de MM. Dou- » ble & Seruin, qu'il l'ont présentée avec exagé- » ration.

S. 2. De l'agonie considérée dans ses phénomènes physiques.

Si l'on considère l'agonie dans ses phénomènes » physiques, on reconnoît encore, comme dans les » sensations qui l'accompagnent, l'influence de » l'âge. Ainsi, chez les enfans atteints de ma- » ladies aiguës, elle est en général bien plutôt » suivie de la mort que chez les adultes & que » chez les vieillards. Lorsque ces derniers sont ar- » rivés à la caducité, quand la constitution se trouve » profondément détériorée, épuisée depuis long- » temps, l'agonie se termine aussi très-rapidement » par la mort, & n'offre point ordinairement cet as- » pect convulsif & si terrible qu'on remarque sou- » vent dans d'autres circonstances. Quand la mort » est produite par une cause qui porte sur l'encé- » phale ou sur la puissance nerveuse, fâche que celle- » ci soit tout-à-coup anéantie, l'agonie est ordinaie- » rement longue, & s'accompagne plus particulie- » rement du délire, quand la maladie est une arach- » noïdite, une céphalite; ou bien de torpeur, de co- » ma, d'assoupissement plus ou moins profond, de » convulsions, d'immobilité des yeux & de leurs » pupilles, souvent de la dilatation considérable de » l'une d'elles, d'une respiration stertoreuse, d'une » dysphagie paralytique, de l'abolition des fonctions » intellectuelles & des sens, en un mot des fonctions » de relation, sentent dans les cas de commotion cé- » rébrale, ou dans ceux de compression causée par » une distension des vaisseaux, par des épanchemens » sanguins, purulens, par l'enfoulement de pièces » ossieuses, &c. J'ai vu, dans l'apoplexie, cet état » durer plus de 34 heures. M. H. F. Ragonneau a » observé des malades empoisonnés par l'opium,

Aaa

dont l'agonie a été de 36 à 48 heures (*Considérations sur l'agonie; Coll.-ct. des thèses, in-4^o. de Paris*). « Quoique, dans tous ces cas, dit M. Ragonneau, l'agonie offre une scène déchirante qui semble annoncer des souffrances inouïes de la part des malades, il paroît probable qu'ils souffrent souvent beaucoup moins qu'on ne pourroit le supposer, & cause de la compression du cerveau qui détermine une sorte de paralysie, & par conséquent éteint beaucoup la sensibilité, déjà rendue obtuse par l'état de maladie. »

Dans les affections des poulmon, excepté lorsque, dans l'asphyxie, la mort arrive aussi par la diminution progressive de l'influence cérébrale ou nerveuse, l'agonie est presque toujours très-courte & peu douloureuse. Dans les maladies du cœur, elle est ordinairement aussi de très-pen de durée, sans perte des sens, mais caractérisée par les douleurs & les angoisses les plus affreuses; toutefois, les syncopes font une exception remarquable. Dans les maladies aiguës des viscères de l'abdomen, l'agonie est ordinairement sans perte des facultés de l'esprit, si ce n'est à l'instinct de mourir, & elle est longue & douloureuse; c'est particulièrement alors que la face offre tous les traits tirés en bas, ou cette expression de douleur, désignée sous le nom de *figure grippée*.

Tels sont les résultats généraux de mon observation & de celle d'un grand nombre de médecins. Je fais que des recherches nouvelles sur l'agonie, qui sont dues à notre savant confrère M. Bricheveau, ne les a pas encore publiées, confirment ces résultats. Ainsi donc; non-seulement dans les divers âges, mais même dans chaque groupe de maladies, l'agonie présente des phénomènes particuliers & pour ainsi dire caractéristiques. Je ne puis ici considérer ses différences dans toutes les espèces d'affections mortelles; ce seroit, d'ailleurs, faire une répétition de ce qui se lit ou se lira à l'article de chacune de ces maladies; mais je crois devoir néanmoins entrer dans quelques détails, sur les phénomènes qui précèdent immédiatement l'abolition de la vie.

Je rappellerai d'abord que ces phénomènes, qui varient suivant celui ou ceux des trois organes principaux sur lesquels la cause de mort porte, ou sur lesquels la mort convenue s'échélone, dépendent aussi de tous les autres organes.

La position la plus ordinaire des agonisants, & qui présume la plus sûrement la mort comme devant s'établir aussitôt, ou presque aussitôt, est celle dans laquelle le corps est pesamment couché sur le dos, les bras & les jambes écartés ou pendans hors du lit, surtout si le corps se porte toujours ou lui-même vers les pieds, & si la mâchoire inférieure s'écarte de la supérieure & tombe, pour ainsi parler, sur le haut de la poitrine. Le mourant qui succombe aux maladies de cette espèce, est obligé de rester sur son séant, & d'avoir la tête fortement renversée en arrière.

S'il y a des poissions, des attitudes qui annoncent une mort très-prochaine, il y a aussi des mouvements qui ne sont pas d'un augure moins fâcheux : tels sont les mouvements convulsifs des globes oculaires, ceux des narines, dans lesquels un œil paroît plus petit que l'autre; les agitations de la peau du menton qui se relève vers la bouche; les tremblemens, les mouvemens irréguliers des membres qui repoussent sans cesse les couvertures, lors même que le malade a froid; la carphologie, le crocodilisme, &c. en général, les mouvemens automatiques. Enfin, la prostration la plus extrême, l'absence des mouvemens, joints aux autres signes funestes, annoncent que la mort va le troubler.

Parmi ces signes, il faut surtout énumérer les caractères de la face cadavérique, appelée communément & improprement *face Hippocratique*; nez aigu, yeux enfoncés, tempes creusées, oreilles froides & irritées, peau du front dure, tendue, sèche, couleur du visage d'un pâle verdâtre, ou noirâtre, ou livide, ou plombée. (*Précis. sect. 1, n^o. 7.*)

Tel est le tableau hideux & frappant de vérité, de la figure d'un homme qui succombe à une maladie de quelque durée. A cette description on peut joindre d'autres traits, qu'Hippocrate a également indiqués pour la plupart, & qui, réunis avec les premiers, sont les avant-coureurs trop certains de la mort. C'est ainsi que l'on doit considérer les paupières à demi fermées, sans mouvement; les yeux dont on ne voit que le blanc, qui sont ternes, noyés de larmes, & qui se couvrent d'une couche glauqueuse; la pupille dilatée, qui ne se resserre plus par une vive lumière; le resserrement d'un côté à l'autre des narines; les lèvres tremblantes, froissées, pendantes, comme flétries, ou fortement collées sur les arcades alvéolaires & dentaires; une sorte de poussière qui couvre le visage, & particulièrement les paupières & les poils des cils & des narines; la peau comme terreuse, sèche ou couverte d'une sueur froide & visqueuse; les traits grippés; les lèvres en convulsion, & surtout quand leurs commissures y participent, en saillant & en se portant alternativement en haut & en bas.

Ajoutons encore la lividité des nonnettes ou leur pâleur extrême avec refroidissement, dans les maladies aiguës inflammatoires, particulièrement dans celles des poulmon; la couleur noirâtre ou plombée que prend tout-à-coup l'ensemble de la figure, dans les mêmes maladies, dans les asphyxies & dans les hydropiques; la fécherelle & comme le racornissement de la langue, qui est tellement diminuée de volume, qu'elle n'occupe plus qu'une petite pice dans la bouche entrouverte; la couleur livide de la même organe, des dents, des gencives & des lèvres dans les maladies consomptives; le grincement des dents & les autres convulsions dans le délire; la rétracti-

tion des oreilles, dont la conque se trouve portée en avant; la sensibilité surprenante de l'organe de l'ouïe; la soif; le refroidissement extrême des membres sans qu'on puisse les réchauffer; celui de tout le corps, dans les hydropisies & les phthisies; le refroidissement écume glacial, & la couleur plombée, livide des pieds, des mains, des doigts & des ongles.

A tous ces phénomènes de l'agonie, à tous ces indices certains d'une mort imminente, lorsqu'on les observe réunis en certain nombre, il faut encore ajouter, pour compléter l'énumération des grands traits du tableau, le râle ou la respiration stertoreuse, surtout dans les apoplexies fortes, dans les inflammations de poitrine & dans les maladies dites fièvres nerveuses; la respiration intermittente, principalement quand elle devient très-rare & qu'elle se fait ou paroît se faire par les seuls muscles de l'abdomen; celle qui devient à chaque instant plus petite & plus obscure, & dans laquelle les mouvements d'inspiration sont lents & prolongés, tandis que ceux d'expiration sont brusques, très-courts, ou entrecoupés & comme recommandés avant que de finir (M. Donde); la respiration qui devient subitement petite & rapide, surtout lors de l'inflammation des viscères, & particulièrement des poumons; la respiration qui se fait avec un bruit remarquable dans la gorge; celle dite suffocante, exercée si péniblement par tous les muscles qui s'insèrent aux côtes, laquelle s'accompagne des mouvements comme convulsifs des lèvres & de la houppe du menton dont il a déjà été parlé, & de mouvements très-étendus d'élévation & d'abaissement du larynx; le hoquet, qui se joint à ces derniers états de la respiration, à la face dite cadavéreuse; l'aphonie; le pouls intermittent dont les intermittences sont très-prolongées; celui qui se réfugie dans les gros troncs artériels ou vers le cœur; la paralysie de la déglutition, celle dans laquelle les liquides surtout tombent dans l'œsophage comme dans un tube inerte; le priapisme ou l'érection du pénis dans certaines maladies aiguës; les déjections involontaires; & enfin, des sueurs froides, visqueuses, qui coulent comme par effusion à mesure que le malade se refroidit, que la face devient cadavéreuse, la respiration embarrassée, & que l'on s'obscurcit par la toile glauque. Ces sueurs couvrent principalement les parties supérieures des agonisants, leur front & leur poitrine.

C'est ici le lieu de dire que l'on a quelquefois, quoique rarement, observé un état qui simuloit l'agonie, ou plutôt une véritable agonie caractérisée par la plupart des symptômes qui annoncent une mort imminente, sans que cette dernière soit arrivée. Ainsi, M. le docteur Polnaire, médecin à Lyon, a publié l'observation d'une pleuropneumonie bilieuse, compliquée d'une fièvre intermittente pernicieuse, dont les accès offroient les signes les plus sinistres: strabisme; yeux ter-

nes, renversés, inégalement ouverts, ne laissant plus apercevoir que le blanc; grincement de dents, convulsions des muscles de la face, rires sardoniques; figure comme cadavéreuse; soubresauts des tendons si fréquents, que l'on distingue à peine le pouls, qui disparoit sous les doigts; sueurs froides, partielles; râle; glissement du malade vers les pieds de son lit; extrémités froides. Le malade a en plusieurs accès semblables, & a néanmoins guéri.

Considérée par rapport à ses phénomènes, l'agonie a été divisée par quelques auteurs en deux sortes: 1^{re} celle qui termine paisiblement la vie, dans laquelle la mort est donnée & sensible le résultat de la prostration & de l'affoiblissement de toutes les forces; 2^e celle qui est caractérisée par le délire, par des convulsions, des symptômes d'un grand trouble, des phénomènes qui annoncent de grandes souffrances. J'ai assez fait entendre les cas où se remarque l'un ou l'autre genre de mort: le premier a été nommé *euthanasie*, & le second *dysathanasie*.

C'est principalement dans les maladies aiguës que l'agonie peut se rapporter à la *dysathanasie*. Mais quelques violens que soient les phénomènes, presque toujours, comme on l'observe plus particulièrement lorsqu'une inflammation intestinale très-étendue, ou qui affecte des organes importants, se termine par la désorganisation ou la gangrène, le passage à cette terminaison est marqué par la cessation des douleurs, par un calme trompeur succédant tout-à-coup aux symptômes orageux. Alors l'état du pouls, de la respiration, &c., annoncent au praticien expérimenté une mort certaine.

L'état de calme dont je viens de parler, qui précède immédiatement la mort, est probablement dû à la cessation de la douleur & à une espèce de détente générale. C'est alors que, dans les maladies aiguës, les convulsions cessent; que les malades, interrogés sur leur état, répondent, lorsqu'ils le peuvent, qu'ils se trouvent bien; que la justesse de raisonnement & une force de liberté d'esprit, remplacent quelquefois subitement le délire & la stupeur; que, dans les maladies des poumons & des voies aériennes, la respiration devient quelquefois, dit-on, tout-à-coup comme naturelle, de pénible & angustieuse qu'elle étoit; que le pouls, qui offroit les plus mauvais caractères, devient égal, simple, & peut même s'élever; que la chaleur remplace le froid dans quelques cas; que l'expiration grappe de la face disparoit, & que les traits n'expriment plus la souffrance. Je tiens de M. Petit, l'un des médecins de l'Hôtel-Dieu de Paris, que, outre ces phénomènes qu'il a très-souvent observés comme les signes des agonisants qui succomboient aux maladies dites communément *fièvres adynamique*, *atérique* ou *ataxo-adynamique*, prendre, à l'instant de mourir, un eclaircissement, une expression très-

remarquable de tranquillité & même du bonheur : on avoit dit le calme du sommeil, & tout faisoit croire que loin d'être sur le point de mourir, les malades étoient au contraire en bonno santé.

La conclusion à tirer des observations sur la mort (il n'est point ici question de certains morts violentes), c'est qu'à l'instant où elle va se consumer, bien que la vie ne soit pas encore équivoque, il paroît qu'il y a toujours on presque toujours absence de douleur. (Voyez l'article MORT, *ibid.* 2. §. III.)

J'aurois pu m'étendre bien davantage sur l'agonie considérée dans ses phénomènes; mais j'ai dû m'imposer des bornes, & ne point répéter inutilement ce qui est dit dans l'article MORT, & dans celui qui traite de chaque maladie ou symptôme mortel.

CHAP. II. Devoirs des médecins envers les mourans.

Le plus grand devoir imposé aux médecins envers les mourans, est de leur cacher le coup terrible qui va les frapper. N'a-t-on pas vu d'ailleurs des malades, dans un état désespéré, être rappelés à la vie? Le chevalier Bacon regardoit, dit-on, l'art de rendre la mort douce, comme le complément de celui qui en retarde l'époque, & la recommandoit aux médecins. C'est à cela, & à prolonger autant qu'il est possible la vie des agonisans, que se réduit notre devoir envers eux-ci.

Nous devons annoncer aux parens d'un malade près de mourir, qu'ils vont le perdre. Mais quant à lui en faire part à lui-même, rien ne nous y oblige : nous serions ses bourreaux si nous le faisions. Nous devons au contraire tout faire pour éloigner de lui l'idée de la mort : lui manifester des craintes, seroit précipiter le moment fatal, on le déterminerait, si la nature pouvoit encore le retarder ou l'empêcher. Il arrive souvent que celui qui n'a qu'une maladie légère, se frappe de l'idée qu'il doit en mourir, que nous l'y condamnons, & il meurt par cela même, lorsque par un zèle indiscrét on lui recommande de se confesser à Dieu & de mettre ordre à ses affaires. Laissons aux autres ce triste soin tout entier : nous sommes des ministres de la nature pour sauver le corps, & non des ministres de la religion pour sauver l'âme. Si ces derniers se présentent chez des gens à qui la religion ne peut apporter ses consolations qui rendent le calme à une conscience troublée, il est même de notre devoir de les faire repousser : l'appareil impofant qui les accompagne, ou mieux les craintes qu'ils peuvent leur faire naître, ayant été plus d'une fois les uniques causes de la mort. Comme médecins, notre première religion est de guérir nos malades; si nous ne le pouvons pas, nous devons chercher à prolonger leur existence autant qu'il est en notre pouvoir de le faire.

Il est des circonstances où la position du médecin est bien délicate, bien pénible. Il s'agit du sort d'une épouse, de celui d'enfans que leur père n'a point encore reconnus. On vous confie ce secret important, ou vous consultez. D'autres fois, c'est le malade lui-même qui demande votre avis pour mettre ordre à ses affaires : il vous le demande au nom de ses enfans qui entourent son lit de douleur; il vous assure que l'idée de les laisser sans fortune est mille fois plus déchirante pour lui que l'idée de la mort; il a rassemblé ses forces, il vous parle avec toute l'éloquence du cœur. Vous, médecin, si vous répondez que ce qu'il veut faire est prudent, vous avez prononcé son arrêt, sa figure change, son mal empire, & lorsqu'il auroit pu guérir, il périt; & c'est vous qui lui avez porté le coup mortel. Quelque habile que vous soyez & vous introduire dans le cœur humain, à reconnaître tous les genres de sentimens & de pensées qui l'agitent, vous avez été trompé : combien ne vous en coûte-t-il pas pour avoir dit la vérité!

O vous qui entrez dans la carrière de la médecine, vous qui ne voyez que le noble but d'arracher des hommes à la mort, que de soulager vos semblables, vous ne savez pas quelle responsabilité vous vous préparez.

Supposez encore le cas d'une agonie affreuse, par la violence & par la longueur des tourmens; que ferez-vous pour arracher un malheureux à des angoisses horribles, alors même que vous êtes certain qu'il va succomber?.... Je ne me sens pas la force de donner un autre conseil que celui de calmer, s'il est possible, ses douleurs, mais sans s'exposer à abrégier sa vie d'une minute. Seulement je réclame pour moi, du médecin qui sera appelé à mes derniers moments, si je dois avoir une agonie aussi redoutable, de ne point balancer à abrégier mes souffrances. Au reste, ces agonies si douloureuses, sont, ainsi qu'il a été dit à l'article MORT (*Hist. nat. & physiolog. de la*), bien plus rares qu'on ne le pense.

Quand il y a quelque lueur d'espoir, ou quand la certitude de la mort n'est pas, si je puis m'exprimer ainsi, aussi absolue qu'il est possible, alors tout est différent, & tous nos efforts doivent tendre à conserver le malade à la vie, à quelque prix que ce puisse être pour lui.

(L. R. VILLERMÉ.)

MOURON, f. m. (*Matière médicale.*) *Anagallis*, Linn. Genre de plantes dicotylédones de la famille naturelle des primulacées. On compte environ d'une espèce de cette plante. On a attribué au mouron des propriétés médicamenteuses, que l'expérience n'a pas confirmées, surtout dans le traitement du cancer, de la rage & de plusieurs vérolues.

L'eau de mouron est tombée en désuétude depuis long-temps, & quelques expériences de

M. Ossa portent à penser, que l'extrait de la même plante, donné à une dose assez forte pour produire un effet sensible, agit plutôt comme un émétique que comme médicamenteux. (Foyez Mousgeline ou MOURON DES OISSEUX.) (L. J. M.)

MOUSSE DE CORSE (*Mat. médic.*). HELMINTHOCORTON, CORALLINE ou MOUSSE DE CORSE ROUGE. Cette espèce de plante fait partie du genre *fucus* ; on lui attribue avec raison, ainsi qu'aux différentes espèces du genre *ceramium*, de la famille des algues, des effets anthelmintiques très-efficaces. « Avant de regarder cette propriété comme une anomalie, dit M. DE CARDELL, pour des plantes appartenant à ce genre *ceramium*, il faudroit déterminer si toutes les algues marines ne font pas plus ou moins vermifuges, ou si la propriété anthelmintique ne tient pas à la nature des sédiments marins qui pénètrent le tissu de ces plantes. J'ai démontré, ajoute le même auteur, dans un Mémoire sur la mousse de Corse, que ce médicament n'est jamais pur dans les pharmacies; en n'y trouvant presque jamais qu'une très-petite portion, & une portion très-variable de son poids, de vrai *fucus helmintocorton*; le reste est occupé par des corallines, des fertulaires, des *ceramium*, au nombre de près de vingt espèces (1). » Quoi qu'il en soit, la substance appelée *mousse de Corse* est employée en médecine, comme un vermifuge très-efficace, surtout depuis 1775, & depuis la confirmation, en France, des expériences que Stéphanopoli avait faites à l'hôpital militaire d'Ajaccio. L'odeur de ce médicament est marécageuse, & sa saveur salée. On en éblient de la gélatine, d'abord colorée, ensuite blanche & transparente, du muriate de soude, des sulfates, des phosphates & des carbonates de chaux.

La mousse de Corse s'administre en substance, à la dose de 12 à 30 grains, selon les âges. On la fait cutrer aussi dans différents véhicules, sous la forme de sirops, de confitures, de confectiens, de gâteaux, &c., &c., & l'en prépare avec le même médicament une gélée plus ou moins agréable.

(L. J. M.)

MOUSSERON (*Mat. médic.*). *Mousseron blanc*, *Champignon muscat*. (*Agaricus abbellus*.) Le mousseron fait partie du groupe des gymnoptères, qui est le plus nombreux du genre *Agaricus*. On le regarde avec raison comme l'un des champignons comestibles le plus estimé. (L. J. M.)

MOUSSES (*Mat. médic.*). *Musci*. Cette famille contient quelques plantes auxquelles on a attribué, d'après les vœux les moins motivés, des propriétés médicales très-développées : c'est ainsi qu'on a allégué que l'application d'une décoction de poly-

tric en de *funaria*, sur le crâne, empêchoit la calvitie. On a vu telle obscurité d'une manière générale, qu'aucune espèce du meniste n'étoit vénécuse. (L. J. M.)

MOUSTON, f. m. (*Hist. natur. médic.*) Insecte dont la piqure est fort incommode, surtout dans les colonies d'espagnols & portugais de l'Amérique. Les morsures, ou plutôt les piqures de cet insecte, sont imperceptibles; on en est averti par la démangeaison, qui porte à se gratter, & à faire naître ainsi du gonflement & de la rougeur. La douleur insupportable & la tuméfaction quelquefois très-étendue, qui résultent de la piqure des moustiques, ne se conçoivent que par la présence d'un venin ou liqueur acrimonieuse, que ces insectes déposent dans la plaie qu'ils ont faite. L'acide volatil affoibli en l'eau de Luce, que l'on fait arriver au moyen d'un tube de verre capillaire, est le moyen le plus efficace dans le traitement de ces morsures vénécuses. (L. J. M.)

MOUTARDE, f. f. (*Mat. médic. Hygiène*). *Sinapis nigra* & *alba*. Genre de plantes qui appartient à la famille des crucifères. (Foyez ce mot dans le Dictionnaire de Botanique.)

La moutarde, considérée sous le point de vue qui doit nous occuper, se rapporte à l'hygiène & à la matière médicale.

L'emploi de la moutarde comme assaisonnement, remonte à une époque assez éloignée, & quelques auteurs ne l'ont pas seulement regardé comme un stimulant digestif; quelques-uns lui ont attribué des propriétés beaucoup plus étendues, entr'autres la propriété d'augmenter la mémoire.

Les feuilles de la moutarde, comme celles de plusieurs autres crucifères, mais principalement les feuilles de la moutarde d'Egypte & de plusieurs parties de l'Asie occidentale, sont regardées comme un légume & se mangent en salade. Les Japonais tirent de la graine d'une espèce de moutarde, une huile qui est analogue à celle de navette, & qu'ils emploient pour l'éclairage. Les Chinois mangent comme une plante potagère, une autre espèce de moutarde dont la culture a produit plusieurs variétés (*sinapis chinensis*). La moutarde des champs (*sinapis arvensis*) se multiplie quelquefois parmi les céréales, au point de mêler la graine à leurs semences, ce qui donne au pain que l'en prépare avec le grain ainsi mélangé, une saveur un peu âcre & amère. L'assaisonnement employé sous le nom vulgaire de *moutarde*, varie beaucoup dans sa préparation, qui souvent est très-composée, & avec des intentions tout-à-fait étrangères à l'hygiène. La manière la plus simple & la plus convenable d'employer cet assaisonnement, consiste à se servir de graines de moutarde pulvérisées à sec, dont on forme, pour l'usage, une pâte plus ou moins épaisse. Préparée de cette manière, ou mêlée avec une

(1) Propriétés médicales des plantes, comparées avec leur classification naturelle, pag. 348.

certaine quantité de vin, la moutarde ainsi préparée n'est pas seulement un condiment, c'est en outre un de ces toniques fixes & généraux, que l'on a désignés avec raison sous le nom d'*antiscorbutiques*. La verté fibrifuge qu'on lui a attribuée, n'a pas été confirmée par l'expérience.

On a proposé aussi l'usage de la moutarde comme vomitif, en la donnant à la dose d'une cuillerée dans un verre d'eau. La même substance a été conseillée dans le traitement de la paralysie, ou plutôt dans celui de l'impotence atonique & sans lésions cérébrales.

L'usage médical de la moutarde le plus commun, consiste dans une application extérieure, soit dans certains pédilaves stimulans, soit sous la forme d'une pâte plus ou moins composée. (Sinapismes & cataplasmes, auxquels on mêle seulement une certaine quantité de moutarde, cataplasmes sinapisés.) (Voyez SINAPISME.)

La moutarde est employée sous différentes formes: en gargarismes, pour les angines tonsillaires chroniques; comme mucilagineux, surtout, dans la paralysie de la langue; & comme liniment que l'on prépare avec l'huile essentielle, toujours très-stimulante; liniment qui est préférable à l'application externe des cantharides dans le traitement de l'anaphrodisie. (Voyez RUBÉFICATION.)

(L. J. M.)

MOULTON. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. Ingesta.

Ordre I. Aliment.

Section II. Animaux.

Tout animal qui peut en même temps nourrir & servir son maître, doit être pour lui d'un grand prix; tel est le mouton. Sa chair succulente est très-propre à rassurer; elle fournit un aliment facile à digérer, lorsque l'animal n'est pas trop dur ni trop vieux. Néanmoins cette viande étant naturellement ferme, a besoin d'être attendrie & mortifiée pour être agréable & légère.

Les meilleurs moutons sont ceux qui vivent sur les bords de la mer, dans les montagnes où les plantes aromatiques sont communes. On vante beaucoup ceux du Berri, de Provence & d'Auvergne, mais on prétend que ceux de l'Auvergne les surpassent pour la finesse du goût.

La chair du mouton est ferrée & compacte: elle ne convient pas dans le commencement d'une convalescence. Dans nos climats, on prépare la laine de mouton pour les étoffes qui servent à nos habillemens; dans le Nord, on passe la peau de mouton avec son poil, & le peuple en fait ses habits; ce sont les plus chauds que l'on puisse porter, conséquemment les plus convenables à ce climat.

MOULTON. (Médecine vétérinaire.) Le mouton, considéré sous le point de vue de l'anatomie

comparée & de la médecine vétérinaire, donneroit nécessairement lieu à un grand nombre d'articles que l'on doit trouver dans différentes parties de ce Dictionnaire ou de celui d'Anatomie & de Physiologie. (Voyez CLAVES, EPIROTIE, RUMINATION, TOURNIL, &c.)

Nous ferons seulement observer ici, d'une manière générale, que le mouton doit être regardé comme celui de tous les animaux qui se trouve le plus anciennement asservi à l'homme, celui dont la nature a été le plus altérée, & qu'en outre nulle autre espèce ne possède moins d'énergie vitale; remarque qui doit toujours être présente dans le traitement des maladies du mouton, ou dans les opérations chirurgicales que l'on fait subir à cet animal. (Voyez PLAIES DANS LES ANIMAUX, POONATITE, VACCINATION DES MOUTONS, &c.) (L. J. M.)

MOUVEMENT, f. m. *Motus*. Ce mot désigne un acte par lequel les corps changent de rapports. Le mouvement préside à toutes les fonctions de notre corps; on peut en établir deux ordres bien tranchés. Le premier ordre comprend les mouvemens internes qui dépendent de l'action & de la réaction des molécules diverges dont l'économie est composée. C'est à ceux-ci qu'appartiennent les mouvemens de la vie de nutrition: ils ont lieu dans l'universalité des organes, mais sont bornés à l'économie. Leurs agents paroissent tirer du triplanchique leur faculté motile, & cette faculté entre en action aussitôt que les organes sont mis en rapport avec leurs stimulans propres. Le second ordre de mouvement, dont celui de *masse* constitue la majeure partie, appartient à la vie de relation & s'étend en conséquence aux objets qui nous environnent. Soumis à l'empire de la volonté, les mouvemens de cette classe ont pour condition indispensable à leur manifestation, le cerveau, la moelle épinière & les nerfs qui partent de ces organes; pour agents secondaires & actifs, les muscles; enfin pour organes passifs, les tendons, les os, &c.

La première classe de ces mouvemens est liée à toutes les fonctions de la vie intérieure; elle les constitue essentiellement, elle ne peut en être séparée, & se rattache tout-à-fait à leur étude.

La seconde classe, qui va seule nous occuper, ne doit être considérée dans cet article que sous le point de vue hygiénique.

MOUVEMENT. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe V. *Gesta*.

Ordre III. Mouvements & locomotion.

L'appréciation exacte de l'influence & l'usage par le mouvement sur l'état général des forces de l'économie, ayant été faite dès la plus haute antiquité; l'histoire de la gymnastique nous en fournit la preuve.

Division du mouvement, considéré comme constituant une des branches de l'hygiène.

Galen paroît être le premier qui ait divisé les mouvements en *actifs* & en *communiqués*, & qui ait remarqué que l'équitation étoit un exercice mixte. M. le professeur Hallé, dans le plan tracé à la suite de l'article Hygiène de cet ouvrage, établit deux grandes divisions des mouvements, qu'il comprend sous les dénominations de *mouvement général* & de *mouvement partiel*. Il subdivise ensuite le premier en *mouvement spontané*, *imprimé* & *mixte*, & le second en *mouvement des membres*, *des organes de la voix*, *de la parole*, &c. Comme nous ne devons pas, dans cet article, examiner l'influence exercée par chacune des séries si différentes de mouvements, qui composent les exercices usités tant chez les Anciens que chez les Modernes, nous réduirons tous ces mouvements aux trois divisions suivantes, & nous déterminerons ensuite l'influence générale de chacune d'elles.

1^o. *Mouvements actifs* : ce sont ceux dans lesquels le corps se moue de lui-même, en totalité ou en partie, mais dans lesquels il est toujours le seul agent du mouvement ; par exemple, la course, le saut, &c.

2^o. *Mouvements communiqués* : ceux dans lesquels notre corps est mu par un autre corps, ou mieux, ceux dans lesquels notre corps, placé dans un réceptacle quelconque, est mu avec ce réceptacle par une force étrangère ; par exemple, la promenade en voiture, le bercement, &c.

3^o. *Mouvements mixtes* : ceux qui tiennent à la fois des premiers & des seconds, & dans lesquels, quoique notre corps soit mu par un autre, quelque-unes de ses parties n'en entrent pas moins d'elles-mêmes en action ; tel est l'exercice du cheval ; tel est celui que l'on prend dans une nacelle lorsqu'on en dirige le cours en agitant les avirons.

Classe première. Mouvements actifs. — Leurs effets.

Effets locaux. Pour nous faire une idée juste du résultat des mouvements actifs, considérons les phénomènes qui se passent lorsque nous exerçons un membre. Nous le voyons d'abord se gonfler par l'afflux plus fréquent & plus considérable du sang ; la chaleur vitale s'y développe avec plus d'abondance. Si les mouvements se répètent pendant quelque temps, nous le sentons s'engourdir, nous y éprouvons un sentiment pénible connu sous le nom de *lassitude* (premier degré de la douleur musculaire), & une difficulté de contraction qui en est le résultat. Il est bien certain que le mouvement étoit excessif & que les propriétés vitales fussent appelées dans l'organe au-delà de toutes les lois physiologiques, il y auroient eu une véritable inflammation, & ses fonctions seroient entièrement in-

terrompues. Mais si, au contraire, après certains intervalles de repos, nous répétons plusieurs fois les mêmes mouvements, nous voyons le développement dans la partie qui en est le siège, une perfection d'action dont elle n'jouissoit pas auparavant ; il s'y manifeste en outre un surcroît de nutrition & d'énergie dû à l'assimilation plus active des matériaux nutritifs. En qui a lieu pour ce membre, trouve son application dans tous les organes du corps, & quelle que soit la partie exercée, elle devient le siège des phénomènes que nous venons d'exposer.

Effets généraux. Mais en outre, si l'augmentation physiologique des propriétés vitales, due au mouvement, le trouve modifiée à un degré un peu élevé dans un organe, ou se passe dans plusieurs à la fois, alors elle finit par répéter dans tous les autres en vertu du *consensus unus* qui règne dans l'économie. Leurs fonctions sont alors modifiées, ainsi que nous pourrions en juger en étudiant l'influence des mouvements actifs sur chacune d'elles.

Effets des mouvements actifs sur les fonctions de l'économie, pendant ou hors le temps de leur exécution, & sur les organes auxquels elles sont causées.

1^o. *Sur les fonctions de la vie nutritive ou organique, en général.*

Les fonctions de la vie nutritive n'ont besoin d'autre espèce d'éducation pour se perfectionner ; mais leur sphère d'activité peut être étendue par certains actes de la vie de relation (les mouvements), comme elle peut être limitée par d'autres (l'exercice outre des facultés intellectuelles).

Les stimulans propres des organes, suffisent pour faire entrer en action la faculté qui est inhérente à leur mode d'organisation. Ainsi les alimens placés dans l'estomac déterminent l'exercice de la faculté digestive, de même que, dans la vie de relation, les sensations arrivées au cerveau, déterminent l'exercice des facultés intellectuelles ou locomotives ; cependant la nature semble nous avoir donné des moyens d'agir d'une manière appréciable, quoiqu'indirecte, sur quelques fonctions nutritives, & de tous ceux qui sont en notre pouvoir, les mouvements actifs musculaires sont loin d'être les moins efficaces. Examinons-en donc les effets.

Sur la digestion. Les mouvements actifs des membres, en se faisant hors le temps de la digestion, excitent la faculté de l'estomac & déterminent le besoin ; c'est avec beaucoup de raison que de tout temps on a regardé l'exercice pris avant le repas comme l'assouplissement le plus propre à exciter l'appétit.

Les mouvements actifs (s'ils sont violents), exécutés pendant que les alimens sont dans l'estomac, pervertissent l'exercice de la fonction. Si la diges-

tion s'exécute mieux chez les personnes ordinairement livrées aux travaux d'esprit, lorsqu'elles sont, après leur repas, une promenade, ou prennent quelque exercice modéré, c'est parce que les fonctions paitriques sont loin d'être aussi dérangées par ces mouvements qu'elles le seroient par l'exercice des facultés intellectuelles.

Sur l'absorption. Lorsque le mouvement précède le temps pendant lequel cette fonction s'exécute, il joint d'une influence marquée sur la rapidité avec laquelle seront élevés les matériaux nutritifs aux surfaces muqueuses intestinales. C'est lui qui, réveillant l'action des vaisseaux absorbans, empêche que le séjour trop prolongé des aliments sur la membrane muqueuse de l'intestin, n'en exalte la sensibilité, comme cela a lieu chez les personnes dont les digestions sont souvent interrompues par des affections morales ou des travaux intellectuels.

L'absorption interstitielle est également rendue plus énergique par le mouvement.

Sur la circulation. La circulation artérielle & veineuse devient plus active par le mouvement. Si, d'un côté, les battemens du cœur lancent dans un temps donné une plus grande quantité de sang artériel aux muscles qui en ont besoin pour leurs contractions, ceux-ci, à leur tour, en se contractant, expriment plus parfaitement le sang veineux de leurs tissus & lui communiquent une progression plus vive.

Le tissu du cœur est donc d'une plus grande force chez les individus habituellement livrés aux mouvemens musculaires violens, & ceux-ci, prolongés jusqu'à la fatigue, rendent le sang plus concret & plus facilement coagulable, comme je m'en suis convaincu par plusieurs expériences.

Sur la respiration. Les phénomènes mécaniques & chimiques qui constituent cette fonction, se succèdent avec plus de rapidité pendant les mouvemens violens. Plusieurs de ceux-ci modifient la respiration d'une manière bien puissante : tels sont ceux, par exemple, qui se passent dans la course; d'autres, par leur mode d'agir, y déterminent des changemens d'un ordre qui leur est propre : tels sont certains modes du nager.

Sur la calorification. Quels que soient les appareils où se passe la calorification, que nous rangions ici parmi les fonctions; sous quelque point de vue qu'on la considère, nous la voyons prodigieusement augmentée par la force, la durée, & surtout pas la fréquence des mouvemens actifs.

Sur les sécrétions. Un bien petit nombre des sécrétions intérieures est influencé par les mouvemens actifs. La sécrétion des membranes synoviales est la seule qu'ils augmentent bien manifestement; la surface lésée de ces membranes, en contact seulement avec elle-même, à l'abri de tous les agens extérieurs, ne paroît en effet avoir d'autre stimulant propre pour entrer en action, que les mouvemens divers qui se passent dans son voi-

sage. Presque toutes les autres sécrétions intérieures sont diminuées. Il n'en est pas de même de celles qui se passent à la périphérie du corps, de l'exhalation cutanée, par exemple; celle-ci reçoit, des mouvemens actifs, une influence bien évidemment excitante.

Sur la nutrition. Des mouvemens actifs modifiés affectent la nutrition dans tous les organes de l'économie; car il n'en est aucun qui ne partage plus ou moins les agitations moléculaires que déterminent les mouvemens dans toute la machine humaine. C'est particulièrement néanmoins dans les agens de la locomotion que la nutrition est le plus marquée.

2°. Sur les fonctions de la vie de relation ou animale, en général.

Les fonctions de la vie de relation réclament pour leur perfectionnement, l'exercice méthodiquement dirigé sur les divers organes qui les exécutent. L'application des mouvemens variés, à quelques-uns des appareils de cette vie, comprend la majeure partie de l'éducation physique, & nous renverrons, pour tout ce qui a rapport à l'influence qu'exerce en particulier sur l'économie, chaque série de mouvemens dont se compose ordinairement un exercice, aux articles qui sont spécialement consacrés à leur description. Nous nous bornerons à examiner ici d'une manière générale les effets du mouvement musculaire actif sur les fonctions encéphaliques.

Sur les fonctions encéphaliques. Les mouvemens actifs font perdre à la plupart de ces fonctions (j'en excepte celle qui préside à la locomotion) une partie de leur énergie & de leur activité. Ce que nous disons des fonctions de l'encéphale s'applique non-seulement aux facultés intellectuelles, mais encore aux qualités affectives, toujours beaucoup moins développées chez les gens livrés aux grands mouvemens musculaires, que chez ceux qui vivent dans le repos.

Classe II. Mouvemens communiqués. — Leurs effets.

Parallèle entre les effets de cette classe & ceux de la première. Nous avons divisé les mouvemens actifs en locaux & en généraux; cette division ne sauroit plus être admise dans les mouvemens communiqués, dont l'effet n'irradie jamais comme dans les premiers de certains organes en action vers d'autres avec lesquels ils ont des communications, mais, au contraire, se fait sentir à la fois à la totalité de l'économie dont aucune partie ne peut se soustraire à la répercussion du mouvement. Nous avons vu que le premier effet des mouvemens actifs se portoit d'abord sur les organes de la vie animale, qui en étoient aussi les principaux agens; qu'ensuite ces mouvemens augmentoient l'action & l'énergie de

de ceux de la vie intérieure, parce que les organes de la vie de relation enlèvent avec plus de promptitude aux viscères, les matériaux nutritifs, & redoublent leur travail en exigeant d'eux plus souvent & plus abondamment de quoi fournir à leur développement. Mais dans les mouvements communi-
qués, c'est un autre ordre de circonstances, ce sont d'autres résultats; l'accroissement de toutes les parties est dans une proportion plus exacte; les muscles, exemptés de contractions, ne détournent pas à leur profit les sucs destinés au développement des viscères; leur nutrition n'est plus favorisée que par l'ébranlement qu'ils partagent avec le reste du corps, & dont ils ne reçoivent que la moindre portion à cause de la décomposition de mouvement, principalement opérée dans les quatre grandes articulations qui naissent les membres au tronc : alors les viscères semblent prédominer sur les muscles, le tissu lamineux se développe, la graisse s'accumule en grande quantité dans l'économie.

Nous avons avancé, en parlant des mouvements actifs, qu'un membre ne peut être le siège de contractions réitérées, sans que les phénomènes que ces contractions y déterminent ne fussent bientôt, en vertu du *consensus* qui établit des relations entre toutes nos parties, réfléchis dans les principaux viscères de l'économie. Or, ces phénomènes auxquels donne lieu le mouvement répété des muscles forment à l'empire de la volonté, tendent tous à accélérer d'une manière prodigieuse les actes de la vie. Leurs effets sont des stimulations durables, dans les systèmes nerveux, circulatoire & musculaire, & c'est des agents qui déterminent les mouvements actifs & volontaires de nos muscles, qu'émane cette cause d'excitation. Les mouvements actifs, en effet, ne peuvent avoir lieu sans que les muscles ne soient influencés par les nerfs de la vie animale & le sang artériel, & ces nerfs étant au cerveau, ce que les artères font au cœur, doivent recevoir de l'organe de la volonté une somme plus grande d'influx nerveux, comme celles-ci reçoivent de celui de la circulation une quantité plus considérable de sang. Le cerveau comme le cœur est donc, dans les mouvements actifs, le siège d'une action plus considérable, qui se manifeste pendant leur durée & après leur cessation, par tous les signes d'excitation qu'ils ont provoqués dans l'économie; ainsi : accélération de la circulation, chaleur plus grande, mobilité extraordinaire, &c. Or, les mouvements communiqués ne nous offrent plus cette cause d'activité émanée des centres nerveux & circulatoire; les fibres de nos organes ne sont plus le siège que de tiraillements indépendants de la volonté, & qui n'ont aucun rapport d'origine avec les contractions auxquelles préside celle-ci; ces tiraillements peuvent même avoir lieu sur des membres paralysés on pendant le sommeil, &c., sans que leur effet en soit moins marqué.

MÉDECINE. Tome X.

Effets des mouvements communiqués sur les fonctions de l'économie, &c.

1°. Sur les fonctions de la vie nutritive ou organique.

Digestion. Cette fonction, que nous avons vue troublée par les mouvements actifs, ne l'est plus par les mouvements imprimés.

Absorption. Les mouvements communiqués donnent lieu, comme les mouvements actifs, à une augmentation manifeste dans l'absorption qui a lieu à la surface des muqueuses intestinales.

Circulation. Nous venons de voir que le cœur, sur lequel les mouvements actifs portent une influence si excitante, n'est pas dérangé par les mouvements communiqués dans le rythme ordinaire de ses contractions : celles-ci ne sont en effet ni plus rapprochées ni plus vives.

Respiration. Les mouvements actifs dérangent la respiration; la plupart provoquent des inspirations & des expirations plus fréquentes. Quelques-unes, soit à cause d'efforts violents qui exigent la fixité des côtes, soit à cause d'actions particulières qu'ils ont pour objet de faire produire aux organes de la voix, soit enfin pour déterminer une pesanteur spécifique moins considérable de la totalité du corps, commandent une longue suspension dans les expirations. Or, ces anomalies ne se rencontrent plus dans les mouvements communiqués : ceux-ci doivent nécessairement réfléchir sur l'appareil respiratoire, les secousses imprimées aux autres organes, favoriser la nutrition du parenchyme des poumons, &c.; mais ils ne portent aucune influence particulière sur ces derniers, & surtout ils n'accroissent point les phénomènes de la fonction qui leur est confiée.

Calorification. La calorification est toujours en rapport direct de développement avec l'énergie des mouvements actifs. Le degré d'activité des causes productrices de la chaleur animale est proportionné à la force & surtout à la fréquence des mouvements volontaires; au contraire, la production & le dégagement de calorique ne sont pas plus considérables pendant les mouvements communiqués que dans l'état ordinaire.

Sécrétions. La plupart des sécrétions intérieures (j'en excepte celle des membranes synoviales), diminuée par les mouvements actifs qui appellent les fluides dans les muscles & dans les vaisseaux exhalans cutanés, est un peu augmentée par les mouvements communiqués qui ne transmettent pas pour cette raison une influence excitante aux organes sécréteurs, mais qui laissent la nature libre sur le choix de la sécrétion par laquelle elle doit se débarrasser de ce qu'il lui est convenable de perdre. Les mouvements communiqués n'étant pas doués de propriétés excitantes, ne suscitent ni diaphorèse, ni sécrétion plus abondante d'urine, de salive, &c.; mais l'économie ayant besoin de se débarrasser de

Bbb

ce qui lui est superflu, choisit, comme elle le fait dans l'état de repos, la voie qui lui convient. Or, comme dans l'aduction c'est le rein qu'elle rend le plus ordinairement supplémentaire des autres organes, c'est aussi lui que pendant les mouvements communiqués elle pousse d'elle-même à une sécrétion plus active. Les personnes qui vont en voiture, surtout en hiver, savent combien est impérieux & fe fait souvent sentir, le besoin de rendre leurs urines.

Nutrition. Nous sommes arrivés à une fonction sur laquelle les mouvements communiqués ont véritablement une action remarquable. Cette fonction qui n'est, pour ainsi dire, que le complément de toutes celles de la vie organique, est singulièrement favorisée par les secousses rythmiques sur tous les points de la machine animale, secousses qui semblent, en pénétrant les molécules les plus intimes de nos tissus, y donner entrée à une forme de vitalité & y faciliter l'intercalation d'une quantité de matériaux nutritifs qui n'y eussent point pénétré sans ce petit dérangement moléculaire & expansif du canevas de nos organes. Sans chercher, d'ailleurs, à expliquer comment & pourquoi cette fonction se fait avec plus d'énergie & devient, pour ainsi dire, plus générale par l'emploi des mouvements communiqués, il nous suffit de citer l'exemple des personnes qui voyagent habituellement en voiture & y acquièrent une complexion riche en sucs nourriciers, & des organes dont les tissus sont parfaitement nourris, de rappeler que si, dans les mouvements actifs, la nutrition est répartie de manière que plus certaines parties sont exercées, plus elles acquièrent de prépondérance relativement à d'autres qui perdent dans la proportion de ce que les premières gagnent en puissance, dans les mouvements communiqués où la distribution a lieu d'une manière égale, c'est aussi dans la plus parfaite égalité que s'opère la nutrition.

20. *Sur les fonctions de la vie de relation ou animale.*

Les mouvements communiqués ne peuvent avoir sur les mouvements de la vie de relation qu'une influence négative. Ils agissent comme le repos; & si beaucoup d'entr'eux jouissent d'une influence marquée sur les fonctions sensoriales, avouons que celle-ci est presque uniquement due aux circonstances dans lesquelles est ordinairement exécutée cette classe de mouvements.

Classe III. *Mouvements mixtes. — Leurs effets.*

D'après la définition donnée des mouvements mixtes, il est aisé de voir qu'ils se composent des deux autres précédentes; leurs effets ne seront donc que ceux des mouvements actifs réunis à ceux des mouvements communiqués. Ces effets, considérés d'une manière générale & dans leurs derniers résultats, seront toujours la produc-

tion d'une certaine somme de forces organiques, associée à plus d'aptitude & de forces locomotrices. Ils ne tendront jamais à rompre l'équilibre qui doit avoir lieu entre le développement des organes de la vie de relation & celui des organes de la vie de nutrition. Quant à leur action immédiate, il suffira, pour l'apprécier, de se rappeler ce que nous avons dit de celle des exercices précédents. Ce n'est guère, en effet, que dans l'étude particulière des exercices mixtes que l'on peut déterminer l'influence qu'ils ont sur les fonctions, puisque celle-ci varie en raison du nombre plus ou moins grand de mouvements actifs qui, par leur association avec les mouvements imprimés, composent le mouvement mixte. Il est facile de concevoir qu'en général leur influence sera d'autant plus excitante, qu'on exécutera des mouvements actifs plus nombreux & plus intenses, & vice versa. (Ch. LODEX.)

MOXA. (Thérapeutique.) Ce mot paroît être emprunté, suivant M. Perrey, du mot portugais *metchia* ou *motachia*, mèche, parce que, dans l'origine, les Européens qui employèrent la cautérisation lente & progressive, à l'exemple des Chinois & des Japonais, se servoient de petites cordes ou mèches disposées comme les cigares. Chacun avoit une provision de ces espèces de cordons, & lorsqu'on vouloit s'en servir, on en coupait une portion qu'on appliquoit soi-même, ou que l'on faisoit enflammer par des médecins brûleurs du pays (*xun-kieu*).

L'application du feu, d'après un procédé analogue, est déguisée, chez les Chinois & chez les Japonais, sous la dénomination de *kieu*. On s'accorde aujourd'hui, pour désigner sous le même nom de *moxa*, une pyramide armée d'un tissu cotonneux que l'on met en usage pour opérer l'aduction. Le même nom de *moxa* est devenu dans la suite presque synonyme de cautérisation, par l'extension de la signification primitive, d'après une figure qui n'est pas moins souvent employée dans la langue des sciences, que dans le langage vulgaire. (Voyez le mot *ANTISTON* dans ce Dictionnaire, & les articles *FEE*, *Moxa*, &c., dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.)

Le *moxa*, ou la cautérisation lente & progressive, doit être rapporté, en thérapeutique, à l'emploi général du feu ou l'aduction, qui forme la partie principale de la médecine primitive & de la médecine asiatique. Cet emploi du feu a été négligé pendant long-temps, & a été repris ensuite avec confiance par plusieurs praticiens modernes, pour remplir un grand nombre d'indications thérapeutiques.

On emploie en particulier la cautérisation lente, ou l'aduction par le *moxa*, sur presque toute la surface du corps, excepté cependant au crâne, aux paupières, au nez, & à la région des oreilles, sur le trajet du larynx, de la trachée-artère, sur le sein,

sur la région antérieure de l'abdomen, & sur les trajets des tendons superficiels & des articulations.

On n'a pas craint, dans des engorgements squirreux & ébranlés du canal de l'urètre, d'appliquer le moxa vers l'origine de ce canal & sur le périnée. On s'accorde à regarder les effets du moxa comme beaucoup plus étendus que ceux de la cautérisation par le fer rouge, dont les Anciens faisoient usage; & comme plus profonds, plus stimulans, plus capables d'opérer un ébranlement général & une dérivation puissante en une forte révolution. Quelques médecins peu éclairés, & entre les mains desquels le moxa est devenu en quelque sorte un moyen de traitement universel, ont proposé vaguement de l'employer dans les ulcérations de la vue, de l'odorat, du goût, de l'ouïe, de la parole.

Les circonstances dans lesquelles le moxa paroît d'ailleurs produire des effets très-efficaces, sont les différentes affections chroniques qui peuvent dépendre d'un état scorbutique ou rhumatismal, & la paralysie, survenue à la suite d'un ébranlement ou d'une commotion de la portion lombaire du prolongement rachidien, ou à la suite d'une maladie quelconque de cette même portion du système nerveux.

L'asthme adynamique ou atonique, les catarrhes très-anciens, plusieurs phlegmasies latentes & chroniques, peuvent exiger également, dans beaucoup de circonstances, l'emploi du moxa.

Pouteau, de Lyon, qui a tant contribué à porter l'attention & la confiance des médecins modernes vers l'emploi du moxa, en a fait plus particulièrement usage, ainsi que Default, dans le traitement du rachitisme. La maladie que Pott a si bien décrite sous le nom de *mal vertébral*, est également combattue avec avantage par le même moyen. (Voyez RACHITISME; VERTÈBRE (Mal).)

Un grand nombre de substances ont été mises en usage, pour l'emploi du moxa, chez les différens peuples. Il paroît qu'Hippocrate se servoit, pour cette préparation, de lin cuit ou d'une espèce de tissu de lin préparé par une lessive, que l'on faisoit brûler au moyen de la flabellation : en a conféré à peu près cet usage dans plusieurs contrées de l'Asie, en préférant toutefois les tissus de coton aux tissus de lin.

La cautérisation, d'après les procédés actuels du moxa, a été apportée en Europe par Ten-Rhine d'après les expériences qu'il avoit vu faire au Japon & à la Chine. Ces procédés furent connus beaucoup plus tard par les Français que par les Portugais & les Espagnols; Pouteau, en France, fut le premier ou l'un des premiers, à reconnaître & à proclamer les avantages de cette nouvelle médication. Il s'en tint du reste à l'usage des moxas par le coton, qui peut souvent être remplacé avec succès par d'autres substances. Il suivit dans cette circonstance, le procédé des Egyptiens, décrit par Prosper Alpin, en diminuant toutefois la hauteur du cylindre incandescent, qu'il porta seulement

à un pouce de hauteur, sur un diamètre plus ou moins étendu.

Depuis ce célèbre praticien, on a toujours cherché à rétrécir cette base, en préférant appliquer, soit simultanément, soit successivement, plusieurs moxas très-étroits, afin de multiplier ainsi les points d'irritation. Du reste, la substance languineuse doit être modérément serrée dans l'espèce d'enveloppe ou de cylindre qui sert à la contenir. Après avoir disposé convenablement cette substance, on allume le moxa avec une bougie : il faut avoir soin que le tissu s'enflamme à la fois dans toute son étendue; on doit maintenir d'ailleurs & invariablement en place, la mèche ou la colonne incandescente pendant tout le temps de la combustion, que l'on accélère jusqu'à la fin, soit par la flabellation, soit avec un petit soufflet, soit à l'aide du rhalumean, quand, à force d'expérience, on est parvenu à manier cet instrument avec beaucoup d'adresse. A mesure que l'ignition fait des progrès, le malade éprouve des douleurs plus vives, & lorsque la combustion approche de la fin, la peau se gerce & se rompt quelquefois avec une espèce de pétilement ou d'éclat. On aperçoit alors une tache noire au centre, jaunâtre à la circonférence, mais sans aucune apparence de cautérisation, si le moxa a été convenablement appliqué.

Plusieurs praticiens, mais principalement M. le professeur Percy, préfèrent en général la cautérisation spontanée ou transcurrente, à l'action du moxa. On peut cependant, & d'après les résultats d'un grand nombre de faits, regarder ce dernier comme mieux indiqué & plus convenable, lorsque la peau n'est pas entamée, & que, loin de vouloir détruire un tissu organique pénétré d'un virus ou d'un liquide délétère, on se propose au contraire de détourner une irritation profonde, par une irritation extérieure beaucoup plus forte.

(L. J. M.)

MOYEN-MOUTIER (Eaux minérales de). C'est un village à huit lieues de Lunéville, où l'on trouve une source minérale froide & acide.

(MACQUART.)

MUCATES, f. m. p. (*Matière médicale*). Les chimistes désignent sous ce nom, les sels qui résultent de la combinaison des terres, des alcalis en des oxydes métalliques, avec l'acide mucique ou saccho-lactique.

Ces différens sels n'ont pas été formés par la nature; aucun d'eux n'est employé en médecine.

(L. J. M.)

MUCHUCUNDA. (*Matière médicale*). On désigne sous ce nom une espèce de pentapetes, qui appartient à la famille des malvacées, & dont le suc mucilagineux & réfrigérant est employé par les Indiens, dans le traitement de certaines gonorrhées. (L. J. M.)

Bbb 2

MUCILAGE. *Mucilago.* (*Hygiène.*)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta.*

Ordre I. Aliens.

Section II. Animaux.

On désigne sous ce nom, la gomme liquide, & mêlée le plus ordinairement avec d'autres substances dans les végétaux. On obtient le mucilage par la presse, la contusion, les décoctions d'un grand nombre de substances végétales (la racine de guaiacum, la graine de lin, &c.).

Le mot *mucilago* peut être pris dans un sens général, & comme synonyme de corps muqueux, mot adopté par les nouveaux nomenclateurs; mais dans une acception plus particulière, on peut le regarder comme le *muquus*, gluant, filant, visqueux, fade au goût, sans cependant en avoir la consistance, de la gelée, dont il est très-voisin; c'est positivement l'état mucilagineux des chairs des jeunes animaux, surtout dans l'intervalle des muscles.

Le degré de combinaison du mucilage, dans toutes les substances où on le trouve, le rend plus ou moins nourrissant; lorsque le mucilage animal est parvenu à l'état de gelée, de quelque manière qu'il y soit arrivé, il nourrit très-bien, & ne fournit presque plus d'excréments; avant de parvenir à ce point, il se digère souvent avec difficulté, & relâche plus ou moins le canal intestinal. Ces effets sont d'autant plus marqués, que le mucilage est plus éloigné du point où il devient parfaitement gélatineux.

La troisième classe des aliments a pour base, ainsi qu'il a été dit au mot ALIMENT, les substances mucilagineuses, gommeuses, gélatineuses, douces, & sans faveur étrangère: une partie de ces aliments est très-nutritive.

Ce que les chimistes ont nommé *muqueur*, paroît donc former les mucilages, les gommages & les gelées. On distingue les mucilages, des gommages & des gelées, parce qu'ils ont différentes espèces de ténacité ou de viscosité. On les distingue encore en mucilages végétaux, & en mucilages animaux.

Les gommages sont bien moins visqueuses que les mucilages. Elles peuvent s'étendre en assez grande quantité dans l'eau, sans la rendre très-collante. Quand leur dissolution est fort rapprochée, elle colle, ou ne file pas, ou file très-peu. Les gommages se dessèchent parfaitement, & sont alors fort transparentes.

Il y a très-peu de substances dans les animaux, auxquelles l'on puisse donner le nom de gommages. On les distingue en celles qui n'augmentent pas beaucoup de volume en s'humectant, ou qui, en le faisant, se gonflent considérablement, & se rapprochent par-là des féculs ou gélées sèches.

Les gélées, quoique plus ou moins collantes, n'ont pas une longue viscosité; elles qui sont

parfaites, s'écoulent moins que les gommages, & quelquefois elles ne s'écoulent point du tout. Quand elles sont étendues dans l'eau, lorsqu'on les fait évaporer à un certain point, en les laissant refroidir, elles se prennent en une masse tremblante & demi-transparente, qui se divise en morceaux. On les distingue en gélées animales & en gélées végétales; ces dernières sont rarement dépourvues d'une combinaison saline, dans l'état de suc ou de liquide; quand elles sont sèches, ou doit les ranger parmi les féculs.

Les mucilages végétaux entraînent plus ou moins de viscosité; les plantes douces en ont beaucoup: ce qui exige qu'on en cuise d'autant plus, pour les rendre moins pesantes & plus digestives, comme les chairs des jeunes animaux. Sans cela ces aliments produiroient des flatulences, qui ne manquent pas d'incommoder. Il est possible que dans les mucilages animaux, la digestion continuée de la chaleur, & peut-être la combinaison, forment des substances gélatineuses, avec des mucilages dont la viscosité est très-grande. Le mélange & la combinaison de certains corps diminuent cette viscosité; tel est le mélange de l'eau, des acides, du sucre, des alliages, des erucifères, des aromates & des parties extractives suaves de presque toutes les plantes. Il est bon d'entrer dans quelques détails sur ces propriétés.

Parmi les plantes, celles qui contiennent le suc le plus visqueux, sont les malvacées, qui renferment beaucoup d'eau, un peu d'extractif & de substance colorante verte. Nous ne les employons pas comme aliments. L'arroche, la betterave, la blette & l'épinard présentent un mucilage plus délayé que les manves; dans l'épinard, la partie colorante ne paroît pas se dissoudre dans les humeurs, & comme il n'y a que les excréments qui en soient teints, on a cru très-mal-à-propos que l'épinard étoit indigeste; au contraire, ces aliments cuits sont adoucissants & très-faciles à digérer: on prétend qu'il y a des endroits où l'ortie est employée de la même manière, comme aliment.

Après les arroches, viennent les pourpier, les fécodes, l'épinard d'Éthiopie, *tetragonia herbacea*, dont M. Amoreux a indiqué l'usage dans le *Journal de Phisique* d'octobre 1789. Le mucilage de ces plantes est encore plus étendu d'eau que celui des précédentes. Elles ont une faveur douce, assez agréable. On les assaisonne avantageusement avec le bouillon, le lait, la crème & le beurre.

Les ciborées viennent ensuite; on fait que par l'étiollement (voyez ce mot) on empêche l'extractif & la partie colorante verte de se former. Leur mucilage est très-délayé, & leur suc très-doux. La vertu calmante de ces substances, si elle existe, est infiniment peu de chose.

Parmi les saines, celles que l'on nomme *visqueuses*, ne sont cependant pas dénuées d'une propriété calmante & narcotique: ce qui prouve que les substances narcotiques, quoique portant

une action vive sur les nerfs, peuvent échapper au sens de l'odorat & du goût.

Les laitues, avec l'âge, acquièrent une acreté qui est due au suc lacteux qu'elles renferment. Les laitues crues en salade, se digèrent aisément : la décoction les rend encore plus douces & plus digestibles.

Après ces plantes, viennent celles qui doivent leur douceur à leur jeunesse ; telle est l'asperge, dont il émane, dans les urines, un principe odorant si désagréable, & qui mériterait bien quelques recherches particulières. Son mucilage est fort doux, & cette plante ne peut être regardée comme échauffante. Dans les pommes de terre, le mucilage visqueux est uni à la fécula.

Après les racines farineuses, viennent celles que l'on nomme improprement charnues, c'est-à-dire, qui, n'étant ni fibreuse ni farineuse, sont tendres, succulentes & susceptibles d'être réduites en pulpe ou en marmelade. Tels sont les scorfonères, les salisils, les topinambours ; leur mucilage est peu visqueux, mais celui des topinambours est propre à faire naître des vents ; on trouve à ces plantes une faveur légèrement sucrée, mais leur vertin échauffante & diaphorétique n'est pas démontrée.

Les réceptacles des fleurs d'artichauts sont fort analogues aux racines dont nous venons de parler. Le chon-palmiste peut tenir ici sa place.

Tous ces alimens nourrissent beaucoup moins que ceux qui ont pour base des féculs, parce que leur mucilage est très-pénétré d'humidité, & non condensé sous un petit volume. L'oseille nous donne l'exemple d'un aliment dont la base est un mucilage combiné avec l'acide oxalique. Nous en avons avec une abondance qui seule seroit une preuve de son utilité, si la raison & une expérience éclairée ne nous apprennent pas combien est utile l'usage de cet acide combiné & corrigé avec les bettes, &c. La base de l'acide oxalique est en effet d'autant plus propre à s'unir à nos alimens, qu'elle leur est commune, ainsi qu'à tous nos organes.

Les végétaux présentent des mucilages visqueux, combinés avec plus ou moins de substance sucrée. La figue & la datte en sont des exemples frappants, & donnent beaucoup de glutinifité à l'eau. Ces fruits sont très-nourrissants, parce que le mucilage y est très-rapproché, & que la partie sucrée est aussi nourrissante par elle-même.

Le miel offre bien parfaitement l'anion d'un mucilage visqueux, uni à beaucoup de sucre. La figue & la datte, quand on en mange beaucoup, passent pour donner des rapports brûlans ; ce qui est probablement dû à ce que le mucilage visqueux, épais jusqu'à un certain point, se dissout & se digère avec peine en fermentant dans l'estomac.

Le mélange du sucre avec le mucilage, est assez

fréquent dans les racines ; mais en général il est uni à une assez grande quantité d'eau qui lui fait perdre sa viscosité. La carotte en est un exemple ; elle a une partie aromatique qui en facilite encore la digestion, & en fait un très-bon aliment. Le panais, qui est de la même famille, contient, outre le mucilage sucré & une partie odorante & sapide qu'il perd aisément par la décoction, une substance qui approche de la nature des féculs. La substance sucrée se trouve en plus grande abondance dans la betterave que dans toutes les autres racines, & Marggraff en a retiré une grande quantité de sucre en nature ; mais comme elle contient plus d'eau que la carotte & le panais, elle est moins nourrissante.

Les navets contiennent également un mucilage sucré, mais uni à beaucoup d'eau, & à un principe acide particulier à toutes les crucifères. Ils produisent dans les intestins un dégagement de gaz hydrogène sulfuré. Les pulpes du radis & de la rave de la même famille, sont pleines d'eau de mucilage sucré, mais leur écorce renferme particulièrement le principe acide dont nous venons de parler. Leur grande quantité d'eau les rend peu nourrissantes, & propres à donner des rapports, quoiqu'en général elles pèsent peu sur l'estomac.

Le raifort est le végétal de la famille qui a le plus de ce principe acre & stimulant, ce qui fait qu'on ne peut s'en servir que comme assaisonnement. Ce principe, qui est échauffant, est un des meilleurs remèdes dans les dispositions glaireuses.

Dans les choux, ce principe volatil se développe modérément, surtout dans ceux qui sont pommes, dans les choux-fleurs & les brocolis, qui donnent des alimens agréables, quoique peu substantiels. Ils procurent aisément des vents d'une odeur hépatique, mais sans troubler en aucune manière la digestion.

Le suc mucilagineux de ces plantes, qui, d'après ce que nous venons de dire, est surchargé d'eau, est susceptible de fermenter ; c'est par ce moyen que l'on prépare le *saure-kraut* des Allemands, dans lequel il se forme un acide très-développé, qui cependant ne détruit pas la partie mucilagineuse & sucrée du végétal, & ne fait que lui donner une propriété de plus, qui la rend stimulante, tonique, & surtout anti-scorbutique. (Voyez Cuvier.) Les autres plantes crucifères sont plutôt des assaisonnements que des alimens. Tels sont les crettons, les cochlearias, la graine du montarde, & même la capucine, qui est d'une famille différente.

Une chose singulière, c'est la promptitude avec laquelle le mélange du sel amortit cette partie volatile, & semble la neutraliser : le vinaigre la change & la modère aussi.

Dans les bulbes des alliées, on remarque que le mucilage visqueux, mucilagineux & sucré, est

uni à une substance volatile très-particulière, qui frappe à la fois les organes du goût & de l'odorat, & picote vivement les yeux, quand on les expose à ses émanations. C'est ce qu'on remarque dans l'ail, l'échalotte, la ciboule, la romarbole, l'oignon & le porreau; mais, comme dans la classe précédente, la décoction enlève une grande partie de ce principe, & il ne reste presque que le mucilage sucré, d'où il résulte que ces plantes ne font pas désagréables dans les assaisonnemens où on les emploie tous les jours.

Les aux sont aussi de très-bons correctifs de la disposition flatulente; ils accélèrent la digestion, & donnent aux vents une fétidité pareille, & encore plus grande que celle des crucifères; ce qui les différencie le plus, c'est leur activité soporifique, & leur propriété de pénétrer dans les voies de la transpiration, ce que ne font pas les autres.

Quoique ces plantes paroissent perdre dans l'eau toute leur odeur, & se réduire à un mucilage sucré, si on les cuit à la chaudière de l'huile ou de la graisse, la décomposition développe un empyreume des plus acres & des plus piquans, comme on le remarque dans l'oignon roussi; quoiqu'alors beaucoup de personnes l'aiment, il en est beaucoup, à l'estomac desquelles il nuit, & donne des rapports très-durables. Ces faits doivent attirer l'attention des chimistes médecins: & les opérations de la cuisine, source de beaucoup de maux, méritent bien qu'ils s'en occupent.

Les plantes dans lesquelles le mucilage se joint à un principe aromatique, servent le plus souvent pour assaisonner les aliments; le persil, le cerfeuil, le thym, l'estragon, la sarriette, l'anis, &c., en sont des exemples. Le céleri crud offre aussi une saveur très-agréable, mais la décoction lui en enlève une partie. Ce végétal n'en est pas moins un très-bon aliment, dont le mucilage sucré est encore légèrement aromatisé. (MACQUART.)

MUCILAGINEUX, adj., *mucilaginosus*. Qui contient, on qui est de la nature du mucilage. (Voyez MUCILAGE.) (A. J. T.)

MUCIQUE (Acide). (*Mat. médic.*) Acide végétal qui est toujours le produit de l'art, & que l'on obtient en traitant des matières mucilagineuses ou gommeuses, par l'acide nitrique. On le retire de la gomme, de la manne grasse, & surtout du sucre de lait: c'est en effet de cette dernière substance que Scheele l'obtint pour la première fois en 1780; ce qui lui fit d'abord donner le nom d'acide *saccharactique* ou *saccharique*, puis celui d'acide *mucique*, qui a enfin prévalu dans la nouvelle nomenclature chimique.

Cet acide, qui n'existe pas tout formé dans les végétaux, se présente sous la forme de paillettes blanches, rudes au toucher, & d'une saveur légè-

rement acide. Il est insoluble dans l'alcool, peu soluble dans l'eau, & jusqu'à présent sans usage. (A. J. T.)

MUCOSITÉ, f. f. (*Pathologie générale*.) On désigne plus particulièrement sous ce nom, un liquide visqueux & plus ou moins consistant, qui lubrifie dans toute leur étendue, les membranes muqueuses ou villoses, & qui peut s'observer accidentellement dans plusieurs autres parties de l'organisation. Sa véritable source doit être rapportée à l'exhalation continuelle des nombreuses villosités de ces membranes, & à la sécrétion de leurs cryptes ou follicules. Lorsque la perspiration est très-active, très-abondante, les mucosités sont beaucoup plus liquides, beaucoup moins consistantes: ce qui peut être produit par certains purgatifs, ou se manifester spontanément dans certains états morbides, dans lesquels on rejette, soit par le vomissement, soit par les sécrétions, une quantité très-considérable de sérosités.

Si la sécrétion folliculaire l'emporte dans une autre disposition, sur la perspiration, les mucosités sont beaucoup plus épaisses, plus visqueuses, & se montrent avec les apparences de matières ou de produits que l'on a désignés vulgairement sous le nom de *glaires*. Cette dilhalation que nous avons tirée de la pratique de la médecine, & qui ne paroit pas avoir attiré l'attention des physiologistes, nous paroit très-importante. Elle conduit surtout & par des conséquences plus ou moins faciles à déduire, à des considérations souvent très-nuiles, sur la nature de plusieurs affections muqueuses, & sur le choix des purgatifs, qu'il importe d'employer dans plusieurs cas, où il n'est pas indifférent d'augmenter l'exhalation muqueuse, plutôt que la sécrétion folliculaire, ou celle-ci, plutôt que l'exhalation muqueuse.

Les mucosités sont très-abondantes, surtout dans les premiers temps de la vie. Quel que soit le lieu où on les observe, elles peuvent être considérées relativement à la féméiotique & à la pathologie; on plutôt sous ces deux rapports réunis, dans un même point de vue, avec le dessein de ne jamais séparer ce qui concerne la cause de leur changement, de leurs diverses apparences, & des symptômes que ces apparences constituent pour le praticien.

Dans l'état naturel ou habituel, les mucosités ne sont pas très-abondantes, & leur produit ne se présente pas sous la forme de matières excrémentielles: on aperçoit évidemment qu'elles ont pour objet de préserver plusieurs surfaces sensibles, du contact des corps étrangers, de lubrifier le plus grand nombre des organes, de favoriser leur mouvement, leurs actions diverses, comme on le voit dans les phénomènes de la respiration & de la voix, dans l'excrétion des matières fécales, & dans plusieurs autres phé-

nomènes de l'économie animale. Dans divers états morbides, & même dans l'état sain, chez les nations civilisées, la sécrétion des mucosités est beaucoup plus abondante; les narines surtout, & la surface des voies aériennes, s'en trouvent continuellement surchargées, ce qui donne lieu aux actions de moucher & de cracher, presque inconnues chez les sauvages. Dans la même situation, les mucosités du canal intestinal ne sont pas moins abondantes, & contribuent pour beaucoup, chez certains individus faibles & lymphatiques, à l'augmentation des matières fécales; dans ce dernier cas, les mucosités suivent pour leur expulsion, un mouvement péristaltique, une direction de haut en bas, depuis l'œsophage jusque à l'anus. Elles suivent un mouvement opposé pour leur expulsion dans les voies aériennes, qui ne s'en débarrassent que par une progression & un effort plus ou moins difficiles qui se font de bas en haut.

Il existe certaines complexions ou certains états morbides, dans lesquels la sécrétion muqueuse a trop-peu d'activité; ce qui donne lieu à l'aridité, à la sécheresse des parties; indisposition qui s'accompagne souvent, lorsqu'elle augmente, de chaleur, de fièvre, de trouble dans toutes les fonctions en général, ou d'une gêne, d'une difficulté dans quelques fonctions en particulier. L'opium, les toniques astringens, les résines, quelques médicaments composés, tels que la thériaque, augmentent sensiblement cette aridité des membranes muqueuses, & peuvent occasionner ainsi les constipations les plus opiniâtres.

L'augmentation de sécrétion des membranes muqueuses dépend plus ordinairement, du moins à son origine, d'une véritable irritation, ou même d'un état inflammatoire; quelquefois aussi, cette même augmentation se présente comme l'effet d'une véritable atonie, d'un épuisement d'action, qui n'a rien de phlegmasique. Dans un plus grand nombre de circonstances, cette même augmentation de sécrétion muqueuse, après s'être manifestée comme l'effet d'une véritable inflammation, persiste lorsque cette dernière est entièrement dissipée, & doit être combattue par certains toniques. Le conduit auditif, la conjonctive, les voies olfactives, l'intérieur de la bouche, de la trachée-artère, du pouson, du tube intestinal, de la vessie, du canal de l'urètre, de l'utérus & du vagin, peuvent être le siège de ces augmentations de mucosités, par atonie ou par irritation, dans un grand nombre de maladies différentes. Leurs diverses qualités, leurs différents aspects, sont d'une grande importance dans la séméiotique, & sont aperçus souvent aux praticiens, des nuances, des modifications d'état morbide, qu'aucun autre phénomène ne pourroit leur offrir.

Les mucosités que l'on rejette par l'expectoration sont plus particulièrement remarquables relativement à la séméiotique. On conçoit très-bien, qu'elles paroissent plus ou moins liquides, suivant

qu'elles aient séjourné moins ou plus long-temps dans les bronches, dans la trachée-artère & dans les vésicules pulmonaires, ou qu'elles dépendent plutôt d'une augmentation dans l'exhalation muqueuse, que d'un excrément des follicules.

L'époque d'un catarrhe, les dispositions particulières chez certains individus, la complication avec le rhumatisme, ou avec d'autres états morbides, occasionnent aussi des différences fort remarquables dans les mucosités. On a voulu rapporter ces principales variétés dans les mucosités pectorales ou crachats, à deux titres principaux, savoir : 1°. les crachats séreux; 2°. les crachats muqueux.

Les crachats séreux paroissent annoncer que l'exhalation muqueuse est sensiblement augmentée : ils assent des mucosités, qui sont comme noyées dans un liquide très-abondant; ils se forment le plus ordinairement dans la première période de la maladie, ou même pendant toute la durée, chez les personnes dont les affections catarrhales, ne suivant jamais une marche franche & régulière, paroissent ne pouvoir arriver à aucune sorte de coction ou de maturité.

Les crachats muqueux ont une consistance plus marquée, & qui augmente à mesure que la maladie paroit vouloir se terminer. Ils deviennent épais, jaunâtres, quelquefois un peu sanguinolens, d'une expulsion facile, lorsque la péripneumonie, ou le catarrhe pulmonaire, doit se terminer d'une manière favorable. Si, après avoir présenté cette consistance, ils deviennent de nouveau clairs & séreux, il faut en conclure au moins que la maladie se dispose à la chronicité.

On ne parvient guère à distinguer les crachats muqueux & purulents, des véritables pus, quoiqu'il y ait des observations judicieuses sur la marche, l'ensemble des symptômes, & sur quelques phénomènes particuliers, tels que la fièvre hectique, les sueurs nocturnes & partielles, la diarrhée, &c.

En général, les simples mucosités sont visqueuses, cohérentes, presque sans odeur, tandis que le pus est plus diffusible, & presque toujours un peu fétide. Le moyen d'exploration & d'analyse que l'on emploie dans ces circonstances, pour arriver à des résultats moins incertains, est celui que Graafwyer a proposé : il consiste à mêler les crachats suspects avec de l'eau distillée, dans laquelle on verse une solution de potasse, en remuant brusquement ce mélange. Si le liquide en expérience contient du pus, il se forme bientôt une espèce de gélée, dure & tenace, si le pus est louable & foible; parsemée d'un grand nombre de filaments opaques, si le pus est de mauvaise qualité.

Le sang qui colore les mucosités pectorales dans un grand nombre de cas, provient d'une véritable exhalation : c'est d'un fâcheux présage, lorsqu'il se montre en abondance au commencement des péripneumonies, ou dans le cours des

maladies chroniques de la poitrine. Les crachats écumeux annoncent assez que l'expectoration n'a été déterminée que par des efforts de toux réitérés; on doit les attribuer au mélange d'une quantité assez considérable d'air, avec les mucosités.

Les diverses couleurs des crachats fournissent aussi des indications souvent très-remarquables sur la nature, l'époque & le caractère de la maladie, qui occasionnent ces variantes. En général, dans les maladies aiguës de la poitrine, les crachats qui, après avoir été stricts ou rouillés, deviennent promptement jaunes & mêlés d'un peu de sang, sont salutaires. Les crachats verdâtres ne peuvent donner quelque sécurité que lorsqu'ils se montrent au commencement de la maladie. Les mucosités noires que certaines personnes rejettent par l'expectoration, ne sont pas toujours de la même nature; celles qui fu dissolvent dans l'eau rhaude, en la colorant comme seroit l'encre, proviennent des glandes bronchiques & ne doivent inspirer aucune inquiétude.

On rejette souvent & pendant très-long-temps une semblable matière, sans éprouver la moindre altération dans la santé. Lorsque ces mêmes mucosités noires ne colorent point l'eau chaude, & qu'elles paroissent avoir de l'analogie avec les matières fuligineuses qui sont rejetées dans le méconium, elles indiquent une altération profonde du poulmon. Les mucosités brunâtres, fanées, semblables à la lie de vin, annonçant une ulcération gangréneuse du poulmon, & une terminaison prochaine & funelle de la maladie.

La saveur douceâtre, salée, acrimonieuse, indique différents modes d'irritation dans la formation des mucosités. L'odeur fétide de ces mêmes mucosités annonce toujours un mode de lésion très-profond dans la structure des poulmons. Les crachats blancs, visqueux, laéiformes, que l'on observe quelquefois chez les hommes, mais plus souvent chez les nouvelles accouchées, n'indiquent pas une lésion aussi grave chez ces dernières. L'abondance trop considérable des mucosités pectorales peut entraîner, comme les autres déperditions de substances, une véritable consomption, & doit être réprimée par les moyens les plus efficaces; par le goudron administré sous forme de vapeurs, par les opiacés, combinés convenablement avec les balsamiques, enfin par l'usage des semences du *phellandrium aquaticum*, dont les effets ont été exagérés par quelques auteurs allemands, dans le traitement de la phthisie: effets qui, pour le dire en passant, ne nous ont paru efficaces que dans le cas d'une surabondance muqueuse, toujours défavorable chez les personnes qui ont beaucoup d'embonpoint, & dont le poulmon a été sensiblement affoibli par plusieurs maladies antérieures. Il n'est pas rare de voir dans les derniers temps de la vie, & chez les personnes qui succombent à des maladies chroniques, sans aucune complication avec une altération pectorale, des crachats

épais, jaunâtres, que l'on rend sans efforts, presque sans tousser, & qui paroissent en tout semblables à la matière de l'expectoration, vers la fin d'une affoction catarrhale qui s'est convenablement terminée.

Les crachats d'un blanc opaque & sale, semblables à des fragmens de matières caéereuses, doivent toujours faire craindre un état tuberculeux, & par conséquent la terminaison la plus funelle de la maladie.

En général, soit en état de santé, soit en état de maladie, la quantité de mucosités est d'autant plus considérable, que la perspiration cutanée est moins active & moins abondante. Il existe toutefois quelques maladies, dans lesquelles l'augmentation & le changement de ces mêmes mucosités se manifestent comme un symptôme principal, ainsi qu'on le voit dans les fièvres muqueuses. Quelques enfans foibles, houlés, & comme empâtés, présentent aussi, mais par une autre cause, une surabondance de mucosités qui s'oppose à la nutrition, & qui devient toujours funelle, lorsqu'on ne parvient pas à corriger une disposition aussi fâcheuse.

Dans plusieurs autres circonstances de la vie, certains individus, chez lesquels la sécrétion muqueuse s'effectue d'une manière fort irrégulière, sont continuellement occupés à chercher du secours, ou un soulagement dans les *anti-pituites* & les *anti-glaireux* de toute espèce, qui augmentent le plus ordinairement leur infirmité, à laquelle il ne faudroit opposer, dans le plus grand nombre des cas, qu'un régime mieux entendu, une vie plus active, & tous les moyens capables de donner plus de réaction & d'énergie aux fonctions de la peau.

La sécrétion inflammatoire qui produit les mucosités dans la trachée-artère, constitue une maladie particulière, le croup, dont le principal caractère consiste dans la formation d'une fausse membrane, au dépens de ces mêmes mucosités épaissies; symptôme qui devient alors la circonstance principale & dangereuse de la maladie. (*Foye Trachéale* (Angine).)

Cette formation d'une fausse membrane n'appartient pas exclusivement à la surface muqueuse de la trachée-artère: on la voit se manifester à la conjonctive, dans le tube intestinal, dans la vessie, dans le canal de l'urètre & dans l'intérieur. (*Foyes* MEMBRANES (Fausse membranes), MUQUEUSES (Membranes muqueuses).)

(L. J. MOREAU DE LA SARTHE.)

MUCUS, f. m. (Muqueux animal, mucilage animal.) *Mucus*. Substance très-analogue au muqueux végétal, soluble en toute proportion dans l'eau, avec laquelle elle est le plus souvent unie dans l'économie animale. Le mucus se forme à la surface des membranes muqueuses, qu'il paroit destiné à lubrifier: on le trouve constamment

ment dans les fosses nasales, la bouche, l'arrière-bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins, &c. Aussi dit-on dans le langage médical : le *muco nasal*, *buccal*, *intestinal*. (Voyez *Mucosités* (Membranes muqueuses) & *Mucoroux*.)

(A. J. T.)

MUE, f. f. (*Physiologie & médecine vétérinaire*), de l'ancien verbe *muer*, & du verbe latin *mutare*, changer, éprouver une espèce de métamorphose.

La chute des feuilles pour les plantes vivaces est une véritable mue, la mue végétale. La métamorphose des insectes, la chute des plumes dans les oiseaux, le changement de peau des reptiles, sont aussi une espèce de mue. Ce phénomène, considéré sous le point de vue de la physiologie, est un des sujets le plus curieux & le plus important de l'anatomie comparée & de la zoonomie. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

Nous ne nous occuperons ici de la mue que dans ses rapports avec l'hygiène & la médecine des animaux domestiques.

La chute des poils d'hiver au printemps, celle des poils d'été à l'automne, & l'évolution des germes qui accompagnent ce phénomène, appartiennent à une fonction qui, dans plusieurs circonstances, n'est pas moins laborieuse que difficile. En général la mue est moins longue, moins sensible pour les chevaux déjà vieux, que pour les chevaux beaucoup plus jeunes ; mais tous, ou presque tous, sont davantage, sont plus faciles à fatiguer pendant la durée ; il importe alors de leur demander beaucoup moins de travail, de les nourrir, de les pauser avec plus de soin, de les soumettre même à un régime particulier, si on desire leur donner un poil plus beau & ajouter à la force ou à la bonté de leur complexion. C'est dans de semblables vues que l'on donne souvent aux chevaux, avec beaucoup d'avantage & pendant quelque temps, une certaine quantité de carottes coupées ou hachées, ce qui devient surtout très-utile quand ces animaux ont été précédemment épuisés par de grandes fatigues, ou que leur complexion a été affaiblie. On a aussi retiré de grands avantages, de l'usage du vin dans les cas de l'adynamie qui accompagne quelquefois la mue de certains chevaux, & qui est si grande qu'elle ne permet pas de retirer aucun service de ces animaux.

L'ensemble des teguments, tout l'organisme de la peau, doit attirer sans doute plus particulièrement l'attention dans les phénomènes de la mue. C'est là en effet où se passe l'espèce de révolution qui se manifeste à cette époque, & qui s'étend le plus souvent à tous les autres organes.

Étiriller trop fortement les animaux dans ce moment, & comme on le fait d'après des routines & des opinions populaires, ne peut avoir que de grands inconvénients, en irritant un organe qui se trouve déjà très-excité, & vers lequel s'opère une

anxiété très-remarquable. Il en est pour les animaux, comme chez l'homme, dans le traitement des fièvres éruptives les plus graves. (La rougeole, la petite-vérole, la scarlatine, &c. &c.)

La situation, le bon état de la peau, la propreté, une irritation modérée, rendent la maladie, ou plutôt la crise de la maladie plus ou moins dangereuse & moins difficile.

La négligence dans le pansement aura d'autres inconvénients qu'il est facile d'apercevoir. Le pansement avec soin, & avec beaucoup de ménagement surtout, & par une espèce de massage, comme cela se pratique en Angleterre pour les chevaux d'un grand prix, diminuera sensiblement le temps de la mue, & en éloignera toutes les complications.

L'usage de faire saigner les chevaux au moment de la mue, d'une manière banale, & sans indication particulière, doit être combattu par tous les cultivateurs instruits & par les médecins vétérinaires.

C'est là encore une de ces erreurs & une de ces pratiques populaires que l'on retrouve en tout temps & en tout pays, & dont il est si important de faire sentir l'absurdité.

La même remarque s'applique aux purgatifs de précaution, au changement brusque de régime, à l'usage de mettre les chevaux au vert & de les affaiblir par un pareil traitement.

La mue en général, & la mue du printemps en particulier, pourroient se trouver associées à différentes maladies constitutionnelles ou accidentelles. (L. J. M.)

MUET (*Physiol. pathol.*), de *mutus*, qui ne parle pas, qui ne peut parler. Muet de naissance, muet par accident ou par maladies développées dans le cours de la vie.

Cet état prolongé, qui constitue une manière d'être constante, une infirmité habituelle, ne dépend pas seulement d'une altération morbide des organes de la voix, il peut aussi être occasionné par l'atonie plus ou moins complète, par l'insensibilité, la paralysie du sens de l'ouïe. Dans ce dernier cas, il a suffi à M. Itard de rétablir & d'exciter ce sens chez quelques sourds & muets de naissance, pour leur rendre la faculté de parler ; ce qui sera facilement compris par tous ceux qui savent très-bien que l'éducation des organes de la voix, d'où résulte la parole, est intimement liée à l'action de l'oreille, & que l'on n'apprend d'ailleurs à parler, que comme on apprend à danser ou à jouer d'un instrument : opérations qui exigent le concours & le perfectionnement d'un grand nombre de muscles très-pen exercés & très-pen développés dans la plupart des hommes. Dans ce sens on s'est véritablement muet que parce qu'on est sourd, & ces deux infirmités ne peuvent être considérées séparément. (Voy. *Sourds et Muets*.)

C'oo

MÉDECINE. TOME X.

Muets (Hygiène.) (Art d'instruire, d'éduquer, de faire parler les). Cet art doit être confidéré ici comme une des principales attributions de l'hygiène pratique, & sans enfermer dans les observations de détail qui le constituent. Ce qui concerne l'éducation, l'existence intellectuelle & morale des sourds & muets en France, est devenu inséparable du souvenir de l'abbé de l'Épée; il le rappellera toujours, par une association aussi juste qu'honorable.

Les Anciens ne nous ont rien transmis de positif à ce sujet: il parait même que chez eux comme chez les premiers chrétiens, on refusa d'accorder une existence civile aux malheureux sourds & muets. Le premier essai qui fut tenté en leur faveur ne remonte pas au-delà du quinzième siècle. Il eut pour objet une chose plus extraordinaire qu'utile, l'art de faire parler les sourds & muets, par des signes & des configurations diverses, qui leur indiquaient les différents mouvements des organes de la parole; espèce de difficulté vaincue, qui excite l'admiration du vulgaire, mais qui ne répond pas entièrement aux intentions du philosophe. L'indication de l'art de faire parler les sourds & muets a été conseillée par le célèbre médecin italien Paul Zacchias, dans ses *Questions medico-légales*.

Le premier ouvrage publié sur le même objet, & qui nous soit connu, ne fut même publié qu'au commencement du dix-septième siècle, par Assinate, qui parait avoir eu d'ailleurs assez peu de célébrité. Le Père Ponce, Juan-Paulo Bonnet, secrétaire du comte de Velafo, & deux autres Espagnols, Ramirez de Cortone & Pietrole Castro, sont beaucoup plus connus. Il parait qu'ils s'attachèrent avec un succès fort remarquable à l'art vraiment prodigieux de faire parler les sourds & muets, sans s'occuper d'ailleurs de développer leur intelligence par le secours des signes naturels; ce qui ne pouvoit guère convenir que pour un petit nombre d'éducatrices particulières. Wallis, qui fut le précurseur de l'abbé de l'Épée, s'occupa du même art, qu'il perfectionna, mais sans y attacher autant d'importance que ceux qui l'avoient précédé; il dédaigna même souvent d'apprendre à parler à plusieurs de ses élèves; mais avec le secours des signes par lesquels les sourds & muets expriment naturellement leurs idées, il parvenoit en peu de temps à leur apprendre à lire, à comprendre ce qu'ils lisoient, & à former ainsi leur intelligence. Conrad Amman, médecin suisse, s'occupa du même objet, mais en réunissant tous les efforts & ses observations sur l'application du mécanisme de la parole à l'éducation des sourds & muets. Son *Traité intitulé Sur les loquens*, imprimé en 1692, & sa *Dissertation sur la parole*, qui parut en 1700, renferment une foule de détails qui appartiennent à la physiologie, & que Haller a souvent rappelés dans son grand ouvrage.

Les recherches de Mercator van Helmont, de

beaucoup antérieur à celles d'Amman, méritent les mêmes éloges. Il les publia sous le titre de *Description abrégée de l'Alphabet vraiment naturel de la langue hébraïque*. Sulzbach, 1672.

• Dans cet ouvrage, l'auteur se le propose pas seulement de fournir aux *sourds & muets* les moyens de recouvrer l'usage de la parole; son projet ne tend à rien moins qu'à fixer pour toujours la prononciation d'une langue, & par conséquent son orthographe; en sorte qu'elle pourroit traverser tous les siècles, parcourir tous les pays, être parlée par tous les peuples, sans jamais éprouver la moindre altération dans cette partie.

• Van Helmont pensoit que pour obtenir quelques succès dans l'art de faire parler les *muets*, il falloit leur figurer la parole, & son ouvrage renferme trente-six gravures, chacune représentant une tête dont les joues découvrent les dents & découvrent tout l'intérieur de la bouche & laissent apercevoir le jeu de la glotte, du larynx, de la langue, des dents & des lèvres dans l'articulation des lettres & des syllabes simples & composées. C'est avec ces tableaux, exécutés en relief, & un miroir, que ses élèves exercoient eux-mêmes à articuler des sons, en plaçant leurs organes dans la position qu'ils avoient sous les yeux.

• Mais pour un essai de ce genre; van Helmont croyoit avoir besoin d'une langue dont la prononciation n'exigeât que des mouvements faciles à exécuter; c'est pourquoi il avoit choisi la langue hébraïque, comme celle qui lui avoit paru la plus naturelle & la plus propre à expliquer les divers mouvements des organes de la parole, & comme ayant été formée dans un temps où les hommes, ignorant absolument toute espèce de langage, & pressés par le besoin de découvrir les pensées des autres & de manifester leurs propres idées, donnoient à leurs voix des inflexions simples, à leurs organes des mouvements faciles, capables de former des sons distincts, mais susceptibles, quoiqu'en petit nombre, d'une infinité de combinaisons.

• L'idée de van Helmont étoit grande & saine, & elle auroit mérité qu'on en eût fait l'application aux langues modernes; mais son exécution auroit exigé la réunion des talents de l'anatomiste, du peintre, du sculpteur, du grammairien; &, ce qui est plus rare encore, un zèle soutenu, une patience à toute épreuve, & un amour ardent & désintéressé de l'humanité. Voilà pourquoi son ouvrage est resté dans le plus profond oubli. » (LURIEU, *Dictionnaire des Sciences & des Arts*.)

Antonie Pareisis, Portugais, & Ernaud, qui usurpèrent le nom d'inventeurs ou promoteurs de l'art de faire parler les sourds & muets, firent connoître les premiers cet art en France. L'abbé

de l'Épée, qui rencontra Wallis bien plutôt qu'il de l'imita, trouva dans une méditation profonde sur le développement de l'intelligence humaine, que l'application raisonnée des signes naturels (art des signes méthodiques) offrirait de plus grands avantages dans l'enseignement d'un grand nombre de sourds & muets, que l'art prodigieux de leur faire prononcer des sons qu'ils ne pouvoient entendre, & qui, par cela même, se trouvoient bien plus éloignés de leur entendement que le langage des gestes. La vie, la fortune entière de l'abbé de l'Épée furent entièrement consacrées à cette entreprise philanthropique, qui trouva un assez grand nombre de détracteurs.

On peut ajouter que sa méthode eut beaucoup plus de succès en France qu'à l'étranger. Du moins est-il certain, dit Lunier (*Op. cit.*), que « quelle que soit l'opinion particulière de ceux qui dirigent maintenant les établissements des sourds & muets, qui existoient avant, ou qui se sont formés depuis la création du nouveau système, il n'en est presque aucun qui ne considère l'usage de la parole comme la base principale de l'instruction des sourds & muets.

« On compte actuellement en Europe onze vingt-trois établissements de cette nature; les uns sont encore d'une date trop récente pour qu'on puisse en porter un jugement; mais on en cite cinq ou six dans lesquels l'art de faire parler les muets est poussé à un très-haut degré de perfection.

« L'Institut de Vienne, dirigé par M. May, est composé de plus de soixante élèves, qui tous sont instruits à parler, & dont le plus grand nombre parlent d'une manière très-distincte.
« L'école de Prague, fondée par M. Scharf, a été composée qu'à quinze ou seize élèves; mais ils parlent presque tous.

« L'établissement de Leipzig, l'un des plus anciens de l'Europe, dirigé maintenant par madame Heinicke, contient dix-sept élèves qui parlent assez bien.

« L'Institut de Kiel, en Holstein, dirigé par le modèle & laborieux M. Püngen, ne renferme qu'un très-petit nombre d'élèves; mais qui parlent tous distinctement, & la réputation, bien méritée, lui en assure du fond des États-Unis de l'Amérique.

« L'école de Berlin, fondée par M. Eschke, contient un assez grand nombre d'élèves, tous instruits à parler, & exercés sous les yeux du maître, par M. Habermas, jeune homme d'un talent extraordinaire, le *Musée* de Berlin, mais qui a sur le Muséum de Paris l'avantage de parler très-distinctement.

« Tel est l'état actuel de l'art de faire parler les muets. L'Espagne a été son berceau; l'Angleterre, la Hollande & l'Italie ont été le théâtre de ses progrès, la France paroissoit être destinée à être le trône de sa perfection; un déplora-

ble esprit de système l'en a banni. C'est en Allemagne qu'il est maintenant cultivé avec le plus de succès: les savans & les instituteurs de ce pays s'entendent & résonnent leurs talens & leurs lumières pour avancer ses progrès. Tous les jours les papiers publics renferment d'excellentes observations sur l'instruction des sourds & muets. Déjà M. Kempfle a fait paraître un ouvrage sur le mécanisme de la voix humaine, & l'on annonce en ce moment un *Traité encyclopédique sur l'éducation physique, morale & civile des sourds muets.* (L. J. M.)

MUFFLIER. (*Histoire naturelle médicale.*) *Antithrimum*. L. Plante de la famille naturelle des personées, dont elle présente les dispositions principales, & à laquelle on a supposé assez gratuitement des propriétés médicales contre les hémorrhoides. (L. J. M.)

MUGNAIO. (*Matière médicale.*) *Agaricus carneus*. C'est un champignon du genre *agaric*, que l'on recherche beaucoup en Italie. Il appartient, ainsi que les mousses, aux groupes des gymnomycètes, qui ne présentent que des espèces comestibles. (L. J. M.)

MUGUET, MILET, BLANCHET. (*Pathologie.*) On a donné ces noms à des aphthes qui surviennent à la bouche des enfans nouveau-nés, souvent les premiers jours après leur naissance, qui se déclarent par des petites pustules ou des petits points blancs, & qui les font périr en deux ou trois jours; d'autrefois on pen plus tard. Cette maladie n'attaque que les enfans à la mamelle; ceux qui sont sevrés en sont exemptés, & elle règne principalement dans les hôpitaux, où elle est beaucoup plus dangereuse que dans les maisons particulières.

En général les aphthes sont plus communes chez les enfans à la mamelle, comme le remarque Chailien dans son *Commentaire sur le troisième livre des épidémies*; & Hippocrate range cette maladie parmi celles auxquelles sont plus sujets les enfans. (*Aphor. xxix*, sect. 3.) Mais ces deux princes de la médecine, non plus qu'Ortise, Paul d'Égine, Aëtius, & les autres anciens médecins qui ont parlé des aphthes, & même de celles qui surviennent aux enfans, ne donnent aucune description qui puisse convenir au muguet. Harris & Rosen, qui ont traité particulièrement des maladies des enfans, n'en ont point parlé. Il en est de même des auteurs français avant l'année 1759, époque à laquelle on l'observa d'abord dans l'hospice des Enfants-Trouvés à Paris. Depuis, cette maladie a été décrite par Raulin dans son *Traité de la conservation des enfans*, & il en est question dans l'*ancien Journal de médecine* (juin 1785).

Le muguet se déclare souvent entre le troisième & le sixième jour après la naissance; d'autres fois

Ccc 2

il ne paroît que le vingtième jour, & même quelquefois plus tard. Avant l'éruption des aphthes, le petit malade pâlit, puis son visage devient terne & livide; son sommeil, quoique profond, est agité, la respiration est gênée, son pouls foible, presque imperceptible : quelquefois il lui survient des vomissemens, & quelques taches rouges le montrent vers l'anus. Dix-huit ou vingt heures après, il paroît autour des lèvres, près le frain de la langue, ou sur les gencives, un ou deux points blancs. Bientôt ces mêmes points blancs gagnent la commissure des lèvres & l'intérieur des joues, tandis que le poulx s'élève. Enfin, au bout de vingt-quatre heures, toute la langue est couverte de ces mêmes petites taches blanches, qu'on peut enlever aisément, mais qui repoussent de nouveau, reparoissent plus épaisses & plus nombreuses, & gênent la déglutition. Pendant ce temps l'enfant éprouve du malaise, il se plaint perpétuellement, il est tourmenté par la soif, par une chaleur vive d'estomac, par une diarrhée féreuse, verdâtre, quelquefois sanguinolente; il s'agite & on prend que difficilement le sein. Le mal cependant augmente promptement, il gagne le gosier & l'œsophage; les points blancs dégénèrent en aphthes de couleur cendrée, qui souvent se fêlent & brûlent; l'anus & les parties voisines se couvrent de pustules; & la couleur érythémateuse de la marge de l'anus gagne les reins. L'enfant alors s'affoiblit de plus en plus & ne tarde pas à périr. Telle est la marche de cette maladie, qui souvent enlève les malades en trois ou quatre jours, quelquefois plus tard, suivant son degré d'activité.

Si l'en envre les cadavres des enfans qui périssent de cette maladie, on trouve que les aphthes occupent non-seulement la bouche & le gosier, mais qu'elles se propagent le long de l'œsophage, dans l'estomac & les intestins jusqu'à l'anus, formant dans l'intérieur, une espèce de bouillie blanche.

Quelque dangereux que soit le muguet, il n'est cependant pas toujours mortel, & on y remarque des différences qui dépendent du plus ou moins d'intensité de la maladie. Quelquefois les pustules sont en petite quantité, larges & superficielles; il y a peu de diarrhée, la couleur de la bouillie est à peine changée, & les aphthes, après avoir été enlevés, ne reparoissent point. Dans cet état, le lait d'une bonne nourrice, celui de chèvre, l'eau sucrée, ou une décoction d'orge un peu aromatisée, suffisent quelquefois pour dégorger ces ulcères & nettoyer les parties affectées. Mais si elles sont petites, nombreuses, s'il succède à ces pustules des escarres brunes & gangréneuses avec une diarrhée verdâtre; si les rougeurs de l'anus sont vives, si les symptômes décrits ci-dessus, l'abattement, la foiblesse, le changement du visage, &c., se joignent à cet état, la maladie est des plus dangereuses, & les petits malades périssent s'ils ne sont secourus promptement.

Quelques médecins modernes attribuent cette

maladie au mauvais état des humeurs des parens, & regardent comme cause déterminante; la mauvaise qualité du lait de la nourrice; & qui peut être vrai jusqu'à un certain point, & rendre les enfans plus susceptibles d'en être atteints. Si l'on considère cependant que cette maladie est très-fréquente dans les hôpitaux, & plus rare dans les maisons particulières, il faut en rechercher quelques autres causes propres à ces hospices. Dans ces établissements, les enfans sont réunis en grand nombre, leurs lits sont près les uns des autres; les émanations qu'ils répandent leurs déjections ont une odeur aigre, presque putride, toutes causes qui tendent à viciar & à corrompre l'air des salles où ils sont ramassés. Cette atmosphère dangereuse agit d'autant plus efficacement sur ces enfans, que leur peau tendre & spongieuse absorbe facilement ces miasmes putrides. A cette première cause si s'en joint une autre qui n'est peut-être pas moins active; c'est le froid qu'ils endurent ces enfans. Nous voyons que les oiseaux, & même les animaux quadrupèdes, réchauffent leurs petits les premiers jours de leur naissance en le tenant sur eux. Les nouveau-nés n'ont pas moins besoin d'être réchauffés par la chaleur du sein de leur mère ou de leur nourrice, pour que cette chaleur entretienne leur transpiration, & en même temps les anime & les fortifie; c'est ce qui ne se rencontre pas dans les hôpitaux, où ces enfans sont isolés dans leurs lits. D'ailleurs, ils sont souvent apportés de loin, & ils ont enduré le froid dans le transport. Il ne seroit donc pas étonnant que cette alternative de froid & de chaud, jointe à la qualité de l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent; contribuent à vicier leurs humeurs, à affoiblir leur estomac & à troubler leurs digestions; en sorte que le lait tournât d'abord à l'aigre, & ce qui est fréquent chez les enfans, & par son séjour ne dégénérât ensuite en une acrimonie capable de pervertir toutes les humeurs. Ce qui prouve encore que le froid peut beaucoup contribuer à cette maladie, c'est l'observation faite par plusieurs médecins, que le muguet est beaucoup plus fréquent dans les pays froids que dans les climats méridionaux, & c'est peut-être par cette raison que les Anciens, d'ailleurs observateurs très-exacts, n'ont point décrit cette maladie, qui pouvoit être très-rare dans les pays chauds qu'ils habitoient. Enfin, une dernière cause, qui peut aussi concourir à rendre le muguet plus fréquent dans les hospices, est le défaut d'évacuation suffisante de *meconium*, de cette matière noire, visqueuse, que rendent les enfans après leur naissance, qui souvent a été négligée chez ceux qu'on apporte dans ces maisons. On fait combien cette matière, s'accumulant dans les intestins des enfans, peut prendre un caractère de putridité, & leur causer une infinité de maux en altérant & en corrompant leur lait & leurs humeurs. La nature a pourvu à cet inconvénient en donnant aux accouchées un premier lait séreux & laxatif,

qui a reçu le nom de *colostrum*. Ce lait trempe la matière épaisse du méconium & la fait évacuer. Les enfans qu'on apporte à l'hospice sont privés de cet avantage; les nourrices qu'on leur donne ont un lait plus ou moins ancien, qui n'a plus cette qualité laxative, du nouveau lait. Il faut donc y suppléer en évacuant le méconium par les moyens qui seront indiqués dans le traitement.

Ce traitement est de deux sortes, préservatif ou curatif: 1°. on cherche à prévenir la maladie & à empêcher que les enfans n'en soient atteints, lorsque le muguet régné dans un hôpital; c'est le traitement *préservatif*; 2°. lorsque la maladie est survenue, on emploie les moyens propres à la guérir; c'est ce qui forme le traitement *curatif*.

Quant au premier article, 1°. comme le froid & la suppression de la transpiration paroissent contribuer pour beaucoup à rendre les enfans susceptibles de gagner le muguet, on aura soin qu'en moment de leur naissance, ils ne soient point exposés à un air froid, que la température de la chambre soit toujours égale, & on les tiendra couverts de linges froids & chauds: En même temps on nettoiera exactement leurs corps de cet enduit gluxineux qui les couvre en naissant, afin que par ces différents moyens, la transpiration se fasse également & ne puisse se supprimer.

2°. Souvent les restes du méconium, lorsqu'il n'est pas bien évacué, peuvent, sinon produire la maladie; au moins l'aggraver, ou rendre l'enfant plus susceptible de la gagner: il faut donc, dans le premier temps de la naissance, évacuer suffisamment cette mauvaise matière. Pour cet effet on donnera à l'enfant, toutes les trois ou quatre heures, soit un scrupule ou un demi-gros de magnésie, du sel d'Epson, avec égale quantité de sucre, soit une petite enillerée de sirop de chlorocée composé de rhubarbe, & pour dissolution une eau d'orge ou de riz légèrement aromatisée, ce qui empêchera le lait de tourner à l'aigre, en fortifiant l'estomac. C'est par ces précautions simples que le docteur Saponis a préservé à jamais un grand nombre d'enfants. (*Mémoires de la société royale de médecine*; année 1787, pag. 47.)

Mais lorsque la maladie est survenue, il faut chercher à la guérir, & c'est alors que le traitement curatif devient nécessaire. Ce traitement doit varier suivant la nature & le degré du muguet, qui peut être benin, conséquent ou malin. Dans tous les cas, il faut commencer par désinfecter l'air que respire le petit malade, au moyen de la vapeur du vinaigre dont on parfume ses chambres; on imbibé de la même vapeur les linges & les lits des malades.

1°. Si le muguet est léger & benin, & s'il y a fort peu d'aphthes, il suffira quelquefois, pour le guérir, d'avoir soin que la bouche du malade soit perpétuellement humectée, tant par la succion du

lait, qu'en la lavant souvent avec un pinceau trempé dans un gargarisme d'eau d'orge & de miel rosat, acidulé avec quelques gouttes d'acide sulfurique, ou en la nettoyant avec le doigt, entouré d'un linge trempé, soit dans ce même gargarisme, soit dans une dissolution d'un gros de borax dans une once & demie de miel rosat; quelque gargarisme que l'on emploie, il est essentiel d'éviter très-fréquemment. Quant aux rougeurs & aux excoriations de l'anus, on les saupoudre, soit avec l'auidon, soit avec la magnésie.

2°. Mais si les aphthes sont abondans, & que le muguet soit conséquent, on commencera par évacuer le malade avec un grain nu deux d'ipécacuanha, puis on corrigera le mauvais état de l'estomac en donnant six ou huit grains de magnésie deux ou trois fois par jour, dans les boissons, ou dix ou douze grains de savon amygdalin mêlé avec du sucre. Il faut dans ce cas, comme dans le précédent, que la bouche soit toujours humectée, tant par la succion du lait, qu'en la nettoyant avec un gargarisme acidulé, comme ci-dessus, ou avec un liniment doux, auquel on joint le borax, dont l'expérience a démontré l'efficacité dans cette circonstance, ou avec une légère dissolution de camphre sur la base de la maladie, on nettoiera la bouche avec une décoction fortifiante & astringente de sauge, de plantain ou de roses, à laquelle on mêlera du miel rosat & un peu d'acide sulfurique. S'il est possible de faire avaler quelque chose au malade, on lui fera passer quelques enillères de looch cambré; & lorsque les aphthes seront tombés, on le purgera avec une petite dose de sirop de chlorocée composé, dans une légère décoction de quinquina.

3°. Si le muguet est d'une mauvaise nature, on insistera encore plus sur les mêmes remèdes, & surtout sur l'usage de la magnésie, du sel d'Epson & du lavon; on y joindra quelques cordiaux, tels que la teinture amère de Whitt, composée de quinquina, de racine de gentiane & d'écorce d'orange dans l'eau-de-vie, qui est bon dans ce cas, & qu'on étend dans quelque eau distillée; pour en former une potion, en y ajoutant le sirop d'guillet ou celui de fleurs d'orange. Si les aphthes prennent une couleur brune, on les étuvra avec les décoctions de quinquina, ou avec celle de racine d'aristologie, acidulée. Outre ces gargarismes & ces linimens, les auteurs modernes ont publié un grand nombre d'autres préparations qui peuvent avoir leur utilité, tels que le sph de mûres, la décoction & le suc de raves, l'eau rose avec le miel, la décoction de grande joubarbe avec le miel & l'alun, &c., dont on peut composer différents gargarismes; mais en général il est essentiel de les aciduler.

Lorsque les aphthes gagnent l'anus, & qu'il y a sur cette partie des rougeurs ou des excoriations, ainsi qu'il arrive souvent dans le muguet abondant & malin, il faut éviter tous les topiques répercutifs, toutes les préparations de plomb,

qui seroient rentrer l'humeur fere que la nature dépose sur la peau, & ne tarderoient pas à faire périr le malade en déterminant la gangrène à l'intérieur. Au contraire, on doit soutenir cette éruption, qui peut être critique, par une boisson de bourrache ou de scorfonère, ce qui n'empêchera pas de donner, s'il est possible, des lavemens adoucissans de décoction de graine de lin, du son, avec un peu de gomme arabique, pour nettoyer les aphtes qui sont dans le canal intestinal.

Une autre précaution bien nécessaire & très-essentielle, c'est de séparer les enfans malades de ceux qui sont sains, de leur donner une nourriture bien portante, qui les réchauffe souvent dans les bras; & lorsqu'ils ne peuvent absolument têter, il faut les soutenir par des bouillons acidulés & des cordiaux antiputres. Néanmoins, malgré toutes ces précautions, il est rare qu'on puisse sauver ces enfans, lorsque la maladie est portée à un certain degré de malignité. (Gzornoy.)

N. B. Le muguet a été le sujet de plusieurs monographies, & d'un assez grand nombre d'observations recueillies dans divers hospices d'enfans, pendant le règne de plusieurs épidémies.

L'aphorisme xxiv de la 3^e section d'Hippocrate, paroit se rapporter bien plutôt aux aphtes accidentelles & symptomatiques, qu'à l'espèce d'éruption qui constitue le muguet ou *blanchet*. Il faut aller jusqu'à François-de-Bois, dans le dix-septième siècle, pour trouver une distinction positive entre ces deux maladies. En 1744 cette même maladie ayant régné de la manière la plus désastreuse dans la maison des Enfans-Trouvés, attirer vivement l'attention du Gouvernement, & plusieurs médecins célèbres furent consultés pour en arrêter les progrès.

Les Mémoires de la Société royale de médecine renferment plusieurs détails importants concernant le muguet. Cette savante Académie engagea même, d'une manière spéciale, les médecins à porter de ce côté leurs recherches, en proposant son étude comme sujet de prix : appel aux lavans qui ne fut point inutile, & qui fit adresser à cette Société plusieurs Mémoires qu'elle a publiés dans ses Annales.

Il s'est élevé dans ces derniers temps une question assez oiseuse, la question de savoir s'il n'étoit pas convenable de placer le muguet parmi les phlegmasies des membranes muqueuses. Sans doute cette maladie est toujours symptomatique ou consécutive; elle ne survient presque jamais que chez les enfans primitivement très-foibles, très-lymphatiques, mais plus encore chez les enfans qui ont continuellement à souffrir de l'air, de mauvais alimens, & dont la nutrition est profondément altérée dans un concours défavorable de circonstances. En la considérant sous son véritable point de vue, on doit la regarder comme

un exanthème, qui n'a rien d'ailleurs de véritablement inflammatoire, & qui, loin de pouvoir être guéri par des débilitans; ne peut cesser que par un changement de régime & l'heureuse combinaison d'un air plus pur, & d'une nourriture plus saine, avec un traitement tonique.

Nous n'ajouterons rien d'ailleurs à la description de cette maladie, qui a été tracée avec beaucoup de soin dans l'article précédent, que nous avons trouvé dans les archives du *Dictionnaire de Médecine pour l'Encyclopédie*. On concevra, d'après cette description, combien cette maladie peut offrir de degrés différens.

Le muguet simple, & qui se montre quelquefois malgré toutes les ressources de la propreté & du luxe, & au milieu des familles les plus riches, est rarement une maladie grave; il se guérit le plus souvent avant qu'on ait quel temps de le reconnaître. Toutefois il peut devenir très-grave dans les mêmes circonstances, s'il est occasionné par une disposition morbide de la nourrice; il le joint nécessairement alors à une affection adynamique dont l'enfant devient la victime, si la cause du mal n'est pas reconnue & détruite avant d'avoir fait de grands progrès.

Dans deux circonstances différentes, l'auteur de cette remarque a vu un nourrisson de cinq à six mois succomber à une pareille maladie, dont la cause & l'origine avoient échappé à la sagacité ou du moins à la surveillance d'un médecin, auquel on attribuoit, dans un certain monde, un grand savoir & une grande expérience pour tout ce qui concerne les maladies des enfans. Dans d'autres circonstances, le muguet est comme constitutionnel chez certaines familles remarquables par une complexion lymphatique, & l'atonie des voies digestives; une bonne nourrice, quelques légers évacuans, auquel on fait succéder l'usage du sirop de quinquina mugué, suffisent toujours pour dissiper le muguet dans cette occurrence particulière.

Le muguet qui ne se manifeste pas dans les hôpitaux, paroit le plus ordinairement occasionné par l'état morbide de la mère ou de la nourrice qui le remplace. Il n'est pas sans exemple, d'un autre part, que cette espèce d'exanthème provoque, par une suite de la succion, une espèce d'éruption miliaire locale, sur le sein de la mère ou de la nourrice; éruption que j'ai en l'occasion d'observer plusieurs fois dans le cours de ma pratique, qui peut se prolonger assez long temps, & provoquer à son tour le muguet chez le nourrisson, lorsque ce dernier s'en trouvoit débarrassé depuis quelque temps.

Le muguet consuet des hospices & des contrées très-humides, telles que la Zélande, la Hollande, la Flandre, est rarement sans complication, soit avec l'état scorbutique, soit avec l'adynamie, l'ataxie, & l'altération mugué que dispose à la fièvre de ce nom. Les boutons très-fermés, jaun-

naïres, bruns ou livides, & tirant sur le noir, font du plus facile préface: si l'éruption se propage & s'étend d'un côté de la trachée-artère & des bronches, cette circonstance ajoute beaucoup à sa gravité. On combat cette maladie en grand, dans les hôpices, par une administration dirigée & combinée dans les vues d'une philanthropie aussi active qu'éclairée, & par le changement de nourriture, si l'enfant est en bas âge; son changement de régime, s'il est plus âgé, suffit, dans les cas particuliers, ou pour l'arrêter, ou pour prévenir toute récurrence. Le miel rosat, seul ou acidulé, ou mêlé à une certaine quantité de borax, présente de grands avantages lorsque la disposition aphteuse se joint aux aphthes & parait les déterminer. (L. J. M.)

MUGUET, f. m. (*Matière médicale*.) Convolvulus. L. Genre de plantes de la famille des lilacées, à un groupe particulier, de laquelle elle doit être rapportée (le groupe des asparagées), dont elle possède quelques propriétés, & qui pourroit au besoin offrir un aliment analogue aux sommets de l'asperge cultivée. Les fleurs de cette plante ont une odeur qui ressemble beaucoup à celle de la fleur d'orange. Elles ont jadis pendant quelque temps, servi en Allemagne, d'un certain aliment, pour remplacer différents médicaments; cette plante ne se trouve plus appelée aujourd'hui dans la matière médicale, que sous un point de vue historique. (L. J. M.)

MULÂTRE, f. m. (*Anthropologie physiolog.*), de l'espagnol *mulato*. Nom donné aux individus qui proviennent d'un mariage entre des individus de races différentes, & principalement entre le nègre & le blanc.

Les mulâtres sont désignés sous différentes dénominations, suivant le degré de mélange & la race des individus qui les ont engendrés. (*Voyez* le mot *MÉTIS* dans le *Dictionnaire d'Histoire naturelle* & dans celui d'*Anatomie*.)

(L. J. M.)

MULES, f. f. plur. (*Nosographie*). Nom vulgaire que l'on a donné aux engelures. (*Voyez* ce mot dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.)

MULES (traversières). (*Médecine vétérinaire*.) On désigne sous ce nom certaines tumeurs qui se forment sur le bout des chevaux, à l'endroit des plus qu'elles entourent, & souvent au-dessus de ces plis.

MULET, f. m. *Mulus*. MULET, ANZ & JUMENT. (*Art vétérinaire*.) Il suit ordinairement de l'accouplement de l'âne avec la jument, ou du cheval avec l'ânesse.

Il parait certain que le mulet peut engendrer, & la mule devenir prolifique; le climat y influence

beaucoup, car ces exemples les plus fréquents arrivent dans les pays chauds.

Lorsque l'étalon ou baudet & la jument sont d'une belle taille, les mulets qui en proviennent sont d'une haute taille: si la mère est de petite taille, le mulet est petit.

La jument qui a été couverte par le baudet, porte douze ou treize mois.

Il me parait utile de détruire ici quelques erreurs insérées au mot ANZ, sous la nouvelle *Encyclopédie médicale*, par M. Hazard.

1°. L'âne avec la jument produit les grands mulets, ou mulets proprement dits. Le cheval avec l'ânesse produit les petits mulets ou bardaux, différents des premiers à plusieurs égards; quelques auteurs ont prétendu encore que de l'union de l'âne avec la vache, ou du taureau avec l'ânesse, il résulteroit une autre espèce de mulet nommé *jumart*; mais il parait que cette sorte de mulets n'existe point, & que ces prétendus *jumarts* ne sont que des bardaux résultant de l'union du cheval avec l'ânesse.

Nota. L'âne produit les grands mulets si la jument est d'une grande taille; il produit des petits mulets ou bardaux si la jument est petite. Je suis certain de ce fait, étant originaire d'Auvergne, où nous élevons beaucoup de mulets. Il est aussi nécessaire de savoir que nous n'accouplons jamais le cheval avec l'ânesse; cet usage est inconnu dans le département du Cantal.

C'est encore une erreur de soutenir que le jumart n'existe point. Il est rare à la vérité dans le département du Cantal, je n'en ai vu que deux; plusieurs de mes compatriotes m'ont assuré en avoir rencontré quelques-uns; c'est le fruit de l'union du taureau avec la jument, ou de la vache avec le cheval. Cet animal est plus fort que le mulet à taille égale; il sert ordinairement de bardau à la suite des troupes de mulets destinées au transport. Celui qui conduit la troupe, le mene.

Il est bien surprenant que M. Hazard ne l'existence du jumart dans l'*Encyclopédie médicale*, & qu'il la reconnaisse dans la *Traduction du traité des harnais*, de M. Hartmann.

Les baudets en usage dans le département du Cantal, pour servir d'étalons, viennent du Poitou, d'Espagne, ou du département de l'Aveyron. Ce n'est que depuis peu d'années qu'on en élève avec succès dans ce dernier département.

Les mulets de haute taille sont employés, dans les départements méridionaux, au charroi ou au labourage. Il n'y a que ceux du Cantal qui labourent avec des bardaux; nous vendons nos mulets aux Espagnols.

On se sert aussi des mulets de haute taille dans les pays méridionaux, pour le transport des marchandises d'un département à l'autre, que l'on fait voyager à dos de mulet dans les pays montagneux.

& difficiles, où les grands chemins ne sont point ouverts.

Le mulet, plus fort que le cheval, peut porter des fardeaux plus pesans. Sa marche est à la vérité plus pesante & plus lente, mais aussi elle est beaucoup plus sûre; lorsqu'il gravit des chemins pierreux & difficiles à travers les montagnes, il est rare qu'il branchoe & qu'il fasse un faux pas, même dans les sentiers étroits & tortueux.

Le mulet est d'un caractère capricieux, méconnaissant quelquefois celui qui le panse & qu'il conduit. Il lui détache une rauque souvent dans le moment où il parait paisible.

Il est dangereux lorsqu'il rencontre des jumens sur son passage pendant la saison des chaleurs.

La mule est plus tranquille, plus douce, pas conséquent moins dangereuse; les allures apprennent de celles du cheval. On monte les mules pour voyager, pour la chasse, &c.; on les attèle aux voitures. Les Espagnols s'en servent beaucoup.

Les ânes que M. Huzard a vus dans les départemens de Vaucluse, du Var & des Bouches-du-Rhône, viennent des départemens de la Corrèze & du Cantal.

J'ajouterai ici un mot for les baras, relativement au département du Cantal, & au reste de la chaîne des montagnes d'Auvergne; nous n'avons point de baras lavages, ni de baras privés dans le sens de M. Hartmann.

Nos propriétaires ont des fermes dans les vallées composées de prairies, de pâturages & de terres labourables; les prairies fournissent le foin pour la nourriture de l'hiver; les pacages sont destinés à la nourriture des bestiaux de labour, aux jumens poulinières, aux poulains & aux jeunes chevaux, pendant la fin de l'automne, les beaux jours de l'hiver & le commencement du printemps.

Les propriétaires ont en outre des vaches laitières au nombre de 30, 40, 50, jusqu'à 80, uniquement destinées à faire des vreaux & des fromages. On les nourrit l'hiver à la ferme; elles vont paître tout l'été sur les montagnes; on y envoie avec elles quelques jumens poulinières & des poulains, qui y restent quatre ou cinq mois, nuit & jour en plein air.

Les propriétaires n'avaient point d'étalons chez eux. Les chevaux & les baudets étalons étoient confiés à des propriétaires particuliers, auxquels chacun envoyait ses jumens dans le temps de la monte. Tels étoient les réglemens de l'ancien régime. Depuis la révolution, chacun est libre d'avoir chez soi des étalons. Il y en a qui sont couvrir leurs jumens par les jeunes chevaux qu'ils élèvent.

D'après ce détail, on peut juger jusqu'à quel point notre éducation se rapproche des baras à demi sauvages. (BAIKODE.)

MULET ou CAROT. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta.*

Ordre I. Alimens.

Section I. II. Animaux.

Le mulet est une espèce de poisson de mer, écailleux, & de la famille des muges. On le trouve dans les étangs formés par la mer, & il remonte les rivières. Ce poisson passe pour ne vivre que de boue, & sa chair n'en est pas meilleure.

Les mulets de mer sont les moins mauvais; ceux des étangs sont plus gras, mais d'un goût plus fade. Ce n'est pas un poisson d'un manger agréable, quoiqu'on en fasse usage. (MACQUART.)

MULLER (Godefrid-Guillaume). On ne ennoit ce médecin, que par sa dissertation sur l'obliquité de la matrice dans les femmes grosses, & sur la difficulté de l'accouchement qui en résulte. *De situ obliquo uteri, in gravidis & ex eo sequente partu difficili.* Argenteur, 1731, in-4°.

MOLLER (Jacques), né à Torgau en 1594. Ce savant, après avoir étudié d'abord les mathématiques, se consacra ensuite à la médecine. En 1637 il fut nommé médecin du landgrave de Hesse & de son armée. On lui doit deux petits écrits ayant pour titre : *De caudis partium genitalium.* *De naturâ motus animalis & voluntatis.* in-4°. 1628, avec les Observations de Grégoire Morlius.

MOLLER (Jean), né à Hambourg, à la fin du dix-septième siècle, & mort en 1725. On sait seulement de ce médecin, qu'il fut médecin de la cour de Saxe-Mecklenbourg, & qu'il enseigna alternativement la physique & la poésie.

MOLLER (Jerr-Matthias), de l'Académie des curieux de la Nature. Ce médecin a publié plusieurs observations dans le recueil de cette Académie. Il donna en outre séparément, l'histoire particulière d'une plaie de tête fort grave. *Casus medico-chirurgicus de effundis cruribus & subsecutis gravissimis symptomatibus, ex voto curatus.* Halle, 1712, in-8°.

MOLLER (Philippe), médecin du seizième & du dix-septième siècle, de l'Université d'Hertzberg, mort en 1699.

MOLLER (Théophile), né à Dresde en 1620, auteur de l'ouvrage suivant :

Commentationum biga, quarum prima de oleis variis ea extrahendi modis; secunda de alchymia. 1688.

MULLER, de Leipzick. On doit à ce dernier un ouvrage qui ne peut plus être consulté que pour l'histoire des erreurs de l'esprit humain. *Miscula chimica, & myseria medica*, 1614, 1^{re} édit., qui

qui a été suivie d'un grand nombre d'autres éditions, jusqu'en 1660.

Müller, comme tous les autres adeptes, consacra sa vie presque toute entière, à la recherche de la pierre philosophale & des arcanes. On lui doit toutefois une dissertation assez estimée, sur l'usage des muscles. *De usu musculorum*, in-4°. 1628. (L. J. M.)

MULTIFIDE (*Hist. nat. médic.*), à plusieurs cordes ou divisions. Ce mot, dont les botanistes se servent pour indiquer une division par plusieurs incisions aiguës, pourroit être employé jusqu'à un certain point par les anatomistes. (L. J. M.)

MULTIMAMES, adj. (*Anatomic.*) Femmes qui ont plus de deux mamelles : espèces de monstruosités, ou de conformations singulières, dont on a cité plusieurs exemples, pour lesquels il faut renvoyer au recueil publié pour amuser les oisifs, sous le nom de *Dictionnaire des merveilles de la Nature*. (L. J. M.)

MULTIMANES, adj. (*Anatomic.*) Individus qui ont plusieurs mains; variété de monstruosités qui appartient aux individus par excès, dont il existe un grand nombre d'exemples, & qui ont été décrits dans les collections académiques. (*Voyez* le mot dans le *Dictionnaire d'Anatomic*, & l'article *Monostratus*, dans ce Dictionnaire.) (L. J. M.)

MUNDANELLA (Louis) (*Biograph. médic.*), médecin, né à Brest, vers l'an 1540, se distingua à Padoue, par ses connaissances en botanique, & par la préférence qu'il donna aux ouvrages des médecins grecs sur ceux des Arabes, alors les seuls estimés. Il a donné :

Epistolarum medicinarum variorum questionum & locorum Galeni difficultiorum expositionem continentes. Basil., 1528, in-8°. Venet., 1545. Lugd., 1557, in-fol.

Dialogi medicinales decem. Tiguri, 1551, in-4°.

Theatrum Galeni, hoc est, universæ quædam à Galeno diffusæ, spargiturque traditur promptuarium. Basil., 1551, 1568, in-fol. Colon., 1567, in-fol.

Epistola ad Jos. Valsalvium, quæ tractator quæstio, utrum in suis affectibus secundum sit venæ quæ ad annulum digitorum sinistram manûs. Ratav., 1567, in-8°. (R. GORTHOY.)

MUNDINUS (*Biograph. médic.*), médecin du quatorzième siècle, étoit de Milan. Il fut l'un des premiers qui, parmi les modernes, s'occupa d'anatomie : c'est à ce titre, plutôt qu'aux progrès qu'il a fait faire à la science, qu'on lui doit de la reconnaissance. Il mourut à Boulogne en 1318. Le grand nombre d'éditions qui furent données, de son *Traité d'anatomie*, prouve la réputation dont il a joui dans son siècle.

MEDICINE. Tome X.

Anatomie omnium humani corporis interiorum membrorum. Papire, 1476, in-folio; 1512, in-4°, &c. (R. GORTHOY.)

MUNGO (*Hygiène*). Garcias dit que le mongo est une graine des Indes orientales, de la grosseur de celle de la coriandre sèche, noire dans la maturité, & si commune à Gazarate & à Dégan, qu'on la donne à manger aux chevaux. Il n'a point décrit la plante qui produit cette graine; mais il paroit que c'est une sorte de *physalis*, que Ray nomme *physalis glandulosa*, dont la tige est droite & haute de trois pieds, portant des feuilles & des fleurs semblables à celles de notre haricot. Ses gonfles contiennent les graines dont parle Garcias, & les Orientaux font cuire ce légume avec du beurre. (MACQUART.)

MUNIER (Jean-Alcide). (*Biograph. médic.*) On rapporte l'existence de ce médecin au seizième siècle. On lui doit une espèce de compilation sur les veines lactées & lymphatiques : *De venis tam lacteis, quam lymphaticis novissimè repertis sylloge anatomica*. Genève, 1648 & 1654.

(L. J. M.)

MUQUEUSE (Fièvre). (*Nosographie*). On désigne assez généralement sous ce nom, une fièvre qui n'a rien de commun avec les affections étiologiques partielles, inflammatoires & non inflammatoires. Les principaux caractères de cette fièvre, ou du moins les plus apparens, consistent dans une prédominance fébrile, dans une surte de pléthore lymphatique, accompagnée d'un embarras pituitieux ou muqueux des voies digestives : disposition qui se rattache d'une manière éloignée à une foiblesse remarquable dans la nutrition.

Un état vermineux, différentes inflammations aiguës & latentes de la membrane muqueuse de l'estomac ou des intestins, & de tout autre viscère creux, sont des événements fréquens dans la fièvre muqueuse; mais ils n'en font pas inséparables. Ils ne la précèdent pas, ils s'y montrent comme des épiphénomènes, & ne peuvent être rapportés à aucune cause primitive d'inflammation. Rien ne s'oppose donc, dans l'état présent des connoissances, à ce que l'on puisse regarder la fièvre muqueuse, d'après les auteurs qui l'ont décrite avec le plus de soin, comme une fièvre essentielle ou primitive : maladie qui a ses causes assez régulières, ses symptômes, sa marche toujours très-lente, & une aptitude à un genre particulier de complication, tels que l'état vermineux, les inflammations des différentes régions des voies digestives avec une congestion muqueuse & dépendante de l'excitement morbide des follicules.

Le sixième malade du premier livre des *Épidémies*, CLÉORACTE, présente, suivant la remarque judicieuse de M. Pinel, un exemple de fièvre muqueuse, qu'il est impossible de méconnoître. « Il

Ddd

» fut tout-à-coup pris d'une fièvre qui n'avoit
 » point d'hébre, ni de marche fixes pour le re-
 » tour des paroxysmes. Dans les premiers jours,
 » céphalalgie & douleur convulsive des membres :
 » quelquefois des sueurs, d'autres fois point du
 » tout : retour des paroxysmes ordinairement les
 » jours critiques ; froid des mains vers le vingti-
 » quatrième jour : ce qui est suivi de vomissement
 » d'une matière bilieuse, d'abord jaune, puis ver-
 » dâtre, & d'un fanguement marqué. Vers le
 » trentième jour, commencement d'une hémor-
 » rhagie de l'âge & d'une ovarie, dont le retour
 » est variable, & se renouvelle à diverses épo-
 » ques jusqu'à la crise : point d'averthion pour les
 » alimens, ni de suif durant tout le cours de la
 » maladie, ni de rêves turbulents : urine claire,
 » mais colorée. Vers le quarantième jour, urine
 » rougeâtre, avec beaucoup de sédiment rouge :
 » rémission des symptômes ; l'urine offre ensuite
 » des variations pour le sédiment, qui masque
 » par intervalles. Le soixantième jour, sédiment
 » copieux, blanc & léger : rémission de tous les
 » symptômes, intermission de la fièvre, urine
 » claire, mais bien colorée. Le soixante-dixième
 » jour, apyrésie qui continue pendant dix jours.
 » Le quatre-vingtième jour, frisson, fièvre ai-
 » guë, sueur copieuse, sédiment rougeâtre &
 » léger de l'urine ; ce qui termine la maladie... »

On a cru pouvoir rapporter à la fièvre muqueuse,
 la fièvre, la succession des symptômes que Huxham
 a désignée sous le nom de *fièvre lente nerveuse* :
 mais les observateurs, les praticiens que l'on peut
 regarder comme les historiens les plus exacts, &
 comme les véritables monographes de cette ma-
 ladie, sont ceux qui l'ont décrite, dans les circon-
 stances où elle s'est montrée avec tout son dévelop-
 pement, & pendant le règne d'une épidémie.

SARCONZELL au premier rang parmi ces historiens,
 par sa description de l'épidémie de Naples, qui
 avoit tous les caractères d'une fièvre muqueuse,
 & qui fut tantôt simple, tantôt compliquée de dif-
 férentes phlegmasies locales ; telles que l'angine,
 la péripneumonie, la gastrite (1).

PLENCZ, RÖDNER & WAGLER ont également
 tiré parti des avantages que leur ont présentés
 pour l'étude de la fièvre muqueuse, deux épidé-
 mies, qui se manifestèrent, l'une pendant le siège
 de Prague (2), l'autre pendant la blocus de Göt-
 tingue, en 1760 (3).

Nous allons tracer rapidement les principaux
 traits de la fièvre muqueuse, en faisant usage, d'une
 part, de la description de ces excellents observa-
 teurs, & en nous servant, d'une autre part, du ré-
 sultat de notre expérience & de nos souvenirs con-

(1) Saiconzella désigne la fièvre muqueuse, sous le nom
 de *fièvre pléuro-pulmonaire*. (Voyez le Recueil de ses obser-
 vations sur les épidémies de Naples.)

(2) Voyez Joseph de Plencz. *Acta & observatio medica.*

(3) Traité de morbo mucoso. Götting. 1763. Editio
 2^a rubrica.

cernant cette maladie, que nous avons observé
 plusieurs fois, & dans un concours remarquable
 de circonstances.

La fièvre muqueuse est toujours une maladie
 sporadique, c'est-à-dire, une maladie qui se ma-
 nifeste au milieu de circonstances & de condi-
 tions individuelles ou particulières, dont le con-
 cours est nécessaire à son développement. Elle
 peut devenir ensuite épidémique, si ces causes ont
 une grande intensité, & si elles agissent à la fois
 sur un grand nombre d'individus renfermés dans le
 même lieu, rapprochés par les mêmes habitudes
 diététiques, ainsi qu'il arrive dans un atelier, dans
 une prison, mais surtout dans une ville assiégée.
 Plusieurs causes ou conditions, qui peuvent contri-
 buer à faire naître cette affection morbide, & dis-
 poser à son invasion, sont intérieures ou inhé-
 rentes aux individus : telles sont certaines situa-
 tions, certaines époques de la vie, la complexion
 physique que l'on a désignée sous le nom de *tem-
 pérément lymphatique*, les suites de coqueluche,
 l'âge critique, les conséquences de certaines ma-
 ladies, tels que les rhumatismes chroniques,
 le scorbut, la syphilis, les hydropisies, les ma-
 ladies scrophuleuses. J'ai vu plusieurs fois ces cau-
 ses simplement prédisposantes, faire naître la fièvre
 muqueuse presque sans le concours de causes
 occasionnelles ; telle fut une mademoiselle J., âgée
 de seize ans, d'une complexion très-lymphatique,
 dont les habitudes devinrent plus sédentaires &
 le régime plus débilitant au moment de la puberté.

Des exemples du même genre m'ont été offerts
 par madame de M^{lle}, à la fin d'une fièvre de lait,
 qui fut troublée d'une manière accidentelle ; & par
 mesdames de B^{lle} & de A^{lle}, & surtout par madame d'A^{lle},
 dont la complexion avoit été profondément altérée
 par de violents chagrins au commencement de l'âge
 critique : malades sur lesquelles je reviendrai dans
 la suite, en rappelant d'une manière abrégée l'his-
 toire de leur maladie.

Les causes occasionnelles ou externes de la fièvre
 muqueuse, appartenant à différents genres de
 circonstances. La saison, le climat, les disposi-
 tions locales de certaines régions, sont placés au
 premier rang parmi ces causes : ainsi l'on voit plus
 ordinairement la fièvre muqueuse régner, dans
 les lieux bas & humides, dans les habitations mal
 exposées, privées de lumière, dans les ateliers où
 un grand nombre d'ouvriers travaillent en com-
 mun, & d'une manière sédentaire. La malpro-
 preté, la misère, la réunion des habitudes qui
 nuisent aux fonctions de la peau, & déterminent
 l'atonie de cet organe, contribuent également au
 développement de la fièvre muqueuse. L'insuffi-
 sance ou la mauvaise qualité des alimens, l'usage
 exclusif des substances végétales, pour des indivi-
 dus qui ne sont pas accoutumés à ce genre d'alimen-
 tats, paroissent encore plus propres à faire naître
 cette maladie, que l'on a vu si souvent se ma-
 nifester, pendant les sièges ou les blocus des villes.

que par la disette presque toujours inévitable dans cette circonstance. On a cru aussi remarquer, & comme une conformation de cette influence de la nourriture, sur la fièvre muqueuse, que cette fièvre étoit beaucoup plus fréquente dans les pays catholiques, surtout à la fin du carême.

Symptômes. La fièvre muqueuse est caractérisée en général, par la lenteur, par l'embarras de la marche, l'étendue de la durée, par la fréquence de ses complications. Ses préliodes sont ordinairement assez prolongés.

Madame d'A*, que j'ai déjà citée, fut pendant près de douze jours dans un état équivoque de santé, que l'on pouvoit regarder comme le prodrome de la fièvre muqueuse; qui ne fut terminée que le cent unième jour de la maladie, & avec une marche, un enchaînement de symptômes, qui me rappellent souvent l'histoire de Cléonade.

Les préliodes ou prodromes de la fièvre muqueuse sont en général caractérisés par l'inappétence, les rapports acides, un fœtissement habituel de gêne, de languer, de contrainte dans l'existence; la maladie débute dans la plupart des cas par un frisson, une horripilation sans tremblement, qui se reproduit ensuite assez souvent dans le cours de cette fièvre, en alternant avec des bouffées de chaleur, des vertiges, des palpitations. Ce début survient plus ordinairement vers le soir; circonstance que Werthof a bien appréciée, & qui lui a fait admettre des rapprochemens entre la fièvre muqueuse continue, la fièvre quarte & la fièvre quotidienne, & que M. Pinel a exagérés en les confondant d'une manière trop exclusive & trop générale.

Le spasme ou tremblement, qui est très-rare au début de ces fièvres muqueuses, au moment de l'invasion; plusieurs autres affections fébriles, & des inflammations, & bien cependant dans quelques circonstances. Madame de M*. L'éprouva avec une violence extraordinaire, & sous les apparences d'une attaque de nerfs, non-seulement au début de la maladie, mais au renouvellement de chaque paroxysme, pendant les vingt premiers jours.

Du reste, le frisson & la sensation de chaleur, dans la fièvre muqueuse, sont loin d'affecter en même temps toutes les parties du corps. Le plus souvent même, certaines parties sont brûlantes, tandis que les autres sont froides & glacées; ce qui arrive de plus souvent pour les extrémités inférieures. D'une autre part, la chaleur fébrile est peu marquée, & l'on ne reconnoît son acreté que par un toucher prolongé; circonstance assez importante, & que Galien avoit très-bien remarquée.

Pendant le développement de la fièvre muqueuse, l'habitude générale du corps & de la physiologie, change de disposition; les chairs se ramollissent, le visage présente la décoloration & le pâleur, qui caractérisent l'étiollement. Il survient une altération profonde, une sorte de dégénérescence dans la sécrétion des membranes muqueuses

de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, des intestins; ce qui produit l'inappétence, le dégoût, l'aversion pour les boissons fades & muqueuses, les nausées, le vomissement on l'expectoration de matières visqueuses, & quelquefois une salivation incommode & fatigante, qui paroît avoir plutôt son siège dans les cryptes ou follicules de la membrane buccale, que dans les glandes salivaires. Les maladies que l'on consulte sur ce qu'ils éprouvent, se plaignent surtout de cette salivation, & de la sensation incommode de mucosités nauséabondes qui les fatiguent continuellement, & dénaturent la sensibilité de l'odorat & du goût.

L'embarras gastrique est assez ordinairement accompagné d'une irritation vive, ainsi que l'annoncent l'anxiété, l'angoisse qu'éprouvent les malades, la sensibilité de l'épigastre & de l'abdomen, tous les symptômes d'accablement & de faiblesse indirecte, qui sont inévitables dans toutes les irritations du bas-ventre, & sur lesquels il est si important de ne pas se méprendre. La langue, qui reste habituellement humectée, devient bientôt sèche & même noire, suivant la remarque judicieuse de Sydenham, lorsque méconnoît la nature de la maladie, & s'en laissant imposer par l'état apparent de faiblesse & de languer des malades, on fait usage d'un régime & d'un traitement toniques.

Le pouls est peu changé dans la fièvre muqueuse; il n'est bien sensiblement fébrile que chez les jeunes sujets. Chez mademoiselle J*, il fut constamment plus fréquent, plus serré que dans l'état naturel, pendant sa maladie; qui dura cinquante jours, & qui étoit compliquée d'un rhumatisme articulaire.

Le dégoût, l'inappétence, l'aversion pour certaines substances végétales ou animales, & les divers symptômes qui se rapportent à l'abdomen ou à la poitrine, présentent de grandes variétés dans la fièvre muqueuse.

Cette fièvre est quelquefois continue, & ne s'étend pas ordinairement alors au-delà du vingt unième jour; on la souvent désignée dans ce cas, sous le nom de *fièvre catarrhale*. Le plus souvent cette même fièvre est rémittente, les paroxysmes n'ont rien de régulier, & reviennent cependant plutôt le soir & dans la nuit qu'à aucune autre époque de la journée. Plusieurs malades paroissent seulement alors éprouver un état véritablement fébrile, le pouls étant très-peu accéléré dans cette maladie. Cette évidence de la fièvre n'a pas lieu toutefois chez tous les malades au moment du paroxysme, qui se manifeste dans un grand nombre de cas, par l'augmentation ou l'apparition de quelques symptômes particuliers, tels que le mal de tête, la nausée, la vomiturition, la toux, une douleur continue des membres, &c.

Chez les jeunes sujets, les choses se passent autrement, & la fréquence du pouls est sensiblement

blement augmentée. Mademoiselle de J^{re}, dont le pouls dans l'état naturel donne de 80 à 86 pulsations par minute, en eut constamment 90 à 95 hors des accès, & 100 & même 110 pendant les paroxysmes; ce qui coïncidoit du reste avec la exhalation plus vive du visage, la gêne de la respiration, & les palpitations qui furent assez incommodes, pour exiger l'emploi de médicaments particuliers.

La fièvre muqueuse rémittente cesse rarement avant le quatrième jour, & va bien souvent au-delà de ce terme. En effet, la maladie de Gléonade, comme nous l'avons vu, ne se termina que le quatre-vingtième jour. Chez madame d'A^{lle}, la même maladie, qui ne se trouva terminée que le cent unième jour, fut suivie d'une convalescence qui dura plus de quatre mois.

Différens phénomènes, que l'on regarde comme des symptômes critiques, se montrent dans le cours de la fièvre muqueuse pendant un temps plus ou moins long, & à diverses époques de sa durée; telles sont les urines qui déposent un sédiment tantôt laqueux, tantôt pulvérulent, blanchâtre, muqueux, & même quelquefois d'apparence purulente, du neuvième au vingt-troisième jour, lorsque la fièvre n'est pas rémittente.

Les urines, dont le dépôt est muqueux & comme chargé d'un sédiment pulvérulent & blanchâtre, se manifestent quelquefois dans la fièvre muqueuse rémittente dès le douzième ou le quinzième jour de la maladie, dont elles deviennent alors un des principaux symptômes: elles peuvent persister dans cet état, avec une constante régularité, pendant plus de vingt, trente & même quarante jours. La maladie dès-lors ne fait plus de progrès, les paroxysmes même diminuent, mais elle ne s'en prolonge pas moins pendant plusieurs semaines. La disparition momentanée du sédiment est toujours l'effet d'un dérangement, d'une perturbation, & se trouve accompagnée de quelques symptômes défavorables, ou de la simple augmentation des paroxysmes, ce qui change tout-à-coup lorsque le sédiment pulvérulent commence à reparaitre. J'ai vu ce même sédiment, enveloppé dans une mucoité d'apparence puriforme qui trompa plusieurs consultants, se manifester pendant plus de soixante jours, chez une malade dont la fièvre muqueuse, occasionnée par des chagrins violents & prolongés, avoit d'ailleurs été précédée d'un catarrhe aigu & inflammatoire de la vessie.

La diarrhée, une espèce de dysenterie pituiteuse, terminent aussi souvent la fièvre muqueuse chez les enfans. Dans d'autres circonstances, cette même terminaison est précédée, & comme amenée, par une éruption miltaire, du dixième au vingtunième jour; par des sueurs abondantes d'une odeur âcre, avec gonflement des mailloles, ou onzième au dix-septième jour, & par une expectoration muqueuse, ou une salivation, du neuvième au onzième. Des vomissemens spontanés, un dévelop-

pement considérable de bontons aphteux, & même une ulcération gangréneuse de la région lombaire, se sont montrés aussi en suite des phénomènes critiques dans la fièvre muqueuse.

La fièvre muqueuse peut devenir une maladie très-dangereuse; & se terminer d'une manière funeste; ce qui dépend de son intensité, des développemens de cette fièvre dans la circonstance où elle a régné d'une manière épidémique; des phlegmasies locales qui s'y sont jointes dans ces circonstances; enfin, des complications diverses qui ont ajouté alors à la gravité; telle fut la plus souvent la marche de cette maladie dans l'épidémie de Gortingue, dont nous avons parlé. Avant son apparition, cette ville avoit déjà souffert depuis long-temps tous les maux inséparables d'un siège prolongé. L'air, les alimens avoient manqué; toutes les conditions nécessaires à l'entretien de la vie furent négligées; le découragement, l'inquiétude, les misères morales de tous genres avoient aggravé le malheur d'une pareille situation. Depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, le ciel fut presque toujours couvert, pluvieux; avec des alternatives du vent de nord; une dysenterie épidémique s'établit dans cet état des choses, & fit place, en novembre, à une épidémie de fièvres muqueuses, qui occasionna une grande mortalité, soit par l'aggravation de ses symptômes, soit par ses complications.

Dans tous les cas où les symptômes de la maladie furent portés à un haut degré, l'altération & l'augmentation de la sécrétion muqueuse offrit une grande intensité, à la bouche, aux gencives, à la surface interne de l'estomac & du duodénum. Chez les malades qui succombèrent dans cette occurrence, on reconnoit les traces de ce désordre morbide, à des congestions plus ou moins abondantes, de matière visqueuse parfois très-épaisse, & qui auroit été évidemment secrétée par les cryptes ou follicules; ces follicules eux-mêmes étoient beaucoup plus développés que dans l'état naturel, & se faisoient aisément apercevoir à la surface du duodénum & de l'estomac, lorsque l'on avoit écarté la couche de mucoité qui les recouvroit, & qu'ils avoient formé (1).

Dans tous les cas où cette prédominance muqueuse s'est manifestée, les malades furent tourmentés par différentes espèces de vers, dont l'abondance des voirs digestives, & peut-être une altération particulière des mucoités, parurent favoriser le développement. Un genre de vers trouvé comme nouveau, le *trichurus*, & que l'on trouva assez constamment dans le cæcum, attira surtout l'attention des historiens de l'épidémie de Gortingue. Les recherches anatomiques firent aussi

(1) Voyez pour ce genre d'altération dans Roderer & Wagler, de *morbo mucoso*, les différentes figures des plaques & 2, dans lesquelles le développement des follicules se trouve indiqué avec beaucoup de soin.

reconnoître chez les personnes qui succombèrent à la maladie muqueuse, & comme une disposition qui en rappelloit l'intensité, une grande quantité de granulations dans la substance du foie, & dans tout le conduit intestinal, une teinte bleuâtre; j'enlève regardée comme l'effet d'une inflammation du sa membrane muqueuse. Il est probable que chez un grand nombre de sujets on prit feu, pendant l'épidémie de Göttingue, plusieurs gastrites & plusieurs affections entéro-gastriques, pour la fièvre muqueuse, & que ces phlegmasies, d'une autre part, se développèrent & le montrèrent comme des épiphénomènes pendant le cours de cette maladie. (Voyez les observations de Roderer sur la dysenterie qui avoit précédé cette épidémie.)

Cette maladie, que l'auteur observa avec un si grand nombre de variétés & de modifications dépendantes d'une foule de causes individuelles, se termina souvent sous ses yeux, d'une manière faveuse, par des ulcérations ou la gangrène des intestins. L'engorgement des poulmons, les lueurs de la nuit & du matin, du neuvième au dix-septième jour, furent des événements favorables, ainsi que les vomissements ponctués ou provoqués, les déjections d'urines sédimenteuses, l'éruption aphteuse, la tuméfaction inflammatoire des gencives, les différents exanthèmes, & même les ulcérations au facien & au tréchantier.

Les complications qui ajoutèrent beaucoup à la gravité de la maladie, indépendamment de son intensité primitive, ces complications consistèrent des formes nouvelles à la fièvre muqueuse, que Wagner & Roderer présentèrent d'une manière assez peu philosophique, comme des espèces particulières & distinctes de cette fièvre.

Une des plus fréquentes fut la présence des vers, qui, en la considérant sous son véritable point de vue, n'auroit été regardée que comme un effet immédiat de la maladie, ou du moins comme un effet de différentes causes particulières & accidentelles, qui avoient amené des complications, en altérant le mode de sécrétion de la membrane muqueuse intestinale & des voies digestives.

De reste, dans la fièvre muqueuse, ainsi que dans plusieurs autres maladies aiguës, on doit soupçonner la complication vermineuse, lorsque l'on voit faire différentes affections irrégulières, qui pourroient aller quelquefois jusqu'à pouvoir être prises pour des symptômes de malignité & d'ataxie, si une observation judicieuse de l'ensemble de la maladie ne tenoit pas en garde contre une semblable méprise. Nous avons déjà remarqué que l'épidémie de Göttingue offrit, comme une de ses circonstances mémorables, le développement d'un nouveau genre de vers intestinaux, les *trichurides*, espèce de vers ronds que l'on trouva principalement dans le corpus, & sur laquelle Winsberg a longuement & inutilement disserté sans en recon-

noître la véritable nature ni les véritables effets, qui pourroient n'avoir rien de nuisible. Il n'en fut pas ainsi des *ascarides vermiculaires*, qui furent aussi très-fréquentes dans la première épidémie. Suivant M. le professeur Pinel, la rémittence vermineuse de Sillé, & la fièvre putride vermineuse maligne de Lepeque de la Cloture, doivent être rapportées à la fièvre muqueuse. (Voyez VERMINEUX (Affections) & VERS.)

Les autres complications qui augmentent la gravité de la fièvre muqueuse, & qui ne sont pas aussi directement liées à la nature de l'affection morbide qui la caractérise, sont différentes phlegmasies locales. Dans les circonstances d'une épidémie désastreuse, on conçoit très-bien que les symptômes de l'adynamie la plus effrayante, & ceux de l'ataxie la plus variée, peuvent se développer aux différentes époques de la maladie. Chez mademoiselle J..., qui eût peine convalescente en ce moment d'une fièvre muqueuse, fièvre qui a été associée, depuis son début jusqu'à sa terminaison, à un rhumatisme articulaire qui attira d'abord toute mon attention, ce ne fut que du septième au neuvième jour, que je reconnus une fièvre muqueuse rémittente; cette fièvre suivit une marche très-régulière, & se fut entièrement terminée que vers le cinquième jour après la disparition soignée du dépôt pulvérulent & muqueux des urines dont j'ai parlé. Il est probable que cet état des urines n'a pas été le seul phénomène critique de cette maladie, & qu'il se fit en outre, & peut-être lors l'influence d'une phlegmasie latente, une congestion séreuse dans toute l'étendue du côté droit de la poitrine. Je sus conduit du moins à cette idée, par ce qui arriva au commencement de la convalescence: on vit alors avec autant de surprise que de chagrin, que la taille de cette jeune personne avait été éliminée entièrement; que ses épaules se portèrent en avant, que le côté droit de la poitrine étoit beaucoup plus développé; que l'épaule gauche étoit plus élevée que celle du côté droit, & qu'enfin l'épine dorsale s'infla en outre une déviation remarquable. La poitrine ayant été soigneusement percute dans cette exploration, on aperçut que le côté droit rendait un son mat dans toute son étendue, & qu'il étoit difficile de ne pas rapporter ces symptômes à une congestion séreuse de ce côté; genre de complication qui, d'ailleurs, n'est pas sans exemple dans les rhumatismes articulaires chez les sujets d'un tempérament lymphatique très-prononcé.

Quoi qu'il en soit, le son mat dont je viens de parler a probablement moins sensible dans la suite à un nouvel examen. Il est probable qu'avant deux mois une résorption complète aura eu lieu, & que la poitrine résorbera de ce côté comme du côté gauche; amélioration que favorisera l'emploi des moyens que l'on met d'ailleurs en usage pour arrêter la gibbosité.

Le traitement de la fièvre muqueuse est entiè-

rement subordonné à l'intensité, aux complications de la maladie, à la nature des causes qui l'ont amenée avec plus ou moins de lenteur, en agissant sur la peau ou sur les voies digestives.

Tout ce qui peut exciter l'action de cet organe & rétablir la perspiration, les frictions sèches, les bains de vapeur, les bains stimulans, & que l'on pourroit faire à domicile avec addition de savon sulfuré gélifèreux, sont indiqués à toutes les époques de cette maladie, & doivent être mis en usage dans tous les cas où le médecin peut disposer avec liberté de toutes les ressources thérapeutiques.

Les vomitifs avec le tartre antimonié de potasse, donnés d'abord avec discrétion, sans l'emploi ou avec l'emploi préalable d'une émission sanguine, locale ou générale, m'ont paru souvent très-utiles dans ma pratique. Dans le plus grand nombre de cas, les malades, dans la fièvre muqueuse, ne peuvent supporter les émulsions animales, ni les émulsions & décoctions végétales, mucilagineuses.

On leur substitue avec succès, dans cette circonstance, l'eau vineuse, les infusions amères ou un peu aromatiques, & quelques *fortitions* alimentaires légèrement stimulantes. J'ai vu plusieurs malades ne supporter, pendant tout le cours de cette maladie, que de l'eau de tilleul pour boisson, & deux jattes d'eau crues & acidulés pour tout aliment pendant chaque journée.

Les symptômes nerveux qui se renouvellent à chaque paroxysme chez quelques personnes, doivent être l'objet d'une médication particulière pour une des maladies déjà citées. J'ai employé constamment avec succès la potion suivante, dont on prenoit la moitié au premier signe d'horripilation, & le reste par cuillerée à bouche de moment en moment.

℞. Eau distillée de laitue.....	℥iv.
Eau de menthe poivrée.....	j.
Sirop de karabé.....	℥ss.
Extr. de jusquiame blanche....	grain.

Mélez selon l'art pour potion.

Tout sert ou tout nuit, suivant l'occurrence & les particularités individuelles. Une demoiselle âgée de quarante ans ne put prendre pendant les vingt premiers jours de la maladie qui nous occupe, que du lait & la glace, son estomac rejetant tout autre aliment avec les plus douloureuses anguilles. La langue fut rouge à sa pointe, vers ses bords, & décolorée dans toute son étendue, comme dans les fièvres scarlatinales les plus prononcées. Vers le troisième jour, le désir de calmer l'irritation gastrique, que je supposais se rattacher à une disposition rhumatismale antérieure de la maladie, me fit administrer sous forme d'essai, & avec l'idée d'un bien faible succès, une poudre composée d'un demi-grain de magnésie décarbonatée & de six grains de poudre tempérante. Le résultat fut beaucoup au-

delà de mes espérances & de mes conjectures : dès la première prise de ces poudres, l'état morbide de l'estomac fut sensiblement calmé, & mademoiselle de V***. put prendre du bouillon, sans d'ailleurs abandonner le lait. Des évacuations critiques s'établirent & furent entretenues par le même moyen renouvelé deux & trois fois en vingt-quatre heures. Il ne fut d'ailleurs employé aucun autre médicament pendant tout le cours de la maladie, qui dura environ cinquante jours.

Dans le plus grand nombre des cas, les purgatifs énergiques sont indiqués vers la fin & au commencement de la convalescence des fièvres muqueuses, surtout lorsque l'on peut supposer des engorgemens pituitaux ou séreux, des inflammations chroniques & latentes, qui ne peuvent se dissiper que par les dérivatifs; telle m'a paru la position particulière d'une mademoiselle de J***, qui depuis la convalescence a été déjà purgée trois fois avec force, avec l'huile de ricin, dans l'espoir qui me parut très-fondé, de favoriser la résorption de la collection séreuse du côté droit de la poitrine.

De reste, si l'on pouvoit s'arrêter à des maximes, à des vues générales, dans le traitement d'une maladie où tout doit être rapporté aux variétés individuelles des malades, ce seroit pour prescrire, dans le plus grand nombre de ces expectations rationnelles, l'éloignement des excitans un peu énergiques, qui sont si rarement indiqués, même dans tous les cas qui se montrent avec l'apparence d'une adynamie; ce seroit encore pour recommander en même temps la médecine appropriée à tous les cas particuliers, la médecine rationnelle du symptôme, la seule peut-être qui seroit véritablement utile lorsqu'elle est faite par des hommes qui unissent à une grande expérience, des données positives d'anatomie & de physiologie médicales.

La fièvre quarté & la fièvre quotidienne, qui ne peuvent se rapporter à la fièvre muqueuse, se rattachent à la vérité, dans un grand nombre de circonstances, à une disposition morbide analogue; mais cette circonstance d'être périodiques, de pouvoir être prévenues dans leurs retours ultérieurs, & de mettre en évidence, sous ce rapport, les propriétés presque spécifiques & comme antiques de la quinquina; cette circonstance, dis-je, est si importante, qu'il est presque impossible, en s'attachant aux vues pratiques, de ne pas faire une catégorie à part des fièvres intermittentes, lors même que ces fièvres n'auroient pas été observées plusieurs fois dans une indépendance absolue des états morbides auxquels on attribue les fièvres bilieuses & la fièvre muqueuse. (Voyez PÉRIODIQUES, TIERCE (Fièvre), & les articles particuliers QUARTE, QUOTIDIENNE (Fièvre).) (L. J. M.)

MUQUEUX, adj. (Flaxion). (*Nasographie*.) Synonyme de catarrhe, qui a été omis dans ce Dictionnaire, & que l'on traduit dans la langue vul-

naire, par le mot *rhum*, auquel on n'attache toutefois que l'idée d'un catarrhe récent & passager, en regardant comme catarrhe proprement dit, tout rhume qui toute fluxion muqueuse qui devient chronique ou qui se montre avec des caractères inflammatoires.

Les catarrhes ou fluxions muqueuses, que nous croyons devoir distinguer des phlegmasies des membranes muqueuses ou folliculaires, consistent dans une simple augmentation de sécrétions dans certaines régions de ces membranes, & principalement dans les fosses nasales, dans la trachée-artère, par exemple, dans les bronches, les voies pulmonaires & digestives, dans le vagin, la vessie, le canal de l'urètre.

Les plus fréquentes sont celles des fosses nasales & des voies pulmonaires, qui peuvent survenir par la seule impression du froid, & lorsque la perspiration cutanée est dérangée par cette impression : alors la sécrétion muqueuse de quelques points de ces organes est tout-à-coup augmentée, le plus souvent sans inflammation, & quelquefois il suffit, pour arrêter une pareille fluxion, de faire usage d'une puissante dérivation, d'un bain de jambes très-chaud & très-excitant, d'un purgatif ou d'un sudorifique très-énergique.

La sécrétion muqueuse, & surtout l'exhalation, peuvent également se trouver augmentées tout-à-coup, & d'une manière considérable. J'ai rencontré quelquefois, dans l'exercice de la médecine, certaines personnes tellement sensibles à cette impression, qu'il leur étoit impossible de l'éprouver, sans avoir tout-à-coup, les uns, un flux nasal très-abondant, & les autres, un catarrhe utérin non moins considérable, sans caractère inflammatoire d'ailleurs, & pouvant aisément se guérir dans l'espace de deux ou trois jours, avec la vésicalité du lit, associée à un traitement dérivatif & tonique.

L'action des purgatifs très-doux, & surtout l'action des purgatifs qui semblent exciter plus particulièrement l'exhalation muqueuse, sans rien changer à la sécrétion folliculaire, doit être regardée comme un phénomène analogue à ces fluxions accidentelles, qui présentent une augmentation de sécrétion non inflammatoire.

La nature des affections catarrhales, comme celle du plus grand nombre des phénomènes morbides, a été pendant longtemps tout-à-fait inconnue, dans certaines théories si peu scientifiques d'ailleurs, & que l'on retrouve entièrement couvertes dans la manière populaire de concevoir ces maladies. L'apparence ayant détourné les esprits de la réalité, dans ces phénomènes, l'effet a été pris pour la cause, & alors on n'a vu dans les différentes fluxions muqueuses, que la pituite ou l'humeur catarrhale, sans soupçonner même qu'elle pouvoit être subordonnée à un changement dans l'action des parties qui la rejettent, ou dont elle dérangeroit les fonctions par

la formation ou la présence : méprise à laquelle les praticiens éclairés n'ont pu se soustraire, avant l'époque où les progrès de l'anatomie & de la physiologie médicales ont conduit à quelques idées exactes sur la nature des sécrétions & des excrétions.

Hippocrate, dont toutes les connoissances anatomiques & physiologiques se trouvoient réduites aux simples aperçus des apparences extérieures du corps, & aux petits nombres de corollaires qu'il est possible d'en déduire, faisoit venir la pituite ou l'humeur catarrhale, des membranes du cerveau, ne connoissant en aucune manière la structure interne des fosses nasales & des sinus de la face : erreur, ignorance, qui se sont perpétuées parmi les personnes entièrement étrangères aux sciences naturelles, & qui continuent à continuer sans doute pendant long-temps, d'appeler *rhum* de *cerveau*, la fluxion muqueuse des narines, qui s'étend quelquefois aux sinus frontaux & aux sinus maxillaires.

Galen & la nombreuse école d'éloignement de plus en plus de la véritable nature des choses, dans leurs opinions sur les nombreuses altérations de la pituite, auxquelles ils rapportoient un système général de pathologie.

Schneider, qui reprit ces vaines & puériles questions avec un détail si fastidieux, vers le milieu du dix-septième siècle, traita très-sérieusement de l'origine ou de la source du catarrhe, qu'il continua de rapporter au cerveau ; examinant la question de savoir, si la tête ne doit pas être comparée à un chapeau d'alambic, réunissant toutes les conditions nécessaires pour attirer de son côté les humeurs du reste du corps (1).

M. le professeur Pinel fut le premier, ou l'un des premiers, qui porta des yeux plus saines dans l'examen du flux muqueux ou des affections catarrhales, mais en négligeant de distinguer celles de ces fluxions qui résistent nécessairement d'une véritable inflammation, dont elles deviennent alors le principal symptôme, des fluxions qu'un excès plus modéré provoque, & dans plusieurs circonstances, & sans se manifester autrement, que par une augmentation de sécrétion.

Du reste, les fluxions muqueuses ne peuvent être traitées sous un point de vue général, & nous devons renvoyer, pour l'examen particulier de ces fluxions les plus fréquentes, aux articles *NOSE*, *NASTR* (Catarrhe), *PULMONAIRE* (Catarrhe), *UTERUS* (Catarrhe de l'), *VAGIN* (Catarrhe du), *VESIE*.

L'embarras gastrique, sans fièvre, doit aussi être regardé comme une augmentation de sécrétion muqueuse, accompagnée, sans doute dans le plus grand nombre des cas, d'une altération plus ou moins grande du fluide sécrété, qui occasionne l'inappétence, des digestions laborieuses,

(1) Schneider, de *catarrhis*, ann. 1670, 5 vol. in-4.

ou même plusieurs symptômes plus étendus, plus généraux, si le dérangement sécrétoire est plus considérable. Chez quelques personnes, cet embarras gastrique se montre souvent avec les caractères d'une fluxion muqueuse beaucoup plus marquée, & se manifeste dans les mêmes circonstances avec les mêmes préliodes, la même marche, la même durée qu'un rhume-ordinaire de la trachée-artière ou du poulmon, qu'elle paroît quelquefois remplacer dans ces circonstances.

Cette remarque s'applique à l'embarras intestinal, mais surtout à la diarrhée dite *diarrhée catarrhale*, qui, quoique très-douloureuse, n'a souvent rien d'inflammatoire, & se guérit très-promptement par l'usage du médicament qui réunit au plus haut degré, la propriété calmante ou hypnotique, & à la propriété de réprimer & même de faire cesser les sécrétions morbides lorsqu'elles ne dépendent pas évidemment d'une phlegmasie. (L'opium & ses différentes préparations.)

Les affections catarrhales & les phlegmasies des membranes muqueuses, paroissent avoir été beaucoup moins communes chez les Anciens que chez les Modernes. Les médecins & les philosophes qui ont été frappés de cette différence dans la complexion physique de l'homme, ont vu l'expliquer de diverses manières.

Il ne peut entrer dans nos vues d'exposer ni de discuter leurs opinions. Le climat, les mœurs, l'état de la société, certaines particularités dans le régime, les habitudes diététiques, nous paroissent expliquer assez naturellement ces différences.

Le petit nombre de nations que nous appelons les *Anciens*, vivoit en général sous un ciel plus doux, dans un climat surtout moins froid, moins humide que le climat & la partie de la plupart des peuples modernes. La manière de faire la guerre, les exercices variés en plein air, ce qui comprenoit la gymnastique; l'usage plus fréquent, plus général des bains & de la natation; les résolutions à cet ordre de choses qui rendoit nécessairement la peau moins irritable, moins susceptible, moins inébranlable en quelque sorte, au milieu des intempéries atmosphériques; ce qui devoit nécessairement diminuer le nombre & la fréquence des affections catarrhales; ajoutons que les Anciens appliquoient les tissus de laine ou de coton, aux usages pour lesquels les Modernes emploient les lins de chanvre & de lin; disons aussi que les Anciens ne portoiént pas, comme les Modernes, sur différents points des membranes muqueuses, cette multitude de stimulans qui ont étendu la sphère de leur activité & de leurs fonctions. Il ne paroît pas même qu'ils aient connu l'usage particulier de nos mouchoirs, & cette seule circonstance, qui semble au premier aperçu peu importante, se rattache à l'une des principales dispositions de leur complexion physique. L'usage de sauer, d'appli-

quer du tabac en poudre à la surface des narines, cet usage qui leur fut également étranger, a beaucoup contribué à rendre certaines affections muqueuses beaucoup plus fréquentes & plus fortes.

La syphilis & l'usage très-fréquent du mercure, dans la pratique de la médecine, ont été admis aussi parmi les causes qui ont pu concourir à donner une véritable prédominance aux fonctions & aux maladies des membranes muqueuses chez les Modernes; ce qui paroît tout-à-fait hypothétique; une circonstance semblable ne pouvant avoir, sous ce rapport, qu'un effet très-incertain & très-éloigné.

Voyez, pour le développement de cette opinion, le *Traité des fièvres* de Grimaud, & son *Mémoire sur la nutrition*.

Consultez aussi, pour l'ensemble de la même question, Cabanis, sur les *affections catarrhales*, & son *Mémoire* de M. Gaillard, couronné par l'Académie de Dijon, sur les causes qui ont modifié la constitution physique & médicale, chez les peuples anciens & modernes (1805).

Le traitement des fluxions muqueuses ne pourroit être que très-difficilement ramené à des indications générales: plusieurs de ces fluxions, soit dans les fosses nasales, soit dans les voies pulmonaires, sont toujours accompagnées, surtout à leur début, d'une irritation quelconque inflammatoire, ou même d'ulcère fibreux. On ne peut alors leur opposer que les purgations douces & dérivatives, un régime plus sévère, la diète, du lit, & tout ce qui peut favoriser ou rétablir la perspiration cutanée, les émissions calmantes & mucilagineuses.

Un catarrhe subtil des fosses nasales ou même des voies pulmonaires, est souvent arrêté, & comme enrayé dans sa marche, par un ou deux purgatifs très-rapprochés, & des pédiluves très-chauds & très-stimulans, répétés jusqu'à trois ou quatre fois par jour, à moyen que l'on fait présenter avec avantage, de quelques évacuations sanguines pour les sujets plus réceptifs.

Les muciques, données sous forme d'opiat, & combinées avec un terre de fleurs de soufre, doit être prescrite comme purgatif, dans cette espèce de médication, lorsque le quartier survenant chez un individu qui a souvent éprouvé des affections rhumatismales, ou dont les ascendans paternels ont-mémefois ont eu beaucoup à souffrir de la goutte & de les affections.

Dans tous les cas où la toux est fréquente, forte, convulsive, & sans rapport avec l'expectoration, il importe de la combattre, soit avec différentes préparations d'opium, soit avec la jusquiame, soit avec l'acide prussique préparé pour l'usage médical, & suffisamment étendu d'eau une certaine quantité d'eau distillée. Ces moyens donnés seuls, demeurent quelquefois sans succès, & dans quelques cas il suffit de les combiner avec quelques autres médicaments pour les rendre

rendre très-efficaces. Dans un de ces cas, & après avoir inutilement essayé, presque sous toutes les formes, les moyens les plus propres à combattre une toux convulsive, qui revenait par des accès tellement violents, que la vie du malade en paroîtloit menacée, je la fis entièrement cesser avec des pilules composées chacune de quatre grains de la masse pilulaire, dite de *cynoglosse*, & d'un grain de mûle, données à la dose de deux ou trois, & même de quatre pilules, dans l'espace de vingt-quatre heures.

Les narcotiques, mais surtout les préparations d'opium, sont contre-indiquées, en général, dans les fluxions muqueuses peu abondantes de la trachée & des voies pulmonaires, chez les individus d'une constitution sèche & bilieuse, qui expectorent & crachent très-peu dans l'habitude de la vie, qui paroissent exister sous l'influence d'une irritation morbide, sensiblement acrimonieuse, & dont les catarrhes, en général, ne peuvent se terminer que par une expectoration qu'il importe bien moins d'arrêter, que de rendre plus facile & plus abondante.

Les mêmes moyens, seuls ou combinés avec les résineux (la térébenthine cuite, le baume du Canada, le baume du Pérou), conviennent au contraire, dans les circonstances où l'abondance de la fluxion muqueuse, qui se trouve le symptôme principal de la maladie, contribue évidemment à détruire les forces & à diminuer l'embouppement du malade.

Les semences de *phellandrium*, associées à l'extrait de ciguë, paroissent avoir une utilité particulière, & que nous avons quelquefois reconnue, dans les affections catarrhales pulmonaires, qui se joignent avec une certaine gravité, à la phthisie tuberculeuse.

La thériaque, quelle que soit la nature, ses effets & l'opinion des détracteurs de ce vieux arcanum, est le moyen peut-être le plus efficace que l'on puisse employer, soit pour modérer le catarrhe chronique, soit pour en prévenir les redoublements, surtout pendant les temps humides, chez les sujets foibles, plus irritables que sanguins, & dont la peau trop sensible est continuellement ébranlée dans ses fonctions. Celui qui fait cette remarque, a éprouvé sur lui-même ces heureux effets de la thériaque, pendant plusieurs années, dans un catarrhe pulmonaire chronique, qu'il n'a pas entièrement détruit, mais qu'il a continué de combattre & d'affoiblir chaque jour, par le même moyen & avec le même avantage.

L'habitation pendant plusieurs heures de la journée, au milieu d'une atmosphère chargée de vapeurs de goudron, que l'on entretient par l'évaporation prolongée de cette substance, produit également des effets très-utiles contre le catarrhe pulmonaire. (Voyez PULMONAIRE (Catarrhe).)

Toutes les diarrhées simples, les dysenteries qui ne sont plus à leur début ou qui se prolongent

sans fièvre, sans inflammation, qui sont augmentées tout-à-coup, après l'ingestion des aliments, doivent être attribuées à une augmentation morbide de sécrétion rasselée que l'on fera toujours cesser promptement, en ramenant la sécrétion à son rythme naturel, d'abord par l'abstinence, & ensuite par les opiacés, mais surtout par les opiacés associés aux résines & aux stimulans dissolubles.

J'ai vu rarement la potion suivante manquer d'efficacité dans ces occurrences.

℥. Eau distillée.....	℥vj
Sirop d'œillet.....	℥ij
Laudanum liquide.....	24 gout.
Elixir de propriété blanc de Paracelse.....	3 j

Pour prendre avant le repas, à la dose de deux ou trois cuillerées à bouche, seules, ou dans un petit verre de vin d'Espagne.

On connoît les avantages du baume de Cepahu, dans les bleunorrhagies chroniques sans nécrasation & sans inflammation, mais entretenues par une simple augmentation morbide de la sécrétion muqueuse du canal de l'urètre. On fait aussi que la térébenthine n'a pas été essayée avec moins d'avantage, & même à des doses très-considérables dans le traitement du catarrhe de la vessie, également indépendant de toute inflammation, de toute lésion organique, & qui est assez rare. (Voyez Térébenthine), & consultez la Dissertation de M. Avicard, qui a recueilli, au sujet de ce médicament, des observations faites à l'Hôtel-Dieu, dans les salles de clinique de M. le docteur Hufsch.

Les fluxions muqueuses, constitutionnelles ou chroniques, exigent souvent un traitement préventif très-efficace.

Les bains de mer, les eaux hydrosulfureuses artificielles ou naturelles, quelques toniques dissolubles, sont la base de ce traitement, qui doit avoir essentiellement pour objet, de rendre la peau moins susceptible & plus propre à une sorte de réaction régulière, au milieu des changements de l'atmosphère.

Voyez, pour plus de détail, pour ce qui concerne les fluxions muqueuses ou catarrhales, les mois FORGES MARIALES (Catarrhe des), OPATHALMIE ATROPHIQUE; OREILLE (Catarrhe de l'); PULMONAIRE (Catarrhe pulmonaire simple), SITUUS DE LA FACE; URÈTÈRE (Catarrhe de l'), VAGIN (Catarrhe du), improprement *catarrhe utérin*, VESSIE (Catarrhe de la), &c. &c.

MOQUEUSES (Membranes). (Anatomie générale. Pathologie.) Grande division des membranes folliculeuses de M. Chaussier; membranes villoses, du même auteur; tuniques spongieuses des différents viscères creux; des anciens anatomistes.

Les médecins français, vers la fin du dix-huitième siècle, ont commencé à désigner sous le nom de membranes muqueuses, l'ensemble des tuniques

Ecc

qui recouvrent, en y adhérant par un tissu lamineux, la surface interne des viscères : oreux & de plusieurs autres organes, à peu près comme la peau revêt l'extérieur du corps, en lui servant d'enveloppe générale.

L'identité, ou du moins une grande analogie entre les phlegmasies qui se manifestent dans les différentes régions du système muqueux, & que l'on regardoit comme des maladies très-différentes les unes des autres, paroit avoir été aperçue pour la première fois par M. le professeur Pinel. Cette identité conduisit à l'idée d'une similitude non moins remarquable entre la structure, les fonctions de ces membranes, & bientôt les recherches anatomiques & physiologiques donnèrent à cet aperçu tous les caractères d'une véritable démonstration. (Voyez le *Traité des membranes*, de Bénédict.)

L'hiloire des membranes muqueuses doit être regardée, dans l'état présent des connoissances, comme une des parties de l'anatomie & de la physiologie qui présente un plus grand nombre d'applications à l'étude détaillée & positive des phénomènes pathologiques. Ainsi, la diversité de structure de ces membranes, dans les différentes régions du corps, les parties qui les constituent, & principalement ce que l'on peut regarder comme leur chorion ou derme; la continuité, les rapports de ce derme avec les toniques musculaires dans plusieurs viscères; les follicules ou cryptes placés au-dessous ou dans l'épaisseur du chorion, & qui sont si développés à la surface des bronches, du palais, de l'œsophage, & des intestins; les papilles nerveuses, qui sont également plus apparentes dans certaines parties; enfin, une multitude de nerfs, une multitude de vaisseaux sanguins qui présentent des dispositions particulières, nous offrent différents points d'anatomie générale, dont le développement doit toujours être présent à l'esprit, lorsque l'on veut approfondir plusieurs questions importantes de physiologie médicale & de pathologie générale. (Voyez ce mot, dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*.)

De reste, ces différentes parties constitutives des membranes muqueuses, ont présenté souvent plusieurs altérations morbides qui méritent d'être remarquées avec le plus grand soin.

Les irritations prolongées, sur différents points de la surface de ces membranes, ont souvent occasionné le développement de plusieurs tissus morbides; du squarre, par exemple, de différentes fongosités; de fausses membranes. On attribue aussi à la même cause, des mucosités particulières que l'on peut regarder comme des dispositions vermineuses, puisqu'elles coïncident constamment avec la présence de vers dans les intestins, & qu'elles sont détruites par les médicaments, qui changent ce mode de sécrétion morbide. Le chorion s'épaissit sensiblement à la suite des inflammations, & surtout des inflammations

chroniques; il s'amincit progressivement & se détruit, aussi que les autres tissus des viscères membraneux dont il fait partie, dans les érosions qui anéantissent les perforations spontanées de l'estomac; phénomène moribonde qu'il est si important de ne pas confondre avec les effets des empoisonnements.

L'irritation de la tunique muqueuse dans la dysenterie, & la communication de cette irritation à la tunique musculaire, expliquent les commotions, les contractions du colon, ainsi que le ténisme, souvent si incommode & assez grave pour qu'il soit nécessaire de porter de ce côté des moyens de traitement, en faisant usage des opiacés en potion, en lavement, en applications extérieures.

Les cryptes ou follicules muqueux de la bouche se lésistent & perdent leur faculté sécrétoire par l'abus de la pipe, par l'usage de mâcher du tabac; ils peuvent, en outre, devenir le siège d'une altération particulière, surtout aux amygdales où ils s'enflamment, en donnant lieu à des douleurs vives ou moins vives, & à une sécrétion morbide dont le résidu se détache & est rejeté tantôt sous la forme d'une matière pulvérulente, & tantôt sous la forme d'une fausse membrane.

Les aphthes, qui ont beaucoup d'analogie avec cette affection, & que l'on pourroit regarder jusqu'à un certain point comme la dartre ou l'herpès des membranes muqueuses, se couvrent après une première période, ou période d'irritation, d'une pellicule blanchâtre, que Jurine de Genève a rapportée aux fausses membranes.

La sécrétion de ces mêmes follicules dans les voies digestives & l'exhalation muqueuse, paroissent susceptibles, d'une autre part, d'un grand nombre d'altérations & de variétés qui coïncident tantôt & seulement avec de simples indispositions, avec des anomalies constitutionnelles, & tantôt avec un état prononcé de maladie. La conspication en particulier est souvent l'effet d'une sécrétion insuffisante des mucosités intestinales; ce qui est surtout très-évident dans la conspication qui succède chez le plus grand nombre des individus à l'usage des rélineux, des substances balsamiques & opiacées.

Les différentes espèces de purgais ne paroissent pas, d'ailleurs, agir également sur l'exhalation muqueuse & sur la sécrétion folliculaire des intestins: les uns, par exemple, excitent plus particulièrement l'exhalation & déterminent une excrétion très-abondante de sérosités; tels sont plusieurs eaux minérales salines, & quelques drastiques, principalement ceux que l'on a désignés sous le nom d'*hydragogues*. Les autres paroissent, au contraire, exciter avec une sorte de préférence la sécrétion folliculaire, ainsi que l'annoncent les déjections plus épaisses qui succèdent à leur action, ce qui est plus particulièrement remarquable pour l'aloë & la rhubarbe.

Les vaisseaux sanguins qui sont plus ou moins nombreux dans les différents points des membranes

muqueuses, paroissent beaucoup plus développées dans ces membranes, à la surface des gros intestins, de l'estomac, des intestins grêles, &c.; ce qui explique la rougeur de ces parties. On conçoit aisément par ces dispositions, combien les congestions sanguines doivent être faciles & fréquentes à la surface de ces viscères, & comment, d'une autre part, ces réseaux vasculaires des membranes muqueuses, privés de points d'appui, sont exposés à se rompre facilement dans les efforts pour tuerse ou pour vomir, & dans la fluxion catarrhale inflammatoire qui constitue la dysenterie. Le nombre de ces vaisseaux dans les mêmes membranes, la multitude, la délicatesse des nerfs qui accompagnent ces vaisseaux, l'activité de composition qui en résulte, & qui se manifeste par une exhalation & une sécrétion presque continuelles, quelquefois très-abondantes; ces dispositions sont aisément concevoir comment, dans le cas d'irritation prolongée, un si grand nombre de tissus morbides se développent dans l'intérieur des fosses nasales, de l'estomac, des intestins, de la vessie, &c. &c.

Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces tissus. Parmi les plus fréquents, on doit placer les fausses membranes ou pseudomembranes : il paroîtroit même que dans certaines circonstances il se formeroit à *posteriori*, des membranes muqueuses accidentelles, dont l'analogie avec les membranes muqueuses naturelles, fut aperçue d'abord par Hunter, reprise ensuite & démontrée par M. Dupuytren dans ses leçons. Bayle s'étoit également occupé du même objet (1), & M. Villermé s'exprime ainsi qu'il suit, sur ce point si important de l'anatomie pathologique.

Membranes muqueuses accidentelles.

- C'est dans certains kystes, dans certains dépôts purulents, au milieu des surfaces muqueuses naturelles elles-mêmes, mais surtout dans les trajets fistuleux, qu'on observe les membranes muqueuses accidentelles.
- A. *Dans les fistules.* Lorsqu'une voie accidentelle est ouverte au dehors ou dans quelque une des cavités muqueuses, à un liquide, & que ce liquide, habituellement charrié par la voie insensible, l'entretenant, celle-ci prend les caractères des conduits muqueux naturels. Aux bourgeons charnus, produits d'abord par l'inflammation, succèdent une surface, un tissu muqueux, puis une véritable membrane de ce genre, qui peut persister ensuite indépendamment de la cause qui l'a amenée.

• On dirait que l'économie est assujettie aux

mêmes lois, dans l'état pathologique, qui nous occupe actuellement, que dans l'état de santé, puisqu'en effet il suffit d'une excrétion confluente pour donner à son conduit les caractères des tuyaux excréteurs. Mais prouvons ce que nous avançons.

• La surface interne des fistules, outre les fluides qu'elle sépare, est en contact avec des matières qui lui sont étrangères. Ces matières sont ici de la lymphe, là de la salive, en cet endroit de l'urine, en cet autre des excréments, &c.; ou bien, & c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est du pus qui provient d'un foyer. (Poyez FISTULE.) Elle est continuellement humide, & comme veloutée au toucher, excepté où il y a des callosités. La couleur de cette surface n'est pas la même pour tous les trajets fistuleux : rose, plus ou moins vermeille lorsqu'elle présente l'apparence d'un état inflammatoire & qu'elle est récente, ou la voit, au contraire, blanchir par prendre une couleur plus pâle lorsque la fistule a livré passage, pendant quelque temps, à un liquide ou substance qui n'est pas du pus ni des matières stercorales. Entr'autres faits que je pourrois rapporter, qu'il me suffise de citer un homme qui, par suite de l'opération de la taille, avait une fistule urinaire directement étendue du fond de la vessie au périnée. La plaie, rouge d'abord, a pâli peu à peu, & trois mois & demi après l'opération, la surface interne de la fistule, du moins la portion de son trajet que l'on pouvoit apercevoir à l'aide d'une certaine position que prenoit le malade, étoit déjà blanchâtre & offroit presque l'apparence intérieure des uretères.

• Ce que je viens de rapporter suffit, ce me semble, pour établir que le trajet des fistules offre très-souvent, quand elles sont anciennes, & sinon une membrane, au moins une surface comme muqueuse. Dans les premiers temps, ou lorsque l'inflammation, l'irritation, continuent, il y a une surface muqueuse & non une membrane distincte; car alors son tissu se confond avec les parties sous-jacentes sous l'apparence d'une substance comme lardacée, plus ou moins roecailleuse, ordinairement traversée par un grand nombre de vaisseaux rouges & déliés.

• Plus tard, lorsque les fistules sont anciennes, non accompagnées d'inflammation & de callosités, elles ont véritablement une membrane qui offre la plus grande analogie avec les muqueuses naturelles, & qui est bien distincte, comme ces dernières, de ces parties qu'elle traverse, par un tissu cellulaire, comme fibrillaire, dans lequel je n'ai jamais aperçu sensiblement de graille.

• Dans un cas de fistule salivaire ancienne, j'ai trouvé que la membrane pouvoit être isolée avec beaucoup de facilité des parties voisines, & auxquelles l'unissoit assez lâchement un tissu semblable à celui dont je viens de parler.

Ecc 2

(1) Bayle, recherches sur la phlogistique pulmonaire, observations 43.

Poyez aussi LAMMEC, Dictionnaire des sciences médicales, tome VIII, page 300, & le Journal de médecine & de chirurgie de M. de Roux, tome IX, page 308.

» M. le professeur Dupuytren m'a dit avoir vu
 » plusieurs fois la membrane du trajet fistuleux
 » des dépôts par congéssion, être partout bien
 » distincte des parties environnantes: il a pu quel-
 » quefois renverser en dedans la membrane de
 » ces conduits, & en la poussant à la manière
 » d'un doigt de gant, la détacher & la séparer des
 » parties qui l'embrassoient, avec presque autant
 » de facilité que l'on enlève la peau de certains
 » animaux.

» La membrane que je décris peut devenir très-
 » mince dans les conduits fistuleux qui ne livrent
 » passage ni à du pus, ni à des matières irritantes.
 » Elle est le siège d'une exhalation marquée. La
 » matière de cette exhalation est du pus dans les
 » fistules récentes, dont la membrane n'est pas en-
 » core bien formée; mais plus tard, s'est souvent
 » un fluide semblable, au premier examen, en
 » quelque sorte, à ce que l'on appelle des glaires.
 » Quel chirurgien n'a vu les mucosités qui s'é-
 » chappent quelquefois d'une fistule à la marge
 » de l'aune, être augmentées, diminuées ou chan-
 » gées d'apparence ou de nature par l'introduction
 » de certaines substances? Je pourrais multiplier
 » les exemples de variations dans la perspiration
 » des conduits fistuleux, & ils porteroient égale-
 » ment à croire qu'il seroit très-aisé d'y déterminer
 » des espèces de catarrhe.

» Il me semble que l'on peut conclure de tous
 » les faits que je viens de rapporter :

» 1°. Que les bourgeons charnus qui résultent
 » du développement inflammatoire de la trame
 » cellulo-vasculaire aux surfaces des solutions de
 » continuité (lesquels sont partout identiques dans
 » leur origine), forment avec le temps, dans les
 » trajets fistuleux, une surface analogue à celle
 » des membranes muqueuses naturelles, & peu-
 » vent même se transformer en une véritable
 » membrane muqueuse bien distincte des tissus
 » sous-jacents;

» 2°. Que cette membrane muqueuse acciden-
 » telle se rapproche particulièrement, dans beau-
 » coup de cas, de la membrane intérieure des
 » conduits excréteurs.

» Ces conclusions pourroient encore être ren-
 » dues plus péremptoires par l'examen de l'énorme
 » différence qui se remarque entre la membrane
 » d'une fistule & celle d'une autre, & par la con-
 » sidération de la difficulté d'obtenir l'oblitéra-
 » tion des fistules anciennes, lorsque la seule cause
 » qui paroît les entretenir a été enlevée.

» Ajoutons à ces raisons, l'usage de donner pas-
 » sage aux fluides qui se forment au fond ou dans
 » le trajet des fistules, & que, conformément à
 » la loi générale, qui veut que l'habitude d'un
 » contact émousse les impressions qui en résultent,
 » l'on peut considérer jusqu'à un certain point la
 » membrane des conduits fistuleux, comme une
 » limite que la nature a placée sur le chemin des
 » fluides ou matières irritantes, pour préserver

» l'organisation des atteintes fâcheuses qu'elle
 » pourroit en ressentir.

» Croiroit-on que la membrane des conduits
 » fistuleux puisse, dans certaines circonstances,
 » être transformée en membrane séreuse? Lors-
 » qu'une fistule, qui est occasionnée par la pré-
 » sence d'une balle ou d'un petit plomb, se tarit
 » & se cicatrise, le corps étranger restant quel-
 » que temps au milieu des parties, l'espèce de kyste
 » qui l'enveloppe prend les caractères des mem-
 » branes séreuses. Je me suis assuré que le corps
 » étranger, souvent embrassé assez étroitement,
 » se trouve alors au milieu d'une matière ordi-
 » nairement peu abondante, & qui a quelque ap-
 »arence de celle des sératomes: j'ai cru recon-
 » noître l'apparence d'une membrane séreuse dans
 » la membrane (originellement muqueuse) d'un
 » kyste formé par l'oblitération d'un conduit ex-
 » créteur de la glande sublinguale.

» B. *Au milieu des surfaces muqueuses natu-
 » relles, ou dans les conduits muqueux eux-
 » mêmes.* A la suite des ulcérations de la bouche,
 » de la gorge, &c., & de certaines opérations
 » chirurgicales qui ont détruit une trop grande
 » étendue de membrane muqueuse pour que
 » celle-ci puisse revenir par le rapprochement
 » vers le centre fur toute la surface qui en a été
 » dépossédée, les bourgeons se convertissent à la
 » longue en une membrane muqueuse, qui se
 » continue & se confond avec la muqueuse pri-
 » mitive. On trouve deux exemples de cette
 » transformation dans l'*Essai sur l'anatomie pa-
 » thologique* de M. J. Cruveilhier (t. II, p. 170
 » & suiv.). Le paragraphe précédent éclaircit ce
 » phénomène.

» C. *Dans certains dépôts purulents.* L'intérieur
 » des dépôts par congéssion & des trajets qui y
 » charrient le pus, a une membrane accidentelle
 » bien évidente, même avant que le pus ne se
 » soit fait jour, ou qu'on le lui ait donné. Cette
 » membrane est ordinairement fort mince avant
 » l'ouverture du dépôt; après, elle rentre dans la
 » classe de celles des fistules dont il vient d'être
 » parlé.

» Quoique les fausses membranes se développent
 » le plus ordinairement à la surface des tissus séreux
 » & dans certaines circonstances très-rarement d'in-
 » flammation, on les voit aussi se former à la surface
 » des membranes muqueuses, plus rarement à la
 » vérité, & avec des caractères moins évidents d'orga-
 » nisation. Parmi ces membranes, celle qui a été le
 » plus fréquemment observée se rencontre dans le
 » croup (*voyez* TRACHÉALE ANOÏNE). On a trouvé
 » aussi des fausses membranes à la surface interne
 » des voies digestives, du larynx & de la trachéo-
 » artère, de la vessie, de l'utérus & du vagin. Ainsi,
 » on trouve en particulier un exemple rapporté par
 » Nysten dans les bulletins de la Faculté de Paris,
 » de la formation d'une fausse membrane, dans le
 » larynx & les bronches; phénomène qui avoit suc-

éclat à une inflammation provoquée par l'inspiration de l'ammoniaque pendant un accès d'épilepsie.

Les fausses membranes des voies digestives sont rendues dans les déjections ou par le vomissement, sous la forme de lambeaux ou de fragmens, que l'on prendroit pour des tubes inégalement déchirés, ce que le vulgaire & les médecins ont pris, pendant long-temps, pour des portions de la membrane interne des intestins. On trouve dans les *Annales de la Médecine pratique* un assez grand nombre de faits de ce genre, dont la véritable nature paroit n'avoir point échappé à la sagacité de Morgagni (Voyez *Épit. xxxi*). C'est principalement dans le cas d'empoisonnement par des substances irritantes & corrosives, que les concrétions membraniformes du tube digestif se sont développées, comme on pourra s'en convaincre en parcourant l'excellente Dissertation de M. Tarita, sur l'empoisonnement par l'acide nitrique. Il parroitroit même que la couleur de ces concrétions ne seroit pas sans analogie, sous quelques rapports, avec la nature du poison, & qu'elle pourroit offrir, sous ce point de vue, des indications qui ne seroient pas à négliger dans les recherches médico-légales.

La surface des fosses nasales & celle de l'œil, ne sont pas plus exemptes que les voies digestives ou pulmonaires, du développement d'une pseudomembrane dans le cas d'une inflammation intense ou prolongée : on a observé souvent, & assez souvent, de pareilles concrétions à la suite de certains ophthalmies. Le catarrhe des fosses nasales amène rarement un semblable phénomène ; mais s'il est très-vif, très-inflammatoire, comme il peut arriver lorsque l'on a été exposé à la vapeur du chloro, il n'est pas impossible qu'il surviennne alors une concrétion membraniforme très-étendue. « On a vu, il y a plusieurs années, un chimiste qui, se trouvant tout-à-coup exposé à une masse considérable de vapeur d'acide muriatique oxygéné, éprouva d'abord une toux très-vive, une éternuement abondant de larmes, de sérosité lymphatique & visqueuse, qui s'écouloit par le nez, ou provenoit du pharynx & de la trachée. Quelques heures après l'accident, ces excretions s'arrêtèrent, mais la voix devint enrouée, la vue s'obscurcit & l'odorat se perdit entièrement. Il s'étoit formé à la surface des yeux une couche opaque, blanchâtre, membraniforme, qui interceptoit le passage de la lumière ; & il y avoit de semblables concrétions dans les cavités du nez, du pharynx, & sans doute dans le larynx & la trachée. Quelques jours de repos & l'usage des adoucissans mucilagineux firent cesser tous les accidens ; les yeux se dépouillèrent d'abord de la couche lymphatique, qui s'étoit formée à leur surface, l'expectoration fit rendre quelques lambeaux membraniformes, & toutes les fonctions furent promptement rétablies. » (*Pyretologie de Selle*, traduct. de Nauche. *NOTES*.)

La membrane caduque ou l'épichorion devroit

peut-être se trouver comprise parmi les fausses membranes du tissu muqueux ; mais la constance, la régularité de sa formation, son développement même dans les cas de grossesse extra-utérine, ne permettent guère de la comprendre parmi les effets d'une irritation morbide. Ce qui concerne les causes, les conditions du développement des fausses membranes, considérées en général, convient en particulier pour les pseudomembranes du tissu muqueux : une inflammation très-vive ou très-prolongée & l'épanchement d'un liquide puriforme, paroissent les premières conditions de ces développemens morbides.

Ce développement présente, d'ailleurs, différens degrés ou périodes qui ont été plus particulièrement observés avec beaucoup de soin dans plusieurs séries d'expériences sur les animaux. (Voyez *FALGOMANER & PERQUERON* *NOTES*.)

Les fongus, dont la formation se rattache sans doute, comme celle des fausses membranes, à un principe d'irritation morbide développé & suivi dans toutes les conséquences, ont été observés comme elles sur différens points des membranes muqueuses.

Ces fongus, qui se montrent sous la forme de tumeurs ou d'extériorités charnues, ne sont pas sans quelque ressemblance de formes avec des espèces de végétations. Les fongus de la membrane muqueuse ont été principalement observés dans les fosses nasales & dans les sinus maxillaires sous le nom de *polypes*. (Voyez ce mot.)

L'encanthis peut être regardé comme une espèce de fongus ou de fongosité, à la suite d'une tuméfaction de la caroncule lacrymale, à la suite d'une brûlure, d'une ophtalmie, ou d'un état variqueux de la conjonctive. Ce fongus a quelquefois le volume d'une noisette, & ne permet pas aux paupières de se fermer. On trouve indiqué dans les Observations de Baillet, l'exemple d'un fongus implanté sur la membrane interne du pharynx & de l'extrémité supérieure de l'œsophage ; ce qui, du reste, est très-rare, & que l'on pourroit peut-être regarder, avec M. Breschet, moins comme un fongus que comme un polype bilieux.

Les tumeurs fongueuses font beaucoup plus fréquemment à la surface des voies digestives. On les a vues se présenter sous différens formes, fermer le pylore, se montrer, dans d'autres cas, avec l'apparence de tumeurs pédiculées, d'extroïssances, de verrues, de prolongemens variés, & quelquefois de tubes longs de plusieurs ponce, ayant toute l'apparence d'un nouvel organe qui se seroit développé à la surface interne de l'estomac. M. le docteur Hallon m'a fait voir un de ces tubes long de plusieurs ponce, qui s'étoit formé dans la grande courbure de l'estomac, & dont le développement ou la présence n'avoit été annoncée par aucun symptôme particulier pendant la vie (1).

(1) Cette pièce se trouve conservée dans le Muséum anti-

Il n'est pas sans exemple que quelques fongosités pédiculées se soient détachées & qu'elles aient été rejetées avec les évacuations. Un fait de ce genre fut offert à mon observation, il y a quelques années, par M. V***, chez lequel je fus conduit par son Jeanroi neveu, dont il étoit le malade.

M. V***, qui se trouvoit depuis long-temps dans un état de maladie chronique indéterminée, étoit arrivé au dernier degré du marasme. Ses boillons les plus dures, les plus légères, n'étoient plus supportées depuis quinze jours par son estomac, qui les rejetait avec des efforts de vomissement très-puissibles, quelque temps après les avoir reçues. Dans une semblable occurrence, & lorsque le malade, qui avoit accepté avec une courageuse résignation l'idée d'une mort prochaine, Jeanroi lui proposa un vomitif comme dernière tentative, & dans la vue d'une médecine perturbatrice, en l'avertissant de tout le danger attaché, dans la situation, à l'emploi d'un moyen aussi énergique.

M. V***, qui, malgré sa résignation, avoit cependant quelque desir de vivre & de guérir, ne balança point, & prit dès le lendemain une boisson émulsive. Il eut bientôt à s'approprier de cette expérience & de son courage : après quelques vomissements qui n'avoient rien de très-pénible, il éprouva tout-à-coup & avec une douleur déchirante, le besoin d'aller à la garde-robe; cette sensation eut quelque durée, devint progressivement de plus en plus vive, & se termina enfin par une forte défécation, pendant laquelle il sembla au malade que quelque chose s'étoit détaché de ses entrailles & arnit été entraîné au dehors, d'une manière extraordinaire. En effet, les secousses occasionnées par les vomissements, & l'action de la boisson émulsive qui étoit devenue purgative, brisèrent le pédicule d'un fongus gros comme une petite poire, qui fut entraîné avec les matières fécales, & dont l'expulsion eut les suites les plus heureuses. M. V***, qui a présenté ce singulier phénomène, vit encore aujourd'hui & jouit d'une parfaite santé. Toutes les circonstances de son ancienne maladie sont très-présentes à sa mémoire, & il aime à la raconter; ce qu'il fait souvent avec un intérêt naturellement attaché au plaisir de trouver dans un événement de sa vie, une singularité curieuse, & comme une espèce de prodige.

Les fausses membranes, les fongosités on les fongues, les poches, les kystes, certaines tumeurs anormales qui se développent à la surface du tissu muqueux ou dans ses différentes régions, peuvent

être regardées comme une altération, une sorte de dégénérescence de ce tissu, sans le concours on avec le concours d'un état de maladie. Le même tissu peut éprouver plusieurs autres lésions, qui le dénaturent, & peuvent lui faire offrir toutes les apparences du tissu euland. Il suffit même qu'une portion de membrane muqueuse soit exposée à l'air, ou au contact de corps étrangers, pour qu'elle subisse cette espèce de transformation, ainsi qu'il arrive quelquefois, à la suite du renversement du vagin. On a vu se développer en outre, dans différents points des mêmes membranes, certains tissus morbides, qui ne respectent d'ailleurs aucune partie de l'organisation; (le tubercule, le tissu cancéreux, &c.)

Différentes affections morbides plus générales, plus évidentes, qui se développent, & se manifestent pendant la vie, sont judicieusement rapportées par les pathologistes à certains dérangements dans la structure & dans les fonctions des membranes muqueuses. Nulle autre partie de l'organisation n'est peut-être plus exposée aux causes occasionnelles des maladies aiguës, que ces membranes, dans les fosses nasales, dans l'appareil de la respiration, & dans les voies digestives. Le développement de leurs propriétés vitales, la délicatesse de leur structure, l'activité non interrompue de leurs sécrétions, leur connexion sympathique avec la peau, enfin la multitude des stimulations qui, dans ses régions, sont appliqués sans cesse à leur surface, expliquent assez comment le catarrhe pulmonaire, l'entérite, la gastro-entérite & la dysenterie, l'emportent par leur fréquence sur presque toutes les autres maladies. Une circonstance particulière doit être, d'ailleurs, remarquée parmi les causes d'une semblable disposition; je veux parler de la facilité avec laquelle la sécrétion des membranes muqueuses est augmentée ou dérangée d'une manière quelconque, chez un grand nombre d'individus, par l'impression du froid, & lorsque la perspiration cutanée se trouve tout-à-coup suspendue ou diminuée par cette impression.

Les maladies qui surviennent dans cette circonstance ont été regardées, tout récemment, mais d'une manière trop générale, comme des affections qui seroient toujours inflammatoires. Souvent, en effet, ces maladies offrent ce caractère, comme on le voit pour l'angine, le croup, le catarrhe pulmonaire aigu, la dysenterie, mais surtout pour la gastrite & l'entérite aiguës & chroniques, dont les symptômes, si souvent méconnus, au milieu des nombreux effets sympathiques qui les enveloppent, ont si utilement attiré l'attention des praticiens à la fin du dix-huitième siècle. D'une autre part, & dans plusieurs circonstances, les affections sporadiques, qui atteignent plus particulièrement les membranes muqueuses, le bornent à une simple augmentation de sécrétion, quelquefois temporaire, quelquefois très-prolongée, & véritablement chronique, avec la forme

sonique de la Faculté de médecine de Paris. (Voyez pour les détails qui concernent ce fait curieux, une observation recueillie par un des disciples de M. Hufson, & publiée, ainsi que le rapport dont elle a été l'objet, dans les *Bulletins de la Faculté*.) (*Bulletins de la Faculté de Paris*, 1819.)

de fluxions, que peut-être on devroit exclusivement désigner sous le nom de *catarrhes*, en y joignant, comme dans la manière populaire de voir & de parler, l'épithète d'inflammatoires, lorsque l'inflammation, qui se leur est pas inhérente, vient s'y joindre ou comme épiphénomène, ou comme complication. En négligeant une pareille distinction, en parlant de l'idée, qu'affections catarrhales & phlegmasies des membranes muqueuses sont synonymes, on se trouve véritablement entraîné par la spéculation, à une grande distance des vues pratiques; ce qui devient très-préjudiciable aux jeunes médecins.

Sans doute l'inflammation se joint à un grand nombre de catarrhes; certaines fluxions muqueuses paraissent même inséparables d'un état de phlegmasie, comme on le voit pour l'otite, l'ophthalmie aigüe, le catarrhe pulmonaire; mais en revanche, & dans un grand nombre de cas, le catarrhe des fosses nasales, certains catarrhes pulmonaires chroniques, le catarrhe gastrique & le catarrhe intestinal que l'on désigne sous le nom d'*embarras gastrique*, n'ont rien d'inflammatoire & doivent être traités par des médications propres à faire cesser la fluxion muqueuse en rapplacant à son rythme habituel, la sécrétion de l'organe malade. Ce qui concerne l'inflammation des membranes muqueuses, dans l'état présent des connoissances, doit être rapporté à deux titres; savoir : 1°. Les phlegmasies évidentes & déterminées de ces membranes dans différens organes; 2°. leur inflammation ou leur simple irritation symptomatique dans les voies digestives pendant le développement de plusieurs maladies fébriles.

Les phlegmasies déterminées des membranes muqueuses sont, principalement, celles de l'oreille & des yeux (*otite & ophthalmie*), l'angine, qui est si rarement une maladie simple, le croup, ou l'angine trachéale, le catarrhe pulmonaire inflammatoire, la gastrite, l'entéro-gastrite, &c. (Voyez ces mots, dans ce Dictionnaire.) Ce qui concerne l'inflammation indéterminée des membranes muqueuses dans les voies digestives, & la doctrine qui a pour objet de rapporter à cette inflammation le plus grand nombre de fièvres regardées comme essentielles ou primitives, seront examinés avec l'importance & l'attention qu'ils méritent, dans les articles *PNEUMASIE* & *PTYRIE*, de ce Dictionnaire. (MORAND DE LA SARTRE.)

MUCREUX. (*Hygiène.*) Mot à mot, ce qui contient, ce qui renferme du mucus, ce qui abonde en mucosités. On a donné plus particulièrement ce nom à celui des matériaux immédiats des végétaux qui se rapproche le plus de la gélatine, & qui contient comme elle des propriétés alimentaires. (Voyez *ALIMENS.*)

On a aussi employé la même dénomination, dans la langue anatomique & physiologique, ainsi que les locutions, *tissu muqueux*, *système muqueux*,

souvent mises en usage par Borden, comme synonymes de *tissu cellulaire*, de *tissu lamineux*. (Voyez *TISSU CELLULAIRE.*)

MUCREUX. (*Anatom. physiolog.*) Corps muqueux de Malpighi. Fluide albumineux qui environne les papilles nerveuses de la langue & de la peau, en les attachant à l'épiderme. Le corps muqueux est incolore chez l'Européen, & plus ou moins noir chez le nègre; il subit différentes altérations dans plusieurs maladies, parmi les individus de ces deux grandes races de l'espèce humaine.

MUCREUX (Fluides): (*Physiologie.*) Les fluides muqueux de l'économie animale le trouvent principalement à la surface des membranes dont ils portent le nom. Ils forment ce que l'on appelle le mucus animal; on les a trouvés aussi dans les cheveux, les poils, la laine, les plumes, les ongles, les cornes, dans les parties les plus épaisses de la peau, mais sans avoir reconnu une identité de composition dans ces différentes parties. (Voyez *MUCUS*, dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie.*)

Les fluides muqueux de l'économie animale qui intéressent le plus le médecin, sont principalement ceux sécrétés par les follicules: ils sont incolores, visqueux, à la fois excrémentitiels & récrémentitiels; ils se dissolvent facilement dans l'humour perspiratoire qui leur donne des propriétés nouvelles, & qui rend leur absorption plus prompte & plus facile. (Voyez ce qui concerne les fluides folliculaires, dans la *Table synoptique des fluides animaux*, par M. le professeur Chanussier.)

Les fluides muqueux exposés à l'air ou agités par les mouvemens alternatifs de dilatation & de constriction des parties, à la surface desquelles ils se trouvent, deviennent écumeux & le résidu est en globules. Leur sécrétion & celle de l'humour perspiratoire qui ne peut être séparée de ces fluides, éprouvent de nombreux changemens dans les maladies; leur aspect, leur différence extérieure, doivent donc nécessairement présenter, & présentent en effet, une multitude de variétés auxquelles on attache avec raison une grande importance dans la médecine. (Voy. *MUCOSITÉ*, *MUCUS*, &c.)

Il existe toutefois une altération morbide dans la sécrétion du fluide muqueux, beaucoup plus remarquable que toutes les autres, sous le point de vue de la pathologie, quoiqu'elle ne soit annoncée par aucun signe, par aucun phénomène extérieur, & qu'elle se manifeste seulement par les effets qui lui sont justement attribués; je veux parler du changement qui s'opère, dans la sécrétion du mucus salivaire chez les animaux carnassiers, sous l'influence de la rage; changement qui donne alors & si évidemment à ce fluide, toutes les qualités d'un virus non moins déterminé que celui de la syphilis ou de la petite-vérole. (Voyez *MUCOSITÉ*, *MUCUS SALIVAIRE* (mucus salivaire), &c.)

MUR, adj., *matinus*, ce qui est à l'inst de maturité. On dit qu'un abcès est *mûr* lorsque l'on peut en faire l'ouverture, c'est-à-dire, lorsque l'on a acquis toutes les qualités qui lui sont particulières. (A. J. T.)

MUR DE BARRÈS (Eaux minérales de). C'est un village de Rouergue, à un lieu du Salt, où se trouve une source minérale appelée *Combilou*. On la dit froide & gazeuse. (Macquart.)

MURAL, adj. Qui ressemble à la mûre (*Morus niger*, Linn.). Les lithotomistes donnent le nom de calculs muraux ou de pierres murales à ceux qui sont bécillés du tubercule d'une asperité qui leur donnent l'apparence d'une mûre. (Voyez Pierre, dans le Dictionnaire de Chirurgie de l'Encyclopédie.) (A. J. T.)

MURALT, ou DE MURALTO (*Biograph. méd.*) (Jean), natif de Zurich, étudia la médecine à Montpellier & à Lyon, suivit à Paris les cours d'accouchement de Mauriceau & de Gayer. De retour en sa patrie, il y remplit à la fois, avec distinction, les fonctions de médecin, d'accoucheur & de chirurgien. Ses ouvrages contribuèrent encore à augmenter sa réputation; celui qui porte le titre d'*Hippocrate helvétique* renferme des observations rapportées au climat de la Suisse, au tempérament & aux usages des peuples. Le *Recueil des curieux de la nature* contient plusieurs mémoires dont il est l'auteur. On a encore de lui : *Vadenecum anatomicum, five, classis medicinarum*, Tiguri, 1677, in-12. Amst., 1688, in-12.

Collegium anatomicum. Norimbergæ, 1687, in-12.

Physices specialis quatuor partes, five, Helvetie Paradisus. Tiguri, 1710, in-8°; ouvrage dans lequel il donne la description des plantes les plus rares de la Suisse, mais souvent avec une nomenclature fautive. (R. GORREAU.)

MURES. (*Hygiène*.) *Morus*.

Partie II. Des choses improprement dites non naturelles.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. *Alimenta*.

Section I. *Végétaux*.

Parmi les différentes espèces de mûriers qui fournissent les mûres, & qui sont connues, nous ne parlerons que des mûriers noirs & blancs.

1°. *Morus fructu nigro*. C. B. G. (*Morus foliis cordatis hispida*, Linn.)

Le mûrier à un tronc gros, noueux, tortu, l'écorce dure; le cœur de l'arbre est dur; les feuilles sont larges, terminées en pointe, velues, d'une saveur visqueuse & douceâtre.

Ses racines sont nombreuses, grandes & fortes; ses chatons soutiennent plusieurs fleurs à quatre pétales, entre lesquelles il s'élève quelques étamines; ses fruits sont d'abord verts, puis ils prennent

une couleur d'un rouge-noir foncé. Les semences contenues dans ce fruit sont très-ar rondies. Le mûrier noir a été transporté de la Chine en Italie, d'où il s'est répandu par toute l'Europe.

2°. Le mûrier blanc.

Morus alba. (*Morus fructu albo minori ex albo purpurascens*.)

Cet arbre s'élève plus haut que le précédent; il a des racines plus grandes & plus étendues. Ses feuilles sont oblongues, plus étroites, plus tendres, dentelées, & quelquefois découpées comme celles de la vigne; ses fruits sont petits, blancs & purpurins dans leur maturité, d'une saveur assez fade & nauséabonde.

Les mûres de mûrier noir, dans leur primeur, sont acerbées & astringentes, mais ensuite elles deviennent douces & agréables au goût; aussi sont-elles en usage dans beaucoup de pays. Leur suc est pectoral, humectant & rafraîchissant; mais elles sont très-peu, elles sont fort aqueuses, & sont mal, comme le melon, lorsqu'on en mange abondamment. Les Romains en faisoient cas, ce que prouve ce passage d'Horace :

... Ille salubres
Æstare perages, qui nigris grandia moris
Finit, aut gravem qua levis arbor solem.

À l'égard des mûres qui naissent sur le mûrier blanc, elles sont mauvaises & indigestes.

(Macquart.)

MURES. (*Pathologie spéciale*.) Excroissances syphilitiques, qui paroissent sur les parties de la génération de l'un & de l'autre sexe, ou dans le voisinage de ces mêmes parties : elles sont ainsi appelées à raison de leur ressemblance avec le fruit que l'on désigne sous ce nom; elles ont un grand rapport avec d'autres excroissances vénériennes du même genre, & sont toujours les indices d'une infection syphilitique ancienne. (Voyez ces articles dans le Dictionnaire de Chirurgie.)

(M. PETIT-RANEL.)

MURIATES. (*Matière médicale*.) On a désigné sous ce nom différents sels qui résultent de la combinaison d'un grand nombre de bases diverses, soit avec l'acide muriatique simple (acide hydrochlorique), soit avec le chloro lui-même.

Ceux de ces sels qui se trouvent employés en médecine, ont été indiqués sous leur nom officiel ou sous leur nom vulgaire dans ce Dictionnaire, ou dans le Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie de cet ouvrage.

Voici une nomenclature de quelques-uns de ces sels suivant l'ordre alphabétique :

Muriate d'ammoniaque, sel ammoniac (*hydro-chlorate d'ammoniaque*).

Muriate d'ammoniaque & de fer (*hydro-chlorate de fer & d'ammoniaque*).

Muriate d'antimoine au minimum d'oxydation (*hydro-chlorate de protoxyde d'antimoine*), poudre d'algaroth

d'algaroth (*Sous-hydro-chlorate d'antimoine*),
beurre d'antimoine (*chlorure d'antimoine*).

Muriate de baryte, terre pesante (*hydro-chlorate de baryte*).

Muriate de chaux (*hydro-chlorate de chaux*).

Muriate de cuivre (*hydro-chlorate de cuivre*).

Muriate d'étain au minimum, ou au maximum
d'oxydation (*chlorure, ou chlorure d'étain*).

Muriate de fer (*hydro-chlorate de fer*).

Muriate de mercure (*hydro-chlorate de mercure*).

Muriate de potasse (*hydro-chlorate de potasse*).

Muriate de soude (*hydro-chlorate de soude*).

(L. J. M.)

MURIATIQUE. (*Matière médic.*) On a désigné pendant assez long-temps sous ce nom, un mélange de chlorure & d'hydrogène, qui jouit d'une grande activité, & qui se combine avec différentes bases salissables, pour former divers sels que l'on appelle *hydro-chlorates*.

L'acide muriatique, ou l'acide hydrochlorique, peut être employé, ainsi que le chlorure lui-même, comme moyen de désinfection.

Les poudres préparées avec l'acide nitro-muriatique forment ce que l'on a appelé les bains de Gondran. On a proposé dans ces derniers temps, & d'après la méthode de son inventeur, M. Scott, une espèce d'ablation & de saignée avec la même substance, pour opérer la guérison lente & progressive d'une phlegmasie latente du foie, accompagnée d'engorgement dans ce viscère. (*Voyez* NITRO-MURIATIQUE (acide).)

MURIATIQUE OXYGÈNE. Les chimistes modernes désignent d'abord sous ce nom, un gaz dont la nature leur étoit inconnue, & qu'ils supposèrent composé, comme l'on voit l'indiquer, d'une base hypothétique & de l'oxygène. On a reconnu plus tard que ce prétendu gaz acide muriatique oxygéné étoit autre chose qu'un corps simple, le *chlorure*, qui se trouve, comme l'oxygène, constamment à l'état de gaz, lorsqu'il est séparé des compoés qui le retiennent.

Le chlorure, considéré sous le point de vue de l'hygiène, de la pathologie & de la thérapeutique, présente toutes les propriétés que l'on a attribuées à l'acide muriatique oxygéné. (*Voyez* ce mot, dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie* de l'Encyclopédie.)

Une des propriétés du chlorure, que l'on a le plus vantée dans ces derniers temps, & avec un peu d'exagération, c'est la propriété de désinfecter une atmosphère altérée par des miasmes putrides, & par les effluves qui répandent dans l'air les personnes atteintes de maladies contagieuses.

Le chlorure est souvent employé, sous ce rapport, sur les bagnes, dans les prisons, dans les hôpitaux & dans les lazarets. Alors, & pour une chambre de cent mètres cubés, on prend dix gros & demi de ma-

Matériaux. Tome A.

riate de soude (hydro-chlorate de soude), & deux gros d'oxyde de manganèse, que l'on mêle après les avoir pulvérisés : on introduit ensuite ce mélange dans une capsule de verre ou de poterie très-dure ; on ajoute alors successivement au mélange de quatre gros d'eau & de six gros d'acide sulfurique, que l'on verse ou en totalité ou à plusieurs reprises, selon l'intensité de l'effet que l'on veut obtenir.

Les vapeurs du chlorure excitent la toux, & déterminent une affection catarrhale très-grave, qui peut être suivie d'une phlébite laryngée. Ce dernier cas s'est présenté deux fois dans ma pratique, & il n'a fallu rien moins qu'un traitement très-efficace, & suivi pendant plus d'une année, pour guérir complètement la maladie. M. Breithwell assure avoir employé le chlorure à l'état liquide, & à la dose de deux gros dans huit onces d'eau, pour le traitement de la scarlatine ; ce qui ne pourroit, au reste, convenir que dans la circonstance d'une complication de cette fièvre éruptive avec l'angine gangréneuse. On a proposé aussi d'employer le chlorure dans le traitement des fièvres adynamiques & des diarrhées atoniques. Une propriété plus évidente & mieux constatée est celle que M. Thénard & Cluzel ont reconnue au chlorure liquide, employé par immersion, sur les mains, pour guérir la gale la plus invétérée. (L. J. M.)

MURIER, MURIER NOIR. *Fruit du murier ; mûres ; écorce de sa racine.*

Ces différentes parties du murier ont été employées en médecine. On donne encore le sirop de mûres, étendu d'eau & pour gargarisme, dans les angines inflammatoires. Ce médicament n'est cependant ni plus ni moins efficace que beaucoup d'autres préparations peu énergiques, & que l'on emploie pour aciduler certains boissons en usage pendant les maladies aiguës. L'usage de l'écorce de la racine de murier, considérée comme purgative & comme vermifuge, a été abandonnée, malgré l'autorité de Dioscoride.

Le murier appartient à la famille des *urticées*, & plus particulièrement à l'un des principaux groupes de cette famille, celui des *artocarpées*, dont plusieurs genres sont remarquables comme le murier, par la propriété vomitive ou purgative de l'écorce & de la racine. (*Voyez l'Essai sur les propriétés médicinales des plantes*, par M. de Candolle, pag. 486.) (L. J. M.)

MUSC. (*Matière médicale & hygiène.*) Le musc est un nom que l'on donne également au parfum & à l'animal dont on le tire.

L'habitude, l'inségnation & la mode exercent tellement un empire arbitraire sur nos sens, que le musc a été recherché & recherché successivement dans tous les siècles & chez toutes les nations. Il y a des peuples qui l'ont mis au rang de ce qu'ils avoient de plus précieux en odeurs ; d'autres l'ont

Eff

dégligé. On est encore aujourd'hui partagé entre l'amour & l'aversion pour le musc. Les Italiens l'estiment beaucoup, tandis que les Français le décrient.

On n'avait que de fausses idées sur l'animal & sur le corps odorant qui le fournissent; jusqu'au moment où de la Peyronie publia son Mémoire sur le musc, dans le *Recueil de l'Académie des Sciences* (année 1751). Aujourd'hui les voyageurs s'accordent à dire, que l'animal qui donne le musc, est une sorte de chevreuil assez semblable au daim pour la grandeur: il porte le musc sous le ventre, dans une bourse placée entre le nombril & les parties génitales. On a cru remarquer en outre une certaine analogie entre la substance grasse & onctueuse contenue dans une vessie du chevreuil musqué, & la structure singulière de l'organe qui en opère la sécrétion.

Comme on a coutume de sophistiquer le musc en Asie, il faut être bien sur ses gardes, le prendre sec, onctueux & odorant, bien conservé dans une boîte de plomb s'il est séparé des vessies. Alors il doit être gras, mais sec, sans mélange, d'une couleur tanée, d'une odeur forte & inhérente, portable, d'un goût amer. Sur le feu il doit se consumer en entier sans résidu.

Le musc de Moscovie est moins recherché que celui de Tounquin & du Bengale, dont le parfum est presque tout huile & le volatil; ses particules odorantes sont en effet en si grand nombre dans un petit volume, qu'un grain peut encore fournir de l'odeur au bout de cent ans, & que l'odeur acquise par les vases dans lesquels on l'a placé, est presque indélébile. Les parfumeurs emploient beaucoup le musc dans leur cosmétique, & dans les préparations avec l'ambre. Les personnes qui ont naturellement le malheur d'exhaler quelque mauvaise odeur, n'en peuvent prendre une qui la masque plus sûrement; mais elles seront toujours très-mal accueillies avec cette odeur, chez les personnes qui sont très-nervieuses ou très-sensibles. Au moins seront-elles très-prudemment, de ne jamais le présenter chez les femmes en couches, auxquelles l'odeur du musc peut causer des accidents fâcheux. Le musc, passe pour un grand antispasmodique; cependant ce que nous venons de dire semble s'opposer à cette idée.

(MACQUART.)

N. B. Le musc, employé comme médicament, s'administre seul, ou combiné avec d'autres substances, qui modifient ou débarrassent ses propriétés calmantes ou antispasmodiques. Lorsque le haut prix de ce médicament ne s'oppose pas à son emploi, on peut le donner à la dose de dix à douze grains, & même plus, dans vingt-quatre heures.

L'habitude, les détails d'une pratique conforme, dans les hautes classes de la société, apprennent seuls au médecin, à suivre les indications qu'il peut remplir avec le musc, dans une foule

de cas où plusieurs autres hypnotiques ont échoué, & paroissent même nuire aux malades: nous dirons seulement ici, que le musc n'est pas contre-indiqué comme l'opium, dans tous les cas où il est dangereux d'exciter le cerveau & de déterminer de ce côté une congestion sanguine: il produit souvent, du reste, en l'unissant avec ce dernier, des effets que l'on n'aurait pas obtenus de chacun d'eux, employé séparément, comme on pourroit le prouver par différents exemples.

Le musc fait partie de plusieurs de ces multitués pharmaceutiques, que l'on appelle compositions magistrales, telles que la confition d'hyacinthe, l'alkermès, l'eau de mille-fleurs, &c. (Voyez Musc, dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie*.) (L. J. M.)

MUSCADE. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. Aliments.

Section III. Assaisonnemens.

La muscade est une partie aromatique d'un arbre des Indes orientales, dont le fruit est de la grosseur d'une petite orange, & dont le noyau, qui est la vraie muscade, est recouvert de trois écorces. La première est pulpeuse; la seconde est réticulaire, & comme partagée en lanières minces, risquées, bulculeuses, rougeâtres, aromatiques; c'est ce qu'on nomme *macis* en Eryopie; on l'emploie à cause de sa saveur balsamique, dans les mêmes circonstances que la muscade elle-même, qui cependant a plus de force. La troisième écorce, qui succède au macis, est une coque dure, mince, cassante, qui contient la muscade.

Cette noix, qui ressemble à une olive pour la forme, est ridée, brune, dure, d'une saveur amère, âcre, suave & huileuse; les meilleures sont pesantes, marbrées en dedans, & d'une forte odeur aromatique.

Dans l'Inde on donne dans les districts, les muscades entières & cassées. (MACQUART.)

MUSCADIÈRE, *myrsica aromatica*. (Lamarck.) Arbre de la famille des Laurinées, qui croît dans les îles Molouques, & dont on fait souvent un usage alimentaire & pharmaceutique. Dans toutes les espèces de muscadier, le suc que l'on obtient par l'incision de l'écorce, est âcre & visqueux. Les feuilles exhalaient une odeur de muscade, & le brun de leurs fruits est d'une saveur caustique. (Voyez Muscade & Myrsiniers.) (L. J. M.)

MUSCAT. (Hygiène.)

Partie II. Matière de l'hygiène.

Classe III. *Ingesta*.

Ordre I. Aliments.

Section I. Végétaux.

On donne le nom de *muscat*, à une espèce d'excellent raisin, qui a un petit goût parfumé, très-agréable, & qui est très-sucré lorsqu'il est parvenu à la parfaite maturité. Tel est le raisin de Frontignan & de Lunel. On a coutume, pour faire les fameux vins de ces cantons, de laisser les grappes mûres, encore quelques temps sur le cep, jusqu'à ce qu'en perdant leur eau, elles se détachent en partie. Alors on en fait un vin très-délicat, très-sucré, & très-recherché des personnes qui aiment les vins courts & liquoreux. Il est stomachique, facilite la digestion, pris à petite dose, il peut être utile, pour restaurer les forces des convalescents. (L. J. M.)

MUSCLE (*Anatomie physiologie*), *musculus* des Latins. On donne ce nom à des parties charnues, éminemment contractiles, dont la plupart recouvrent les membres ainsi que le tronc, & servent à la locomotion. On comprend aussi parmi les muscles, la tunique charnue & contractile d'un grand nombre de viscères creux, le cœur lui-même tout entier, dont la structure & l'action présentent d'ailleurs des particularités qui le distinguent des autres muscles.

L'ensemble des muscles soit internes, soit externes, constitue, comme l'ensemble des tissus cellulaires, ou d'un genre de membranes, un système d'organes. Le système musculaire, qui sert plus particulièrement à la locomotion, mais qui se trouve répandu dans plusieurs appareils d'organes, fait partie de leur structure, & prend part à différentes fonctions, telles que la vision, l'audition, la parole, la voix, la respiration, la digestion & la reproduction.

La composition des muscles, considérée en général, leurs propriétés, leur description en particulier; le mécanisme de leurs fonctions, &c. appartiennent à l'anatomie & à la physiologie. (Voyez ces mots dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

Nous ne les considérons ici que sous le rapport de la physiologie médicale & de la pathologie, en renvoyant d'ailleurs à plusieurs articles de ce Dictionnaire, pour ce qui concerne les altérations de ces organes, qui constituent des maladies particulières.

Les muscles considérés sous le point de vue de la physiologie médicale, doivent être divisés en deux classes, savoir: les muscles fasciculés ou composés de fascicules, & les muscles membranés; distinction qui paraît beaucoup mieux fondée, que la distribution basale & scholastique d'après laquelle on partage les muscles, en *muscles de la vie animale* & *muscles de la vie organique*.

Les muscles fasciculés & les muscles membranés peuvent offrir, ainsi que tous les autres organes, des altérations morbides, avec lésion évidente, & probante de leur structure, & des altérations accompagnées seulement de lésions pré-

sumées & temporaires de cette même structure. Sous le premier chef, nous rangerons pour les muscles fasciculés, leurs contusions, leurs divisions ou plaies, leurs ruptures, leur hernie, leur déplacement, leur atonie, leur relâchement, l'augmentation ou la diminution de consistance de leur tissu, leur rétraction, leurs dégénérescences variées, leurs transformations diverses; en substance grasse ou adipocreuse, en matière cartilagineuse, osseuse, fibreuse, &c. : lésions qui peuvent être ou devraient regarder plutôt comme la suite, comme l'effet consécutif de différentes maladies aiguës ou chroniques des muscles, que comme des dérangements morbides, essentiels.

Les divisions ou les plaies des muscles, présentent plusieurs particularités dont le détail n'appartient pas à ce Dictionnaire. (Voyez *Muscia* dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.) Ce qui concerne la pathologie générale, dans ces plaies, a pour objet, l'inflammation qui en est la suite, & la formation de la cicatrice.

L'inflammation des muscles dans le cas de leur division, est une véritable inflammation adhésive; elle donne lieu après un laps de temps plus ou moins long, à la formation d'une substance qui, d'abord liquide, se solidifie ensuite, & s'organise comme tous les tissus de seconde formation.

Si la division s'est faite sans perte de substance, la cicatrice qui se présente avec l'aspect d'une intersection tendineuse, ne met aucun obstacle aux fonctions du muscle qui a été divisé. Elle peut au contraire gêner, altérer sensiblement les fonctions, si la perte de substance a été considérable, & si les muscles qui l'ont éprouvée, sont employés à former une cavité sphénocéphale.

La contusion des muscles est susceptible de différents degrés de force, depuis le simple froissement de leurs fibres, jusqu'à l'altération la plus absolue, c'est-à-dire, jusqu'à la destruction complète de leur structure; aussi qu'il arrive surtout par la percussion oblique des boulets sur les membres (vent du boulet), qui produit quelquefois une petite désorganisation sans occasionner une altération sensible dans le tissu de la peau. La formation d'une courbature, l'engourdissement, la stupeur dans le membre, l'altération profonde des nerfs qui s'y distribuent, annoncent ordinairement les contusions graves des membres, & sont suivies dans certains cas, d'une paralysie partielle, d'un état d'impotence qu'il importe de ne pas confondre avec la paralysie, occasionnée par une affection du cerveau. M. le comte de L... qui fut laissé pour mort, dans la crasse journée de Quiberon, présente un exemple remarquable de ce genre de contusion. Un coup de bayonet reçu à la partie inférieure de la cuisse s'avoit occasionné une forte contusion, & un ébranlement considérable dans les muscles & dans les nerfs de toute l'extrémité inférieure. M. le comte de L... survécut à cette horrible blessure, mais

il ne put se servir qu'avec une extrême difficulté, de l'extrémité inférieure du côté gauche; l'impotence s'étendit par la suite aux muscles du tronc, à ceux du bras & de l'avant-bras, enfin à tout le côté gauche, sans arriver toutefois à aucune des parties de la tête, dont les fondions se sont maintenues dans toute leur intégrité, au milieu d'une altération aussi profonde du reste du corps.

On trouve plusieurs exemples remarquables de défordres occasionnés par la contusion des muscles, dans l'ouvrage immortel de Morgagni. (Voyez lib. IV, édit. 49, no. 6.)

La rupture des muscles appartient moins à la pathologie générale & à l'anatomie pathologique, qu'aux études spéciales & à l'art particulier du chirurgien. (Voyez le mot RUPTURE DES MUSCLES, dans le Dictionnaire de Chirurgie.)

Le déplacement des muscles, que l'on appelle hernie musculaire, lorsque le muscle se fait une issue à travers une aponeurose déchirée, & avec ou sans étranglement, appartient plutôt à la chirurgie proprement dite, qu'à la médecine spéciale, à laquelle notre travail est consacré. Nous en traiterons cependant ici, mais sous un rapport historique, & relativement à quelques particularités, qui tiennent de plus près à l'ensemble des données générales & usuelles de pathologie, que l'on doit trouver dans l'Encyclopédie.

Pouteau a donné une attention particulière au déplacement des muscles, qu'il a désigné sous le nom de *luxation*. Toutefois il avait eu précédé dans ce genre de recherches, par van Swieten & du Verney, &c.

Le déplacement des muscles survient ordinairement au moment d'une chute, d'un mouvement brusque, intempestif, que la volonté n'a point dirigé, & que la frayeur, le défaut d'attention, la surprise, ont fait exécuter à faux & sans précaution.

Une jeune demoiselle, qui regardoit par une fenêtre, est tout-à-coup appelée par une personne, placée à un étage supérieur. Elle tourne alors brusquement la tête de gauche à droite, eu la renversant avec force pour répondre; mais au même instant, elle éprouva une douleur très-vive au côté droit du cou, vers lequel la tête fut subitement ramenée.

Pouteau, qui rapporte cet exemple, eut bientôt fait cesser la douleur & la gêne que cet accident avoit occasionnée, en forçant, par des frictions bien dirigées, le muscle déplacé à reprendre sa place. Ou a beaucoup parlé de ce déplacement musculaire cité par Pouteau. On en trouve plusieurs autres exemples dans les recueils d'observations, & ce qu'il importe surtout, sous le rapport de la médecine proprement dite, dans cette question du déplacement des muscles, c'est de ne pas le confondre, lorsqu'il arrive aux lombes, avec la néphrie ou le rhumatisme, simulant cette ma-

ladie. Suivant la remarque judicieuse de Lieutaud, qui désigne assez improprement sous le nom d'*entorse*, un pareil déplacement (*Médecine pratique*, pag. 557), les symptômes de ce déplacement ne sont pas toujours faciles à distinguer. On regarde comme les plus évidens, l'espèce de tumeur qui forme le muscle déplacé, & la situation extraordinaire de la partie où il se trouve par suite de ce déplacement; l'œchymose à laquelle Pouteau attachoit tant d'importance, appartient bien plus aux ruptures des muscles qu'à leur déplacement. Les circonstances qui ont accompagné ce dernier, aident aussi à le reconnaître.

Le traitement doit avoir pour objet, de mettre les muscles dans le plus grand relâchement, de comprimer le genre de la douleur, soit par des frictions, soit par le massage du membre affecté; le succès toujours assez prompt de ce traitement, annonce que l'on ne s'est pas mépris sur la nature du mal, en le confondant avec la rupture des muscles.

La *dysfonction forcée*, l'*écartement* des muscles, celui de leurs fibres, ce que l'on appelle leur *enlèvement*, sont plutôt une infirmité qu'une maladie. Ce genre de dérangement a plus souvent lieu pour les muscles qui peuvent être distendus outre mesure dans l'accouchement, surtout pour les muscles droits. On l'a vu aussi avoir lieu chez quelques sujets foibles ou chargés d'embonpoint, de manière à rendre la station, ou l'action d'aller en voiture, presque impossible. J'ai rencontré plusieurs exemples d'une semblable disposition, que l'on corrige jusqu'à un certain point, ou que l'on rend plus supportable, par l'effet d'une ceinture bien faite.

L'écartement des muscles droits (sterno-pubiens) dans l'accouchement, est une des principales infirmités auxquelles les femmes en couches sont exposées, & on peut se guérir qu'avec beaucoup de soin, un long repos, & l'emploi des moyens propres à rapprocher d'une manière soutenue, les muscles disjoint ou écartés. (Voyez dans ce Dictionnaire DRACHES - PUBLIENS, MUSCLES DROITS (écartement des).)

La faiblesse des muscles & le ramollissement de leur tissu, sous le concours d'une disposition paralytique, constituent bien plus évidemment une maladie, que leur déplacement, qui n'est, à tout prendre, qu'un accident léger, lorsqu'il a été reconnu à temps & traité d'une manière convenable.

La faiblesse & le ramollissement des muscles, considérés comme maladie ou comme infirmité, peuvent avoir lieu par l'effet même de l'âge, par l'oisiveté, par les inconvénients de la vie sédentaire. Cependant ils se manifestent le plus ordinairement à la suite de différentes maladies aiguës ou chroniques très-graves, du scorbut par exemple, des fièvres muqueuses, du rhumatisme, des fièvres adynamiques, &c. Cette maladie peut alors être

perte au point de simuler la paralysie, & de condamner à une triste immobilité, les malheureux qui en sont affectés.

La faiblesse & le relâchement de certains muscles peuvent devenir, & sont devenus en effet très-souvent la cause de luxations spontanées, & de rupture de muscles, pour des causes légères qui opèrent plutôt une déchirure qu'une rupture. Le genre de mort, le genre de maladie, peuvent tellement diminuer la consistance des muscles, que la roideur des membres, regardée comme le signe le plus évident de la mort, peut masquer entièrement dans ces circonstances, & comme on l'a plusieurs fois observé à la suite de l'asphyxie, disposition qu'il est très-important de connaître, lorsque l'on doit prononcer sur les phénomènes de la mort naturelle, comparés à ceux de la mort apparente.

La *rétraction*, opposée si l'on veut à la faiblesse ou au relâchement des muscles, est un phénomène pathologique, que les praticiens ont en souvent l'occasion de rencontrer. Ses effets, dans beaucoup de circonstances, doivent contribuer à faire naître plusieurs difformités, qu'il n'est pas toujours impossible de guérir, & dont le traitement appartient d'une manière plus particulière à la chirurgie & à la médecine pratique. (Voyez *PRESTORI, RÉTRACTION, STRABISME, TORTICOLIS.*)

Les dérangemens morbides que nous venons de parcourir, constituent de véritables maladies, & des maladies, dans lesquelles la structure du muscle n'est pas tellement désorganisée, qu'elle ne puisse se rétablir, ou continuer de remplir ses différentes fonctions.

Des altérations plus profondes, les *dégénérescences* des muscles, surprennent quelquefois à la suite de ces différentes maladies, ou de plusieurs autres affections aiguës ou chroniques, qui n'avoient pas d'abord altéré sensiblement la structure de l'organe; ces altérations arrivent aussi par l'effet de l'âge, du genre de vie, & de plusieurs causes tout-à-fait inconnues.

La conversion des muscles en substance grasseuse, est un des cas les plus remarquables de ces dégénérescences; l'ouvrage de Morgagni, les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, & l'*Vapereau Journal de Médecine*, en fournissent de nombreux exemples.

L'exemple rapporté dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, par Vicq-d'Azyr, a plus particulièrement attiré l'attention des médecins & des anatomistes. Chez le sujet qui le présente, & qui étoit très-âgé, la structure des muscles avoit été comme détruite, & remplacée, par un tissu comme graisseux. Quelques muscles avoient conservé cependant leur apparence naturelle, mais le plus grand nombre avoient perdu jusqu'à leur enveloppe. Les aponeuroses, dit Vicq-d'Azyr, n'ont plus cet air luisant & saisi que les anatomistes leur reconnoissent: toutes les informa-

tions que j'ai faites, m'ont appris, ajoute le même auteur, que l'individu, qui présentoit une altération musculaire aussi profonde, étoit également servi des deux extrémités pendant long-temps, mais qu'après une maladie, l'extrémité du côté gauche s'étoit de plus en plus affoiblie sans se déformer, & qu'enfin le malade avoit été contraint de marcher, à l'aide d'une béquille. Il ne paroît pas, d'après l'observation qui a été faite des muscles transformés en matière grasseuse, que cette matière ait quelque analogie avec la transformation en matière grasse ou adipocéruse, dont un si grand nombre de cadavres ont présenté des exemples, dans l'exhumation du cimetière des Innocens, à Paris. Le cœur lui-même n'est point exempt de la conversion en matière grasseuse. (Voyez Corvisart, *Mémoires du cœur*, pag. 83.)

Madame la duchesse D^{ne}, pour laquelle j'ai été plusieurs fois consulté, s'est trouvée dans cette situation d'*adynamie musculaire*, à la suite d'une fièvre maréreuse. Sa vie se soutient avec un régime sévère depuis quinze ans, & sans qu'il ait été possible à Paris, de rendre le plus léger degré d'énergie aux muscles des extrémités inférieures, qui sont presque aussi incapables de mouvements, que dans une paralysie complète.

Les autres conversions ou transformations des muscles, dont les observateurs ont recueilli des exemples, sont la conversion fibreuse, la conversion osseuse, la conversion cartilagineuse. (Voyez *TRANSFORMATION.*)

Le changement de couleur que l'on a remarqué dans les muscles, quelquefois après la mort, & auquel M. Portal a donné trop d'importance, ne peut guère être rapporté d'une manière constante, à une altération morbide. Il n'est pas sans exemple, que plusieurs muscles d'une certaine étendue aient été occupés par des hydatides: phénomène qui se trouve indiqué par les différents auteurs qui ont donné des traités sur l'anatomie pathologique, & principalement par Rudolphi.

Dans des maladies des muscles, dont le développement n'est pas accompagné d'une altération sensible ou prolongée de structure, les nerfs paroissent affecter l'ensemble des muscles, tandis que les autres semblent appartenir plus particulièrement aux nerfs de ces organes, ou même à l'encéphale. Parmi les premières on range l'inflammation, caractérisée par des symptômes particuliers qui dépendent de l'action de la fonction même des muscles, & de leur structure. (Voyez *MYOPEY, PARAPLEGIE, PARALYSIE GÉNÉRALE*, &c.)

Une classe d'affections, qui paroît appartenir d'une manière plus spéciale aux muscles, nous est offerte par la grande famille des maladies rhumatismales, dont le traitement exige souvent les émissions sanguines; maladies qui ne doivent pas être rapportées, comme on le fait dans ces derniers

temps, à la classe des phlegmatics, dont elles différaient par leurs causes, par l'ensemble, la marche de leurs symptômes, & par les différents modes de terminaison, dont elles sont susceptibles.

Les spasmes, les convulsions, mais surtout l'épilepsie & le tétanos, la paralysie, les différents degrés, les différentes formes, les convulsions ou névroses partielles de certains muscles, la cataplexie, la chorée, sont des maladies des muscles, que l'on rapporte plutôt à un certain état de trouble dans les nerfs, qu'à un dérèglement dans la substance même des muscles. (Voyez ces différents articles dans ce Dictionnaire.)

Les divers muscles membraneux sont également accessibles à ces différents états morbides. Le mouvement péristaltique qui leur est propre dans toute l'étendue du canal intestinal, peut en particulier éprouver plusieurs dérangemens notables, mais surtout le genre de perturbation, d'où résultent le vomissement, certaines constipations opiniâtres, & le phénomène rare & merveilleux du *meçisme* ou rumination accidentelle. (Voyez ce mot.)

Le vulvulus est un état convulsif des intestins, dont plusieurs portions exécutent des mouvemens en sens opposé. (Voyez Vulvulus.)

Le rhumatisme peut affecter, dans certains cas, les muscles membraneux & les muscles fasciculés internes, tels que le cœur & le diaphragme. (Voyez Rhumatisme.)

Le sphindyl de l'anus, comme dans les muscles orbitaires, peut éprouver une contraction spasmodique permanente, & assez opiniâtre pour exiger une opération chirurgicale. (Voyez Tenesme.) (L. J. M.)

MUSCULAIRE. (Physiologie.) Le seul caractère commun que nous offrent les différents appareils que l'on a jusqu'ici considérés comme musculaires, c'est de posséder l'irritabilité & de contractilité. On doit donc, pour être conséquent, voir de véritables muscles dans toutes les parties qui présentent cette double propriété : ainsi, nous regarderons comme musculaires, non-seulement les organes actifs de la locomotion, le cœur, le diaphragme & la langue médiane des intestins, de la vessie ; chez les oiseaux, celle des urètres, du conduit pancréatique & des canaux biliaires, mais encore, chez l'homme, le tissu du fœtus, bien qu'on appareût ne s'en prévaloir rien de semblable aux autres, surtout en ce qu'il n'offre point ces faisceaux parallèles, qui, dans les organes que nous venons de nommer, servent pour l'ordr, le caractère le plus saillant d'un appareil musculaire.

On a voulu regarder comme musculaire la tunique fibreuse des artères, & l'on a été à l'appui de cette opinion quelques faits & quelques expériences. On a dit, par exemple, & l'on répète encore, que chez l'éléphant on a vu l'aorte garnie d'un appareil de faisceaux charnus semblables en

tout aux muscles de la locomotion. Ce fait est entièrement faux : j'ai été à portée d'examiner une portion assez considérable de l'aorte d'un éléphant mort il y a quelques années à la Ménagerie; on voit que près elle étoit entièrement semblable à celle d'un bœuf, d'un cheval & de tout autre grand quadrupède. Je fais bien que l'absence de fibres rouges dans l'aorte ne prouve pas qu'elle soit dépourvue de contractilité ; mais les expériences seules peuvent décider la question : or, j'ai fait & j'ai vu faire un grand nombre d'expériences sur ce sujet & sur des animaux d'espèces différentes, des chiens ; des chevaux, des lapins, des cochons d'Inde ; dans tous les cas j'ai vu le tissu de l'artère se comporter absolument comme eût fait tout corps élastique inerte. Mais, dit-on, la contraction n'est sensible que chez les grands quadrupèdes, le bœuf, le cheval, &c. Il n'est pas aussi facile de répondre à cette objection, en montrant des faits, parce qu'on a rarement l'occasion de faire de semblables expériences. Une seule fois j'ai vu sur un âne effrayé pour l'aorte tous les genres d'excitation ; l'opérateur étoit habillé aux expériences de ce genre, les spectateurs étoient attentifs, & plusieurs venoient prévenir en faveur de la contractilité des artères ; cependant personne ne put voir autre chose que ce que nous avons observé tant de fois tous ensemble sur les chiens, les lapins & autres animaux que j'ai nommés.

Il faut bien prendre garde, quand on fait de pareilles expériences, au genre d'excitation que l'on emploie. Si l'on se sert d'agens chimiques, il peut arriver qu'on produise dans l'artère un relâchement, mais qui ne sera point suivi de relâchement ; & c'est alors un simple effet de racornissement qui se fait produit après la mort comme pendant la vie.

Entre l'opinion qui fait croire les artères contractiles & celle qui les fait voir ayant seulement comme ceux élastiques, il s'est élevé une opinion mixte qui veut, je crois, à J. Hunter, elle consiste à accorder aux petites artères la contractilité que l'on refuse aux grosses, contractilité d'autant plus développée dans ces premiers vaisseaux, qu'ils le rapprochent davantage des capillaires artériels qu'on en suppose donés au plus haut degré.

Cette doctrine fut depuis embellie par l'imagination de Bichat, qui accorda à ces vaisseaux la faculté de reconnaître la nature des substances qui les approchoient, celle de juger si l'introduction de ces substances dans le torrent de la circulation seroit avantageuse ou nuisible, & celle enfin de pouvoir, par suite de ce jugement, les y faire entrer ou les en tenir constamment écartées.

Ainsi modifiée, l'opinion de J. Hunter est maintenant celle de presque tous les physiologistes en France. Un fait anatomique assez récent a semblé venir lui prêter un nouvel appui. Sur le dernier éléphant mort au Jardin des Plantes, M. Cuvier a trouvé que les petites artères avoient un couleur rou

gêtre que ne présente point les grosses : la chose est évidente, s'en est écrié, elles se rapprochent de plus en plus de la nature musculaire.

Mais je l'ai déjà dit, quoique dans un sens opposé, à l'occasion de l'acte de ce même animal : la colonne devient un carillonneur tout-à-fait insignifiant chaque fois qu'il s'agit de parties présumées musculaires. La sauge du diuissu, dans ce cas, ne prouve pas plus pour la contractilité que dans l'autre cas, à peine ne prouveroit contre. Ce sont donc encore ici les expériences seules qui peuvent décider la question : or, ces expériences faites avec le plus grand soin, & variées de toutes les manières sur un grand nombre d'animaux, m'ont toujours montré les petites artères très-élastiques, & même, proportion gardée, beaucoup plus que les grosses, mais jamais elles ne m'ont fait voir la moindre apparence de contractilité. Sur l'âne dont j'ai parlé, avant de le sacrifier pour examiner l'artère, on avoit élargi les différents excisés sur des artères de tous les calibres ; les plus petites se conduisoient exactement comme les plus grosses. Je suis intimement convaincu que ceux qui croient avoir vu ces mouvements des petites artères, s'en sont laissé imposer par un mouvement général de transport présumé, ou par le choc du sang arrivant du cœur, ou par la contraction d'un muscle voisin, j'en ai vu quelques-uns par l'excitant qu'on vouloit appliquer à l'artère.

Pour ce qui est des capillaires artériels, comme leur situation les déroberoit à notre vue, on ne peut rien affirmer relativement à leurs propriétés ; seulement on peut demander à ceux qui les douent de sentiment, de résistance, de puissance, comment toutes ces choses leur ont été révélées.

Parmi les parties musculaires du corps des mammifères, il en est une que j'ai oublié de nommer ; & sans doute sans que cette omission ait été remarquée, puisque la faculté contractile n'avoit pas été jusqu'ici reconnue ; je veux parler des véritables sténiales chez certains animaux de la classe des rongeurs.

À la fin du septembre 1820, je faisois, avec MM. Magendie, Andral & Pouillet, des expériences sur les animaux au moyen du galvanisme. Après un assez grand nombre d'expériences sur les effets du galvanisme, nous essayâmes ce genre d'excitation sur tous les organes contenus dans l'abdomen. Étant appliqué un jour sur un cochon d'Inde, ses vésicules féminales, qui sont très-grandes chez ces animaux, nous vîmes à chaque application se développer, du sommet vers la base, un mouvement péristaltique très-prononcé.

Fibre musculaire. Cette expression, comme toutes celles dans lesquelles entre le mot *fibre*, n'offre à l'esprit aucune signification bien précise. Qu'est-ce qu'une fibre en effet ? Quelle est la définition qu'on en donne ? On entend, nous dirons, on en général, par fibres, des corps longs & grêles qui, par leur disposition & leurs con-

nexions, donnent naissance à toutes nos parties ; d'où l'on voit que ce nom s'applique à tous les solides du corps. (*Dictionnaire des Sciences médicales*, article *Fibre*.) Mais n'est-il pas dans le corps humain, un grand nombre de parties où l'on ne peut, avec la meilleure volonté possible, apercevoir ces corps longs & grêles dont tous nos organes doivent être composés ? Le fœtus même le plus exercé à fabriquer des membranes devient inhabile quand il faut nous faire apercevoir ces fibres dans certaines parties du cerveau.

Si donc on veut que tous les solides du corps soient composés de fibres, il faut admettre que ces éléments sont de forme variable. Qu'auront-ils donc de commun qui puisse les faire rassembler sous un même nom ? Sera-ce la composition chimique ? On ne s'attendrait guère sans doute à voir soutenir une pareille proposition. Qu'on ouvre cependant la grande *Physiologie* de Haller, on lira dans les prolégomènes, que la fibre est composée d'une terre calcaire cristalline, d'un peu de fer & de gluten. Plus loin, traitant de la fibre musculaire, il se demande gravement si la contractilité réside dans la terre, le fer ou le gluten.

La dénomination de *fibre* que nous avons rapportée, semble convenir assez bien quand on l'applique aux muscles ; ces organes, en effet, se séparent naturellement en corps longs & grêles. Mais jusqu'à quel point devra-t-on pousser cette division pour arriver à la fibre élémentaire ? Qu'aura-t-elle de commun avec les faisceaux musculaires qui résultent des premières divisions ? En quoi en différera-t-elle autrement qu'en volume ? Y a-t-il rien de plus puérile que ces ordres trinitaires de fibres de plus en plus petites, établis par Muri ? N'est-ce pas le comble du ridicule de dire, comme le veut Linnaeus, que la fibre musculaire est composée de 3000 filaments qui, réunis, ne feroient pas le volume d'un cheveu ?

Le mot de *tissu* qu'on a voulu substituer à celui de *fibre*, semble d'abord moins attaquant ; tel vient de ce qu'il offre nécessairement dans sa signification quelque chose de plus vague encore : l'expression même de *tissu* musculaire, applicable à l'homme & au plus grand nombre des animaux, celle de *tissu* pour celui de l'ordre le moins élevé, & par conséquent n'est pas générale. Chez les méduses, les hydres, les sédimens, on ne pourroit pas plus, dans les parties contractiles ou musculaires, montrer une *contraction* quelconque, qu'on ne le feroit dans un morceau de ficelle de sac de canut-chaux.

Bannissons donc, il en est temps, du langage de la médecine, toutes ces expressions, celle d'un philosophe suranné, & qui n'offrent à l'esprit rien que de vague & d'indéterminé. Si nous voulons élever la physiologie au rang des sciences, le premier pas à faire est de lui créer un langage exact.

Contractions musculaires. Nous ne parlerons

cel de ces contractions qu'autant qu'il le faudra pour faire sentir leurs altérations diverses, qui sont le sujet principal que nous devons traiter. Quelque fucides que soient nos descriptions, elles suffiraient pour montrer combien sont puériles ces divisions fondées sur la couleur des parties musculaires, puisque les différentes espèces de contractions ne font point en rapport avec des classifications systématiques, mais avec les usages des organes que les muscles concourent à former.

Contraction des muscles de la locomotion. La contraction des muscles de la locomotion s'opère ordinairement sous l'influence de la volonté (1) :

(1) Cette assertion ne doit pas être exacte, si l'on n'en entend parler que de cette volonté qui, prise aux actes ouverts de l'intelligence, & qui est toujours chez nous, le résultat d'un jugement dont nous avons conscience. Mais si l'on examine avec soin les actions de l'homme & des animaux, en rapport avec les motifs qui ont dû les déterminer, on s'aperçoit bientôt que l'intelligence n'a pu les diriger toutes, & qu'il en est un grand nombre qu'il faut rapporter à un autre principe. On voit qu'il se veut parler de l'instinct.

1^{re}, elle inspire cette force par laquelle l'homme & les animaux sont poussés à faire certains actes nécessaires à leur conservation, mais dont ils ignorent le but au moment où ils les exécutent. L'instinct peut avoir pour but la conservation de l'espèce comme celle de l'individu.

L'instinct fait diriger tous les actes de la vie chez le plus grand nombre des animaux. Chez l'homme seulement, & chez les animaux de l'ordre le plus élevé, il existe conjointement avec l'intelligence, mais ces deux facultés y sont toujours en proportion inverse. L'être intelligent par excellence, l'homme, est celui qui présente l'instinct le plus borné. Les habits de la civilisation, en donnant à l'intelligence de plus fréquents occasions de s'exercer, l'ont encore perfectionnée, rendus qu'elle n'ont fait qu'insensibiliser l'instinct. A mesure que l'on s'éloigne de l'homme, on voit s'accroître l'instinct & diminuer l'intelligence.

L'instinct se fait appercevoir, 1^o, dans toutes les circonstances physiologiques où l'intelligence n'aient pas les données suffisantes pour déterminer un acte nécessaire à la conservation de l'espèce ou de l'individu ; 2^o, dans celles où l'intelligence n'a pas suffi promptement ; 3^o, dans celles où il ne paraît pas qu'il puisse exister d'intelligence en raison de l'état du système nerveux.

On peut citer pour exemple les premiers ans des faits nombreux & que personne n'ignore : la construction du nid chez les oiseaux, qui précède de beaucoup le temps où l'animal pourroit en sentir le besoin ; la connaissance des sèves de la génération qui se retire, pour ainsi dire, tout-à-coup à l'animal au moment où il est devenu capable de perpétuer son espèce, & d'après les circonstances où ce pouvoir peut être fructueux, &c.

Pour le dire en un seul mot, ces mouvements automatiques sont tels que la pensée, & qui précèdent par conséquent toute réflexion ; ceux par lesquels nous prévenons une chute en dressant par un brusque mouvement du bras ou de son autre membre contre celle de gravité, & le talent de nous-mêmes conduire à la bête de salutation ; celui par lequel nous garantissons l'œil de la lumière trop vive d'un éclair, en abaissant rapidement les paupières ; celui par lequel nous retirons involontairement la main quand un corps brûlant vient à la toucher.

L'instinct nous avertit qui cherche le manège de sa nourriture, & le traduit dans la bouche de exerce les mouvements de succion nécessaires pour faire pénétrer le lait dans son estomac, nous offre un exemple frappant du troisième cas. On pourroit également en trouver un dans la manière dont les animaux des ordres inférieurs pourroient & satisfaisant leur proie.

elle exige alors l'intégrité du cerveau, celle du muscle qui agit, & celle du nerf qui s'y distribue.

Cette contraction peut être aussi déterminée par une irritation mécanique fortée, soit directement sur le muscle, soit sur le nerf qui s'y rend, soit sur la partie du cerveau où vient aboutir ce nerf.

De ces trois modes d'excitation, le second est celui qui détermine le plus énergiquement la contraction.

Dans le cas où l'excitation est portée directement sur le muscle, la contraction qui en résulte est faible, si l'on agit sur un animal vivant, & très-provoquée si l'animal est mort depuis quelques instants.

La contraction, quelle que soit la cause qui la produise, se fait toujours nettement & sans être précédée d'aucun tremblement. On convient généralement de la vérité de ce fait, dans le cas où la contraction s'opère sous l'influence de la volonté ; mais quand elle est déterminée par l'application d'un stimulus, on croit communément qu'elle est précédée de plusieurs oscillations. M. Magendie est le premier qui, d'après des expériences multipliées, ait énoncé le contraire. Je les ai moi-même répétées plusieurs fois, & je me suis assuré par mes yeux que le mode de contraction étoit le

même, nous offre un exemple frappant du troisième cas. On pourroit également en trouver un dans la manière dont les animaux des ordres inférieurs pourroient & satisfaisant leur proie.

Aux trois divisions que j'ai établies, j'ajouterais d'en ajouter une quatrième : l'instinct d'externe agresse quand l'intelligence, par suite de l'état d'obéissance où se trouvent les sens qu'il mettroit en rapport avec les corps extérieurs, est forcé de se livrer dans l'attaque au moins en ce qui s'appartient avec ces corps. Pendant le sommeil, par exemple, d'importantes fonctions doivent continuer à s'exécuter. Si des circonstances étrangères viennent à y mettre obstacle, la vie peut être compromise, mais l'instinct lui-même qui veille à notre conservation, & ce même des mouvements que ces circonstances ont rendus nécessaires.

On dirait que l'instinct est le résultat d'une intelligence se pénétrant à la mort, qui se mettrait en relation avec les corps extérieurs par des moyens plus parfaits que ceux que nous offrons nous-mêmes, pour appercevoir une toute de rapport que nous sommes incapables de sentir, & qui même d'extrême fait d'innombrables & être données, peut préjuger de quelque chose du état futur des choses, & par suite de jugemens qu'il nous suffirait de commander, dans l'intérêt de notre conservation, des siffons que nous pourrions faire d'extérior sans en comprendre le but.

Le savant qui dans ses expériences s'occupe à tracer l'histoire de l'intelligence humaine, néglige souvent de consulter la nature, & ne connaît les actions auxquelles cette intelligence doit s'appliquer. Il fait de la l'homme même le plus judicieux n'avant qu'une partie des données du monde, peut, en procédant rigoureusement de conséquence en conséquence, arriver aux résultats les plus éloignés des faits. Considérez, sans d'abord comme les phéno-mènes intellectuels, a été conduit à dire des idées, quand il a voulu nuire comment la nature a été amenée parvenue à connaître les moyens d'apparier la laim.

même

même dans les deux cas. Ceux qui soutiennent l'ancienne opinion s'en feront sans doute laissé imposer par ces tremblements que l'on remarque souvent aux approches de la mort, & qui persistent quelque temps après, mais qui n'attendent point, pour se monter, l'application d'un stimulus. La seule différence qui existe entre la contraction volontaire & celle qui est provoquée par une excitation étrangère, consiste en ce que la dernière est toujours brusque, pendant que la première peut être graduée.

La contraction provoquée par une excitation portée directement sur le muscle, n'est-elle souvent que partielle : alors il arrive que la partie inactive, forcée de se raccourcir avec celle qui est contractée, se froisse & offre des rides transversales. Ce fait a induit en erreur presque tous les physiologistes, & leur a fait dire que le raccourcissement du muscle étoit dû au *froncement de ses fibres*. J'ai observé souvent sur des animaux les muscles d'un membre mis à nu, & dans les efforts qu'ils faisoient pour s'échapper, j'ai toujours vu la surface du muscle contracté, lisse & sans aucune ride.

Contraction du diaphragme. Le diaphragme, dans le moment de sa contraction, ne présente que des phénomènes entièrement semblables à ceux des muscles de la locomotion ; nous devons l'en distinguer pourtant, non-seulement à cause de la différence dans le résultat de la contraction, & à cause de ce mouvement qui l'anime depuis le premier instant de la vie jusqu'au dernier, mais ce qui constitue une différence plus importante encore, à cause de l'espèce d'influence qu'exerce sur lui la volonté. Au premier aperçu, le diaphragme semble obéir, comme les muscles locomoteurs, aux déterminations raisonnées & aux impulsions instinctives ; cela n'est pourtant exact que pour les dernières. Les actes, pour la production desquels la contraction du diaphragme est nécessaire, il est vrai, presque tous volontaires ; la respiration, la défécation, les efforts de l'accouchement s'exécutent habituellement sous l'influence de la volonté ; mais la volonté, dans ces différens cas, porte sur l'ensemble de l'acte & non sur la contraction du muscle.

On peut accélérer les mouvements de son diaphragme, mais ce fera en ayant la volonté d'accélérer ceux de la respiration.

Il est pourtant quelques individus, & je fais de ce nombre, chez lesquels le diaphragme peut se mouvoir sous l'influence directe de la volonté. Je puis, sans faire aucun effort de défécation & sans inspirer, tenant la glotte bien fermée, contracter un peu latéralement le diaphragme ; mais la poitrine, par suite de cet abaissement, se trouve agrandie dans le sens de son axe vertical, & comme une nouvelle portion d'air ne peut y pénétrer à cause de l'occlusion de la glotte, il devient nécessaire qu'elle se rétrécisse dans la partie où les parois

offrent le moins de résistance : ainsi dans cet instant la voûte diminue à la base par le mouvement des cartilages des dernières fausses côtes qui se rapprochent de l'axe vertical (1).

(1) Avant de passer outre, il n'est pas inutile d'attirer l'attention sur la disposition concave que présente le diaphragme. On conçoit très-bien, on conçoit parfaitement tous les avantages qui résultent de cette forme pour l'accomplissement des fonctions les plus importantes. Mais a-t-on assez réfléchi à tout ce qu'elle offre d'étonnant ?

Comment se fait-il qu'une partie éminemment contractile ait pu prendre une forme si éloignée de la forme plane que la tendrait toute déviation du droit ? Parmi les organes musculaires, fait-elle une exception unique à la loi générale ; ou plutôt cette exception ne seroit-elle qu'apparente ? Personne encore ne s'est occupé de nous le dire, peut-être même n'a-t-on pas songé à cette difficulté.

Pour arriver à conclure la cause de cette singulière disposition, commençons par établir les faits qui se présentent à notre observation.

1°. La concavité du diaphragme existe chez le fœtus avant le moment de la naissance.

2°. Après que l'air a pénétré dans les poumons du fœtus, & augmenté ainsi leur volume, on trouve la cavité du diaphragme assez sensiblement diminuée.

3°. Le développement complet des poumons ne la fait point dans un instant, & par le seul effet de la première inspiration ; il est successif, & pendant quelques jours après la naissance, leur volume continue à augmenter : la concavité du diaphragme diminue en même temps.

4°. La concavité du diaphragme persiste après la mort. Sur un cadavre dont l'abdomen a été ouvert, si l'on fait un diaphragme, qui se présente dans l'état que je viens de décrire, une petite ouverture avec la pointe d'un scalpel, on entend un sifflement produit par l'entrée de l'air dans une des cavités des plèvres, & l'on voit de ce côté s'altérer la forme convexe. Les sifflements changent en pouvant plus revenir sur eux-mêmes, une partie de cette même cavité du diaphragme est repoussée vers l'intérieur, auquel elle présente la concavité.

De tous les faits que nous venons d'exposer, on est conduit naturellement aux deux conséquences suivantes : l'une d'entre les trois premières ; c'est qu'il existe une relation nécessaire entre le volume des poumons & la courbure du diaphragme ; l'autre qui dérive des deux dernières, c'est que cette disposition qui persiste après la vie, & qui existe par une liaison physique indissoluble, doit être produite par une cause purement mécanique.

La concavité du diaphragme n'a-t-elle point d'autre cause que celle, dans le fœtus, dans l'état de son cadavre, elle est le résultat de la pression du milieu, dans lequel se trouve plongé.

Si l'on examine comparativement chez le fœtus, le volume que présente le poumon, & l'ensemble des points où s'attachent le diaphragme, on voit que si cette étoffe étoit tendue, il résulteroit entre elle & lui un espace équilibrable. Dans le vide, la chose pourroit suffire ainsi ; mais dans l'air réel, avec la disposition que présentent les organes, elle est leu d'être possible.

Le fœtus est plongé dans un liquide qui exerce, nous le savons, une plus grande, sur tous les points de sa surface une pression bien supérieure à celle que l'air atmosphérique exercera sur le fœtus. Cette différence de pression n'est point, il est vrai, bien sensible pour précipiter toutes les parties du corps, pleines & formées, surtout à cette époque, en si grande proportion de liquides incompressibles ; mais elle exerce des effets très-marqués sur le thorax & l'abdomen, cavités susceptibles de varier dans leur capacité.

Cet abaïssement général du diaphragme, on le conçoit bien, ne peut être que très-borné, puisqu'il est lié avec le resserrement de la base de la poitrine, qui ne sauroit être porté bien loin; il est, d'ailleurs, très-pénible à cause de l'effort considérable de contraction nécessaire pour vaincre la résistance des cartilages, & à cause du sentiment de constriction qu'il fait éprouver.

On sent qu'il n'en doit plus être ainsi, lorsqu'une partie seulement du diaphragme vient à se con-

tracter, l'autre pouvant se relâcher en proportion, la capacité de la poitrine ne sera pas changée. Je puis contracter successivement, & très-vite, les moitiés droite & gauche du diaphragme de manière à imprimer à tous les viscères contenus dans l'abdomen, un mouvement très-fort de ballotement; mais, je le répète, c'est une exception à la règle générale.

Contraction de l'appareil musculaire du voile du palais. On peut dire des muscles qui entrent dans la composition du voile du palais, de ses piliers & de la luette, ce que j'ai dit du diaphragme. L'appareil dont ils font partie agit dans la déglutition, aussi jusqu'à un certain point volontaire, & cependant, en général, ils ne se meuvent point sous l'influence de la volonté. Il n'y a que très-peu de personnes qui puissent, à leur gré; tendre, relâcher le voile du palais, rapprocher, écarter les piliers, les porter en avant, en arrière, en haut, allonger ou raccourcir la luette; encore, parmi ces individus, en est-il plusieurs chez lesquels cet empire de la volonté n'est qu'apparent, & qui ne parviennent, par exemple, à élever le voile du palais qu'en faisant une grande inspiration.

On s'étonnera peut-être d'entendre appeler la déglutition un acte jusqu'à un certain point volontaire; mais il est certain que ce mouvement n'est pas entièrement & ne peut s'exécuter qu'autant qu'il y a dans la bouche quelque chose qui puisse être avalé. Je sais qu'on peut exécuter ces mouvements de déglutition sans avoir auparavant introduit dans la bouche aucune substance; mais alors on avale une partie de la salive qui y étoit contenue & qui s'y renouvelle sans cesse. On répète ce mouvement deux ou trois fois avec assez de facilité; mais comme la quantité de salive avalée est toujours plus considérable que celle qui, dans un même espace de temps, est versée par les glandes salivaires, la bouche se dessèche, la déglutition devient de plus en plus difficile, & cesse entièrement d'être possible, quand il n'existe plus de salive à la surface de la langue; il faut alors, avant qu'on puisse recommencer, attendre un temps plus ou moins long, jusqu'à ce qu'il s'en soit fait de nouveau.

J'ai dit que la pression qu'éprouve le sternum dans le bas de la cage est beaucoup plus considérable que celle qu'il éprouverait, après la naissance, de la part de l'air atmosphérique. La première pression se compose en effet, 1°. de celle que l'air atmosphérique exerce sur les parois du thorax même, & qui se transmet à toutes les parties qui y sont contenues; 2°. de celle qui résulte des poids des viscères qui pèsent sur l'inférieur; 3°. de la pression produite par le sang que l'artère a reçu et qui lui-même, pression qui ne perd rien de son effet, en agissant par l'intermédiaire du sang, incompressible; 4°. de celle qui provient de la pesanteur même des eaux de l'arnio.

La force employée à distendre le diaphragme est elle-même considérable pour que la contraction puisse trouver moyen de s'exercer; mais quand, d'une semblable pression l'air n'est pas à une pression beaucoup moindre, celle de l'air atmosphérique, la force de contraction l'emportera à son tour sur celle de pression, & le diaphragme devra s'abaïsser.

Cette contraction nécessaire du diaphragme au moment de la naissance est bien certainement une des causes, si elle n'est pas la seule, du phénomène de la première inspiration.

trader, puisqu'il n'en doit plus être ainsi, lorsqu'une partie seulement du diaphragme vient à se con-

tracter, l'autre pouvant se relâcher en proportion, la capacité de la poitrine ne sera pas changée. Je puis contracter successivement, & très-vite, les moitiés droite & gauche du diaphragme de manière à imprimer à tous les viscères contenus dans l'abdomen, un mouvement très-fort de ballotement; mais, je le répète, c'est une exception à la règle générale.

Contraction de l'appareil musculaire du voile du palais. On peut dire des muscles qui entrent dans la composition du voile du palais, de ses piliers & de la luette, ce que j'ai dit du diaphragme. L'appareil dont ils font partie agit dans la déglutition, aussi jusqu'à un certain point volontaire, & cependant, en général, ils ne se meuvent point sous l'influence de la volonté. Il n'y a que très-peu de personnes qui puissent, à leur gré; tendre, relâcher le voile du palais, rapprocher, écartier les piliers, les porter en avant, en arrière, en haut, allonger ou raccourcir la luette; encore, parmi ces individus, en est-il plusieurs chez lesquels cet empire de la volonté n'est qu'apparent, & qui ne parviennent, par exemple, à élever le voile du palais qu'en faisant une grande inspiration.

On s'étonnera peut-être d'entendre appeler la déglutition un acte jusqu'à un certain point volontaire; mais il est certain que ce mouvement n'est pas entièrement & ne peut s'exécuter qu'autant qu'il y a dans la bouche quelque chose qui puisse être avalé. Je sais qu'on peut exécuter ces mouvements de déglutition sans avoir auparavant introduit dans la bouche aucune substance; mais alors on avale une partie de la salive qui y étoit contenue & qui s'y renouvelle sans cesse. On répète ce mouvement deux ou trois fois avec assez de facilité; mais comme la quantité de salive avalée est toujours plus considérable que celle qui, dans un même espace de temps, est versée par les glandes salivaires, la bouche se dessèche, la déglutition devient de plus en plus difficile, & cesse entièrement d'être possible, quand il n'existe plus de salive à la surface de la langue; il faut alors, avant qu'on puisse recommencer, attendre un temps plus ou moins long, jusqu'à ce qu'il s'en soit fait de nouveau.

Contraction du pharynx. J'aurai peu de choses à dire de la contraction des constricteurs du pharynx. Le second temps de la déglutition dans lequel il agit est un mouvement soulevé de la volonté, une espèce de position déterminée par la présence du bol alimentaire & suite nécessaire du premier temps. On trouve pourtant quelques individus qui, hors du moment de la déglutition, contractent à leur gré ces muscles.

Contraction de l'œsophage. De toutes les parties musculaires, l'œsophage est celle qui jouit des mouvements de contraction les plus variés. M. Nageotte les a fait connaître dans sa Mémoire fort intéressante qu'il a publiée sur ce sujet; c'est à lui

que j'emprunterai ce que je vais en dire, en regrettant d'être forcé de l'abréger.

» L'œsophage, dans son tiers inférieur, est continuellement agité d'un mouvement alternatif de contraction & de relâchement qui semble indépendant de toute irritation étrangère.

» Ce mouvement m'a paru limité à la portion du conduit qui est environné par le plexus des nerfs de la huitième paire, c'est-à-dire, à son tiers inférieur environ; il n'en existe aucune trace au cou, non plus qu'à la partie supérieure de la poitrine. La contraction se montre à la manière du mouvement péristaltique; elle commence à l'union des deux tiers supérieurs de l'œsophage avec son tiers inférieur, & se prolonge jusqu'à l'insertion de ce conduit dans l'estomac. La contraction une fois produite continue un temps variable, ordinairement c'est moins d'une demi-minute.

» Contracté de cette manière dans son tiers inférieur, l'œsophage est dur comme une corde fortement tendue. . . . Quand la contraction a duré le temps que je viens d'indiquer, le relâchement m'a paru arriver tout-à-coup & simultanément dans chacune des fibres contractées; dans certains cas cependant, le relâchement m'a paru se faire des fibres supérieures vers les inférieures; l'œsophage examiné durant l'état de relâchement, présente une flaccidité remarquable & qui contraste singulièrement avec l'état de contraction.

» Le mouvement alternatif dont je parle est sous la dépendance des nerfs de la huitième paire. Quand on a coupé ces nerfs sur un animal, le mouvement cesse complètement, l'œsophage ne se contracte plus; mais il n'est pas non plus dans l'état de relâchement, ses fibres souffraient à l'influence nerveuse se reconstruisent; c'est ce qui produit, relativement au toucher, un état intermédiaire à la contraction & au relâchement.

» Lorsque l'estomac est vide ou à demi rempli d'aliments, la contraction de l'œsophage revient à des époques beaucoup plus éloignées; mais si l'estomac est fortement distendu par une masse quelconque, la contraction de l'œsophage est ordinairement plus énergique & elle se prolonge beaucoup plus long-temps. Je l'ai vu dans des cas de cette espèce se continuer plus de dix minutes; dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire, lorsque l'estomac est rempli outre mesure, le relâchement est toujours beaucoup plus court.

» Si, durant la contraction de l'œsophage, on veut, par une pression mécanique exercée sur l'estomac, faire passer une partie des aliments qui y sont contenus dans l'œsophage, il faut, pour y parvenir, employer une force très-considérable, encore le plus souvent n'y parvient-on pas; il m'a semblé même que la pression

» faisait croître l'intensité de la contraction de l'œsophage & qu'elle la prolongeait.

» Quand, au contraire, c'est dans l'instant du relâchement que l'on comprime l'estomac, il est très-facile de faire passer les matières qu'il contient dans la cavité de l'œsophage; si c'est un liquide, par exemple, la plus légère pression, quelquefois même le simple poids du liquide on la tendance qu'a l'estomac à revenir sur lui-même, peuvent seuls amener ce résultat.

» Voyons maintenant comment se comporte l'œsophage dans la déglutition. Le pharynx, par sa contraction, a poussé le bol alimentaire avec assez de force pour le faire pénétrer dans la partie supérieure de cet organe qu'il dilate; les fibres de cette partie, excitées par la présence du bol, se contractent & poussent l'aliment vers l'estomac (1), en déterminant la distension de celles qui sont plus inférieures, celles-ci se contractent à leur tour, & la même chose se répète jusqu'à ce que le bol parvienne à l'estomac.

» Dans les deux tiers supérieurs de l'œsophage, le relâchement des fibres circulaires lui immédiatement la contraction par laquelle elles ont déplacé le bol alimentaire. Il n'en est pas de même pour le tiers inférieur; celui-ci reste quelque instant contracté après l'introduction de l'aliment dans l'estomac.

» On s'abuseroit si l'on croyait rapide la marche du bol alimentaire dans l'œsophage. J'ai été frappé dans mes expériences de la lenteur de sa progression; quelquefois il met deux ou trois minutes avant d'arriver dans l'estomac, d'autres fois il s'arrête à diverses reprises & fait un séjour assez long à chaque station. Je l'ai vu dans certaines circonstances remonter de l'extrémité inférieure de l'œsophage vers le cou pour remonter ensuite.

» Outre les mouvements de contraction péristaltique que je viens de rapporter, l'œsophage jouit encore d'un mouvement semblable à celui des muscles volontaires. Si on le pique, si on tire avec des nerfs qui s'y distribuent, si on le soumet à une décharge galvanique, on le voit aussitôt se contracter énergiquement à la manière des muscles, ou le soit à la fois diminue de longueur par la contraction de ses fibres longitudinales, & de calibre par celle des fibres circulaires.

» Contractions de la tunique musculuse de l'estomac. L'estomac, si l'on en juge par la direction différente des faisceaux charnus de sa tunique moyenne, peut jouir de mouvements très-variés;

(1) C'est ce resserrement de l'œsophage derrière le corps soumis à la déglutition, qui permet à certains bacheliers de manger & de boire dans une position renversée, & telle que le point par où le liquide est introduit, est placé le plus bas possible, pendant que celui auquel il doit parvenir est placé le plus haut.

cependant, dans l'état de vacuité, cet organe n'en présente habituellement qu'un seul, peu marqué, & qui ne se montre qu'à d'assez longs intervalles. C'est un léger resserrement annulaire produit par la contraction des faisceaux du plan moyen (1), & qui semble se promener sans suivre de lui déterminée, tantôt de l'œsophage vers le pylore, tantôt de ce point au cardia.

Quelquesfois on le voit naître vers une des extrémités, d'autres fois c'est à la partie moyenne qu'il commence à se montrer. Dans tous les cas, le filon qui lui présente est beaucoup moins prononcé que celui qu'on observe sur les intestins, dans leur mouvement péristaltique.

Si l'on introduit dans l'estomac un médicament irritant, le mouvement ondulatoire devient beaucoup plus prompt & beaucoup plus marqué. De toutes les substances que l'on emploie à cet effet, celle qui m'a paru agir le plus puissamment, c'est la *véralrine*, alcali végétal découvert depuis peu de temps dans l'ellébore blanc, *veratrum album*, & la cévadille, *veratrum sabadilla*, par MM. Pellétier & Cavenou.

Un jeune médecin m'a dit avoir observé après l'injection d'un gros de sublimé dans l'estomac d'un chien, des effets plus prononcés encore que ceux que je lui rapportais dans la véralrine : c'étoit un mouvement tumultueux, assez semblable, malgré son irrégularité, au mouvement péristaltique. Quelquesfois on voyoit naître successivement au pylore plusieurs filons très-profonds, qui, en se portant vers le cardia, donnaient, par leurs ondulations, à la surface de l'organe, l'apparence de celle d'une liquide agitée par le vent. Quelquefois les rides se montraient vers l'œsophage & se dirigeoient vers le pylore ; elles souvent deux courans opposés se rencontraient, & alors les contractions n'offroient plus rien que d'irrégulier pendant un temps assez long.

M. Portal raconte, qu'ayant donné à un chien une certaine dose d'arsenic, ce chien fut bientôt tourmenté par le vomissement, le hoquet, les convulsions. On lui ouvrit le bas-ventre en coupant transversalement les muscles droits, à l'a-

(1) On sût que la tunique moyenne de l'œsophage se compose de trois plects musculaires : le plus extérieur est formé de faisceaux longitudinaux, qui commencent à la partie inférieure de l'œsophage, s'étendent en recouvrant les faces antérieure & postérieure de l'estomac, pour le s'approcher vers le pylore, & qui suivent surtout la grande & la petite courbure. Ces plects, réunis en deux bourses, forment, suivant quelques auteurs, un grand rôle dans l'acte du vomissement. Les second plect se compose de faisceaux en partie annulaires, & disposés perpendiculairement à la grande courbure de l'estomac. Les faisceaux sont peu nombreux au cardia, vers le pylore, ils deviennent moins distincts, & l'on ne peut même que supposer leur présence à la plus grande épaisseur des parois, & à la contractilité dont jouit ces orifices. Le troisième plan n'en est pas un, & proprement parler, il se compose uniquement de deux larges bandes, qui de l'œsophage se portent obliquement vers le grand cul-de-sac,

pointe des obliques & des transverses ; les vomissements continuèrent, & l'on put voir le ventricule se contracter & se relâcher alternativement.....

Je suis loin de révoquer en doute la bonne foi de l'auteur & son talent d'observation ; cependant je regarde comme incertain le fait qu'il a rapporté. Ce qui rend souvent les expériences moins profitables à la science qu'elles ne devoient l'être, c'est que, l'observateur y apporte un esprit qui n'est pas entièrement dégagé des idées qu'il a précédemment reçues, & qu'il est tout disposé à reconnaître le phénomène qu'il attend dans celui qui va se présenter : c'est, je crois, ce qui est arrivé dans le cas dont il s'agit.

À l'époque où M. Portal fit cette expérience (en 1771), on ne doutoit point que l'estomac ne se contractât dans le vomissement. On ouvrit l'abdomen pour observer le phénomène ; on vouloit le voir, on le vit. Dans le moment du vomissement, l'estomac étoit agité par les contractions des muscles obliques, dont l'action n'étoit que très-peu diminuée par la section de la sonde apoplectique médiane. On observa des mouvements dans l'organe, on dut croire avoir vu des contractions.

Une piqure, une percussion brusque du doigt, l'application d'un conducteur galvanique, &c. en ont ; une excitation quelconque à la surface de l'estomac, détermine dans cet organe la contraction des fibres circulaires au point excité, & produit ainsi un resserrement qui la forme lentement, persiste un temps plus ou moins long, & disparaît graduellement sans se remonter ailleurs.

Ce resserrement annulaire paroît plus prononcé quand l'excitation est portée sur l'estomac d'un animal qu'on vient de mettre à mort. Le mouvement vémiculaire spontané est aussi beaucoup plus prononcé dans ce cas, même lorsque l'organe a été entièrement séparé des parties voisines.

La présence des alimens dans l'estomac, détermine dans cet organe une série de mouvemens très-remarquables, & qui ont été décrits avec beaucoup de soin par M. Magendie, dans son *Prix élémentaire de physiologie*. Je les ai moi-même observés en grand nombre de fois, & j'ai vu combien ils ressembloient peu au mouvement de *peristole*, indiqué par presque tous les physiologistes comme appartenant à ce mouvant.

Si, après avoir fait avaler à un chien une certaine quantité d'alimens, on ouvre l'abdomen pour observer l'état de l'estomac, on remarque les phénomènes suivans :

Le pylore est fermé, & est qui lui est d'ailleurs habituel ; que l'estomac soit vide ou plein, ce qui résulte du resserrement de son anneau bursaire, comme de la contraction des derniers fileux musculaires du plan musculaire moyen.

Souvent on voit à l'estomac un autre resserrement à un ou deux pouces de distance. Ce resser-

rement semble destiné à empêcher les aliments d'arriver jusqu'au pyllore.

Enfin, l'on aperçoit de temps à autre des contractions irrégulières, antipéristaltiques, c'est-à-dire qui commencent au duodénum & se prolongent dans la portion pylorique; contractions dont l'effet est de repousser les aliments vers la partie splénique.

Lorsque les aliments sont restés un certain temps dans l'estomac, & comme on a pu le reconnaître en ouvrant cet organe, lorsqu'il commence à y avoir du chyle formé, on voit, après quelques instans d'immobilité, se contracter l'extrémité du duodénum, le pyllore & la portion pylorique de l'estomac. Par ce mouvement, le chyme déjà sucré & à la surface de la masse alimentaire est repoussé vers la portion splénique.

Bientôt un mouvement en sens inverse se développe. La portion pylorique se relâche & permet au chyme de rentrer de nouveau dans la cavité, puis elle se contracte de gauche à droite, & dirige vers le duodénum le chyme qui franchit le pyllore & pénètre dans l'intestin. Ce mouvement se répète un certain nombre de fois, puis s'arrête pour recommencer ensuite; quand l'estomac est plein d'aliments, il est borné à la portion pylorique; mais à mesure que cet organe se vide, il acquiert plus d'étendue & se montre plus prononcé. La portion splénique elle-même y prend part vers la fin de la chymification.

Contraction du pyllore. Un arroule faire jouer au pyllore un rôle important dans l'acte de la digestion, en le supportant doué d'une sensibilité particulière, en vertu de laquelle il distingueroit quand il faut ouvrir ou fermer le passage aux matières alimentaires suivant leur degré d'élaboration. S'acidification, dans ce cas, est considérée comme un phénomène entièrement actif; d'autres auteurs, au contraire, la regardent comme entièrement passive, & n'y voient voir rien que de mécanique.

De ces deux opinions, la première, fondée sur la supposition d'une sensibilité dont on ne sauroit prouver l'existence, on peut être induit par ceux qui veulent des explications déduites des faits, & non des hypothèses; la seconde, aussi trop exclusive, ne sauroit être reçue, du moins sans de grandes restrictions.

L'obstacle que le pyllore oppose à la sortie des aliments contenus dans l'estomac résulte, a-t-on dit, en partie du rétrécissement de ses anneaux fibreux, en partie de la contraction de ses anneaux musculaires; or, ces derniers se conduisent comme ceux de la partie inférieure de l'œsophage, comme se conduisent, en un mot, tous les muscles qui forment le sphincter; ils font alternativement contractés & relâchés; tant que la cavité dont ils ferment l'entrée est vide, les contractions sont rares & de peu de durée; quand, au contraire, l'organe est distendu par les matières qui y sont con-

tenues, & qui tendent à s'en échapper, les contractions sont de longue durée, & le relâchement n'a lieu que dans un temps très-court.

Ce relâchement s'opère au moment où le chyme, poussé par la contraction de la portion pylorique de l'estomac, se présente pour passer dans le duodénum; la résistance de l'anneau fibreux est alors surmontée mécaniquement par la pression qu'exerce le chyme; mais lorsque cette substance est passée dans l'intestin grêle, l'anneau revient pour lui-même en vertu de son élasticité, & forme de nouveau l'estomac.

Cette coïncidence du relâchement du pyllore, avec la contraction de l'estomac, peut fournir matière à de nombreuses réflexions; est-il, par exemple, bien rationnel de croire que deux phénomènes aussi opposés soient produits dans le même moment, par l'impression d'une même substance sur des parties d'organisation semblable? Nous reconnaissons cette coïncidence, nous sentons son utilité, mais quant à l'expliquer, nous ne le pouvons pas plus pour cette fonction que pour tant d'autres, où nous voyons également simultanément d'action dans des organes en apparence indépendans l'un de l'autre.

Contraction des intestins. Si l'on examine les intestins contenus dans l'abdomen d'un animal vivant, on les voit habituellement en repos. Seulement de temps à autre un mouvement vibrateur, un peu plus prononcé que celui de l'estomac, se montre sur quelque point de leurs circonvolutions; ce mouvement n'a rien de régulier, il le dirige tantôt vers l'extrémité inférieure du tube intestinal, & tantôt vers la supérieure. Un médicament injecté dans l'intestin augmente beaucoup l'intensité de ces mouvemens. La vérsine, par exemple, dont nous avons déjà parlé, produit ces effets d'une manière très-insupportable. Les contractions qu'elle détermine se montrent d'abord au point avec lequel elle a été mise en contact, & de-là elles se propagent rapidement à toute la longueur du tube intestinal, qu'elles agitent de mouvemens tumultueux. On peut tirer parti de cette propriété de la vérsine, & s'en servir très-utilement pour réveiller la contractilité du canal, & l'exciter à se débarrasser des matières fécales qui, chez certains vieillards, s'y amassent en grande abondance.

Une irritation portée à l'extérieur du canal intestinal, détermine une contraction qui quelquefois se borne au point excité, & quelquefois aussi se propage aux points les plus voisins.

Si l'on ouvre l'abdomen d'un chien ou d'un autre mammifère, peu d'instans après la mort, on remarque dans toute la partie loquidapragmatique du canal intestinal, un mouvement très-fort & très-précipité, & qui n'est nulle part plus marqué que dans l'intestin grêle. Non-seulement les contractions péristaltiques ont augmenté beaucoup d'intensité, & font marcher rapidement dans des

directions différentes les gaz & les matières solides contenus dans la cavité, mais encore on le voit agité dans le sens de sa longueur, d'un mouvement très-prononcé par lequel ses circonvolutions roulent en glissant sur elles-mêmes, & changent à chaque instant de rapports. Ce dernier mouvement se montre aussi dans le cas d'interjection, à l'intérieur du canal; d'une substance suffisamment irritante, il se montre encore, quoique d'une manière moins marquée, dans la digestion, pendant tout le temps qu'emploie le chyme à s'accumuler dans l'intestin grêle.

Quand sur un animal vivant, on détache de l'abdomen la masse entière des intestins, on voit au mouvement lent & peu marqué, dont j'ai parlé au commencement de ce paragraphe, succéder en très-peu de temps le mouvement tumultueux que je viens de décrire.

Pendant la digestion, une série nouvelle de mouvements se développe; ces mouvements ne commencent à se montrer qu'au moment où une portion du chyme déjà formée, va passer de l'estomac dans l'intestin grêle; ils font d'abord bornés au duodénum; voici la part qu'y prend cet intestin.

On voit à sa partie moyenne se développer un mouvement de contraction, qui se propage rapidement vers le pylore. Cet anneau se resserre, & l'estomac lui-même se contracte dans sa portion pylorique, en présentant le mouvement antipéristaltique que nous avons décrit; le mouvement inverse a bientôt lieu & se propage au duodénum. Au moyen de la contraction de ces deux parties, & grâce au relâchement du pylore dans cet instant, le chyme passe de l'estomac dans l'intestin. Quand, après un intervalle plus ou moins long, ce mouvement se répète pour faire passer la nouvelle portion de chyme formée à la surface de la masse alimentaire, celui qui est contenu déjà dans le duodénum, repoussé par le mouvement antipéristaltique de cet intestin, tend à rentrer dans l'estomac, mais il est arrêté par le resserrement du pylore; de sorte que cet anneau ne sert pas moins à empêcher les matières alimentaires de remonter dans l'estomac, quand elles ont subi le degré d'élaboration nécessaire, qu'à les empêcher d'en sortir avant ce moment.

Lorsque, par le moyen de ce double mouvement répété un certain nombre de fois, & à des intervalles plus ou moins éloignés, le chyme s'est accumulé dans la partie supérieure du duodénum, cette partie, existant par sa présence, se contracte bientôt, & par un mouvement qui n'a rien de régulier, elle le fait marcher vers le cæcum. Peu à peu, lorsque la quantité d'aliments introduite dans l'estomac est suffisante, l'intestin grêle se trouve entièrement rempli.

Lorsque tout le chyme est passé dans l'intestin grêle, les mouvements que nous venons de décrire cessent entièrement; on ne voit plus qu'un petit

mouvement vermiculaire très-irrégulier, & assez semblable à celui qui se montre pendant la vacuité de l'organe.

Quand le chyme a séjourné dans l'intestin grêle le temps nécessaire à la formation & à l'absorption du chyle, la portion inférieure de l'intestin se contracte, & par des mouvements très-irréguliers qui le répètent à de longs intervalles, & ne coïncident en rien avec ceux du pylore, elle fait passer dans le gros intestin les matières dépouillées de leurs principes nutritifs.

Ces matières s'accumulent dans le cæcum, où leur présence, au bout de quelque temps, détermine des contractions très-irrégulières, & pour la direction qu'elles affectent, & pour les instans où elles se montrent. De ces contractions, les unes tendent à pousser les matières fécales dans le colon, les autres tendent à les faire remonter dans l'intestin. Mais ces matières trouvent un obstacle dans la valvule iléo-cæcale, qu'elles avoient abaissée à leur sortie de l'intestin, qu'elles relèvent elles-mêmes dans le mouvement rétrograde, & qui s'oppose ainsi à leur retour.

Le mouvement par lequel le colon, en se contractant, fait marcher les matières fécales dans sa cavité, est très-peu marqué, & serait peut-être insuffisant sans la pression qu'exerce sur cet intestin les parois abdominales. Sous l'influence de ces deux causes, les matières arrivent dans le rectum qui se laisse distendre par elles, mais qui, après un certain temps, se contracte de haut en bas pour les expulser. Mais malgré l'épaisseur qu'il présente dans sa couche musculaire, sa contraction serait insuffisante si elle n'étoit aidée par celle du diaphragme qui s'abaisse directement les viscères, & par celle des muscles abdominaux; qui, par leur résistance, empêchent que l'effet de la pression ne se borne à les porter en avant. Mais il ne suffit pas que les matières, pour sortir de l'intestin, soient ainsi poussées vers l'anus; il faut encore que celui-ci s'ouvre pour leur livrer passage; c'est ce qui arrive par le relâchement des deux sphincters & celui du releveur de l'anus.

Contractions des sphincters de l'anus. Le sphincter externe ne diffère en rien, pour sa structure, des muscles de la locomotion. Ajouté du même mode de contraction, & comme eux, il entre en action sous l'influence de la volonté. Il est habituellement fermé par le seul effet de sa tonicité; mais il peut se contracter avec plus de force & aider par son resserrement à celui du sphincter interne, dans les cas où il faut empêcher la sortie involontaire des matières fécales; lorsque la plus grande liquidité de ces matières & l'intensité plus grande des contractions du rectum & du colon exigent une résistance plus forte que de coutume.

Le sphincter interne ne présente rien de différent pour ses mouvements, de ceux des autres sphincters du canal digestif; il est alternativement

contradicté & relâché. Quand le rectum est vide, les contractions sont rares & de peu de durée; quand il est plein, elles durent très-long-temps; les intervalles de relâchement au contraire sont très-courts.

Le sphincter interne de l'anus n'est pas bien distinct des autres faisceaux charnus qui forment le plan interne de la tunique moyenne du-rectum, & les plus inférieurs partagent la contraction dans le temps où cet intestin est rempli par les matières qui s'y sont accumulées. Lorsque la défécation s'exécute sous l'influence de la volonté, ces anneaux se relâchent de bas en haut devant les matières fécales, à mesure que celles-ci sont poussées par la contraction successive des anneaux supérieurs.

Remarques sur les contractions du canal digestif. Dans tous les mouvements que nous venons de décrire, la contraction des faisceaux anaux se manifeste par des effets très-sensibles; celle des faisceaux longitudinaux est beaucoup plus obscure, & ses effets ne sont guère manifestes qu'à l'œsophage, où une excitation extérieure détermine un raccourcissement très-prononcé, & à l'intestin grêle, où l'on voit les circonvolutions changer de rapport, etc. etc., ce qui ne pourroit être produit par la seule contraction des faisceaux annulaires.

Ce n'est que dans les changements qui s'opèrent lentement, qu'on peut bien apprécier l'action des faisceaux longitudinaux, sur le canal intestinal. Tout le monde dit que lorsque l'estomac est resté quelque temps vide, il revient sur lui & diminue considérablement dans toutes ses dimensions, ce qui ne sauroit avoir lieu si les faisceaux qui suivent la direction de ses deux courbures, & qui se continuent avec ceux du plan externe de l'intestin grêle, ne se contractent aussi bien que les faisceaux annulaires qui les croisent. Ce resserrement n'est point borné à l'estomac; l'intestin grêle, le gros intestin y participent également, quoique d'une manière moins sensible; mais on peut le voir très-marqué chez les individus morts à la suite d'une longue maladie, dans laquelle ils ont pris peu d'aliments & de boissons; chez eux, le canal intestinal se trouve souvent réduit au tiers de sa longueur, & quant à sa capacité intérieure, elle est quelquefois diminuée au point de pouvoir à peine admettre le tuyau d'une plume à écrire.

On s'en remarque que sous le rapport de la contraction, les parties supérieures & sous-diaphragmatiques du canal intestinal offrent entre elles une différence bien tranchée. La partie supérieure, soumise par sa partie externe à une excitation physique, se contracte bruyamment & dans une grande étendue, absolument comme le feroit un muscle de locomotion placé dans les mêmes circonstances, tandis que la partie inférieure, stimulée par le même excitant, se resserre d'un mouvement lent, qui commence au point excité & passe succes-

sivement aux faisceaux voisins. Le phénomène est surtout bien remarquable chez les oiseaux. Chez ces animaux privés de diaphragme, on ne peut désigner de la même manière que chez les mammifères, les parties analogues du canal intestinal; mais chez eux comme chez ces derniers, l'estomac & la partie du tube digestif placée au-dessous de lui, se contractent par un mouvement lent & vermiculaire, tandis que l'œsophage jouit d'un mouvement brusque & instantané. Cependant cet organe est pour ainsi dire membraneux, & ne présente dans son organisation rien d'apparent qui puisse le faire distinguer de certains autres points du canal intestinal. L'estomac, au contraire, offre des muscles rouges & épais, pourvus de tendons, semblables aux muscles de la locomotion, mais qui ne jouissent pourtant que d'un mouvement vermiculaire.

Contraction de la vessie. Cette contraction se borne, d'une part, au resserrement uniforme de toute la tunique musculaire pour expulser l'urine quand la distension de l'organe a été portée trop loin, & de l'autre au resserrement habituel & plus énergique des faisceaux charnus du col, resserrement qui retient ce liquide dans la vessie jusqu'à un moment où le besoin, produit par cette distension, s'en fait sentir.

La contraction de cet anneau musculaire peut s'appuyer à la sortie de l'urine tant que celle-ci n'est pas en assez grande quantité pour faire s'élever la vessie au-dessus de la marge du bassin; au-delà de ce point, comme cet organe n'est plus protégé par des parois osseuses, il devient plus exposé aux effets de la pression abdominale; & comme, d'ailleurs, la tunique musculaire, plus distendue, tend davantage à revenir sur elle-même, l'urine se trouve, dans la cavité, soumise à une compression qui l'en expulseroit malgré le resserrement du sphincter; & à la résistance opposée par celui-ci, ne venoit se joindre celle du releveur de l'anus, dont la contraction a pour effet d'appliquer l'une contre l'autre les parois de l'urètre.

Dans les efforts de défécation, quelque petite que soit la quantité d'urine qui distend la vessie, cet organe, soumis à une pression assez forte, à cause de l'abaissement du diaphragme, tend toujours à s'en débarrasser; comme d'ailleurs le releveur de l'anus, qui aide ordinairement le sphincter à s'opposer à cette expulsion, se relâche dans ce moment pour le passage des matières fécales, la résistance n'est plus assez grande & le liquide doit s'échapper.

Le relâchement du releveur de l'anus est presque toujours accompagné de celui du sphincter externe; & comme l'action du premier de ces muscles est nécessaire pour s'opposer à la sortie des matières fécales comme à celle de l'urine, il arrive qu'au moment de l'expulsion de ce liquide, les matières contenues dans le rectum trouvent

une grande facilité à s'en échapper ; aussi, chez les individus atteints de diarrhée, l'urine n'est-elle point expulsée par un jet continu ; sa forme est, au contraire, interrompue par des contractions brusques & fréquentes des muscles du périnée, contractions qui ont évidemment pour but de s'opposer à la sortie des matières stercorales.

De toutes les téniques musculaires du corps humain, la tunique de la vessie est celle qui se montre le moins sensible aux excitations appliquées à sa surface extérieure. Quant à celles que l'on pourroit porter sur la surface interne, au moyen de médicaments irritans, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire l'essai, & je ne crois pas qu'aucun auteur en ait décrit les effets.

Les contractions isométriques se développent quelques instans après la mort dans la tunique musculaire de la vessie, & chassent une partie de l'urine contenue dans cet organe s'il s'en trouve une assez grande quantité.

Le meilleur moyen d'observer ces contractions & de voir leurs effets aussi marqués que possible, est d'isoler entièrement la vessie sur un chien qu'on vient de mettre à mort. Si l'on a eu soin de ne pas intéresser le col, on voit que son resserrement suffit d'abord pour s'opposer à la sortie de l'urine sollicitée par l'action de la pesanteur ; mais bientôt les parois de la cavité reviennent sur elles-mêmes, la vessie, de flasque qu'elle étoit, devient dure & résistante, & surmontant la résistance du sphincter, elle lance l'urine par un jet qui s'élève souvent à plus d'un pied. Pendant ce temps, le volume de l'organe diminue, & quelquefois à un tel point que l'expulsion achevée, il offre à peine le diamètre de ce qu'il étoit avant le resserrement.

Contraction du cœur. Des deux mouvemens de systole & de diastole que présente chacune des cavités du cœur, le premier est bien évidemment un effet de contraction musculaire. Pour le second, la chose est loin d'être aussi manifeste, & tout porte plutôt à croire que dans la dilatation, les parois de ces cavités le montrent purement passives.

Les mouvemens des cavités du cœur sont trop intimement liés avec le mouvement du sang qui les traverse, pour qu'on puisse décrire les uns sans parler en même temps de l'autre ; aussi l'ordre que suit ce liquide dans son cours, sera celui que nous adopterons dans la description des contractions des parois qui le meuvent.

Quand sur un animal vivant on observe le cœur nu à nu, on voit que le resserrement des ventricles alterne avec celui des oreillettes, & que ce mouvement se fait de telle manière que la systole des uns a lieu précédemment au moment de la diastole des autres.

Il n'est pas absolument exact de dire, comme on le fait ordinairement, que l'oreillette droite se contracte sous l'influence du sang qui y arrive par les veines caves supérieure & inférieure, puisqu'après qu'on a lié ces vaisseaux & empêché ainsi

l'abord du sang, les contractions n'en persistent pas moins. On les voit également continuer sur un cœur que l'on a détaché entièrement du corps. La contraction de l'oreillette droite se fait d'une manière nette & brusque, comme celle des muscles de la locomotion.

Cette contraction, sans effacer entièrement la cavité de l'oreillette, la diminue considérablement, & le sang s'échappe par toutes les ouvertures suivant le degré de facilité qu'il y trouve. La veine coronaire n'a qu'un très-petit calibre & n'en peut, par conséquent, admettre que fort peu ; elle est, d'ailleurs, garnie d'une espèce de valvule qui en ferme presque entièrement l'entrée. La veine cave, il est vrai, offre un orifice assez large, mais cette veine, dans l'abdomen, est soumise à une pression considérable, & la partie voisine du cœur peut seule le dissoudre pour recevoir le sang de l'oreillette. Quant à la veine cave supérieure, le sang n'y peut refluer qu'en remontant contre d'efforts de la pesanteur & en surmontant le poids de la colonne nonvelle qui descend vers l'oreillette. Il ne remplit donc encore de cette veine que la partie la plus voisine du cœur.

L'orifice oriculo-ventriculaire offre un passage plus facile ; sa largeur est beaucoup plus grande, & la cavité du ventricule droit, auquel il conduit, s'agrandit dans le moment même où diminue celle de l'oreillette. Ce ventricule reçoit donc la plus grande partie du sang chassé.

La dilatation de l'oreillette succède immédiatement à son resserrement, & le sang veineux dont le cours avoit été suspendu, s'y précipite de nouveau.

La diastole est-elle un effet purement passif de l'afflux du sang ? C'est l'opinion d'un grand nombre de physiologistes, & c'est celle que professoit Haller. Ramberger, qui étoit rarement du même avis, soutenoit au contraire que la dilatation étoit la cause & non l'effet de cet afflux : que les parois de l'oreillette étoient plus actives dans ce cas que dans la systole, rar elles lui paroissent plus dures, & que le vide qui tendoit à se produire dans cette cavité étoit activement agrandi, soit la cause qui y faisoit arriver le sang contenu dans les veines caves & coronaire.

Ces deux opinions trop exclues ne peuvent aujourd'hui être adoptées ; celle de Haller manque d'exactitude, puisque la dilatation de l'oreillette exige point l'abord du sang, qu'elle a lieu avant la liaison des veines qui l'apportent, & qu'on la remarque même sur le cœur entièrement séparé du corps ; mais à cet auteur, au lieu de la présenter comme un effet passif de l'afflux du sang, se fait consentir de dire qu'on n'y voyoit rien d'actif ; je ne fais ce qu'on en ait pu lui répondre.

Aujourd'hui, il est vrai, rien ne prouve que les parois du cœur soient entièrement inactives dans la diastole, mais rien aussi ne nous prouve le contraire.

Ce n'est certainement point la dilatation de l'oreillette qui attire le sang par une espèce de suction, comme le prétend Haubergier. S'il en étoit ainsi, cette augmentation de capacité active, & tout-à-fait indépendante de l'afflux du liquide, devroit être la même, qu'il en abordât ou non, dans la cavité. Or, l'observation nous apprend que lorsque le cours du sang est libre dans les veines carotides supérieures & inférieures, l'oreillette, dans la diastole, est bien autrement rebondie que dans le cas où elle est vide par suite de la ligature de ces veines ou même de leur section.

On peut donc dire, sans crainte d'erreur, que l'arrivée du sang dans l'oreillette, doit être une des causes de la dilatation. Je sais qu'un grand nombre d'écrivains prétendent que le sang veineux arrive avec trop peu de force dans cette cavité, pour pouvoir la distendre en aucune manière; mais cette force n'est pas aussi petite qu'en le suppose communément. On doit se souvenir que pendant la systole, le sang, repoussé dans les veines caves, s'est accumulé dans les parois de ces veines les plus voisines du cœur, qu'il a distendu fortement leur paroi, & que lorsque la cause qui s'opposait à son mouvement vient à cesser, ces parois élastiques, quoi qu'en dise Richat, doivent régir elles-mêmes fortement; que l'impulsion qui est résultée pour cette portion du sang, jointe à celle qui lui est communiquée par la colonne qui la suit, doit le pousser avec assez de force dans l'oreillette. On peut remarquer d'ailleurs, qu'au moment où il y pénètre, les parties qui s'étoient contractées dans la systole se trouvent dans l'état de relâchement, & se laissent, par conséquent, plus facilement distendre.

La cavité a été réduite par suite d'une contraction musculaire de ses parois; il est naturel qu'à son relâchement, elle revienne à une capacité plus grande: peut-être d'ailleurs, dans ce mouvement de dilatation, y a-t-il quelque chose qui tienne à l'élasticité des parois, comme on le voit dans les artères qui, diminuant d'abord sensiblement de capacité, après avoir été soumise à une cause intérieure de dilatation, reprennent ensuite, par l'effet de cette même élasticité des parois, un calibre plus considérable, & tel qu'elles l'avoient ordinairement auparavant.

Mais, dira-t-on, quand on examine sur un cadavre les parois de l'oreillette, on n'y reconnoît point cette élasticité & la résistance à la rupture, également remarquable pendant la vie dans ces parties; l'observe-t-on aussi alors? Si on ne la connoît point d'avance, on seroit loin de la soupçonner: n'en pourroit-il pas être de même de l'élasticité?

Cette supposition me répondra moins à admettre, que celle d'une force d'expansion dont l'économie n'offrirait aucun autre exemple; car attribuer à cette cause l'augmentation de volume des tissus caverneux, me sembleroit aussi peu

sensé que d'y rapporter celui d'une éponge que l'on mouillerait.

Au reste, ces deux idées étant purement conjecturales, l'une & l'autre ne méritent pas qu'on y attache beaucoup d'importance, & jusqu'à ce que l'expérience ait décidé, l'esprit pourra se déterminer pour celle qui lui sera la plus agréable.

Le sang qui afflue de nouveau dans l'oreillette droite, pendant la diastole, pénétreroit de suite à travers l'orifice oriculo-ventriculaire dans le ventricule du même côté, si celui-ci n'étoit en même temps dans la systole. Or, en concevant que dans cet instant où la capacité intérieure diminue, loin de pouvoir admettre une nouvelle masse de liquide, il tend à expulser par ses ouvertures celui qu'il contenoit déjà. Or, le reflux ne peut avoir lieu vers l'oreillette, car le sang qui se porte dans cette direction, relevant la valvule tricuspide, forme l'orifice & oppose ainsi lui-même un obstacle à son passage. Il ne reste donc de voie libre que celle de l'artère pulmonaire, & c'est en effet dans cette artère que s'engage tout le sang chassé du ventricule, sauf la petite portion qui peut repasser dans l'oreillette, à travers l'espace que laissent entr'elles les trois points de la valvule.

Le ventricule dans la systole se contracte par un mouvement brusque, & rapide comme est celui de l'oreillette, mais la diminution apparente de volume qui en résulte, est proportionnellement beaucoup moindre; la diastole qui la suit est par conséquent moins sensible à l'extérieur. Cette diastole se produit sans doute sous l'influence des mêmes causes que celle de l'oreillette; mais l'élasticité des parois qui tend à faire reprendre à la cavité la première forme, doit avoir ici des effets plus marqués à cause de leur plus grande épaisseur.

Pendant la dilatation du ventricule, le sang qui en a été chassé par la contraction précédente, y reviendrait par l'effet de sa propre pesanteur & par la réaction qu'exercent sur lui les parois distendues de l'artère pulmonaire, si les valvules sigmoïdes qu'il a relevées en montant, ne s'abaissent devant lui lorsqu'il tend à descendre, & ne lui fermoient ainsi le passage.

Après avoir parcouru l'artère pulmonaire & ses divisions, le sang revient au cœur par les veines pulmonaires, & aborde dans l'oreillette gauche par quatre canaux, deux pour chaque côté. Il n'y entre point d'un mouvement continu & comme dans l'oreillette du côté opposé; il n'y pénètre que dans le temps de dilatation. Dans le temps de resserrement qui a précédé, ce liquide s'est accumulé dans les quatre trunks des veines pulmonaires qu'il a distendus. Quand arrive la diastole, les parois de ces veines, plus épaisses & plus élastiques que celles des veines caves, réagissent sur lui & le repoussent dans l'oreillette avec une force qui s'ajoute à celle qui lui est communiquée par l'onde systolique qu'il suit.

Hhh

La contraction de l'oreillette gauche ne diffère en rien de celle de l'oreillette droite. Son effet est de pousser dans le ventricule la plus grande partie de sang qu'elle contenoit; une petite portion est refoulée dans les veines pulmonaires, une autre reste dans la cavité, qui ne s'oblitére point entièrement par la contraction. Le ventricule gauche se resserre bientôt, & le liquide qui ne peut remonter dans l'oreillette, à cause de la disposition de la valvule mitrale, est chassé dans l'aorte, d'où il peut, en feulevant les valvules fymgmoïdes qui s'abaissent ensuite, s'opposer à son retour.

Le cœur mis à nu sur un animal vivant, se montre presque insensible aux excitations extérieures, & même après la mort de l'animal, quand on a fait cesser la respiration en ouvrant les deux cavités des plèvres, ses mouvemens, qui persistent encore quelque temps, ne sont pas altérés d'une manière bien visible par les causes d'irritation qu'on y applique: Les mouvemens des quatre cavités obéissent le même rythme que pendant la vie; mais après avoir diminué d'intensité, & quelque temps avant de disparaître, ils présentent une irrégularité plus ou moins grande. Ceux des oreillettes persistent encore lorsque ceux des ventricules ont déjà cessé depuis long-temps.

Pour bien voir les mouvemens du cœur, il faut les observer non point sur un mammifère, où ils sont nécessairement altérés par la modification de la respiration, qu'on peut plus se faire que d'un seul côté, mais sur un oiseau, qui présente la même organisation dans ce viscère, & une disposition plus avantageuse dans les organes pulmonaires, qui, attachés aux côtes, se dissident encore après qu'on a enlevé le sternum. A mesure que l'animal s'affaiblit, par suite de la perte du sang, on voit les contractions s'altérer. Dans les mouvemens qui précèdent la mort, ces contractions ne sont plus qu'une espèce de frémissement onduloire qui explique la sensation que fait éprouver le peul à la suite des grandes hémorragies.

On a long-temps disputé pour savoir si, dans le moment de la contraction des ventricules, le cœur s'allongeait ou se raccourcissait. Des observations nombreuses n'avaient rien décidé sur ce point, & les uns le voyaient s'allonger dans le moment même où d'autres le voyaient se raccourcir. Il est en effet très-difficile d'observer un mouvement partiel sur un organe qui est constamment agité par un mouvement général de déplacement. Chacun apportait des raisons en faveur de son opinion. Comment croire, disoient les uns, qu'un organe musculaire puisse s'allonger dans le moment de sa contraction? Et s'il ne s'allonge pas, disoient les autres, comment franchir-il dans la systole les parets du thorax, dont il est éloigné de près d'un pouce? Balfour, enfin, intervint dans la dispute, & ne se bornant pas à examiner le surface de l'organe, il fit voir que le cœur s'alonge

geoit dans la systole, les valvules mitrales & tricuspides, retenues abaissées par les colonnes charnues, ne pourroient fermer les envergies auriculo-ventriculaires. Il restoit à démontrer comment ces ventricules se raccourcissent, le cœur pourroit se porter en avant. Senac attribua cet effet, 1°. à la dilatation des oreillettes qui se fait pendant la contraction du ventricule; 2°. à la dilatation de l'aorte & de l'artere pulmonaire par suite de l'introduction du sang que les ventricules y ont poussé; 3°. au redressement de la crosse de l'aorte par l'effet du ventricule gauche.

C'est à la première de ces causes seulement que plusieurs physiologistes attribuent maintenant le déplacement du cœur; mais la dilatation des oreillettes est loin de pouvoir produire une percussion aussi brusque que l'est celle de la pointe de cet organe contre la paroi gauche de la poitrine. Quant à la seconde cause que suppose Senac, je ne crois pas qu'elle puisse avoir un effet aussi sensible pour porter le cœur en avant; il n'en est pas de même de la troisième, le redressement de la crosse de l'aorte est la principale cause de ce mouvement; mais une cause que l'on n'a point assez remarquée, & qui est cependant bien réelle; c'est le mouvement de l'artere pulmonaire, dont les divisions, par suite de la contraction de ventricule droit, tendent à se joindre en ligne droite avec le tronc; le cœur, par ce mouvement, seroit porté en bas, & en avant s'il n'étoit sollicité au même temps par le redressement de la crosse de l'aorte qui tend à le porter aussi en avant; mais en bas il prend une direction moyenne & vient frapper de sa pointe la paroi latérale de la poitrine entre la sixième & la septième vraie côte.

Le nombre des battemens du cœur est variable suivant l'âge.

A la naissance il est de . . .	120 à 140 par min.
A 1 an	120 . 130
A 2 ans	100 . 110
A 3 ans	90 . 100
A 7 ans	85 . 90
A 14 ans	80 . 85
A l'âge adulte	75 . 80
A la pyramide vieillie	65 . 75
A la vieillesse confirmée	60 . 65

Ces nombres varient suivant une infinité de circonstances, le climat, le sexe, le tempérament. Quelques individus présentent des variétés quelquefois héréditaires; ainsi l'on voit des familles entières dans lesquelles le nombre des pulsations chez les adultes ne va guère au-delà de 40.

Les battemens du cœur sont influencés, d'une manière connue de tout le monde, par les passions tristes ou gues; ainsi l'imagination a sur eux un grand empire, mais ils sont soumis à l'influence de la volonté. On cite pourtant quelques individus qui peuvent accélérer ou retarder à leur gré les mouvemens du cœur, quelquefois même l'arrêter

entièrement. Bayle, au rapport de M. Riles, jouissoit de cette faculté. « Plusieurs fois, dit-il, lorsque j'étois avec lui à Valladolid en Espagne, il a accéssé complètement, pendant quelques secondes, les battemens de son cœur; aussi-tôt que le mouvement venoit dans cet organe, on scentoit le pouls se relever d'une manière insensible, & après sept ou huit pulsations, il reprenoit sa marche irrégulière. »

Contractions du scrotum. Le scrotum offre tantôt un mouvement très-lent, produit par le resserrement uniforme de toute la surface, qui revient uniformément sur elle-même, tantôt un mouvement partiel plus rapide qui se montre dans un grand nombre de points à la fois, fronce cette peau dans une foule de directions & lui imprime un mouvement qui simule celui que présente la masse des intestins lorsqu'on vient de la séparer du corps d'un animal vivant. Ce mouvement ordinairement tumultueux, est provoqué par quelque excitation extérieure, tels que l'impression d'un air frais, le pincement de la peau, &c.

Les pulsions tristes paroissent aussi avoir une influence très-marquée sur ces mouvemens; une vive frayeur les fait paître avec la plus grande intensité, & chez les malades craintifs ils offrent une véritable difficulté dans l'opération très-simple de la ponction pour l'hydrocele.

Chez les adultes, le scrotum est habituellement dans un état moyen de resserrement; son relâchement habituel dénote toujours de la foiblesse.

Contractions des uretères des canaux biliaires & pancréatiques chez les oiseaux; des vésicules séminales sur les cochons d'Inde. Ce n'est point ici le lieu de décrire ces contractions, qui, d'ailleurs, n'offrent rien de très-remarquable. Un resserrement s'opère dans un point du canal distendu par le liquide que sécrète l'organe, & se propage vers l'orifice extérieur, chassant devant lui ce liquide. Dans l'état ordinaire, ce mouvement est spontané, mais il peut être aussi provoqué par une excitation extérieure.

Altérations de la contraction des muscles locomoteurs.

On ne doit point compter parmi les effets de ces altérations, la foiblesse dans les mouvemens de locomotion, quand elle est la suite de l'émanation des muscles; mais lorsque cette foiblesse coïncide avec un système musculaire bien développé, & qui, à la contraction près, n'offre rien de différent de l'état habituel, elle constitue une véritable maladie. (Voyez, pour sa description & son traitement, l'article ATONIE MUSCULAIRE.) Cet affoiblissement de la contractilité, dans l'atonie musculaire, paroît dépendre d'une altération dans les fonctions de la partie centrale du système nerveux. C'est à une altération de même nature, & sensiblement plus profonde, qu'il faut rapporter la cause

de la paralysie, maladie dans laquelle cette contractilité se trouve totalement suspendue, ou même entièrement détruite. Cependant, dans les paralysies partielles, la cause n'est que quelquefois dans les muscles de la partie affectée; un dans les nerfs qui s'y rendent.

Un muscle, chez un homme sain & dans la vigueur de l'âge, ne peut rester contracté qu'un temps assez court, & ce temps une fois passé, la volonté n'a plus assez d'empire pour faire continuer la contraction; la douleur qui se développe nécessite le relâchement. Chez les individus affoiblis par certaines maladies chroniques, ce temps diminue encore, & dès qu'il est passé, la contraction cesse sans qu'il y ait eu avant ce moment d'autre sentiment que celui d'une légère fatigue; mais au seul instant de relâchement suit pour que le muscle puisse se contracter de nouveau, de sorte que l'attitude maintenue par l'action n'a pas eu le temps de changer, & que le corps n'a éprouvé autre chose qu'une espèce de tremblement. Chez certains vieillards, les mouvemens de locomotion ne s'exécutent plus; la station ne peut plus se maintenir que par une alternative semblable de contraction & de relâchement dans les différens muscles dont l'action est nécessaire; & comme le moment de la contraction est égal à celui du relâchement, il en résulte que le corps entier est agité d'un tremblement continu. (Voyez TREMBLEMENT SÉNILE.)

Lorsqu'un malade reste très-long-temps couché sans pouvoir se remuer, il arrive quelquefois que ses jambes se fléchissent peu à peu, de manière que ses talons se rapprochent des fesses presque jusqu'au point de les toucher. La disposition des fléchisseurs, par rapport aux os qu'ils meuvent, est en partie la cause de ces rétractions. (Voyez ce mot.) Ils ont sur les fléchisseurs un avantage bien marqué, en ce qu'ils agissent sur un bras de levier plus long, avantage qui augmente à mesure que la flexion du membre est portée plus loin. Cette cause cependant, si elle agissoit seule, seroit insuffisante pour donner aux fléchisseurs cette prépondérance incontestable qu'ils ont dans toutes les parties du corps, sur leurs antagonistes. Peut-être, si on examinoit comparativement ces deux classes de muscles, trouveroit-on dans le nombre, dans la disposition ou la distribution des nerfs, des différences propres à expliquer cette singularité. Le cas qui nous occupe, d'ailleurs, n'est pas le seul où l'influence nerveuse se manifeste, dans des parties où apparence semblable, par des effets très-différens. Dans les convulsions, pendant que les fléchisseurs & les extenseurs font eu proie aux agitations les plus violentes, les adducteurs restent ordinairement dans un état parfait de tranquillité. Peut-être dans les rétractions dont nous parlons, l'influence nerveuse agit-elle en augmentant la tonicité des fléchisseurs au même temps qu'elle diminue celle qui est naturelle aux extenseurs.

On remarque sur quelques individus, d'ailleurs bien portants, une altération assez singulière de la contractilité musculaire : chez eux, la volonté détermine bien la contraction des muscles dont l'action est nécessaire, mais elle ne peut la modérer, de sorte que tous leurs mouvements sont brusques, mal réglés, & que leur démarche ressemblerait à celle d'un pantin qui se meut par ressort.

Quelquefois on voit sur un muscle quelques faisceaux charnus se contracter & se relâcher plusieurs fois très-brusquement & dans un temps très-court. Ces palpitations locales paroissent spontanément & disparaissent de même : elles deviennent parfois assez incommodes quand elles se montrent, comme cela n'est pas rare, dans le releveur de la paupière supérieure ; dans les autres cas, à peine s'en aperçoit-on. (Voyez PALPITATIONS LOCALES.)

Souvent, au lieu de plusieurs contractions répétées dans une portion de muscle, on en voit s'opérer une seule sur le muscle tout entier, ou même sur plusieurs à la fois ; cette contraction est ordinairement assez prononcée, elle ne revient qu'après un intervalle plus ou moins long. Lorsque cet état devient habituel, il constitue une véritable maladie fort incommode, & que l'on nomme *tic*. (Voyez ce mot.) Cette maladie semble attaquer de préférence les muscles du cou, & ceux du visage. Chez les individus qui présentent un peu cet état très-développé, ce muscle seul en est quelquefois affecté.

Quelquefois tous les muscles d'un même côté du corps sont affectés de ces contractions involontaires ; il en résulte des mouvements déformés du bras & de la main, une espèce de claudication du même côté, & des contorsions singulières dans le visage. Au commencement de cette maladie, les mouvements ont lien avec l'acteur ; ils acquièrent ensuite une mobilité extrême & presque perpétuelle. (Voyez CRANÉE.)

Dans les convulsions proprement dites, les mouvements sont beaucoup plus étendus, beaucoup plus énergiques que dans la chorée ; or, comme la faculté de contraction s'use en raison de l'étendue, de l'intensité, de la fréquence des mouvements, il s'ensuit que la durée des convulsions est nécessairement limitée, pendant que celle de l'autre affection ne l'est aucunement.

Ces roideurs spasmodiques, ces mouvements déformés, conservent pourtant dans leur anomalie, une certaine régularité, & apparaissent dans un ordre déterminé. Après un léger tressaillement, on voit ordinairement les bras se roidir & les doigts s'écarter ; souvent la convulsion se borne à cet effet, surtout chez les jeunes enfans. Quelquefois il survient immédiatement après, une agitation extrême de ces mêmes parties ; agitation qui dure plus ou moins long-temps, & qui semble augmenter d'intensité lorsqu'on cherche à l'empêcher.

Lorsque les convulsions deviennent générales, elles présentent un spectacle vraiment effrayant ; les membres & le corps tout entier sont agités des mouvemens les plus violents, auxquels succèdent des contractions tétaniques. Les mâchoires se ferment, la tête se renverse, les yeux sont fixés ou roulent dans leur orbite.

Un état aussi violent ne peut être de longue durée, mais il se reproduit plusieurs fois dans chaque accès, & pour les accès eux-mêmes il n'est pas rare d'en voir plus d'un dans le même jour. (Voyez CONVULSIONS.)

Ordinairement, comme je l'ai déjà dit, dans les convulsions des membres, les adducteurs restent tranquilles pendant que les fléchisseurs & les extenseurs présentent le plus grand désordre. Un phénomène à peu près semblable se montre dans le tétanos, c'est-à-dire, qu'une seule classe de muscle participe à l'affection. Tantôt la contraction spasmodique qui la constitue porte sur les fléchisseurs de la tête & du tronc qu'elle tient pliés en avant (*emprothotonos*) ; tantôt elle porte sur les extenseurs, & la tête & le tronc renversés en arrière sont courbés comme un arc fortement tendu (*opisthotonos*). Quelquefois le tétanos affecte tous les muscles & tient tous les membres à la fois dans un état d'immobilité & de roideur ; d'autres fois il est partiel, borné aux muscles qui fléchissent le cou, sur la poitrine, sur le dos, ou sur les épaules. Le plus fréquent de tous est celui qui survient aux muscles de la mâchoire inférieure, & que l'on nommoit sous le nom de *trismus*. (Voy. ce mot.)

Le développement du tétanos peut être lent ou graduel, ou bien suivre une marche très-rapide. Lorsque cette maladie se termine heureusement, les contractions spasmodiques des muscles cessent d'une manière graduelle & dans un ordre varié. (Voyez ТЕТАНОС.)

L'altération la plus singulière de la contraction des muscles locomoteurs, est sans contredit celle qu'on remarque dans la catalepsie, au milieu d'autres phénomènes plus extraordinaires encore. L'individu qui a cette bizarre maladie, reste tout-à-coup immobile & conserve la position qu'il avoit avant l'accès, qu'il soit debout, assis ou couché ; mais cette immobilité ne ressemble en rien à celle du tétanos : elle est sans roideur, les membres restent flexibles, ils prennent & conservent les positions qu'on veut leur imprimer, & le corps, pourvu qu'il soit dans les conditions d'équilibre, se maintient dans toutes les attitudes où l'on peut le placer. On peut le tenir pendant plusieurs heures dans des positions tellement extraordinaires, que, dans l'état de finie, la fatigue ne lui permettroit pas de les conserver plus de quelques minutes. Cependant, l'accès finit. Sa terminaison est ordinairement subite, & il ne reste aucune lassitude. (Voyez CATALEPSIE.)

La crampe est la dernière des altérations de la contraction des muscles locomoteurs dont il nous

reste à parler; c'est une contraction soudaine des muscles, accompagnée de douleurs très-vives, d'une douleur plus ou moins considérable, laquelle naît le plus souvent spontanément, ou du moins sans cause apparente; c'est ordinairement aux muscles du mollet qu'elle survient, & surtout pendant la nuit. On la fait cesser assez promptement en appuyant fortement le pied à terre; il ne reste qu'un léger engourdissement qui se dissipe bientôt.

La crampes survient aussi quelquefois dans l'exercice de la natation, qu'elle contribue à rendre plus périlleux. Souvent des nageurs qu'elle privait du mouvement d'une jambe, ont péri dans des circonstances où le développement de toutes leurs forces eût suffi pour les sauver.

On confond souvent avec la crampes un engourdissement douloureux des muscles de la jambe, provenant de la compression qu'exerce l'autre genou sur le nerf & les vaisseaux poplités lorsque les deux jambes sont croisées l'une sur l'autre.

Je ne dois pas oublier de parler des mouvements du carpo-logie, mouvements qui apparaissent dans les derniers instans de la vie, & qui sont produits par la contraction des muscles fléchisseurs, & quelquefois par ceux du bras. Le mourant semble chercher à saisir lui-même quelques petits corps, ou paroit vouloir relever ses couvertures. Les infirmes, dans les hôpitaux, déignent cet état en disant que le malade fait *son paquet*. Ce symptôme dénote toujours une affection des organes cérébraux. (Voyez CARPOLOGIE.)

Altérations de la contraction du diaphragme.

On fait que le diaphragme se contracte pendant les efforts, & l'on croit communément que c'est pour fixer le thorax & donner ainsi un appui solide aux membres qui s'y attachent. Cela peut être en effet une des causes de sa contraction, mais ce n'est pas la seule.

Lorsqu'un grand effort devient nécessaire de la part de tous les muscles de la locomotion, il n'y a absolument à se contracter que ceux dont l'action est indispensable à l'accomplissement du mouvement. Les mouvements alternatifs du thorax sont suspendus, les parties offensées abandonnées à elles-mêmes rétrécissent sa cavité, & les poumons, affaiblis comme dans le moment de l'expiration, ne se laisseront traverser que très-difficilement par le sang, si le diaphragme, en l'abaissant, ne leur permettoit de se développer un peu. La contraction du diaphragme, dans cette circonstance, n'est donc pas liée directement avec l'effort, mais avec le besoin que la circulation ne soit pas suspendue pendant le temps de sa durée.

Comme au même moment les muscles de l'abdomen se contractent fortement pour fixer d'une manière solide au bassin la colonne vertébrale par l'intermédiaire du thorax, les viscères refoulés tendent à porter en haut le diaphragme, & ne

permettent jamais que son abaissement puisse devenir bien considérable; aussi, quelle que soit l'énergie de contraction que déploie ce muscle, la circulation éprouve toujours une gêne plus ou moins grande, & cette gêne est même une des principales causes qui empêchent que de violents efforts puissent être longtemps continués.

L'accélération des mouvements du diaphragme constitue l'anhélation qui est une accélération de la respiration. Cette modification dépend ordinairement d'une cause immédiate, qui peut être elle-même l'effet de circonstances très-différentes entr'elles, telles que l'augmentation de la contractilité du cœur, ou la déformation d'une partie des poumons. On sent que quelle que soit la cause qui accélère le cours du sang dans les vaisseaux capillaires des collines bronchiques, l'air qui y sera décomposé plus rapidement aura besoin d'être plus souvent renouvelé, & la respiration deviendra plus fréquente; or, cette accélération dans les vaisseaux capillaires pourra dépendre, ou de ce que le cœur, dans un temps donné, y pousse une plus grande quantité de sang, les contractions devenant plus fortes & plus fréquentes; ou de ce que, dans le même temps, une quantité toujours égale de sang sera obligée de passer à travers des vaisseaux moins nombreux, les autres n'étant plus perméables dans la partie déformée.

Le soupir est produit par une contraction lente du diaphragme, suivie d'un relâchement plus prompt; l'inspiration profonde qui en résulte est ordinairement nécessaire par une légère accélération qui se produit dans la circulation sous l'influence d'une passion.

Dans le bâillement, l'inspiration est plus profonde encore, & la bouche s'ouvre largement comme pour laisser à l'air un libre passage; cette inspiration succède communément à d'autres inspirations plus rares & moins profondes que de coutume. Cette diminution dans les mouvements de respiration est, comme on fait, souvent produite par l'ennui, mais elle est aussi très-souvent la suite d'une attention soutenue, comme on peut le voir au théâtre & dans les salles de concert, chez les individus qui prennent le plus d'intérêt au spectacle ou à la musique.

Le diaphragme concourt à la production du rire comme à celle du bâillement, mais d'une manière différente; c'est une alternative rapide de contractions très-rapides & de relâchement, une espèce de tremblement convulsif du muscle dans le moment où il s'allonge pour remonter dans la poitrine. Quand ce mouvement est très-prononcé, les muscles de l'abdomen y prennent une part plus ou moins active; l'ébranlement qui se communique alors aux parties situées dans l'épigastre est souvent suivi d'un sentiment de douleur dans cette région.

J'ai observé for moi-même, dans une hépatite

signif, un tremblement du diaphragme assez semblable à celui qui a lieu dans le rire. L'inspiration ne présente rien que d'ordinaire, elle étoit seulement plus profonde à cause de la fièvre qui existoit; mais l'expiration, au lieu de s'achever dans un seul temps, se faisoit par cinq ou six expirations partielles & d'un mouvement saccadé.

Le hoquet est produit par une contraction brusque du diaphragme, suivie immédiatement de l'occlusion de la glotte & accompagnée d'un bruit particulier. Comme cette affection paroît très-symptomatique d'un certain état de l'estomac, & qu'elle s'accompagne d'un sentiment de tiraillement à l'épigastre, Morand avoit pensé qu'outre l'abaissement du diaphragme il y avoit un raccourcissement de l'œsophage qui tendoit à faire remonter la portion cardiaque; mais pour faire admettre dans l'œsophage un semblable mouvement, la première considération est de bien peu de poids; & quant à la seconde, je crois que le tiraillement qu'on éprouve n'a point lieu dans la portion cardiaque de l'estomac, mais dans la portion correspondante du diaphragme, & qu'il est un effet de la contraction même de ce muscle, laquelle ne pouvant plus avoir pour effet de l'abaisser à cause de l'occlusion subite de la glotte, tend à rapprocher de ses piliers, qui ne peuvent le déplacer, son attachement antérieur.

Le sanglot ne diffère du hoquet, quant aux phénomènes qu'il présente, qu'en ce qu'au moment de la contraction du diaphragme, la glotte ne se ferme point complètement: aussi le bruit que l'air fait entendre à son passage dans le larynx est-il prolongé dans le sanglot, pendant qu'il est bref & terminé brusquement dans le hoquet.

Le diaphragme ne prend, dans la toux, qu'une part très-peu active. Les muscles abdominaux se contractent & tendent à le relever en haut, mais cet effet ne peut le produire, la cavité de la poitrine ne peut ainsi diminuer tant que la glotte fermée ne permet point à l'air de sortir. Tout-à-coup cet obstacle vient à cesser, la contraction des muscles abdominaux a son effet, le diaphragme remonte brusquement, & l'air, chassé des poumons, sort en produisant à son passage un bruit qui commence nettement au moment où se ferme la glotte, retentit plus ou moins dans la cavité de la poitrine, & présente un timbre qui varie en raison de l'état différent des conduits aériens. (Voyez Toux.)

L'éternuement diffère de la toux en ce que la glotte ne s'oppose dans aucun instant à la sortie de l'air; c'est, d'ailleurs, également un brusque relâchement du diaphragme qui coïncide avec une contraction non moins brusque des muscles abdominaux. A ce moment, la bouche qui s'étoit ouverte pour l'inspiration profonde qui précède toujours, se ferme, & l'air, à qui ce passage est interdit, est forcé, pour sortir, de traverser les fesses nasales.

Altérations de contractions dans les parties musculaires du canal digestif.

Pharynx. La contraction spasmodique du pharynx s'observe dans un grand nombre de circonstances; elle est quelquefois essentielle, mais bien souvent symptomatique: elle s'accompagne fréquemment l'hygiène, l'hydrophobie, &c. On la voit quelquefois survenir chez des mélancoliques qui se sont privés long-temps d'aliments dans la crainte d'être empoisonnés, ou pour tout autre motif qui les frappe fortement; elle persiste quelquefois après que cette fantaisie a disparu, & ils périroient, dit-on, faute de pouvoir prendre de nourriture, si on ne portoit les aliments jusqu'à leur estomac, par le moyen d'une sonde.

Œsophage. L'œsophage peut offrir, comme le pharynx, un resserrement spasmodique; mais on a bien plus rarement occasion de l'observer. Son mouvement antipéristaltique contribue à faire remonter, presque dans la bouche, un liquide, si ce n'est la forme dans l'estomac pendant les manœuvres digestives, ou la bile qui pénétre quelquefois dans cet organe par suite des contractions anormales du duodenum. Telles sont les causes des rapports & du pyrosis.

Si c'est une quantité un peu considérable de liquide ou de matières alimentaires qui remontent dans la bouche, le phénomène, qui est toujours le même, prend le nom de *régurgitation*. Il arrive fréquemment chez des enfants dont l'estomac est ordinairement distendu par une grande quantité de lait, ou chez les individus qui se sont gorgés d'aliments & de boissons, surtout lorsque, dans quelques efforts, comme ceux de la défécation, l'estomac se trouve pressé par la contraction du diaphragme & des parois musculaires de l'abdomen. Les personnes qui jouissent de la faculté de ruminer suppléent à ces contractions, pendant lesquelles la partie inférieure de l'œsophage est habituellement fermée, & se soulevait, comme pour la régurgitation, qu'accidentellement; elles y suppléent, dis-je, au moyen d'une pression exercée avec les mains sur l'épigastre & la région ombilicale.

L'œsophage, qui est habituellement assis dans la déglutition des liquides, se relâche dans la dernière période de certaines maladies, & se laisse traverser par eux comme un conduit inerte, en faisant entendre un bruit qui préjuge la fin prochaine du malade.

L'œsophage joue un rôle important dans le vomissement, & cet acte ne pourroit avoir lieu si son relâchement, & surtout celui de la partie inférieure, ne coïncidoit avec la contraction convulsive du diaphragme & des muscles abdominaux.

Estomac. L'estomac prend, dans le vomissement, une part très-peu active. La contraction de la tunique moyenne se borne à un resserrement

très-lent, qui, dominant la cavité de cet organe à mesure qu'il lo vide, permet à la pression abdominale de s'exercer sur lui avec plus d'avantage pour expulser le reste des matières qu'il contient. (*Voyez Vomissement.*)

Pylore. Il paroît qu'en d'autres altérations de la contraction du canal digestif, celle qui caractérise le plus spécialement la faim, c'est le relâchement anormal de l'anneau musculaire du pylore; relâchement qui permet aux substances alimentaires de varner, sous l'influence de la pression abdominale, la résistance de l'anneau fibreux, & de passer dans l'intestin grêle avant d'être réduites en pâte liquide.

Intestin grêle & gros intestin. Le mouvement habituel de l'intestin grêle est ordinairement augmenté par la colique, soit que cette affection soit purement nerveuse, soit qu'elle dépende de mauvaises digestions. Les digestions de cette nature, même lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de douleur, produisent encore cet effet. Les contractions plus intenses de la tunique moyenne de l'intestin font marcher dans son intérieur les gaz qui s'y trouvent ordinairement alors en plus grande abondance, & qui s'y meuvent en faisant entendre un bruit que l'on désigne par le nom de *borborygmes*.

Les causes qui augmentent les contractions de l'intestin grêle, augmentent aussi celles du gros intestin. Dans le choléra-morbus, le mouvement antipéristaltique très-violent, peut faire remonter jusque dans l'estomac les substances alimentaires contenues dans le point le plus reculé de l'iléon, & qui y privées presque entièrement de leurs principes primitifs, ont déjà subi une très-grande altération; mais les matières stercorales proprement dites ne peuvent jamais parcourir le même chemin, la disposition de la valvule iléo-cæcale leur défend le retour dans l'intestin grêle.

Les passions paroissent avoir une influence bien marquée sur les mouvemens du canal intestinal. Sans parler ici des effets d'une vive frayeur, la colère, surtout chez certaines femmes, produit une accélération de ces mouvemens, qui le décide par de fréquentes & bruyans borborygmes.

Il arrive assez fréquemment chez des enfans très-faibles, affectés de la diarrhée, que le rectum se trouve distendu par une grande quantité de matières fécales, qu'il ne peut expulser, à cause du relâchement très-étroit des sphincters. Lorsque ces muscles viennent tout à coup à se relâcher ensemble, l'intestin revient rapidement sur lui-même; tant à cause de l'élasticité de ses parois, que de leur contractilité qui est alors développée; & si la position de l'enfant est favorable, les matières stercorales sont lancées souvent à plusieurs pieds de distance.

La diminution de contractilité de la tunique charnue des intestins est presque aussi fréquente que son augmentation; la constipation en est la suite

presqu'inévitable; ce défaut de contraction est surtout fâcheux chez les vieillards, qui n'y peuvent suppléer pour la défection par des mouvemens assez énergiques du diaphragme & des muscles abdominaux. La pression seule ne seroit pas suffisante pour faire marcher les matières stercorales dans le gros intestin, mais elle dévient pour cet intestin en excitant véritablement qui détermine les contractions. C'est ainsi que l'acte de la défécation est volontaire chez certains individus, & peut s'exécuter sans avoir été précédé du sentiment ordinaire qui en annonce le besoin.

Sphincters du Anus. Chez les individus qui ont éprouvé une ou plusieurs attaques de paralysie, on observe assez souvent un relâchement habituel du sphincter externe; il en résulte une incommode très-grande, car lorsque les matières contenues dans le rectum sont en peu liquides, il en s'échappe toujours quelque portion.

La contraction spasmodique des sphincters est moins commune que leur atonie; cependant on l'observe quelquefois. Dans certains cas, dit-on, elle est devenue assez fâcheuse pour nécessiter une opération chirurgicale; la section complète des deux muscles.

Altérations de la contraction de la vessie.

Quelquefois la tunique musculeuse de la vessie acquiert une sensibilité telle, que la présence d'une petite quantité d'urine fait éprouver la sensation qui accompagne l'accumulation d'une grande quantité de liquide dans la cavité & force la tunique contractile à revenir sur elle-même pour l'expulser avant d'avoir subi le degré ordinaire de distension.

La tunique musculaire de la vessie peut être frappée de paralysie, & l'urine s'accumule dans la cavité de l'organe sans faire naître aucun mouvement qui tende à l'en chasser; mais lorsque la vessie, de plus en plus distendue, vient à s'élever au-dessus du bassin qui l'a voit jusque-là soutenue en grande partie à l'influence de la pression abdominale, elle éprouve les effets de cette pression, & la contraction du diaphragme, aidée de celle des muscles abdominaux, suffit ordinairement pour expulser une partie de l'urine, à moins qu'une contraction spasmodique de l'appareil musculaire du col n'y oppose un obstacle trop grand.

Cette contraction spasmodique du col de la vessie est elle-même quelquefois un obstacle suffisant à l'écoulement de l'urine. Plus souvent toutefois, comme nous l'avons vu, elle n'est qu'un obstacle circonstanciel; celui du sphincter de l'anus, donne lieu à un écoulement involontaire de l'urine.

Altérations de la contraction du cœur.

Il ne nous est pas permis d'observer directement les modifications qui éprouve la contraction du cœur

dans les différentes maladies & dans les diverses affections de l'ame, mais nous pouvons juger par celles du pouls, qui en font un effet, combien elles doivent être nombreuses. Cependant, suivant toute apparence, il en est encore beaucoup dont la connoissance ne peut arriver jusqu'à nous par ce moyen.

Une augmentation dans la force ou la vitesse des mouvemens du cœur, produite par des causes qui peuvent être très-différentes dans leur nature; une altération dans le rythme de la contraction de ses quatre cavités; enfin, une exaltation de sensibilité qui rend incommode au malade des battemens dont l'intensité n'est point augmentée; voilà trois affections bien distinctes qu'un a réunies sous le nom commun de *palpitation*. Il est évident que pour cette dernière il n'existe point d'altération de mouvement qui puisse nous occuper. Quasi à la première, elle est ou parement nerveuse, ou symptomatique, ou dépendante de l'altération organique d'une partie du cœur; ce dernier cas ne rentre point dans notre sujet. Quant aux deux autres, comme les mouvemens du cœur ne diffèrent de l'état ordinaire que par plus de force ou de fréquence, nous nous dispenserons d'en parler.

Les palpitations, qui sont le résultat d'une altération dans le rythme des mouvemens des différentes parties du cœur, peuvent dépendre ou de ce que la contraction des oreillettes ne coïncide plus pour le temps avec la dilatation des ventricules; ou de ce que plusieurs contractions des oreillettes ont lieu pendant que le ventricule se contracte une seule fois. Il peut y avoir ainsi jusqu'à quatre contractions de l'oreillette pour une du ventricule; le pouls ne fait quelquefois pas reconnoître ce désordre, pendant que la main, appuyée sur la région précordiale, le fait apprécier assez exactement. Cependant, dans le plus grand nombre des circonstances, il y a coïncidence entre les battemens du cœur & ceux de l'artère radiale.

Quelquefois les contractions du cœur, loin d'être augmentées, deviennent trop faibles pour pousser jusqu'au cerveau le sang dont la présence est nécessaire à cet organe pour l'exercice de ses fonctions; il en résulte une suspension plus ou moins complète de la respiration, des vibrations, de l'entendement, de la contraction musculaire.

Quelquefois la syncope est produite par une suspension subite des mouvemens du cœur, qui n'a point été précédée par leur affoiblissement.

Ici je termine ce que nous avons à dire sur les altérations du mouvement dans les différentes parties musculaires du corps humain.

Rhumatisme musculaire. (Voy. RHUMATISME).
Ruptures musculaires.

Ces ruptures, qu'on a souvent occasion d'ob-

server aujourd'hui, ont été long-temps méconnues. On confondoit les accidens qui en résultent avec ceux qui suivent le déplacement d'un muscle, accidens dont on ne connoissoit pas d'avantage la cause; on les rapportoit les uns & les autres à une surextension de muscle, que l'on déignoit tout à tour sous les noms d'*entorse musculaire*, d'*effort*, de *souffle*, de *coup de fouet*, &c. J. L. Pons est le premier qui ait fait connoître la véritable nature de cette lésion, en indiquant les signes auxquels on doit la distinguer.

Les ruptures musculaires ont été, depuis cette époque, l'occasion de plusieurs écrits; leur mécanisme surtout paroit avoir exercé beaucoup l'esprit des auteurs qui s'en sont occupés, & qui, en général, l'ont assez mal compris. Ils ont tous voulu voir dans cette rupture quelque chose d'entièrement différent de celle des autres organes. « C'est », ces derniers, disent-ils, elle n'arrive que par un excès de distension, tandis que sur les muscles elle s'opère par un effet de raccourcissement déterminé par une contraction violente. » Sans doute, quoique ce ne soit pas le cas le plus ordinaire, la rupture de la partie charnue d'un muscle peut être produite par le raccourcissement de l'organe déterminé par une contraction violente; mais quand c'est le tendon qui vient à se rompre, ce peut être aussi par l'effet du même raccourcissement déterminé par une contraction. Dans ce cas, comme dans l'autre, la partie dont la contraction produit la rupture n'est pas celle qui éprouve la solution de continuité; mais comme, dans le premier cas, la partie rompue se trouve alors elle-même contractée, l'espèce d'équivoque qui résulte de ce fait a été la cause de l'erreur dans laquelle sont tombés ces écrivains.

Si la rupture du muscle étoit un résultat immédiat de la contraction, elle devroit s'opérer dans le lieu où les effets de cette contraction sont le plus intenses, dans le point où les faisceaux musculaires sont le plus nombreux; dans le ventre du muscle, en un mot, & non pas, comme nous le voyons toujours, plus ou moins près de son insertion au tendon.

Un muscle se rompt comme se rompt un tendon; uniformément, un ou, comme se rompent tous les corps de la nature. Deux points s'éloignent entr'eux d'une quantité plus grande que celle dont peut s'allonger l'espace intermédiaire; il faut de toute nécessité qu'il se produise une solution de continuité. Or, un muscle contracté; fixé par ses extrémités opposées à deux points où l'une cause quelconque tend à écarter l'un de l'autre, s'oppose à cet écartement comme le seroit une corde extensible, & comme elle, si la contraction persiste (1), il rompra dans son point le plus

(1) On sent que pour que cette condition ait lieu, & par conséquent pour que la rupture puisse s'opérer, il faut que l'effort soit assez brusque pour que le muscle ne puisse avoir le temps de se relâcher.

faible au moment où la force qui tend à mouvoir les deux os s'est devenue supérieure à celle de la cohésion dans un point quelconque de sa continuité.

La portion charnue d'un muscle jouit, dans le moment de la contraction, d'une force considérable de cohésion, & peut, par conséquent, opposer à sa rupture une résistance très-grande, mais qui, pour chaque point de sa longueur, est toujours en proportion avec le nombre des faisceaux musculaires qui s'y trouvent. Or, on conçoit qu'en de ces points en peut présenter un assez petit nombre pour que la résistance soit moindre que celle des parties purement tendineuses : si donc il y a lieu à rupture, c'est dans ce point qu'elle devra s'opérer.

On conçoit que cette rupture d'un muscle qui tend à rapprocher deux points osseux, pourra être produite par l'action du muscle antagoniste qui tend à les écarter, si celui-ci est capable de déployer une force assez considérable. Mais ce qui semble plus difficile à comprendre, c'est une autre espèce de rupture produite par la contraction même du muscle sur lequel elle a lieu ; la théorie que des anatomistes en ont donnée est si peu vraisemblable, qu'elle a suffi pour en faire rejeter l'existence. Mais c'est à marche peu philosophique que de nier un fait parce qu'il a été mal expliqué : celui-ci est constant ; commençons par le reconnaître, nous chercherons ensuite à lui trouver une explication satisfaisante.

La force qu'un muscle est capable de déployer est représentée par la somme des forces partielles de tous les faisceaux réunis à sa partie moyenne. Les parties extrêmes, tendineuses & charnues, peuvent être considérées comme des cordes destinées à transmettre ses actions : or, ces cordes peuvent offrir dans quelques-uns de leurs points une résistance trop faible pour soutenir l'effort que peut exercer le ventre du muscle ; la rupture arrivera nécessairement au ce point, qu'il soit en partie charnu (1), ou purement tendineux.

On voit bien que la rupture s'opérant ainsi, c'est absolument la même chose, que si le muscle dans lequel elle s'opère s'étoit contracté pour rapprocher les deux os (comme dans le dernier cas), ou pour les empêcher de s'écarter (comme dans le premier) ; seulement, dans un cas, on considère cette contraction comme un principe de mouve-

ment, & dans l'autre comme une cause de résistance. (ROULLÉ.)

MUSCULEUX, *musc.*, adjct. *Musculosus*. De la nature des muscles ; qui est pourvu de beaucoup de muscles. (A. J. T.)

MUSCUS ERECTUS (*Mat. médic.*), *Lycopodium selago*, de la famille des lycopodiées. Sa décoction, comme celle du *L. clavatum*, a la propriété d'exciter le vomissement. On s'en fait la poignée qui se trouve dans les petites coques de ces plantes, & qui est regardée par les uns comme la graine, & par les autres comme le pollen, est d'une nature très-inflammable. Ce genre de plantes est en général très-peu connu quant à ses propriétés médicales. (L. J. M.)

MUSGRAVE (Guillaume) (*Biogr. médic.*) naquit vers 1657, dans le duché de Sommerfet ; fut reçu docteur en médecine à l'université d'Oxford, en 1689 ; avant d'être membre de la Société royale de Londres, en 1684 ; il en fut nommé secrétaire dans la même année. Il communiqua quelques observations à cette compagnie. En 1691 il se retira à Excester, où il exerça la profession & composa les ouvrages suivants :

Dissertatio de arthritide symptomatice. Oxonii, 1703, in-8°. Goussier, 1756, in-4°.

De arthritide anomala fove interia, dissertatio. Oxonii, 1707, in-8°. Amstel., 1710, in-8°.

(R. GZORRAT.)

MUSICIENS, *f. plur.* (*Hygiène*). On donne ce nom aux artistes qui s'occupent de musique d'une manière spéciale, & par état & par profession.

L'exercice auquel ils se livrent, les organes, les facultés qu'ils emploient d'une manière particulière, tendent à modifier profondément l'organisation, & exercent souvent une influence marquée sur la nature de la santé & sur le caractère des maladies ; le chant, la pratique de certains instruments, produisent d'ailleurs différents effets qui lui sont propres. Nous renvoyons aux articles *Musiciens* & *Professeurs*, pour ce qui concerne les maladies des musiciens, ou voulant pas reproduire ici une partie des vices généraux qui ont déjà été exposés. (Voyez aussi *CHANT*, *CHASTNET*, *INSTRUMENTS A CORDS*, *VENT* (instruments à), *Violon* & *Voix*.)

Nous nous bornerons à remarquer ici, & d'une manière générale, que le chant & la pratique des instruments à vent, celle des instruments à cordes, & surtout du violon, sont les habitudes, pour lesquelles les médecins sont le plus souvent consultés, soit sous le rapport de l'hygiène, soit sous le rapport de la médecine légale, soit pour dériver des exemptions ou excoimes à des musiciens attachés à un service public. (L. J. M.)

MUSIQUE, *f. f. Musice*. Bouffon partageait les sons en deux classes, dans la première des-

le temps de se relâcher, une force qui s'exerce lentement ne peut produire de rupture que sur un muscle contracté spontanément, & qui se mouve ainsi spontanément par une cause quelconque à l'empire de la volonté.

(1) Lorsque la rupture arrive dans cette circonstance, le point faible compris entre deux points plus résistants, s'allonge, avant la rupture, autant qu'il peut s'allonger, tandis que les deux points s'éloignent ; on peut alors considérer leur contraction. La rupture d'un muscle arrive donc comme celle des autres organes, par un excès d'étension, mais l'étension n'a lieu dans ce cas que dans le pousse qui éprouve la solution de continuité.

MUSCULUS. Tome V.

quelles il plaçoit la vue & l'ouïe, qu'il appeloit avec raison les sens de l'intelligence; il a été imité en cela par les physiologistes modernes. Si nous examinons les résultats de l'audition dans les personnes chez lesquelles le sens de l'ouïe est très-perfectionné ou délicatement organisé, nous voyons que deux sortes d'impressions sont transmises par l'oreille au cerveau : les unes éveillent en nous le jeu des facultés intellectuelles ; les autres excitent les affections morales & les passions. Les premières nous portent à l'attention, à la méditation, à l'exercice du jugement & de toutes les forces de l'intelligence; les secondes font naître en nous le plaisir ou la douleur, la joie ou la tristesse, le calme ou la colère, la haine ou l'amour. L'oreille contribue à produire ces effets divers, soit au moyen de la perception des paroles, soit au moyen des sons & des tonations. Ainsi le mot *ami*, par l'idée qu'il nous rappelle, excite en nous un sentiment de bienveillance pour la personne qui nous l'adresse, & de contentement pour nous-mêmes; mais ce mot prononcé sans *expression*, c'est-à-dire; dépourvu de certaines inflexions de voix qui en fassent le sens naturel, ne produit plus tout son effet; il peut même faire naître le mécontentement, la haine ou la colère, s'il est prononcé avec certaines inflexions de voix auxquelles on a donné le nom de *ton ironique*.

Les sons articulés, que l'on nomme *paroles*, n'excitent donc nos affections & nos passions qu'autant qu'elles font prononcées avec le ton relatif au sens qu'on veut y attacher. Les sons articulés, au contraire, auxquels aucune idée n'est liée dans le langage vulgaire, agissent sur nous qu'en raison de leur intensité & de quelques modifications particulières : ils ne s'adressent à l'intelligence, & portent toute leur action sur la sensibilité; très-aigus, ils affectent douloureusement notre oreille; très-graves, ils n'ont pour elle aucun charme; très-intenses, ils la fatiguent, quelquefois jusqu'à la douleur; très-faibles, ils peuvent lui échapper. Combien dans certains rapports d'intensité & de durée, les sons affectent agréablement l'oreille, & (chose très-remarquable) ils peuvent exciter les affections & les passions sans le secours de la parole; l'expressif est alors senti par l'oreille indépendamment des mots dont elle fixe ou modifie le sens dans les autres cas.

Cette combinaison de certains sons, calculée d'après des règles presque mathématiques qui tirent leur origine des phénomènes observés dans les corps sonores en mouvement, constitue ce qu'on appelle la *musique*. Si l'on étoit parti des principes que nous venons d'établir, on n'auroit pas demandé si elle peut émouvoir, indépendamment de la poésie; puisqu'elle n'est que l'expression *du ton*, portée au plus haut degré. Toutefois on lui fait par exagérer son pouvoir; on a été sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, bien au-delà des faits réels, & la fable a usurpé

la place de l'histoire. C'est moins à telle ou telle composition musicale qu'est attachée la propriété de remuer les passions, qu'à ce que les Grecs appeloient avec raison le *mode*, & à ce que l'on désigne par le nom général de *mélodie*. Ces modes sont peu nombreux; un physiologiste peut les réduire à quatre d'après les modifications qu'ils déterminent dans l'état moral des individus : 1°. le mode *posé & doux*; 2°. le mode *vigilant & varié*; 3°. le mode *grave & lent*; 4°. le mode *impétueux, abrupt, ou le mode guerrier*. Ces modes sont relatifs aux quatre principaux états de l'âme, le calme, la joie, la tristesse & la colère.

Il n'est pas de musique qui, comme on l'a prétendu, puisse exciter spécialement la pitié ou l'amour de la patrie. Peut-être le sentiment de la pitié pourroit-il naître de la combinaison du mode *grave* avec le mode *doux*; mais on n'a que d'obscures observations positives à cet égard. Quant à l'amour de la patrie, comme tout attachement vif & profond, il se nourrit d'idées intellectuelles & de souvenirs. Si le *mode des riches*, célébré par Rousseau, faisoit déserter les soldats suisses au service de l'étranger, ce n'est pas que l'auteur de cette musique si simple satisfait leur orgueil & à Pergolèse & à Grétry, c'est parce que cet air des montagnes étoit lié à tous les souvenirs d'affection. De même, dit Rousseau, que les sentiments excités en nous par la contemplation d'un beau tableau se naissent point des couleurs, de même l'empire que la musique exerce sur nos âmes n'est point l'ouvrage des sons. La mélodie fait précisément dans la musique ce que fait le dessin dans la peinture; c'est elle qui marque les tons & les figures; doit les sons & les accords ne font que les contourner. La musique agit plus intimement sur nous qu'elle excite, par un sens, des affections semblables à celles qu'on peut exciter par un autre. Le musicien ne représente pas directement les choses, mais il fait naître dans l'âme les mêmes sentiments qu'on éprouve en les voyant.

C'est aussi que l'on peut expliquer les effets si étonnans de la musique sur les Grecs. Elle faisoit partie de leur éducation; y étoit le même aux préceptes de la religion & de la morale; les lois de l'état étoient enseignées, apprises & retenues à l'aide du chant. La musique étoit aussi associée à tous les songes, à toutes les passions généreuses, aux mœurs, aux devoirs & aux plaisirs. Tyrhée, enflammant les Grecs par ses chants, n'agissoit sur leur esprit, avec tant de force que parce qu'il s'adressoit à un sens exercé dès l'enfance à rappeler les idées de patriotisme & de gloire. Ce rappel d'un beau son ne peut pas nous faire exciter par la musique, est tellement naturel, il tient si peu à la musique elle-même, que ces airs sont souvent tout-à-fait vulgaires, plus bruyans & plus cadencés que mélodieux; & qu'on les voit agir avec plus d'énergie sur l'oreille inculte d'un soldat que sur le sens cultivé d'un musicien.

Il seroit cependant peu conforme à l'observa-

tion de nier toute espèce d'influence particulière de la part des sons sur l'organisme; mais nous pensons qu'ils n'agissent, sous ce rapport, que comme modification des nerfs de l'ouïe, & par suite, du cerveau, en produisant sur ce dernier organe une stimulation très-forte ou modérée: lorsqu'ils sont aigus, ils agissent douloureusement, ainsi que nous l'avons observé, les nerfs auditifs. Certains animaux; les chiens, par exemple, pouffent alors des cris qui annoncent leur souffrance; mais chez eux divers sons dans le bas produisent le même effet.

Une dame donée d'un beau talent musical, assureoit que les chiens paroissent entendre avec plaisir certains sons, certains accords. Les vieux habitués du Luxembourg le soutiennent encore que, du temps du Directoire exécutif, il y avoit un gros chien caniche que le goût de la musique amenoit tous les jours à la même heure dans le jardin. Il venoit s'asseoir à la parade & pouffoit entendre avec le plus vif plaisir les airs militaires joués par la musique de la garde, & ensuite il accompagnoit ordinairement quelqu'un des musiciens jusque chez lui. L'habitude qu'ont ces animaux de vivre dans la société de l'homme, fait qu'ils participent jusqu'à un certain point à ses goûts. J'en citerois d'autres preuves si c'étoit ici leur place; je pourrois aussi répéter ce qu'on raconte des merveilleux effets de la musique sur les furies, les loups, les cygnes, les araignées, les rats, les lézards, les poissons, les serpents, les dauphins, enfin (qui le croiroit ?) sur l'âne même. Ces récits, tous plus ou moins incroyables, conçoivent dans les écrits de Macrobe, d'Aristote, d'Atthénée, de Kircher, de Mörhof, de Bourdelot, d'Aldrovande, de Lamouille-Voyer, du Père Schott, d'Ulrich-Magnus & de Paul Diaconus, méritent bien moins l'attention du philosophe & du physiologiste, que l'influence bien connue de la trompette & du tambour sur le cheval; d'un flageolet très-doux, d'un picave sur les oiseaux; du chant monotone d'un conducteur, sur le mulet & le chameau.

La douleur, l'irritation, qu'on, comme on le dit vulgairement, l'agacement que des sons trop élevés font éprouver aux sujets dont le système nerveux est très-irritable, va jusqu'à leur occasionner des mouvements convulsifs. C'est ainsi que la musique est dangereuse pour certains malades dont la sensibilité cérébrale est fortement excitée, & pour les femmes en couches particulièrement. La sensibilité nerveuse peut quelquefois être le résultat de l'irritation continue qu'exerce sur le sens de l'ouïe le chant des oiseaux: le sifflement perçant du serin, plus que tout autre, est susceptible de produire ce fâcheux effet. Certains instrumens jouent aussi par-dessus tout les autres de la propriété spéciale d'exciter trop vivement la sensibilité. On peut remarquer que les joueurs d'harmonica sont ordinairement maigres & sujets aux tremblements nerveux.

La culture assidue de la musique, & surtout de la musique instrumentale, ne laisse pas d'offrir aussi de graves inconvénients: elle exalte non-seulement la sensibilité des organes des sens & de la partie du cerveau à laquelle ils transmettent les impressions, mais encore les facultés intellectuelles, on plutôt l'imagination seule, qui finit par prédominer sur le jugement, & par enivrer en quelque sorte tout le système intellectuel: c'est alors qu'on observe dans le caractère des personnes chez lesquelles la musique produit de sensibles effets, les lignes d'une grande irrascibilité & d'une susceptibilité qui sont le tourment de ceux qui les entourent. A cet excès d'irritabilité physique & morale se joignent des vaines irascibilités, impétueuses, des caprices sans nombre, des alternatives de joie folle & de tristesse sans motif, enfin tous les symptômes de l'hypocondrie, de la mélancolie, & même de la manie. C'est dans cet état que mourut Mozart avant sa trentième année: les organes trop faibles se brisèrent sous les efforts de son génie, & sa vie fut consumée par ces accords qui nous ravissent. Il en est à peu près de même chez les poètes; comme les musiciens, ils cultivent un de leurs sens & leur imagination aux dépens des autres facultés de leur esprit. Mais c'est à disculper de ces inconvénients de la culture d'un art aimable qui nous procure les jouissances les plus délicieuses & les plus pures, qui souvent nous console, & qui toujours augmente le petit nombre d'instans heureux qu'il nous est permis de goûter.

La musique peut quelquefois être employée avec avantage comme moyen thérapeutique: sous ce nouveau point de vue, elle est bien peu connue encore, malgré les recherches d'un assez grand nombre de médecins, parmi lesquels il faut distinguer Joseph-Louis Roger, son traducteur Eugène Sainte-Marie, & M. Moreau de la Sarthe. (Voyez les *Mémoires de la Société médicale d'émulation*, 2^e année.)

Il n'est presque pas de maladie contre laquelle on n'ait conseillé l'usage de la musique. Sauvages dit avoir vu un jeune homme atteint d'une fièvre rémittente, accompagnée d'une violente douleur de tête, qui s'éprouvoit du soulagement que lorsqu'on battoit près de lui du tambour. Ce fait nous paroît très-vraisemblable aux partisans de l'utilité de la musique; car il faut avouer que le bruit du tambour n'a rien de bien mélodieux. Il est également permis de douter que la musique puisse, comme le fait espérer M. Sainte-Marie, convertir la féroce en courage, le libertinage en amour, l'égoïsme en sensibilité pour autrui; qu'elle puisse guérir les vapeurs, les maladies nerveuses, la consomption, la manie, & prévenir les suicides. Mais nous pensons, avec l'estimable traducteur de l'ouvrage de Roger, que la musique, comme tous les beaux arts, adoucit généralement les mœurs, & peut être employée avec avantage dans le traitement de quelques maladies.

Pour déterminer les cas où ce moyen thérapeutique peut être utilement administré, on doit commencer par indiquer ceux dans lesquels il est évidemment inutile, puis ceux où il deviendrait nuisible. Il serait superflu, par exemple, d'avoir recours à la musique dans les cas où un organe important est profondément altéré dans sa structure, à moins toutefois que l'on eût seulement eu vue de diminuer l'influence sympathique que la lésion de cet organe peut exercer sur le cerveau. Il n'en est pas de même pour les autres parties du corps. Il n'est pas de doute que la musique est capable de nuire dans toutes les circonstances où il existe une telle sensibilité cérébrale, que le stimulant le plus doux de chaque organe des sens, ou seulement de celui de l'ouïe, produit une vive agitation, une douleur intense à la tête, & à plus forte raison quand elle détermine des mouvements convulsifs. Ainsi la musique doit-elle être sévèrement proscrite dans tous les cas d'inflammation aiguë du cerveau ou des méninges.

Quelles seront donc les affections dans lesquelles la musique peut devenir avantageuse?... Ce sont celles qui paraissent tenir uniquement à une répartition inégale de la sensibilité : ainsi les spasmes de la poitrine, les palpitations du cœur (avant que cet organe soit devenu anévrysmatique), une douleur de dent, une céphalalgie purement nerveuse, un chagrin concentré, la monomanie, la mélancolie avec penchant au suicide, la nostalgie, une profonde affection morale, quelle qu'en soit la cause, les symptômes nerveux & hypochondriaques provoqués par les phlegmasies chroniques de l'estomac ou des intestins, ou mieux encore tous ceux qui dépendent de l'influence sympathique de l'utérus sur le cerveau, enfin certaines espèces de convulsions, & peut-être le tétanos.

C'est à dessein que nous ne parlons point de l'emploi thérapeutique de la musique dans la piqûre de la tarantule. On fait combien Baglivi s'est laissé tromper sur ce point, & il est inutile de s'arrêter à ce que M. Froment vient d'annoncer sur les prétendus avantages de ce moyen dans le traitement des personnes piquées par une araignée, dont il n'a indiqué ni l'espèce ni le genre.

Les Anciens étoient plus crédules que nous sur ce point comme sur beaucoup d'autres : la musique fut, pour ainsi dire, une branche de l'art de guérir chez les Grecs & chez les Hébreux, & l'on doit peu s'en étonner lorsqu'on se rappelle que chez ces peuples, comme chez tous les autres, les premiers médecins furent des prêtres, c'est-à-dire des hommes prompts à s'emparer de tous les moyens de domination. Pythagore, dont le système est trop peu connu pour qu'on puisse porter sur ses opinions un jugement assuré, fit de la musique une des principales branches de l'éducation qu'il donna à ses disciples. Ses vues sur l'harmonie des sphères célestes sont une des conceptions les plus hardies & les plus poétiques de la seconde antiquité. Ce philosophe parut avoir fait un grand

usage de la musique comme moyen de guérison ; mais il est impossible de déterminer jusqu'où il a poussé la confiance dans l'efficacité de cet agent thérapeutique, & il serait injuste de porter atteinte au respect dû à la mémoire de ce grand homme, qui le premier conçut l'idée d'un système complet de philosophie & de gouvernement, en lui attribuant gratuitement les opinions absurdes de ses disciples. Que dire de Jean-Baptiste Porta, qui, à l'imitation de ces derniers, proposa sérieusement de guérir le syphilis en faisant entendre au malade des airs joués sur des instruments fabriqués avec le bois des végétaux qu'on employoit dans le traitement de cette maladie ? Qui croiroit aujourd'hui que le son d'un flageolet fait d'une tige d'ellébore, ait pu guérir la manie ?

Après avoir donné pendant quelques instans son attention à de pareilles rêveries, on la porte avec plaisir sur quelques faits qui peuvent être exagérés, sans doute, mais qui tendent à prouver que la musique est susceptible d'agir, par l'entremise du système nerveux, sur des organes dont il sembleroit que ce moyen ne devoit avoir aucune action. Scéliger raconte qu'un gentilhomme gascon éprouvoit le besoin d'uriner, & n'y étoit en effet, chaque fois qu'il entendoit le son de la carnausse. Les conducteurs de chevaux paroissent croire qu'en faisant ils favorisent cette excitation, & cette opinion populaire n'est pas dénuée de tout fondement. Baglivi dit avoir vu des gouteux retirer des bons effets de la musique : sans doute qu'elle charmoit, comme on dit, leurs douleurs. Aibénès, Théophraste & Celsus Aurelianus rapportent également que de vives douleurs soitiques n'ont été adoucies par ce moyen ; ils choisissent dans cette vue la sîte, afin d'obtenir des sons aigus & éclatans. Chrysippe recommandoit la musique dans le traitement de l'épilepsie ; Pierre-Desault l'employoit, dit-il, avec succès dans la phthisie, c'est-à-dire que par elle il atténue les souffrances des malades & les soulageoit momentanément ou momentanément de leur état. Ce même Desault croit avoir contribué au soulagement de personnes mordues par des chiens enragés ; on les faisoit assister à un concert. Il ne seroit pas inutile, sans doute, de recourir à ce moyen, parait plusieurs autres, pour dissiper le profond sentiment de terreur qui pourroit sans relâche les individus menacés d'hydrophobie ; mais si cette affreuse maladie étoit une fois déclarée, la musique, comme tout ce qui agit sur les sens, ne seroit probablement qu'en exciter & multiplier les accès. Bourdelot cite un cas de folie guérie par la musique ; mais les récits de ce médecin, plus courtisan qu'observateur, ne peuvent inspirer beaucoup de confiance. Alcibiade, Albrecht, mais surtout Willis & M. Pisol, méritent à plus juste titre d'être cités parmi les médecins qui ont employé avec succès la musique dans le traitement de la folie. Enfin, l'homme a recueilli une obser-

vation remarquable de guérison d'hystérie chez une jeune fille qui, dès le commencement de sa maladie, s'étoit livrée avec beaucoup d'ardeur à l'étude du violon.

Ces faits qui, pour la plupart, m'ont été fournis par l'intéressant ouvrage de Roger, tendent à prouver que la musique peut être utile dans le traitement de plusieurs maladies. Nous avons indiqué sommairement celles dans lesquelles il nous paroit que ce moyen peut être le plus rationnellement mis en usage : maintenant il nous resteroit à tracer les règles qu'on doit suivre dans son application ; mais ces règles n'existant point, parce que jusqu'ici la musique n'a guère été employée en médecine pratique, que par une sorte d'inspiration, & jamais d'après une indication probable & un plan déterminé, l'out ce que nous pouvons dire, c'est qu'en même temps qu'on essaye l'usage de la musique, il ne faut négliger aucun des moyens indiqués par la nature du mal ; qu'il est nécessaire d'observer attentivement les effets qu'elle produit, car ces effets peuvent être défavorables, & alors il faut cesser son emploi ; qu'enfin on s'en réduit à des tâtonnemens continuels avant d'être assuré quel est le genre de musique qui doit être préféré à tous les autres. En général, on commencera par les airs qui sont dans le mode doux & lent, & l'on s'élèvera jusqu'à un mode éclatant & vif.

Il est remarquable que la musique n'a été jusqu'ici d'aucune utilité dans les maladies de l'oreille interne. Pourquoi n'a-t-on pas cherché à tirer parti de ce puissant modificateur de l'ouïe ? A l'article SOUË, nous avons soin de dire à quels intéressans résultats est parvenu le docteur Liard, en soumettant l'oreille de jeunes sourds-muets qui jouissoient encore d'un faible degré d'audition, à l'action de quelques instrumens sonores. Nous parlerons aussi d'un cas très-remarquable de boudernement qu'il parvint à guérir, en recommandant à la malade de se tenir constamment soumise à l'influence d'un bruit uniforme & long-temps continué. C'est à peu près à ce qui vient d'être dit que se borne tout ce qu'on fait de positif sur l'emploi de la musique en médecine ; ce qui paroît manquer à cet article doit se trouver plus convenablement aux articles OUIE, SON, SORDA & SORDITÉ.

(COURTÈVE.)

MUSITAN (Cherles) (*Biogr. méd.*), naquit à Castelvillari, dans la Calabre, en 1635. Il étudia & professa la médecine à Naples. Prêtre & médecin, l'on trouve souvent son nom où il s'occupait spécialement de traiter les maladies des femmes & les maladies vénériennes ; mais sa réputation & ses succès lui firent obtenir du pape Innocent XII la permission de continuer son état, qu'il exerça avec célérité jusqu'à sa mort, arrivée en 1714, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Attaché à la secte chimique, il vantoit hautement ses prétendus spécifiques, condamnoit la saignée, les sangsues & les lavemens.

L'on peut juger d'après cela du cas que l'on doit faire de ses ouvrages.

Pyretologia seu de febris. Neapoli, 1683, in-4°. Colonie Allobrogum, 1701, in-4°.

Del mal Francejo, en 4 livres. Naples, 1697, in-8°.

Chirurgia theorico-practica, seu, Trutina chirurgico-physica. Genev., 1718, in-4°.

De morbis mulierum. Ibid., 1709, in-4°.

Opera omnia. Genev., 1701, 2 vol. in-4°.
(R. GOSNOD.)

MUSOMANTE, de *musomania*. Dénomination mal entendue, par laquelle on désigne le goût exagéré pour la musique. (Voyez MICHOMASIE, TAERTISME & TAERTULE.) (L. J. M.)

MUSITATION. (*Pathologie générale, fébrile*). Affection de parler bas ; mouvement comme automatique & involontaire des lèvres, que l'on regarde avec raison comme un des principaux symptômes des fièvres malignes ou atoniques. (L. J. M.)

MUTAGISME. (*Pathologie*). Vice de prononciation qui consiste dans la répétition fréquente des lettres labiales M. B. P., que l'on substitue à d'autres lettres dans la composition des mots. (L. J. M.)

MUTES (Vins). (*Hygiène*). Les vins quelconques, soumis à la distillation à un degré de chaleur qui n'excède pas celui de l'eau bouillante, ne fournissent point d'autres principes que leur gaz, lorsqu'ils en contiennent, leur phlegme, leur partie spiritueuse & une petite portion de l'acide & de l'huile les plus volatils. Si l'on cesse la distillation après qu'ils ne fournissent plus d'eau-de-vie, le résidu de cette distillation n'est plus qu'un mélange des autres principes qui constituent le vin.

Ces résidus offrent des différences suivant les espèces de vins dont ils proviennent, & les saisons qui ont régné dans le temps de la maturité des raisins.

Ceux des vins produites, on fers, sont acides, acerbes, colorés d'un rouge altéré, d'une couleur sentille-morte ou jaune, si le vin étoit rouge.

Ce que le vin pouvoit contenir de lie & de terre s'y trouve aussi confondu avec le partie extractive acide.

Les résidus des vins de liqueur, entre ces principes, contiennent encore toute la matière filtrée qui n'a pas fermenté dans ces vins, & qui leur donne le caractère de vins de liqueur.

Il en est de même des résidus des Vins noirs, dont le fermentation a été arrêtée par l'acide sulfureux que l'on brûle dans les tonneaux pour empêcher, en totalité ou en partie, leur principe sucré de se changer en alcool.

Ces vins sont doux & conservent une très-grande partie de gaz carbonique qui se trouve combinée avec leur partie sucrée, & ne se développe qu'à

lentement. C'est à ce gaz, qui se dégage dans l'estomac, à cause de la chaleur à laquelle il se trouve exposé, qu'on doit leurs effets capiteux qui envoient très-promptement; car ce n'est point à l'alcool qui y est contenu que nous devons rapporter ces effets nuisibles, attendu qu'il n'y en a qu'une très-petite proportion; aussi l'ivresse que ces vins occasionnent est-elle de très-pen de durée; ce qui n'arriveoit pas s'ils contenoient beaucoup d'alcool.

Ces qualités se trouvent dans les vins bourrais, tels que celui d'Arbois, dont la fermentation a été fautive avant que toute leur partie sucrée ait été convertie en vin, & qui, par cette raison, font en même temps sucrés & pleins de gaz carbonique qui le rend d'autant plus mouffeu, qu'ils se trouvent exposés à une température plus chaude; ce qui fait que dans les pays méridionaux on les conserve dans des bouteilles bouchées seulement avec un liçon de paille, après avoir couvert la surface du vin d'une couche d'huile de l'épailleur d'un pouce.

On trouve encore ces qualités dans les cidres nouveaux, tant qu'ils conservent une partie de leur pommance, & avant que ce qui leur reste de principe sucré ait été décomposé avec le temps par l'effet de la fermentation lente ou insensible.

On retrouve dans les résidus de la distillation de tous ces vins un liquide vineux; la même quantité de matière sucrée qu'ils contenoient au moment où l'on en a fait l'analyse; car cette matière ne monte & ne s'altère point au degré de chaleur qui s'exerce pendant celui de leur bouillonnante; en sorte qu'après avoir été ainsi séparée de sa partie spirituelle, elle seroit propre à subir elle-même la fermentation vineuse comme si elle n'avoit jamais fait partie du vin. Mais malgré la douceur de cette matière dans les résidus de vins distillés, l'aigre & l'acide s'y sont toujours formés d'une manière très-désagréable, parce que la combinaison de ces principes diffèrent a été détruite, & que même la partie du vin a été altérée par la chaleur de la distillation.

Les vins mutés sont ordinairement très-agréables, & ne se servent communément qu'à dessert; car il seroit dangereux d'en faire usage produit tout le v'pas. (CASSINI-VERMOREL.)

MUTIS (Donald). (*Biogr. méd.*) Ce médecin, né à Raguse, jouissoit de quelque célébrité vers le milieu du seizième siècle. On lui doit quelques observations sur les propriétés de la térébenthine, & l'ouvrage suivant sur la traduction des Aphorismes d'Hippocrate, par Galien: *In interpretationem Galeni super quatuordecim aphorismos Hippocratis, Dialogus*. 1547, in-4°. (L. J. M.)

MUTILATION. (*Chirurgie, médecine légale.*) Opération qui consiste à retrancher certaines parties du corps, certains organes, & par figure, étoit qui résulte de ce retranchement, de cette

ablation. Ce mot a un sens très-étendu lorsque sa signification n'est pas restreinte dans le Vocabulaire de la chirurgie, à laquelle il appartient. (Voyez cet article dans le *Dictionnaire de Chirurgie* de l'Encyclopédie.) (L. J. M.)

MUTIS. (*Biogr. méd.*) Ce célèbre botaniste fut l'ami & le disciple de Linné: son titre & ses fonctions de médecin du comte de Cafa-Flores, vice-roi, le surpassèrent beaucoup dans ses études sur la Flore de Bogota, par les parties de l'Amérique. La Flore de Bogota fut enrichie de figures qu'il fit graver par des peintres du pays. Mutis donna une nouvelle extension à ses travaux lorsqu'il se trouva nommé chef de l'expédition botanique de la Nouvelle-Grenade. On doit à Mutis un ouvrage quinquana. (*Le quinquana de la Nouvelle-Grenade.*) (L. J. M.)

MUTISME, f. m., ou MUTIS, f. f. *Mutitas*. (*Pathologie.*) On se sert de ce mot pour désigner l'impairance où l'on trouve certains individus de faire entendre des sons articulés. Il est essentiel de ne pas confondre la mutisme avec l'aphonie; celle-ci est la perte plus ou moins complète de la voix, mais la possibilité d'articuler des mots il peut cependant arriver qu'on confonde ces deux, car dans l'aphonie privent en même temps le sujet de la faculté de parler & d'émettre aucune espèce de sons vocaux.

Les maîtres de l'art ne nous ont pas laissé de description exacte du mutisme, dont la paroisse même s'être peu occupée. Hippocrate n'a traité que de l'aphonie; & les observations éparpillées de Porellus, de Tulpus, avec ce qu'on en a dit Hollmann dans ses divers ouvrages, & Sauvages dans sa *Noëlogie*, sont des seuls documents un peu anciens que nous possédons sur cette maladie. Des faits relatifs au mutisme, inférés de des époques plus ou moins éloignées de nous, dans une seule de recueils & d'écrits périodiques, ont fait, à la vérité, des preuves de la connaissance que les Modernes ont acquise de cette maladie, mais ont montré en même temps que jusqu'à ce jour elle n'avoit pas fixé d'une manière spéciale l'attention des esprits observateurs.

M. le professeur Pinet, qui, de nos jours, s'est le plus occupé de classifications & de descriptions de maladies, n'a fait qu'indiquer cette lésion qui, sous certains rapports, réclame de la part autant de soins que l'aliénation mentale; car il s'agissoit aussi des moyens de rendre à la société une ligue de malheureux victimes rejetés de son sein. On peut donc assurer que ce sont les travaux récents de M. Jard qui ont fait sortir des ténèbres & de l'oubli, le mutisme considéré sous le point de vue médical. Aussi est-ce dans les ouvrages de ce médecin distingué, & dans les faits particuliers qu'il a bien voulu me transmettre, que j'ai dû chercher les connaissances les plus positives sur cet intéressant sujet.

On rencontre dans l'étude des agens morbifiques, un certain nombre de causes générales dont la présence se reproduit indifféremment dans le développement de toutes les maladies; mais ce n'est pas une raison de les passer sous silence en traitant d'une maladie en particulier. Ainsi des évacuations périodiques ou supprimées, des vers intestinaux, un refroidissement subit, une vive affliction morale, l'abus des liqueurs alcooliques ou des jouissances de l'amour, les métastases d'asthme, varicelles et autres, &c., sont susceptibles d'exercer sur la production du mutisme une influence réelle, qu'on ne plus éloignée que l'action des causes directes dont nous traiterons tout à l'heure. Sauvages parle d'une fièvre vermineuse qui rendit un enfant muet; le malade se trouva guéri par l'expulsion de beaucoup de vers. Macquart, médecin de Clisson, rapporte dans le *Recueil des observations de médecine des hôpitaux militaires*, l'histoire d'une perte totale & subite de la parole, occasionnée par la présence des vers: de fortes doses d'émétique, des anthelmintiques & des purgatifs violents furent mis vainement en usage pour rendre à la langue ses fonctions; elle resta constamment inactive, froide & molle; & ne reprit son état naturel qu'après l'usage des sténomatrices & des salivages les plus puissans. M. Benjamin Verraud (*Recueil périodique de la Société de médecine*) a publié un exemple de mutisme par suppression des règles. Poterius (*Censur. a curandis*) a laissé l'histoire d'une petite fille qui devint muette par la cicatrisation d'ulcères qu'elle avoit sur la tête; elle ne guérit qu'à l'aide de purgatifs long-temps continués. Dans les *Extraits des Actes de Copenhague*, on lit l'observation d'une aphémie complète, occasionnée par la peur, & qui fut guérie par l'usage des antispasmodiques.

Dehaene a inséré dans son recueil, l'histoire d'une semblable affection survenue à la suite de l'usage précipité & immodéré du quinquina donné comme fébrifuge. Enfin, une foule d'observations de ce genre ne peuvent laisser aucun doute sur l'action particulière des causes que nous avons énoncées. On n'a pas besoin d'admettre les théories de l'humorisme, ni de marcher sur les traces de Galien ou de Sylvius, pour reconnaître la possibilité de faits aussi certains; & sans vouloir les expliquer à l'aide de ceux des humeurs, on connaît bien assez les lois des sympathies & des phénomènes critiques, la fréquence des métastases dans un grand nombre de maladies, pour ne pas être surpris & embarrasé dans la rencontre d'une mutité dépendante d'agens qui, au premier coup d'œil, pourroient paraître étrangers à la production de cette maladie.

Parmi les causes plus directes du mutisme, nous mettrons la section des nerfs récurrents, leur lésure, leur compression (comme le prouvent des expériences très-connues), une tumeur développée

sur l'un ou l'autre côté des angles de la mâchoire, & qui comprimerait le larynx ou le grand hypoglosse. Thomas Bartholin a eu sous les yeux de semblables exemples, & l'on trouve chez d'autres observateurs, des histoires de mutisme par suite de l'extirpation des glandes du cou, d'une attaque d'apoplexie, d'un abcès dans l'un ou l'autre hémisphère cérébral, d'hydattides développées sur le trajet ou sur l'origine des nerfs de la cinquième, de la huitième ou de la neuvième paire, par une compression partielle de l'encéphale, par l'usage des opiacés, &c. Galien parle d'une perte instantanée de la parole, survenue après une injection anodine sur une dent cariée. Sauvages rapporte qu'au près de Montpellier, des velleurs, en mêlant à du vin des plantes vénéneuses, avoient composé une boisson qui privoit de la parole pendant un & même deux jours. Enfin, tous les moyens capables d'exciter ou d'exciter trop fortement l'action nerveuse, sont autant de causes qui peuvent agir puissamment sur le développement du mutisme.

La furdité de naissance est toujours accompagnée de la perte de la parole, à moins qu'un art bien-faict ne vienne rendre aux fons-muets la faculté de se faire entendre, & celle de communiquer avec leurs semblables à l'aide de l'articulation des sons. (*Poyez le Traité de l'oreille & de l'audition*, par M. Itard.) L'idiotisme, la démence, sont aussi des causes fréquentes de mutité; les lésions organiques du larynx, l'entière érosion du pharynx, des piliers de voile du palais, le glossite, la gangrène, le cancer de la langue, la perte ou le volume excessif de cet organe, une angine violente, &c., produisent incontestablement le même effet. Il n'est pas besoin de citer des observations pour prouver l'action de ces dernières causes ou d'autres semblables; leur mécanisme est assez facile à saisir.

D'après cette exposition méthodique des causes de la mutité, il n'est pas difficile de déduire les différences importantes qu'on observe dans cette maladie, & d'en former, d'après elles, quatre espèces principales: 1°. le mutisme nerveux, c'est-à-dire, celui qui dépend de l'affection des nerfs du larynx & de la langue; 2°. le mutisme par furdité; 3°. le mutisme par lésion de l'intelligence; 4°. enfin, celui qui provient d'un vice matériel ou acquis des organes de la parole ou de la voix.

On rencontre aisément que les symptômes de la première espèce ne sont pas nombreux, & que la perte complète de la parole est le signe principal & presque unique de la maladie; mais un examen peu attentif, en induisant en erreur sur la cause, pourroit bien devenir funelle par l'application d'une thérapeutique erronée. La perte de la parole constatée, il faut d'abord s'enquérir des circonstances commémoratives: ici l'étude particulière des causes générales qui rentrent dans l'ordre de celles qui produisent le mutisme nerveux, n'est pas de peu d'importance. Le sujet affecté de mutité nes-

veuse entend facilement, mâche & avale même le bel alimentaire sans trop de difficultés; sa langue est plus molle, plus froide que dans l'état naturel; elle paraît glorieuse dans ses mouvements; le malade éprouve la même difficulté à la tirer de sa bouche, & à la rentrer: quelquefois même en apparence, elle requiert l'exploration attentive des organes de la voix. Le pharynx peut aussi être paralysé; on reconnoît sa paralysie à la difficulté & même à l'impossibilité d'avaler. On devra examiner encore les parties voisines des nerfs qui le distribuent au larynx & à la langue; & au moyen de cette exploration on pourra découvrir des tumeurs ou des gonflemens dont on ne s'étoit pas encore aperçu. Toutes ces recherches ne servent pas peu à établir un diagnostic assuré. Outre ce que nous venons de rapporter, il est encore une toute de variétés curieuses du système nerveux qu'on ne sauroit passer sous silence. On a vu des guerisons inattendues causées par des excitations violentes, des pertes subites de la parole, des intermittences presque salutaires, & cependant affirmées par des témoins irrécusables.

On lit dans l'*Histoire de l'Académie des Sciences*, qu'une jeune fille devenue muette par suite de la guérison d'une fièvre intermittente, ne pouvoit parler qu'après avoir bu d'une infusion de fleurs vulnéraires, & qu'elle en portoit habituellement dans sa poche: ce qui lui faisoit dire qu'elle avoit sa voix dans sa poche. Thomas Bartholin vneoit d'entre une consultation pour un muet chez lequel il n'avoit trouvé d'autre symptôme que la difficulté de monvoir la langue. Le malade, en se rendant chez l'apothicaire, rencontra sur son chemin une vieille femme à laquelle il portoit une haine mortelle; la vue de cet objet odieux excita chez lui un mouvement de colère si violent, que sa langue se déba tout-à-coup pour lâcher à l'ennemie une inspiration très-énergique. Ce fait peut confirmer au besoin celui que l'histoire ancienne nous a laissé du fils de Crésus, à qui l'ouïsme qui lui causa le danger pressant où le trouvoit son père, rendit subitement l'usage de la parole.

On trouve dans la *Collection académique*, (tom. XI; partie étrangère) l'observation d'un paysan devenu muet à la suite d'une attaque d'apoplexie. Cet homme avoit appris à chanter quelques psaumes avant de tomber malade; après son accident il put encore les chanter aussi nettement que l'homme dont l'organe est le plus libre, mais il fallut que quelqu'un l'aiderait en commençant à chanter avec lui. Il étoit, d'ailleurs, complètement muet, & se servoit de signes pour se faire comprendre. Ce fait en rappelle un à peu près semblable, consigné dans la même *Collection*, tome III. Une dame de distinction, devenue muette après une légère apoplexie, ne pouvoit pas, même prononcer une syllabe, à l'exception de l'*Oraison domi-*

nicaie, du *Symbole des Apôtres*, de quelques paroles de la Bible & d'autres prières qu'elle récitait sans hésiter, quoiqu'avec un peu de précipitation; mais (ce qui est digne d'attention) elle ne pouvoit les réciter que dans l'ordre auquel elle s'étoit accoutumée depuis plusieurs années: si l'on vouloit changer cet ordre, elle ne pouvoit plus en venir à bout, succéda après beaucoup de temps & des peines infinies. Cette observation a été donnée par Pierre Rommélius, qui d'vu lui-même la malade, & qui n'a pu la guérir. Salomon Kneissel dit avoir observé une perte de la parole non moins remarquable. Georges Alkajer, âgé de vingt-cinq ans, fils d'un cabaretier, perdit peu à peu la faculté de parler, à la suite de maux de cœur suivis de plusieurs vomissemens. L'extinction de la voix n'étoit d'abord que momentanée; ensuite elle persista, se prolongea davantage de jour en jour, depuis la durée de quelques minutes jusqu'à celle d'une demi-heure, d'une heure, de trois heures, & enfin jusqu'à vingt-trois heures, mais sans régularité. Enfin, le retour de la parole garde son ordre constant, que depuis quatorze ans il ne pouvoit parler que pendant l'espace d'une heure entière, depuis midi jusqu'au commencement de la première heure du soir. D'après l'auteur qui rapporte un fait si extraordinaire, il étoit impossible de tromper cet homme par la transposition arbitraire des heures sur le cadran des horloges: quoi que l'on fit, son accès ne revenoit jamais qu'à l'heure véritable; mais pendant le temps qu'il avoit l'usage de la parole, il répondoit à toutes les demandes & parloit sur tous les sujets avec netteté & précision; il lisoit même à haute voix; mais dès qu'une heure après-midi étoit arrivée, il lui étoit impossible de se faire entendre autrement que par signes. Cette histoire singulière a été consignée dans les *Éphémérides des curieux de la nature* (Vol. I, an IX & X, 1788 & 1789), recueilli où se trouvent tant d'autres faits incroyables. Des observations pareilles ne contrarient ou rien ce qu'on sait de bigarrément, qui précède ou accompagne toutes les maladies nerveuses, & qu'on observe même assez souvent chez des sujets qui peuvent parler. En admettant le fait comme vraisemblable, est-il possible d'y voir autre chose qu'une de ces singulières & inexplicables anomalies dont l'action des nerfs est susceptible?

La deuxième espèce de mutisme est le mutisme par surdité. Nous pourrions ici sous silence une description qui trouvera mieux sa place à l'article *Deaf-mutism*. Au reste, la partie la plus intéressante des observations qui se rapportent à cette espèce, consiste dans l'éducation longue & pénible à laquelle on soumet les malades, afin de les rendre propres à communiquer avec leurs semblables, & à faire eux-mêmes partie de la grande société humaine.

Peu riches en faits relatifs au mutisme de la troisième espèce, c'est-à-dire à celui qui dépend

de lésions de l'intelligence, nous ferons forcés d'admettre la description. L'idiot muet, incapable d'appréhender les sons articulés qui frappent son oreille, ou ne les retient pas, ou les oublie aussitôt qu'il les a appris; ses facultés intellectuelles, anéanties par des lésions organiques du cerveau, le rendent pareil à la brute, & quelquefois moins susceptible qu'elle de recevoir un certain degré d'éducation; aussi, lorsqu'un tel accident est venu priver cet idiot de la vue ou de l'ouïe, ou bien encore lorsque, sourd-muet de naissance, la nature l'a traité avec la plus grande rigueur, une démence complète est le résultat de cette complication d'affections morlides; cet être repoussant est devenu tout-à-fait à charge à ses semblables, & le seul signe qui conserve de l'humanité est un rire marqué du fœces de la bête. Quelquefois il arrive que la langue des muets idiots est épaissie en partie, & se meut difficilement; alors les remèdes excitans font bien lumbé procurer le succès qu'on auroit pu se promettre de leur administration. La cause essentielle de la mutité étant la démence ou le défaut d'action de la puissance cérébrale, on conçoit qu'elle seule ait pu être capable d'influencer les organes de la parole au point de ralentir & d'empêcher leur action.

La difformité du larynx, du pharynx, de la langue ou des autres parties dont la bonne conformation est nécessaire à l'émission de la voix, ne permet pas que nous soyons induits en erreur par la cause de la quatrième espèce ou du mutisme organique; car son existence est plus que constatée par des lésions aussi apparentes. Dans un glossitis inflammatoire ou virulent, les parois de la bouche font gonflées, les lèvres épaissies & rougeâtres, quelquefois livides; la langue fait effort pour sortir plus volumineuse par l'ouverture de la bouche; elle finit quelquefois par descendre au-devant du menton, ou même du cou, & alors la suffocation est imminente. Ailleurs, une salivation mercurielle, abondante, avec une effrayante difformité, sont des causes suffisantes de la mutité. Tel guérit sans que le cancer à la langue; tel autre est privé entièrement de cet organe; plusieurs, par suite de maladies ou de circonstances qui agissent continuellement sur eux, ont la bouche desséchée & ne peuvent faire entendre aucun son articulé. De semblables symptômes seront aisément reconnus, & la présence du mutisme & la cause organique qui l'entretient; mais cette dernière espèce de mutisme offre des variétés qu'il n'est point indifférent de connaître.

Tulpin a laissé l'observation suivante: Jean, sur nommé le muet à cause de son malheur, avoit été privé de la langue par des pirates turcs; l'extirpation de cet organe, qui avoit été pratiquée au moyen d'une incision faite sous le menton, ne le priva nullement de la faculté de pousser des cris, mais lui ravit pendant trois ans l'usage de la parole. Au bout de ce temps, ce malheureux ayant

Médecins. Tome X.

été subitement réveillé, au milieu de la nuit, par la chute inattendue de la foudre; ébloui par le feu du ciel, & frappé d'une vive frayeur, les liens de sa langue se rompirent, c'est-à-dire que la petite portion de langue qui lui restoit devint capable de remplir toutes les fonctions de cet organe, au point que le muet s'entendait lui-même parler ne pouvoit en croire ses oreilles. Sauvin, chirurgien à Nantes, rapporte l'histoire d'une fille qui, à la suite d'une métastase variolique sur la langue, perdit cet organe par inflammation gangréneuse. Privée d'abord de la parole, elle parvint peu à peu à parler & à chanter assez nettement. Fen M. de Jusieu, professeur de botanique au Jardin du Roi, parle (*Académie des Sciences*) d'une fille qui, née sans langue, remplissoit néanmoins les fonctions dépendantes de cet organe. Riélan, dans son *Anthropographie*, raconte un fait à peu près semblable. Un certain Roland, chirurgien à Saumur, dans un Mémoire intitulé *Argéostomatographie, ou Description d'une bouche sans langue*, nous apprend qu'un garçon de huit à neuf ans, qui, par une gangrène survenue dans le cours de la petite-vérole, avoit perdu la langue, parloit néanmoins assez distinctement, & s'acquittait assez bien des fonctions de cette partie.

Puisqu'il résulte de tous ces faits, plus ou moins avérés, & d'un grand nombre d'autres faits semblables que nous nous dispenserons de rapporter ici, que la lésion, & même l'extirpation de la plus grande partie de la langue, peuvent ne pas entrainer le mutisme complet, que penser de la doctrine de ces praticiens qui s'emprescent de recourir de suite à la section du filet quand la parole n'est pas parfaitement libre? M. Itard, dans le cours d'une longue pratique spéciale, n'a pas observé un seul cas de mutisme où cette incision pût être de quelque utilité.

Après ce qui vient d'être dit, en conservant sans peine combien un diagnostic raisonné est indispensable dans le traitement de la mutité. Quelles erreurs grossières ne commettrait pas un médecin qui, sans faire attention aux causes diverses qui la déterminent, la regarderait indistinctement comme incurable, ou soumettrait le malade aux essais empiriques du liguement ici, la saignée de la racine lui paroitroit exigée; là, il voudroit inciser le filet de la langue, & peut-être, dans le cas de la longueur démesurée de cet organe, il feroit la proposition d'extraire ce qui dépasseroit le bord alvéolaire. Un praticien exercé, au contraire, examinera d'abord le malade avec soin; la liberté des mouvemens de la langue, la facilité de la déglutition, la bonne conformation de toutes les parties qui entrent dans la composition du cou, l'état satisfaisant des facultés intellectuelles, l'absence de la furdité & de toute autre lésion organique du côté des parties qui concourent à la formation & à l'articulation des sons, seront pour lui des conditions toujours présentes à sa pensée, & dont l'absence faciliteroit beaucoup son diagnostic. Le

Kkk

mutisme par surdité n'exige pas une étude bien attentive pour être reconnu, mais encore laudrait-il savoir s'il est réccut, s'il est iusé, & si des chances de guérison peuvent être tentées. Au reste, je n'ai pas besoin de répéter que cette variété fera traité amplement dans un article spécial. Pourroit-on pareillement méconnoître l'espèce qui seroit causée par la lésion apparente des organes de l'ouïe, & l'inspektion du malade ne suffirait-elle pas seule pour établir un diagnostic certain ? Quelles seroient donc les variétés du mutisme difficiles à reconnoître ? Celle qui dépend de la lésion de l'intelligence seroit-elle dans ce cas ? Ici, la langue sera comme empâtée, l'ouïe existera dans son intégrité ; le cou, les nerfs seront reconnus sains, après les plus scrupuleuses recherches ; mais le trouble des facultés intellectuelles, cousté d'une manière évidente, ne pourra laisser le moindre doute sur la cause & la nature de la maladie.

Le mutisme nerveux est la seule espèce dont le diagnostic soit un peu obscur. On vous présente un muet, sain d'ailleurs dans toutes les fonctions, n'offrant sur le cou rien de remarquable, ayant la langue légèrement embarrasée, froide & molle, mais assez libre dans ses mouvements ; quelle détermination pourrez-vous prendre ? Lazare Rivière rapporte l'observation d'un homme très-bégu, sur le cadavre duquel il dit qu'on trouva, à l'ouverture du crâne, une tumeur formée par une membrane fort dure, située sous la substance corticale, remplie d'une humeur séreuse, & percée à la partie inférieure d'une petite ouverture par où le liquide distilloit continuellement sur les nerfs moteurs de la langue. Des vers fixés dans le canal intestinal peuvent produire sympathiquement des effets semblables. Au lieu de ces étourneaux répétés, de ces démanseions fréquentes de la membrane muqueuse, qui sont les signes ordinaires de leur présence dans les premières voies, que la muosité ferrugineuse sans être accompagnée d'aucun autre indice, il faudra toute la sagacité du médecin le plus expérimenté pour établir un diagnostic aussi difficile qu'il est indispensable pour diriger le traitement d'une manière méthodique & efficace. Des tumeurs scrophuleuses compriment le grand hypoglosse, le nerf lingual ; quel médecin, même après un examen attentif, pourroit se douter d'une influence dont on a jusqu'à ce jour si peu d'exemples ! Galien rapporte l'histoire unique d'un homme muet par la présence des écrouelles. La première espèce, ou le mutisme nerveux, se reconnoît donc seulement aux principaux signes que je vais récapituler ici : toute lésion visible ou palpable des nerfs, des organes de la voix ou de ceux de la parole, la flaccidité de la langue, la difficulté de ses mouvements, sa froideur sensible au toucher, enfin l'absence des signes caractéristiques des autres espèces de mutisme.

Traitement du mutisme. Dans le mutisme ner-

veux, l'extinction de la sensibilité réclamera de violentes excitations ; on ne devra pas surtout négliger les moyens moraux les plus énergiques & capables de porter le trouble, la terreur dans les sens du malade, d'exciter violemment en lui la surprise, & même le besoin impérieux d'exercer la faculté qu'il a perdue. Quelquefois les antispasmodiques seront d'une grande utilité ; on les emploiera alors après avoir eu recours sans succès aux excitans. Enfin, les tumeurs placées sur les trajets nerveux devront être extirpées, si leur résoltion étoit devenue impossible.

Tout le monde connoît assez aujourd'hui le mode d'éducation des fous-muets ; je ne saurois mieux faire que de renvoyer le lecteur aux ouvrages qui traitent de cette matière ; mais je puis avertir en passant que des fous-muets, en petit nombre, à la vérité, ont recouvré le sens de l'ouïe par l'influence instantanée de sons très-aigus, par le bruit des cloches, par une sorte de détonation telle que le bruit du canon, &c. &c. De pareils moyens pourront amener quelquefois des résultats aussi heureux qu'insensibles.

Le mutisme par lésion de l'intelligence est peut-être plus incurable encore que le mutisme par surdité : il peult peut-on apprendre à l'idiot, les signes qui lui sont nécessaires pour demander la subsistance ; néanmoins il faudroit soumettre le malade à l'action de quelques excitans, & tenter, à l'aide de l'éducation la plus pénible & la plus longue, d'améliorer quelque peu que ce soit la déplorable situation. M. Itard a donné, en ce genre, un exemple de philanthropie & de philosophie expérimentale qui prouvera peu d'imitateurs.

Enfin, le mutisme organique ne cessera que par la destruction des causes, & son traitement devra être aussi varié qu'il y aura eu de lésions capables de le produire ou de l'entretenir. Cependant, si une portion de la langue, si petite qu'elle soit, subsistât encore, on pourroit tenter de l'exciter le plus souvent possible ; on pourroit même la frotter fréquemment, la mouvoir en tout sens, exciter le courroux & la colère du muet, lui faire agir dans sa bouche de petites palettes de bois, des pierres, &c. &c. Alliez de fais on a prouvé que l'usage complet de la langue n'étoit pas indispensable à la parole, pour tester de suppléer à l'imperfection matérielle de cet organe par un exercice soutenu & perfectionné des parties accessoires, qui, comme le voile du palais, les buccinateurs & les lèvres, concourent à l'articulation des sons. (COSTANCES.)

MUTITÉ, sub. f. *Mutitas*, de *mutus*, muet. Impuissance d'articuler des sons. (Foy. **MUTISME**.)

MUYS (Wyer-Oudlaume) (*Biogr. médic.*), né à Steenwyk, dans l'Over-Yssel, en 1683, étudia à Leyde, & se fit recevoir docteur à Utrecht. Peu fortuné, il s'adonna du bonne heure à la pratique,

ce qu'il fit avec succès. En 1711 il fut nommé professeur de médecine au université de Franeker, & passa successivement à la chaire de chimie & à celle de botanique; il fut ensuite nommé conseiller-médecin de la maison d'Orange. Il mourut à l'âge de soixante-deux ans, en 1744.

Alimenta physices methodo mathematica demonstrata, quibus accedunt dissertationes duæ prior, de causâ soliditatis corporum; posterior, de causâ resistentiæ fluidorum. Amstel., 1711, in-4°.

Dissertatio & observationes de julis ammoniaci præclaro ad febres intermittentes usu. Francqueræ, 1716, in-4°.

Disputationes duæ, de materiâ luminis seu ignis, caloris & lucis naturâ. Ibid., 1731, 1732, in-4°.

Investigatio fabricæ quæ in partibus musculis componentibus exstat. Lugd. Bat., 1738, 1741, 1751, in-4° (R. Gessner.)

MUYTEN. *Celastrus myiartenus.* (Mat. méd.) Cette plante appartient à la famille des frangulacées. On emploie, au Chili, la décoction de ses jeunes rameaux, contre les œdèmes & les gonflemens, que l'on attribue à l'ombre vénérable d'un arbre appelé *lithi*. (L. J. M.)

MYCHTHISME, *mychthos*, de *μύς*, génir. Il paroît qu'Hippocrate désignoit sous ce nom l'espèce de bruit ou de gémissement que produit l'expiration chez les malades. (Coac. Prænot., 510.) (L. J. M.)

MYDESE, *mydesis*, de *μύδω*, abonder en humidité. Ce mot signifie en général, gangrène ulcéreuse, putréfaction complète, &c. (L. J. M.)

MYDRIASE. (Patholog. génér. Seméiotique.) Affaiblissement de la vue, causé par une hydrophtalmie. (L. J. M.)

MYDROS, de *μύδω*, morceau de fer ou de filer, que l'on faisoit rougir au feu pour le plonger dans l'urine, avec le dessein d'employer cette dernière en fomentation. (Hippocr. de morb. mulier., lib. II.) (L. J. M.)

MYE (Frédéric van der) (Biograph. médic.), médecin & poète du dix-septième siècle, naquit à Delft, & exerça la profession à Breda; il s'y distinguait non-seulement par les succès de la pratique, mais encore par les ouvrages dont il a enrichi la médecine.

De Arthritis & calculo gemino, tractatus duo, unâ cum dissertatione philosophicâ de lapidum generatione. Hagæ Comitum, 1624, in-4°, avec le suivant :

Historia medica de vertigine, catarrho, tussu vehementi, abortu, &c. Amsterpæ, 1624, in-4°.

De morbis & symptomatibus popularibus Bredæ, tempore obfidionis, de quæ medicamentis in

summa rerum inopis adhibitis. Ibid., 1627, in-4°.

De officio medici præfidi & morbis ab arbo recuperatâ grassantibus Bredam, erroribus variis prædictorum & medicamentis tempore obfidionis in præfido pro militibus præscriptis. Bredæ, 1630, in-4°. (Extr. d'Eløy.) (R. Gessner.)

MYLABRES, f. plur. (Mat. méd.) Insectes vélicans des pays méridionaux, qui paroissent avoir été les cantharides des Anciens, & que l'on ramène encore aujourd'hui dans quelques pharmacies d'Italie. Les Napolitains surtout emploient le *mylabre de la chicorée*, soit seul, ou mêlé avec des cantharides, & les Chinois se servent comme d'un puissant vélicant, du *mylabre pulvé* d'Olivier, qui se trouve en assez grande abondance dans leur pays. (A. J. T.)

MYNSICHT (Adrien) (Biogr. médic.), docteur en médecine, comte Palatin, conseiller-médecin du duc de Mecklenbourg & de plusieurs autres princes, se distinguait par ses connoissances chimiques au commencement du dix-septième siècle. On a de lui un ouvrage qui a eu beaucoup de vogue, ainsi qu'on en peut juger par le nombre des éditions; mais il ne faut pas toujours se fier à ce que dit l'auteur sur les propriétés des médicaments dont il donne la manipulation. Voici le titre de cet ouvrage :

Armamentarium medico-chymicum, hoc est, selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio, qui in fine adjunctum est Testamentum Hadrunæum de aureo philosophorum lapide. Hamburgi, 1631, in-4°; Lubecæ, 1638, 1646, 1662, in-4°; Lugd., 1645, in-8°, &c. C'est à ce médecin que l'on doit le sel de duobus, ou sulfate de potasse, dont on fait encore aujourd'hui tant d'usage. (Extr. d'Eløy.) (R. Gessner.)

MYOCEPHALON. (Pathologie.) Premier degré du staphylôme, ainsi désigné à cette époque d'après son volume, que l'on a comparé à la tête d'une mouche. Cette tumeur est formée par une portion de l'iris qui se montre à travers la cornée entamée ou détruite dans quelques points, à la suite d'une ophtalmie très-grave, ou d'une plaie, ou d'un ulcère; c'est donc une espèce de hernie de l'iris. Plusieurs pratiques que les oculistes mettent en usage peuvent retarder la guérison, ou même s'y opposer. Cette maladie ne doit pas être traitée autrement que la procidence de l'iris. (Voyez PROCIDENCE DE L'IRIS.) (L. J. M.)

MYOCOLITIS. (Nosologie.) Nom dérivé du grec, par lequel quelques auteurs nosologistes ont désigné l'inflammation des muscles du bas-ventre. Vogel en a fait un genre particulier de maladies. Mais comme la fièvre inflammatoire, la tension & la douleur du ventre sont des symptômes communs à l'inflammation de plusieurs parties de cette capacité;

Kkk a

comme ils le rencontrent également, lorsque le péritoine, l'épiploon, le mésentère, &c., sont enflammés, comme il n'est pas aisé de distinguer précisément laquelle de ces parties est affectée, & que, d'ailleurs, dans tous ces cas, le traitement est absolument le même, Cullen a eu raison de réunir ces différentes espèces de maladies sous le genre de *péritonites*. Il seroit encore mieux de les décrire toutes sous le nom général d'*inflammations du bas-ventre*. (Voyez INFLAMMATION & INFLAMMATION DU BAS-VENTRE.) (PETIT-RADEL.)

MYODÉSOPSIE. (*Pathologie.*) Altération de la vue d'où résultent diverses impressions morbides, telles, que le malade croit voir des taches, des monches, des nuages diversément colorés qui le poursuivent sans cesse. Ce symptôme peut appartenir à plusieurs maladies différentes. (L. J. M.)

MYODYNIE (*Nosographie*), de *μύς*, muscle, & de *δύναμις*, douleur. Mot à mot, douleur des muscles; le symptôme le plus remarquable de leur inflammation, & que l'on a pris quelquefois pour cette inflammation elle-même. (Voyez FALGASIE.) (L. J. M.)

MYOGRAPHIE, MYOLOGIE. (Mot à mot, description des muscles.) (Voyez ces articles dans le *Dictionnaire d'Anatomie.*) (L. J. M.)

MYON (Saint-) (Eaux minérales de). C'est un village à deux lieues de Riom, où se trouvent plusieurs sources d'eaux minérales qui coulent au pied de l'éminence sur laquelle le village est situé. Raulin, dans son *Traité analytique des eaux minérales*, offre deux analyses de ces eaux par Collot & Dufour. Il compare les eaux de Saint-Myon avec celles de Selz, & les regarde comme stomachiques, tempérantes, diurétiques, diaphorétiques, vésicaires, antiscorbutiques & antipaludiques. Il indique la manière d'en faire usage. (MACQUART.)

MYOPE, MYOPIE (*Nosographie*), de verbe grec *μύω*, je ferme, & de *ὄψις*, œil. Etat des personnes qui ont la vue courte, & qui, pour voir les objets distinctement à une certaine distance, sont obligés de se servir de verres plus ou moins concaves.

La myopie résulte nécessairement de la réunion des rayons lumineux au-devant de la rétine, avant d'être rassemblés par cette membrane; ce qui peut dépendre du volume trop considérable de l'œil, d'une trop grande saillie de la cornée, de la position du cristallin, &c. &c.

La myopie, dépendante de ces causes locales & mécaniques, diminue ordinairement avec l'âge: on l'a vue disparaître quelquefois par l'extraction du cristallin. Les myopes qui font usage de verres concaves, doivent commencer par les numéros

les moins avancés, & s'attacher à placer toujours leurs lunettes à la même distance de l'œil.

Il existe une myopie qui dépend d'une augmentation de sécrétion dans l'humeur dite de Morgagni, qui tend plus ou moins la capsule du cristallin.

La myopie, comme toutes les infirmités ou infirmités constitutionnelles, appartient plutôt, pour les détails pratiques, à l'hygiène & aux arts hygiéniques, qu'à la médecine proprement dite. (L. J. M.)

MYOSIE, f. f., de *μύω*, je ferme. Contraction permanente de la prunelle dans les cataractes purulentes & dans l'atrophie de l'œil. Quelques oculistes l'ont appelée aussi *phthisis oculaire*.

(L. J. M.)

MYOSITIE, f. f. Nom donné par Sagar à l'inflammation des muscles. Il est synonyme de Myodynisme. (L. J. M.)

MYOSOTIS. *Myosotis*, de *μύω*, je ferme. Linnaë désigne sous ce nom un genre de plantes qui se trouve compris, d'après le système des familles naturelles, parmi les boraginées. Aucune espèce de ce genre n'est employée en médecine.

(L. J. M.)

MYOTILITÉ, f. f. (*Physiologie.*) M. le professeur Chaussier désigne sous ce nom une des propriétés vitales; la contractilité musculaire, ou la contractilité propre aux muscles.

La myotilité se manifeste dans son état naturel par des alternatives de relâchement ou de contraction & de relâchement, d'où résulte la locomotion. Ses divers états morbides sont l'atonie, la paralysie, l'impotence, la contraction permanente, la rétraction, la distension, le spasme, les convulsions. (Voy. MUSCLES.) (L. J. M.)

MYOTOMIE, de *μύς*, muscle, & de *τομή*, je coupe. Disséction des muscles. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie.*) (L. J. M.)

MYRACOPUM, de *μύρος*, fatigue. Espèce d'onguent dont les Grecs se servaient pour dissiper le sentiment d'une grande fatigue. (L. J. M.)

MYREPSUS (Nicolas). (*Biogr. médic.*) Myrepsus d'Alexandrie, collectionneur ou compilateur, qui vivoit dans le treizième siècle. On le place parmi les empiriques, dont il imita la polypharmacie, l'attention donnée aux circonstances les plus poétiques, les pratiques superstitieuses, & les précautions de donner des titres pompeux aux médicaments. Cet auteur est cependant remarquable, en cela qu'il est le premier écrivain grec qui ait décrit les préparations & les compositions médicales que les médecins de son temps mettoient en usage.

Sa compilation, qui formoit une espèce de

pharmacopée ou de dispensaire, fut traduite du grec en latin par Léonard Fuch, sous le titre d'*Opus medicamentorum in sectiones quadraginta octo digestum*. Les médecins de Salerne & les médecins arabes suivirent cette espèce de pharmacopée jusqu'au seizième siècle. Son travail appartient bien plus, du reste, à la médecine arabe qu'à la médecine grecque. Il faut le louer, cependant, suivant les remarques d'Ackermann, d'avoir eu le premier l'idée de prescrire des règles & des formules pour la préparation des médicaments.

(L. J. M.)

MYRE, ou mieux encore MIRE (*Histoire des Sciences médicales*), de *mirra*, parfum, suivant quelques-uns, ou, suivant quelques autres, du mot *ma-deri*, de la langue romane.

On désigna sous ce nom, & plus de trois cents ans avant les croisades, les personnes qui exerçoient quelques parties de la médecine, & dans une acception non moins étendue que celle du mot *surgeon* des Grecs & du mot *medicus* des Latins. Stimant M. le professeur Percy, qui a traité avec beaucoup de savoir & d'intérêt l'article Mira dans le *Dictionnaire des Sciences médicales*, l'étymologie latine est la seule que l'on doive admettre pour ce mot, qu'il ne faudroit pas alors écrire *myre*, mais *mire*, comme dans tous les anciens écrits, depuis le roman de *la Rose*, jusqu'au *Théâtre des Antiquités de Paris*, par Jacques Dubreuil.

Les mires, au temps de Charles VII, exerçoient, tant bien que mal, les différentes parties de la médecine, sans en excepter la pharmacie. On les a appelés quelquefois *cliniques* lorsqu'ils visitèrent les malades :

A donc fai demander & querre
Toz les bons *mev* de la terre,
Se aucuns peut voir s'orine
Ou par aucune médecine,
De l'altuaise ou du poison,
Li puisiez donner garison.

ALLAIN-CHARTIER, page 507.

Les médecins non mariés, & auxquels le concile de Latran, de 1215, défendit de visiter les malades & de se livrer à certaines parties de chirurgie & de la médecine des femmes, furent appelés *physiciens*, & ne purent se marier qu'en 1432, & d'après une ordonnance qui fut obtenue par le cardinal Deslouterville, à l'occasion de laquelle on s'est montré bien étranger à la connaissance des mœurs & des usages des anciens Français, à une époque rendue trop célèbre, par de vains débats & des discussions scandaleuses.

On prétendit alors, en effet ; que les mires ou chirurgiens devoient se renfermer dans certaines parties de la médecine, tandis que tous les ouvrages contemporains indiquent sous ce nom de *chirurgiens* les personnes qui exerçoient l'art de guérir dans son ensemble.

On disoit proverbialement après la mort le *mire* :
comme on disoit,

Qui veut la santé, du *mire*,
Il lui convient, tout son mal dire ;
Et ne s'avoye trouver mire
De ma de leur ne de mon ire.

Plus tard l'expression eut un sens moins étendu, & les *mirca*, ou *médecins-chirurgiens*, furent distingués des *médecins* ou *physiciens* ecclésiastiques.

Les mires devinrent *médecins vulgaires*, ou *chirurgiens*, & on leur attribua, dans les siècles de temps, plusieurs traits très-honorables.

Les mots *niege* & *meige* sont des altérations du mot *mire*.

Les deux *mm*, assez ordinairement ajoutés à la signature de Jean Pitard, d'Urbain, de Simon de Flore, &c., dans quelques fragments de manuscrits conservés à la Bibliothèque du Roi, signifient *meistre mire*, suivant la remarque de M. Percy.

Ces détails ne paroissent sans doute superflus ou déplacés qu'aux lecteurs assez peu instruits pour ignorer, que ce qui concerne la police de la médecine, & l'existence civile de ceux qui l'ont exercée, est une partie de son histoire, aussi essentielle qu'importante. (L. J. M.)

MYRICA, *cerifera*. (*Mat. médic.*) La racine de cette plante, qui appartient aux *amentacées*, est employée en infusion dans l'Amérique, soit pour arrêter quelques hémorragies passives de l'utérus, soit dans le traitement de plusieurs hydropisies qui ont succédé à des fièvres intermittentes. L'huile fixe, qui se trouve dans plusieurs *amentacées*, & que l'on dégage par la simple pression, s'écoule au dehors de la graine dans le *myrica*, & s'y concrète sous la forme de cire végétale. (L. J. M.)

MYRISTICA. (Voyez MYRISTICÉES.)

MYRISTICÉES. Les propriétés des myristicées ont beaucoup de rapport avec celles des *laurinées* ; leurs diverses espèces ne diffèrent du muscadier aromatique que par la quantité ou la fixité de leur huile volatile. Le *spermodermis*, ou l'enveloppe de la graine, présente dans le macis un mélange d'huile fixe & d'huile volatile. Dans le *sirola sebifera* de la même famille, le persifforme fournit un véritable suif que l'on en extrait par l'immersion dans l'eau chaude. (L. J. M.)

MYRMÈCE. Espèce de vermine, qui croît aux mains & à la plante des pieds, suivant Celsus. (Voyez VERREUX.) (A. J. T.)

MYROBOLAN, ou MIROBOLAN, f. m. (*Mat. médic.*) Mot à mot, & d'après l'étymologie grecque, gland ou fruit propre à faire des onguents.

La famille des euphorbes & le genre *myrobolans* de Gaëtier renferment les cinq espèces de plantes dont les fruits sont appelés *myrobolans* ; savoir, 1°. le *myrobolan emblic*, 2°. le *myrobolan belleric*, 3°. le *myrobolan chébulé*, 4°. le *myrobolan noir* ou de l'Inde, 5°. le *myrobolan citrin*.

Le *myrobolan emblic*, qui appartient à la famille des euphorbes, est employé par les Indiens, dans quelques préparations médicinales.

Les différentes espèces de *myrobolans* furent regardées par les Arabes comme des purgatifs doux, quoiqu'elles aient une propriété astringente assez marquée.

On emploie les *myrobolans* comme purgatifs, à la dose de deux à quatre gros en substance, & d'une once en décoction; on en fait des espèces de confitures & de condiments dans l'Inde.

Actuellement connu comme médicament, dont Mésué exagéra sans doute les propriétés & les avantages. On éprouveroit peut-être quelques difficultés aujourd'hui pour le procurer, dans la plupart des pharmacies, un échantillon de *myrobolans*.

(L. J. M.)

MYROXILON. (*Mat. méd.*) On a rapporté cette plante à la famille des légumineuses, ce qui seroit pour cette famille une sorte d'anomalie par le suc que l'on retire du *myroxilon*. La baume du Pérou seroit produit par cette plante, suivant Mutis. (Voyez Pérou (Baume du).) (L. J. M.)

MYRRHIE, f. f. Myrrha. (*Mat. méd.*) Gomme-résine que le commerce tire de l'Arabie, & qui est produite par un arbre que Nibuchi rapporte, mais seulement par conjecture, à la famille des Nymphaeacées. On trouve dans le *Bulletin de Pharmacie*, t. IV, pag. 64, une très-bonne analyse chimique de la myrrhine.

Cette substance n'est plus guère employée aujourd'hui que pour la confection de certaines préparations très-composées, tels que la thériaque, l'orviétan, le mithridate, la confection d'hyacinthe, l'elixir de propriété de Paracelse, les pilules de cynoglossé.

La myrrhine possède cependant une vertu assez efficace dans tous les cas où il importe de donner un peu plus de consistance ou de force aux organes, & plus particulièrement encore dans les circonstances où l'on veut réprimer des sécrétions morbides trop abondantes (l'expectoration habituelle, la diarrhée atonique, les fleurs blanches). L'expérience de celui qui trace rapidement cet article lui a appris que, dans ce dernier cas, déchargé de toute complication inflammatoire, nul médicament n'est préférable à la myrrhine, soit qu'on la donne seule, soit qu'on la combine avec le carbonate de fer, l'extract de quinquina, la valériane, la rhubarbe torréfiée, suivant une foule d'indications particulières que les détails d'une grande expérience font reconnoître.

Les chirurgiens modernes ont abandonné la teinture de myrrhine, qui fut très-employée dans l'enfance de la chirurgie. Nous ne savons plus guère aujourd'hui ce que peut avoir été le fameux *vin de myrrhine* des Anciens; nous connoissons mieux, mais sans y attacher aucune importance, l'usage de la myrrhine employée comme malicatoire par les Egyptiens. (Voyez dans le *Bulletin des Sciences médicales*, 1810, la Notice de M. Rouyer, sur les médicaments des Egyptiens.) La myrrhine a été employée en fumigation, mais on doit lui préférer, sous cette forme, le goudron, qui produit, en évaporation, des effluves très-efficaces dans le traitement du catarrhe pulmonaire, spécialement par une sécrétion muqueuse dont l'abondance peut entraîner le dépérissement & la consomption.

On prescrit la myrrhine à la dose de quatre à six grains, soit sous forme de pilules, soit sous la forme d'opiat, soit enfin suspendue, comme le mûsc, dans une quantité d'eau suffisante. On donne l'extract de myrrhine à une dose un peu plus forte : son action primitive paroit se développer dans l'estomac; elle contribue ensuite, & d'une manière sympathique, à fortifier & à ramener à leur mode habituel d'action plusieurs autres organes, & principalement le vagin, l'utérus, la membrane muqueuse des voies pulmonaires; &c.

(L. J. M.)

MYRTE, myrtus. (*Mat. méd.*) Servant de type pour la famille des myrtées, qui contiennent environ cinquante espèces propres aux climats chauds.

Dioscoride & Pline ont accordé aux myrtées des propriétés que l'expérience n'a pas confirmées, & de telle sorte que le vin, l'huile, l'extract, l'hydromel de myrte, sont oubliés depuis long-temps.

L'huile de myrte & la *poignée de la comtesse*, sont des cosmétiques très-peu efficaces, & que l'on a employés long-temps sans succès avec des vues, que la dignité de cet ouvrage ne nous permet pas de rappeler.

On doit au myrte piment, *myrtus pimenta*, un condiment connu sous le nom de *safran-épice*, ou de *poivre de la Jamaïque*, qui est en usage en Angleterre. La pharmacopée de Londres a même admis comme médicament l'eau distillée de cette espèce de myrte.

On emploie, au Pérou, la décoction des racines du myrte musqué & du *myrtus luma*, dans le traitement de la dysenterie. (L. J. M.)

MYRTA (Feuille de). Espèce de spatule que l'on emploie pour étendre les onguents, & qui peut, au besoin, servir à d'autres usages dans la pratique de la médecine & de la chirurgie. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Chirurgie*.)

(A. J. T.)

MYRTÉES, ou MYRTINÉES. (*Mat. méd.*) Famille naturelle, qui contient un grand nombre de

plantes qui ont été célébrées par les poètes dans tous les temps, & chez tous les peuples. M. de Candel rapporte à deux titres les propriétés des myrtilées ; savoir, celles qui dépendent d'une huile volatile, celles qui ont leur source dans un principe astringent. » L'huile volatile, dit ce savant botaniste, se trouve dans de petites vésicules qui existent dans toute la partie corallée, & qu'on aperçoit dans les feuilles par leur transparence ; lorsqu'on l'extrait pure, comme on le fait pour l'huile de Cayepot, extraite du *melaleuca Cayeputi*, & peut-être aussi du *melaleuca leucadendron*, & de quelques espèces voisines ; pour l'huile de gérolle, que l'on retire des calices du gérolier avant l'épanouissement des fleurs ; pour l'huile de myrte, qu'on extrait de la baie, mais qui est peu employée, &c. ; lors, dis-je, qu'on obtient par l'huile volatile des myrtilées, on la trouve très-aromatique, non peu acre, presque caustique, & à un moindre degré de force tonique, & stimulante pour la fibre musculaire ; & même antispasmodique. C'est à la présente, en quantité plus ou moins considérable, de cette huile volatile, que diverses myrtilées doivent leur odeur & leur saveur ; tels sont, par exemple, les clous de gérolle, qui, d'après l'analyse de M. Tromsdorf, en contiennent $\frac{1}{10}$ de leur poids, & qui deviennent presque insipides lorsqu'on les en a dépourvus.

» Le principe astringent existe surtout dans l'écorce de la racine & des fruits après leur maturité ; mais on le retrouve dans l'écorce de la plante entière. Tout le monde l'a senti dans l'écorce de la grenade : nous le retrouvons dans le *myrtus ugni* & le *myrtus luma*, de Molina, & dont les racines donnent une décoction employée au Pérou contre la dysenterie ; dans l'*eugenia mallaccensis* L., dont l'écorce offre le même secours aux Indiens ; dans la résine extraite à la Nouvelle-Hollande ; de l'*eucalyptus resinifera*, & qui a été souvent confondue avec plusieurs autres produits étrangers, sous le nom très-impropre de *gomme kino*. » Nous le retrouvons surtout dans les fruits de toutes les myrtilées, qui sont astringents & acerbés avant leur maturité. Lorsque le parenchyme de ces fruits prend de l'accroissement, & que la matière sucrée s'y développe, alors le

léger principe astringent & le léger arôme qui s'y trouvent réunis, les rendent agréables au goût. » Ainsi les fruits du grenadier, du jamboyer, de l'*eugenia jambolana* Lam., du *physidium pyramicum* & du *P. pomiferum*, tirent leur principal mérite de la légère astringence mêlée au mucilage de leurs fruits, tandis que le *myrtus ugni*, & le *myrtus pimenta*, & probablement l'*akangium decapetalum*, doivent leur réputation à l'arôme de leurs baies.

» Les feuilles de plusieurs plantes de cette famille font employées en guise de thé ; & ici on a surtout recherché l'arôme que l'astringence ; & tels sont le *myrtus ugni*, le *leptospermum scoparium*, &c.

» La seule anomalie que présente la famille des myrtilées, est la propriété du purgatif hydragogue, attribuée par les Malais aux *alangium decapetalum* & *A. hexapetalum* de Lamarek ; encore ces racines offrent-elles le même arôme que les autres myrtilées, mais probablement elles sont dépourvues de principe astringent de Candel, & *Propriétés médicales des plantes*.)

(L. J. M.)

MYRTIFORME (Caroncule), adject. Les caroncules myrtiformes ne font point, comme on le répète dans un grand nombre d'ouvrages d'anatomie, les débris de la membrane hymen, mais une excroissance qui augmente avec l'âge.

On a aussi appelé myrtiforme une portion du muscle labial, dont on faisoit un abaisseur particulier de l'aile du nez. (Voyez ces mots dans le Dictionnaire d'Anatomie de l'Encyclopédie.)

(L. J. M.)

MYURE (Poule), adject., de *mus*, rat, & de *ure*, queue. Galien parait avoir désigné le premier sous ce nom, le *poulet*, qui déroit indistinctement, & qu'il comparoit, sous ce rapport, à la queue d'un rat. (L. J. M.)

MYXA. Dénomination sous laquelle les Anciens désignaient le mucus qui descend des sinus frontaux. (L. J. M.)

MYXOSARCOME. Dénomination sous laquelle Marc Aurèle Severin parait avoir désigné une variété particulière du sarcome. (L. J. M.)

N. Abréviation du mot *nombre* dans les formules médicales très-régulières, comme dans la suivante :

℞. Tartre stibié..... grains N. ij.
(L. J. M.)

NABOTH (Martin) (*Biographie médicale*). est connu par sa Dissertation sur la stérilité des femmes (*de mulierum sterilitate*), Leipzig, 1707, dans laquelle il voulait substituer les vésicules qui il avoit aperçues au col de l'utérus de la femme du cerf, aux fœctions attribuées aux ovaires.

Naboth a aussi publié une Dissertation sur l'organe de l'ouïe (*de organo auditus*, Leipzig, 1763), sur laquelle l'étoile de Haller s'est arrêtée.

(L. J. M.)

NACRE DE PERLE. (*Matière médicale*). Substance calcaire provenant du coquillage appelé le *mytilus margaritifera*, L.; elle étoit employée autrefois dans l'emplâtre *stiptique*, & dans la poudre *pectorale*; elle est tout-à-fait tombée en désuétude aujourd'hui. (L. J. M.)

NACRÉE, adjectif. (Ichtyose nacrée.) (*Pathologie*). La nacrée ne peut être regardée comme une variété de l'ichtyose, qui attaque le plus souvent les pêcheurs. Ce genre de maladie n'ayant pas été indiqué à son article, nous demandons qu'il nous soit permis d'en faire ici le sujet de quelques observations.

M. le professeur Alibert désigne sous le nom d'*ichthyose*, dans la description des *maladies de la peau*, diverses altérations de cet organe, caractérisées par des écailles rouges & blanches, superposées à peu près comme des écailles de poisson. Cette lésion paraît souvent congénitale : la couleur des écailles varie du brun au blanc nacré; elles sont entourées d'une aréole violacée ou roseâtre, chez les nateurs de quelques contrées de l'Asie, mais surtout de l'île de Taïti.

On a remarqué que cette maladie étoit plus commune sur le littoral de la mer ou des grands fleuves, & chez les ichthyophages. On a regardé, dans la suite, comme une ichtyose, l'espèce de monstruosité ou de lésion, qui a fait donner le nom d'*hommes porcs-épics*, à certains individus qui se montraient au public comme un objet de curiosité, & dont la peau étoit recouverte d'éminences dures, saillantes, & assez élastiques pour produire une espèce de bruit lorsqu'on les touchait rapidement avec la main. Edward Lambert, qui l'on montra à Londres, présentait aux curieux cette singularité pathologique, qui paroît s'être

transmise d'une manière héréditaire dans sa famille. Ces excroissances écailleuses, qui ont sans doute beaucoup d'analogie avec la norme & les ongles, se régénèrent comme ces parties lorsqu'on les coupe, & lors même qu'elles tombent spontanément.

Sans forcer les rapprochemens, on peut sans doute regarder l'ichtyose comme un mode de lésion analogue aux végétations cornées & accidentelles que l'on a quelquefois observées chez les personnes très-âgées (1).

M. Alibert a voulu rapporter aussi au même genre de maladie, la pelagre des Milanais; dont nous aurons occasion de parler dans un autre article.

Les ichthyoses se présentent sous un grand nombre de formes, & dans certains cas, assez rares à la vérité, les diverses excroissances qui les caractérisent, acquièrent une consistance cornée qui leur donne l'apparence de tubérosités ou de pointes. Les frères Lambert, descendans de Lambert que l'on montrait à Londres, & dont nous avons parlé, & qui parurent à Paris en 1803, présentaient dans tout son développement, ce mode singulier d'altération. La situation du chef de cette famille avoit été décrite en 1752, dans les *Transjactions philosophiques*, par Jean Machin, qui ajouta une gravure à la Notice, dont les détails étoient entièrement opposés aux récits fabuleux du condoleur des frères Lambert qui nous occupent dans ce moment.

Du reste, il paroît d'ailleurs démontré que cette espèce d'infirmité s'est propagée héréditairement dans cette famille, en ligne masculine, d'une manière exclusive. L'aîné des frères Lambert avoit paru rachitique dans son enfance; tout le corps des frères Lambert, excepté la face, la paume des deux mains & la plante des deux pieds, les intervalles des doigts & leurs extrémités, étoit couvert d'excroissances; & dans toutes les parties où les écailles étoient nombreuses, on apercevoit à peine quelques poils.

Les écailles placées vers l'extrémité de la jambe, sur le dos, sur les mains, sur les pieds, étoient beaucoup plus considérables. Il y avoit une espèce de mue périodique aux équinoxes de l'hiver & du printemps, phénomène qui cessa chez Lambert le père, vers l'âge de quarante ans. Lorsque les excroissances sont tombées, après cette mue, elles se reproduisent ordinairement dans l'espace d'un mois : on peut les couper dans plusieurs directions

(1) Voyez à ce sujet une observation curieuse de Gualtier, insérée dans les *Mémoires de l'Académie royale de médecine*.

sant produire aucune douleur. En France, M. Alibert, auquel nous empruntons ces détails; en Allemagne, M. Tiléus, & en Italie, M. Buniva, ont donné beaucoup d'attention à l'exagération des ichtyoses, ce qui a fait nommer hommes *porc-épics*, les individus extraordinaires qui en présentent des exemples.

On a, du reste, désigné sous le nom d'*ichtyose cornée*, ce développement congénial & constitutionnel d'écaillés nombreuses & saillantes. L'ichtyose sacrée n'offre pas la même saillie, & paraît plus commune chez les individus d'une complexion scrophuleuse & scorbutique: elle a le point d'analogie avec la lèpre, & le hème, comme les autres ichtyoses, à une formation vésiculeuse & surabondante de l'épiderme, dont le développement produit quelquefois une tuméfaction des membres, monstrueuse & gigantesque. On a observé quelquefois une ichtyose sacrée serpentine, & la suite de la petite-vérole, ou sous l'influence d'une disposition scrophuleuse.

M. Alibert cite l'exemple d'une ichtyose périodique, qui n'alloit que le côté droit, & qui se manifestait au printemps. Les plus occasionnelles, cette altération morbide est endémique, si toutefois on en excepte l'ichtyose cornée, qui se voit chez les castes, qui ne nous sont pas bien connues. Il seroit superflu de rappeler ici toutes les hypothèses dont on a fait usage pour expliquer la formation des ichtyoses.

Les ichtyoses auxquelles nous avons eu doges quelque attention ne doivent être regardées, d'ailleurs, que comme une maladie plus curieuse par la singularité de ses phénomènes, qu'importante à connaître sous le point de vue des indications curatives & toutefois, si l'on étoit consulté dans une longue pratique sur une altération morbide sensible, qu'il lui occurreroit de tracer un mode de traitement, on indiqueroit les changements les plus favorables dans le régime, le déplacement d'un lieu humide ou froid, dans un milieu plus élevé & plus chaud, l'emploi des bains, ou les bains profonds ou prolongés, que l'on désigne sous le nom d'*antiscorbutiques*, les bains chauds, les bains hydropathiques, &c. &c.

Pour ajouter à l'intérêt de cet article, que nous avons réduit autant qu'il a été possible, nous croyons devoir l'enrichir de l'observation suivante, tirée du *Journal complémentaire des Sciences médicales*.

Alfred Fuges, âgé de dix-huit ans & demi, né aux environs de Paris de cultivateurs aisés, fut admis pendant quelques mois à l'hôpital St-Louis. Ce jeune infirmier, dont les parents sont très-sains, & qui a eu deux frères exempts de toute espèce de maladie de peau, avoit le front recouvert d'écaillés jaunes, rugueuses, d'une couleur grisâtre, formées de couches superposées, beaucoup plus nombreuses aux aines, sous les aisselles, & dans les jarrets que partout ailleurs; mais il n'é-

Mémoires. Tome X.

voit aucune partie du corps qui n'en fût dépourvue, à l'exception de la figure, de la paume des mains & de la plante des pieds; encore ces places ne se font-elles nettoier que depuis un an à peu près. Son corps ressemble assez au tronc des vieux chênes, dont l'écorce se détache par petits fragmens. Fuges a vu le jour avant le neuvième mois de la grossesse, comme si la nature avoit voulu se hâter de le soustraire aux influences qui, dans le sein même de la mère, lui prépareroient une existence malheureuse. Du reste, ce ne fut que quelques semaines après sa naissance qu'on remarqua les premiers symptômes de la maladie qui le rend aujourd'hui un véritable sujet de curiosité pour les naturalistes, & d'étonnement, je dirai presque d'effroi, pour les gens du monde.

Les premiers soins lui furent donnés par un médecin de Liancourt, auquel il avoit été présenté par M. le duc de Laroche-neault, dont la philanthropie sert de modèle à tous ceux qui s'occupent du bonheur des hommes. Chez cet enfant, les fonctions des viscères abdominaux & thoraciques ne sont pas sensiblement troublées, mais les membres sont grêles & les forces languissantes. Le malade est assez grand pour son âge, mais il est fort mince; ses facultés intellectuelles ne sont pas des plus fortes, mais il est mou, indolent, & toujours morose, taciturne. Trois de ses sens sont plus ou moins affaiblis: l'ouïe, le toucher & l'odorat. On lui donne des douches, on lui fait prendre des bains, on lui administre à l'intérieur des poudres purgatives, du goudron. (*Voyez Op. cit., tom. V, pag. 323.*) (L. J. M.)

NATHAN D'WYCK (Pierre Yan) (*Biogr. médic.*), médecin hollandais du dix-septième siècle, qui parut être spécialement occupé de l'art vétérinaire. Nous avons de lui un ouvrage d'hippiatrique, imprimé à Leyde en 1631, & qu'il publia sous ce titre:

Libri duo Philippicorum, sive, de Equorum natura, educatione, educatione, disciplina & curatione. 10-8. (A. J. T.)

NAERSEN ou NASSER (Jean) (*Biograph. médic.*), médecin Dordrecht, le 11 novembre 1580. Ses humanités & la philosophie terminées, Naerssen fut reçu au collège théologique des Etats de Hollande, & Lejde, & les progrès qu'il y fit lui méritèrent l'an 1605, la place de ministre à Grave-sur-Meuse (emploi honorable, qu'il fut obligé d'abandonner quelques années après: ce qui le déterminait à passer en France pour aller étudier la médecine à Caen. Naerssen passa de là à Hambourg, où il obtint la permission d'exercer sa profession; il fit ensuite plusieurs voyages en Allemagne, parcourut la Saxe, la Prusse, la Pologne, la Moldavie, & retourna à Stockholm, où il fut plus heureux. Le roi Gustave-Adolphe honora en effet du titre de son médecin, & le fit son historiographe. A la

— 441

mort de ce prince, qui eut lieu en 1632, Naerffen retourna en Hollande, d'où il fut envoyé aux Indes orientales, avec le titre de médecin de la Compagnie hollandaise. Deux ans après il mourut à Batavia.

Naerffen, que l'on peut mettre au nombre des médecins poètes, ne nous a laissé qu'un assez grand nombre de poésies : quelques-uns de ses recueils sont en flamand, les autres en allemand, & la plupart des vers qu'il a faits à la louange de Gustave sont en latin. (*Extr. d'Elag.*)

(A. J. T.)

NEYIAN (*Biographie médicale*), auteur d'un traité ayant pour titre : *De curindis morbis*, in-8°, Gaudav., 1775-1775. (L. J. M.)

NÆVIUS (Gaspard). (*Biographie médicale*) Nævius, de Chemnitz en Saxe, manifesta de bonne heure un goût particulier pour la médecine. Il suivit pendant long-temps les plus célèbres professeurs d'Italie, & très-jeune encore il obtint une chaire dans les écoles de l'université de Leipsick : Gaspard Nævius fut honoré du titre de médecin consultant, des électeurs de Saxe, Maurice & Auguste : son frère aîné avoit rempli avec honneur. Ce médecin qui mourut en 1579, à l'âge de soixante-cinq ans, nous a laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels on remarque des *Consultations de médecine* (1), deux Lettres adressées à Matthiæ, l'une sur quelques plantes, l'autre sur une fesse bleue, & un mémoire ayant pour titre :

De natione alterandi humores per medicamenta ad purgandum, obsequio cornidei executionis tempore. Lipsie, 1551, in-4°.

(A. J. T.)

Nævus (Jean), frère aîné du précédent, également de Chemnitz, étudia la médecine en Italie, où il fut reçu docteur en 1725. Après avoir exercé la médecine pendant quelque temps en Saxe & en Bohême, les électeurs Maurice & Auguste l'attachèrent à leur maison, comme médecin particulier : l'empereur Ferdinand l'honora de sa venue deux fois à Vienne, pour le consulter sur la santé ; son honneur justifié, & que lui avoit attirée la grande réputation dont il jouissoit en Allemagne. Pierre-André Matthiæ, dont Nævus avoit gagné l'amitié, pendant son séjour en Italie, en perdit comme d'un médecin d'un rare mérite : Jean Nævus mourut en 1574 : nous avons de lui plusieurs recueils de consultations, parmi lesquels on en trouve une qui mérite surtout d'être consultée ; elle a pour titre :

Medicamenta contra pestem pro republica Dresdensi. (*Extrait d'Elag.*) (A. J. T.)

(1) Voyez le Recueil de Bruchmann.

NÆVUS. *Maternus*. (*Pathologie*.) *Signe, en-vie*. On a fait usage de ce nom, en médecine, d'après l'opinion populaire, qui attribue à l'imagination de la mère, les taches & les altérations extérieures du corps, que l'on désigne vulgairement, sous la dénomination d'*envers*. (Voyez *Monstr.*) (L. J. M.)

NAGATES, pl. m. (*Histoire médicale*.) Nom que les habitants de l'île de Ceylan donnent à leurs astrologues, espèces de jongleurs & de charlatans, qui se vantent de prédire l'avenir, par la seule inspection des astres. (A. J. T.)

NAGEUR, adject. Celui qui nage & qui fait nager. (Voyez *NATATION*.)

NAGEUR, adject. (*Hygiène*.) Plusieurs personnes se livrent souvent à l'exercice de la natation, sans que l'on puisse dire que cet exercice soit pour elles l'habitude d'une profession particulière. Les effets morbides, qui résultent dans quelques cas de la natation, ne doivent donc pas être rapportés aux maladies des professions. Ces effets se rapportent à trois causes différentes : 1°. à la différence du milieu, 2°. à la température ; 3°. aux différentes espèces de mouvements, suivant la nature des muscles qui sont employés pour la natation.

Certaines causes purement accidentelles peuvent également occasionner plusieurs maladies, pendant la nage, mais surtout des contusions, plus ou moins violentes.

Les muscles qui sont le plus employés dans l'exercice de la natation, sont ceux des épaules, des lombes, des cuisses & des bras. Un exercice inusité ou immodéré de la natation, occasionne souvent une forte courbature de tous les muscles, & plus souvent encore diverses contusions dont l'impression subite a fait périr plusieurs fois les nageurs les plus habiles. (Voyez *NATATION*.)

(L. J. M.)

NAGRUS (Dominique) (*Biographie médicale*), publia à Rome, en 1671, une dissertation sur le café, dont l'usage s'étoit récemment établi en Italie ; *Virtu del caffè, & rapida introduzione nuovamente nell'Italia*. Rome, 1671. (L. J. M.)

NAIN, f. m. & adject. *nanus*; *pumilio*, *pumilus*, de *nans* & de *nans*, agneau, ou servant quelques personnes, dérivé de *nans*, faible, désole, dénué.

Si les naturalistes modernes ont fait apprécier à leur valeur les sables & les lisières interlongères que les Anciens nous ont transmises sur les nains & les pygmées, & que des voyageurs trop peu véridiques ont voulu renouveler pour donner plus d'intérêt à leurs récits, les travaux des physiologistes n'ont pas encore été beaucoup de servir sur la cause de cette prétendue variété de l'espèce humaine.

Il est bien reconnu aujourd'hui que les nains ne forment pas une variété de l'espèce humaine, & bien moins encore une race distincte. Cet état de nain est une maladie, & non un phénomène produit par l'exercice régulier des fonctions.

Il est sans doute de grandes différences dans la structure des hommes des diverses nations, & quoique la hauteur de la taille ait souvent servi de caractère pour distinguer les races humaines, cependant jamais les différences dans la stature n'ont été assez grandes, pour constituer d'une part des nations de géants, & d'une autre part des peuples nains. Nous savons ce qu'il faut penser de la haute taille des Patagons, & de la petitesse des Samoïdes, des Groënlandais & des Kamtschadales. Les premiers ne sont pas des géants & les derniers ne sont pas des nains. Tout ce qu'ont dit Athénée & Pline l'ancien des pygmées & des spiritamiens, prouve que ces deux auteurs parloient plus d'après des ouï-dire, que d'après leurs propres observations. Strabon, dont l'esprit étoit sévère, dit qu'on a pu admettre l'existence des pygmées, par l'idée qu'on se faisoit de l'action des degrés extrêmes de la température en chaud ou en froid, mais que personne ne peut affirmer avoir vu des pygmées.

L'organisation a des phases bien distinctes pour l'apparition & le mode de développement des organes. Ces époques les plus souvent régulières dans toutes les espèces, présentent pourtant des différences, & dans quelques cas l'ordre est totalement interverti. L'évolution organique offre alors, tantôt une activité plus grande, une succession plus rapide dans les développements individuels des organes, & tantôt une lenteur, un retard ou même une cessation entière, soit partielle ou générale dans l'économie animale. L'évolution organique des animaux a déjà fait le sujet des recherches & des méditations de plusieurs médecins, qui ont retiré de cette étude de nombreux avantages ; mais leurs travaux laissent beaucoup à désirer, & cette partie de la zoologie appelle encore l'attention des médecins & des naturalistes.

J'attribue à un dérangement dans l'évolution organique, la production des nains, & je place cet état de non-développement ou de développement entravé, parmi les maladies qui se donnent *dérangements organiques*. (Voyez le mot *Oscartique* de ce Dictionnaire.) C'est dans cette même classe & dans le même ordre que je fais entrer les vices d'organisation, appelés communément *monstrosités*. Les nains & les géants doivent être placés à côté des idiots de naissance, des crétins, des albinos, &c. &c. La taille des nains varie depuis seize jusqu'à quarante pouces ; leur poids est de vingt à quarante livres. Leur tête est grosse, le tronc mal fait, le plus souvent rachitique. Les nains ont le plus communément l'esprit stupide, & la plupart sont idiots. Leur pouls bat environ cent fois par minute. Vifs, agiles, jaloux, coquets, inconstants, ils offrent au moral comme

au physique de nombreuses analogies avec les enfants, si nous en exceptons ce qui est relatif à l'intelligence. Ils dorment aussi beaucoup, & c'est encore un de leurs rapports avec les enfants.

La preuve que l'évolution organique est en retard chez les nains, s'est qu'on a vu la première dentition ne s'effectuer chez eux que bien plus tard que chez les enfants bien conformés. Il existe des exemples où les dents n'étoient pas encore hors des alvéoles, quoique les sujets eussent deux ou trois ans.

Les nains sont stériles ; cependant ils peuvent se livrer au coït, & ils s'y livrent quelquefois avec excès ; comme chez les sujets imputables, cet acte produit sur eux un effet très-pernicieux.

C'est une erreur de croire que les nains font de très-avortons, c'est-à-dire, des enfants nés bien avant le terme ordinaire de la grossesse.

Les parents des nains ont toujours été des personnes d'une taille moyenne, ou d'une stature bien supérieure à celle du nain qu'ils ont produit. La longévité des nains ne dépasse guère trente ans ; quelques-uns sont arrivés jusqu'à quarante ans, mais ils sont morts avec tous les caractères de la caducité la plus prononcée.

Voyez, pour d'autres détails, l'article *Oscartique* (*Dérangements organiques*).

(J. BAZZECET.)

NAISSANCE. (*Anatomie & Physiologie.*) On désigne sous le nom de *naissance*, le passage de la vie intra-utérine, ou de la vie végétative d'embryon & de fœtus, à la vie extra-utérine, ou vie animale.

La naissance naturelle ou à terme, correspond pour l'espèce humaine, à la neuvième, ou dixième époque menstruelle, d'une manière nécessaire & par un concours, une succession de phénomènes qui s'établissent même dans le cas d'un fœtus mort, ou d'une grossesse extra-utérine.

On s'accorde ainsi à penser, d'une manière générale, que la naissance a terme arrive à sept mois pour l'homme, comme elle survient à cinq pour le cheval & l'âne, à neuf pour le bœuf, à huit pour le cerf, à cinq pour les bœufs & les chèvres, à tous les jours pour le chien, & à treize pour les lapins & les lièvres. Nous verrons incessamment que ce terme n'est pas de rigueur, même pour des animaux : les conditions de l'expulsion de l'utérus pour expulser le fœtus, pouvant éprouver différentes modifications. (Voyez *Accouchement*, *Médecine légale*, *Naissances précoces* & *Naissances tardives*, *Part.*)

La naissance oaire, pour l'homme & pour les autres mammifères, le cercle d'une nouvelle existence : elle doit être distinguée avec soin de l'accouchement qui la précède, & dont tous les phénomènes appartiennent à l'utérus. La naissance qui se manifeste par les premiers efforts du fœtus pour respirer, n'est complète qu'après la section

du cordon ombilical. L'effort pour respirer alien, même avant la fin de l'accouchement, lorsque les communications qui unissent l'enfant à la mère, sont accidentellement, ou prématurément rompus ou gênées : circonstances importantes, que les expériences de M. Bérclard ont fait connaître (1), & qui expliquent par une détermination primitive ou innée, les premiers efforts pour respirer, quel que soit d'ailleurs le milieu dans lequel le fœtus se trouve placé, soit qu'il fasse parvenir de l'air, ou qu'il attire de l'eau dans ses bronches. (Voyez les *Bulletins de la Faculté de Médecine de Paris*, tome III, page 476.)

Ces efforts, sur le véritable caractère desquels, le savant que nous venons de citer, a appelé le premier ou l'un des premiers l'attention des physiologistes, pourroient être regardés comme le premier phénomène de la naissance, & le résultat des expériences qu'il les ont fait connaître, se rattache nécessairement, dans plusieurs circonstances, à des questions médico-légales très-importantes (2).

D'après ce premier aperçu, il est évident que la naissance ne doit pas être confondue avec l'accouchement : elle ne commence même qu'au moment où ce dernier est achevé, ou lorsqu'il se termine ; elle s'en trouve tout-à-fait indépendante, pour les animaux, dont les femelles n'ont pas d'utérus. Du reste, dans l'homme & chez les mammifères, la naissance est une suite nécessaire, une conséquence rigoureuse de l'expulsion du fœtus : lorsqu'un corps étranger pour la matrice, cette dernière commence & poursuit naturellement une suite d'efforts pour l'expulser. Le fœtus, dans cette opération, est entièrement passif, & est entraîné par son poids, ses efforts pour sortir, afin de respirer, ou d'évacuer le méconium, le décollement du placenta, & plusieurs autres circonstances que l'on a crues, pour expliquer l'accouchement, ne pourroient être considérées sous ce rapport, que dans l'imagination des faiseurs de théories.

Une observation plus attentive, plus détaillée, ne permet pas d'admettre ces vaines explications, & fait trouver la cause très-simple, très-naturelle de l'accouchement, dans le mode d'union & dans la structure de l'utérus qui, comme tous les organes creux & musculaires, se tend & se contracte, le corps renfermé dans sa cavité, les fibres qui le revêtent éprouvent un certain étranglement.

La même observation fait connaître aussi les

causes particulières qui, à l'époque accoutumée de l'accouchement, plutôt que dans un autre temps, sollicitent & déterminent la contraction de l'utérus.

Ces causes particulières qui sont inhérentes à la matrice, qui s'y trouvent dans tous les temps de la grossesse, ne se développent, ne deviennent ordinairement actives dans leur ordre naturel, qu'à la fin du neuvième mois ; époque à laquelle l'expansion graduelle de l'utérus, s'étant faite par son fond, par son corps & par son col, ce dernier diminue peu à peu de longueur, s'amincit, présente peu de résistance, & se dispose à céder aux contractions de l'utérus. (Voyez *Ans. Petit, Mémoires sur le mécanisme de l'accouchement, Recueil de pièces sur les naissances tardives.*)

Des changements intérieurs se font opérés en même temps dans cet organe ; il s'y est fait une nutrition plus abondante, & un nouveau genre de ténacité ; les vasa du même organe sont développés, la sensibilité a augmenté, tandis que la contractilité est devenue plus grande, par l'état des fibres qui ont acquis le caractère & les propriétés musculaires d'une autre part, le placenta, n'admettant plus avec la même facilité le sang apporté par les artères ombilicales, il résulte de cette manière d'être, plusieurs du placenta, pléthore du fœtus & de la matrice, & de là un degré d'engorgement, de stimulation, suffisant pour exciter la première contraction utérine. Cette contraction cesse, à la vérité, lorsque le sang a repris son cours, on s'est répandu dans les vaisseaux collatéraux ; mais la même cause de pléthore subsistant, l'engorgement sanguin se renouvelle, & avec lui les contractions, qui deviennent toujours plus fortes & plus fréquentes, & se manifestent encore même après l'expulsion du fœtus, pour opérer le resserrement des parois de la matrice, & ramener l'organe à son état primitif.

Il ne sera pas inutile de remarquer, pour appuyer ou pour étendre cette considération, que les contractions de l'utérus s'établissent pour l'accouchement d'un fœtus mort, & dans les grossesses extra-utérines ; qu'elles sont faibles dans le cas d'hémorragie, ou d'infantilisation des parois de l'utérus : enfin l'importance encore observée que par des dispositions qui nous sont inconnues, & que nous appelons les lois de la nature, l'accouchement, comme les autres opérations fondamentales de l'économie s'exécute dans des limites peu variables, & qu'en outre il n'est pas indépendant de l'action que se renouvelle périodiquement, au moment de la menstruation, ou de la dixième menstruation, aussi qu'au moment des huitième ou neuvième menstruations précédentes. (Voyez la *Tabl. synoptique de l'accouchement*, par M. le professeur Chaussier.)

Les phénomènes qui appartiennent essentiellement à la naissance, constituent l'état de nouveauté, qui ne commence véritablement qu'au

(1) Expériences qui semblent prouver que le fœtus respire l'eau, comme dans l'Ammon.

(2) Il résulte de ces expériences, que l'on pourroit recourir à la suite d'un accouchement laborieux, & sans en tirer aucune idée de culpabilité, une petite quantité de liquide dans la trachée-artère, ou dans les bronches d'un fœtus, qui auroit succombé dans cet accouchement.

moment de la révolution, d'après laquelle l'existence bérnée du fœtus est tout-à-coup changée & agrandie par de nouvelles fonctions. (*Voyez* *NAISSANCES*, dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*, N^o (Nouveau).)

(MORÉAU DE LA SARTRE.)

NAISSANCES PRÉCOCES, NAISSANCES TARDIVES. (*Médecine légale.*) On regarde comme naissances *à terme* les naissances qui arrivent neuf mois après la conception, & qui correspondent à la neuvième ou dixième époque menstruelle dans tous les climats, pour toutes les races, & pour toutes les variétés de l'espèce humaine. Les naissances qui précèdent ce terme de neuf mois, ou qui le dépassent, sont regardées comme des naissances précoces, ou comme des naissances tardives. Quelles doivent être les limites de cette latitude relativement à la légitimité de ces naissances, & sous le point de vue de ce qui concerne la médecine légale?

Cette question, sur laquelle l'attention des médecins a été souvent appelée, devint, dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, l'objet d'une discussion à laquelle les médecins les plus savans de cette époque, & qui y prirent part, ont attaché une grande célérité (1).

La question sur laquelle on demandait l'avis des médecins les plus éclairés avoit pour objet, de savoir si la naissance d'un enfant mâle, arrivé dix mois dix-sept jours après la mort de sa mère, âgée de douze à douze ans, pourroit être regardée comme légitime? Cette question, qui d'abord sembloit se renfermer dans des limites assez étroites, devint bientôt très-étendue, & conduisit les savans qui s'en occupèrent, à passer à un rebout tout ce qui concerne la reproduction.

Bérin, Antoine Petit, & plusieurs autres, répondirent pour l'affirmative. Bouvier, Louis, Almon, se prononcèrent pour l'opinion contraire, & se montrèrent, dans cette discussion, avec tous les avantages que peuvent donner le talent d'écrire, & les ressources d'une puissante littérature.

Bouvier, qui fut consulté le premier, ou l'un des premiers dans cette affaire, répondit, en s'appuyant d'une part, sur les lois que la nature paroît suivre dans le développement du fœtus, & de l'autre, sur les faits, sur les exemples, qui paroissent que ces lois ont des exceptions assez étendues. La première partie de sa question est elle-même traitée, & la seconde partie par le même recueil, les *Mémoires & les observations* d'Antoine Petit, sur le même sujet, on a peine à croire que ces deux auteurs soient contemporains, & que leurs écrits appartiennent à la même époque des connaissances.

(1) Bérin, Antoine Petit, Bouvier, &c.

Dans le deuxième point de vue de la question, Bérin montre moins de critique que d'érudition. Les témoignages d'Hippocrate, d'Aristote, de Galien, qu'il invoque, ne se rattachent point assez à des choses de fait, pour être employés dans l'examen d'une question médico-légale. Quant aux exemples de naissances tardives, cités par le même auteur, à treize, seize & même dix-neuf mois, on a dû remarquer qu'ils étoient empruntés, pour le plupart, à des auteurs qui s'avoient pu considérer peut-être ces phénomènes avec la sévérité que commande le doute philosophique.

L'accouchement ne dépendant point du fœtus, suivant les principes si judicieux d'Antoine Petit, on auroit désiré aussi que Bérin n'eût pas rappelé, pour étayer son opinion, le passage suivant, d'un auteur d'ailleurs estimable, dont l'idée exposée par ce passage ne pouvoit avoir aucun appui. « Rien a été plus naturel que de penser qu'un enfant sortit de son sein avant d'être parvenu à sa maturité, & d'accroissement de neuf mois, quand suite en aura pu prendre en sept ou huit, & même en six, du lieu qui lui est destiné pour finir, & pour accomplir ce qui est nécessairement commencé. L'enfant étant le ventre de la mère, on a dû le prendre le nourrir. La force & la vigueur qui lui conviennent, pourquoi en sortant avant d'être parvenu au degré de perfection qui lui est nécessaire, étoient-il arrivés aux fruits qui sont aux arbres? Car, n'en voit-on pas qui ont atteint leur maturité avant le temps ordinaire, & qui en restent quelques-uns au même arbre long-temps après que les autres ont été cueillis, parce que ces derniers fruits n'ont pas atteint leur maturité? »

L'auteur de ce passage cite plusieurs exemples de naissances à onze, douze & treize mois; que Bérin a soin de rapporter, & sur la réalité desquels il ne parait pas que l'on puisse élever aucun doute. Il y a cependant un point qui convient aussi à plusieurs des cas très-rares cités par Nobel, dans sa Dissertation sur les *enfants nés à terme*, publiée dans la première moitié du dix-huitième siècle (2).

Une autre observation de naissance tardive, citée par Bérin, & qui donne avec beaucoup de détail dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*.

La femme Périgord, qui fait l'objet de cette observation, demeura grosse pendant trois ans, sans suspicion des règles du premier ou dix-huitième mois. Vers la fin du dixième, elle ressentit des douleurs, comme pour accoucher, ce qui dura quatre jours, après un écoulement d'environ trois pintes de liquide. Cette femme se rétablit de cette espèce d'accident, & continua d'être

(2) De la Mousse, *Thèse des accouchemens*, liv. 1^{re}, chap. 28.

(3) L'Université de Heidelberg déclara l'ignorance de l'un de ces enfants.

grosse, & le 7 janvier 1751, elle accoucha d'un garçon vivant. La femme Péquigna, devenue grosse de nouveau dans la même année, du moins en apparence, n'étoit pas encore accouchée en 1755.

On regarde, & l'on doit regarder comme trop étendues les conclusions de Bertin, que les accouchemens qui arrivent le douzième, le treizième, & même le quatorzième mois, sont conformes aux lois de la nature.

Bouvard, dans l'examen de la même question, rappela d'abord, et pour les dissenter, dans le sein & dans l'intérieur de la matrice, les ailes ou les mesures de l'aortite (1), dont la femme René auroit pu tirer avantage, ou plutôt on méconnaissant que ce genre de considération doit être écarté dans l'examen des questions médico-légales. Le facile sur les témoignages & sur les citations des auteurs qui ont été invoqués par les partisans de l'opinion qui l'emporta (Aristote, Galien, Avicenne, Platon, Pline, Plutarque, Averroès, Albert-le-Grand), & la morale physique, dit-il, a prévalu sur les vœux de l'ancienne, en sorte qu'Aristote, qui n'eût encore été consulté & suivi sur la pratique, s'est vu plus d'une autorité sur les matières de physique. A l'on peut porter le même jugement sur les autres Anciens et sur les modernes. Quant aux plus modernes, les Boëlle, Lestour, Desautels, Schenkens, ils ne vivoient pas encore dans un siècle assez éclairé pour avoir secoué le joug de l'autorité physique, & ils n'ont fait, sur le point dont il s'agit, qu'unir la crédulité de leurs anciens maîtres, joint en copiant leurs erreurs (2).

De reste, Bonvart, après s'être ainsi expliqué, continue de traiter la même question ; pluri on justifie sa thèse en morale que en physiologie & en médecine ; rappelant, autant pour les composer, de droit des doctes Tablettes, celui du Dugès, l'Édit à Adrien mentionné par Dufresne, & les opinions de plusieurs auteurs de médecine légale, qui ne se font pas assez remarquer dans les bornes de l'expertise, médicale & anatomique.

Le livre de *Octiméfi* paraît maintenant attribué à Hippocrate, & qui n'auroit pas dû être confusé par les savans auxquels nous devons la Code Médicale, et aussi rappelé par Boissier, qui auroit dû se borner à recueillir l'histoire de cet écrit, quel qu'il soit, au lieu d'en donner, comme il a fait, un vilain commentaire. On trouve dans le mémoire de Joubert, également écrit pour la même cause, la diction élégante et claire. L'expression

philosophique, & la dialectique pressante que l'auteur a montrée dans tous ses écrits de médecine légale.

L'option que la nature, dans tous les cas, concerne la reproduction des hommes et des animaux; fût des lois constantes et invariables, sans en excepter l'incubation chez les oiseaux; cette opinion est d'abord développée par l'auteur, selon le bon sens d'évidence, mais dans les vues de cette philosophie superficielle, qui conservait alors, et qui acquiesce toujours des partisans, parce qu'elle admet comme des faits, ce qui se trouve encore en question, et qu'elle suppose dans la marche de la nature des intentions impossibles, un accord, une harmonie, un enchaînement dans toutes les productions et dans tous les phénomènes, dont l'idée, plus poétique que philosophique, donne un si grand attrait au système des causes finales.

Les partisans des naissances tardives, se livrant à des vues théoriques sur les causes de l'accouchement, étoient principalement arrêtés à se porter au tirer des conséquences en leur faveur, l'idée que le volume, la force et la facilité du fœtus devaient être compensés par les sautes occasionnelles de la naissance.

Louis, reconquit aisément toute l'insuffisance d'une pareille théorie. « La diffusion de ces faits, dit-il, est très-importante vu le petit volume où le poids du fœtus qui oblige la matrice à bouger, ou, ce qui reviendrait au même, si ces cannes existaient l'utérus de cet organe, on en tirerait des inductions (et) favorables aux accouchements tardifs; alors, on ferait fuir, soit par insurmountable constitution, soit par les malaises, les élargis ou autres accidents que la mère aurait éprouvés pendant le grossesse, pourrait relier un mois ou deux de plus dans la matrice pour acquiescer le point de perfection & de maturité nécessaire à la naissance & à la conservation de la vie. Voilà le fondement du système de ceux qui admettent la possibilité des naissances retardées contre l'ordre ordinaire.

« La mère, et toute plus loin le même auteur, met le fantôme à l'abri des intemperies de l'air et des vicissitudes des saisons, le conserve tranquillement dans une chaleur douce et uniforme : mais le fantôme est en lui-même les causes et les agens du développement, et il absorbe simplement des forces nourricières de la mère. L'imagination de celle-ci, qu'on a jusqu'ici donnée comme une cause de faiblesse pour le fœtus, n'a aucune influence sur lui; c'est une plante parasite qui pourrait attirer celle dont elle tire la subsistance sans que la végétation s'embarrasse en souffrant. Il est certain que l'épanouissement de la mère pourrait plutôt être regardé comme la source du bon état de l'enfant; si n'était bien coté par la présence des deux femmes dont la croissance a été des plus heureuses, qui ont joui de la meilleure santé, durant et malgré une merveille, out eu des enfans chétifs : tandis que

8. d'autres femmes, qui n'ont presque pas conser-
vé la accouche qu'elles prenoient; & qui ont très-
peu mangé, ont fait des enfans gros & vigou-
reux.

Si l'on pouvoit admettre la propagation du
terme de la naissance, pour les besoins du fœtus,
les gros enfans viendroient tous avant terme; & les
petits les plus faibles & les plus petits, resteroient
nécessairement dans le sein de leur mère au-delà
du terme; & de là les accouchemens à onze & douze
mois seroient très-ordinaires; & dans le cours ha-
bituel des choses: or, certainement, personne ne
voudroit soutenir une telle absurdité; elle est ce-
pendant une conséquence directe & légitime du
principe posé.

Les règles de la nature sont tellement in-
variables, qu'à encore le redoutable adversaire des
maillages rarissimes, qu'elles le manifestent même
dans les cas où l'on trouve qu'elles ont été le plus
de son cours ordinaire. On sait que des fœtus ont
été conservez pendant grand nombre d'années
dans le ventre de leur mère, sans corruption; soit
par d'elles-mêmes, ou par une espèce de putréfac-
tion; & d'autres le sont putréfiés plus ou moins
promptement, ce qui, dans certains cas, & fait
périr la mère par gangrène; & que d'autres fem-
mes, plus heureuses, ont rendu à disserter sous
par paroles, les fœtus putréfiés, au moyen des
bâtons qu'elles ont ouverts des illes à l'extérieure.
Bartholin a fait à ce sujet un ouvrage particulier
très-étendu, & à consulter. *De insolutis partibus*
viu. Le vulgaire porta toujours avec admiration
un fœtus, tel que celui de Smolte, qui a demeuré
quarante-six ans dans le ventre de la mère. Celui
de Joigny, qui a y séjourner trente-trois ans, ex-
croît, il y a quelques années, le cœlécite de tout
Paris; mais ce qui ne doit pas échapper à l'atten-
tion des observateurs éclairés, ce sont les dis-
tinctes circonstances qui ont accompagné la for-
mation de ces phénomènes.

Pour ne faire mention que de ce qui est relatif
à notre objet, nous remarquerons, à l'occasion de
l'enfant parité qui a résisté vingt-huit ans dans
le ventre de sa mère, morte à Senz en 1583, qu'elle
a senti un terme ordinaire toutes les dix-huit jours
qui précèdent & accompagnent un accouchement
ordinaire; & que la rupture des membranes, l'écoulement
des eaux, &c. cette femme avoit quarante ans,
& n'avoit eu première grossesse.

C'est femme de 1606, au Franche-Comté, de-
vint grosse à l'âge de trente-huit ans. Au neuvième
mois, tous les signes d'un accouchement prochain
se déclarèrent, mais elle s'accoucha plus & elle
mourut quinze ans après, le 25 juin 1607; Je sentis
bien cependant, & avais que la rupture d'un
enfant de sept mois (*Apophymosis de ad. inguit.*
curios. Decad. 8. sup. 31. Obs. 12.).

De l'enfant de Toulouse, dont l'histoire Bayle
médécine de cette ville, a donné l'observation rai-
sonnée, & qui porta vingt-cinq ans sa mère d'un

on dix autres enfans; & au terme de cette onzième
grossesse, elle se sentit pressée du douloureux ordi-
naire du l'effacement, & rendit une partie des
eaux.

Baubio rapporte, dans ses *Felix Platerus*,
l'histoire d'un enfant qui a résisté quinze mois dans
le ventre de sa mère. *Amnionique*, il y eut dis-
position d'accouchement, deux mois après, on
commença à s'apercevoir d'un gonflement des ma-
tières pures; la femme souffrit de l'oppression,
le mouvet cessa par le gangrène; les vomissemens
de sa ventre, elle avoit trente ans, & avoit la
cinquième grossesse.

A ces quatre exemples nous ajouterons le cas
qui a fourni à Bartholin l'occasion du traité des
vires excoelentes, & de l'accouchement. La fem-
me qui fait le sujet du premier chapitre de cet
ouvrage, étoit à la quatrième grossesse. Patience
au terme de neuf mois, elle eut des douleurs &
fut deux jours en travail; les douleurs se
dissipèrent entièrement; & quelques semaines après
se renouvelèrent. Elle accoucha d'un fœtus à
sept & demi mois, qui donna lieu à quelques par-
tions offensées; mais après qu'elle eut été en par-
tition, point de la circulation du sang; & au bout
d'un temps le fœtus au bout de dix & demi
mois. La femme eut après à tous les dangers qu'elle
avoit courus, & fut par joye d'une longue santé.

Après avoir espulé un fait si singulier,
Bartholin parle de temps anciens de l'accouchement
à sept mois, & est persuadé que la nature a ses usages
possibles pour la naissance des enfans, comme pour
celle des animaux; & il le conclut principalement
de ce qu'il a vu de neuf mois, & à 10 autres les
dispositions qui marquent un accouchement in-
stant. Il connoît les relations continues à ce
principe; il les croit infidèles, & juge qu'on ne
peut recevoir pour vraies ce qui n'a pu de proba-
bilité & de raison. *Rarus quidem historiam de
fœtibus, si quibus probabili, aliquo tempore
vires naturalis.* Un philosophe, ou plutôt tout
homme raisonnable, ne peut pas passer dis-
tinctement.

Quel est, ces faits que nous avons rapportés,
plutôt parce qu'ils sont curieux que parce qu'ils
sont distinctement à la portée pour nous de-
venir, nous n'en disons rien de la naissance des enfans,
le fait est seulement, comme d'offrir en lui, elle
est obligée de convenir, que même dans les cas
où l'accouchement n'a pu s'effectuer par des causes
accidentelles; & heureusement fort rare, la na-
ture n'a point varié pour l'époque de cet accou-
chement de celle d'après la marche du fœtus
végétal & la plus constante; & ce qui ne pourroit
empêcher d'admettre l'exemple de sa complaisance
dans lesquels elle en est certaine.

Quant au genre d'épreuves sur lequel nous de-
vons conclure, le rapport à l'âge de l'accouche-
ment de l'âge de la mère, & de la durée de la
des femmes.

« Seivant l'ordre le plus commun de la nature, l'enfant & ses annexes acquièrent à peu près, en neuf mois de temps, le volume propre à porter les fibres de la matrice au point de distension ou de développement par-delà lequel l'irritation & toutes ses suites surviennent : ce terme est, en conséquence, celui où le plus ordinairement les enfans viennent au monde, & nous ne faisons aucune difficulté de convenir que c'est le terme le plus naturel, le terme par excellence. Mais il s'agit de savoir s'il est le seul qui mérite d'être regardé comme légitime. Nous avons déjà dit que nous pensions le contraire ; voici maintenant sur quoi notre opinion est établie.

« A quelquel terme que l'enfant vienne au monde, pourvu qu'il puisse vivre après être né, ce terme doit être regardé comme un terme naturel ; il ne sauroit y avoir de difficulté sur cet objet.

« D'après les principes certains que nous venons de poser, il est évident que l'irritation qui détermine l'accouchement, est en raison composée de la sensibilité & de l'extensibilité de la matrice, d'une part, & du volume de l'enfant & de ses annexes, de l'autre ; de manière que, dans une matrice fort sensible & peu susceptible d'extension, il ne sera pas nécessaire, pour produire l'irritation sulfite, que l'enfant acquière autant de volume qu'il faudroit qu'il le fit, dans un organe moins sensible, & plus disposé à prêter & à s'étendre ; en sorte que toute la question se réduit à savoir, s'il n'est pas possible que, dans une matrice d'une sensibilité & d'une dilatabilité ordinaire, un enfant preune, plus tôt ou plus tard, le degré de volume propre à amener les fibres au dernier degré de développement dont elles sont susceptibles ? S'il n'est pas également possible, sans que la crue soit accélérée ou retardée, qu'il se trouve placé dans un organe plus ou moins capable de s'amplifier, & donc d'une sensibilité plus vive ou plus obtuse, soit que naturellement cet organe soit ainsi constitué, soit qu'il ait été eunduit à cet état par quelque vice particulier. »

Après s'être ainsi exprimé, Petit n'oublie pas de rappeler que plusieurs enfans sont nés à sept mois ; que quelques femmes ne portent jamais leurs enfans plus de sept mois, & que, par l'effet des causes contraires à celles qui occasionnent des accouchemens prématurés & légitimes ; on ne peut refuser des naissances également légitimes, quoique tardives.

Cette manière de raisonner est fondée sans doute, mais l'auteur en force peut-être les conséquences, & donne par trop d'extension aux principes qu'il a établis, d'après la réalité de l'expérience & la nature des choses, lorsqu'il ajoute.

« Ne faudroit-il pas renoncer à toutes les connaissances que fournit la médecine, pour refuser de convenir, que de même qu'il se peut faire que la sensibilité d'une partie en général, & celle de la matrice en particulier, s'accroissent dans

l'état maladif, par les causes propres à disposer à la phlogose, & que son extensibilité diminue par l'effet des mêmes causes, dans la proportion que la sensibilité s'augmente, de même il peut arriver aussi, & que, de fait il arrive tous les jours, que dans une matrice abreuvée, trop humide & relâchée, la faculté de sentir soit inondée, & celle de s'étendre devienne plus considérable ? Or, si l'on suppose un enfant conçu dans une matrice pareille, à se voir-né pas de la manière du monde la plus claire & la plus évidente, qu'ayant été dans les proportions ordinaires jusqu'à neuf mois, il ne sera pas sur la matrice l'impression propre à en déterminer la contraction, dont l'accouchement doit être l'effet ? Il restera donc, passé ce terme, dans le sein de la mère, jusqu'à ce qu'à force de prendre de l'accroissement, il vienne au point de lacer les fibres de l'organe de se refuser à une extension ultérieure, & d'être affectées de celles qu'elles supportent, de manière à entrer en contraction. Or, cela arrivera plus tôt ou plus tard, suivant que l'extensibilité sera plus grande, & la sensibilité plus petite ; & pourquoi ne se pourroit-il pas faire que, pour arriver à ce point, il fallût deux ou trois mois, & même davantage ? Dans ce cas, la femme accoucherait au onzième & douzième mois révolus, elle mettrait seulement au monde un enfant plus gros, & c'est précisément ce que les auteurs observent être souvent arrivé, dans les cas analogues à celui dont il est ici question.

« Si l'on suppose maintenant qu'un enfant soit renfermé dans une matrice dont les deux facultés, celle de s'étendre & celle de sentir, soient dans l'ordre la plus naturel, ne peut-il pas arriver que son accroissement se retarde, en parce qu'il est attaqué de maladie, ou par quelqu'autre cause ? Dans ce cas, il ne pourra obtenir qu'à onze & douze mois le degré de volume qu'il doit avoir, pour exciter la matrice à le chasser de son sein : il est certain que les enfans des personnes âgées sont foibles, petits, malsains, & que le plus grand nombre de ces enfans périt de bonne heure. Il est également certain, que des enfans nés en même temps, & dans des circonstances en apparence égales, les uns croissent vite, ont leurs dents de bonne heure, & sont d'une haute stature, quand ils sont parvenus à l'âge de la puberté, tandis que d'autres languissent, croissent lentement, ont leurs dents tard, & restent petits pendant tout le cours de leur vie ; ce qui leur arrive après leur naissance, ne seroient-ils donc l'éprouver aussi, tandis qu'ils font encore dans le sein de leur mère ? Il ne parait pas possible de se persuader que la matrice leur ait refusé cette qualité, quand on fait attention que les enfans reçoivent de leurs mères plusieurs maladies, telles que la petite-vérole & le mal vénérien, que souvent ils ont des convulsions avant de naître, qu'il y en a qui viennent au monde paralytiques, & qu'enfin plusieurs meurent

M m m

rent dans le cours de la grossesse. Ne seroit-il pas absurde de prétendre qu'ils peuvent perdre la vie, & qu'ils ne peuvent perdre la santé? Et si ce dernier accident leur arrive, il n'est certainement pas à présumer qu'ils croissent, dans l'état de maladie du de langueur, dans la même proportion qu'ils l'auroient fait, s'ils eussent joui d'une bonne santé.

Le terme de neuf mois accompli, regardé comme le plus naturel, ou le plus habituel, ne doit pas être considéré comme tel, suivant le même auteur.

« Nous savons, à n'en point douter, ajoute-t-il, d'après ses propres observations, qu'en général, sur trente femmes grosses, il y en a plus de la moitié qui accouchent du quinze au vingt du neuvième mois, dix qui mettent leurs enfans au monde vers le treize du même mois, & quatre ou cinq qui le portent encore quelque temps par-delà : les observations des accoucheurs les plus attentifs donnoient à peu près les mêmes résultats, nous croyons être en droit d'en conclure, que le terme le plus naturel, le vrai terme de la grossesse, est à la rigueur l'intervalle du quinzième jour au vingt, ou vingt-cinq du neuvième mois, en sorte qu'en prenant une moyenne entre ces deux extrêmes, il se trouveroit que dans l'ordre le plus commun, & par conséquent le plus naturel, les enfans naissent dix jours avant le neuvième mois accompli : or, nos adversaires conviennent que celui qui vient au monde dix jours après ce dernier terme, mal-à-propos regardé comme le plus naturel, peut être légitime ; cependant il est clair que, d'après leur aveu & notre calcul, sa sortie du sein de sa mère a été retardée de vingt jours : c'est pourtant ce qu'ils prétendent être impossible. On peut voir par-là, le cas qu'on doit faire de leur assertion (1). »

L'induction tirée de l'exemple des monstres, en faveur des naissances tardives, paroît très-forte au même auteur, comme on peut le voir par la citation de son mémoire.

« La raison sensible enseigner qu'il y aura moins de difficultés à ralentir la marche du développement de les parties, qu'à échanger l'ordre & la conformation de ces parties elles-mêmes : or, ce changement, quoique très-difficile à opérer, frappe cependant nos yeux tous les jours, dans les monstres, qui se présentent assez souvent dans l'espèce humaine ; d'où il est naturel de présumer que le plus difficile se faisant, le plus aisé n'est

pas tout-à-fait impossible, & que, par conséquent, la naissance d'un enfant peut être plus ou moins retardée, suivant le degré de force des causes qui donneront lieu à ce retard.

« On peut, si l'on veut, regarder du même oeil les enfans nés à onze ou douze mois, & les monstres les mieux caractérisés : pourquoi faudroit-il que les mères des uns conservent leur bonoeur dans son intégrité, & que la justice s'arme de toute sa rigueur, pour couvrir les autres d'infamie ? J'ai vu un enfant d'environ quatorze ans qui avoit quatre cuisses & quatre jambes, deux desquelles lui servoient à marcher, comme les autres hommes ; les deux autres lui pendoient au-devant du ventre, & n'avoient presque point d'action : quoique cet enfant fût évidemment monstrueux, cependant personne n'avoit songé à lui contester ni son état, ni la possession du bien de ses pères. En supposant, qu'un enfant, dont la naissance auroit été retardée de trois mois, fût une production aussi éloignée de l'ordre naturel, que celle dont il vient d'être parlé, l'équité n'exige-t-elle pas que, dans l'ordre moral, leur sort soit le même ? En conséquence, si l'un de ces enfans est regardé comme légitime, & jouit de tous les droits annexés à cette qualité, l'autre ne sauroit être, sans injustice, privé de cet avantage. »

« Tout ce qui exillo, ajoute Antoine Petit, est possible, sans doute ; mais tout ce qui est possible, n'existe pas toujours. Nous croyons avoir démontré la possibilité des naissances tardives. Il est maintenant question de faire voir que, suivant les auteurs les plus graves, ces naissances ont réellement lieu quelquefois. A Nouvelle tâche que l'auteur remplit en rappelant avec beaucoup de soin & d'érudition, le témoignage des auteurs, depuis Aristote & Galien, jusqu'à Haller & van Swieten, qui, sans se décider d'une manière précise, laissent cependant entrevoir qu'ils font porte pour l'affirmative, dans la question relative aux naissances tardives.

La discussion littéraire & polémique que nous devons rappeler, n'auroit pas lieu sans doute aujourd'hui, & ne se feroit pas même engagée, à une toute autre époque des sciences médicales, si la question qui en est l'objet, avoit été mieux posée. Cette question devoit se réduire à celle-ci : la réalité de certaines naissances tardives peut-elle être admise, & un enfant né dix mois & demi après la mort du mari de sa mère, peut-il être regardé comme légitime ? Le mémoire à consulter qui fut adressé aux médecins experts, ne fut point rédigé avec cette simplicité.

« Charles, suivant les auteurs de ce mémoire, étoit né le 15 janvier 1687 ; il avoit soixante-douze ans passés, lorsqu'il épousa René, qui étoit âgé d'environ trente ans, & dont il a point eu d'enfans, pendant près de quatre ans que leur mariage a duré.

(1) « Le calcul que je donne ici a paru à quelques personnes avoir besoin d'être mieux prouvé. . . Il est appuyé sur les observations que j'ai faites le plus exactement qu'il m'a été possible, & sur ce que j'ai entendu dire à des accoucheurs instruits. Je n'ai point d'autres preuves à administrer, & je ne crois pas que la chose en admette d'un autre genre. J'espère que si l'on veut prendre la peine de suivre ces objets avec quelque attention, les calculs qu'on fera en donneront plus des résultats bien différents des miens. »

» Il tomba malade la nuit du 7 au 8 Octobre 1762 ; sa maladie commença par une fièvre & une oppression violente, qui n'ont pas cessé jusqu'à la mort.

» L'oppression étoit si forte, qu'il fut toujours assis sur son lit, ne pouvant tenir dans une autre situation, & d'ilant à ses gardes de ne pas le laisser dormir, dans la crainte où il étoit d'être suffoqué : il n'avoit pas la force de se mettre à genoux sur son lit, pour le premier des besoins. On lui passoit avec peine le vase nécessaire aux malades les plus affaiblis. Ses gardes ne le quittaient ni jour ni nuit.

» Il avoit un pied & une partie de la jambe gangrenés dès le 21 Octobre. La gangrène étoit folle & point accidentelle. Les médecins & chirurgiens opinèrent à l'amputation ; son état de foiblesse & de dissolution totale s'y opposa : on considéra qu'il lui seroit impossible de soutenir cette opération, & qu'en la faisant, on ne seroit qu'avancer sa fin, par un tourment inutile.

» Il fit un testament, par lequel il pria un magistrat, proche parent d'un de ses héritiers collatéraux, d'assister au *passage* qui seroit fait entre eux, de son argent & de son arquerie.

» Renée, la femme, ne couchoit point dans sa chambre, & il n'étoit pas étonnant qu'elle y couchât ; cette chambre se ressentit du genre de la maladie ; on y respirait une odeur insupportable, au point que le médecin, le chirurgien, l'apothicaire & les gardes étoient très-souvent obligés de tenir les fenêtres ouvertes.

» La gangrène, l'oppression & la fièvre ne cessèrent point de faire des progrès, jusqu'au 17 novembre, qu'il mourut, environ les deux heures de l'après-midi, âgé de soixant-seize ans.

» Plus de trois mois & demi après sa mort, Renée sa veuve, témoigna des doutes de grossesse, sans cependant déclarer l'époque qu'elle entendoit donner à cette grossesse, & sans permettre qu'on la vîssât.

» Les héritiers collatéraux nommèrent un médecin & un chirurgien pour être les surveillans de son état, lui rendre des visites, & assister à l'accouchement si aucun arrivoit.

» Cet accouchement est arrivé en effet, mais n'est arrivé que le 3 Octobre 1763. Renée en ressentit les premières douleurs à sept heures du matin & à environ midi elle mit au monde un enfant mâle, bien constitué, dans l'état ordinaire d'un enfant de neuf mois.

» Jusqu'à ce moment, elle n'avoit eu aucunes douleurs qui annonçaient son accouchement. Le sien a été facile, & il n'y a aucun signe qui puisse faire présumer que l'ordre de la nature ait été troublé, ni retardé dans ses opérations.

» Or, à compter du 8 Octobre 1762, jour de la maladie de Charles, jusqu'au 3 Octobre 1763, jour de l'accouchement inclusivement, il y a un an moins quatre jours.

» Il y a onze mois & demi depuis le 21 Octobre, jour que la gangrène se manifesta.

» Et à compter du jour de la mort seulement, il y a dix mois dix-sept jours, sans accident, sans douleurs, sans aucune circonstance, dont on puisse induire que la grossesse a pu être naturellement d'une durée beaucoup plus longue que les grossesses ordinaires.

» Sur cet exposé, on demande si l'enfant de Renée doit être réputé l'enfant légitime de Charles.

BOUTVART, BARON, VERONIAN, POISSONNIER, BELLOT, BOKIE, MACHAROS, MACQUART, SOLIER.

» Les auteurs qui, en généralisant cette question particulière, se déclarent pour la négative, contre la légitimité des naissances tardives, ont sans doute raison, plutôt en jugeant d'après des considérations morales & particulières, que d'après des vues générales & tirées de l'expertise médicale & physiologique. En effet, suivant toutes les apparences, un enfant né dix mois dix jours après la mort de son mari, âgé de soixante-douze ans, & qui avoit succombé à une maladie adynamique, ne pouvoit raisonnablement pas être regardé comme l'enfant véritable de ce moribond, & en considérant les choses sous ce rapport, Louis, Bouvart, &c., avoient raison de se déclarer pour la négative ; mais d'une autre part, Ant. Petit, qui écartoit tout ce qu'il y avoit de moral & de particulier dans le sujet de cette consultation, pour ne traiter qu'une question de médecine légale ; Antoine Petit, qui étoit persuadé qu'il devoit donner une instruction sans prononcer un jugement, avoit eu raison de se déclarer pour l'affirmative, en exprimant une décision qui n'engageoit pas les tribunaux, & dont les résultats pouvoient être balancés dans la conscience des magistrats, par des particularités physiques & morales, concernant le sujet sur lequel ils devoient prononcer. Dans l'état présent de notre législation, cette non-légitimité des naissances tardives ne pourroit plus être soumise aux médecins. Elle n'a pu être intéressante pour nous, qu'en la considérant sous un point de vue historique, & sous le rapport de l'heureuse influence des progrès des sciences naturelles, sur l'excellence des lois relatives à la légitimité des naissances précoces & des naissances tardives.

» D'après ces lois exprimées dans les articles 312, 314 & 315 de notre Code civil, le législateur admet des naissances précoces, qu'il fixe au commencement du septième mois, & des naissances tardives, en déclarant que la naissance d'un enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra seule être contestée ; ce qui indique dans l'esprit de cette disposition législative, l'idée de la possibilité d'une naissance jusqu'à ce terme.

Des recherches récentes, faites avec soin par un homme recommandable par sa probité & par son l'avis, prouveroient, s'il étoit nécessaire de le faire,

combien cette latitude, cette indulgence de la loi sont fondées, rationnelles & préférables à l'opinion, que dans l'espèce humaine, l'existence d'ailleurs à des causes de variétés & de modifications dans tous les actes de la vie, le terme de la naissance seroit plus constant, plus régulier, que pour les animaux.

Ces recherches, que nous croyons devoir rappeler en terminant cet article, ont été communiquées à l'Académie des Sciences, le 5 mai 1817, par M. Teflier, membre de cette Académie. Elles avoient pour objet de déterminer, par un grand nombre de faits, quelles sont les limites les plus étendues & la durée moyenne de la gestation.

En voici les résultats exprimés par l'auteur dans quatre conclusions de son Mémoire :

1°. Sur cinq cent soixante-quinze vaches, vingt-une ont mis bas, du deux cent quarantième au deux cent soixante-dixième jour; terme moyen, deux cent cinquante-neuf jours & demi.

2°. Cinq cent quarante-quatre ont mis bas du deux cent soixante-dixième au deux cent quatre-vingt-dix-neuvième; terme moyen, deux cent quatre-vingt-deux jours.

3°. Deux ont mis bas du deux cent quatre-vingt-dix-neuvième jour au trois cent vingt-unième; terme moyen, trois cent trois jours.

Il y a donc de la plus courte gestation à la plus longue une différence de quatre-vingt-neuf jours, c'est-à-dire, plus d'un quart de la durée moyenne.

2°. Sur deux cent soixante-dix-sept juments, vingt-trois ont mis bas du trois cent vingt-deuxième jour au trois cent trentième; terme moyen, trois cent vingt-six jours.

3°. Deux cent vingt-sept ont mis bas du trois cent trentième au trois cent cinquante-neuvième jour; terme moyen, trois cent quarante-quatre jours & demi.

4°. Vingt-huit ont mis bas du trois cent soixante-neuvième au quatre cent dix-neuvième jour; terme moyen, trois cent quatre-vingt-dix jours.

Il y a donc en parmi les juments, de la plus courte gestation à la plus longue, un intervalle de quatre-vingt-dix-sept jours, & par conséquent plus d'un quart de la durée moyenne.

3°. On n'a observé que deux ânesses; l'une a mis bas au trois cent quatre-vingt-troisième, & l'autre au trois cent quatre-vingt-onzième jour.

4°. Sur neuf cent douze brebis, cent quarante ont mis bas du cent quarante-sixième au cent cinquantième jour; terme moyen, cent quarante-huit jours.

5°. Six cent soixante-seize ont mis bas du cent cinquantième au cent cinquante-quatrième; terme moyen, cent cinquante-un jours.

6°. Quatre-vingt-seize ont mis bas du cent cinquante-quatrième au cent soixante-unième; terme moyen, cent cinquante-sept jours & demi.

Ici l'intervalle extrême n'est que de quinze jours sur une durée moyenne de cent cinquante-

deux, c'est-à-dire, seulement un dixième d'intervalle.

5°. Sur sept buffles, le terme moyen a été de trois cent huit jours, & les différencs extrêmes de vingt-sept jours.

6°. Sur vingt-cinq truies, les gestations extrêmes ont été de cent neuf & cent quarante-trois jours.

7°. Sur cent soixante-douze lapines, les termes extrêmes de gestation ont été vingt-sept & trente-cinq jours; différences, huit jours.

Les conséquences de ces mêmes recherches, relativement à la durée de la grossesse, pour l'espèce humaine, sont trop évidentes, trop parfaitement d'accord avec des considérations *a priori*, sur le même objet & sur les variations dans l'échecement de l'utérus, pour qu'il soit utile de s'y arrêter & de donner plus de développement à cet article.

(L. J. MORBAU DE LA SARTHE.)

NAISSANCES EXTRAORDINAIRES. On a désigné sous ce nom, les naissances qui paroissent merveilleuses, soit par la durée de la grossesse (voy. NAISSANCES PRÉCOCES & NAISSANCES TARDIVES), soit par la nature de l'accouchement; ce qui peut devenir d'une haute importance relativement à la médecine légale. (Voyez ACCOUCHEMENT, MORBIDES (Droits des), VAGIN (Imperforation & absence du), VULVE.)

Une des naissances les plus extraordinaires parmi celles dont les archives de la médecine & de la physiologie retracent des exemples, dépendoit de l'un des vices de conformation que nous venons de citer, de l'absence de la vulve & du vagin. Louis l'a rapportée ainsi qu'il suit dans sa Dissertation sur les organes de la génération, dont l'impression fut arrêtée par un arrêt du Parlement: Cette dissertation avoit pour titre: *DE PARTU EXTERNARUM GENERATIONIS INSPERIENTIUM IN MULIERIBUS, NATURALI, PIETOSA ET MORBOSA DISPOSITIONE* (1755). Le fait en question y est rapporté de la manière suivante: *Alia imperforatio apparentis speciei hic manet, recensenda, de qua non ita pridem Parisi vidimus exemplum notatu dignum, vernacule in Academicarum commentariis non tradendum, ob verendum de re pudenda servandum. Adolecentula in qua nullum vulvæ & virginis vestigium, per annum purgationes mensuales patiebatur. Eam viri quidam adamavit; & hinc, quod datâ viâ, se commisit, non tangenda transiens vada. Quod alibi nefanda fuisset fœditas, in hoc casu fuit secundum naturam intentum. Gravida enim facta, statim tempore oportuno enixa est, lacerato ani sphindere. An uxore, sic disposita, uti fas sit, vel non, judicent Theologi morales? (Voyez la Thèse citée pag. 21.)*

Les exemples de naissances extraordinaires, sous le rapport de la durée de la grossesse, sont assez nombreux, mais la plupart ne sont point

affez authentiques. En voici quelques-uns qu'Antoinette Petit n'a pas dédaigné de rapporter en faveur de l'opinion médico-légale, concernant la légitimité des naissances tardives.

Le premier de ces exemples qui se présente à notre souvenir est emprunté de Sennert, dans les ouvrages duquel on trouve l'histoire d'une femme qui, après plusieurs couches dans l'ordre naturel, eut deux autres hors de cet ordre, savoir, l'une à dix mois & l'autre à vingt. Bertin citoit souvent, d'après sa propre expérience, l'exemple d'une dame qui, après avoir éprouvé toutes les apparences d'un commencement de travail à neuf mois, continua de demeurer grosse, & n'accoucha qu'à dix-huit, d'un enfant qui se portoit bien.

On trouve plusieurs faits analogues dans une thèse soutenue sous la présidence d'Heister, dans le dessein d'établir la doctrine des naissances tardives, d'une manière incontestable. On a cité souvent, & d'après Godefray, un autre trait de même genre, celui d'une veuve qui étoit accouchée plus de treize mois après la mort de son mari, & dont l'enfant fut cependant regardé comme légitime. Une autre veuve, qui avoit toujours vécu d'une manière exemplaire, déclara sa grossesse au commencement même de son voyage, & se retira dans un couvent. Neuf mois après, elle sentit des douleurs pour accoucher, ce qu'elle ne fit que deux mois plus tard. « Comme la conduite de cette femme n'étoit point coupable », dit l'avocat-général le Nain, & qu'elle avoit déclaré sa grossesse après la mort de son mari, sa se retirant dans le lieu le plus respectable, presque toute la famille reconnoît son enfant comme légitime. » (le Nain, à l'occasion de l'arrêt du 28 juillet 1703, rapporté par Hucgard.)

Thomas Bartholin a cité aussi, parmi plusieurs exemples de naissances tardives, celui d'un enfant qui étoit venu au monde qu'on seizième mois de la grossesse de sa mère qui, s'étant déclarée enceinte par fait de séduction, avoit été enfermée & gardée à vue par ordre des magistrats jusqu'au moment de la délivrance.

Les exemples des naissances tardives ne manquent pas, même dans l'histoire des animaux. On prétend que les jumeaux portent plus ou moins de temps, suivant qu'elles sont pleines d'un mâle ou d'une femelle. Wagner cite l'exemple d'une chèvre qui devoit mettre bas au commencement du carême, & qui ne le fit qu'à la fin. La durée de l'incubation pour les œufs de poules varie du vingt au vingt-cinquième jour; la germination elle-même n'a rien de rigoureux ni d'absolu dans sa durée, ainsi que la maturation des fruits.

Depuis le rapprochement de tous ces faits, que le judicieux Antoinette Petit fit habilement valoir pour soutenir la légitimité des naissances tardives, des recherches beaucoup plus conséquentes, plus positives, & qui donnent les mêmes conséquences,

ont été faites sur la durée de la gestation des femelles de plusieurs animaux domestiques, par M. Tessier, de l'Académie royale des Sciences de Paris. (Voyez NAISSANCES TARDIVES.)

Tous les différents faits que nous venons de rappeler relativement à une époque extraordinaire & reculée de la naissance, appartiennent à l'histoire des phénomènes singuliers & curieux, que l'on désigne sous le nom de *cas rari*, ou physiologie & en médecine. Nous ne pourrions entrer dans une exposition plus détaillée relativement à ce sujet, sans nous exposer à placer ici plusieurs considérations qui appartiennent aux articles ACCOUCHEMENT, GESTATION, GROSSESSE, MONSTRES, PART, &c. (Voyez ces mots.)

(L. J. MOREAU DE LA SARTHE.)

NALDIUS, ou NALDI (Matthias) (*Biographie médicale*), médecin du dix-septième siècle, qui se rendit célèbre, non-seulement par ses connaissances en médecine, mais encore par son érudition. Il savoit plusieurs langues, notamment les langues latine, grecque, hébraïque, chaldaique & arabe. Il se livra à l'enseignement avec beaucoup de succès, à Pise, & bientôt il fut remarqué par le pape Alexandre VII (1), dont il devint le premier médecin. Naldius, malgré cet emploi honorable, n'en continua pas moins d'enseigner la médecine à Rome: il contribua, par ses talents distingués, à faire fleurir les écoles de l'Université de cette ville, & mourut en 1682 dans un âge très-avancé. Ce médecin a publié plusieurs ouvrages, dont quelques-uns sont en vers; & dans toutes ses productions littéraires, on a cru remarquer qu'il s'attachoit surtout aux discussions physiologiques. Voici le titre des principaux ouvrages de Naldius:

Sapientis vitale filum, quod philosophice ac medicæ facultatis ambages publice ingressurus, Heroicis numeris sibi conglomeravit (a). Senis, 1623, in-4^o.

Panphilia, seu mundi universi amicitia, cui dissidentes philosophorum opinionum conciliantur & parantur, ex Re medicæ amicitia. Ib., 1647, in-4^o.

Regole per la cura del contagio. Rome, 1656, in-4^o.

Aphorismorum Hippocratis explanatio. Romæ, 1657, in-4^o.

Rei medicæ prodromi, præcipuorum physiologiae problematum, Tractatus. Ibid., 1682, in-fol. (Extr. d'Éloy.) (AUG^{te}. THILLATZ.)

NANARIS. (*Matière médicale*). (Pinella

(1) Le cardinal Fabio Chigi, élevé à la papauté en 1655, sous le nom d'Alexandre VII.

(a) Le poëte que Naldius manuscrit dans la jeunesse pour la poésie, lui fit écrire ces ouvrages en vers.

oleosa. *Nanarium* de Rumphius.) Cet arbre appartient à la famille des tércbinthacées; il est remarquable par l'huile essentielle qui pénètre son écorce & lui donne l'odeur la plus agréable. Le *nanaris* s'est point employé en médecine.

(L. J. M.)

NANCÉATES, f. m. pl. (*Voyez* Nancé et Acide.)

NANCÉIQUE (Acide). (*Matière médicale*.) Dénomination qui n'a pas été conservée, & qu'il eût fallu peut-être supprimer entièrement; l'acide que l'on désignoit sous ce nom ne paroît pas différer de l'acide lactique. (L. J. M.)

NANCEL (Nicolas de) (*Biograph. médic.*), célèbre médecin du seizième siècle, naquit en 1539, dans un petit village situé entre Noyon & Soissons (1). Ses études littéraires furent brillantes, & dès l'âge du dix-huit ans, il fut chargé par l'université d'enseigner publiquement les langues latine & grecque, dans le collège de Presles, à Paris. Nancel fut ensuite professeur dans l'Université de Douay, revint à Paris, à la sollicitation de ses nombreux amis, reprendre une chaire au collège de Presles, & songea à le faire recevoir docteur en la Faculté de médecine de cette capitale (2). Soissons paroît être la première ville dans laquelle Nancel exerça la profession. Peu de temps après il se fixa à Toul, & ne quitta cette ville, après y avoir demeuré dix-huit ans, que pour aller occuper une place de premier médecin auprès de l'abbé de Fanfrevault (la princesse Éléonore de Bourbon). Nancel mourut en 1610, à l'âge de soixante-onze ans; & dans le nombre des ouvrages qu'il a laissés, on distinguera toujours les suivans :

De risu febtilis. Paris, 1587, in-8°.

De legitimo partus tempore f. 11, f. 111, LX, X & XI mensium problema. Paris, 1587, in-8°.

Discours très-ample sur la peste, 1584, in-8°.

Declamations & theses ad P. Rami ritu; Paris, 1600, in-8°.

Analogia microcosmi ad macrocosmum. Lutetiae, 1611-1631, in-folio (3). (A. J. T.)

NANCY (Eaux minérales de). Chef-lieu de

présente dans le département de la Meurthe, Nancy possède plusieurs sources que l'on a regardées comme minérales; la principale est connue sous le nom de *Fontaine de St-Thibault*. L'eau en est froide, claire, d'une saveur astringente, & plus ou moins aigrelette. M. Mathieu de Dombasle, qui en a fait l'analyse en 1810, a prouvé qu'un kilogramme d'eau, prise à cette source, contenoit :

Carbonate de chaux.....	0,55 gram.
Sulfate de chaux.....	0,07
Sulfate de chaux cristallisé.....	0,36
Mucilage de fonde.....	0,04
Carbonate de fer en suspension.....	0,04

Les autres sources ont paru différer fort peu de l'eau citée.

Malgré leur saveur astringente, les eaux minérales de Nancy sont peu employées aujourd'hui comme médicament; elles pourroient cependant être prescrites à la dose de deux à trois pintes par jour. Bagard en conseille l'usage dans le diabète, la chlorose & la leucorrhée.

Noos possédons quelques traités particuliers sur les eaux minérales de Nancy: 1°. celui de Bagard, publié en 1763, ayant pour titre: *Les eaux minérales de Nancy*, ouvrage dans lequel l'auteur ne parle que de la source de St-Thibault; 2°. une thèse de Lullize, portant ce titre: *De aëre & aquis Nancejani*, soutenue en 1770; dans les écoles de Nancy; 3°. quelques écrits de Marquet, Mandel & Nicolas. (A. J. T.)

NANNIUS (*Biographie médicale*), de l'Institut de Bologne, contemporain de Morgagni, d'Albertini, &c.

Nannius publia quelques recherches d'anatomie dans le premier volume des Mémoires de cette Compagnie savante, après sa réunion avec l'Académie, qui avoit été fondée par Eustache Méntred; Nannius s'occupa en particulier de la structure des glandes. (L. J. M.)

NANNONI (Angelo) (*Biograph. médic.*), chirurgien à l'hôpital général de Sainte-Marie-la-Neuve, à Florence, enseigna la chirurgie dans cette ville, où il acquit une brillante réputation. Il naquit en Toscane en 1715, & mourut en 1790. Ses principaux ouvrages sont :

Trattato delle malattie delle mammelle. Florence, 1740, in-4°.

Discorso chirurgico nell' introduzione al cuspide delle operazioni. Florence, 1750, in-4°.

Della simplicità di medicare, 1761, 1774, 1776.

A treatise on hydrocele. London, 1779 (2).

(1) Cet ouvrage fut publié en anglais par Nannoni, en 1779, & traduit en italien dans la même année, par Tommaso Albini.

(2) Bertrandi attribue à Nannoni cet ouvrage, dont il y a eu plusieurs éditions.

(1) Le village de Nancel, dont ce médecin porta le nom. (2) Eloy, dans son Dictionnaire, mentionne quelques docteurs sur cette particularité de la vie de Nancel, en disant qu'on ne retrouve pas son nom dans la notice des médecins de Paris, par Baron. Il s'adressoit même, suivant ce biographe, que Nancel pourroit avoir fait profession sans être reçu docteur, ce qui est fort douteux.

(3) On trouve dans cet ouvrage le Mémoire que Nancel publia en 1587, ayant pour titre: *De immutata anime, videlicet adversus Galenum*. Ce médecin avoit aussi pressenti une nouvelle édition des *Medici antiqui*. L'exemplaire fut l'un des premiers qui furent corrigés dans la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris, & est placé par Bernard Peyrille.

Differtazione sulla cateratta. Milano, 1780.

Differtazione sulla regenerazione della parti similari, constituiti il corpo humano. Milano, 1781.

Memoria sull' aneurisma della piegatura del cubito. Firenze, 1784. (A. J. T.)

NANT (Ean minérale de), village à trois-quarts de lieue de Saint-Martin-de-Valamas. La source minérale qui porte indifféremment le nom de Nant & celui de Saint-Martin-de-Valamas, sort près de ce village, d'un rocher placé dans un petit ravin : elle est froide. M. Boniface la regarde comme acide & martiale. (*Extr. de Carrière.*) (A. J. T.)

NAPEL, *Aconitum napellus*. (*Histoire de la médecine.*) Divers, savans, & plus particulièrement M. de Candolle, ont cherché à répandre quelques lumières sur ce qui appartient à l'histoire littéraire, dans l'histoire naturelle des *aconitis napel*. Théophraste faisoit venir ce nom d'*aconit*, de la ville d'Acone, près d'Héraclee, dans le royaume de Pont. Il paroîtroit, du reste, que les Anciens auroient donné le nom d'*aconit* d'une manière trop générale à plusieurs poisons très-énergiques :

Liberis viribiles, miseris aconitis nocere.

Ovén.

C'est dans ce sens que les poètes attribuoient l'*aconit* à l'écumé de Cerbère, & qu'ils supposoient qu'il entroît dans les compositions magiques. Dans l'île de Céos, les vieillards, pour abréger une existence devenue inutile ou incommode, *avoient l'aconit*, comme on buvoit la ciguë dans Athènes, pour sur la peine capitale. Plusieurs accusations d'empoisonnement par l'*aconit* se trouvent indiquées dans l'histoire des Anciens. L'*aconit Thelyphorum*, souvent cité par Théophraste & par Pline, produisoit surtout, & par de simples applications extérieures, les effets les plus dévastateurs. Il seroit très-difficile aujourd'hui de pouvoir trouver une espèce de concordance entre ces *aconitis* si redoutables chez les Anciens, & les espèces que nous connoissons.

L'*aconit* de Théophraste, qu'il est plus particulièrement difficile de déterminer, ne paroît pas appartenir à l'espèce de leur genre qui a conservé ce nom, & que les botanistes rapportent à la famille des rubiacées. Plusieurs botanistes fort instruits ont cru devoir rapporter au *nigella arvensis* anthora de Linus, l'*aconit* de Pline & le *thelyphorum* de Théophraste ; d'autres font portés à croire que l'*aconit* de Dioscoride répond à l'*aconitum lycoctonum*. (L. J. M.)

NAPEL (Aconit). (*Histoire naturelle médicale.*) L'*aconit* napel appartient à la famille des ro-

nonnacées, dont il possède, en grande partie, les propriétés les plus énergiques. C'est principalement dans la racine que réside son action tantôt vénééuse, & tantôt médicale. Lorsque l'on a mâché ou avalé quelques parties de cette racine, qui est d'une faveur douceâtre, toutes les parties de la bouche s'engourdissent ; on y éprouve une acréte brûlante, des douleurs lancinantes, & la salive coule en grande abondance. Il se manifeste ensuite une fièvre ardente, du frisson, un grand alloiblissement, des vertiges, du délire, un état comateux ou convulsif, des déjections stériles ; enfin, des sucurs froides, qui sont bientôt suivies de la mort, si l'empoisonnement est complet. Ces effets du napel, qui sont assez constants, ont été produits d'une manière solennelle, & en quelque sorte historique, à différentes reprises sur des criminels, à Prague, par exemple, d'après les ordres de l'empereur Ferdinand 1^{er} ; & à Rome, sous le pontificat de Clément VII. (*Vid. Matth. in Dioscorid.*, pag. 768.)

Les expériences de M. Orfila, sur le napel, donnent les résultats suivans :

1°. Le suc des feuilles d'*aconit*, introduit dans l'estomac, dans le rectum, ou injecté dans le tissu cellulaire des chiens, détermine des accidents graves, suivis d'une mort prompte.

2°. Il en est de même de la racine de cette plante, dont les effets paroissent encore plus marqués que ceux du suc des feuilles.

3°. L'extrait aqueux d'*aconit* préparé, en exprimant le suc de la plante fraîche, jouit à peu près des mêmes propriétés vénééuses que le suc, tandis qu'il est incomparablement moins actif lorsqu'il a été obtenu par décoction.

4°. L'extrait résineux est plus énergique que l'extrait aqueux.

5°. Ces diverses préparations sont absorbées, transportées dans le torrent de la circulation ; elles agissent spécialement sur le système nerveux, & particulièrement sur le cerveau, où elles déterminent une espèce d'aliénation mentale.

6°. Elles exercent, en outre, une irritation locale, capable de développer une inflammation plus ou moins intense.

7°. Elles paroissent agir sur l'homme comme sur les chiens.

Toutes les espèces d'*aconit* sont également vénééuses, sans qu'il soit possible cependant d'attribuer au contact de leurs fleurs ou de leurs feuilles, les effets dont quelques-uns de merveilleux ont rapporté des exemples. On ne connoît point d'antidote contre l'empoisonnement par le napel ; on doit se borner aux boissons mucilagineuses, & même acidulées, sans négliger les évacuations sanguines & les moyens les plus utilement employés dans le traitement du narcotisme. On a introduit depuis plusieurs années l'extrait d'*aconit* dans la matière médicale, soit pour at-

taquer des maladies constitutionnelles, soit pour répondre à quelques indications particulières qui ne seroient pas aussi bien remplies avec l'opium ou avec d'autres substances narcotiques.

Störck, qui paroit avoir eu l'initiative dans l'emploi de ce médicament, prétend l'avoir employé avec succès dans les rhumatismes & les gontes invétérées, les sciatiques, &c. On le préfère quelquefois à l'opium pour calmer la violence des douleurs qui accompagnent certains paroxysmes de goutte, & l'auteur de cet article en a fait plusieurs fois usage avec succès, pour remplir cette indication.

L'extrait d'aconit, qui doit être préparé avec beaucoup de soin, ne le donne, d'ailleurs, qu'à très-petite dose, & d'une manière en quelque sorte explorative; quelques grains ayant suffi, dans plusieurs circonstances, pour produire les accidents les plus graves. On commence par un quart de grain sur un demi-grain, & on augmente progressivement jusqu'à quatre, six, dix, douze, quinze & même vingt grains, suivant le mode de sensibilité du sujet & les indications.

D'après les observations de Fouquet, de Montpellier, l'extrait d'aconit napel, qui ne pouvoit être employé seul, chez certains malades, produit les meilleurs effets en le combinant, soit avec l'extrait d'opium, le camphre, soit avec la valériane, le musc, &c.

Les pilules suivantes, connues sous le nom de *pilules d'aconit mercurielles*, me paroissent, ainsi qu'à M. Double, un moyen de traitement très-efficace dans plusieurs affections chroniques dans lesquelles on peut supposer un état morbide, dépendant d'une disposition scorbutique, dartreuse ou rhumatismale.

T. Extrait d'aconit napel. 3 j

Muriate de mercure suroxydé

(sublimé corrosif) ij grains.

broyez pendant long-temps, dans un mortier d'agate ou de verre, pour en opérer un mélange très-exact, & divisez en vingt pilules égales.

Une pilule matin & soir, en augmentant d'une pilule tous les dix jours. (L. J. M.)

NAPHA. (*Matière médicale.*) On désigne ainsi, dans certaines formules très-anciennes, la fleur d'orange: *Aqua napha.* (*Flores Aconit.*) (L. J. M.)

NAPITE, ou **NAPTUS** (*Matière médicale*), du *נפת*, dérivé, suivant quelques étymologistes, du chaldéen ou du syriaque. On désigne sous ce nom une substance bitumineuse qui se rencontre naturellement dans certaines contrées de la Perse, & même dans la Sicile. Le pétrole lui-même doit être regardé comme une espèce de naphite, moins pur & moins cher. L'huile de naphite se trouve placée, par les auteurs de matière médicale,

parmi les huiles empyreumatiques, dont elle possède en grande partie les propriétés médicales les plus efficaces. (*Flores Petrole, Savorum Ammoniacal & Secern.*) (L. J. M.)

NAPIER (Richard) (*Biogr. médic.*), étudia la médecine à Oxford, où il fut reçu docteur en 1642. Partisan de l'empirisme, on lui reproche d'avoir eu recours à toutes les supercheries de l'astrologie pour se faire un nom dans l'exercice de la profession. Il y réussit assez mal, car il paroit avoir fait plus de bruit en Angleterre, par la singularité de ses idées, que par les cures qu'il entreprit. Napier, qui fut un des premiers membres de la Société royale de Londres, mourut en 1675.

On trouve dans la plupart des Dictionnaires historiques un autre **NAPIER** (Richard), fils de Robert, gentilhomme anglais. Il exerça la médecine, quoiqu'il ne fut jamais reçu médecin, & comme le précédent, les amulettes & les talismans furent les moyens qu'il employa pour favoriser son empirisme. (*Extr. d'Éloy.*) (A. J. T.)

NAPLES (Eaux minérales de). La ville de Naples & ses environs possèdent une telle variété de sources minérales, que, sans en donner une énumération détaillée, nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot sur celles que l'on a généralement regardées comme les plus actives & les plus efficaces. On en compte quatre principales; savoir : 1°. *l'eau sulfureuse*, qui se trouve dans la ville même de Naples; 2°. *l'eau de Piscicelli*, qui est aluminée & prend la source au milieu de la chaîne des volcans des champs Phlégréens; 3°. *l'eau ferrugineuse*, qui est très-commune (le carbonate de fer étant très-abondant dans le cratère de Naples); 4°. *l'eau de Gurgitelli*, ou alcaline, qui contient du carbonate de soude.

M. Attomonielli (1), au mémoire duquel nous sommes redevables en partie de cette notice, assure que les eaux de Naples ont en juda la plus grande renommée : « Les écrits de Strabon, de Plin, de Galien, ajoute ce médecin, montrent l'usage constant qu'en faisoient les Romains. Plusieurs personnes allèrent à Baies pour y prendre des bains chauds : l'expérience ayant constaté leur utilité, ces eaux furent constamment fréquentées; on y bâtit des maisons de campagne en grand nombre, de sorte que Baies, Pozzuoli & Misène ne firent plus, au temps des Romains, qu'une seule ville & comme une petite Rome! Dans les temps plus reculés, lorsque l'école de Salerne jouissoit encore d'une grande réputation, on faisoit encore beaucoup d'usage des eaux minérales de Pozzuoli & de Baies. Les médecins qui ont écrit sur ces eaux miné-

(1) *Mémoire sur les eaux minérales de Naples*; brochures in-8°, Paris, 1804.

rales de Naples, conviennent qu'elles s'en trouvent également utiles dans un grand nombre de maladies. L'eau *sulfureuse*, par exemple, est conseillée par M. Attomelli dans les affections puriques, particulièrement pour combattre les dartres invétérées; dans les affections scorbutiques, les ulcères du même genre, soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a également obtenu un succès complet de leur emploi, dans les digestions bilieuses, dans les diarrées accidentelles, causées par des indigestions; dans l'ictère, la gonorrhée, &c. L'eau de *Piscicelli* est surtout précieuse en boillons & en injections par M. Attomelli, dans la gonorrhée, lorsque l'écoulement, ayant duré deux ou trois semaines, ne produit plus aucune sensation douloureuse; dans la leucorrhée, en douces & en injections; dans le dialète, les hémorrhagies passives & les affections phtoriques. L'eau *ferrugineuse* convient surtout dans les faiblesses d'estomac, les obstructions, les scrophules, la chlorose, l'hydropisie, &c. Enfin, la plupart des praticiens regardent les eaux minérales de *Gargicelli* comme d'une efficacité remarquable, dans la débilité calculeuse, dans les différents ulcères, tant internes qu'externes, dans la chute du vagin, du rectum, &c.

Nous nous sommes abstenus, à dessein, d'entrer dans les développemens que donne M. Attomelli sur l'emploi des eaux minérales de Naples; ces détails deviendroient, d'ailleurs, beaucoup trop étendus. Nous ajouterons seulement, comme complément de cet article, que l'on prépare à Paris, dans l'établissement de Trévise, sous le nom d'*eaux minérales artificielles de Naples*, un médicament très-essence, qui paroît devoir être les principales propriétés à la réunion de gaz acide carbonique & trydrosulfurique. Ces eaux minérales, que M. le professeur Moreau de la Saône a souvent employées avec succès, lui semblent plus particulièrement indiquées dans les affections catarrhales de la poitrine, leur disposition inflammatoire, chez les personnes très-grasses, d'un tempérament lymphatique, ou d'une complexion scrophuleuse. Ces eaux paroissent agir, dans le cas dont nous parlons, en changeant le mode d'action de la membrane muqueuse, & en ramenant à un état normal, soit pour la qualité, soit pour la quantité, la sécrétion de cette membrane. Cette indication de changer un mode d'action & de corriger une altération sécrétrice, n'est point assez prise en considération, pour le dire surpasse, dans plusieurs autres affections de membranes muqueuses, qui sont susceptibles d'un grand nombre de dérangemens ou d'altérations, que les détails de la pratique font connaître, & qui ne sont jamais bien saisis par les lyabriques, quoiqu'ils soient les moins prompts & les moins exacts empruntent pour proclamer ou annoncer leurs succès.

(A. J. T.)

NARCISS. (Matière médicale.) Narcissus de
MÉDECINE. Tome A.

floré, de la famille des Narcissées, qui constitue l'ordre cinquième des monocotylédons apétales, & qui se trouve très-voisine des Juncacées. L'usage médical de plusieurs espèces de ce genre, redonne jusqu'au temps d'Hippocrate & de plusieurs autres médecins de l'antiquité, tel que Dioscoride, Plin, Galien, qui ont bien connu la propriété vomitive inhérente au bulbe de la plupart des narcisses.

Celui à plusieurs fois tiré parti de cette propriété; M. Boissier Deslongchamps, qui fit, il y a quelques années, plusieurs essais sur divers plantes indigènes, pour les substituer à des plantes exotiques beaucoup plus chères, a fait des expériences sur les bulbes des narcisses, & principalement sur celles du narcissus *laurage*, du narcissus *lacté* & du narcissus odorant; & a périéres d'où il résulte, que les bulbes sont employés bien plus utilement après les avoir fait sécher & les avoir pulvérisés.

L'extrait de fleurs de narcissus a été employé par M. Dubreuil, Vuillemeur, & par quelques autres, dans le traitement de la coqueluche & de plusieurs affections spasmodiques.

(L. J. M.)

NARCISSÉES. (Matière médicale.) Narcissées. Famille naturelle des Narcissées. (Foyez NARCISS.)

NARCISSUS (François-Nicolas) (*Biographie médicale*). Savant anatomiste, qui appartient à la première moitié du dix-huitième siècle. Narcissus s'est principalement occupé d'anatomie & de physiologie. On lui doit une Dissertation sur le son (*de sono*), qui a été publiée dans les *Transactions philosophiques*. Nous lui sommes également redevables de recherches fort curieuses sur la génération, & sur les réservoirs du chyle. Leyde, 1741, in-4°.

Narcissus a fait connoître, en outre, par des figures qui sont généralement estimées, les vaisseaux bords très-développés, & quelques variétés du canal thoracique. (L. J. M.)

NARCOSE. (Néologie.) M. Baumes a désigné sous ce nom, dans son ouvrage sur les *fontaines de la science méthodique des maladies*, un genre d'affections qui s'appartient à la première classe des maladies *phéniques* ou *oxygénées*; ce qui la rapproche, dans cette singulière classification, de plusieurs maladies très-différentes, telles que la *psychose*, le *mentisme*, l'*agrypnie*, la *névrose*, &c. (Foyez OXYGÉNÉES.) (L. J. M.)

NARCOTICO-ACRES. (Poisons.) (Matière médicale.) Il seroit difficile de trouver dans l'histoire naturelle, une classification plus irrégulière & plus incohérente que celle où l'on a réuni, sous ce titre, un grand nombre de substances plus ou

Naa

moins vénéneuses, très-différentes les unes des autres. Ainsi on a renfermé dans cette même classe, la scille, l'aconit, l'élébore, la colchique, la belladone, la pomme épineuse; la feuille de tabac, la digitale, différentes espèces de ciguë, la noix vomique, la fève de Saint-Ignace, l'opium tendu, le camphre, la coque du Levant, les champignons, la feuille ergotée, &c. ; en un mot, presque toutes les substances végétales vénéneuses qui agissent autrement que par un simple narcotisme. Aucune considération générale ne peut évidemment se rapporter à des classes aussi disparates; & nous renvoyons, pour chacune des substances que nous venons d'énumérer, à leur article particulier.

(L. J. M.)

NARCOTINE. (*Matière médicale.*) On a désigné sous ce nom le principe cristallisable tenué par Déroline, dans l'opium, où il est uni & combiné avec la morphine, d'où paroissent résulter d'ailleurs, & d'une manière exclusive, les propriétés narcotiques & vénéneuses des opiacés.

La narcotine, séparée de l'extract d'opium par l'éther, est solide, blanchâtre & légèrement jaune, inodore, insipide; elle fond comme les graisses, à une température peu élevée, & se décompose si la chaleur n'est trop forte, en répandant une odeur aquamarine.

La narcotine est très-soluble dans l'éther, moins dans l'huile d'olives, d'amandes douces, peu ou presque point dans l'eau froide.

L'extract d'opium, privé de narcotine par l'éther, suivant le procédé de M. Robiquet, ne sensible pas agir avec moins d'énergie comme poison, & ne manie point par, dans la pratique; un médecin aussi assuré que l'extract gommeux d'opium. Plusieurs personnes auxquelles l'air administré cet extract de M. Robiquet, & qui faisoient souvent usage de l'extract gommeux, ont éprouvé, à la même dose, des symptômes assez pénibles qui ne l'ont fait abandonner, de la céphalalgie, des nausées, & surtout beaucoup de tristesse & d'angoisses, trois à quatre heures après avoir fait usage de ce médicament, soit en lavement, soit sous forme de pilules ou de potion. D'une autre part, M. Orfila s'est assuré par différentes expériences, & contre l'opinion de M. Magendie, que l'extract gommeux d'opium de M. Robiquet parait être au moins aussi énergique, & même plus que l'extract gommeux d'opium du nouveau Codex.

Du reste, la narcotine donnée seule, à la dose de dix à douze grains dans l'huile, & par ingestion, agit comme poison, & donne, du troisième au quatrième jour, la mort, qui n'est pas précédée de vertiges, de paralysies des extrémités, de crises convulsives; phénomènes qui appartiennent à l'empoisonnement par l'opium, ou par un sel à base de morphine.

M. Orfila, qui s'est assuré de ce résultat par ses expériences, a vu aussi qu'un seul grain de nar-

cotine, dissous dans l'huile, & injecté dans la veine jugulaire d'un chien, pouvoit donner la mort dans vingt-quatre heures, après avoir occasionné un état de stupeur fort remarquable.

De nouvelles recherches cliniques seront peut-être reconduites, dans la suite, soit dans la narcotine, soit dans l'extract d'opium qui en est séparé, & qui semble devoir alors tout son effet à un méconate de morphine, des propriétés médicales très-impotentes; quel que soit, d'ailleurs, le résultat des expériences sur les animaux, toujours si éloigné des phénomènes que nous observons sur l'homme, & pendant le développement d'une sensibilité tantôt altérée, ou développée par un état morbide.

Nous avons rempli notre tâche, en exprimant franchement ce que nous ayons vu, ce que nous avons pensé, & nous attendons sans prévention tout ce qui pourra modifier, par des faits positifs, notre pratique ou notre théorie sur le point de doctrine thérapeutique, auquel cet article a été consacré. (*Voy. Moraines, Narcotiques, Opium.*)

N. B. Plusieurs ouvrages périodiques ou dogmatiques ont déjà traité de la narcotine, qui fut aperçue pour la première fois par Déroline, dont est à peu près le temps le nom. (*Seld de Déroline. Voyez, pour plus de détail, le n. 1 du Bulletin de la Société médicale d'émulation, 1820, & les Leçons de médecine légale de M. Orfila, 1 vol. in-8°, pag. 202, 207 & suiv.*) (L. J. M.)

NARCOTIQUES. (*Médecine légale, Hygiène, Matière médicale.*)

Narcotiques & Narcotico-acaux (Substances), de *narcos*, assoupissement, parce qu'en effet la stupeur, l'embarras du cerveau, l'assoupissement, l'état comateux, sont les résultats les plus frappants, les plus généraux de l'action des narcotiques données à une dose assez forte pour agir comme poison. Cet assoupissement porté au plus haut degré, est alors promptement suivi de la mort, & d'un genre de mort qui commence par la cerveau, sans que l'on doive toutefois le comparer à celui qui succède à l'apoplexie. On sait par différentes expériences sur les animaux, que cette mort, provoquée par les narcotiques, a toujours été plus rapide lorsque la substance vénéneuse étoit directement introduite dans les veines; qu'elle est plus lente quand la même substance est déposée dans le tissu cellulaire; qu'elle est plus lente encore, lorsqu'elle est introduite dans l'estomac. Si la même substance a été donnée, en lavement, il survient plus communément des vomissements, des nausées, & la disorde nerveux acquiert beaucoup plus d'intensité (1).

(1) Voyez la *Toxicologie générale* de M. Orfila, 2^e édit. tom. II, pag. 225.

Plusieurs familles de plantes sont remarquables par le nombre ou par l'énergie des substances narcotiques & narcotico-acres que fournissent leurs différents organes. Nous placerons au premier rang la famille des papavacées, dont le seul nom nous rappelle l'idée du plus puissant des narcotiques, de l'opium ; espèce de suc propre à laiteux, que l'on extrait du pédoncule & de la capsule du pavot rhébatique, ou même de nos pavots indigènes, avant la maturité. (Voyez OPIUM.)

Le *Cocquelicot*, l'*Argemone mexicana*, les *Fumeterres*, &c., sont aussi narcotiques ou soporifiques, mais à un très-faible degré.

Une famille beaucoup plus étendue & plus générale que celle des papavacées, celle des Solanées, contient un nombre très-considérable de plantes narcotiques & de plantes narcotico-acres. On regarde même, sans un petit nombre d'exceptions, toutes les plantes de cette famille comme douées de la propriété narcotique, qui se trouve plus ou moins développée dans leurs divers organes, dans les racines, par exemple, dans les feuilles & dans les fruits, qui présentent, de quelle soit ce rapport, un grand nombre d'analogies. Les solanées les plus fortement narcotiques, & qui sont considérées par cela même, comme des plantes éminemment vénéreuses, sont la belladone (*atropa belladonna*), les juponiames noirs & blancs, *hyoscyamus*, & la pomme épineuse (*datura stramonium*), plusieurs autres plantes de la même famille, moins actives, les morelles, par exemple, qui, sans perdre entièrement leur caractère narcotique, sont beaucoup plus calmantes que les simples éméliens, si on les emploie comme topiques. Il paroîtroit même, d'après les expériences de M. Dunal, que l'extrait de morelle, appliqué sur la conjonctive, occasionne la dilatation de la pupille (1).

La propriété nourissante des tubercules ou *excroissances* farineux qui se développent sur certains organes analogues aux tiges, dans la pomme de terre (*solanum tuberosum*), présente plutôt une anomalie, qu'une exception, dans l'histoire des solanées ; & malgré l'avantage d'offrir, dans ses tubercules, un des aliments les plus précieux à l'espèce humaine, le *solanum* dont nous parviens nous en servir sans mépris, dans les autres organes, mais surtout dans les feuilles, des analogies frappantes avec les autres plantes de la famille à laquelle il appartient.

D'autres plantes narcotiques ou narcotico-acres, les *Cigues*, la *Laiton vivrée*, l'*Aconit napol.*, le *Laurier-rose*, l'*Arisaema*, le trouvent éparses dans diverses familles.

Les effets produits par les différentes substances

que nous venons d'énumérer d'une manière assez incomplète, présentent dans la circonstance principale de leur action vénéreuse, des phénomènes communs ou généraux ; mais ces phénomènes se montrent avec des variations, avec des modifications souvent très-remarquables, & propres à se faire particulièrement de chacune de ces substances, dont les uns excitent ou suspendent les sécrétions, provoquent les symptômes douloureux, ou déterminent seulement des mouvements convulsifs, occasionnent la stupeur, ou le délire, & même plusieurs espèces de délire, &c. (Voyez nos articles sur ces différentes substances ; voyez aussi NARCOSISME, & plusieurs autres particulières sur cette altération morbide du cerveau ; dans l'article MÉNÈGE, MENTALISME de ce Dictionnaire, tom. IX.)

Les symptômes communs ou généraux que l'on peut rapporter à la plupart ou des différentes substances, sont une irritation violente, quoiqu'étrangée à toute espèce de disposition phlogistique, un excrément du cerveau, presque instantanément suivi de la stupeur, de la congestion, du coma, & une issue plus ou moins prompte, suivant que la substance vénéreuse a été absorbée avec plus ou moins de rapidité. Ce qui est encore commun à l'action des mêmes substances narcotiques, & qui les fera distinguer de l'apoplexie & d'une disposition épileptique, c'est de pouvoir être combattus avec efficacité, par des médicaments particuliers & spécifiques, qui sont toujours efficaces quand elles ont habilement administrées, & que le narcotisme n'est pas arrivé à son dernier terme.

Parmi les substances narcotico-acres qui ont été indiquées dans cette rapide énumération, le plus grand nombre, au moins, n'agit sur le cerveau qu'après avoir excité une irritation locale plus ou moins forte, & ne donne lieu que consécutivement au narcotisme ; telles sont les feuilles de tabac, l'achillée, &c., &c. (Voyez NARCOSISME.) Les effets de ces mêmes substances, & de plusieurs autres, présentent d'ailleurs diverses altérations morbides très-singulières, & qui ne se renouvellent pas dans l'action des narcotiques simples.

Les substances narcotiques & narcotico-acres ont souvent été, entre des mains coupables, le moyen d'un empoisonnement volontaire & provoqué, tantôt avec l'intention d'un véritable assassinat ou d'un suicide, tantôt dans la seule vue de jeter dans un assoupissement qui rendit le vol, ou tout autre délit, plus facile à commettre. Les Annales des causes célèbres contiennent plusieurs exemples de ces empoisonnements, parmi lesquels nous nous contenterons de citer le procès des *empoisonnés du Midi*, qui excita si vivement l'attention dans le dix-huitième siècle.

Les vénéreux que l'on désignoit sous ce nom, parvenant ordinairement à faire prendre aux viciés qu'ils avoient dépouillés, du tabac ou du vin.

N. A. R.

(1) L'extrait de morelle noire, quoiqu'un peu vénéreux, agit néanmoins à la longue, quand il est donné à dose assez forte, & non par intervalles, la motilité & la sensibilité. (Voyez les Expériences de M. Oulie, Op. cit. tom. II, pag. 218.)

mêlé avec une certaine quantité de pomme épineuse, sèche & réduite en poudre. Le chef de cette bande avoua dans son interrogatoire que plusieurs personnes avoient succombé à cette espèce d'empoisonnement ; & que les autres qui avoient survécu, parce que la dose du poison n'étoit pas très-forte, avoient été plongés, tantôt dans un véritable délire, & tantôt dans un accablement fébrile. Sauvages, qui rapporte ce fait, est plusieurs fois l'occasion d'interroger différents individus qui s'étoient laissés surprendre par voleurs. Ces malheureux, dit-il, s'endormoient d'abord, ils se réveillaient ensuite, mais dans un état de folie, disant ou faisant des choses les plus extravagantes ; lorsque le délire étoit terminé, les malades étoient très-faibles (2).

Les médecins experts qui seroient consultés pour des cas analogues, ne peuvent montrer trop de circonspection ou de prudence dans leurs rapports ou considérations médico-légales concernant des matières aussi délicates : la substance vénéneuse, employée dans ces circonstances, étant nécessairement très-altérée ; presque toujours absorbée, ce qui rend difficile, pour ne pas dire impossible, toute espèce d'épreuves pour l'obtenir & pour la reconnaître.

D'une autre part, les altérations organiques, produites par ces mêmes poisons, ne sont point assez caractérisées pour fournir aucune conclusion descriptive dans une information juridique : remarque qui s'applique également aux symptômes de l'empoisonnement qui a été provoqué par les mêmes substances. On ne découvre aucune altération, dit M. Orfila, de ce sujet, dans le canal digestif des individus qui ont avalé une substance narcotique, & l'on raconte dans les auteurs, des faits contraires à cette assertion, cela dépend de ce que l'on a administré avec le narcotique, des substances irritantes capables de produire une inflammation.

Suivant le même auteur, à la suite du même empoisonnement, les vaisseaux du cerveau & des méninges sont très-engorgés ; les poumons paroissent d'une couleur violette ou d'un rouge plus foncé que dans l'état naturel, ce qui coïncide avec la gêne de la respiration de leurs tissus, du moins dans quelques-unes de ses parties. La fluidité prolongée du sang contenu dans les veines, que quelques médecins experts avoient regardée comme un signe de l'empoisonnement par les narcotiques, n'est point un fait constant, & souvent, dans ce cas, on a trouvé, peu de temps après la mort, le sang coagulé dans ses vaisseaux (3).

Les considérations hygiéniques sur les narcotiques, qui n'ajoutent pas, comme la médecine lé-

gale, un haut degré de certitude pour être utiles, doivent être présentées avec quelques développemens, dans un ouvrage aussi étamment consacré que l'encyclopédie, à la propagation des vérités qui sont le plus susceptibles d'une application utile, dans les différentes occurrences de la vie.

Les exemples d'empoisonnements accidentels, occasionnés par les narcotiques, qui exigent les soins les plus actifs & les plus éclairés, se rencontrent souvent dans la pratique, & peuvent être presque toujours attribués à des négligences ou à des méprises, sur lesquelles il importe d'attirer l'attention.

Les plus fréquens de ces empoisonnements se rapportent à l'opium, soit que cette substance ait été employée à trop forte dose, par méprise, soit qu'elle ait été donnée dans l'intention d'un suicide, ou à dessein beaucoup plus foible, mais capables cependant d'exciter des symptômes d'empoisonnement par suite d'une disposition constitutionnelle, ou d'un état morbide particulier, qui semble se rattacher avec une espèce d'antipathie toute espèce de préparations opiacées.

Plusieurs autres substances narcotiques peuvent également donner lieu à divers empoisonnements accidentels & volontaires, très-graves ; ainsi, les acanis, mais surtout l'acanis uapal, dont les racines se confondent aisément avec celles des panais, & les jeunes pousses avec celles du céleri, ont été employées plusieurs fois comme substances alimentaires, & toujours avec les symptômes d'un empoisonnement très-grave, dont Viciat a fait connaître plusieurs exemples dans son *Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse*. Les feuilles de l'edera perillée, *Athusa cynapium* L. ; les différentes espèces de ciguës (*Conium maculatum* L.) ne se distinguent qu'avec beaucoup d'attention des feuilles de persil. La graine de la ciguë ressemble en outre beaucoup à celles du fenouil. L'imprudence, l'inexpérience, trompées par ces similitudes illusoires, ont fait trouver plusieurs fois un poison redoutable, dans ce qu'on avoit pris pour un légume agréable ou salubre.

Les belladones baccifères, que l'on cultive dans plusieurs jardins, portent des fruits d'un noir luisant dans leur maturité, & dont la belle apparence & le goût sucré ont souvent porté les enfans à en manger. Voici un exemple fort remarquable de cette méprise, tiré de l'*Histoire des plantes vénéneuses* de Boissier.

« Deux enfans de la Piété s'arrêtèrent au Jardin des Plantes, auprès d'un pied de belladone chargé de fruits, & en mangèrent des uns plus, les autres moins. Ils se plaignirent bientôt d'enivre de vomir, de maux de tête, d'époussèment d'angouilles ; ont des douleurs fort incertaines sur des symptômes aussi graves, lorsqu'un de ces pauvres enfans revint en vomissant, & presque dans leur entier, le plus grand nombre des

(1) Voyez *Néologie de Sauvages*, tom. II. Voyez aussi *Garbieri* *Histoire des plantes de l'Europe*.

(2) Voyez *Orfila*, *Opusc.* pag. 101 & 102. Voyez aussi les *Lectures de médecine légale* de ce même auteur, pag. 118.

fruits qu'il avoit avalés. MM. Thonin & M. Brun alors chirurgien de la Pitié, reconnurent le caractère de ces fruits & la source du mal qui étoit un véritable empoisonnement.

Parmi les petits malades, les uns paroissent dans la stupeur, d'autres dans l'ivresse; le plus grand nombre étoit furt agité; mais aucun ne mourut, soit parce que l'empoisonnement n'avoit pas été porté au plus haut degré, soit parce qu'un traitement convenable fut employé à temps pour en arrêter les symptômes. (Voyez BELLARD, *Op. cit.*, in-8°, pag. 201.)

Les exemples d'empoisonnement accidentels, on par méprise, que produit la jusquiame noire (*Hyoscyamus niger*), sont peut-être encore plus fréquents & plus graves que tous ceux que nous avons cités, en qui peuvent être occasionnés par différentes faiblesses narcotiques.

Les racines de cette plante, qui sont données au goût, & que l'on peut aisément confondre avec celles de plusieurs plantes potagères, ont été mêlées plusieurs fois avec des aliments, ou mangées seules; ce qui toujours a produit les symptômes les plus graves de l'empoisonnement. Vicat, qui nous avons déjà cité, Linné, Haller, rapportant plusieurs exemples de ces accidents. Van-Swieten, en particulier, assure que les racines de la jusquiame, mangées au printemps pour celles du panais, ont rendu des hommes ivres, furieux, en provoquant une espèce de délire qui s'est terminé par la stupeur & l'imbécillité. Boerhaave éprouva sur lui-même les premiers symptômes d'un pareil empoisonnement, pour avoir préparé un emplâtre dans la composition duquel on faisoit entrer la jusquiame.

Il seroit sans doute superflu de citer un plus grand nombre d'exemples du genre d'empoisonnement par les narcotiques, dont l'hygiène doit plus particulièrement s'occuper, soit pour exciter une surveillance salutaire & préventive, soit pour indiquer des préceptes ou des conseils, sur la conduite médicale qu'il faut suivre pour arrêter les effets de ces méchants empoisonnements. Ces conseils sont de la plus haute importance; ils n'ont pas moins, d'ailleurs, pour objet de signaler, de combattre plusieurs erreurs populaires très-dangereuses, que de prescrire le traitement le plus efficace & le plus conforme à la raison & à l'expérience. Une de ces erreurs les plus funestes, & que plusieurs médecins partagent malheureusement, est encore avec le peuple, c'est l'opinion généralement répandue, & d'après laquelle on administre, dès le commencement de l'empoisonnement par les narcotiques, des boissons abondantes, mais surtout des boissons acidulées; il n'est pas moins contraire à une saine pratique d'admettre que le camphre peut être employé comme l'antidote de l'opium.

Les boissons acidulées, telles que toutes celles que l'on prépare avec le vinaigre, le suc de ri-

tron, &c., ne peuvent convenir que lorsqu'il ne reste plus dans les premières voies aucune parcelle de matière narcotique. Les expériences de M. Orfila ne laissent aucun doute sur cette question, & prouvent, jusqu'à l'évidence, que les acides possédant la propriété de dissoudre l'opium & plusieurs autres narcotiques, on donne nécessairement plus d'intensité à leur effet, si on administre ce précéda antidote d'une manière intempestive.

Le même auteur s'est assuré, par des recherches également concluantes, que le camphre, donné à fortes doses avec l'opium, n'a point altéré les effets de ce dernier, & paroît même avoir surchargé cet empoisonnement, de plusieurs symptômes d'irritation qui ne se manifestent pas dans le narcotisme simple.

Le traitement à prescrire dans les empoisonnements par les narcotiques, a deux objets; le premier, de faire expeller, s'il est possible, la matière du poison, & le second, d'arrêter, par des médications véritablement antidotiques, les effets ultérieurs & généraux de l'empoisonnement.

La première indication se remplit ou par les vomitifs, ou par les purgatifs. Les moyens les plus prompts sont, dans ce cas, les meilleurs; ainsi, l'on cherchera d'abord à faire vomir avec une larbe de plume, ou en portant les doigts dans l'arrière-bouche. Si cette première tentative est insuffisante, il fera argent de donner quatre à cinq grains de tartre antimonial de potasse (émétique) dans le véhicule le moins abondant, afin de ne pas contribuer à dissoudre la matière narcotique, & à favoriser son absorption. Si le vomissement n'est pas excité au bout d'un quart d'heure, M. Orfila recommande d'administrer vingt-quatre grains de sulfate de zinc (couperose blanche) dans un verre d'eau, en deux fois, de quart d'heure en quart d'heure, si la première dose n'a point fait vomir. Le même toxicologiste ajoute; & malheureusement sans s'appuyer sur des faits tirés de la pratique médicale, que si tous ces moyens avoient échoué, il faudroit faire prendre trois à quatre grains de sulfate de cuivre dans un verre d'eau. Quant aux purgatifs que l'on peut administrer convenablement, ils sont indiqués dans tous les cas où l'on pourra penser que la substance narcotique est parvenue dans les intestins. Il nous paroit, ainsi d'avertir que toute cette première partie du traitement seroit sans objet, si le poison n'avoit pas été introduit dans les voies digestives, mais appliqué sur une blessure, & qu'il faudroit, dans ce cas, ne s'occuper que du narcotisme.

Les médicaments que nous appelons *antidotes*, qui, on uniquement pour lui d'agir sur le système nerveux, & de faire cesser le narcotisme par des médications spécifiques, dont l'effet, convenablement dirigé, ne paroît pas moins efficace alors que le quinquina, dans cette espèce d'ataxie qui, lorsqu'elle est abandonnée à elle-même, ra-

même incessamment chaque accès d'une fièvre pernicieuse, & conduit ainsi à une terminaison funeste.

Le café, les acides, sont principalement employés pour développer les médications antinarcotiques dont nous venons de parler.

Le café doit être assez fort, & il importe de le préparer, en faisant bouillir pendant dix minutes huit onces de café très-peu torréfié dans un litre d'eau. Les acides sont employés d'une quantité suffisante d'eau, & de manière à former une boisson acidulée. On préfère l'acide du citron non peut néanmoins employer également les acides que l'on trouve sous sa main, le vinaigre, par exemple, la crème de tartre, le verjus; on donne alternativement, & de dix minutes en dix minutes, une petite tasse de ces boissons acidulées, & une semblable dose de café. Les mêmes préparations peuvent être données en lavemens avec beaucoup d'avantage, mais surtout lorsque le narcotisme fait des progrès rapides, & lorsque l'on peut supposer, qu'il est resté quelques portions du poison dans les premières voies.

Des bains de pieds stimulans, une saignée du pied ou de la jugulaire, & à la suite de ces moyens, l'application de la glace sur la tête, seroient employés avec avantage si la congestion vers le cerveau étoit trop considérable & la fièvre trop profonde.

La saignée pourroit même, dans certains cas, être employée concurremment avec les vomitifs, & pour en favoriser les effets, comme le prouve l'observation ci-jointe de M. Price, de Philadelphie, citée de M. Orfila, & insérée dans l'ouvrage de ce laborieux physiologiste.

« Étant attaché à un dispensaire, en 1810, dit M. Price, je fus appelé pour voir une vieille femme qui étoit plongée dans un état de stupeur profonde (*Orfila*, t. II). Sa respiration étoit stertoreuse, & l'haleine avoit une odeur opiacée; enfin, on observoit tous les symptômes qui indiquent une congestion cérébrale. Je la secouai fortement pour la réveiller, mais aussitôt après elle retomboit & paroissoit profondément endormie. On ne put me donner aucun renseignement sur la cause de cette affection, mais je soupçonnai qu'elle avoit été produite par le laudanum, soit par l'odeur que la malade exhaloit par la bouche, soit parce que je trouvais auprès du lit une fiole vide, dans laquelle il étoit resté de voir qu'il y avoit eu du laudanum. J'administrai donc grains de tartre stibié en dissolution concentrée, & j'irritai le gosier avec les barbes d'une plume. Voyant, au bout d'une demi-heure, qu'il n'y avoit aucune évacuation, je me décidai à faire prendre vingt grains de sulfate de zinc; quelques heures après, le vomissement n'ayant pas eu lieu, & le sang, étant très-fort & très-fréquent, je crus devoir saigner aux *Jugulæ*. Aussitôt que le

« sang coula, la malade vomit, & les symptômes d'empoisonnement diminuèrent. J'ordonnai les boissons acidulées, & le lendemain il ne restoit que de la saignée & de la confusion dans les idées. La malade m'avoit qu'elle avoit avalé, avant mon arrivée, deux onces de laudanum dans le dessein de se suicider. »

Le camphre, qui n'est pas l'antidote de l'opium, comme quelques personnes l'avoient pensé; peut être cependant employé avec avantage, & à petite dose, pour contribuer à dissiper le narcotisme; dans ce cas, on donna quelques grains de camphre dans un quart de lavement, de deux heures à deux heures.

Les considérations hygiéniques qui précèdent sont tirées, en grande partie, de l'ouvrage de M. Orfila; & quoiqu'elles se fondent en général sur différentes expériences auxquelles divers animaux, & principalement les chiens, ont été soumis, nous les trouvons entièrement conformes, autant que nos expériences & nos lectures nous permettent de l'affirmer, avec les résultats les mieux connus de la pratique médicale. Pour appuyer cette assertion, nous croyons devoir citer les deux exemples suivans, extraits de notre Mémoire clinique.

Mademoiselle **, âgée d'environ quarante ans, & livrée depuis plusieurs mois à une profonde mélancolie, prit dans une seule fois, & avec l'intention de terminer ses souffrances avec la vie, dix-huit grains d'extrait gommeux d'opium, qu'elle avoit laborieusement & soigneusement amalgamés en un, en faisant usage d'une formule médicale qu'elle avoit conservée.

Elle fut pendant plus de quatre heures sans pouvoir éprouver aucune espèce d'accident. Un peu plus tard, la tête s'embarassa, il y eut du délire, de la stupeur; avec tous les signes d'une congestion sanguine vers la tête, mais sans aucune espèce de désordre du côté des voies digestives. L'époque de l'empoisonnement étant déjà très-éloignée, je ne crus pas devoir faire usage des vomitifs; j'eus recours à l'application de vingt sangsues derrière les oreilles & à la nuque; je provoquai en même temps un écoulement très-vif sur les extrémités inférieures, tandis que la tête étoit presque constamment recouverte avec une calette de glace. Je jignai, d'ailleurs, à un traitement externe aussi efficace, l'usage du café & des boissons acidulées, données alternativement de quinze minutes en quinze minutes, mais avec la précaution de faire avaler seulement le café, & de donner les boissons acidulées en lavemens. Ce traitement fut prescrit à huit heures du matin; à deux heures le narcotisme commença à diminuer; la malade pouvoit répondre quand on l'appelloit à haute voix, mais retomboit ensuite dans une espèce de sommeil léthargique. A quatre heures elle put proférer quelques paroles, & sentit les cataplasmes stupéfiés dont les pieds avoient été recouverts à plusieurs repri-

tes dans la journée. Un peu plus tard, & dans la cours de la soirée, cette infortune retrouva toute sa lucidité, mais avec une surprise-douloureuse, & en se plaignant de ce qu'une sollicitude mal entendue l'eût empêchée de terminer à son gré une existence qui lui étoit devenue insupportable.

L'auteur de plusieurs romans de mœurs, très-estimés, la célèbre *miss* **, dont quelques circonstances particulières avoient fixé le séjour à Paris, venoit d'être opérée d'un cancer au sein depuis quelques jours. Pour combattre des symptômes nerveux qui se développoient alors, & qui sembleraient faire attendre une fièvre ataxique, le chirurgien qui avoit pratiqué l'opération, prescrivit un lavement avec douze grains de camphre : une eruelle méprise fit substituer à cette substance douze grains d'opium, qui furent administrés avec autant de sécurité que d'imprudence. Six heures après cette méprise, les symptômes du plus effrayant narcotisme commencèrent à se manifester ; il survint des vomissemens, des nausées, avec beaucoup d'angoisses & d'agitation ; la malade reconnoissoit à peine les personnes qui l'entouroient, & ne sembloit avoir qu'une idée confuse de la situation actuelle & de l'ensemble de son existence ; elle entendoit encore, mais distinguoit à peine les objets qui l'environnoient, & sa tête s'engageant de plus en plus après quelques symptômes de délire, il survint un état comateux que l'on pouvoit à peine interrompre par les bruits les plus forts & par les stimulations les plus énergiques. Les douleurs du sein, qui étoient très-fortes avant cet accident, & la suppuration qui commençoit à s'établir, s'arrêtèrent lorsque le narcotisme le trouva porté à un pareil degré. Une situation aussi grave devoit depuis quelques heures lorsque j'arrivai auprès de la malade. Ne pouvant attendre que la matière résineuse eût été entièrement absorbée, je m'empressai d'administrer, sans perdre du temps, les médications les plus propres à faire cesser le narcotisme aussi prompt, & qui ne me paroissent pas pouvoir prolonger quelques instans, sans devenir funeste. Des quarts de lavement, avec une forte décoction de café, acideulé, & une boisson acide, furent donnés alternativement, d'abord, de quart d'heure en quart d'heure, puis de demi-heure en demi-heure : on couvrit en même temps les extrémités inférieures de cataplasmes sinapies, & on fit usage de toutes les stimulations extérieures qui parurent les plus propres à réveiller la sensibilité & à faire cesser l'engourdissement. Ce traitement fut continué à neuf heures du matin, & à midi on put se flatter à peine quelques succès. A une heure, cependant, la malade paroissant se réveiller quand on l'appelloit à très-haute voix ; bientôt elle proféra quelques paroles, & les paupières ayant pu se hausser, on reconnut que des pupilles n'étoient pas très-dilatées. Les suurs froides & salivales furent alors remplacées par une douce moiteur ;

les douleurs de la poitrine réveillèrent ; & avec elles la sensibilité de toutes les parties. Le traitement fut continué jusqu'à six heures du soir, mais avec de plus longs intervalles ; à huit heures l'incroyable *miss* ** étoit presque dans son état naturel. Il ne restait plus qu'un grand assaïement, une espèce de vague ou d'embaras dans les idées, accompagné, d'ailleurs, du plus grand calme.

Depuis cet accident, dont les suites différencièrent entièrement le premier degré d'ataxie qui s'étoit manifesté, la situation de la malade ne fut plus troublée par aucune espèce de symptômes accidentels, & la cicatrisation de la plaie-pain même s'opéra plus rapidement & avec moins de difficulté, que dans les cas ordinaires les plus favorables.

Les narcotiques, que nous venons de considérer comme des poisons, ont été employés depuis un temps immémorial comme les médicaments les plus précieux, comme les moyens de faire cesser l'insomnie ou de suspendre le sentiment de la douleur présente & le souvenir des maux dont le temps n'a pas détruit l'amertume. Les Népenthés, dont les chants d'Homère ont célébré l'effet bienfaisant, appartiennent évidemment à cette classe de médicament. Dans les siècles & chez les peuples les plus éclairés, les médecins occupés d'une grande pratique ont proclamé à leur tour, & fust être arrêtés par les idées de Stahl, les effets salutaires des narcotiques (1).

On se fait pas seulement usage des narcotiques en général, ou de l'opium en particulier, pour ramener le sommeil, pour faire cesser la douleur ou le spasme, & réprimer certaines sécrétions morbides, ce qui est propre à l'opium & l'un de ses grands avantages. On les donne aussi, ou du moins quelques-uns (2), dont l'action thérapeutique laisse beaucoup à désirer, pour rompre le cours de certaines affections chroniques très-graves & très-complicées.

Quels sont, & en éliminant toute idée de curatation, les effets primitifs des narcotiques ? ce qu'on appelle si improprement dans les écoles leurs effets physiologiques ? Comment ces médications doivent-elles être considérées sous le point de vue thérapeutique, & en la dirigeant moins d'après des vues théoriques que d'après les résultats d'une longue & saine expérience ?

(1) Sydenham déclare, que la médecine sans opium étoit manquée & défectueuse. *Ut sine illis morbis sit, ac clandestinis medicamentis.*

Sylvius va plus loin encore, & déclare qu'il seroit renoncé à la médecine, si on lui avoit interdit l'usage de l'opium ; époque d'ignorance de soi qu'il seroit difficile de ne pas faire, dans le but de son art, & lorsque l'on a vu de traiter un grand nombre de malades, sans recourir à la morphine & la dose d'alléger des souffrances, qu'il n'est pas possible de faire cesser.

(2) Les opies (*Conium maculatum*), la pierre précieuse (*Lithium stramonium*), l'aconit napel (*Aconitum napellus*), la jusquiame noire (*Hyoscyamus albus*), etc.

Les narcotiques les plus efficaces, mais principalement l'opium, le stramonium, la jusquiame, & fins d'ont le plus grand nombre des substances analogues, doivent tout leur effet à un alcali particulier qu'elles contiennent (1); ce qui leur est commun avec les médicaments les plus énergiques tirés du règne végétal, tels que la tève de Saint-Ignace, la noix vomique, l'upas tiétié, qui donnent la *strychnine*; le quinquina & l'ipécacuanha, dont on a obtenu la *quinine*, la *cinchonine* & l'*émétine*, &c.

Notre première question, qui a pour objet de déterminer quels sont, dans les narcotiques, les effets du principe d'action qui leur est propre, auroit pu être traitée dans les considérations qui précèdent; mais elle nous a paru appartenir davantage à ce troisième article, qui doit embrasser à-la fois les résultats des expériences toxicologiques & les conséquences plus variées peut-être & plus étendues d'une grande pratique médicale. Il a régné pendant long-temps, & il régné encore dans les écoles, une grande dissidence d'opinions sur la question de savoir, si les narcotiques doivent être regardés comme des excitans. Chacun, à ce sujet, a proposé des explications ou des hypothèses plus ou moins ingénieuses. Si l'on se borne à regarder comme des débilisans, comme des calmans, les moyens thérapeutiques qui déterminent d'une manière directe un abaissement temporaire, général ou local, dans l'exercice des propriétés vitales, ce qui n'appartient qu'aux médications soporatives & émollientes (2); il est évident que l'on ne doit pas rapporter les narcotiques à cette classe de médicaments.

En effet, l'action de l'opium & des autres narcotiques ne peut pas être comparée à la laignée, à la diète, & aux applications adouciissantes, lors même que cette action est suivie de la suspension rapide de l'iritation la plus douloureuse; ce qui ne peut arriver alors que par une sorte de révulsion antidotique & spécifique, qui fait succéder l'état naturel ou normal à un état morbide du système nerveux: d'une autre part, l'excitement produit par l'opium dans plusieurs circonstances, & proclamé par Tralles & par Brown avec tant d'enthousiasme, ne peut être révoqué en doute, lorsque l'on s'accorde l'importance qu'elles méritent, à plusieurs observations médicales & aux récits des voyageurs qui ont le mieux observé les usages & les usages des Orientaux (3).

Toutefois, l'action des narcotiques à quelque chose de si particulier, de si éloigné de ce que nous connoissons des autres stimulans & des autres irritans, que M. Orfila pense, avec raison, & d'a-

près de nombreuses expériences, que ce mode d'action ne peut être désigné exactement par aucune dénomination actuellement en usage dans la nomenclature médicale: ce qui caractérise, d'ailleurs, cette action des narcotiques simples, c'est même qu'elle se termine par la mort, & de occasionner aucune inflammation, & de concentrer toute son énergie sur le cerveau. En ne considérant les effets des narcotiques que sous le point de vue thérapeutique, nous n'hésiterons pas à les rapporter à une classe de médicaments antidotiques ou révulsifs, qui n'opère la sédation que d'une manière indirecte & comme anti-atonique, ce qui est l'opposé des sédations directes ou anti-phlogistiques (1).

L'effet local & très-prompt des narcotiques dans certaines circonstances, la propriété qu'on leur attribue de diminuer, avant d'occasionner le narcotisme, la sensibilité d'une partie douloureuse sur laquelle on les applique; cette propriété, & la rapidité des effets généraux qui succèdent à cette même application, avoient fait penser, sans rejeter l'absorption, que l'effet des narcotiques se portait directement sur les expansions nerveuses; & s'étendoit ensuite, par sympathie, jusqu'au cerveau.

Les expériences de Nysten, qui font d'ailleurs d'accord avec les données les plus positives de la physiologie, concernant ce point de théorie, ne permettent pas d'adopter aujourd'hui cette opinion: l'on s'est même convaincu par d'autres expériences, que l'application des narcotiques simples sur les muscles, ne détermine pas leur contractilité, & que l'opium, porté lui-même sur le cerveau, produit des symptômes d'irritation qui n'ont rien de commun avec le narcotisme.

La condition d'être absorbés paroît exclusive, rigoureuse, dans les effets ordinaires des narcotiques, & plus cette absorption est rapide, & plus ces effets seront promptement développés. Ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, la laignée, les purgatifs très-forts, l'abstinence, toute espèce de saignée & de vacuité favorisent l'action des narcotiques, & donnent lieu, sous ce rapport, à des particularités qui seront aisément comprises si on veut admettre l'absorption veineuse, & les idées de M. Magendie sur cette absorption. On fait, en outre, & comme nous l'avons déjà indiqué, que les effets des narcotiques ne sont jamais ni aussi prompts, ni aussi redoutables que lorsque le poison a été introduit directement par les veines.

Dans l'état présent des connoissances, nous sommes bien éloignés, sans doute, de pouvoir déterminer avec exactitude comment cette substance vénéneuse, qui est absorbée, peut produire le genre d'effets qui lui est propre: effet qui se manifeste par des phénomènes dont il importe de ré-

(1) Voyez *Morphine* & *Stramonium*.

(2) Voyez dans ce Dictionnaire l'article *Médications*, tom. IX, page 551.

(3) Voyez le tome X de ce Dictionnaire, article *Mandragora*, page 183.

(4) Voyez l'article *Médications*, page 553, tom. IX, colonne 1, 10.

connaître le phénomène par une sévère analyse, la subordination & l'enchaînement.

Le phénomène principal, d'où paroissent dépendre plusieurs effets secondaires & moins constants, c'est le changement qu'il opère dans le cerveau, d'où de mode d'action & les relations avec les autres organes, tout sensiblement modifiés par les narcotiques en général, & par l'opium en particulier, même à une dose très-faible. Ce changement peut ne se manifester que par une sorte de léthargie, & par la suspension d'une douleur accompagnée de spasme, aussi qu'on l'observe dans l'emploi de l'opium, administré en lavement, pour calmer ou pour faire cesser le ténisme & les horribles souffrances, que le cancer de l'utérus fait souvent éprouver, dans son dernier période. Si la dose est un peu plus forte, le narcotisme, qui commence plus tôt ou plus tard, s'annonce, suivant son intensité, tantôt par un véritable excès intellectuel, par des dispositions, soit à l'insomnie, soit à une rêverie pleine de charmes, tantôt par la douleur de tête, par la somnolence involontaire, ou par divers symptômes de délire, & enfin par l'état comateux & soporeux qui conduit à la mort, si la progression de l'empoisonnement n'est pas arrêtée par les moyens du traitement le plus énergique.

Tous ces phénomènes se rapportent bien évidemment à l'encéphale, & lorsqu'on les observe sans prévention, il est impossible de ne pas reconnaître que les narcotiques agissent d'une manière toute élective, pour modifier l'état du cerveau, que le Métronome, pour provoquer le tétanos, le jure-brûlé, pour exciter la vomitance, les cathartiques, pour déterminer l'irritation de la vessie, d'autres substances purgatives ou laxatives, pour augmenter la sécrétion des gros intestins & de l'appareil urinaire. Ajoutons qu'il suffit, dans plusieurs circonstances, que le cerveau ou le système nerveux se trouve dans une condition particulière, pour résister ou pour s'opposer même entièrement à l'action des narcotiques, comme on le voit si souvent dans le tétanos, chez les hydrophobes & chez plusieurs autres, pendant lesquels ces agents les plus violens de la nature.

Les influences secondaires de l'opium sur un grand nombre d'organes, loin de porter atteinte à l'opinion que nous adoptons, la confirmeraient tous au contraire; si nous connoissions mieux l'état intime des fonctions cérébrales, le leur degré d'influence sur les autres fonctions, dans l'état de santé ou dans l'état morbide.

Un de ces effets consécutifs & le plus remarquable, que nous venons d'indiquer, la suspension de la douleur, pourroit-il se concevoir autrement que par l'influence d'un nouvel état du cerveau, qui agit sur la partie affectée, & ramène, au moins pendant quelque temps, la sensibilité à son rythme naturel, dont une irritation morbide l'a voit éloignée?

D'autres phénomènes, diverses altérations mor-

lides de la contractilité ou de la sensibilité, l'ardeur de la bouche, la soif, les nausées, le vomissement, par exemple, la flaccidité de l'estomac, la constipation, la lenteur du pouls ou son irrégularité, ou même son intermittence, la débilité musculaire, sont trop liées, dans tous les cas, à l'action cérébrale, pour ne pas les rapporter à cette même action, dans les changements que les narcotiques font éprouver à l'encéphale.

Quoi qu'il en soit, plusieurs autres symptômes dépendans de l'action des narcotiques, sont éprouvés par les différents organes, & doivent être observés avec soin, lors même qu'il seroit impossible d'en découvrir le rapport avec les phénomènes encéphaliques.

Un de ces effets secondaires le plus constant, consiste dans la diminution, dans la suspension ou la perversion du plus grand nombre des sécrétions; phénomène fondamental, auquel se rattachent, comme l'effet à sa cause, l'état pâteux de la bouche, l'affaiblissement des fonctions digestives, la diminution des urines & même du sperme, &c.

Nous ayons déjà remarqué que, dans plusieurs circonstances, il est difficile de ne pas admettre, que l'application d'un narcotique sur une partie élective & douloureuse, n'en modifie directement les propriétés; il est également probable que cette même substance narcotique, introduite dans les voies circulatoires, agit aussi dans quelques circonstances, & dans l'intercession du cerveau, sur des organes qui sont momentanément un centre de fluxion ou d'irritation.

CONSIDÉRATIONS THÉRAPEUTIQUES.

Les narcotiques, qui dans les phénomènes d'empoisonnement, présentent une manière d'agir véritablement analogue dans ces circonstances fondamentales, n'ont presque rien de commun, lorsqu'on les considère sous le point de vue de la thérapeutique; & ce qui les concerne, sous ce rapport, ne peut être bien saisi avec détail, que dans les articles consacrés à chacune de ces substances. (Voyez NAPIEL, OPIUM, SBLAXIES, STASMOXYN.) Nous devons, en conséquence, nous borner, dans ce troisième & dernier article, à un petit nombre de considérations générales.

On donne les narcotiques comme des médicaments, sous différentes formes, mais principalement en extraits aqueux (les extraits gommeux d'opium, de jusquiame blanche & noire, de belladone, de stramonium, de ciguë, &c. &c.).

La dose, plus ou moins forte, suivant la nature de ces différents extraits, peut n'être que d'un quart ou d'un huitième de grain, & même plus faible pour l'opium. On peut les donner progressivement, mais à des doses assez fortes, surtout pour les extraits de ciguë & de jusquiame noire. Les limites de ces doses ne peuvent pas véritablement être indiquées; nous dirons seulement, qu'il ne faut jamais aller au point d'opérer les plus légers changements mor-

000

lides du cerveau, tels qu'un commencement de narcotisme, la céphalalgie inter-orbitaire, les nausées, l'inappétence, ou quelques phénomènes du même genre; le vertige, la loibesse, le trouble de la vue, l'exaltation de quelques sens, les fausses perceptions, un état extraordinaire de l'entendement, &c. &c.

Les doses nécessaires pour occasionner de semblables altérations sont très-variables, suivant la complexion des individus ou le caractère des maladies; on les porte depuis deux ou trois grains, par exemple, chez quelques personnes, jusqu'à douze, vingt, quarante, & même cent grains, pour certains extraits particuliers, tels que l'extrait de joshuisme, dans le traitement du tré douloureux, & l'extrait de ciguë employé pour combattre, soit des douleurs de tête névralgiques, soit des engorgemens scrophuleux & squirreux.

Les narcotiques simples sont principalement indiqués, quelle que soit la nature de la maladie, pour les personnes qui les ont essayés avec quelques succès, & chez lesquelles on ne peut supposer, dans le moment de leur emploi, aucune disposition inflammatoire générale ou particulière, aucune plénitude vasculaire, aucune congestion sanguine, surtout vers les parties supérieures; enfin, aucune de ces prédominances de l'action cérébrale, que détermine un genre de vie complètement sédentaire.

Une seule de ces circonstances apporte souvent de très-grandes variations dans l'effet des narcotiques; tel, par exemple, qui fait immanément usage de l'opium pour combattre certaines irritations non fébriles ou non inflammatoires, s'en trouvera fortement incommodé, éprouvera des nausées, la sécheresse de la bouche, la céphalalgie inter-sourcilère, la somnolence laborieuse, s'il fait usage du même médicament sous l'influence bien marquée d'une fièvre essentielle ou symptomatique.

L'irritation vasculaire & nerveuse, qui précède & qui accompagne souvent l'éruption menstruelle, peut aussi, & sans avoir un caractère morbide, occasionner des variations semblables dans l'effet des narcotiques. En voici un exemple assez remarquable: Madame D^{ne} **, âgée de trente-neuf ans, faisoit usage depuis quinze jours, & avec beaucoup de succès, pour arrêter une toux convulsive, d'une potion opiacée & contenant un grain d'extrait gommeux d'opium, trois fois océes de véhicule, à prendre en deux fois, le soir & le matin. Le seizième jour, la même potion ayant été administrée de la même manière, provoqua tous les symptômes d'un narcotisme assez développé, tel que les nausées, la sécheresse de la bouche, le trouble des idées, & un commencement d'état soporeux. L'usage alternatif du café & des boissons acidulées pendant quelques heures, dissipâ bientôt ces symptômes, qu'on ne put raisonnablement attribuer qu'à l'irritation menstruelle

qui venoit de se manifester, & qui fut suivie le lendemain de l'éruption des règles.

Toutes choses égales d'ailleurs, on peut affirmer, en thèse générale, que tous les malades supporteront d'autant mieux l'emploi des narcotiques, qu'ils se trouveront plus directement dans les situations morbides où l'on réclame l'usage, telles que certaines douleurs abdominales, quelques infirmités particulières, & plusieurs irritations convulsives.

Dans plusieurs circonstances, certains narcotiques, l'extrait gommeux d'opium, par exemple, donné seul, est nuisible, ou demeure sans effet thérapeutique; tandis qu'il répond aux indications que l'on s'est proposé de remplir, s'il est combiné, soit avec un autre narcotique, soit avec un autre médicament, tels que le melle ou le camphre, ou même avec un excitant tonique ou sécrétor. Ma pratique m'a présenté plusieurs exemples de ces anomalies; j'ai vu souvent, entre autres, mais principalement dans deux circonstances très-remarquables, l'extrait gommeux d'opium échouer entièrement chez le même malade, dans le traitement d'une toux convulsive très-violente, & qui fut arrêtée d'une manière presque magique, par l'usage de pilules que l'on administrait de douze heures en douze heures, & qui étoient composées de quatre grains de la masse pilulaire de cytoglose, & d'un grain de melle.

Fouquet, avant nous, avoit fait plusieurs observations analogues sur les narcotiques; nous aurons incessamment l'occasion de revenir sur cette question importante, en parlant de la combinaison des extraits, soit d'opium, soit de joshuisme, de tiguë, d'aconit, &c., avec d'autres substances qui en modifient sensiblement les propriétés, & qui paroissent rendre ces médicaments très-efficaces dans le traitement de plusieurs maladies chroniques.

Les contre-indications qui s'opposent à l'effet de l'opium, sont très-difficiles à déterminer *a priori*, & ne peuvent guère le reconnoître, dans le plus grand nombre des cas, que d'après des expériences individuelles. Les uns, du reste, sont générales, & les autres particulières; les contre-indications générales se trouvent implicitement indiquées dans ce qui précède; ainsi, l'irritation fébrile ou inflammatoire, les douleurs rhumatismales des gouttes, l'embarras vasculaire, les congestions partielles, l'état soporeux, &c., doivent être rapportés à ces contre-indications. Nous passons, en outre, que dans plusieurs circonstances, une propriété d'absorption trop développée chez certains individus, & la disposition opposée à cette propriété, par l'effet d'une plénitude, d'une langueur vasculaire constitutionnelle, que l'on confond trop souvent avec une pléthore accidentelle ou momentanée, peuvent être considérées comme des dispositions, qui doivent faire proscrire, ou du moins faire administrer à très-petites doses, les narcotiques.

que l'on cultive en Angleterre, & qui n'est pas encore introduits dans la pharmacopée française, paroît offrir à la médecine, une semence beaucoup plus douce que la plupart des autres narcotiques, & qui conviendroit pour les personnes, dont le mode de sensibilité repousse les préparations opiacées; avec une sorte d'asthénie. De reste, l'emploi des narcotiques considérés comme somnifères, exige des connoissances de détail, qu'une longue pratique fait seule acquiescer, & ne manque souvent son effet que parce qu'il est confié à des mains inhabiles.

Ne pouvant exposer ici toutes ces délicatesses de l'art de guérir, nous dirons seulement, & d'une manière générale, que l'action hypnотique est souvent très-letée; qu'elle ne se manifeste, par exemple, quelquefois que la deuxième nuit; que l'administration du narcotique doit être souvent précédée de l'usage de la magnésie; que dans tous les cas, elle doit être placée à une grande distance des repas; que les boissons acidulées en développent l'effet; & le rendent plus prompt, & qu'enfin certains narcotiques, qui ne paroissent pas à rappeler le sommeil, se à faire cesser une agitation obscure très-incommode, s'étant arrivés à cet heureux résultat, lorsqu'on les combine, soit avec le musc, le camphre ou même avec d'autres substances narcotiques, mais principalement avec les extraits de jujubiers noirs & blanches.

Les autres symptômes que l'on combat le plus souvent avec efficacité par les narcotiques, sont la douleur, les irritations convulsives, les fébrétions trop abondantes, &c.

Toutes les douleurs qui sont pas calmées ou satisfaites par ces médicaments: les douleurs d'nerveuses, mais principalement celles des intestins ou de l'utérus, les exigent d'une manière particulière (1). Quelques céphalées, que l'on a vaicement attaquées avec d'opium, ont été tantôt à l'emploi de la jujubine noire; tantôt à l'extrait de nigelle porté graduellement à des doses très-considérables; circonstance qui permet de rapporter ces espèces de maux de tête, à une disposition cérébrale.

La névralgie faciale elle-même (sic douleurs) que l'on combat si rarement avec succès avec l'opium, n'a pas résisté dans quelques cas, tantôt à l'extrait ou à la teinture de stramonium, tantôt à l'extrait de jujubine noire employé dans la préparation dite pilule de Stéphen. La douleur qui accompagne plusieurs inflammations extérieures, mais principalement le pharynx, ne trouve de soulagement dans l'emploi des narcotiques, qu'après une application de sangsues.

(1) Les douleurs d'nerveuses, les douleurs accompagnées du spasme qui provoque l'épilepsie, les personnes, l'usage de l'opium, &c. du côté du cœur, le tétanos, qui accompagne les épilepsies ou la dystrophie, &c. se voient symptomatiquement associés dans les manifestations épileptiques.

qui fait cesser dans la partie malade, la congestion sanguine qui résulte de la phlegmasie. Les douleurs les plus atroces, celles qui accompagnent le développement du cancer, ou qui se manifestent dans différentes parties frappées de gangrène par cause interne, sont presque toujours combattues inutilement par l'emploi local des narcotiques, & l'on ne parvient à soulager momentanément les malades, dans ces circonstances, qu'en prolongeant chez eux, & par l'usage interne des mêmes médicaments, une insensibilité à peu près qui suspendent alors le sentiment de leurs horribles souffrances.

Les douleurs de goutte ne sont pas ordinairement calmées par l'usage de l'opium, & d'après quelques essais, il paroîtroit que l'extrait d'aconit seroit mieux indiqué dans ce cas particulier.

Il n'en est pas ainsi des douleurs rhumatismales, les fièvres, & que l'on suspend presque toujours avec un cataplasme émollient, arrosé de laudanum, & recouvert avec un linge ciré, pour entretenir sur le siège de la douleur, un bain de vapeurs opiacées.

Dans les douleurs abdominales que nous venons d'indiquer, les narcotiques doivent être presque toujours employés, ou lavement, à la dose de six à huit onces de véhicule, pour une quantité plus ou moins considérable d'une préparation narcotique. L'opium en particulier agit sous cette forme, bien plus utilement & plus promptement dans les douleurs occasionnées par le caecum de l'utérus, que lorsque il est introduit directement dans la vulve.

Les irritations convulsives qui exigent l'emploi des narcotiques, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ont le plus ordinairement leur siège dans les téguments membraneux d'un grand nombre de viscères, ou dans le diaphragme lui-même, ou dans le parenchyme des organes très-peu dotés de contractilité dans l'état de santé: tels sont la toux dite nerveuse, la domination des intestins dans la dysenterie, les nausées, le vomissement spasmodique, le tétanos, les convulsions de l'utérus, les mouvements comme pour se coucher dans la métrite ou pendant certains accès d'hystérie.

A tous ces symptômes on applique aisément l'opium, ou tout autre narcotique, comme on peut le voir dans plusieurs articles de ce Dictionnaire. (Voyez Nausees (Cholera), Nerveux (abdominaux), primitives ou convulsives), Tétanos, Toux nerveuse.)

L'état spasmodique des muscles de la locomotion est très-peu modifié par l'usage des narcotiques; & le rend nul ou presque nul, ainsi que nous l'avons déjà remarqué pour le tétanos même, si des doses de la substance médicamenteuse devoient s'apporter avec tous les caractères d'un empoisonnement. Il n'en est pas ainsi du spasme fibrillaire, qui agit

sur le tissu fibreux de la peau, & consécutivement sur l'estomac & le diaphragme ; on le prévient presque à volonté dans le plus grand nombre des cas, avec l'opium associé (tantôt à l'éther, tantôt au camphre, tantôt à des substances aromatiques, & administré quelque temps avant l'accès).

Nous devons rappeler, ici que Barthez, qui a donné beaucoup de crédit à cette médication, préférait les narcotiques avec succès, mais surtout l'opium, dans le moment où la chaleur succède au frisson. Dans les fièvres ataxiques, le même médicament paroit aussi avoir produit les effets les plus utiles pour combattre des symptômes nerveux très-graves, soit en excitant, & par l'action cérébrale, pour arrêter des concentrations nerveuses, qui tendoient à s'établir sur d'autres viscères, soit, & ce qui est beaucoup plus probable, en agissant d'une manière qui nous est tout-à-fait inconnue.

Les hémorragies dans lesquelles il existe beaucoup de spasme & très-peu de fièvre, ont cédé plusieurs fois à l'emploi de l'opium bien administré.

Sydenham donnoit presque toujours le même médicament dans la petite-vérole, un peu avant l'éruption, & lorsque les malades se trouvoient tourmentés au-delà de toutes mesures, par une irritation vive de la peau, & par des démangeaisons insupportables. D'autres praticiens lui ont attribué également beaucoup de succès dans le traitement de la pleurésie & de la péripneumonie, après les évacuations sanguines : ce qui a été remarqué surtout par Sarcoue & par Huxham.

Les lésions morbides que l'on réprime ou que l'on ramène à leur état normal par les narcotiques, mais surtout par l'opium, sont la salivation, l'expectoration trop abondante, la diarrhée, les pollutions nocturnes, le catarrhe utérin & les hémorragies chroniques, qui ne se trouvent pas d'ailleurs sous la dépendance d'un état inflammatoire ou fébrile.

L'opium seul, ou mieux encore l'opium associé aux résineux & aux balsamiques, à la fébréolique, au baume du Pérou, au baume du Canada, à la myrrhe, à l'extract de genièvre, manque rarement son effet lorsqu'il est uni avec habileté. Il peut être alors véritablement curatif dans des cas très-graves, & qui ne pourroient manquer de devenir funestes, tels que l'expectoration, qui entraîne la maigreur & la perte des forces, le dévoiement des enfants, le cholera-morbus, l'aberration évidente de secrétions.

Les maladies chroniques, dans le traitement desquelles plusieurs médecins ont attendu de grands succès, de l'emploi des narcotiques, se rapportent aux scrophuleux, aux engorgemens lymphatiques, à la syphilis invétérée, aux névralgies d'un caractère chronique, & à certaines altérations morales indéterminées, que l'on attribuoit tantôt

à une habitude névralgique, tantôt aux suites d'un grand nombre de chumistifères.

Quelques avantages ont été obtenus en effet dans le traitement de ces maladies, par certains narcotiques, par l'extract de ciguë & d'acopit, par l'opium associé au mercure sous une seule des formes, par l'extract de jusquiame noire, l'extract de stramonium, par l'extract d'aconit napel combiné avec l'hydrochlorate de mercure, dans les pilules d'aconit mercurielles ; mais ces avantages, qui laissent encore beaucoup à desirer, n'ont pas répondu à l'enthousiasme des médecins qui ont employé ces médicaments, & on n'en pourra constater les effets que par des expériences plus exactes que le plus grand nombre de celles dont ils ont été l'objet jusqu'à ce jour. (Voyez NÉVRALOGIE, SCROPHULES, SCOPHARY, SCOPHAREUX (Engorgement), STAPHILIS.)

(MORÉAU DE LA SARTRE.)

NARCOTISME. (*Pathologie générale*). *Narcosis, narcosis*, de *narcus*, état morbide, singulièrement particulier que provoquent l'opium, les jusquiames, la laque virgule, le stramonium, etc., lorsque ces substances font donquer des effets, soit pour modifier sensiblement l'action du cerveau.

Le narcotisme n'est point dans tous les cas & chez tous les individus qui l'éprouvent, un état absolu, identique, mais une question qui présente une foule de nuances ou de degrés, depuis une douce excitation cérébrale, un mouvement plus facile, plus agréable des idées, ou un léger mal de tête, jusqu'à la stupor, l'engourdissement & l'état soporeux, dont une mort, qui commence par le vœux, devient une suite inévitable.

Cette altération morbide présente d'ailleurs plusieurs variétés, suivant les substances qui ont été employées pour la produire, ainsi, le narcotisme occasionné par l'opium, n'a pas des suites aussi longues & aussi graves, que celui du stramonium, qui laisse ordinairement après lui une sorte d'aliénation. Le narcotisme excité par l'extract de chair combiné à d'autres substances, est presque toujours suivi d'une grande faiblesse ; un autre narcotisme, celui qui suit l'emploi des jusquiames, la belladone, est le plus souvent accompagné de perceptions morides & d'un grand délire, dans l'action des sens. (Voyez dans ce Dictionnaire, notre article NARCISME GÉNÉRAL, tom. IX, pag. 188.)

On ne peut méconnoître, dans le narcotisme, un excès de particularité, spécifique du cerveau, qui, comme certaines pathologies insidieuses, ne se prolonge jamais sans devenir funeste. Cet excès, en effet, est impossible de seconclure d'ailleurs dans l'état de l'opium ou d'engourdissement, est facile à observer dans la première nuance, ou le premier degré du même état, manifesté par le mouvement facile des idées, dont nous avons parlé, par la complaisance déli-

eleuse, un délire agréable, & ce sentiment de bonheur, cette exaltation de courage, que certaines préparations opiacées font éprouver aux Orientaux. Si le narcotisme augmente de quelques années, on s'il est perité tout-à-coup à un degré aisé fort, l'excitement ne se manifeste que par le trouble, par le désordre des fonctions du cerveau, l'altération de plusieurs facultés, la diminution de la mémoire, l'insipidité pour toute espèce d'attention, &c. &c. Il ne seroit peut-être pas impossible de reconnaître, & de déterminer à volonté, certaines modifications du narcotisme, auxquelles l'on pourroit reconnoître impunément dans le cours de plusieurs maladies, soit pour faire cesser des souffrances inutiles, & pour répandre quelques charmes, & un peu de calme on d'atrait, dans une situation pénible; soit même pour adoucir les dernières heures des mourans, & contribuer ainsi, à cette *Euthanasie*, que Bacon a demandée avec tant d'éloquence, à la médecine. On a dit peut-être un peu légèrement, que Cabanis étoit parvenu à composer pour lui, & pour les amis, dans les momens les plus douloureux de la révolution, une préparation chimique analogue à celles que nous indiquons ici, & assez forte pour faire cesser en même temps la souffrance & la vie, en donnant ainsi à la mort, toutes les apparences du sommeil le plus paisible. (Voyez NARCOTIQUES.)

(MORAND DE LA SARTHE.)

NARD. (*Matière médicale*.) On connoît sous ce nom plusieurs substances végétales, dont les plus célèbres sont le *nard indien* & le *nard celtique*. Nous ignorons si le nard que nous recevons aujourd'hui de l'Inde est bien le nard des Anciens, qui étoit fourni par plusieurs plantes différentes, très-peu connues jusqu'à l'empire d'Auguste. Quant à la substance qui nous est connue sous le nom de *nard indien*, elle paroît appartenir à plusieurs plantes. Elle n'est pas employée aujourd'hui en médecine & en parfumerie, malgré l'éloge qu'en ont fait les Anciens, entre autres Galien, qui prétendoit avoir guéri les maux d'estomac de l'empereur Marc-Aurèle, par l'application d'un onguent de nard; sur la région épigastrique.

Le nard celtique appartient à la *valeriana celtica*. (Voyez VALERIANE.) (L. J. M.)

NARDUS (Jean). (*Biographie médicale*), médecin italien, qui naquit à Monte Pulciano, & exerça la médecine à Florence, au commencement du dix-septième siècle. On a de lui les ouvrages suivans :

1°. *Lactis physica analysi*. Florentiae, 1634, in-4°.

2°. *Apophlegmatica Fortunæ Licetæ mullærum, note dypticæ*. Florentiae, 1636, in-fol. & in-4°.

3°. *De ignis æternæ physica prolesio*. Ibid., 1641, in-4°.

4°. *De ore disquisitio physica*. 1642, in-4°.

5°. *Nodium genialium physicarum, annus primus*. Bononiæ, 1646, in-4° (1).

6°. *De prodigiis vulnenum curatioribus*. Norimbergæ, 1642, in-4°.

Nardus, qui aimoit beaucoup la littérature, publia aussi une édition de l'*Ouvrage de Lucrèce*; il la fit paroître à Florence en 1647, sous format in-4°, avec des notes assez étendues.

(A. J. T.)

NAREZ (Urfmer) (*Biographie médicale*), naquit en 1678, à Binch, dans la province de Hainaut, de parens peu fortunés; dès les premières années, il montra de grandes dispositions pour l'étude, & un ecclésiastique son parent, les ayant remarquées, les cultiva avec d'autant plus d'avantages, que dès l'âge de dix-huit ans, il avoit déjà obtenu à Louvain, une place distinguée comme professeur. Un tel succès encouragea le jeune Narez à se livrer à l'étude de la théologie; mais ne tarda-t-il pas à être nommé professeur de philosophie au collège du Parc. Il prit le degré de bachelier & se prépara à recevoir les ordres sacrés à Cambrai; mais l'absence que demandoit cette épreuve étant incompatible avec la chaire de philosophie, il forma tout-à-coup la résolution de renoncer à l'état ecclésiastique, dont il ne conserva que l'habit. Déjà il se livrait à l'exercice de la médecine, il résigna un canonicat de Saint-Paul, à Liège, qu'il avoit obtenu en vertu des privilèges de la Faculté des Arts, & il fut reçu à la licence le 20 septembre 1706; dès lors il chercha à se fixer à Louvain, fut nommé membre de l'Académie de médecine de cette ville en 1710, & succéda à Favelet (Jean-François) dans la chaire de botanique; Narez continua de la remplir jusqu'en 1719, époque à laquelle il fut installé dans celle des *Institutes*; deux ans après il passa à la charge d'anatomie & de chirurgie, obtint le grade de docteur en 1718 (2), & en 1742 il fut choisi de nouveau pour remplacer Favelet dans la chaire de professeur primaire, ainsi que dans la direction de l'hôpital de Louvain. Narez ne remplit pas long-temps ce nouvel emploi; car deux ans s'étoient à peine écoulés, qu'il fut enlevé au monde, à la suite d'une maladie de l'estomac. Ce médecin avoit une philanthropie, simple, par testament, les fonds nécessaires à l'établissement de plusieurs fondations utiles, & en particulier, il légua 60 florins de rente, pour servir à l'entretien du Jardin des plantes de Louvain.

Nous ne possédons qu'un seul ouvrage de Narez,

(1) Ouvrage rempli de faits curieux & de recherches ingénieuses.

(2) Et Elzy, dans sa Notice sur Narez, observe que les honneurs du doctorat ne s'accordoient à Louvain, qu'à un très-petit nombre de personnes dans chaque Faculté; le cours ordinaire des études se bornoit à la licence, & qu'il étoit rare, pourqu'on, dit ce biographe, Narez, en ayant obtenu le grade, ne se bornât à l'usage des lettres & à l'enseignement.

encore le devons-nous à son aversion décidée pour l'empirisme; c'est une *Lettre d'un médecin de Louvain à un de ses amis* (1), à l'occasion d'un livre intitulé : *PRÉCAUTIONS DE LA SÉCRÉTÉ DE GARDEER LES URINES*, &c., par J. F. D. B. (Louvain, 1753, in-12.) (A. J. T.)

NARINES. Voyez NASAL (Fosses nasales).

NARVATIUS (Math.). (Biograph. méd.) Les écrits de Narvatus sont rapportés par Haller à la thérapeutique, mais principalement son Recueil de sentences relatives à la chirurgie, & tirées des ouvrages d'Hippocrate; Recueil dans lequel l'auteur fait connaître les instruments employés pour les plaies de tête. *Sylva sententiarum, ad chirurgiam pertinentium, ex libris Hippocratis excerptis*, in-8°. Deux éditions, l'une de 1576 & l'autre de 1602. (L. J. M.)

NASAL, *na, nasalis*, adj.; de *nasus*, nez, qui appartient au nez.

Apophyse nasale. Montante, verticale, elle se voit à la partie antérieure & supérieure de la face externe de l'os maxillaire supérieur, au-dessus duquel elle s'élève beaucoup; aplatie de dehors en dedans, la face externe est concave de haut en bas, & présente quelques trous pour les vaisseaux nourriciers. Sa face interne, de même concave, faisant partie de la paroi externe des fosses nasales, s'articule supérieurement avec l'ethmoïde, & inférieurement avec le corps moyen; le bord antérieur oblique s'articule supérieurement avec les os propres du nez, & inférieurement il donne attache au cartilage de l'aile du nez. Le bord postérieur est creusé par le canal nasal, qui le divise en deux lèvres. L'interne s'articule avec l'os unguis, & l'externe donne insertion au tendon direct du muscle orbiculaire des paupières. (nasopalpebral). Le sommet tronqué inégal, s'articule avec l'échancrure nasale de l'os frontal; la base est confondue avec le reste de l'os.

Arrière nasale (sus-nasale). Lorsque l'artère ophtalmique (orbitaire) a fourni les palpébrales, elle se divise en deux branches, dont l'une est la nasale (sus-nasale), & l'autre la frontale. La nasale sort de l'orbite au-dessus du tendon direct de l'orbiculaire des paupières (nasopalpebral), & se rend sur les côtes de la racine du nez, où elle s'anastomose avec la labiale. Elle fournit des branches qui se rendent au sac lacrymal, à l'orbiculaire des paupières, & un très-grand nombre qui se répandent dans les parties constitutives du nez; & il y a encore quelques petites branches de la labiale supérieure, branche de la palato-labiale, qui se distribuent au nez, & sont appelées *nasolabiales*.

(1) Opuscule dans lequel Nares s'est particulièrement attaché à démontrer l'innuité de l'aromance.

Basse nasale. C'est une petite éminence placée entre les arcades sourcilières & au-dessus de l'échancrure nasale; cette partie présente, sur les jeunes sujets, une suture qui le confère quelquefois jusque dans un âge avancé. Cette éminence est très-peu marquée chez les enfants, & devient de plus en plus apparente à mesure que les sinus frontaux se forment.

Canal nasal. On appelle ainsi le canal creusé dans le bord postérieur de l'apophyse montante de l'os maxillaire dont nous avons parlé plus haut, converti en trou; supérieurement, il concourt à former la gouttière lacrymale; inférieurement, il s'ouvre dans le méat inférieur. Ce canal, légèrement aplati de dehors en dedans, est dirigé de haut en bas & d'avant en arrière. (Voyez VOIES LACRYMALES.)

Tapisé par la membrane pituitaire, il a pour usage de transmettre les larmes dans le nez.

Cartilage nasal. Plusieurs auteurs l'ont décrit comme formé de trois portions, dont deux similiaires, qui forment une partie du dos du nez; se réunissant sous un angle plus ou moins aigu, & la troisième perpendiculaire, s'insérant à la réunion des deux cartilages précédents; mais le plus généralement on le regarde comme un cartilage unique.

La portion moyenne, qui est la plus étendue, fait partie de la cloison des fosses nasales; elle est ordinairement plane; l'extrémité supérieure est adhérente à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde; l'inférieure, divisée en deux parties, s'articule avec le vomer en avant; il est situé dans un intervalle qu'il laisse entre elles les branches internes des fibro-cartilages elliptiques de l'ouverture des fosses nasales; le bord postérieur correspond au dos du nez; il est épais supérieurement & mince inférieurement, où il se recouvre par les mêmes cartilages. Les deux autres parties de ce cartilage, ou cartilages latéraux, naissent de la partie supérieure de son bord antérieur, & forment les côtes du nez; triangulaires, supérieurement & postérieurement, ils s'attachent par des ligaments à fibres courtes, aux os du nez, & inférieurement aux fibro-cartilages des ouvertures. La membrane pituitaire recouvre les deux faces de la partie qui sert à la cloison & la face interne des parties latérales; leur face externe est recouverte par la peau & le muscle transversal du nez.

Fibro-cartilages des ouvertures du nez. A peu près elliptiques, ils sont en angle aigu en avant, & tronqués en arrière. Ce sont eux qui donnent la forme aux ouvertures nasales antérieures; & les maintiennent dans un état constant de dilatation nécessaire à la libre introduction de l'air. Ils sont formés de deux branches, l'une externe & l'autre interne; la première, dirigée obliquement de dedans en dehors, & d'avant en arrière, s'unit inférieurement, sous un angle plus ou moins aigu, à l'interne; la face externe est tapissée par la peau & le muscle pyramidal. La branche interne est sa base.

taut avec celle du côté opposé, & laisse entr'elles un léger intervalle; elle termine intérieurement la cloison; les deux réunies lui donnent l'épaisseur qu'on lui connoît, & qui est plus considérable en arrière. Il est tapissé intérieurement par la membrane muqueuse, qui a presque tous les attributs de la peau.

Fibro-cartilage des ailes du nez. Il est d'une forme assez difficile à déterminer; il complète l'espace qui est entre le cartilage latéral du nez & celui dont nous venons de parler; quelquefois, au lieu d'être unique, on en trouve plusieurs qui sont séparés les uns des autres, & réunis par des membranes. Ils sont recouverts intérieurement par la membrane muqueuse, & en dehors par la peau & le muscle pyramidal.

Echancrure nasale. C'est un enfoncement de l'os frontal, situé au-dessus de la fosse nasale, entre les apophyses orbitaires internes. Sa surface est inégale, raboteuse, s'articule latéralement avec les apophyses nasales, & à sa partie moyenne avec les os propres du nez.

Épine nasale. Trois parties différentes ont reçu ce nom; la première est cette petite éminence pointue, située à la partie moyenne & inférieure de l'échancrure nasale; elle est dirigée d'arrière en avant & de haut en bas; sa face supérieure s'articule avec les os propres du nez; sa face inférieure présente une petite crête qui s'articule avec le vomer & sépare deux petits enfoncements qui sont partie de la voute des fosses nasales.

Les deux autres épines nasales sont distinguées en antérieure & en postérieure; l'antérieure est cette petite éminence pointue dirigée en avant, que l'on remarque à la partie moyenne & inférieure de l'ouverture antérieure des fosses nasales, formée par l'union des os maxillaires supérieurs; la postérieure se remarque de même à la partie moyenne du plancher des fosses nasales; elle est formée par les os palatins & dirigée en arrière.

Fosses nasales. On appelle ainsi deux grandes cavités dans la partie moyenne de la face, séparées par une cloison très-mince, & dans lesquelles s'ouvrent plusieurs petites cavités accessoires; elles sont situées au-dessous de la base du crâne, au-dessus de la voute palatine, derrière le nez, & devant de la fosse gattorale, entre les orbites & les fosses canines & zygomatiques.

Privées des parties molles, on voit qu'elles sont bornées supérieurement par les os propres du nez, l'éthmoïde & les faces antérieures & inférieures du corps du sphénoïde; elles se terminent inférieurement sur la portion horizontale des os maxillaires & palatins. La cloison qui les sépare est formée par la lame perpendiculaire de l'éthmoïde, le vomer & le cartilage de la cloison; en dehors, on y voit les os maxillaires, palatins, l'éthmoïde & les unguis.

Abstraction faite des sinus, chaque fosse a la forme d'un quadrilatère, dont le bord supérieur

présenteroit deux coupes qui diminueroient à la hauteur d'ayant en arrière. Largues de deux centimètres environ à leur base, elles ne le sont supérieurement que de trois à quatre millimètres; leur hauteur, prise de la réunion de l'éthmoïde avec la partie antérieure de l'échancrure ethmoïdale du coronal & du trou palatin, est d'à peu près cinq centimètres, & de trois du rostrum à l'épine nasale postérieure. Ces diverses dimensions ont été prises sur plusieurs têtes d'hommes adultes, & sont assez exactes; on conçoit facilement que lorsque la membrane pituitaire est plus foliée, elles sont réduites de quelque chose.

Pour faciliter la description des fosses nasales, on est convenu de leur distinguer une paroi interne, une externe, une supérieure ou voute, & une paroi inférieure ou plancher; une ouverture intérieure ou faciale, & une postérieure ou gutturale.

La paroi interne, qui est une face de la cloison qui sépare ces fosses, est formée par l'épine nasale, la lame perpendiculaire de l'éthmoïde & le vomer; ces deux parties constituent, par leur réunion, un angle rentrant, qui, dans l'état frais, est rempli par le cartilage de la cloison. Cette face, ordinairement plane, est tantôt déjetée d'un côté, tantôt de l'autre, & présente supérieurement de petits filons dirigés de haut en bas, & qui servent de conduit aux filets de la première paire de nerfs.

La paroi externe est la plus compliquée de toutes; elle est légèrement inclinée de haut en bas & de dedans en dehors, & offre une légère courbure dont la concavité regarde la cloison. Étudiée de haut en bas, elle présente les objets suivans: une surface plane, rugueuse postérieurement, formée en avant par la face interne de l'apophyse nasale, & en arrière par la face interne de l'os planum; postérieurement, cette face se recourbe, se porte de dedans en dehors & un peu d'avant en arrière, de sorte qu'elle laisse entr'elle & le sphénoïde un petit écartement dans lequel s'ouvrent les sinus sphénoïdaux. A la moitié postérieure de cette surface on aperçoit une petite lame mince, recourbée, formée par l'éthmoïde; cette lame, appelée *cornet supérieur*, *cornet de Morgagni*, forme supérieurement une petite cavité connue sous le nom de *meat supérieur*. Ce meat, le plus petit de tous, dépend entièrement de l'éthmoïde, n'occupe guère qu'un tiers du diamètre antéro-postérieur des fosses nasales. A sa partie antérieure & supérieure on aperçoit une petite ouverture qui coïncide dans les cellules postérieures de l'éthmoïde, dont le nombre peut s'élever jusqu'à huit ou neuf; derrière ce meat, & au-dessous de l'ouverture des sinus sphénoïdaux, est le trou sphéno-palatin, qui donne passage aux vaisseaux & aux nerfs du même nom.

Immédiatement au-dessous du meat supérieur est le cornet moyen, cornet ethmoïdal, confondu antérieurement

entièrement avec les masses latérales de l'ethmoïde dont il est un appendice; il forme en arrière la paroi inférieure du méat supérieur, plane en avant. A mesure qu'on le considère plus postérieurement, on voit qu'il se recourbe de plus en plus, de manière à offrir une convexité qui regarde en dedans, en se terminant en pointe; il s'articule avec l'os palatin au pen au-dessous du trou sphéno-palatin. Les surfaces de ce cornet sont rugueuses.

Le méat moyen est situé en-dessous de ce cornet, qui la forme en grande partie; ce méat, dirigé comme tous les autres d'avant en arrière, est formé par l'apophyse montante de l'os maxillaire, par l'os onguis, l'os palatin & l'apophyse ptérigoïde du sphénoïde. C'est à la partie antérieure & supérieure de ce méat que l'on voit la petite gouttière qui conduit dans l'infundibulum, au moyen duquel les fosses nasales communiquent avec les cellules ethmoïdales antérieures, & de-là avec les sinus frontaux. Ces sinus sont creusés dans la table externe du cornet, & sont séparés l'un de l'autre par une petite cloison osseuse.

Au-dessous de cette gouttière, & un peu plus en arrière, on aperçoit l'ouverture qui conduit dans le sinus maxillaire; cette ouverture, examinée sur un os maxillaire désarticulé, est beaucoup plus grande que lorsque cet os est en position; car alors elle est rétrécie supérieurement par des lamelles de l'ethmoïde, postérieurement par le palatin, & inférieurement par ce même os & le cornet inférieur. Ce sinus, creusé dans le maxillaire dont il porte le nom, est assez vaste; il est à peu près triangulaire: le sommet correspond à la portion molaire de cet os, & la base, à son ouverture. On remarque à la partie antérieure & moyenne de ce sinus, une petite crête qui correspond au canal dentaire supérieur & antérieur, qui s'ouvre quelquefois dans ce sinus, & la région qui correspond à la tubérosité maxillaire; on y voit aussi la trace des conduits dentaires supérieurs & postérieurs qui s'ouvrent aussi quelquefois dans ce sinus. Les parois de cette cavité sont extrêmement minces, & il arrive même que les dernières dents molaires s'y montrent à nu.

Ce méat est borné intérieurement par le cornet inférieur; ce cornet est le plus grand de tous, c'est un os particulier, tandis que les deux autres ne sont que des prolongemens de l'ethmoïde. Cet os est à peu près deux fois plus long que large; sa longueur occupe environ les trois quarts du diamètre antéro-postérieur des fosses nasales. Il est recourbé sur lui-même, de manière que sa convexité regarde en dedans & sa concavité en dehors; il est plus large antérieurement que postérieurement, où il se termine en pointe. Son bord supérieur s'articule au moyen d'une petite lame verticale avec l'ethmoïde, & par

une autre lame, recourbée en bas. Il concourt à fermer l'ouverture des sinus; il s'articule aussi avec le palatin.

Au-dessous de cet os est le méat inférieur, le plus grand de tous, qui se termine au plancher des fosses nasales; à la réunion de son tiers inférieur avec les deux tiers postérieurs, est l'ouverture du canal nasal, caché entièrement par le cornet inférieur.

La voûte des fosses nasales est plus large, antérieurement & postérieurement, qu'à sa partie moyenne. La partie antérieure, formée par les os propres du nez & l'épina nasale du coronal, est dirigée de bas en haut & d'avant en arrière; elle est concave transversalement; on y aperçoit souvent des petits trous qui donnent passage à de petits vaisseaux. La partie moyenne, la plus étroite, a le même disposition que la lame criblée de l'ethmoïde qui la forme entièrement; elle est percée d'un grand nombre de petits trous qui donnent passage aux filets du nerf olfactif. Antérieurement & près de la cloison, existe une petite fente dirigée d'avant en arrière, qui donne passage à la branche nasale de l'ophtalmique de Willis. La troisième partie, la plus large de toutes, est formée par la moitié des faces antérieures & inférieures du corps du sphénoïde. A la partie antérieure de cette face, on aperçoit l'ouverture ovalaire du sinus sphénoïdal, sinus creux dans le corps de cet os, séparé de celui du côté opposé par une lamelle osseuse. La partie la plus basse de ce sinus est au-dessous du niveau de l'ouverture, par laquelle il communique avec les fosses nasales. La paroi antérieure de ce sinus est formée, chez les enfans, par une lamelle osseuse, mince, recourbée, & que l'on appelle *cornet de Bertin*. Sa forme varie beaucoup. La face intérieure de cette région est bornée par le rostrum & la base de l'apophyse ptérigoïde; elle présente en dehors & en arrière l'ouverture du conduit vidien, par lequel passent les vaisseaux & nerfs vidien. La partie inférieure ou plancher, est plus étroite antérieurement que dans le reste de son étendue; elle est plane, présente à sa partie antérieure & vers la cloison, un petit trou nommé *palatin antérieur*.

L'ouverture antérieure commune des fosses nasales a été comparée à un cœur de carte à jouer dont la base seroit en bas; elle est formée par le maxillaire supérieur, inférieurement & latéralement, & supérieurement par les os propres du nez; elle se termine dans le nez proprement dit. L'ouverture postérieure ou naturelle s'ouvre dans la partie inférieure du pharynx; la cloison est formée entièrement par le vomer, & les apophyses ptérigoïdes les bornent en dehors.

Telles sont les fosses nasales considérées sur le squelette; dans l'état frais elles sont tapissées entièrement par une membrane muqueuse, dans la

quelle se distribuent les parties nécessaires à l'olfaction. Pour décrire cette membrane avec plus d'ordre, nous la partagerons d'un point, & après lui avoir fait parcourir toute l'étendue des fosses nasales, nous l'y ramènerons.

En la prenant à la partie inférieure de la cloison, on voit qu'elle tapisse toute cette face sans former aucun pli antérieurement elle se continue avec la peau qui recouvre le cartilage de la cloison, & présente des poils en arrière en se recourbant derrière le vomer; elle se réunit à celle qui revêt la cloison de l'autre fosse nasale; continuant son trajet, elle en tapisse la voûte; alors, échangeant de direction, elle suit la paroi externe, pénètre en arrière dans le sinus sphénoïdal, couvre le trou sphéno-palatin, se répand sur le cornet supérieur dans le méat supérieur, & s'introduit dans les cellules ethmoïdales postérieures par l'ouverture que nous y avons signalée. Lorsque la cellule palatine s'ouvre dans ces cellules ou dans le sinus sphénoïdal, elle est aussi tapissée par un prolongement qui vient de la membrane qui tapisse la cavité à laquelle elle correspond; recouvrant ensuite le cornet moyen, elle forme à son bord inférieur un prolongement plus marqué en arrière qu'en avant. Parvenue dans le méat moyen, elle pénètre dans les cellules antérieures de l'ethmoïde, & de-là dans le sinus frontal; ensuite, un peu plus en arrière, elle s'introduit dans le sinus maxillaire; elle se comporte de même avec le cornet inférieur comme avec le moyen, & parvenue dans le méat inférieur, elle envoie un prolongement dans le canal nasal. En avant, elle tapisse les ailes du nez, & s'étend à l'ouverture des narines avec la peau qui les revêt; en arrière, elle se continue avec la membrane pharyngienne; du méat moyen elle s'étend par la paroi inférieure ou plancher, & arrive au point d'où nous l'avons supposée partir, se confond postérieurement avec la membrane qui tapisse la face supérieure du voile du palais, & antérieurement avec la peau de l'ouverture nasale antérieure.

Cette membrane recouvre beaucoup les différentes ouvertures des cavités accessoires des fosses nasales, & quelques-unes, très-vissibles sur une tête desséchée, sont souvent à peine apercevables dans l'état frais. Elle est composée de deux feuillets assez facilement séparables dans la portion qui recouvre les cornets, tandis que dans les autres ils sont très-adhérens. Ces deux feuillets paraissent ne pas exister dans les sinns; cependant des anatomistes distingués les ont reconnus dans les sphénoïdal & frontal. Le feuillet externe est partout adhérent aux os, mais s'en détache assez facilement. Quelques-uns l'ont regardé comme leur propre. Le feuillet interne ou muqueux proprement dit, est l'une des plus épaisses des membranes de cet ordre. Cette membrane est beaucoup plus épaisse, plus molle sur les cornets que partout ailleurs; elle offre dans toute sa surface un grand nom-

bre de villosités très-déliées, & de la structure desquelles on n'est pas encore assuré. Bichat dit qu'il n'en existe pas, & qu'il ne paraît tel qu'aucune des petites ouvertures des follicules glanduleux. On n'y aperçoit pas non plus, d'une manière évidente, de follicules muqueux. Stenon dit cependant qu'ils existent, & de plus, qu'ils font beaucoup plus marqués en arrière qu'en avant de ces cornets. Bichat les admet plutôt par analogie que par la certitude qu'il avoit que les petites granulations qu'il y a remarquées fussent de véritables glandes. Il y a à la partie de la cloison une lacune assez grande, & qui est le réservoir de plusieurs de ces follicules. Cette membrane n'a pas la même couleur dans tous les points de son étendue; elle est pâle à l'ouverture du nez & dans les sinus & les cellules ethmoïdales, dernières parties dans lesquelles elle est très-mince; sur les cornets elle est très-épaisse, très-rouge. On dit que la partie qui revêt les sinns est exempte de cryptes; cependant il y a aussi là une sécrétion muqueuse, & par conséquent ils doivent aussi y exister.

Le système sanguin y est très-superficiel, ce qui rend parfaitement raison de la fréquence des hémorragies qu'on y observe; les vaisseaux artériels y sont en très-grande quantité, & il ne faut pas une injection très-fine pour la transformer en un réseau artériel. Cette membrane fibro-muqueuse reçoit des nerfs des artères, des nerfs des veines & des vaisseaux lymphatiques.

10. *Nerf olfactif*, considéré plutôt comme un appendice du cerveau que comme un nerf: aussi, qu'il est parvenu sur la lame criblée de l'ethmoïde, il se divise en vingt ou vingt-quatre filets environ, qui traversent les trous dont elle est percée pour se rendre dans les fosses nasales; les uns se distribuent sur la cloison; les plus nombreux & les plus longs se répandent sur la paroi externe. Ces filets, tant qu'ils sont apercevables, s'anastomosent souvent entre eux. Il est très-probable que, comme Scarpa & Blumenbach le pensent, ces nerfs forment, ou une membrane particulière, ou bien se confondent, se mêlent intimement avec la membrane veloutée; de sorte que partout où il y a olfaction, il y a présence de ces nerfs.

20. La cinquième paire de nerfs olfactifs, tri-jumeux (*trifacial*, Cn.), fournit les autres nerfs des fosses nasales, mais ceux-ci ne servent nullement à l'olfaction; ils n'ont pour usage que de leur communiquer la sensibilité nécessaire à la vie.

Le rameau nasal, branche de l'ophthalmique, arrive vers le trou orbitaire interne antérieur, se divise en deux branches; l'interne s'enfonce dans ce trou, rentre dans le crâne, & en ressort de nouveau par la petite fente postérieure à côté de l'ophyse crista-galli. Parvenu dans les fosses nasales, il fournit des rameaux, dont les uns se portent sur la cloison, & les autres se distribuent à la lac-

externe; en suite il les quitte pour se porter au dos du nez, où il devient plus consistant & se distribue à cet organe, d'où M. Chauffier lui a donné le nom de *naso-labiale*. L'externe se distribue à l'œil & au labne du nez.

Les autres nerfs que ces parties reçoivent du nerf maxillaire supérieur, proviennent de la branche dentaire antérieure. Pendant qu'elle est enfermée dans le canal de ce nom, il donne un filet qui, après avoir distribué des ramifications au sinus maxillaire, en sort par son ouverture, & traversant la fosse nasale, va s'anastomoser avec le nerf naso-palatin. Les nerfs dentaires, postérieurs & supérieurs, répandent aussi quelques filets dans la membrane du sinus maxillaire.

Ceux qui sont fournis par le ganglion de Meckel (*sphéno-palatin*), sont les suivans: la branche vicienne ou ptérogéidienne, avant de s'introduire dans le trou de ce nom, fournit deux filets qui, ne manquant chez aucun sujet (Bichat), se distribuent au sinus sphénoïdal. Pendant qu'il est renfermé dans ce conduit, il en arrive d'autres qui se distribuent à la partie postérieure & supérieure des fosses nasales; ceux qui entrent par le trou sphéno-palatin se distribuent à la face externe principalement, & dans les cellules ethmoïdales postérieures. Le plus considérable de ces nerfs, mais qui n'appartient pas aux fosses nasales, le naso-palatin, fournit dans son passage à travers cet organe, quelques petits filets qui se distribuent à la membrane muqueuse.

Si les fosses nasales reçoivent des rameaux du grand sympathique, ce n'est que par les filets qu'il envoie à l'orbite-frontal, ou par le moyen des artères.

Artères. L'artère faciale, maxillaire externe, fournit quelques rameaux à la membrane pituitaire, mais les plus nombreux proviennent de la maxillaire interne (*gutturo-maxillaire*).

L'artère dentaire fournit quelques petites branches au sinus maxillaire.

La palatine supérieure donne quelquefois à sa terminaison une petite artériole qui, traversant le trou palatin antérieur, pénètre dans les fosses nasales & se distribue au plancher.

La sphéno-palatine, pénétrant dans les fosses nasales par le trou sphéno-palatin, arrivée au niveau du cornet moyen, ou même quelquefois, avant d'entrer dans le trou dont elle porte le nom, fournit deux ou trois branches principales, dont l'une se porte sur la cloison & s'y distribue, & les autres sur la paroi externe, surtout à sa partie moyenne, & forment de petites ramifications aux sinus maxillaire & frontal & aux cellules ethmoïdales.

L'artère ophtalmique (orbitaire), branche de la carotide interne (céphalique antérieure), donne aussi à ces parties.

L'ethmoïdale postérieure pénètre dans le conduit orbitaire externe postérieur, & pendant qu'elle y est renfermée, elle envoie des ramifications dans les cellules ethmoïdales postérieures; parvenue sur la face supérieure de la lame criblée de l'ethmoïde, elle donne des branches qui s'anastomosent avec l'antérieure & se distribuent à la voûte des fosses nasales.

L'antérieure gagne le trou orbitaire interne antérieur, répand dans son trajet des ramifications sur les cellules antérieures de l'ethmoïde & au sinus frontal; rentrée dans le crâne, elle en ressort par les trous ethmoïdaux, & se distribue à la partie supérieure des fosses nasales.

Veines. Leur distribution peu connue est, en général, la même que celle des artères. Toutefois Vieq-d'Azyr dit que les sinus caveaux communiquent avec les arrière-narines; ces vaisseaux sont placés très-superficiellement dans le feuillet muqueux de la membrane.

Les vaisseaux lymphatiques, à peine connus, vont se rendre dans les ganglions qui enveloppent la veine jugulaire interne.

Usage des fosses nasales. Les fonctions des fosses nasales sont de nous rendre sensibles aux odeurs; cette faculté réside principalement sur leurs parois interne & externe, ainsi que sur les cornets: aussi la pituitaire y est-elle plus longueuse, plus molle, & par conséquent plus propre à servir à l'olfaction. Les diverses cavités accessoires paroissent, d'après les expériences, ne concourir en rien à l'olfaction; mais il est probable qu'il n'en arriveroit pas ainsi si la membrane des sinus étoit dans un état sain. Or, dans toutes ces expériences, il y avoit fistule, & sans doute inflammation chronique de cette même membrane. On sait que les maladies des fosses nasales produisent une anosmie plus ou moins complète.

On a été long-temps sans savoir que c'étoient les nerfs olfactifs qui étoient chargés de cette fonction: Dans l'état actuel de la science, c'est une chose tellement avérée, que personne n'oseroit la révoquer en doute.

Les autres nerfs, qui se distribuent aux fosses nasales, ne servent qu'à leur procurer l'irritabilité nécessaire à la vie; & comme elles en reçoivent un grand nombre, & qu'elles n'ont aucun mouvement à exercer, elles sont une des parties les plus sensibles de l'économie animale. Le plus léger contact, à l'entrée des narines, d'une barbe de plume, d'un poil, produit un chatouillement insupportable, une sensation extrêmement vive; ce contact ayant lieu plus loin, produit des nausées, des vomissemens: combien cette sensation n'est-elle pas pénible, lorsqu'une partie des alimens rejetés par les vomissemens traverse les fosses nasales! Cette membrane, en contact avec elle-même, s'irrite & produit alors l'éternuement, comme on le voit dans le coryza, ou lorsque l'on comprime lé-

grément le nez, à la réunion du cartilage latéral du nez & de ses os propres, près le dos de cet organe.

Elles sécrètent continuellement un mucus liquide, visqueux, filant, se mêlant difficilement à l'eau, destiné à s'opposer à la dessiccation de ces surfaces, que produirait le passage continuel de l'air; ce mucus entretient une humidité constante, retient les molécules odorantes des corps, ce qui, joint à la chaleur animale, nous en fait ressentir plus vivement l'impression. Quelles donc sensations ne nous procurent pas les fleurs de nos jardins, lorsqu'il survient tout-à-coup une légère pluie, qui rend l'atmosphère plus humide!

Situées à la partie supérieure du canal aérien, on doit regarder les fosses nasales comme devant nécessairement être traversées par l'air dans la respiration: aussi sont-elles dans l'état sain le seul passage par où l'air pénètre pour s'introduire dans les poumons. On doit donc regarder, comme s'éloignant d'une bonne conformation, les personnes qui respirent par la bouche, parce qu'elles ne jugent pas ou qu'elles ne jugent qu'imparfaitement des odeurs.

Dans la *phonation*, elles augmentent l'intensité du son, en lui faisant parcourir les différentes cavités. Les personnes qui ont des *otites*, un *coryza*, ou toute autre maladie qui mettent obstacle à la libre circulation de l'air par le nez, ont la voix *nasillarde*, ou, comme on le dit vulgairement, *elles parlent du nez*. Ce même phénomène se remarque encore lorsqu'il existe des perforations de la voûte palatine, ou du voile du palais; maladies produites le plus souvent par la *syphilis*. Un médecin ne peut exercer, & qui entend parler une personne, reconnoît à ce timbre particulier de la voix, l'altération du voile du palais, & rarement il se trompe.

La grandeur des fosses nasales varie suivant les âges; beaucoup moins développées chez les enfants, elles manquent entièrement de cellules ou de sinus lorsqu'ils viennent au monde. Le sinus maxillaire commence déjà à se creuser au septième mois environ de la gestation, mais c'est un simple petit enfoncement qu'il offre; le frontal est celui qui se développe le plus tard, car ce n'est qu'à l'âge de six-huit mois à deux ans qu'on en aperçoit des traces, quoique leur développement ait lieu à l'âge de six à huit ans en général. On peut dire avec certitude que ce n'est qu'à douze ans qu'ils sont ce qu'ils seront toujours, à la grandeur près, car on les trouve d'autant plus étendus, que les individus sont plus âgés: il en est de même pour le reste des fosses nasales.

On a agité la question suivante: la membrane qui revêt les sinus & les cellules, est-elle un prolongement de la pituitaire, ou bien est-elle d'une nouvelle origine secondaire? On prétend déjà que

c'est un problème qui ne sera peut-être jamais résolu.

Maladies des fosses nasales.

Adhérences. Ces adhérences ont presque toujours lieu dans la portion nasale, & n'existent ordinairement que d'un seul côté; elles font produites par des plaies, des ulcères. Si l'adhérence n'a lieu que d'un seul côté, on ne la détruira que lorsque le malade voudra en être débarrassé; alors on portera un bistouri étroit dans la direction connue, on incisera la cicatrice, puis on introduira un bout de sonde de gomme élastique, on mettra de la charpie autour, & l'on continuera long-temps après la guérison de la plaie, pour être sûr que ces parties ne se réuniront pas.

Écartement. Les enfants nouveau-nés présentent quelquefois un écartement de la voûte palatine, qui s'étend depuis l'épine nasale antérieure jusqu'à la postérieure, & fait ainsi communiquer la cavité buccale avec celle des fosses nasales; cet état dépend d'un bec de lièvre. Ce vice de conformation ne réclame d'autres soins que l'opération du bec de lièvre; aussitôt qu'elle est pratiquée, les os se rapprochent & la fente ne tarde pas à disparaître.

Epistaxis. Hémorragie nasale, Hémorrhynie. Cette affection est une des plus fréquentes que l'on rencontre dans les fosses nasales: ainsi que toutes les maladies de cette classe, elle a été distinguée en active & en passive; d'après cela aussi elle a deux modes de traitement, un actif ou antiphlogistique, & un passif ou tonique; mais souvent elle est métastatique & exige un traitement différent.

Les causes de cette maladie sont très-multipliées: ainsi la jeunesse, depuis l'enfance jusqu'à l'âge de vingt à trente ans, ensuite la vieillesse, le tempérament sanguin, les vives affections de l'ame, la colère, une nourriture trop succulente & l'inaction, la suppression d'une hémorragie habituelle, naturelle ou obtenue par l'art, la produisent le plus fréquemment; alors, dans ce cas, elle est quelquefois régulièrement périodique. Chez les jeunes filles, lors de l'établissement de la menstruation, la nature porte ses efforts sur tel ou tel organe, & c'est alors qu'on observe des épistaxis. On l'observe aussi souvent dans un grand nombre de maladies aiguës, soit au début, soit au déclin. Quand il survient un bien-être dans la situation du malade, on regarde l'hémorragie comme *critique*. Si les accidents persistent ou augmentent, elle est considérée comme un *épiphénomène*, ou une crise avortée: telles sont les causes les plus ordinaires quand elle est active. Pour l'hémorragie passive, on l'observe chez les individus affaiblis, dans les constitutions débilitées, chez les personnes atteintes du scorbut; dans ces cas elle est le plus souvent très-dangereuse.

Les signes qui annoncent que cette hémorragie aura lieu, ne sont pas toujours assez certains pour que l'on puisse la prédire. On observe en général des douleurs, des pesanteurs de tête avec battement des artères temporales, une rougeur de la face & des yeux, & un chatouillement de la narine par laquelle le flux doit avoir lieu; mais souvent aussi elle arrive sans qu'aucun symptôme l'ait précédée: celle qui est passive suit toujours cette dernière marche.

Tant que la quantité de sang évacuée n'est pas trop considérable, l'hémorragie peut être utile; autrement, il faut la surveiller, de crainte que le malade ne s'en trouve trop affaibli, mais cela est relatif à la nature de la maladie. Dans tous les cas, tant qu'elle est active, il faut bien faire attention de ne l'arrêter que lorsqu'elle pourroit devenir dangereuse par la trop grande quantité de sang, car on s'exposeroit à une météorisation toujours dangereuse.

Dans la plupart des circonstances où elle se présente, elle n'exige aucun traitement, il faut la respecter; mais remplace-t-elle une autre évacuation, c'est celle-ci qu'il faut rappeler. Chez les individus pléthoriques, il faut diminuer la masse du sang par la diète, les saignées. Paroit-elle dans une maladie aiguë, il faut la laisser aller. Est-elle symptomatique d'un polype, elle est inutile.

L'épistaxis passive étant toujours dangereuse, il est évident qu'il faut l'arrêter.

Les moyens que l'on emploie le plus ordinairement sont les révésifs appliqués instantanément, & surtout lorsque le malade ne s'y attend pas, les pédiluves froids, la glace appliquée au front, au dos, au scrotum, l'eau rendue styptique que l'on fait ressuier au malade. Ces moyens conviennent également lorsque l'écoulement est passif, & on y joint l'usage long-temps continué des moyens propres à relever les forces.

Quand l'épistaxis est très-considérable, & qu'on ne peut l'arrêter par aucun de ces moyens, il faut recourir au tamponnement des fosses nasales, on plinôt à l'occlusion de leurs ouvertures antérieure & postérieure.

Souvent, lorsqu'elle est arrêtée, les malades la font repaître imprudemment. Le caillot qui reste adhérent à la pituitaire causant un chatouillement, ils veulent s'en débarrasser en se mouchant plusieurs fois de suite, & l'épistaxis est reproduite.

Inflammation de la membrane pituitaire. Coryza.

Cette inflammation est très-fréquente, surtout en hiver, & lors des refroidissemens subits de la température.

Ses causes sont celles de toutes les inflammations, mais elle est spécialement produite par le

refroidissement des pieds, de la tête, par les vapeurs, les applications irritantes, &c.; par ces dernières causes, les accidents se déclarent avec promptitude, & en peu de temps l'affection est guérie. On observe aussi très-souvent l'hémorragie nasale lorsqu'une éruption cutanée doit se manifester.

Symptômes. D'abord douleur frontale très-désagréable; les narines sont sèches, l'olfaction est presque nulle; larmoiement, yeux douloureux, éternuements fréquents très-saignants; le malade est obligé de tenir la bouche ouverte pour respirer. Bientôt il s'écoule une sérosité limpide comme de l'eau distillée, très-âcre, irritant les parties de la peau avec laquelle elle est en contact; cette sérosité devient de plus en plus épaisse; les premiers symptômes diminuent, & quelquefois ils cessent entièrement; la mucoité devient épaisse, verdâtre, & reprend peu à peu ses premières qualités; la maladie est terminée dans un temps plus ou moins long, suivant l'intensité & la persévérance des causes.

Le coryza n'exige aucun traitement; souvent il suffit de se tenir chandement, & d'user de quelque pédiluve irritant. Si la maladie est portée au point d'empêcher la respiration par le nez, les fumigations émollientes conviennent particulièrement: ce dernier moyen guérit promptement cette maladie. Si le coryza devient chronique, il se présente sous deux formes très-différentes, on avec sécrétion d'une grande quantité de mucoités, & ce cas est le plus ordinaire, on bien avec sécheresse des narines. On ne ressent presque aucune douleur, il y a sécrétion plus considérable de mucoités, surtout le matin. La matière est quelquefois comme purulente. Au moindre changement de température, à la moindre cause, il prend un caractère plus aigu & cause un peu de gêne. Dans la variété avec sécheresse, les narines sont toujours dans un état de siccité, & il y a anémie plus ou moins complète: cette espèce est toujours plus désagréable que la première, & cause de ce dernier symptôme.

Le traitement consiste principalement à éloigner les causes. Ainsi on conseille au malade de se tenir les pieds chandement; de porter des chaussons de flanelle, de ne pas se découvrir la tête, d'éviter l'humidité; ensuite on recommande les fumigations de vapeurs émollientes, & la maladie cède nécessairement. Dans la seconde variété, on emploiera les mêmes moyens, mais l'astiction est bien plus rebelle. Si ces moyens ne réussissent pas, on pourra conseiller au malade l'usage du tabac, qui excitera la sécrétion de la membrane.

On observe quelquefois un épaississement dans la membrane pituitaire, épaississement dont il faut attribuer la cause à une inflammation chronique, idiopathique ou spécifique. S'il est dû à une inflammation idiopathique, il faut d'abord employer les émollients, & si la maladie

ne cède pas, il conviendra de reconnoître, abs-
aromatiques. La cause est-elle spécifique? Les mé-
dicaments appropriés au genre d'affection devront
être employés. On a reconnoît plusieurs fois des
phlegmons sous la membrane pituitaire; si pa-
reille maladie se présente, on la reconnoît
à la douleur, à la chaleur, au sentiment de pulsa-
tion que le malade éprouveroit dans le nez. Si elle
n'étoit pas située profondément, on s'assureroit de
son existence par la vue & le toucher; lorsque la
suppuration est établie, ce que l'on connoît à la
fièvre, à la douleur pognitive, on y porte le bis-
tour, on incise largement, le pus s'écoule, & la
maladie ne tarde pas à guérir, s'il ne s'y joint pas
de complications.

Hydropisie du sinus maxillaire. A la suite d'un
pus ou moins grand nombre de corsifs aigus ou
chroniques, ou après une ulcération ou une fistule
d'une partie du cornet moyen, il peut se faire que
l'ouverture du sinus maxillaire, très-étroite natu-
rellement, se trouve oblitérée par l'adhérence de
ses bords ou par celle du cornet; dès-lors le mucus
ne pouvant plus écouler, s'amasse dans cette
cavité & donne lieu à la maladie improprement
dénommée sous le nom d'*hydropisie*. S'il n'y avoit
point d'inflammation dans ce sinus, elle ne tarde
point à s'y développer, & alors les accidens aug-
mentent avec plus d'intensité. Cette maladie n'est
pas toujours facile à reconnoître, & on pourroit
bien la confondre avec un fungus du sinus maxi-
laire, mais l'erreur ne seroit nullement préjudi-
ciable au malade. On éprouve un sentiment de
tension, les os très-minces se déjetent de côté &
d'autre, jusqu'à ce qu'ils aient produit une fistu-
le par laquelle la matière s'écoule. C'est une chose
singulière que la dissolution des os, leur ramollis-
sement a plutôt lieu que le déchirement de la ci-
carrice. Il sera toujours assez difficile de la recon-
noître, de la distinguer du fungus maxillaire;
ce n'est guère que parce que cette production ne
sera pas trouvée dans la fosse nasale correspondante,
que l'on pourra en acquiescer quelque certitude.

Le traitement de cette affection consiste à don-
ner une issue à la matière sécrétée & à celle qui se
sécrète lorsque le sinus aura été vidé: il faut donc,
ou créer un nouvel écoulement à la muco-
sité, ou rétablir l'ancienne voie. Pour le pre-
mier moyen, si une des dernières dents molaires
manquoit, ou que la matière s'écouloit entre
une dent malade & l'alvéole, on arracheroit
cette dent, & on pratiqueroit une large ouver-
ture avec perle de substance, au moyen du trépan
perforatif; mais si les dents étoient saines, il fan-
droit se décider à faire l'ouverture de ce sinus à la
partie antérieure & externe de la fosse canine, après
avoir incisé circulairement la membrane. Dans
tous les cas, la fistule indique le lieu de nécessité,
alors on agrandit le plus possible l'ouverture;
lorsque la maladie est portée à un haut degré, le

bord alvéolaire devient si tendre qu'on l'incise fa-
cilement avec un scalpel. Les mucus renfermés à
quelquefois de la peine à sortir, parce qu'il est
trop épais; alors on injectera de l'eau tiède pour
l'entraîner peu à peu. L'ouverture du sinus maxi-
laire, proposée par Jourdain & rejetée par l'an-
cienne Académie royale de chirurgie, seroit bien
le meilleur moyen à employer. Voici la manière
dont on pourroit opérer: on prendroit la canne
d'un trois-quarts courbe, de trois millimètres en-
viron de diamètre; on l'éleveroit au côté externe
du sinus malade, pour l'introduire alors, de de-
dans en dehors, & de bas en haut, la convexité
tournée contre la cloison, & un peu en haut, afin
de glisser l'instrument sous le cornet inférieur. Dès
qu'on l'auroit fait pénétrer à la profondeur de
quatre à cinq centimètres, & que l'on auroit jugé
à sa direction qu'il est parvenu au niveau de l'or-
bite, on seroit sûr qu'en introduisant la lame du
trois-quarts, dont la pointe doit être aplatie, on
parviendroit ainsi dans le sinus; on le perforeroit,
on inciserait largement en le portant en avant &
en arrière, on injecteroit ensuite, avec force, au
moyen de la canule que l'on auroit maintenue dans
l'ouverture. Le sinus vidé, on y porteroit au bout
d'une petite tige de fer un morceau de pierre in-
fernale, avec laquelle on cautériseroit.

Abcès du sinus maxillaire. Les abcès du sinus
maxillaire sont presque toujours dus à une carie,
à une nécrose des parois de cette cavité, ou du som-
met d'une dent.

Les symptômes auxquels ils donnent lieu sont
assez équivoques; on ressent en général une dou-
leur profonde dans les joues; l'air qui sort de la
narine du côté malade a une mauvaise odeur;
on observe aussi un écoulement purulent par cette
même ouverture. Lorsque, par ces symptômes, on
a reconnu la maladie, on procède comme pour
l'hydropisie du sinus, en observant les mêmes pré-
cautions; toutefois l'ouverture doit être moins
grande, puisqu'elle se refermera. Si déjà il y avoit
carie, on la changeroit en nécrose, au moyen
du cautère actuel; on attendroit la chute de l'es-
carre, & on injecteroit tous les jours une décoction
émolliente. S'il y avoit oblitération de l'ou-
verture naturelle, le pus produiroit les mêmes
symptômes que l'hydropisie; le traitement seroit
alors absolument le même. Cette maladie est tou-
jours très-longue à guérir.

Ulcers. Les ulcérations des fosses nasales pré-
cèdent ou suivent quelquefois le coryza. Les cau-
ses les plus communes sont le coryza aigu ou
chronique, un corps étranger, le virus syphiliti-
que; les scrophules, les dartres, la carie, la néc-
rose. Quand ils sont situés peu profondément, il
n'est pas difficile de les reconnoître par la vue;
mais s'ils sont profonds, les lignes sont assez équi-
voques. Ainsi, une douleur dans un point quel-
conque, un écoulement de mucus purulent, le-
ticide, surtout en très-grande quantité quand le ma-

lade se mouche, ensuite l'existence d'un corps étranger, l'état scrophuleux, dartreux, & surtout syphilitique du sujet, sont d'un grand secours pour reconnoître cette maladie. Si les ulcères ne sont dus à aucune de ces dernières causes, leur traitement est plus difficile, plus long, & c'est plutôt la nature qui guérit que les médicaments; on aura recours aux émollients en fumigation, & on leur substituera ensuite les aromatiques. Les ulcères des sinus maxillaires doivent être traités comme des abcès, dont souvent ils sont les causes; ceux qui sont dus à la syphilis, &c., guérissent très-promptement par les remèdes appropriés à ces diverses maladies.

Quelques ulcères, situés à l'ouverture des narines, sont souvent rebelles, quoique dans une position très-propre pour qu'ils guérissent promptement. Une petite démangeaison s'établit, les malades y portent le doigt, une ulcération a lieu, se couvre d'une croûte que le malade enlève, & ainsi de suite. Ces irritations continuelles peuvent rendre cette maladie cancéreuse, dont les progrès sont très-prompt et exigent l'ablation entière de la partie, par le bistouri ou la cautérisation arsenicale. Pour s'opposer à ces suites dangereuses, on recommande au malade de n'y pas toucher, d'y faire des applications émollientes, de les enduire d'écraï; on pourroit substituer à ce dernier un digestif plus ou moins animé, suivant l'état de la maladie.

L'ozène est une maladie très-grave, non par les dangers qui peuvent l'accompagner, mais bien par les désagréments qu'elle fait éprouver à ceux qui en sont atteints, parce que chacun les évite autant qu'il peut, tant leur haleine est fétide. Les causes de cette maladie sont le plus souvent inconnues; la carie, les ulcérations, donnent bien une mauvaise odeur, mais elles peuvent guérir; l'ozène, au contraire, est généralement incurable, & se présente par malheur assez fréquemment. On la rencontre surtout chez les personnes dont les ouvertures du nez sont dirigées en haut; elle peut paroître à tout âge; elle a été autrefois mise au nombre des causes du divorce. Quelques personnes l'ont attribuée à une ulcération, à une carie située profondément; M. Cloquet croit qu'elle dépend d'un spasme de muscle dans les sinus, & dont une mauvaise conformation s'opposeroit à la sortie. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'écoulement purulent.

On prévoit, d'après ces raisons, que cette maladie est à peu près incurable. Est-elle symptomatique d'une carie, d'une ulcération? ce sont ces altérations qu'il faut traiter. Mais si la cause est une mauvaise conformation, le traitement est tout-à-fait impuissant.

On pourroit conseiller aux malades l'emploi des parfums, qui masqueroient la mauvaise odeur & les rendroient plus supportables à ceux qui les entourent.

Après l'histoire de ces affections, vient naturellement se placer celle des *polypes* des fosses nasales.

On les a distingués en polypes mous, vésiculaires, indolens; en polypes fibreux, cassés en polypes carcinomateux.

Ces polypes peuvent prendre naissance de toutes les parties de la membrane pituitaire. Cependant ceux de la deuxième espèce affectent de préférence la partie postérieure des fosses nasales, & se propagent plus particulièrement dans le pharynx.

Quelle que soit leur nature, voilà les symptômes généraux qu'ils produisent: d'abord gêne de la respiration, la voix devient nasillarde, la sécrétion du mucus est augmentée; bientôt ils acquièrent un plus grand volume, se répandent dans les méats, dans les sinus, & se présentent à l'ouverture antérieure, pénètrent dans le pharynx, dévient l'œil en dehors, de-là exophtalmie; la joue correspondante acquiert un plus grand volume, les douleurs alors sont plus vives; les os se ramollissent, se laissent couper facilement; les dents tombent au moindre contact, &c.; des épistaxis fréquentes obligent quelquefois de tamponner. Les polypes, qui sont carcinomateux, chassent lieu de fréquentes hémorragies, sont douloureux & saignent au toucher, & se jettent de préférence dans le pharynx; les polypes mous, au contraire, se détachent facilement, deviennent plus volumineux dans les temps humides, & se portent principalement en avant.

La cause de ces affections est assez généralement inconnue; on dit que les personnes qui sont souvent atteintes de coryza y sont plus exposées que les autres; elles ont quelquefois succédé à la suppression d'une évacuation habituelle.

Le traitement des premiers est toujours difficile; celui des autres est presque toujours impossible; les polypes vésiculaires repoussent, s'ils ne sont pas entièrement enlevés; les polypes durs & fibreux dégénèrent ordinairement en cancer.

Deux méthodes de traitement sont à présent employées pour leur guérison, la ligature & l'arrachement. La ligature a du succès lorsque le polype offre un pédicule étroit; ce qui arrive rarement. Quant aux polypes durs & saignans, on s'assure, au moyen d'un stylet, du lieu d'où ils prennent naissance: lorsqu'on l'a trouvé, on porte une sonde de Bellocq d'un côté du pédicule, on pousse le ressort, on y attache un fil & on le retire, alors on porte la sonde de l'autre côté de son pédicule, & on agit de même; il le trouve ainsi compris dans une anse de fil, dont on introduit les deux bouts dans le serre-nœud de Desault. Si le polype étoit incliné du côté du pharynx, il faudroit le traverser d'un fil pour le retenir au moment où il tomberoit, car sans cette précaution il pourroit faire périr le malade de suffocation.

Pour l'arrachement, on se sert de pince; on

va saisir le polype le plus haut passible, & on en fait l'arrachement en le tordant; s'il falloit la saisir par l'arrière-narine, on se servirait d'une pince recourbée & on l'arracheroit de haut en bas; on a quelquefois été obligé de fendre le voile du palais. On ne peut que tracer des règles générales, pour ces différens procédés; c'est en génie du praticien à les adapter aux cas particuliers, lesquels peuvent varier à l'infini.

Les polypes vésiculeux peuvent guérir par ce traitement, mais rarement ceux qui sont carcinomateux sans détruits: il faudroit pour ceux-ci pouvoir les arracher entièrement ou les cautériser, ce sans cette précaution, ils repullulent avec beaucoup plus d'intensité, finissent par devenir cancéreux, s'ils ne le sont déjà, & font périr le malade.

Les tumeurs fongueuses ou fongus du sinus maxillaire prennent naissance, comme leur nom l'indique, dans cette cavité; elles produisent d'abord le gonflement de la joue, l'exophthalmie, le ramollissement de l'os maxillaire, le perforant, & de-là pénètrent dans les fosses nasales.

Le fer & le feu, surtout ce dernier, employés avec persévérance, peuvent guérir cette maladie.

Ou ouvrira donc largement le sinus maxillaire comme nous l'avons indiqué plus haut, on arrachera tout ce qu'on pourra de fongus, & ensuite, avec le fer incandescent, on cautérisera fortement.

Fistules des fosses nasales. Ces fistules ont leur siège dans les sinus frontal & maxillaire.

Fistules du sinus maxillaire. D'après ce que nous avons dit en parlant de l'abcès & de l'hydrociste du sinus maxillaire, on voit que ces maladies les produisent fréquemment; elles peuvent ensuite être la suite de l'ulcération, de la carie, de l'évolution d'une dent qui pénétreroit dans ce sinus, d'un projectile lancé par la combustion de la poudre à canon. Nous avons déjà indiqué le traitement: agrandir le fistule existante, ou bien pratiquer une nouvelle ouverture en bas de la fosse canine, & faire des injections émollientes détersives; lorsque la cause qui l'eura produite sera détruite, la fistule disparaîtra.

Les fistules du sinus frontal sont presque toujours incurables. Leurs causes sont: les plecies péénétrantes, les plaies d'armes à feu, la carie, le nécrose; souvent enfin elles sont la suite de la syphilis, &c.

Le traitement consiste à rapprocher le plus possible les lèvres de la plaie, pour tâcher d'opérer la cicatrice; si le rapprochement n'est pas assez considérable, on préserve le sinus des corps étrangers, au moyen d'une plaque de cuir.

La carie est une maladie toujours grave, surtout si elle occupe la partie supérieure des fosses nasales ou le sinus maxillaire; les contusions, les fractures, la syphilis, les scrophules, les dentries, les ulcères, peuvent l'occasionner; elle se reconnoît à la fétidité de l'haleine, à la douleur persis-

tante dans un point, à un écoulement sanguin, & à quelques portions d'os que le malade trouve dans son mouchoir; si elle est située profondément, il est impossible de la guérir. Si, après avoir employé les antivéneriens, elle ne se guérit pas, il faut, si cela est possible, la transformer en nécrose au moyen du fer ou des caustiques; pour y parvenir, on imprègne une boulette de charpie de la substance corrosive, & on la maintient quelque temps appliquée sur la partie malade; mais c'est un moyen très-difficile à employer; le plus souvent on est obligé de s'en tenir aux soins de propreté. Si cette maladie a lieu dans le sinus maxillaire, elle peut produire une fistule ou un abcès, & doit être traitée comme le réclament ces maladies. Quand la carie a détruit les parties supérieures de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, l'épine nasale supérieure, &c., le nez s'affaisse & produit une difformité très-défigrante, & quelquefois alors les os du nez prennent part à l'affection.

La nécrose, due à peu près aux mêmes causes, est assez rare dans les fosses nasales; elle s'exige que l'extraction des parties mortes, qui très-souvent tombent d'elles-mêmes: si cependant la pièce d'os étoit trop considérable & qu'elle fût accessible aux instrumens, on le briserait avec des tenettes pour l'extraire plus facilement.

Quelquefois il y a communication des fosses nasales avec elles, par la destruction d'une partie de la cloison; destruction produite le plus souvent par le vice syphilitique; mais cette maladie ne demande aucun traitement particulier. Il n'en est pas de même lorsque les fosses nasales communiquent avec la bouche, la mastication est plus difficile & la parole surtout en est très-altérée; on remédie à tous ces accidens au moyen d'un obturateur qui bouche complètement cette ouverture.

Corps étrangers introduits dans les fosses nasales. Ils sont de deux sortes, ou animés ou privés de vie.

Ceux qui sont animés sont très-dangereux, produisent des symptômes effrayans, & même la mort. La présence de ces corps étrangers dans les fosses nasales, étant très-rare, lorsqu'on a lieu de les observer, on attribue toujours les désordres qu'ils produisent à d'autres causes: on fait subir des traitemens au malade, il meurt pendant ce temps; & si on a la précaution d'ouvrir les fosses nasales, ce qui arrive rarement, on découvre la cause de cette mort affreuse.

Les corps étrangers que l'on a eu l'occasion d'observer chez l'homme, sont dus à l'œuf des moutons, dont le germe déposé sur les narines, ou porté par toute autre cause, se glisse peu à peu, & le plus ordinairement jusque dans le sinus frontal.

Dans le sinus, la larve de la mouche de la viande, ou l'asclète lui-même, peuvent, lorsqu'ils existent dans les fosses nasales ou les sinus, produire

produire des accidens fâcheux, dont la cause n'est pas toujours facile à connoître.

Une douleur vive dans le sinus frontal, les tempes, une céphalalgie atroce, le d'être, un écoulement fétide par le nez, ne tardent pas à se présenter; bientôt l'appétit diminue, le malade s'épuise, & la mort arrive après de terribles souffrances. Quelquefois l'animal fort spontanément, & alors les symptômes cessent tout-à-coup. Quoique ces symptômes ne se montrent que lorsqu'il y a des anévrysmes dans les cavités, si l'on en soupçonnoit l'existence, on pourroit tenter l'application d'une couronne de trépan; opération qui ne peut pas être très-nuisible, & au moyen de laquelle on guériroit sûrement la maladie. On a proposé de remplir d'huile les cavités nasales, afin d'asphyxier ces animaux, ou bien d'employer les sternutatoires pour tâcher de les chasser; mais ces moyens font rarement utiles, surtout le dernier, car les ouvertures qui conduisent dans les sinus sont si étroites, que l'air qu'ils contiennent est à peine ébranlé dans la sternutation.

Les corps étrangers inertes peuvent être de toute nature; on y a vu des haricots, des balles, des billes à jouer. Ils peuvent être situés dans différens points des fosses nasales. Ils produiront le coryza, des ulcérations, & même la carie, si l'on n'a pas le soin de les extraire le plutôt possible, soit au moyen de pincettes, soit en produisant l'éternuement, qui en pareil cas est plus utile que lorsque ce sont des vers qui tourmentent le malade. Les projectiles lancés par la combustion de la poudre à canon peuvent y séjourner très-long-temps, & ne sont pas toujours faciles à extraire, mais leur présence est ordinairement sans danger.

On rapporte aussi des exemples de concrétions crétacées rendues, soit en se mouchant, soit en éternuant, & c'est seulement dans ces circonstances qu'on est instruit de leur existence.

Les fractures des os des fosses nasales, lorsqu'elles ont lieu, sont moins dangereuses par elles-mêmes que par les causes qui les ont produites, & qui portent toujours leur action jusque sur le cerveau. On conçoit fort bien que dans une fracture de l'ethmoïde, du sphénoïde ou du maxillaire supérieur, cet accident est celui sur lequel on porte le moins son attention; les symptômes concomitans sont redoutables. J'ai vu plusieurs fois de ces fractures, & toujours les malades ont succombé.

Si l'on n'y avoit qu'une fracture des os du nez, on les remettoit en position au moyen d'une sonde de femme ou de tout autre instrument analogue. Dans la plupart des cas le bandage seroit inutile, mais ordinairement on en met un, plutôt pour soutenir les résultats que l'on applique sur cet organe, que pour maintenir les fragmens.

Il nous reste encore à indiquer les exostoses des

MÉDECINE. Tome X.

parois de ces cavités. Elles peuvent être occasionnées par des contusions, par le virus syphilitique, &c. Le plus ordinairement elles ont leur siège sur l'os maxillaire supérieur ou sur les os du nez. Si elles sont vésicériennes, le traitement antisyphilitique doit être administré. Survenues sans cause connue, mais si elles font petites, on les respèce; très-volumineuses, on en feroit l'ablation au moyen d'une petite scie, ou avec la gonge & le maillet.

L'anosmie est presque toujours le résultat de l'inflammation chronique de la membrane muqueuse: elle peut être due à une maladie qui a son siège dans le cerveau, à une tumeur qui comprimerait les nerfs olfactifs. Elle peut être aussi occasionnée par la plupart des maladies dont nous avons parlé plus haut. Dépend-elle d'un coryza? il faut traiter cette affection. Est-elle due à une maladie qui a son siège dans le cerveau? on conçoit que le traitement est le plus communément difficile, & sans efficacité. Reconnoît-elle pour cause les polypes des fosses nasales? c'est contre ces maladies qu'il faut diriger les moyens de traitement.

Les perversions de l'insalivation, beaucoup plus communes chez les femmes que chez les hommes, sont le plus souvent incurables; mais heureusement elles sont rares.

NERF NASAL. Le nerf ophtalmique (orbito-frontal), branche du trifacial, le plus souvent avant de pénétrer, & quelquefois en entrant dans l'orbite, se divise en trois rameaux; celui qui est situé le plus inférieurement, & qui est le moyen pour la grosseur, est le nerf nasal.

En pénétrant dans l'orbite, il traverse avec le moteur commun (oculo-musculaire commun) & l'externe (oculo-musculaire externe), l'extrémité postérieure du muscle droit externe, & continuant son trajet, il passe entre le nerf optique (oculaire) & le muscle droit supérieur de l'œil, & gagne la paroi interne de l'orbite.

Avant ou après son entrée dans l'orbite, ce nerf donne un filet assez gros & court, qui, suivant le côté externe du nerf oculaire, va le rendre au ganglion ophtalmique (orbitaire); peu après il fournit deux petits filets ciliaires, dont un s'anastomose presque toujours avec un nerf ciliaire; ils ont la même direction que ces nerfs, & se distribuent aux mêmes parties.

Lorsque le nerf nasal est arrivé vis-à-vis le trou orbitaire interne antérieur, il se divise en deux branches d'un volume à peu près égal, l'une interne & l'autre externe.

La branche interne pénètre dans le trou orbitaire interne antérieur, qui le ramène dans le crâne, est recouvert par la dure-mère; il s'introduit dans la fente longitudinale creusée sur le côté de l'apophyse crista-galli, sort de nouveau du crâne pour se distribuer aux fosses nasales; lorsqu'il y est

Q 99

parvenu, il fournit un grand nombre de filets plus ou moins longs, à la membrane muqueuse; poursuivant son trajet convert par la pituitaire, il se place sous les os du nez dans une petite rainure, & se porte sur le dos du nez, en passant entre son cartilage latéral & les os du nez, rarement en traversant ces derniers: dès qu'il est sorti des fosses nasales, il devient beaucoup plus consistant & se distribue aux tégumens du lobe du nez.

Le rameau externe, nasal externe, continue son trajet le long de la paroi interne de l'orbite, s'anastomosant dès qu'il est arrivé vers la poulie du muscle grand oblique, avec un rameau du frontal; sortant ensuite de cette cavité, il se divise en plusieurs filets qui se distribuent au muscle orbiculaire (nafo-palpébral), au sac, à la caroncule lacrymale, au muscle pyramidal du nez (fronto-nasal) & aux tégumens; ils s'anastomosent aussi avec des filets provenant du nasal interne, du sous-orbitaire & du trifacial, septième paire.

OS PROPRE DU NEZ. OS NASAL. Il est situé à la partie antérieure des fosses nasales & supérieure du nez; il est quadrilatère, beaucoup plus épais supérieurement qu'inférieurement, où il est très-mince. Sa face externe, élargie, est convexe transversalement, concave dans son grand diamètre supérieurement, & plane inférieurement; on y voit ordinairement plusieurs petits trous nourriciers, & un autre plus considérable, qui sert de passage à des vaisseaux, & quelquefois on en voit un pour le nerf nasal interne; elle est recouverte par le muscle pyramidal, fronto-nasal & les tégumens. La face interne, nasale, est concave, inégale en haut, polio-inférieurement; elle présente quelques sillons qui logent des artères & des nerfs: un surtout, plus considérable, reçoit le nerf nasal interne. Cette face est entièrement recouverte par la membrane pituitaire; le bord interne ou nasal, plus épais supérieurement qu'inférieurement, s'articule dans la plus grande partie avec celui du côté opposé, par la partie la plus postérieure, avec l'épine du coronal & la tige perpendiculaire de l'ethmoïde; le bord externe ou maxillaire est le plus mince, coupé en biseau au dessus de la face externe; il s'articule avec le bord antérieur de l'apophyse nasale de l'os maxillaire supérieur. Le bord inférieur est le plus mince, coupé inégalement de haut en bas & de dedans en dehors; il donne attache au fibro-cartilage du nez. Le bord supérieur est épais, inégal, & s'articule avec l'échancrure nasale du coronal. Cet os a donc des connexions avec les os maxillaires supérieurs, le coronal & l'ethmoïde; c'est lui principalement qui donne au nez une forme plus ou moins élégante. Il se développe par un seul point d'ossification. (N. G. B.)

NASCUS (*Biographie médicale*) (Sébastien),

médecin du dix-septième siècle. On lui doit une méthode générale du traitement dans les maladies: *Speculum methodi medendi*. Brixia, 1633, in-fol. (L. J. M.)

NASÉALE. (*Pathologie*.) On désigne sous ce nom une espèce de peccaire composé de laine & de coton, & disposé en plamasseau. Il n'est plus en usage. (L. J. M.)

NASILLARD, adj., *nasilloquus*. Mot à mot, qui parle du nez. On dit que la vix d'une personne rend un son *nasillard*, lorsque l'air, par une cante quelconque, ne peut plus passer par les narines, & qu'il semble raisonner dans les cavités nasales, passagèrement, sans communication avec l'extérieur. Le son *nasillard* s'observe surtout chez les individus qui ont des coryzas, & des polypes, ou toute autre cause d'occlusion des conduits du nez. (A. J. T.)

NASITORT. (*Matière médicale*.) *Lepidium sativum* de Linné, connu sous le nom de *croffon alenois*, *croffon des jardins*.

On emploie fréquemment les feuilles de cette plante, dans le dessein d'opérer la médication, vulgairement désignée sous le nom d'*action du d'effort antiscorbutique*. Du temps de Pline & de Dioscoride, le nasitort servoit à la composition d'un topique souvent employé dans le traitement des affections phtoriques & dartreuses. On ne doit pas oublier, en parlant du nasitort, que, guidés par l'analogie végétale, les compagnons du voyageur Schouten trouvèrent une ressource aussi précieuse qu'inspérée, contre le scorbut, dans le *lepidium oleraceum*, qui croît sur les bords du détroit de Magellan. (*Voyez* SCORBUT.) (L. J. M.)

NASO-OCULAIRE, NASO-PALATIN, NASO-PALPÉBRAL, NASO-SURCILIER. Dénominations qui ont été données à différents nerfs ou à différents muscles, d'après leurs rapports ou leur position. (*Voyez* ces mots dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*.)

(L. J. M.)

NASSAVIUS (Louis). (*Biographie médicale*.) Cet auteur, qui appartient à la première moitié du dix-septième siècle, n'eut point assez de force d'esprit pour en repousser les fables & les superstitions. Il écrivit une épître sur la manière de guérir les blessures par la sympathie; ouvrage qui ne peut plus nous intéresser aujourd'hui que dans ses rapports avec l'histoire des erreurs de l'esprit humain, & sur lequel on est étonné que l'étoile de Haller se soit arrêtée.

(L. J. M.)

NATA, NATTA, NARTA, NARA ou NAIDA.

(*Pathologie.*) C'est le *sarcoma natta* de Sauvages, c'est-à-dire, une espèce de tumeur charnue, pédicellée, se développant à la surface de la peau, & qui se manifeste le plus ordinairement à la région dorsale. (L. J. M.)

NATALIS (Jean) (*Biographie médicale*), né à Messine, le 16 mars 1642, fut reçu docteur en philosophie & en médecine en 1661. Comme médecin, il a joui d'une réputation méritée, qui s'étendit dans toute la Sicile & dans tous les pays circonvoisins. Son titre de docteur ne l'empêchoit pas de se confondre avec les élèves, & il assistait régulièrement aux leçons de Malpighi (Marcel), de Borelli & de Charles Fracassati; c'est en suivant de semblables maîtres qu'il fut tiré un grand parti de leur instruction. On croit qu'il mourut en 1750. Ce médecin a écrit plusieurs ouvrages de poésie, & a laissé quelques manuscrits sur la médecine. (*Extr. d'Eloy.*)

(A. J. T.)

NATATION. (*Hygiène.*) C'est l'art de se mouvoir & de se diriger dans un liquide, en ne prenant d'autres points d'appui que ceux qui résultent de la résistance même du milieu dans lequel le corps est plongé.

La natation est le mode de progression le plus universellement répandu; & dans toutes les classes d'animal on trouve de nombreuses espèces douées de cette faculté.

Parmi les mammifères, presque tous les quadrupèdes nagent plus ou moins bien, & quelques-uns même carnassiers ou herbivores, trouvant au sein des eaux leur nourriture habituelle, y passent la plus grande partie de leur existence, & ne viennent à terre que pour dormir.

Les mammifères amphibies, doués de membres moins parfaits, ne se meuvent sur la terre que très-difficilement; c'est au milieu des flots seulement qu'ils jouissent de toute leur force, & qu'ils peuvent déployer toute leur agilité.

Les mammifères cétaqués enfin, n'ont pas d'autre moyen de locomotion. Il en est de même pour les poissons, sauf le vol des trigles & le ramper des anguilles. Quelques auteurs, il est vrai, ont prétendu que certains poissons à nageoires fortes & roides, s'en servoient pour marcher au fond de l'eau, mais ce n'est là évidemment qu'une conjecture fondée sur une apparence grossière, & dénuée d'ailleurs de toute vraisemblance.

Parmi les oiseaux, les familles nombreuses des palmipèdes, quoique douées presque toutes d'un vol très-élévé, sont sur les eaux leur séjour le plus habituel; leur corps, disposé en carène, glisse légèrement, poussé par des rames de la construction la plus ingénieuse, & quelquefois même par le vent dont ils empruntent le secours au moyen de leurs ailes étendues.

Dans la classe des reptiles, les tortues, les crocodiles, les grenouilles, les salamandres, nagent avec la plus grande facilité; les serpents mêmes peuvent traverser les eaux & s'y soutenir par des ondulations semblables à celles qui les font avancer sur un sol résistant.

Les mollusques nus, presque tous habitants des eaux, sont doués au plus haut degré de la faculté de nager. Le poulpe poursuit & atteint avec une effrayante rapidité les animaux dont il fait sa proie. Parmi les mollusques crustacés, plusieurs sont, il est vrai, condamnés par la pesanteur de leur coquille à rester constamment au fond des eaux; mais cet obstacle n'existe pas pour tous. L'argonaute, en vidant sa nacelle, peut s'élever des profondeurs de la mer, & dans les jours fereux ou le voit à la surface dresser au vent sa petite voile, ou agiter en rame les tentacules symétriques. L'huître, plus pesante, peut cependant aussi, en chassant brusquement l'eau comprime entre ses valves, se détacher du fond & s'élever par un mécanisme semblable à celui qui fait monter la fusée volante ou reculer le canon.

Dans la classe des insectes, les hydrophiles, les dytiques, parcourent les eaux dans toutes les directions en poursuivant leur proie, tandis que les gyryns tournent à la surface, & que les hydrachnes s'y meuvent en ligne droite par des élans répétés. Un grand nombre de crustacés marchent en nageant à volée, & parmi les insectes ailés eux-mêmes, il en est beaucoup qui, à l'état de larves, ont passé dans l'eau une grande partie de leur existence.

Les vers, espèces de larves qui ne doivent point se développer, se trouvent aussi abondamment au sein des eaux, & plusieurs espèces s'y sont remarquées par la vivacité & la bizarrerie de leurs mouvements.

Les animaux du dernier ordre, enfin, les zoophytes, peuplent de leurs innombrables légions les mers, les lacs & les rivières; les marais croupillans en recèlent des myriades dont le microscope peut seul nous dévoiler l'existence; tandis que dans les mers du Sud, des îles d'une vaste étendue s'élèvent en peu d'années par la seule déposition de certains polypes: ceux-là, il est vrai, sont fixés au sol par une tige immobile; mais des espèces plus nombreuses se meuvent librement au milieu de l'Océan. On voit à la surface, lorsque le temps est calme, les alcyons, les méduses, étaler leurs brillantes couleurs. Si la mer vient à mugir, si les vagues se soulèvent, elles disparaissent soudain & vont chercher à de plus grandes profondeurs une mer moins agitée. D'autres espèces destinées à l'ornement des nuits, étincellent dans les mers des régions équatoriales, & traversent les flots avec la rapidité comme avec l'éclat du météore. Si de ces espèces brillantes nous descendons aux espèces les plus humbles, à ces êtres

obscur, dont l'existence fut si long-temps ignorée; si nous observons les mœurs, les habitudes des rotifères, des vibrions, des animaux spermatoïques, des monades, de tous les animaux infusoires, en un mot nous les voyons nager dans les diverses liqueurs où la nature les a fait naître.

Si l'on considère quelle diversité de formes se montre dans cette longue série d'animaux, on concevra sans peine qu'au milieu des mêmes circonstances accoutumées, leurs modes de locomotion devront cependant être infiniment variés. Entendre de les faire tous connaître, serait une tâche très-difficile & très-pénible; car, dans un tel travail, les livres ne feraient presque d'aucun secours, & pour bien décrire chaque mouvement il faudrait l'avoir observé dans les lieux mêmes où vit l'animal: heureusement, pour bien connaître la théorie de la natation, il n'est pas nécessaire d'en avoir étudié le mécanisme sur un grand nombre d'espèces, & lorsqu'on l'a bien comprise, on ne peut éprouver aucune difficulté à en faire l'application aux différents cas qui se présentent.

Tous les animaux qui naissent peuvent être, sous ce rapport, divisés en trois classes; non point d'après leurs caractères zoologiques & leur ordre dans la chaîne des êtres, mais seulement d'après leur pesanteur spécifique & suivant qu'elle est inférieure, égale ou supérieure à celle du liquide dans lequel ils ont à se mouvoir.

Les oiseaux palmipèdes nous offrent un exemple du premier cas: leur corps, spécifiquement plus léger que l'eau, flotte nécessairement, & ainsi les mouvements natatoires ont pour but, non de les soulever à la surface; mais de les y faire glisser dans diverses directions. Pour exemple du second cas, nous avons les poissons à vessie, qui, au moyen de cet appareil, peuvent donner à leur corps une pesanteur spécifique, égale à celle de l'eau dans laquelle ils se trouvent. Ainsi en équilibre, leur corps se maintient sans mouvement à une hauteur quelconque, pourvu toutefois qu'il soit totalement immergé. Pour le troisième cas, enfin, nous citerons l'homme & les mammifères quadrupèdes; leur corps, spécifiquement plus pesant que l'eau, tend naturellement à gagner le fond, & ils ne peuvent s'élever ou se maintenir à la surface qu'en faisant naître, par des mouvements répétés & à l'aide de la résistance du liquide, une suite d'impulsions qui les portent en haut.

Nager des poissons à vessie.

Borelli a décrit avec beaucoup de précision & d'exactitude le nager des poissons à vessie: il a fait voir que cette poche aérienne peut être comprimée par un appareil musculaire, de sorte que

le poisson a la faculté de changer de volume sans changer de poids, c'est-à-dire, d'augmenter ou de diminuer à volonté la pesanteur spécifique: faculté qui ne lui sert pas seulement pour le faire monter ou descendre, mais encore pour se tenir habituellement en équilibre dans l'eau, dont la pesanteur n'est pas constante & varie suivant le degré de pureté & suivant le degré de température. Il a reconnu, par des expériences, que la locomotion, chez ces animaux, ne résultait point communément de l'action des nageoires, mais des mouvements de la queue, & il a comparé ce mouvement de la queue qui fait avancer le poisson, à celui d'un aviron placé à l'arrière d'un canot & agité alternativement à droite & à gauche. Cette comparaison est parfaitement juste; cependant elle n'a pas paru telle à Barthez: « elle fauflloit, suivant lui, une objection que Borelli n'a point apportée, & à raison de laquelle on peut dire que le problème de nager n'a point été résolu jusqu'ici. »

Comme je n'ai point aperçu cette difficulté, & que même les différences indiquées par Barthez entre les différents cas me semblent tout-à-fait inférieures, je crains de n'avoir pas compris son objection, & je me crois obligé de la rapporter toute entière.

« L'aviron, dit-il, ne ment alors la nacelle en avant que parce que le rameur imprime à l'extrémité de la partie intérieure de l'aviron (à laquelle il est appliqué) un mouvement qui pousse la nacelle en avant en même temps que la pale de l'aviron pousse l'eau en sens contraire; & ce mouvement en avant est plus grand à proportion de ce que l'aviron trouve plus de résistance dans ce fluide (toutes choses étant égales d'ailleurs). »

« Mais si l'aviron étoit articulé par son bout opposé à sa pale (ou intérieure) avec le bord de la nacelle, & se mouvait librement dans cette articulation, où l'on supposeroit qu'il fût assujéti par des cordages, une puissance quelconque qui serait alors interposée entre l'eau & la nacelle, & qui n'agiroit que sur cet aviron ou le poussant contre la résistance du l'eau, ne pourroit que lui imprimer un mouvement angulaire par rapport au corps de la nacelle. »

« Si cette puissance quelconque agissoit, & sur l'aviron & sur la nacelle, en contractant une partie des cordages attachés à l'un & à l'autre autour de leur articulation, il ne pourroit, quelle que fût la résistance du l'eau, donner à la nacelle & à l'aviron qu'un mouvement angulaire & réciproque. »

« Ainsi, dans l'un & l'autre cas, aucun mouvement n'opéreroit jamais un mouvement de la nacelle en avant. »

« La queue du poisson étant jointe par articulation avec le trou de son corps, ne peut étre

- comparée qu'à un aviron articulé avec le corps
- de la nacelle : donc les muscles moteurs de la queue, s'ils en opèrent simplement ou la flexion ou l'extension totale, en la poussant contre la résistance de l'eau, ne peuvent que faire mouvoir angulairement la queue autour de la partie inférieure du tronc; ou bien qu'opérer en même temps réciproquement une petite rotation du tronc sur la queue; mais ces muscles ne peuvent jamais alors mouvoir le tronc en avant.

J'avoue que je ne conçois pas quelle différence il y a, pour le résultat, à ce que la rame se prolonge à l'intérieur du canot, ou se termine en l'articulant au point d'appui. Le mouvement est toujours le même pour la portion de l'aviron qui plonge dans l'eau; la résistance de ce liquide agit toujours solli de la même façon; il n'y a de différence que pour le rameur, à qui il est plus commode d'agir sur un levier du premier genre que sur un du troisième, au moyen de cordes appliquées des deux côtés de l'aviron.

« La queue ou extrémité du poisson qui nage, ajoute-t-il, & l'aile de l'oiseau qui vole, ne peuvent se comparer à une rame ordinaire; on peut les considérer comme une lame brisée en plusieurs parties articulées en sens alternatifs, lesquelles ayant été d'abord rapprochées, s'éloignent par des mouvements angulaires en même temps que le jeu total ou le mouvement composé de cette rame brisée (& de deux semblables rames placées de côté & d'autre du corps dans l'oiseau) fait avancer l'animal à l'aide de la résistance de l'eau (ou de l'air). »

Ainsi donc, s'il n'y avoit pour ces parties qu'une seule articulation, il n'y enroit ni vol ni natation possible : & comment lunt donc les *trigles* pour voler; eux chez qui les rayons pectoraux font tout d'une pièce, au lieu d'être composés, comme les ailes des oiseaux, de plusieurs parties articulées? Comment nagent les *ostréons*, puisque chez eux la partie qui dépasse le coiffe osseux se réduit presque à la nageoire caudale, & ne peut avoir que l'effet d'un aviron simple? On pourroit faire encore bien d'autres objections; mais suivons le développement de cette théorie.

« Dans le mouvement qui précède & prépare le nager, la queue entière du poisson, en même temps qu'elle se courbe vers la tête, se replie latéralement en deux sinuosités (qui forment deux suites d'articulations de vertèbres de l'épine), & les courbures de ces sinuosités font disposées en sens contraires, ou alternativement vers la droite & vers la gauche.

« Ces deux courbures ayant été ainsi fléchies, les extenseurs de chaque courbure agissent ensuite pour les redresser, & poussent l'eau dont la résistance s'oppose à cette extension : dès-lors il s'établit, non à l'extrémité, mais dans une

partie moyenne de la queue qui est ainsi courbée en deux sens opposés, un centre de mouvement qui est variable sans doute, mais autour duquel se balancent les efforts des muscles extenseurs des deux courbures, & les résistances de l'eau & du corps du poisson.

« Ainsi, lorsque dans cette espèce de rame brisée qui forme la queue, les extenseurs de ces deux courbures consécutives, en sens opposés, agissent en même temps, ces extenseurs doivent imprimer au tronc du corps du poisson, des mouvements de projection autour des sommets de l'une & de l'autre courbure.

« Mais ces deux mouvements de projection étant imprimés vers des côtés opposés, se combinent, & au lieu de ne produire qu'un mouvement réciproque des différentes parties du poisson, comme seroit chacun d'eux séparément, ils donnent une impulsion moyenne, suivant laquelle le corps du poisson est dirigé & lancé en avant. »

Cette description n'est point exacte; car, en examinant les mouvements du poisson, on n'y voit point ce redressement simultané de deux courbures alternatives; & de plus, on voit que le corps, au lieu d'être lancé directement en avant, éprouve à chaque fois une petite déviation & un mouvement de pirouette par lequel la tête est portée à droite ou à gauche, suivant que la queue frappe de l'un ou de l'autre côté. Mais la description de Barthez, fut-elle juste, sa théorie n'en seroit pas moins fautive; car si l'extension des deux courbures tend à imprimer au tronc du corps du poisson des mouvements de projection en sens opposé autour des sommets de l'une ou de l'autre courbure, ces deux mouvements ne peuvent se détruire l'un l'autre; car c'est un principe connu, que deux forces appliquées à un corps libre de se mouvoir dans l'espace, ne se feront jamais équilibre, à moins qu'elles ne soient opposées l'une à l'autre. En second lieu, si l'extension de chacune des deux courbures ne produisoit aucun déplacement au centre de gravité, il est évident que leur combinaison n'en produiroit pas davantage.

Borelli parle dans sa description de la double courbure de la queue, mais il ne dit point, comme Barthez, qu'elle soit due uniquement à la flexion des vertèbres; il ne s'explique point à ce sujet; or, voici comment la chose se passe.

Lorsque la queue exécute son mouvement préparatoire de flexion, chaque point de sa longueur est animé d'une vitesse différente; ar, comme la résistance du milieu croît en raison du carré de la vitesse, on voit que la nageoire caudale, qui est tout à l'extrémité qui est large & qui presse l'eau par la plus grande surface, doit avoir à braver un effort très-considérable. Cette nageoire, d'ailleurs, n'est pas comme le reste de la queue, où chaque vertèbre est tirée par un muscle particu-

lier ; mais l'impulsion est communiquée seulement à l'extrémité antérieure. Si elle étoit rigide , cela suffirait bien pour la mouvoir , & il faudroit qu'elle suivit le mouvement de la vertèbre avec laquelle elle s'articule ; mais elle est d'un tissu élastique & souple , & l'un conçoit qu'elle doit se laisser fléchir par la résistance de l'eau , & se courber dans un sens opposé au reste du corps. Il est possible même qu'une portion de la queue la plus voisine prenne part à ce mouvement ; car les muscles chargés de maintenir les vertèbres devenant moins volumineux vers l'extrémité , à mesure que la résistance devient plus grande , peuvent aussi être assez faibles pour ne pas pouvoir la surmonter.

En assimilant le mouvement du poisson qui nage à celui d'un canot qui marche à la godille (1), Borelli a fait une comparaison juste ; mais une comparaison , quelque exacte qu'elle soit , ne peut être considérée comme explication qu'autant que le cas avec lequel on établit la similitude a été lui-même précédemment expliqué : or , c'est ce que notre auteur n'a pas fait. On pourroit suppler à cette omission ; mais il est plus simple , & il n'est pas plus difficile de s'occuper directement du nager.

Lorsque la queue , préalablement fléchie , s'étend pour se mettre en ligne droite , elle pousse l'eau par tous les points de sa surface convexe , & , pour la déplacer , elle éprouve une résistance qui est dans un rapport déterminé avec la vitesse qu'elle avoit en la frappant.

Si la queue , dans son déploiement , n'éprouvoit aucune résistance , le seul effet de ce mouvement seroit de porter en arrière son extrémité & de l'éloigner du centre de gravité , mais celui-ci ne recevrait aucune impulsion & resteroit immobile. Si , au contraire , cette extrémité de la queue s'appuyoit contre un obstacle insurmontable , le redressement auroit pour effet d'éloigner d'elle le centre de gravité , & celui-ci se porteroit en avant de toute la quantité dont le seroit allongée la ligne qui mesure sa distance au point d'appui ; si enfin , comme dans le cas qui nous occupe , le corps , placé derrière la queue , peut céder après avoir résisté , il arrivera , à cause de cette résistance , que , dans le redressement de l'arc des vertèbres , l'extrémité postérieure ne pourra se porter en arrière assez vite pour compenser l'accroissement de la distance qui la sépare du centre de gravité , & il faudra par conséquent que ce point lui-même se porte en avant. Or , il est facile de juger , que la force qui produit ce mouvement en avant , doit être justement le complément de celle qui porte la queue en arrière , & ainsi le mouvement résultant de cette impul-

sion communiquée au centre de gravité , sera le même que celui qui eût été produit si la queue , restant immobile & fléchie , l'eau fût venue la frapper avec une force égale à celle par laquelle elle a résisté. On peut donc considérer le corps comme sollicité par une force unique , dont l'intensité , la direction & le point d'application sont les mêmes que ceux de la résultante de toutes les résistances partielles.

Or , ces résistances partielles ne sont pas égales pour tous les points , parce que tous n'ont pas la même vitesse ; ainsi , en supposant , ce qui n'est pas tout-à-fait exact , que les vertèbres aient une même longueur , & que les angles qu'elles font entr'elles soient égaux : si elles se tendent de la même quantité , la vitesse de l'extrémité postérieure représentée par 1 , la vitesse de la seconde sera 1 + 2 , celle de la troisième 1 + 2 + 3 , enfin celle d'une vertèbre quelconque sera toujours représentée par la somme de tous les nombres naturels jusqu'à celui qui indique le rang de la vertèbre.

Quoique cette loi qui représente les vitesses soit assez simple , il seroit cependant encore difficile de trouver pour ce cas , la résultante de toutes les résistances partielles , & ce seroit bien autre chose encore , s'il falloit tenir compte des différences dans la grandeur des vertèbres , dans leur inclinaison entr'elles , dans la vitesse des contractions des muscles qui les meuvent , & enfin dans la largeur de la queue pour les différents points de sa longueur.

Si la queue se mouvoit angulairement autour d'une articulation unique & conservoit partout la même largeur , il seroit très-facile de trouver le point d'application de cette résultante des résistances partielles. En effet , ces résistances étant proportionnelles au carré des vitesses , & les vitesses étoient elles-mêmes directement proportionnelles à la longueur du rayon , il suffiroit de trouver la résultante d'une suite de forces parallèles appliquées à une ligne droite & proportionnelle au carré de leur distance , à une extrémité de cette ligne : or , les propriétés de la pyramide nous offrent une solution très-simple de cette question. On peut en effet considérer ce solide comme composé d'une infinité de petits prismes pesans , parallèles à sa base. Ces prismes , ayant même hauteur , sont entr'eux comme leurs bases , ou comme les carrés des côtés homologues , ou enfin , ce qui revient au même , comme les carrés de leur distance au sommet. Les poids de tous ces petits prismes sont donc entr'eux comme les résistances que nous considérons , & le point d'application de leur résultante nous indiquera celui que nous cherchons. Or , nous savons que ce point d'application , qui dans la pyramide est le centre de gravité , se trouve sur une ligne qui joint le centre de sa base au sommet , au quart de la longueur de cette ligne , à partir de la base. Ainsi , dans

(1) Expression par laquelle on désigne dans nos ports de l'Océan , le mode de progression d'un canot que l'on conduit avec un seul aviron placé à l'arrière.

le cas que nous avons supposé, la résultante de toutes les résistances partielles opposées par l'eau, aura son point d'application à l'union du quart postérieur avec un des quarts moyens de la queue. Mais comme, dans le cas véritable, l'effet de la flexion des vertèbres est de rendre plus rapide encore l'augmentation de vitesse à mesure qu'on s'approche de l'extrémité postérieure, il s'ensuit que la résultante des résistances partielles, ou la force que l'on suppose pousser le corps, a son point d'application plus près encore de cette extrémité.

Cette force, en ce point, est sensiblement normale à la queue, & généralement elle est oblique à la direction du poisson. On peut la considérer comme le résultat de la composition de deux autres forces, une qui passe par le centre de gravité de l'animal & tend à faire avancer le corps tout entier dans cette direction, l'autre qui tend à le faire pivoter autour de ce point central. Celle-ci, en produisant son effet, devra porter toutes les parties qui sont au-delà du centre de rotation dans une direction opposée à la sienne : c'est ce que nous voyons effectivement, & la tête, dans les mouvements de progression du poisson, s'incline très-sensiblement du même côté que la queue.

Quant à l'autre composante, pour bien apprécier l'effet qu'elle produira réellement, il faut examiner quelles résistances elle doit surmonter. Comme ces résistances sont, pour une même vitesse, proportionnelles à la quantité d'eau déplacée, elles devront différer suivant que le mouvement aura lieu dans la direction de l'un ou de l'autre des trois axes de l'animal. S'il tend à s'opérer dans la direction de l'axe transversal, c'est-à-dire, normalement aux surfaces latérales, la résistance sera aussi grande que possible, puisque le corps présentera directement les deux plus grandes dimensions. Si le mouvement a lieu suivant l'axe dorso-abdominal, la résistance sera moindre, car le corps présentera en même temps son plus petit & son plus grand diamètre : enfin, la résistance sera la plus petite possible quand la direction du mouvement sera suivant l'axe longitudinal, parce que ce seront alors les deux plus petits diamètres qui se présenteront. Cela posé, revenons à la force qui pousse le centre de gravité : on peut aussi à son tour la supposer décomposée en deux autres, l'une selon l'axe longitudinal, & qui tend à pousser le corps directement en avant; l'autre suivant l'axe transversal, & celle-ci doit produire un mouvement de déviation latérale. Or, si l'obliquité de la résultante par rapport à la direction du poisson est petite, ainsi que cela a lieu communément au commencement du mouvement, cette dernière force sera peu considérable; & comme, d'après ce que nous avons dit, elle aura à lutter contre une résistance très-grande, son effet sera peu sensible; l'autre composante, au contraire, beaucoup plus considérable, aura

à vaincre une résistance bien moindre : aussi le mouvement en avant sera-t-il à beaucoup près le plus marqué.

Ainsi, en nous résumant, l'extension de la queue produit trois espèces de mouvement : un mouvement direct en avant, un petit mouvement de déviation latérale, & un mouvement de rotation autour du centre de gravité.

Jusqu'ici nous avons raisonné comme si l'impulsion produite par le redressement de la queue étoit instantanée; mais il est très-facile d'appliquer cela à l'exclusion continue, & l'on voit qu'à chaque instant de son mouvement elle donnera naissance à trois impulsions de la nature de celle que nous avons fait connoître, mais dont le rapport changera continuellement : celle des trois composantes qui pousse le corps en avant ira toujours en décroissant d'intensité, & parce que la résultante devient plus oblique par rapport à sa direction, & parce que cette résultante elle-même diminue. Le mouvement de la queue devenant de plus en plus lent, cette force enfin sera nulle quand la queue sera reniée en ligne droite avec le reste du corps. Arrivée à ce point, la queue continue de se porter dans la même direction pour se fléchir en sens opposé, & par ce mouvement elle donne aussi naissance à trois espèces d'impulsions. Les deux premières tendent à produire la rotation & la déviation latérale dans le sens où ces mouvements s'opèrent déjà; mais la troisième tend à porter le corps en arrière, & ainsi elle détruit une portion de l'impulsion en avant, portion à la vérité très-petite, parce que la flexion de la queue est toujours beaucoup plus lente que son extension.

Lorsque la flexion préparatoire de la queue sera ainsi opérée, toutes les parties seront, à la différence près de côté, dans le même état où nous les avions considérées d'abord, & des effets seront produits. Le mouvement en avant succédera à celui qui a été détruit par la résistance du liquide & par la flexion de la queue. La déviation latérale corrigera celle du mouvement précédent, & le mouvement de rotation portera la tête du côté opposé à celui où elle avoit été d'abord inclinée.

Si des flexions alternatives, telles que celles que nous venons de décrire, étoient exécutées par une partie placée au-devant du centre de gravité, ce point seroit poussé dans une direction contraire, & le corps tout entier reculeroit : c'est en effet le mécanisme qu'emploient les poissons anguilliformes pour se porter en arrière, comme on l'a observé pour les gymnètes. Mais chez les autres poissons, la disposition des os & l'épaisseur des muscles ne permettent point de semblables flexions, & le corps recule au moyen d'un mouvement rétrogrado des anneaux pectorales.

Nager de l'homme.

Après les détails dans lesquels nous venons d'entrer relativement à la natation des poissons à vessie, nous pouvons faire comprendre en très-peu de mots, la théorie du nager chez l'homme, & ainsi ne point excéder les bornes d'un article de dictionnaire.

Le poisson, dans la progression, tant que son corps est entièrement immergé, est soulevé en quelque sorte à l'action de la pesanteur, & la seule force qu'il ait à vaincre est celle qui naît, par suite même du mouvement, de la résistance du liquide. Il n'en est pas de même pour l'homme & pour les mammifères, dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle de l'eau. Lors même qu'ils y plongent entièrement, l'excès du poids de leur corps sur le poids de la portion d'eau déplacée, tend à les entraîner vers le fond, & ainsi il faut que dans leur progression, la force unique qui résulte de tous les mouvements partiels puisse à la fois & surmonter cette action de la pesanteur & porter le corps en avant, c'est-à-dire, qu'il faut que cette force, transportée au centre de gravité, puisse se décomposer en deux autres, une horizontale, dirigée en avant, & une verticale, dirigée en haut. L'effet de la première force sera détruit uniquement par la résistance de l'eau; l'effet de la seconde sera détruit par cette résistance & par l'action de la pesanteur qui s'exerce continuellement. Aussitôt que cette dernière force sera tout-à-fait détruite par le concours des deux causes que nous venons de nommer, le corps commencera à descendre, jusqu'à ce qu'un nouveau mouvement donne naissance à une nouvelle impulsion en haut. Pour que le corps puisse se maintenir à la surface, il faut qu'au moment où le second mouvement commence, le centre de gravité ne soit pas descendu plus bas que le point d'où il étoit parti au premier mouvement. Ainsi, pour ce cas, il y a un rapport déterminé entre l'intensité de la force ascensionnelle & l'intervalle qui sépare deux impulsions consécutives. Au-delà de ce rapport, le corps pourra encore se porter en avant, mais il ira toujours en s'enfonçant; au-dessus, l'animal commencera d'abord à s'élever à chaque mouvement; mais à mesure qu'il s'élèvera, la quantité d'eau dont il tient la place diminuera, & ainsi l'excès du poids de tout son corps sur la partie déplacée augmentera. Il arrivera donc bientôt un moment où l'action de la pesanteur étant augmentée, l'impulsion verticale sera seulement suffisante pour ramener à chaque fois le corps à la hauteur d'où il étoit parti. Cherchons comment, par suite des mouvements ordinaires de la natation, peut se produire la force dont nous venons d'examiner les effets. Ces mouvements sont trop bien connus de tout le monde pour qu'il soit nécessaire d'en donner une des-

cription détaillée; nous nous contenterons de les rappeler brièvement. Au moment où une brulée va commencer, le tronc est dans une direction oblique moyenne entre la direction horizontale & verticale, cependant plus voisine de cette dernière; les bras & les jambes sont fléchis & rapprochés du corps, la main dirigée en avant dans le sens du mouvement & de manière à diviser l'eau le plus facilement; le pied, au contraire, fléchi sur la jambe & disposé de manière à pousser l'eau normalement par la surface plantaire. Tout-à-coup les bras & les jambes viennent à s'étendre à la fois & tendent à mouvoir le corps dans des directions différentes. Comme les membres antérieurs & postérieurs sont symétriques dans leur forme & dans leur mouvement, il s'ensuit que les deux impulsions résultant de l'extension des bras, par exemple, seront symétriques par rapport au plan médian; il en sera de même pour les jambes, & ainsi les deux résultantes seront dans ce plan: la première tend à porter le corps en arrière, car lorsque l'extrémité antérieure des bras se porte en avant, la résistance qui leur est opposée par l'eau, tend à faire reculer leur extrémité postérieure, & le tronc tout entier avec lequel cette extrémité est articulée. Les pieds, au contraire, poussent le tronc en avant, par suite de la résistance qui leur est opposée en arrière par le liquide qu'ils déplacent. Si ces deux forces, qui sont sensiblement opposées, étoient égales entr'elles, le centre de gravité n'avanceroit ni ne reculeroit, & le corps obéissant à la seule action de la pesanteur, descendroit verticalement par un mouvement accéléré. Mais ces deux forces opposées sont loin d'être égales; l'extension au bras se fait plus lentement qu'à la jambe, & d'ailleurs, à cause de la supériorité de longueur des membres postérieurs sur les antérieurs, lors même que dans les uns & les autres l'extension des articulations se feroit également vite, le pied ne se porteroit pas moins en arrière avec une rapidité plus grande que la main: il est d'ailleurs, comme nous l'avons dit, disposé de manière à éprouver de l'eau la plus grande résistance, tandis que la main est dirigée de manière à en éprouver le moins.

Comme, d'après ce que nous avons dit précédemment, les impulsions communiquées au centre de gravité sont égales aux résistances opposées par le liquide, comme ces résistances augmentent avec les surfaces, & sont, à surfaces égales, proportionnelles au carré des vitesses, il est facile de voir que la force qui résulte du déploiement des jambes sera bien supérieure à celle qui est produite par l'extension des bras; & ainsi, en les supposant directement opposées, ce qui n'est pas tout-à-fait exact, le corps feroit sollicité par l'excès de la première sur la seconde.

Puisque les deux composantes étoient situées dans le plan médian, la résultante y sera aussi nécessairement,

nécessairement. Maintenant, si cette résultante ne passe pas par le centre de gravité, on pourra, comme nous l'avons fait pour le poisson, la supposer décomposée en deux autres, une qui passe par ce centre & le pousse directement dans la direction; l'autre, perpendiculaire à la première, & qui tend à faire exécuter au corps un mouvement de rotation autour du centre de masse. Comme la direction du mouvement des jambes est plus rapprochée de la verticale que la direction générale du corps, il s'ensuit que l'effet nécessaire de cette force est de porter en haut l'extrémité postérieure du tronc, & par conséquent de faire plonger la tête, ce qui viendrait s'ajouter à la tendance qui a déjà cette partie à descendre, parce qu'elle est très-pesante, & que, dans un corps qui flûte, le centre de gravité tend toujours à se mettre le plus bas possible. Il est vrai que les mains, en se portant horizontalement en avant, vont fournir de larges surfaces d'appui, & agissent d'autant plus efficacement pour soutenir la tête, qu'elles en sont plus éloignées : elles remplissent dans cette circonstance le même usage que les balanciers des petites embarcations de la mer du Sud.

L'appui fourni par les mains n'est pas la seule cause qui maintienne la tête au-dessus de l'eau, de manière à permettre à l'homme de respirer : on peut nager les mains derrière le dos. Ainsi il faut qu'il y ait encore autre chose qui soulève l'extrémité antérieure du tronc. Cette cause, qui n'a point été indiquée par les auteurs, résulte de la forme & de la disposition de la partie du corps qui déplace l'eau. La partie antérieure de la poitrine présente en effet un plan incliné de 45 degrés environ. Or, quand le corps se porte en avant, l'eau résiste dans une direction normale à celle de la surface qui la presse; par conséquent chaque résistance peut être considérée comme le résultat de deux petites forces, l'une horizontale, qui tend à détruire l'impulsion en avant; l'autre, verticale, qui porte en haut la poitrine & la tête, & agit pour faire tourner le corps dans un sens opposé à celui des deux causes de rotation que nous avons indiquées.

Lorsque l'extension des membres est accomplie, l'impulsion en avant & en haut n'est pas uniformément détruite, & le centre de gravité continue à le mouvoir, non pas en ligne droite, comme cela avoit lieu pour le poisson, mais à cause de l'action toujours présente de la pesanteur, suivant une courbe analogue à celle que décrit un projectile dans l'air. Pendant que ce mouvement s'opère, les bras, en se portant latéralement pour se fléchir, secondent ce reste d'impulsion; les jambes, au contraire, en se fléchissant, tendent à porter le corps en arrière, & concourent ainsi, avec la résistance de l'eau, à détruire le mouvement en avant.

Tels sont les principes sur lesquels se fonde la

MÉDECINE. Tome X.

théorie de la natation chez l'homme. Si l'on veut de plus grands détails, il faut les chercher dans les ouvrages composés *ex professo* sur ce sujet. On peut consulter mon *Essai sur les mouvements & les attitudes de l'homme*, essai dont une partie a déjà paru par numéros dans le *Journal de Physiologie expérimentale* du M. Magendie.

Nager des oiseaux palmipèdes.

Nous pouvons dire en peu de mots tout ce qui a rapport au nager des poissons à vessie. Le centre de gravité de tout leur corps est placé plus près de la face inférieure que de la supérieure, qui est en rapport avec les pousmons; de sorte que lorsqu'ils sont dans l'eau, ils gardent, en flottant, la même position qu'ils ont sur la terre, & ainsi leur tête se trouve naturellement élevée au-dessus de la surface. Quand leurs pattes, avec les membranes étendues, poussent l'eau en arrière, elles donnent naissance à une impulsion en avant & un peu en haut, & du plus, elles tendent à produire un mouvement de rotation, par lequel la partie postérieure serait élevée, tandis que l'antérieure s'enfoncerait. Une portion du effet de cette force se trouve détruite par suite de la disposition inclinée de la poitrine, comme nous l'avons fait remarquer chez l'homme : le reste n'est pas assez considérable pour devenir gênant pour l'animal dont la tête est toujours supportée par un long cou. Quand les pattes ont achevé leur mouvement en arrière, elles le reportent en avant pour donner une nouvelle impulsion; mais dans ce transport, la résistance qu'elles éprouvent de la part de l'eau, tend réellement à faire reculer le corps. Mais cette résistance est bien moindre que celle qui a poussé le corps en avant, d'abord par la raison que le mouvement est plus lent, & ensuite parce que les pattes, dont les doigts étoient écartés & les membranes déployées, sont maintenant fermées & offrent une bien moindre surface : cette résistance cependant, quelque faible qu'elle soit, concourt, avec celle qui s'exerce à la partie antérieure de la poitrine, à détruire l'impulsion en avant.

De la natation sous le rapport hygiénique.

Outre les avantages qui lui sont communs avec les autres exercices gymnastiques, la natation est à quelques-uns qui lui sont propres. Ainsi, par exemple, dans la marche, la course, le saut, enfin dans les différents modes de progression sur un sol résistant, les bras ne prennent on quelque sorte aucune part à l'exercice & ne servent qu'à ce que de balanciers. Dans la natation, au contraire, ils concourent très-étroitement à la locomotion. La natation est donc très-utile, par cela seulement qu'elle fait agir des muscles qui, chez un grand nombre d'hommes, dans notre état social, s'atrophiaient pour ainsi dire faute d'exercice, & cet

R 11

exercice, qu'elle leur fait prendre, est le plus convenable de tous, puisqu'il oblige à des efforts peu intenses & de courte durée, mais long-temps répétés.

M. Londe, dans la *Gymnastique médicale*, a fait ressortir très-bien toutes les autres avantages qui résultent de la natation. Ils dépendent principalement de deux causes, la plus grande pression exercée par le milieu dans lequel le corps est plongé, & la différence de température de ce milieu milieu avec celui que l'on vient de quitter. Un résultat nécessaire de ces deux circonstances, abaissement de température & augmentation de pression, c'est qu'en faisant un exercice même assez violent, on peut n'éprouver que très-peu de pertes par la transpiration cutanée, ce qui n'est pas un médiocre avantage. (ROCHL.)

NATES. (*Anatomie.*) Dénomination sous laquelle les anciens anatomistes désignaient ridiculement les deux tubercules quadrangulaires du cerveau, sur lesquels la glande pinéale est appuyée en arrière. (Voyez TUBERCULUS QUADRANGULARIS, dans le *Dictionnaire d'anatomie & de physiologie.*) (L. J. M.)

NATRUM. (*Matière médicale.*) Nater. On a désigné sous ce nom, dans la plus haute antiquité, la soude que l'on retirait de l'Égypte, dans le voisinage du lac Natron.

C'est le sel de soude ou sous-carbonate de soude dans les nouvelles nomenclatures chimiques. (Voyez SOUDES.) Ce que Dioscoride & Pline ont dit du nitrum ne convient point au nître (nitrate de potasse), mais bien au natrum qui étoit employé dans les embaumemens. Consultez de plus sur le natrum d'Égypte & les lacs qui le fournissent, les Observations de MM. Berthollet & Deccroix, *Annales de Chimie*, tom. LX, pag. 58. (L. J. M.)

NATURALISME. (*Médecine légale. Histoire de la médecine.*) Opinion, doctrine, qui rapporte à la nature, un certain ordre de phénomènes, que des motifs quelconques portent à regarder comme extraordinaires & miraculeux. Cette dénomination a été plus particulièrement employée par Hequet Durval, dans le livre curieux & instructif, qu'il a publié sous le titre de *Naturalisme des convulsions, dans les maladies, de l'épidémie convulsionnaire*.

Les médecins furent souvent appelés pour reconnaître aussi le naturalisme d'un grand nombre de phénomènes, & pour tirer une ligne de démarcation entre les événements naturels & les miracles ou les prodiges.

La canonisation, le procès contre les sorciers, l'effusion spontanée du sang, par les plaies du cadavre d'une personne asphyxiée, à la vue des prétendus meurtriers, exigèrent cette intervention

des médecins & donnèrent lieu à plusieurs rapports officiels, dans différentes circonstances très-importantes.

Un de ces rapports, comme on sait, celui de Morand, fit fermer le cimetière des Innocens, & placer à son entrée ce fameux arrêt :

De par le Roi, défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu.

Un autre rapport non moins sage, celui de la Faculté de Montpellier, ne laissa aucun doute sur le naturalisme des phénomènes bizarres ou singuliers, attribués aux diables de London, & à la possession des Ursulines, dont fut accusé le malheureux Urbain Grandier, dans le siècle, & pendant l'administration du cardinal de Richelieu.

Quant à l'auteur du livre sur le *Naturalisme des convulsions*, il est fort éloigné, comme il en avouait, de vouloir attaquer les miracles qui s'opéraient par l'intercession de M. de Paris ; il veut seulement séparer les convulsions de ces miracles, & y reconnaître ce qui est purement physique & évidemment séparé, de ce qui est spirituel ; ce qu'il fait avec la physiologie de son temps, avec le mouvement, l'afflux des humeurs, le mécanisme particulier de certains viscères, & l'hypothèse d'un fluide nerveux qu'il gouverne & distribue à son gré, pour expliquer tous les phénomènes qui attirent son attention. (L. J. M.)

NATURE. (*Philosophie médicale. Histoire de la médecine.*) Ce mot répond à plusieurs idées différentes, que les médecins d'un esprit étendu & cultivé ne peuvent jamais confondre, soit en parlant la langue commune ou vulgaire, soit en se servant de l'idiome spécialement consacré aux sciences naturelles en général, & à la médecine en particulier.

Dans l'acception la plus littérale & la plus étendue, on entend par le mot *nature*, le résultat de tout ce qui est né : l'ensemble, la collection de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé (histoire, tableaux, phénomènes de la nature). On appelle aussi *nature*, le système des lois générales que l'on suppose établies pour l'existence des choses, pour la succession des êtres, pour l'accomplissement constant & régulier des phénomènes (de la nature des choses, de *naturæ rerum*).

Dans une acception plus restreinte, mais toute métaphorique, on emploie le mot *nature* pour désigner, en la personnifiant, la puissance qui agit suivant les lois générales, & qui gouverne les annales (opérations, productions, empire, actions de la nature). C'est dans ce sens qu'un éloquent & savant écrivain français a dit : La nature n'est point une chose, car cette chose seroit tout : la nature n'est point un être, car cet être seroit Dieu ; mais on peut la considérer comme une puissance vive, immense, qui embrasse tout,

« qui anime tout, & qui, subordonnée à celle du
 « premier être, n'a commencé d'agir que par son
 « ordre, & n'agit encore que par son concours ou
 « son consentement.... La nature est un ouvrier
 « sans cesse actif, qui fait tout employer, qui, tra-
 « vaillant d'après lui-même, toujours sur le même
 « fouds, bien loin de l'épuiser, le rend inépuisable.
 « Le temps, l'espace & la matière sont les moyens;
 « la conservation son objet; le mouvement & la vie, son
 « but. Les effets de cette puissance sont les phéno-
 « mènes du monde; les ressorts qu'elle emploie
 « sont des forces vives, que l'espace & le temps ne
 « peuvent que mesurer & limiter, sans jamais les
 « détruire. » (Baillet, *Hist. nat.*, édit. de l'im-
 « primerie royale, tom. IX, pag. 1 & suiv.)

Le mot *nature*, considéré relativement à
 l'homme & aux différents espèces d'animaux, se
 prend également dans deux acceptions différentes.
 Dans le premier sens, & dans ces locutions, *la nature*
de l'homme en général, la nature de chaque
individu en particulier, on exprime le résultat,
 l'ensemble des différentes parties de l'organisation
 & de leurs propriétés, considérées dans ce qu'il
 peut avoir de propre ou de caractéristique: ce qui
 répond, même pour l'individu, au mot *tempérament*,
 qui ne parait pas avoir été employé avant
 Galien, par les médecins & par les philosophes de
 l'antiquité. Le mot *nature* a été évidemment pris
 dans cette acception par Hippocrate on par l'au-
 teur, quel qu'il soit, du livre sur la nature de
 l'homme, attribué au fondateur de la médecine.

Il paraîtroit que, dans la suite, on auroit voulu
 donner plus de précision à cette même accep-
 tion, en la bornant à ce qui est propre, normal,
 balaisé pour l'homme, à ce qui lui appartient
 d'une manière exclusive, dans son état de santé ou
 de perfection; façon de voir d'après laquelle on
 a appelé *changement contre nature*, les phéno-
 mènes des maladies; & *choses non naturelles*, les
 principaux moyens de l'hygiène, les puissances, les
 conditions extérieures, dont l'application constan-
 te & régulière entretient la santé & la vie.

Dans la seconde acception, le mot *nature*,
force, à peu près synonyme de *principe vital*, de
chaleur innée, *impetus fuciens*, désigne, en
 la personnifiant, la force ou la puissance à la-
 quelle on rapporte, en dernière analyse, tous les
 phénomènes de l'organisation dans l'homme, mais
 principalement les phénomènes des maladies: opi-
 nion trop poétique, trop figurée sans doute pour la
 médecine ou pour la philosophie, qui a prévalu ce-
 pendant jusqu'au dernier siècle, & qui conservera
 encore pendant long-temps une sorte de prestige,
 soit par l'autorité de ses partisans les plus célèbres
 explique, pour les esprits superficiels, la marche &
 le développement des maladies. De reste, cette
 même opinion, qui est très-ancienne, & dont la
 trace subsiste encore parmi nous, se rattacherait
 aisément, si nous voulions en reconnaître la

source, à des idées très-anciennes, sur les causes
 premières, qui passent naturellement de la philo-
 sophie dans la médecine.

Quoi qu'il en soit, la nature doit être consi-
 dérée comme une puissance toujours active, dans
 l'homme, soit pour entretenir la santé, soit pour
 développer d'après un plan, le plus ordinairement
 régulier, les phénomènes des maladies en général,
 & des maladies aiguës en particulier. Cette accep-
 tion du mot *nature*, nous offre dans l'histoire de
 la médecine, un point fixe auquel les médecins cé-
 lèbres de tous les temps, de tous les pays, se
 sont attachés jusqu'au dix-huitième siècle, avec
 une conformité de doctrine inadmissible, quelle
 que fût d'ailleurs la différence de leurs hypo-
 thèses ou de leurs théories.

Barker, qui a traité cette question de litté-
 rature médicale avec beaucoup de développement,
 a porté dans son examen autant d'éradication que
 d'esprit philosophique (1).

Toutes les fois que les médecins parlent des
 opérations de la nature, dit ce judicieux & savant
 écrivain, on doit faire attention que ce mot est
 toujours pris dans un sens élastique, qu'il signifie
principe d'action dans l'animal, & que cet axiome,
la nature guérit les maladies, est aussi ancien que
 l'art lui-même. Nous ajouterons qu'il importe
 de remonter jusqu'à l'origine de cette opinion; dont
 il ne seroit pas aussi facile d'apprécier l'importan-
 ce, sans une semblable recherche.

Les Anciens, avant l'école d'Alexandrie, ne
 possédoient aucune connaissance de détail, sur
 l'organisation de l'homme, étant tout-à-fait étran-
 gers à l'étude de l'anatomie, comme on le voit
 pour Hippocrate, & autres qui soient d'ailleurs. À
 ce sujet, les dénégations de quelques enthousias-
 mes (2).

On s'étoit borné à observer en grand, les phé-
 nomènes les plus apparents de la vie, la respira-
 tion, la génération, l'action des sens, le déve-
 oppement & la marche des maladies aiguës. L'en-
 chaloement & l'ordre qui se manifestent le plus é-
 clatamment dans l'économie vivante, conduisoient
 bientôt à reconnaître dans le petit monde, comme
 dans le système général de l'Univers, on principe
 d'action, une cause première, dont l'activité constan-
 te & l'influence régulière se manifestent chez
 l'homme dans l'état de santé ou dans l'état de ma-

(1) Voyez *l'essai sur la conformité de la médecine ancienne & moderne*, &c., traduit de l'anglais, par Schumbeig, nou-
 velle édition, avec les notes de Lorry, in-8°, 1860.

(2) On ne trouve guère dans Hippocrate, ou du moins
 dans ses ouvrages authentiques, que quelques notions d'os-
 téologie. Il ne parait pas avoir eu, du reste, des notions
 bien distinctes sur la nature des muscles; sur celle des veines &
 des artères, qu'il désigne sous le nom collectif de *φλοΐ*;
 sur le système nerveux, sur les ligaments, sur les os.
 Nous ne saurions même sur la disposition des principaux vis-
 cères en général, & du cerveau en particulier. (Voyez *Hist.*
de la médecine, par Synges, tome I, page 303 & sui-
 vantes.)

ladié ; en le nomma *nature*, ou *pois*, *ses primitif*, *chaleur innée*, *émanation de l'ame générale du monde*. Platon appela même cette nature ou *art divin*, & les florentins un *feu artificiel*.

La nature, qui, suivant Galien, a formé le corps, a exécuté tous les phénomènes du développement ou de l'évolution, dans l'embryon & le fœtus, doit également contribuer à l'entretien de la santé & à la guérison des maladies. On personnifia à son tour la cause de la maladie, & on entendit par la maladie séparée de sa cause, le combat ou l'effort de lutte pour vaincre cette même cause, que l'on enoûdroit, en général, comme une substance étrangère, comme une matière hostile & nuisible qu'il importoit de détruire ou de rejeter : ce qui devoit s'opérer avec plus ou moins de bonheur par différentes voies d'élimination (les sueurs, les urines, les excréments alvines) : phénomènes dans lesquels on ne pouvoit alors apercevoir que les apparences trompeuses de l'expulsion d'une matière irritante, sans remonter à la formation de cette matière ; phénomènes qui, par cela même, ne pouvoient être bien compris qu'en leur appliquant les idées ingénieuses de Borden, sur les sécrétions, & ce que ce philosophe lui-même ne fit pas, & ce qui est à peine aujourd'hui à la portée d'un petit nombre de médecins véritablement physiologistes. Toute la nomenclature de l'ancienne pathologie étoit d'accord avec cette hypothèse, que l'on appela le *naturisme*, lorsqu'elle devint trop exclusive, & lorsque ses partisans refusant d'admettre les causes secondaires, prétendirent que la nature se folt à elle-même dans la curation des maladies. Ainsi en admit une coction, c'est-à-dire, une action régulière & progressive de la nature sur la cause matérielle de la maladie, une crise ou le jugement, l'issue, de cette espèce de lutte ou de combat ; des jours critiques, des métastases, &c. &c.

Cette manière, à la fois simple & métaphorique, s'accordoit le plus souvent, surtout dans les maladies aiguës, avec les vues d'un indicieux empirisme ; & on ne doit pas être étonné de la voir servir de point de ralliement à toutes les grande pratiques, au milieu d'une invection de théories & de systèmes qui, malgré leur appareil dogmatique, s'éloignoient beaucoup plus des véritables indications du *art de guérir*, que l'ancienne & primitive hypothèse d'une nature qui guérit les maladies, & dont les médecins ne font que les ministres en les agens secondaires. La doctrine des causes finales, qui s'établit dans la suite, & qui coexistoit encore de nombreux partisans, fortifia bien plus qu'elle n'affoiblit cette même hypothèse, même à l'époque, où certains médecins philosophes commencèrent à reconnaître que l'on avoit été conduit à l'idée d'une nature ou d'une puissance personnifiée dans l'homme physique, par la notion abstraite du résultat & du concours des forces qui aiment l'organisation.

Cette hypothèse, d'une nature, d'une puissance toujours active, pour concevoir les phénomènes les plus apparens de l'organisation en général, & les phénomènes des maladies aiguës en particulier, paroit si simple, si facile, qu'elle n'a pas même été rangée parmi les théories médicales, par les historiens de la médecine.

Il semble qu'elle doit se présenter sans effort à l'esprit de tous les hommes doués de quelque méditation, qui cherchent à se rendre compte de ce qui se passe chez les malades, lorsqu'un motif d'intérêt quelconque attire leurs remarques & leurs réflexions, sur les phénomènes de certaines maladies, & dans cette circonstance nous parlons tous, avec plus ou moins de justesse, du pouvoir, des efforts, des ressources de la nature. Cette façon d'expliquer d'une manière très-générale, & en supprimant tous les faits, toutes les idées intermédiaires, qu'un état plus avancé de la science fait découvrir, paroit se rattacher à la constitution même de l'esprit humain, & se trouve d'accord avec la marche qui a été suivie dans tous les efforts pour comprendre & pour expliquer l'ensemble des phénomènes physiologiques & pathologiques.

En effet, le naturisme, en médecine, remonte, comme nous l'avons déjà indiqué, au système des anciens philosophes, sur la cause première, sur la manière de concevoir, d'après l'hypothèse de cette cause, le système général du monde. Ce naturisme n'est même, à proprement parler, qu'une extension particulière de cette hypothèse, & il ne seroit pas vrai de dire qu'Hippocrate est l'inventeur d'une pareille théorie, la plus ancienne de toutes celles dont l'histoire littéraire nous a transmis le souvenir. Ce philosophe en trouva sûrement l'origine dans les idées des principaux membres de l'école d'Ionie & d'Italie. Il simplifia ces idées, sans doute pour les appliquer à la physiologie, & surtout à la pathologie, en les combinant avec l'expérience médicale ou l'empirisme ; ce qui fut dire, même de son temps, qu'il avoit introduit la philosophie dans la médecine ; la philosophie de cette époque, & avant Socrate, n'étoit en effet qu'une espèce de physique générale, de cosmogonie spéculative & poétique.

Pour Hippocrate & pour les médecins qui précédèrent les premiers dogmatistes, & les écoles d'Alexandrie, la matière n'étoit toutefois qu'une force aveugle, une puissance d'action inévitable, nécessaire dans ses opérations, & dont le mouvement n'étoit régulier que suivant certaines probabilités plus ou moins grandes, & par un concours de conditions, de circonstances, qui devoient la trouver réunies pour cette régularité.

Cette force, appelée par Hippocrate *tautôt force* (ce qui produit) ; & *tantôt puissance* (principe d'action vitale), dépense toute son énergie dans les maladies.

La nature, est-il dit dans plusieurs écrits attribués à Hippocrate, agit, opère dans les animaux par toutes les opérations de la vie. Elle fait, sans l'avoir appris, tout ce qui leur est nécessaire. (*De naturalibus facultatibus*, lib. 1^{er} & 11.) Elle se manifeste par différentes facultés, dont le développement a pour objet d'attirer ce qui est bon, ce qui est convenable à chaque espèce, de le préparer, d'élaborer, de rejeter ce qui est hétérogène & nuisible. Les facultés étoient désignées sous le nom de *dynameis*. (Voyez le *Livre de l'aliment*, DE ALIMENTO.)

Hippocrate admettoit en outre, que toutes les parties du corps humain étoient liées entr'elles par une étroite sympathie; que tout concourt, tout coopère vers le même but dans l'économie animale, & qu'en outre certaines parties sont plus étroitement unies, comme les mamelles & l'estomac.

Cette nature si active, si puissante, étoit d'une constitution *ignée*. Hippocrate attribuoit même au principe de la chaleur personifiée, la même activité qu'au *phlegme* ou à la nature, comme il le donne à entendre lorsqu'il dit : « Ce que nous appelons la *chaleur primitive*, me paroît être quelque chose d'*immortel*, qui entend tout, qui voit tout, qui voit & qui connoît autant les choses présentes que les choses à venir. » (Voyez le *Livre des chairs*, DE CARNEBUS.) (1)

Ces idées d'Hippocrate, un peu spéculatives, & peut-être trop métaphysiques, paroissent moins transcendantes, & le rapprochoient des opinions populaires lorsqu'il les appliquoit à la pratique. La simplicité, je dirois presque la vulgarité de sa philosophie, devient telle alors, qu'il ne peut plus être compris aujourd'hui, lorsque ses pensées sont exprimées dans nos langues modernes, & qu'il n'est permis de le goûter & de l'apprécier, suivant Bordeu, qu'aux médecins qui ont fait une étude particulière de sa doctrine. Ajoutons qu'on ne doit pas être surpris si plus tard, les empiriques, beaucoup plus frappés des observations d'Hippocrate que de sa théorie, voulaient s'appuyer de son autorité, & le regarder comme l'un des principaux membres de leur école.

Son hypothèse de la nature qui devoit combattre, & de la matière morbide qui devoit être combattue, par une suite d'efforts, le plus ordinairement réguliers, & correspondant dans leurs phénomènes les plus apparents & les plus décisifs,

à des jours, à des temps marqués & prévus, cette hypothèse n'étoit véritablement qu'un léger *devein* qui n'avoit rien d'exclusif ou de forcé, & qui laissoit aux praticiens toute la liberté d'esprit nécessaire pour l'adapter à toutes les indications.

Ce naturalisme rationnel & si voisin de l'empirisme, a été exposé par Hippocrate dans plusieurs de ses écrits, & principalement dans le livre sur le régime, pour les maladies aiguës (*De ratione victus in acutis*).

Les maladies, qu'il regarde d'ailleurs dans ce Traité, comme des affections aiguës & subordonnées dans leur curation aux efforts salutaires de la nature plus ou moins aidée par la médecine, sont les affections aiguës de la poitrine (la pleurésie, la péripneumonie), la fièvre ardente (*causis*) & la phrénésie. Le cours de ces différentes affections, suivant Hippocrate, a trois temps ou périodes, savoir : 1^{re}. La période de crudité; 2^{re}. la période de collation; 3^{re}. la période de la crise.

Dans la première période, la matière morbifique, entièrement hétérogène, & opposée à l'assimilation, provoquoit de la part de la nature, une réaction plus ou moins violente, qu'il falloit souvent calmer ou diriger en faisant usage de tous les moyens qui pouvoient rendre cette espèce de lutte moins inégale & plus heureuse.

Dans la période de collation, cette même matière morbifique, dont on a fait depuis la matière *peccante*, éprouvoit de la part de la nature & de la chaleur intégrante, un degré d'élaboration, de maturation, suffisant pour pouvoir être expulsée. Enfin, dans la période de la *crise*, annoncée par différents phénomènes, qu'Hippocrate & les Anciens ont reconnus & signalés avec une grande sagacité, cette expulsion d'une substance étrangère & hostile s'effectuait entièrement, soit par une hémorragie; soit par l'expulsion, les sueurs, les urines, les évacuations alvines ou les abcès. Profondé qu'il y avoit quelque chose d'inévitable, de nécessaire dans ce développement successif d'une maladie, Hippocrate s'attachoit bien plus à observer tous les phénomènes de ce développement, toutes ses nuances, tous ses degrés, qu'à le troubler par des médications turbulentes ou actives, & n'ayant d'autre objet que de modifier certains symptômes partiels plus ou moins incommodes.

Hippocrate bornoit le plus souvent sa pathologie à ces vues générales. Quelquefois cependant, il s'occupoit des causes prochaines, & Sprengel remarque avec raison, que dans son livre des plaies de tête, il expliquoit l'inflammation par l'afflux du sang, dans les parties où il ne pénédroit pas auparavant. Suivant le même auteur, Hippocrate expliquoit dans un autre passage de ses écrits, la formation des calculs urinaires, par l'accumulation ou l'agglomération des parties sédimenteuses qui sont connues dans les urines.

(1) Ce livre est regardé comme peu authentique, & cette insensibilité, cette immortalité accordée à la chaleur titigante, est peut-être, suivant Sprengel, une suite de matérialisme, qui ne paroît pas conforme à la manière de philosopher d'Hippocrate. Quel qu'il en soit, nous avons cru devoir rapporter ce passage, qui, s'il ne se rapporte pas directement à Hippocrate, n'en appartient pas moins à la philosophie de ses contemporains ou de ses successeurs.

Soit dans son expédition, soit dans sa conduite active, Hippocrate agissoit d'après l'observation, & toujours dans l'intention d'abandonner la nature à elle-même, ou de la diriger, ou de la modifier d'après une connaissance approfondie de sa marche la plus régulière, & des lois les plus constantes, qu'elle suit dans le développement de son énergie.

La première méthode étoit celle qu'il mettoit le plus souvent en usage, persuadé qu'elle étoit d'une vérité incontestable; que par dix maladies aiguës, il y en a les deux tiers au moins, dont la guérison est spontanée & tout-à-fait indépendante du médecin. Nal autre, sans doute, n'avoit mieux senti, que la nature est plus puissante que les médecins, & qu'on ne doit employer ses forces, que pour faire tourner au profit de l'animal, tout ce qui agit sur lui (les alimens, les boissons, &c.); moyens qui suffisent en effet le plus souvent, lorsqu'il ne s'agit pas de lutter contre une cause matérielle de maladie.

Cette méthode d'Hippocrate, qu'il porta peut-être trop loin, dans les épidémies dont il a si bien tracé les bilieuses fébriles; cette méthode qu'Asclépiade appeloit une *méditation sur la mort*, devoit permettre & permit en effet à Hippocrate de saisir dans la marche des maladies aiguës, un rapport avec des époques fixes & presqu' toujours annoncées en préces : disposition qui se trouvoit d'ailleurs favorisée par le climat de la Grèce & par la complexion des habitans de cette contrée. Cette dernière conséquence du naturalisme hippocratique a formé ce que l'on appelle, la doctrine des jours critiques, non moins remarquable par l'opposition exclusive de ses détracteurs, que par l'enthousiasme aveugle de quelques-uns de ses partisans.

Suivant Sprengel, cette doctrine se remontré pas aux Pythagoriciens, & ne suppose, en aucune manière, l'idée d'avoir attaché une propriété quelconque à certains nombres; folie dans laquelle l'esprit humain est tombé sous doute, à une autre époque, comme on peut le voir par l'histoire des opinions attribuées à Nicomache & aux nouveaux pseudo-pythagoriciens en général.

L'observation seule conduisit Hippocrate à cette opinion des jours critiques & des espèces de périodes auxquelles la nature paroît assujettie dans les maladies aiguës. Il appelle ces jours, *critiques*, de *crisis*, jugement. Les principaux étoient le quatrième, le septième, le dixième, le quatorzième, le dix-septième & le vingtième.

Quant aux crises elles-mêmes, Hippocrate avoit trouvé, dans une contemplation assidue & judicieuse des maladies, une exactitude admirable pour les prévoir ou pour les reconnaître, sans jamais les troubler, ni porter atteinte à ce qu'il regardoit, dans ce phénomène, comme le travail de la nature.

Les mêmes principes, les mêmes résultats d'une

expérience conformée, une observation attentive des opérations régulières de la nature, le dirigeoient pour toutes les indications.

Dans les affections épidémiques & nouvelles, dont le caractère lui paroissoit obscur, il étoit long-temps son ennemi avant de l'attaquer, se bornant seulement à calmer les accidens qui se manifestoient avec gravité au commencement de la maladie, persuadé que la nature déploieroit ensuite les ressources avec moins de trouble & plus d'efficacité. Il s'abstenoit surtout d'ailleurs, & dans tous les cas, des méthodes de traitement par les évacuans, lorsque l'on ignoreoit le genre de crises qui pouvoit survenir. Du reste, il n'eut jamais la pensée que l'on pût guérir une fièvre. Il saignoit cependant au début de certaines affections, non point pour opérer une crise artificielle, mais pour modérer la violence des symptômes ou de la réaction; ce qui lui paroissoit plus convenable, plus indiqué, lorsque la maladie étoit dans la fleur de l'âge & dans la plénitude des forces. Chez les autres malades, Hippocrate n'osoit assez d'oser pour la saignée, même dans les douleurs pleurétiques, lorsqu'elles avoient été précédées de la fièvre & qu'elles en paroisoient plutôt l'effet que la cause : manière de voir & de pratiquer, que Prosper Martian a très-bien signalée, & dont il donne l'explication d'après la pathologie humorale de son temps. (*Prosper Martian, in Hippocrat., pag. 411.*)

Quelle que fût l'indication plus ou moins prononcée de la saignée, il paroît que c'étoit une règle pour Hippocrate & pour tous les médecins de l'antiquité, de ne point la mettre en usage dans les maladies aiguës, excepté dans un petit nombre de cas très-pressés, comme celui d'Anaxion, qui fut saigné le huitième jour d'une pleurésie, la fièvre étant devenue alors beaucoup plus violente, la toux plus forte, la respiration plus difficile (1).

Au début des maladies, mais surtout dans les cas de pleurésie & de péripneumonie, un régime sévère, des boissons abondantes & douces, les lavemens & tout ce qui pouvoit exciter sans irritation les évacuans alvines, étoient employés par Hippocrate jusqu'aux quatrième & cinquième jours, sans jamais oublier de prendre l'état des forces en considération & de soutenir la nature dans l'espèce de lutte qui constitue la maladie.

Dans plusieurs cas, Hippocrate, ne voulant pas ajouter un nouveau degré d'énergie à des efforts déjà trop violens de la nature, permettoit seule-

(1) Il est surprenant, pour un Médecin philosophe de la médecine, de voir combien l'hyperthésie instinctive & simple du naturalisme est prévenue aux systèmes isométriques, qui étoient encore en crédit dans le dix-huitième siècle, & d'après lesquels l'hyper- & l'hypo- pouvoient commencer, dans les notes sur Galien, la pratique des Anciens, relatée de la saignée.

ment aux malades l'eau simple, l'eau miellée, l'oxymel, furent pendant toute la durée du premier période. Il cherchoit à favoriser l'expectoration dans les maladies de poitrine, en cessant d'exciter les intestins & en faisant usage de l'hydromel (*miellum*), des fomentations chaudes, sèches ou humides. La coction & les phénomènes créniques, dans les autres maladies, étoient abandonnés le plus souvent aux mouvements de la nature.

Sans repousser entièrement ni les vomitifs ni la saignée, le père de la médecine ne les employoit jamais pour opérer une crise, & cependant il avoit très-bien remarqué que quelques maladies s'étoient terminées par le vomissement & d'autres par des évacuations alvines. Il ne parloit pas assez qu'il ait essayé d'obtenir une crise artificielle par les crèmes, quoique d'ailleurs il ait employé dans d'autres intentions, les diurétiques & même les cantharides. Quant aux sudorifiques, il en faisoit usage à une époque convenable de la maladie, mais seulement par des moyens externes, & sans offrir, ni dans sa théorie ni dans sa pratique, aucune autorité pour appuyer le genre de maladie qu'il introduisoit beaucoup plus tard, & dont Sydenham reconnut si bien l'exagération & les funestes conséquences.

Le principe d'Hippocrate, pour provoquer les évacuations alvines, étoit de s'expulser la cause matérielle de la maladie, la *matière peccante*, que lorsque la nature, après l'avoir élaborée par la coction, s'en trouvoit comme surchargée & ne pouvoit l'expulser. *Concordia purgare, atque mox oportet, non cruda, neque in principio, nisi turgent. Plurima vero non turgent.*

Il ne parut en outre que son esprit, si éminemment observateur, n'avoit reconnu ni l'espèce de complication que la sabure des premières voies peut faire naître, ni les indications secondaires qui se rattachent à cette remarque, à laquelle Sydenham, Baglivi & Stoll attachèrent dans la suite trop d'importance.

Quant aux indications pour se purger, ou pour purger d'après cette règle de conduite, Hippocrate les prenoit dans l'abaissement ou dans la présence du féciment des urines. Il est digne de remarque, que les vues pratiques à ce sujet, & l'hypothèse toute gratuite d'un principe d'action continuellement occupé à combattre & à expulser une matière peccante dans les maladies, s'éloignent aussi peu, dans ses conséquences pratiques, des notions plus exactes que l'on possède aujourd'hui sur le mode & sur la véritable caractéristique des sécrétions qui surviennent à la fin de plusieurs affections aiguës, & qui paroissent contribuer à leurs terminaisons.

On ne doit pas voir d'une autre part, avec moins d'admiration & de surprise, que toujours conduit par la même hypothèse & par les excel-

lentes observations avec lesquelles elle s'accordoit, Hippocrate ou les auteurs des écrits qui sont attribués à Hippocrate, aient saisi dans leur pratique les points principaux des méthodes de traitement par révulsion & par dérivation, lorsqu'ils se proposoient de faire rentrer la nature dans ses voies régulières quand elle s'en étoit écartée.

Le passage suivant, du VI. livre des *Épidémies*, paroît surtout fort remarquable. L'auteur recommande au médecin d'observer le but que se propose la nature, quelle que soit d'ailleurs la direction de ses mouvements & de ses efforts. « Si les humeurs, dit-il, veulent se porter sur une partie qui ne puisse impunément en recevoir l'afflux, nous devons les en détourner; mais si elles suivent un cours régulier, il faut les aider dans cette direction & leur ouvrir les issues vers lesquelles elles se dirigent. »

Les moyens dont les Anciens faisoient usage pour appeler une fluxion sur un organe, ou pour détourner cette fluxion, différaient peu de ceux qui sont mis aujourd'hui en usage. Ainsi l'on saignoit & l'on purgeoit dans l'esquinancie, pour éloigner, par révulsion, la fluxion qui tendoit à se faire sur la partie enflammée. On consilioit également les fomentations chaudes sur les jambes pour détourner la fluxion sanguine qui s'étoit établie sur les pommons ou sur l'estomac, dans le cas d'un crachement ou d'un vomissement de sang. Pour agir plus vivement dans le même dessein, les ventouses, les sinapismes étoient mis en usage.

Hippocrate, dans le premier & le troisième livre des *Épidémies*, qui sont authentiques, & les auteurs des autres livres que l'on a attribués à Hippocrate, ne s'écarteront pas de cette méthode modérée & presque expectante, quelque désastreuse que fussent les maladies qui ont été décrites dans ces livres. Peut-être même s'en méritent-ils alors plus que jamais les partisans, & c'est bien sûrement à tort que l'on voudroit leur en faire un reproche, quoique par quarante-deux malades, dont l'état a été décrit dans l'histoire de ces épidémies, vingt-quatre aient succombé.

Deux, PRIMO, mais surtout COR & ABUS, ont très-bien fait sentir, pour repousser ce reproche, que les tableaux, si admirablement tracés, surtout dans le premier & le troisième livre, furent choisis par beaucoup d'autres pour servir de bases aux idées de l'auteur sur le pronostic & sur la marche de la nature, dans les maladies le plus souvent funestes.

On peut ajouter à cette observation, que la médecine agissante eût encore augmenté sans doute cette mortalité, puisqu'il est évident que la plupart de ces livres appartiennent à nos siècles essentiellement ataxiques, que nous ne savons pas mieux guérir que les médecins de l'antiquité. « Aclépiade appelloit, dit Borden, cette espèce de *meditation sur la mort*; & ce qui a été souvent répété & fait tous les jours, sans que les

« médecins expédiateurs s'en fâchent; ils ne croient pas devoir renoncer à leur principe pour un bon mot, qui ne remue que les têtes légères & frivoles : ils pourroient alléguer rendre la pareille aux médecins qui ne pensent pas comme eux, & qui prétendroient semer des doutes sur leur doctrine immuable, comme les lois sur lesquelles elle est établie.

« Ils diroient qu'il vaut mieux méditer sur la mort des malades attaqués d'une maladie mortelle, que rendre mortelle une maladie, qui se seroit guérie d'elle-même, si on n'avoit eu la fureur de la harceler par des manœuvres inconsidérées & par l'application hasardee de cent remèdes essayés sur des indications imaginaires, & adoptés sur de vains & périlleux témoignages.

« L'hypothèse ingénieuse du naturisme, admise par Hippocrate & par les médecins de l'antiquité qui précéderent les anciens dogmatistes & les écoles d'Alexandrie, conservoit à la médecine toute sa simplicité primitive. Elle se concilioit sans effort, avec tous les avantages de l'empirisme. Bien préférable sous ce rapport aux théories, aux systèmes qui succédèrent à ce premier état des choses, qui furchargèrent l'art de guérir d'un vain luxe scientifique ou d'une application intempestive des systèmes de philosophie les plus en crédit aux différentes époques de l'esprit humain, depuis l'introduction de la physique de Platon jusqu'aux théories des mécaniciens & des astrochimiques les plus exotiques. Changemens & altérations de la méthode hippocratique & du naturisme rationnel ou primitif qu'un disciple de Stahl a décrits sous le nom de *maladies de la médecine*, & qu'un poète, ami de Van Helmont, a très-bien dépeint dans l'apologue suivant, découvert & traduit par Borlueu.

« Fille d'Apollon, de même qu'Esculape, la médecine gémissoit du sort de son frère que Jupiter avoit fait mourir; elle se cachoit dans les lieux les plus déserts & les moins habités, elle courroit, comme égarée, sans oser se fixer. Hippocrate l'entrevit par hasard au pied d'une montagne aride. Il devint bientôt éperdument amoureux de cette jeune nymphe, dont les grâces dévoileroient l'origine, & dont le hile & les fatigues n'avoient point changé la physionomie régulière & majestueuse.

« Où courez-vous, charmante nymphe, lui dit Hippocrate, & pourquoi fuyez-vous dans des lieux presque inhabités, où vous ne sauriez trouver que des adorateurs indignes de vous? La nymphe, touchée de l'air de candeur & de la bonne mine d'Hippocrate, lui dit avec beaucoup de modestie, mais avec confiance : c'est vous que je cherche & que je chéris déjà au-dessus de tous les autres humains; je vais vous rendre le plus grand des médecins, je partagerai avec vous mon immortalité.

« Hippocrate s'approcha d'elle, consent à vi-

« vre sous ses lois, & lui fit présent d'une robe légère, la plus commode, au même temps la plus simple, & qui éblouissoit par sa blancheur. Les Anciens cultivèrent la médecine sous cette pureté honnête & naturelle. Galien, après plusieurs siècles, dédaignant cette simplicité, habilla la médecine d'étoiles bigarrées, & où le travail pénible de l'art le faisoit trop sentir il changea la blancheur des lis en rouge éclatant. Plusieurs ornemens de tête, des pendans d'oreilles & d'autres joyaux rendirent la médecine méconnoissable. Avicenne passa ses jours à la farder & à la maqueter de plus en plus. Chaque médecin lui fit présent de quelque colifichet & ils ne s'occupèrent qu'à varier & à multiplier ses habits.

« PARACELSE parut. La médecine, accablée sous le poids d'inutiles bijoux, s'aperçut bientôt que Paracelse étoit issu des dieux & mille fois au-dessus des autres mortels. Elle ouvre son cœur à cet adorateur légitime; elle se plaint de toutes les insultes qu'on lui a faites, de tous les ridicules ornemens dont on l'a accablée : elle prétend reprendre son ancienne parure. PARACELSE devient son confident & l'entretient dans ces beaux sentimens contre les anciens coiffeurs.

« Qui me donnera, dit-elle, un miroir, pour que je puisse m'arranger au gré des dieux & des hommes raisonnables? C'est Van Helmont qui présente ce miroir. Il est du sang d'Hippocrate; il met en pièces & rejette au loin tous les barbares affiquets dont on avoit furchargé la médecine. Elle demande aux dieux de s'unir à Van Helmont; ce qui lui est accordé.

« Les hommes supérieurs, CELSE, par exemple, ASMETZ, GALIEN, malgré l'autorité de l'apologie, firent exception, & tendirent toujours à se rapprocher de la simplicité & du naturisme rationnel dans la pratique de la médecine; disposition d'esprit qui n'est pas moins marquée chez les Modernes les plus célèbres, tels que SYDENHAM & BOERHAVE.

« Avant ces deux auteurs, deux chefs de secte, qui ont exercé une grande influence, entendirent l'hypothèse du naturisme à leur manière, & la firent évidemment entrer dans leur pratique & dans leur théorie.

« L'adage, que la nature guérit les maladies, & qu'elle le fait en chassant du corps la matière fébrile, fut le grand principe auquel se rattache en dernière analyse toute la pratique de Van Helmont.

« La marche graduée des phénomènes morbides, tous ces détails d'observation que les Anciens avoient si bien accordés avec leurs idées sur la coction & les crises, le célèbre novateur les rejeta avec un superbe dédain, & comme il arriva à tous les chefs de secte, qui ont en général plus d'ambition que de véritable amour des sciences & de la vérité.

« La nature, suivant Van Helmont, est douée d'intelligence, & par conséquent elle a trop de bon sens pour s'amuser à la coction d'aucune matière.

matière fébrile, quand elle n'en peut faire d'autre usage pour elle-même. « La fièvre est le chemin qu'elle prend pour chasser toutes fortes de fièvres, dit Barker, & un médecin doit imiter la crise naturelle, en prescrivant des médicaments sudorifiques, & en ne donnant que ceux-là seuls; il ne doit ni attendre ni désirer une crise naturelle, mais tâcher de prévenir la nature en ce point; car, ajoutoit-il, un homme qui ne fait pas guérir une fièvre en quatre jours de temps, ne mérite pas le nom de médecin. » (Barker, *op. cit.*, pag. 260.)

La saignée, les purgatifs paroissent dans les vues, des moyens de traitement dangereux, ou du moins inutiles.

Van Helmont ne saignoit même pas dans une pleurésie, & prétendoit ne guérir que plus promptement & plus sûrement sans ce moyen. Il ne se montra pas plus favorable aux irritations de la peau & aux lavemens, dont les Anciens faisoient beaucoup d'usage, & son éloignement pour les vésicatoires étoit tel, qu'il en attribuoit l'invention au mauvais génie Moloch.

L'opinion de Van Helmont étoit qu'il étoit possible de guérir toutes les fièvres par la sueur & avec un seul remède, en faisant cependant usage de plusieurs médicaments, mais surtout de la thériaque & du vin. « Celui-ci, disoit-il, est un grand cordial par lui-même; mais quand on manque de véhicule pour quelqu'autre remède, il est un messager propre à le charger de la commission, parce qu'il connoît la route, qu'il est bien reçu partout où il va, & qu'il est introduit avec plaisir dans les plus secrets appartemens de l'édifice humain. »

Stahl, qui entendit le naturalisme dans un sens tout-à-fait opposé, sous le rapport de la pratique, fut véritablement le chef d'une nouvelle secte de médecins (les médecins essentiellement expectans, ou les naturalistes médecins, ainsi que Boerhaave les a désignés.)

Cet homme justement célèbre & ses disciples les plus recommandables prirent exclusivement la nature pour guide & se livrèrent à une médecine toute *ascétique & contemplative*, examinant tout dans les moindres détails, n'osant rien troubler, & respectant même les hémorragies, persuadé, comme il l'étoit, que la nature prévoyante, intelligente, donne, développe, dirige les maladies avec des vues & des intentions toujours utiles.

Les nouveaux principes de conduite médicale que la théorie de Van Helmont intraduisit dans l'exercice de la médecine, continuoient d'avoir un grand crédit en Hollande & en Angleterre, lorsque Sydenham commença à exercer l'art de guérir. Leurs dangereux effets & son aversion pour les subtilités scholastiques lui firent mieux sentir tous les avantages d'une médecine moins transcendante, moins *a priori*, également éloignée de

MEDICINE. Tome X.

la turbulence de Van Helmont & de l'oïseuse contemplation de Stahl.

Cet homme si judicieux, & que le caractère, la trempe de son esprit rendoient si propre à l'exercice de la médecine, attacha, comme Hippocrate, beaucoup moins d'importance à la théorie, qu'à cet empirisme rationnel qui se forme & se perfectionne continuellement, par un commerce journalier entre les médecins & les malades.

Il admit également, comme Hippocrate, une nature qui guérit & une médecine qui doit avoir pour objet d'assister la nature, d'en diriger les mouvements, de traiter les malades non point *a priori*, mais par indications, & de subordonner les grands moyens de l'art, la saignée, les purgatifs, à l'âge des sujets, à l'état des forces, à la complexion individuelle des malades & à la constitution atmosphérique.

La succession des phénomènes morbides, la marche progressive de la nature dans le travail de la coction ou dans les phénomènes critiques, furent respectées par Sydenham, comme par les médecins de l'antiquité, & sous ce rapport, on ne peut refuser d'admettre, entre la conduite de ces médecins & celle du savant auquel la postérité confirmera sans doute le titre de *Hippocrate anglais*, que ses contemporains lui ont si justement accordé.

Boerhaave, plus savant que Sydenham, & lui-même chef d'école, n'en montre pas moins de déférence pour Hippocrate & pour le naturalisme rationnel des Grecs, comme on pourra aisément s'en convaincre en parcourant ses écrits en général, & en particulier son admirable discours sur la nécessité d'étudier Hippocrate, & de rapporter à cette étude toute la partie fondamentale de la médecine pratique. (*De studio Hippocratis commendando.*)

Telle est l'exposition dans laquelle nous avons cru devoir retracer, en la considérant aux différentes époques de la médecine, l'hypothèse d'une nature toujours agissant, dans les maladies, d'une manière graduée, & par une succession de phénomènes ou d'événements qui conduisent ordinairement, dans les maladies aiguës, à un dénouement favorable. Ce ne fut d'abord qu'une métaphore assez hardie, une comparaison ingénieuse, puis une supposition, & enfin une doctrine qui expliqua très-bien certains phénomènes, en ne considérant que leur apparence : phénomènes par la réalité desquels l'état présent des connoissances anatomiques & physiologiques ne fournit encore que des aperçus incomplets & des données insuffisantes. Cette doctrine a eu d'ailleurs cela de remarquable, que, malgré son affiliation avec des idées très-anciennes sur la cause première, elle n'étoit empruntée à aucun système dominant de philosophie, qu'elle s'étoit formée directement dans l'observation assidue & journalière des malades, & que, par cela même, elle fut adoptée dans tous

les temps par les hommes judicieux qui, ne voyant pas les choses *à priori*, mais d'après l'expérience, doivent être appelés *médecins empiriques*; lorsque l'on donne à ce titre sa véritable acception.

Il est bien évident aujourd'hui que l'on doit dire, la terre tourne autour du soleil, si l'on considère la réalité des choses, & cependant l'observation des phénomènes *apparens* étant plus forte que la démonstration de Copernic, nous disons: le soleil se lève, le soleil se couche, &c. Il en est de même pour la doctrine du naturalisme rationnel: elle s'est formée sur l'apparence & non point sur la réalité des phénomènes. Sans doute, avec le temps, il sera prouvé que tout ce que l'on rapporte & à une nature, & à un principe d'action vitale, personnalisé, s'expliquera plus rigoureusement par les lois & par les phénomènes généraux de l'organisation; mais l'habitude, l'autorité, la simplicité de l'hypothèse, la manière d'être accessible à tous les esprits, l'emporteront pendant long-temps sur les vérités de détail que la science nous révèle. Nous continuerons alors de dire: la nature agit, opère dans les maladies; le médecin doit être son ministre, doit imiter ou diriger ses mouvemens, l'admirer dans ses ressources, respecter ses efforts réguliers, & se borner le plus souvent, dans l'exercice de son art, à calmer la violence, ou à prévenir ses aberrations. *Meliora video, deterius sequor.* (MORÉAU DE LA SAINTE.)

NATURE DE L'HOMME. (*Histoire de la médecine.*) Un Traité sur la nature de l'homme se trouve compris parmi les écrits attribués à Hippocrate. Ce Traité, quel qu'en soit l'auteur, est fort ancien, comme il est facile de s'en convaincre par l'importance avec laquelle on y résout la théorie de l'unité de l'élément, qui avoit alors un grand crédit, & qui, dès le siècle de Platon, ne comptoit plus qu'un très-petit nombre de partisans.

Platon, au rapport de Galien, a cité, en l'attribuant à Hippocrate, ce Livre de la nature de l'homme, dont il a emprunté un passage qui ne s'est pas conservé, & dans lequel on trouve la comparaison entre le corps & l'économie générale de l'Univers; rapprochement qui se trouve aussi indiqué dans le Traité de la nature de l'homme, aphorisme XVIII, du troisième livre. Du reste, les Anciens eux-mêmes attribuoient ce même Traité de la nature de l'homme, à différens auteurs, tels que Dracon, Tessale, Polybe, &c. Le fragment d'angologie que l'on rencontre dans ce Traité, a été attribué en particulier par Aristote, à Polybe; c'est un document de la plus haute importance pour l'histoire de l'anatomie, ainsi que MM. Sprengel & Lanth l'ont bien reconnu. Ce même Traité de la nature de l'homme, est un des monumens de l'antiquité, d'après lequel on peut le mieux juger la pathologie des médecins grecs, avant l'école d'Alexandrie. L'auteur, quel qu'il soit, met un

grand prix à démontrer que le corps de l'homme est composé de plusieurs choses ou de plusieurs éléments; chacune de ces choses confère, dans l'organisation, la force ou les propriétés par lesquelles elle contribue à cette organisation: telle est, dit l'auteur, la nature des animaux & de tous les êtres; tous naissent & meurent de la même manière, étant composés des mêmes éléments. Le corps de l'homme en particulier renferme du sang, de la pituite, & deux sortes de bile, la jaune & la noire; il est malade par un défaut de proportion entre ces choses, & bien portant par leur équilibre & leur juste mesure.

Empédocle, avant Hippocrate, s'étoit montré contraire aussi à l'unité d'une matière constitutive, pour admettre la doctrine des quatre éléments.

L'auteur du Livre sur la nature de l'homme diffère de ce philosophe en ne regardant pas ces mêmes éléments comme immuables, & en substituant à leur rencontre un juxtaposition dans les corps, une combinaison ou un mélange. (*Crisis.*)

Suivant une remarque délicate & très-philosophique de Sprengel, l'auteur de ce même Traité auroit séparé les éléments eux-mêmes pour personifier, par une abstraction très-familière à l'esprit humain, leurs qualités ou propriétés les plus générales, comme on le voit pour la chaleur intégrante, qu'il ne faut pas confondre avec le feu, auquel Pythagore, Héraclite & Platon attachoient une si grande influence. Cette conjecture d'un esprit à la fois subtil & profond, se trouve justifiée par les passages suivans: *Ceux qui croient ont plus de chaleur intégrante & demandent plus de nourriture.*

L'homme jouit d'une santé parfaite lorsque la chaleur animale est intimement combinée avec les autres qualités élémentaires. (De veteri medicina.)

On voit même, dans un autre passage, que l'intelligence suprême & l'immortalité, furent accordées par les Anciens, à la chaleur intégrante; ce qui ne peut s'entendre sans doute du feu lui-même, mais des propriétés personnifiées, du feu ou de la cause occulte à laquelle on attribuoit ces propriétés & ces phénomènes.

Un peu plus tard, suivant le même auteur, on parvint à distinguer d'une manière plus claire, les éléments matériels des corps, que l'on nomma *cruxia*, des principes personifiés de leur action, *axos*, tels que l'humidité radicale, la chaleur intégrante, le sec & le froid; subtilités qui ne doivent pas étonner chez les philosophes grecs. Du reste, le Traité de la nature de l'homme nous offre la trace la plus ancienne & comme l'origine du système des humeurs, qui prit de nouveaux développemens au temps de Galien, & qui se retrouve dans plusieurs opinions populaires, dont les médecins eux-mêmes ont bien de la peine à le disjindre.

C'est dans ce même Livre sur la nature de l'homme, mais principalement dans le passage concernant l'angiologie, qu'il faut chercher les motifs des saignées particulières ou d'éléction, si souvent recommandées par les Anciens; la saignée des vaisseaux internes, dans la strangurie; de la veine intérieure du coude, dans la pleurésie; la saignée au jarret & à la malléole externe, dans les affections du dos; la saignée de la malléole interne, dans les maux des lombes & des testicules. On voit dans le même Livre que les Anciens, tout occupés qu'ils étoient d'agir par une forte de révulsion dans les affections inflammatoires, recommandoient, d'une manière générale, de pratiquer les saignées le plus loin possible du siège de la douleur.

L'auteur du Traité de la nature de l'homme ne distinguoit pas, du reste, les veines, des artères, qu'il désignoit collectivement sous le nom de *vasa*. Il ne paroît pas, en outre, que l'auteur de ce même Livre ait attribué l'origine de ces vaisseaux soit au cœur, soit au foie, comme on le fit dans la suite. Suivant la conjecture de Lauth, il s'étoit borné, dans l'histoire des vaisseaux, à ce qu'il avoit pu apercevoir à l'extérieur chez des sujets amaigris par la maladie; ce qui bornoit ses observations aux veines, qu'il suivit depuis les parties latérales & postérieures de la tête, jusqu'à l'extrémité des membres.

(MORÉAU DE LA SARTHE.)

NATURE DE L'HOMME. (*Physiologie & Pathol.*)

Ce qui concerne la nature de l'homme pourroit sans doute embrasser toute l'étendue de son organisation, & donner lieu dans ses développemens à un traité complet de physiologie. Nous nous bornerons à indiquer sous ce titre, l'examen & les conséquences des dispositions propres à la structure de l'homme, & des propriétés vitales qui sont attachées & inhérentes à cette structure.

La force vitale elle-même, ce dernier fait auquel on arrive pour rattacher comme à une cause occulte & ignorée dans son essence, les phénomènes qui appartiennent à l'ensemble de l'organisation, cette force vitale diffère sans doute beaucoup dans l'homme de ce qu'elle peut & doit être dans les animaux, même les plus voisins de l'espèce humaine; ce qui, toutefois, ne peut être connu que d'une manière indirecte & par les effets divers de cette différence; c'est principalement dans le mode de sensibilité, d'irritabilité, de réaction vitale, dans la manière d'être & d'agir des sens & du système nerveux, qu'il faut chercher à reconnoître l'influence de cette diversité.

La sensibilité, dans l'organisation humaine, est plus active, plus uniformément répandue & diffuse dans tous les organes: les impressions ne sont presque jamais solitaires & bornées; les sympathies, les affections sont plus fréquentes, plus étendues, jouent un rôle plus important dans les phé-

nomènes de la vie; toutes les affections locales ont peu fortes deviennent bientôt générales. Les différentes parties du corps communiquent entr'elles avec une promptitude extrême; tout concourt à cette harmonie, & c'est principalement à l'homme que s'applique l'idée d'Hippocrate sur l'essence de la vie:

Una natura, conspiratio unica, consensientia omnia.

Un autre trait principal de la nature de l'homme peut se tirer des variations de la sensibilité, soit dans les degrés, soit dans la diversité des stimulans qui la mettent en jeu chez les différens individus.

Dans les animaux, & même dans les espèces les moins éloignées de l'homme, ces variations du sentiment sont très-bornées. Les individus de la même espèce ne sont, en général, excités de la même manière que par des stimulans semblables. Plus simples dans leur structure, soumis à un plus petit nombre de lui qui n'ont presque pas d'exception, tous ces êtres parcourent d'un pas égal & ferme la carrière de la vie. L'homme seul s'y traîne, y marche, y vole tour à tour, & en sort brusquement, quelquefois en portant sur lui-même, dans son désespoir, des instruments de fureur & de destruction.

L'homme seul présente toutes les nuances, tous les degrés du sentiment, depuis la sensibilité diminuant, étouffée ou suspendue dans le *sakir* de l'Inde, le prisonnier américain & les martyrs de toutes les religions, jusqu'à la délicatesse & la susceptibilité d'une femme de Londres ou de Paris, qu'un objet horrible fait tomber en syncope ou en convulsion.

La manière de répondre aux divers excitans n'est pas moins variée que cette différence dans les degrés de la sensibilité.

Rien n'est fixe ni régulier dans l'action d'un stimulant sur la sensibilité humaine. L'aliment le plus sain, pour le plus grand nombre, est presque un poison pour quelques estomacs qui ne peuvent le supporter. Le même médicament produit les effets les plus variés; le même virus, certaines causes semblables de maladie, agissent avec violence sur quelques personnes, & n'altèrent pas la santé des autres. La sensibilité du même individu varie dans les différens âges, dans la même année, quelquefois dans le même instant, & chaque malade est toujours, pour le médecin, un nouveau sujet d'observation & d'expérience.

Ce sont même toutes ces variations & ces vicissitudes, dépendantes de la nature de l'homme, qui donnent à l'exercice de l'art de guérir cette difficulté, cette inconstance, cette incertitude qu'il est injuste & peu philosophique de lui reprocher: & en effet, ces défauts ne doivent pas être imputés à la science, mais à la nature de l'homme, au mode versatile de sa sensibilité. La médecine,

SSS 2

en faisant même de très-grands progrès, fera toujours moins exacte, moins sûre, dans ses applications pratiques, que les autres sciences ou les autres arts, parce qu'elle ne se rapporte point à des lois fixes, à des phénomènes immuables. Ces philosophes si fiers de ces physiciens & ces mathématiciens, si fiers de la précision de leurs résultats; ces naturalistes, qui connoissent si bien toute la nature, excepté l'homme; tous ces sages, tous ces savans, qui reprochent si souvent à la médecine la marche peu assurée; qui vont quelquefois jusqu'à prétendre qu'elle n'est pas une science, verroient qu'elle est une science plus difficile s'ils connoissoient mieux la nature humaine: alors peut-être ils défavoueroient d'injustes déclamations, ou seroient forcés de déclarer que l'on peut régler cette sensibilité si capricieuse de l'homme, & qu'eux-mêmes ils font toujours affectés également dans des circonstances semblables; qu'ils ont des goûts, des appétits constants; que le même aliment, le même médicament, la même cause de douleur ou de plaisir, excitent toujours leur sensibilité de la même manière.

Dans l'homme, l'irritabilité, la force motrice est uniformément diffusée & distribuée, comme le principe du sentiment, dans toutes les parties de l'organisation. Le développement de ces deux forces vitales est libre, facile, peut s'exalter ou s'abaisser; il est susceptible d'une réaction illimitée; & devient la cause de cette force & cette flexibilité d'organisation que l'on a toujours regardés comme le caractère principal de la constitution humaine.

Cette énergie, cette flexibilité se manifestent dans une foule d'emplois de la vie, sous le poids des fardeaux, dans les exercices gracieux de la danse & de la voltige; dans les combinaisons d'efforts exigés pour la sphéristique & la palestrique; enfin, dans l'exercice des métiers & des professions. Quelques physiologistes ont même pensé que l'intensité de la force vitale doit être telle pour l'espèce humaine, que toutes choses égales d'ailleurs, le cadavre de l'homme se putréfie plus lentement que celui des autres animaux.

Des considérations plus détaillées sur les caractères de l'organisation de l'homme en général, sur la disposition du cerveau en particulier, sur celles des sens, du squelette & des muscles, & sur le rapport de toutes ces choses avec la manière de vivre & le développement des facultés intellectuelles; ces considérations nous entraîneroient sans doute au-delà du sujet qui doit nous occuper en ce moment, & nous porteroient à reproduire, peut-être sans nécessité, les remarques que nous avons publiées, il y a quelques années, dans une dissertation qui fait partie de la nouvelle édition du grand ouvrage de Levater, sur l'Art de connoître les hommes par la physionomie. [Voyez cette édition, tome 1^{er}, édition in-4^e. & in-8^e.] (MORAU DE LA SARTHE.)

NATUREL, ELLE, adjectif. Les Anciens ont souvent désigné sous ce nom, ce qui étoit propre, inhérent au corps de l'homme ou des animaux, pour le distinguer des subtilances extérieures ou étrangères qui agissent sur son organisation. C'est dans ce sens que l'on appelloit choses non-naturelles ce qui constitue la matière de l'hygiène.

(L. J. M.)

NATURELLES (Familles) des plantes. (*Matière médicale*.) On désigne sous ce nom plusieurs groupes de plantes qui se trouvent réunies, non-seulement par diverses dispositions essentielles ou fondamentales de leur organisation, mais encore par une conformité, par une analogie dans leur structure, leurs formes extérieures, &c.

Les propriétés médicales sont elles-mêmes comprises dans cette analogie, ainsi que Camerarius paroit l'avoir entrevu le premier, & d'après des aperçus qui ont été successivement développés & perfectionnés par Wilke, Gmelin, & surtout par M. de Candolle, auquel nous devons une excellente Dissertation sur les propriétés médicales des plantes, comparées avec leurs formes extérieures & leur classification naturelle (1).

Cette analogie entre les propriétés médicales des plantes & les formes extérieures du végétal est une chose de fait, très-évidente pour plusieurs genres & pour plusieurs familles, dans lesquels cette espèce de conformité est beaucoup plus remarquable. Ainsi, toutes les espèces de quinquina contiennent de la quinine ou de la cinchonine, & partagent en conséquence les propriétés fébrifuges qui furent attribuées d'abord seulement à quelques-unes de ces espèces. La même remarque s'applique aux *rheum*, aux *pavots*, aux *absinthies*, aux *térébinthes*, aux *violettes*; & cette espèce de conformité dans les propriétés médicales, pour plusieurs espèces d'un même genre, est telle, qu'elle les avoit fait réunir sous un même nom, d'une manière presque empirique, avant d'avoir reconnu tous les rapports que doit embrasser leur histoire naturelle.

Des groupes plus étendus, des familles entières, présentent la même similitude dans les espèces & dans les genres qui leur appartiennent. Toutes les mauves, par exemple, ne sont-elles pas émollientes? la plupart des crucifères, antiscorbutiques; les gentianées, fébrifuges; les euphorbiacées, acres & purgatives; les solanées, vénéneuses: analogie que nous présentons également les labiées, les graminées, les ombellifères, les consérues, les aménacées; & devons-nous être surpris, si plusieurs voyageurs ont reconnu que chez des peuples séparés par de grandes distances, des plantes du

(1) *Essai sur les propriétés médicales des plantes, comparées avec leurs formes extérieures & leur classification naturelle*, in-4^e, 1804, 1^{re} édition, pour servir de dissertation inaugurale, 2^e édition, Paris, 1816, in-8^e.

même genre ou de la même famille étoient employées aux mêmes usages (*) ?

Cette ressemblance, cet accord de propriétés médicales dans un grand nombre de plantes du même genre, ou de la même famille, est un résultat du mode de nutrition dans ces plantes, qui doit nécessairement imprimer un caractère constant, uniforme, aux dispositions physiques ou à la composition chimique de leurs parties, qui sont employées comme aliments, comme poisons, ou comme médicaments.

L'instinct des animaux, l'antipathie, la préférence que plusieurs espèces manifestent relativement à certains genres ou à certaines familles de plantes, ont précédé l'homme, ou l'ont dirigé dans l'observation de ces grandes analogies.

En effet, plusieurs espèces, dans les mammifères, guidées par la seule impulsion de la nature, rejettent ou recherchent également toutes les plantes d'une famille. Les bœufs laissent intactes toutes les labiées, toutes les véroucées; les chevaux, presque toutes les crucifères: les bœufs, les chevaux, les moutons, les cochons, les chèvres, dédaignent en général les solanées, & montrent évidemment leur préférence pour les graminées, les légumineuses, ainsi que Linné l'a très-bien remarqué. (Voyez dans les *Annotines academice*, la Dissertation ayant pour titre: *Pan Succus*.)

Les vers à soie se nourrissent avec les feuilles de toutes les espèces de mûriers. Plusieurs insectes dépassent même les limites d'un genre de plantes; suivant l'observation de M. de Candolle, qui remarque que dans nos bosquets les cantarides attaquent d'abord les frênes, se jettent ensuite sur les lilas, les troënes, même sur les oliviers, qui appartiennent tous à la même famille, sans jamais atteindre les jasmins, qui se rapportent à une autre famille.

Le même naturaliste s'est assuré, par des expériences très-ingénieuses, que la teigne à salbalas de Réaumur, qui ne se rencontre jamais dans la nature, que sur l'altragale à feuilles de réglisse, attaque exclusivement les autres légumineuses lorsqu'elle se trouve privée de sa nourriture habituelle.

Les plantes parasites ne montrent guère moins, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'instinct ou de discernement dans le choix des végétaux auxquels elles attachent pour se nourrir de leur substance: toutesfois de nombreuses exceptions se présentent dans l'histoire des similitudes & des har-

monies végétales qui nous occupent en ce moment; mais le plus souvent ces mêmes exceptions, qui faisoient élever des doutes par leur nombre, sur la loi & sur la règle, diminuent, par une étude plus approfondie & par des connoissances plus avancées; il n'est pas même sans exemple qu'une plante, qui s'éloignoit par ses propriétés du genre ou de la famille où on l'avoit d'abord placée, se trouve appartenir réellement à une famille différente, lorsque son organisation est mieux connue. C'est ainsi que, guidé par les propriétés médicales, on a fait disparaître plusieurs anomalies, en prouvant que les MÉLIANTHES ne doivent pas être réunies avec les PRIMULACÉES; que le QUASSIA n'appartient pas à la famille des MAONOLIACÉES; que les STRYCHNOS forment un petit groupe qu'il faut séparer des APOCYNÉES, &c.

On évitera, du reste, beaucoup de confusion, en distinguant dans les propriétés des plantes, celles qui sont générales ou communes à toutes les parties du végétal, des propriétés spéciales. Ces dernières méritent seules notre attention sous le point de vue qui nous occupe.

Ces propriétés spéciales sont particulières à quelques matériaux de la plante ou à quelques-uns de ses organes. En la prenant en considération, on ne confondra pas dans les euphorbes ce qui vient du périsperme, qui est doux & sain, de l'embryon, qui est âcre & fortement purgatif: on distinguera la racine de la carotte, des feuilles de ciguë. La pulpe parfumée, qui enveloppe la graine dans la vanille, & qui manque dans les autres plantes de la famille des orchidées, explique naturellement les propriétés particulières de cette espèce. Il en est de même pour la pulpe douce de la casse & du tamariu, qui manque dans la plupart des autres légumineuses; pour les tubercules qui naissent sur les fibres de certaines racines, & qui sont toujours des réservoirs remplis d'une sève très-abondante, comme on le voit pour la pomme de terre, la patate, le topinambour, &c. Étudier ainsi les exceptions, en chercher les causes ou la raison dans une étude approfondie de la physique végétale, c'est confirmer la règle, ou même l'étendre pour certains cas où elle paroît se renfermer dans des limites trop étroites. Ajoutons que la nature du sol, le mode de culture, l'époque, l'âge du végétal au moment de son emploi, les parties qui sont mises en usage, les organes du corps de l'homme ou des animaux auxquels ces parties sont appliquées, ont fait naître d'autres anomalies, d'autres exceptions, qui ne sont pas fondées sur la nature des choses, & qui disparaissent lorsque l'on réunit, pour les mieux voir, toutes les lumières d'une observation plus complète & d'une science plus avancée.

L'exposition des plantes employées en médecine, dans l'ordre des familles naturelles auxquelles elles appartiennent, est une preuve continuelle de cette vérité & de l'importance des rap-

(*) Les racines du *Dracena terminalis* sont employées aux mêmes usages par les Indiens, que la racine du *Sinilaris* dans l'Amérique septentrionale. L'*Euphorbia melaleuca*, &c. plusieurs myrtes, paroissent indiqués dans certaines contrées, dans le traitement de quelques dysenteries. Les *Isforns* offrent des purgatifs, dans les quatre parties du Monde.

ports qui unissent la médecine aux sciences naturelles. On pourra en juger par l'énumération ri-jointe, que nous empruntons à l'excellente Dissertation de M. de Candoile, dont nous suivrons la marche & la classification, en nous attachant seulement aux familles qui contiennent des médicaments très-efficaces & souvent employés.

Cent dix-huit familles dans lesquelles on trouve des plantes remarquables par des propriétés relatives, ou à la matière médicale, ou à l'hygiène, sont comprises dans la première classe (classe des *Dicotylédones*, ou *Euxogènes*).

Toutes les plantes de cette classe nous offrent les produits les plus élaborés de la végétation, les huiles fixes & volatiles, les acides, le camphre, les résines, les gommés-résines. C'est aussi dans l'écorce du plus grand nombre de ces plantes, que se trouve le *tannin*, que l'on doit distinguer avec soin aujourd'hui de la *quinine*, de la *cinchonine*, qui paroissent posséder éminemment la propriété fébrifuge, & qui n'ont encore été découvertes que dans les quinquinas. Nous devons indiquer aussi, & comme un caractère négatif, l'absence du principe glutineux dans cette première classe.

La première famille de cette classe, les *RENONCULACÉES*, nous offre les hellebores & les acônites, & quelques plantes analogues, dont les racines contiennent à un degré plus ou moins prononcé, un principe d'une acreté & d'une amertume qui en fait des médicaments très-énergiques. (*Voyez RENONCULACÉES.*)

Il faut aussi rapporter à la même famille, plusieurs plantes qui sont employées à l'extérieur, pour produire une espèce de rubéfaction (les *Chénopées*, les *Renonculus acris, bulbosus & sceleratus*), le *Knoultonia vesicatoria*, employé comme vésicatoire dans l'Afrique australe, l'*Anemone nemorosa*, &c. &c.

L'écorce de Winter, l'écorce de Mélabo, assez récemment introduites dans la matière médicale, l'anis étoilé ou la badiane, & quelques autres médicaments tirés du genre *Drymis* & du genre *Tulipiers*, nous intéressent principalement à la famille des *MAGNOLIACÉES*.

En général, toutes les plantes de cette famille nous offrent une saveur amère, nullement astringente, & sont remarquables par un principe aromatique, beaucoup plus développé dans les espèces du genre *Drymis*, dont le nom grec indique ce caractère. (*Spice*, saveur acre.)

L'écorce de Mélabo, que nous venons de citer, qui paroît appartenir à ce genre, ne contient ni acide gallique, ni tannin, mais un principe volatil très-aromatique, & une grande quantité de matière amère & résineuse. (*Voyez Mélabo.*)

Le tulipier paroît avoir été substitué souvent, dans les Etats-Unis, au quinquina comme fébrifuge. (*Voyez ce mot.*) La teinture préparée avec les cônes du *Magniola acuminata*, est em-

ployée dans le traitement des affections rhumatismales.

Si nous parcourons les autres familles, nous trouvons d'abord dans les *MÉNISPERMÉES*, le *Peirens brava*, le *Menispermum palmatum*, qui donne la racine julemment estimée, sous le nom de *racine de Colombo*, & le *Menispermum lacunatum*, dont les baies, plus connues sous le nom de *Cogues du Levant*, empoisonnent les poissons & les oiseaux, ce qui doit être attribué à l'action d'une nouvelle substance que M. Boullay a découverte & désignée sous le nom de *picrotoxine*. (*Voyez ce mot & MÉNISPERMÉES.*)

En poursuivant la revue des autres familles de la même classe, nous voyons qu'il faut comprendre dans notre énumération, un grand nombre de mannes (dans les *MALVACÉES*), le tilleul (dans les *TILIACÉES*), le quassia & le simarouba (dans les *SIMARUBACÉES*); toutes les espèces de Gayac, & quelques espèces des genres *Ruta* & *Pegnum* (dans les *RUFACEES*); l'anguilline dans un groupe de la même famille (les *ZANTHOXYLÉES*), les ipécacuahas (dans les *VIOLACÉES*), le thé (dans la famille des *CAMELLIÉES*), & enfin, l'oranger & le citronnier (dans la belle famille des *HYDRANGÉES*). (*Voyez ces différents mots, excepté les MALVACÉES, les CAMELLIÉES & les HYDRANGÉES*, sur lesquelles nous croyons devoir ici nous arrêter un instant.)

L'abondance du mucilage de nos mannes indigènes, leurs propriétés émollientes, adoucissantes, sont bien connues. La plupart des mannes étrangères servent aux mêmes usages, présentent les mêmes propriétés, & sont employées comme aliment. (*L'Hibiscus esculentus.*)

Nous devons dire aussi que les pétales de plusieurs malvacées ont une saveur astringente. L'*Hibiscus theobroma*, plus connu sous le nom de *cacao*, contient une cire butyreuse un peu amère, qui forme la base du chocolat. (*Voyez Cacao, CHOCOLAT, THEOBROMA (Hibiscus).*)

Nous ne pouvons pas terminer cet article sans ajouter que dans plusieurs genres de cette famille, les graines sont entourées de filaments laineux ou fuyens bien connus, dans le *Coton* & dans le *Bombax*, où ils diffèrent beaucoup de la substance ligneuse, qui douvent de l'acide oxalique quand on les traite par l'acide nitrique. (*Voyez Coton.*)

Les *CAMELLIÉES*. Cette famille ne comprend que deux genres, le *Thé* & le *Camellia*: l'analogie de ces deux genres est telle, que plusieurs feuilles de *Camellia japonica* & *Camellia sasanqua*, sont souvent employées à la place du thé. On doit observer que les plantes de ces deux genres n'ont point de parfum qui leur soit propre, & qu'elles le doivent à la transpiration que l'on en fait avec les fleurs de l'*Olea fragrans*. (*Voyez Thé.*)

Dans les feuilles & les écorces de la famille des *HYDRANGÉES*, la partie vraiment active, l'huile volatile, est contenue dans de petits réservoirs vési-

cultures qui se trouvent dans les feuilles & dans les écorces : ces plantes contiennent en général, dans la pulpe de leurs baies, un principe acide qui est beaucoup plus développé dans les différentes espèces de citrons.

Les autres familles de la même classe, qui doivent encore attirer notre attention relativement à leurs propriétés médicales, conformes à l'analogie botanique, sont les *Cucurbitacées*, les *Papavéracées*, les *Frangulacées*, les *Polygalacées* & les *Légumineuses*, qui fournissent de nombreuses ressources à la matière médicale ou à l'hygiène, comme il sera facile de le voir dans les différents articles consacrés aux diverses plantes qui se rapportent à ces familles, & qui sont employées en médecine.

Dans les autres familles, on doit plus particulièrement porter son attention sur les *Rosacées*, les *Myrtinées*, les *Combinetacées*, les *Grosellacées*, les *Ombellifères*, les *Caprifoliacées*, les *Rubiacées*, les *Valérianiées*, les *Composées*, les *Cornéacées*, les *Cochleariacées*, les *Ericariées*, les *Ebenacées*, les *Stavchnées*, les *Gentianées*, les *Convulsiacées*, les *Borraginées*, les *Solanées*, les *Personées*, les *Lamiées*, les *Polygones*, les *Laurinées*, &c. &c.

Ce qui concerne ces différentes familles a été exposé ou sera exposé dans ce Dictionnaire, depuis l'époque où la rédaction nous a été confiée. Nous allons passer rapidement en revue les articles qui ont été omis dans les volumes qui précèdent, ou qui ne s'y trouveraient pas indiqués sous le point de vue qui nous intéresse en ce moment.

10. Les *Cucurbitacées*. Les plantes de cette famille contiennent un principe très-âcre, très-stimulant, qui leur donne une odeur particulière, & qui se trouve beaucoup plus concentré dans les graines de moutarde & dans les racines du *Cochlearia armoracia*. Suivant les proportions, le développement de ce principe, les différents genres de crucifères nous offrent des médicaments très-efficaces, les antiscorbutiques les plus puissants, ou des alimens assez toniques. Plusieurs plantes, que nous employons comme légumes, appartiennent à cette classe : tels sont le cresson, différentes espèces de choux, la rave, le navet.

Nos brocolis, nos choux-fleurs, sont dus en particulier à quelques espèces de choux, dont on a fait avorter les fleurs en totalité ou en partie. Le *Crambe maritima*, employé chez les Romains pour la nourriture des pauvres, & fort estimé aujourd'hui chez les Anglais, sous le nom de *Sea-Kale*, est produit par l'étiollement artificiel des tiges d'une espèce de choux, au moment où elles sortent de terre. (Voyez *NAVET*, *RAVE*, *SCORBUTIQUE* (Anti-), *SEA-KALE*.)

20. Les *Frangulacées*. Les frangulacées, RACINI de Jussieu, contiennent un grand nombre de plantes employées en médecine. (Voyez *RHAMNUS* & *ROUARBRE*.)

30. Les *Légumineuses*. Parmi les différents genres de cette famille, le plus grand nombre présente beaucoup d'analogie, beaucoup de similitude avec certaines anomalies ou irrégularités, que l'on doit attribuer aux variations dont est susceptible l'élément végétal qui leur est propre (l'extrait).

Plusieurs légumineuses qui contiennent abondamment ce principe, sont très-purgatives, comme on le voit pour le féné (voyez *SÉNÉ*), le *Spartium purgans*, le *Coronilla varia*.

La pulpe sucrée de la casse, des tamarins, de quelques mineux, purge beaucoup plus doucement que les préparations de ces différentes plantes.

Lorsque les graines des légumineuses ne contiennent que de petites quantités d'extrait, elles offrent alors de très-bons alimens ; ce qui est remarquable pour les haricots, les pois, les lentilles, &c.

Les caractères botaniques sont tout-à-fait d'accord avec les propriétés nutritives ou non nutritives des graines, & peuvent se rapporter à deux chefs : 1°. les légumineuses à cotylédons épais ; 2°. les légumineuses à cotylédons minces & très-peu féculents. Les graines des premières sont remplies de fécule ; de pourpres de pores corticaux, elles ne changent point d'état dans la germination, & nourrissent la jeune plante. Elles sont employées comme aliment dans divers pays.

Les graines dont les cotylédons sont minces, nous offrent des pores corticaux, & peuvent se changer en feuilles à l'époque de la germination. Elles ne sont pas employées comme aliment. Quelques semences des légumineuses sont assez âcres pour aromatiser le tabac (la *Terre Tonga*), ou pour être employées comme vermifuges (les semences de l'*Andira*). Quelques racines de plusieurs légumineuses renferment dans les tubercules une substance alimentaire, comme on le voit pour le *Lathyrus tuberosus*, que l'on mange en Hollande, le *Dolichos tuberosus* & le *D. bulbosus*, employés comme aliment par les Indiens. La racine de réglisse, qui contient un peu de fécule amilacée, n'est pas sans quelque analogie avec ces racines. (Voyez *RHIZOMES*.)

La racine de l'*Abrus precatorius* présente la même analogie : elle sert, dans l'Inde, à préparer une boisson pectorale appelée l'*etti*.

Les écorces de plusieurs arbres de la famille des légumineuses sont amères, & employées, dans quelques pays, comme fébrifuges. (Les écorces du *Geoffrea*, du *Cassipouia bonducella*.)

Le baume de Copahu, le baume du Pérou, appartiennent à la même famille, dont l'histoire, on ne sauroit trop le répéter, présente un grand nombre de faits contradictoires ou peu connus.

40. Les *Combinetacées*. L'écorce de plusieurs plantes de cette famille, qui n'est pas encore très-

bien connue, paroît jouir d'une propriété furt astringente, très-développée dans le *Bucida buceras*.

Le suc du *Terminalia benzoïn*, qui appartient à la même famille, paroît fournir le véritable benjoin. (Voyez TERMINALIA.)

5°. Les GROSILLÈRES. Toutes les plantes de cette famille le rapportent plutôt à l'hygiène qu'à la matière médicale. Toutes, ou presque toutes, ont des baies très-aqueuses, douces dans quelques-unes, aromatiques dans quelques autres, & qui sont employées en général pour former des boissons rafraîchissantes. Les fruits du *calis* font exception; ils sont stimulant & toniques; ce qui dépend de la présence d'un organe particulier à cette plante.

6°. Les CAPRIFOLIACÉES. Les caprifoliacées offrent moins aux botanistes une seule famille de plantes, que l'assemblage de plusieurs groupes qui se trouvent réunis par certaines alliances. Les écorces de toutes les plantes de cette famille sont astringentes: celle du *Cornus florida* est employée comme fébrifuge aux États-Unis. L'écorce du *Cornus sericea* a été aussi substituée au quinquina. Les sureaux, qui forment un des principaux groupes dont nous venons de parler, se distinguent par l'odeur de leurs fleurs, qui sont fœtidiques, & par la propriété émetique & purgative de leur liber & de leurs feuilles. La racine du *Triosteum perfoliatum* a des propriétés purgatives, & provoque aussi le vomissement quand elle est donnée à dose un peu forte.

7°. Les CORMUSIÈRES. L'amertume que l'on observe dans toutes les plantes de cette famille, y prend un caractère particulier, ce qui s'explique par la combinaison du principe amer avec un principe résineux; combinaison qui présente de nombreuses variétés & des anomalies assez frappantes, parmi les genres de cette famille; ainsi, dans un grand nombre de corymbifères, la résine est en faible quantité, & le principe amer ou astringent, très-développé: ce qui donne des propriétés toniques, bien connues dans le *Tussilago farfara*, la *Camomille*, l'*Inule*, la *Verge d'or*, la *Matricaria parthenium*.

Si la proportion de résine augmente, les plantes de la même famille deviendront beaucoup plus stimulant: les unes, comme les *Tanaisies*, les *Santolines*, seront employées comme vermifuges; les autres, comme les *Matricaires*, les *Armoises*, serviront comme emménagogues; enfin, plusieurs autres seront regardées comme fœtidiques ou comme diurétiques.

L'*Eupatorium* du Brésil, plus connu sous le nom d'*Ayapan*, le *Guaco* ou *Huaco* du Pérou, & quelques autres corymbifères, ont été regardés comme des alexitères puissants; opinion qui ne paroît toutefois établie que sur des traditions populaires & très-incertaines.

8°. CUCURBITACÉES. Les plantes de cette famille, qui fournissent un assez grand nombre de resour-

ces à l'hygiène & à la matière médicale, nous offrent d'ailleurs de nombreuses anomalies. Les *Courges*, les *Concombres*, les *Momordiques* & même les *Papayers*, qui appartiennent à cette famille, donnent tous des fruits dont la chair est pulpeuse, donc, toujours rafraîchissante, & ordinairement agréable au goût.

La coloquinte, l'*Elaterium*, le *Trichosanthes amara*, donnent au contraire des fruits très-amers, qui ont des propriétés drastiques & émetiques; ce qui dépend d'un principe résineux qui se retrouve en petite quantité dans le melon, dans les citrouilles, que l'on a vu devenir purgatives à fortes doses. Les graines de la plupart des cucurbitacées ont des propriétés calmantes. Ce que l'on appelle les quatre semences froides, appartiennent même à cette famille. Leurs racines ont une saveur anère & une action purgative très-développée, dans les Bryonées & dans le *Momordica elaterium*.

9°. La famille des ERICINÉES présente surtout à la matière médicale l'*Uva-ursi*, & quelques plantes analogues, auxquelles on avoit si ridiculement attribué des propriétés lithontriptiques.

Les baies de presque toutes les éricinées à fruit charnu, servent comme aliments dans plusieurs pays, mais principalement les baies du *Symphelic Richei*, dont les fruits ont servi seuls de nourriture au célèbre voyageur & naturaliste Riche, dans une longue & pénible expédition. On ne sauroit parcourir l'histoire des éricinées, sans se rappeler ce qui concerne les fleurs du *Asclepias pontica*, dont le nectar rend le miel très-sucré; particularité que nous retrouvons dans Xénophon, qui rapporte que plusieurs soldats ayant mangé de ce miel, près de Trébisonde, en devinrent très-malades.

Les *Rhododendron*, qui appartiennent à la même famille, fournissent des poisons & des médicaments. (Voyez RHODODENDRON & RHODORACIÉES.)

10°. Les ERISACÉES. Les fruits des plantes de cette famille sont employés comme aliment dans plusieurs pays. Ils sont tous remarquables par une saveur acerbe avant leur maturité, & ne deviennent mangeables que lorsqu'ils commencent à subir l'espèce de décomposition qui leur a fait donner, par le vulgaire, le nom de blets ou blêches (1).

L'écorce de quelques plantes de la même famille est astringente & tonique. Les *Syrax*, ou *Alibouffiers*, qui appartiennent à la même famille, fournissent le benjoin & le storax, qui sont composés de résine & d'acide benzoïque. (Voyez STORAX & SYTRAX.)

11°. Les APOCINÉES. On peut dire en général des apocinées, qu'elles sont acres, stimulant, astringentes & même vénéneuses, lorsque ces propriétés sont portées à l'excès: Plusieurs racines de ces

(1) Parmi les fruits susceptibles de devenir blêms, se trouvent les nêfles; les sorbes, les poires, & tous les fruits des familles à ovaire adhérent.

plantes sont employées dans divers pays, à la place de l'ipécacuanha.

L'infusion de la racine de *Asclepias decumbens* excite la perspiration générale, sans augmenter la chaleur; ce qui l'a fait employer en Virginie, dans le traitement de certaines pleurésies. Le suc des apocinées est laiteux, acre, plus ou moins caustique. On trouve cependant, & par une exception fort extraordinaire dans la même famille, l'*Asclepias lactifera*, dont le suc laiteux est si abondant & si doux, que les Indiens l'emploient comme aliment.

12°. Les GENTIANÉES. Toutes les plantes de cette famille ont une saveur amère qui a principalement son siège dans la racine. Elles nous offrent un grand nombre de médicaments employés tantôt comme toniques, tantôt comme fébrifuges; parmi les indigènes, nous trouvons les *Gentiana amarella*, *G. campestris*, *G. cruciata*, *G. Chlora perfoliata*, *menianthes trifoliata*. (Voyez MÉRIANTHE.)

Parmi les plantes exotiques de la même famille, on cite la *Gentiana peruviana*, la *Chironia angularis*, la *Fraseria Walteri*, &c.

La racine des gentianées, malgré son amertume, contient assez abondamment de la matière sucrée, & peut fournir de l'eau-de-vie; ce qui fait exploiter sous ce rapport la gentiane jaune dans quelques parties de la Suisse.

13°. Les CONVOLVULACÉES. Les racines de presque toutes les plantes de ce genre, sont remplies d'un suc laiteux dont la propriété purgative est très-développée dans les liférons en général, dans la *Scammonée* en particulier, dans le *jakup*. (Voy. SCAMMONÉE.)

Cette propriété purgative des convolvulacées, qui se trouve plus marquée dans les liférons, est due à une résine que contient le suc de la plante, & qu'il est convenable d'administrer séparément, pour ne pas s'exposer à aucun mécompte dans son usage.

La racine du *Convolvulus edulis* est employée à la Chine comme aliment, & le *Convolvulus batatas* en Amérique. (Voyez TOPINAMBOUR.)

14°. BORRAGINÉES. La plupart des plantes de cette famille contiennent un macilage très-abondant, tantôt dans les feuilles, tantôt dans les racines; quelquefois narcotique, comme dans le *Cynoglossum*, quelquefois mêlé à du nitre, comme dans la Buirache.

Plusieurs espèces de bourrache servent comme aliment dans différentes contrées.

15°. Les LARIXES. Aucun groupe de plantes ne mérite mieux d'être regardé comme une famille naturelle; nulle autre aussi ne présente un accord aussi parfait entre ses propriétés & les formes extérieures des plantes qui le composent. Le principe amer & le principe aromatique se trouvent du reste combinés dans les labiées, suivant différentes proportions qui en forment tantôt des stimulans faibles ou des stimulans énergiques, des toniques fixes ou des toniques dissolubles. Leur saveur & leur

MÉDECINE. Tome X.

odeur, qui se conservent dans les infusions, dans les décoctions, dans les eaux distillées, sont dues à un principe gomme-résineux plus ou moins abondant. (Voyez MÉLISSE, ORIGAN, SARRIETTE, SAGE, SCORONUM, SERPOLLET & TRYX.)

Gaubius d'abord, & Proust ensuite, ont prouvé que le camphre existe dans les sauges, la lavande, & probablement dans toutes les huiles essentielles des labiées.

16°. Les LAURINÉES. Cette famille est peu nombreuse. Tous les arbres qui lui appartiennent exhalent, dans leurs différentes parties, mais principalement dans l'écorce, une odeur très-remarquable.

Les plantes les plus actives de cette famille, sont le CANNELIER (*Laurus cassia*), le L. CASSIA (*Cassia lignea*) (Voyez SURINAM (Bois de)), le L. PARVIFOLIA (Voyez PICURAM (Fève de)), le L. CULORARI (Bois cannelle de l'île-de-France), le L. BENJOIN, le L. NOBILIS, originaire d'Europe; enfin le L. SASSAPARA. (Voyez SASSAPARA.)

On trouve dans les Laurinées deux sortes d'huiles, l'huile fixe & l'huile volatile. Le camphre, qui est un des produits de cette même famille, se tire plus particulièrement de l'espèce connue sous le nom de *Laurus camphora*.

17°. ARISTOLOCHÉES. Les espèces du genre Aristoloches ont toutes des racines dont la saveur est amère, & qui peuvent être employées comme toniques; quelques-unes ont été vantées comme des spécifiques contre les effets de la morsure des serpents en Amérique (l'*Aristolochia serpentaria*, & l'*A. anguicida*); elles ont quelquefois agi comme purgatives. Ces dernières propriétés se retrouvent dans l'*Asarum Europæum*, qui a une vertu éméétique assez prononcée, quand la racine de cette plante est fraîche.

18°. EUPHORBACÉES. Presque toutes les plantes de cette famille renferment un suc propre & laiteux très-âcre, qui agit comme rubéfiant à l'extérieur & comme purgatif drastique, ou comme éméétique à l'intérieur. On croit ce suc de nature gomme-résineuse. On attribue les effets purgatifs à la résine, qui, moins oxygénée, & par cela même plus rapprochée des huiles essentielles dans quelques plantes de la même famille, amène une sorte d'exception remarquable pour la Cascaille, le *Croton aromaticum*, le *C. balsamicum*.

Quelques plantes de la famille des Euphorbiacées sont plus âcres, plus irritantes que les autres.

Le manihot, que l'on appelle aussi manioc (*Jatropha manihot*), qui appartient à la même famille, contient dans ses racines une très-grande quantité de fécule, & perd les propriétés par la cuisson. La gomme Éthiopie ou le *Canot-choue*, se retire d'une euphorbiacée, de l'*Hevea guyanensis*, & on en retrouve quelques traces dans quelques plantes de la même famille.

La graine des euphorbes n'est guère moins irritante que le suc des tiges: ce qui doit être at-

T 11

tribué seulement à l'embryon, qui a beaucoup d'activité, tandis que le péricarpe est rempli d'une huile très-douce.

19. Les ANGIACÉES. Dans toutes les plantes de cette famille, l'écorce contient un principe astringent qui les a fait employer quelquefois comme fébrifuges (1). L'épée de Ilyx que l'on retire du *Liquidambar Orientalis* est regardée comme un antispasmodique. Les fruits de presque toutes les plantes de cette famille contiennent une grande quantité de fécula, qui, dans plusieurs, se trouve mêlée avec une quantité plus ou moins considérable d'huile fixe. La plupart de ces fruits peuvent servir à la nourriture de l'homme (ceux du châtaignier, du chêne ballote, du chêne à feuilles rondes).

20. COSMÉTÉES. Le suc des plantes des cosmétées, répand une odeur particulière assez semblable dans toutes les espèces à celle qu'exhalent les térébenthines. Le Genévrier (*Juniperus*), qui appartient à cette famille, doit sans doute à la résine aromatique, qui donne cette odeur, les heureux effets qu'il produit lorsqu'il est bien administré, dans tous les cas où il convient de faire cesser certains catarrhes chroniques, en changeant le mode d'action de la membrane muqueuse, gastro-pulmonaire, & en réprimant la sécrétion trop abondante dont elle est le siège. Ce genre de propriété du genévrier lui est commun avec la plupart des autres plantes de la même famille, & avec toutes les plantes qui fournissent la substance que nous désignons sous le nom de térébenthines & de baumes, d'huiles volatiles résineuses (la poix, le goudron, la térébenthine de Venise, les baumes de copahu, du Pérou, du Canada, &c.). Mes observations particulières, sur l'esprit de genièvre, me portent à le regarder comme le moyen le plus généralement convenable, pour réprimer la sécrétion morbide & surabondante de la membrane gastro-pulmonaire, d'où résulte le plus grand nombre de catarrhes chroniques de la poitrine, non inflammatoires. (Voyez Térébenthine, Térébenthine.)

Les graines des cosmétées, lorsqu'elles sont enveloppées dans une baie, participent aux propriétés générales de l'écorce. Quelques-unes peuvent être mangées, lorsqu'elles ne sont pas coquilles depuis long-temps, & qu'on les a préservées avec soin du contact de l'air chaud.

La classe des MOSCOTYLÉDONES, beaucoup moins étendue que la précédente, n'a présenté à M. de Candoille que vingt-cinq familles, dans lesquelles on peut trouver, avec plus ou moins d'étendue, des preuves & des exemples des rapports des propriétés médicales, avec les caractères botaniques & les formes extérieures. Les racines & les tiges, dans les monocotylédones, con-

tiennent une grande quantité de mucilage, & les graines une fécula très-abondante, tantôt pure ou presque pure, & tantôt combinée avec d'autres substances. Fourcroy a remarqué du ressu que leurs fruits ne donnent pas d'huile fixe; que le *Caout-chouc*, le *Saber*, peut-être le *Camphre* & le *Tanin*, n'y ont pas été découverts jusqu'à ce jour.

Les familles naturelles de cette classe, sur lesquelles nous allons appeler en ce moment l'attention de nos lecteurs, sont les suivantes: les AROÏDES, les ORCHIDÉES, les DRYMYRHIDÉES, les LILIACÉES, les AMARYLLIDÉES, les LILIACÉES, les COLONCACÉES, les CÉRIFACÉES, les GRAMINÉES, les FOTOGÉES, &c.

1. Les AROÏDES. Les racines des aroïdes sont épaisses & charnues. On peut les employer comme aliment, après en avoir dégagé, ou par le lavage, ou par la trituration, le principe acro ou résineux qui s'y trouve allié avec la fécula. Ce même principe acro & stimulant ne parait pas dépourvu de propriétés médicales. Les Indiens de Démétrici se servent des feuilles fraîches du *Dioscorea purpureum* pour exciter une vétilation légère & universelle, qui a paru être utile dans certains hydropiques. La racine de l'*Arum triphyllum*, cuite dans le lait, lui donne une légère écreté, qui parait convenir dans le cas de certains atones des organes de la digestion. (Voyez Pied-de-veau, ZOSTÉES.)

2. Les ORCHIDÉES. Les racines des plantes, dans cette famille, présentent une telle uniformité dans leurs propriétés, qu'elles sont presque toutes employées indifféremment les unes pour les autres. On en tire le *SALAP* ou *SALAP*, qui est plutôt employé comme nourriture que comme médicament. Le genre VANILLE, qui appartient à cette famille, doit sa faveur particulière à la pulpe charnue de son fruit, qui n'existe que dans les espèces de ce genre. (Voyez ORCHIDÉES, SALAP, VANILLE.)

3. Les DRYMYRHIDÉES. Le Gingembre, le Galanga, le Curcuma, la Zédaire, &c., qui appartiennent à cette famille, offrent des assaisonnements ou des condiments très-recherchés. En général toutes les racines sont aromatiques, ainsi que l'indiquent les noms: elles contiennent une quantité plus ou moins considérable d'huile volatile, que l'on peut extraire par la distillation, & qui est très-rare dans les monocotylédones.

Cette odeur & cette faveur aromatique ont fait supposer de grandes propriétés médicales à plusieurs genres de la famille des drymyrhidées; ainsi, à Madagascar, on regarda comme un alexitère la racine de *Lampyrum majus* & *minus*; ce qui est attribué par divers auteurs à plusieurs plantes de la même famille qui croissent dans leurs pays.

La fécula, qui est contenue très-abondamment dans la racine, n'a guère été extraite que dans les genres où l'arôme est faible. La fécula connue sous le nom d'*Arrow-root*, si justement estimée au-

(1) Principalement les écorces du *Pinus*, du *Coumar*, du *Bouillon*, de presque tous les *Santal*, &c.

jourd'hui, appartient à l'un de ces genres, le *Marrubium indicum*. (Voyez Arrow-Root.)

4°. Les LAIBERS. Les racines, dans quelques genres de cette famille, agissent comme de légers stimulans, & , grâce à leur odeur de violette, elles peuvent être employées comme des masticatoires très-agréables. *Lilium tuberosum*, *Lilium vesiculosum*, *Lilium verna*, ont des propriétés purgatives. Le *Crocus*, qui appartient à la même famille, fait une forte exception par la saveur & par la propriété stimulante de ses stigmates. (Voyez Polychroite & Safran.)

5°. AMARYLLIDÉES. Des rapports très-remarquables existent entre les plantes de cette famille & les plantes de la famille des LILIACÉES. Leur bulbe renferme en général une petite quantité de fécula, qui se trouve réunie à un extrait gommeux, analogue à celui qu'on retire de la feuille, très-développé, suivant M. Loiseleur, dans les *Narcissus tazetta*, *odoratus* & *Pseudo-Narcissus*, & que l'on retrouve sans doute aussi dans le *Narcissus* des Anciens, qui étoit employé comme émétique.

6°. LILIACÉES. Les liliacées présentent plusieurs groupes, que l'on peut regarder comme autant de familles distinctes. Les ASPAROAGÉES forment un de ces groupes qui fournit des aliments & des médicaments, tous remarquables par l'odeur fétide & particulière qu'ils donnent à l'urine. Quelques asparagées sont beaucoup plus actives, le *Dracena terminalis*, qui est employé comme diaphorétique, le *Medeola virginica*, dont l'effet diurétique est très-prononcé. Les plantes d'un autre groupe de la même famille (le groupe des TAILLIACÉES), dont les racines excitent le vomissement. Un autre groupe, celui des ASPARAGELLÉES, est remarquable par les bulbes, qui contiennent d'un côté la fécula, & d'un autre côté un suc amer, gommeux-résineux, très-excitant. Les plantes dans lesquelles ce dernier principe est très-développé se rapprochent des COLCHICACÉES & sont très-actives, comme on le voit pour la *Scilla maritima*, les AULX en général, l'ALOUX. (Voyez SCILLE.)

Toutes les espèces de l'un de ces genres (aux) peuvent être substituées les unes aux autres, soit comme condimens, soit comme aliments, & la plante, réduite si célèbre par Homère, sous le nom de *moly*, appartient à ce genre.

7°. COLCHICACÉES. Les propriétés vénéneuses que l'on attribue aux différentes parties des plantes de cette famille, sont beaucoup plus développées dans les racines des colchiques & des vétaires, surtout pour la colchique, à l'époque du printemps & lorsque la plante est en feuilles. La fécula se trouve d'ailleurs réunie au principe acre & irritant dans les racines des colchicacées. Les feuilles, les semences des plantes de la même famille, participent plus ou moins aux propriétés qui sont si développées dans les racines.

8°. CYPÉRACÉES. Dans les plantes de cette fa-

mille, les racines, qui seules intéressent le médecin, sont rangées parmi les diaphorétiques, & présentent quelques modifications dans le genre des Souchets. Dans le *Cyperus esculentus* on trouve des tubercules qui présentent, comme dans la pomme de terre, des réservoirs de mucilage & de fécula. (Voyez ce mot.)

9°. LES GRAMINÉES. Cette famille, une des plus étendues, ne renferme aucune espèce vénéneuse. Toutes les parties ou presque toutes les parties des plantes qui lui appartiennent, présentent des propriétés nutritives, qui sont plus particulièrement développées dans les graines. Toutes les céréales, par exemple, sont employées ou peuvent être employées comme aliments, ou servir à préparer des boissons fermentées : ainsi on prépare la bière, tantôt avec l'orge, tantôt avec le froment; l'eau-de-vie, tantôt avec le riz, tantôt avec les semences de nos céréales. L'ivraie lui-même ne fait point exception, & diffère très-peu du froment, lorsque ce dernier a été trop exposé à l'humidité. La propriété excitante de l'avoine ne fait pas davantage exception, parce qu'elle ne dépend pas du périsperme de cette plante, qui ne diffère point de celui des autres GRAMINÉES, mais de l'enveloppe du grain, dans laquelle on trouve un principe aromatique analogue à la vanille.

Cette explication fait comprendre d'ailleurs combien il importe d'employer l'avoine mondée ou non mondée, suivant les indications que l'on veut remplir par son usage. La science rend également compte de l'anomalie qui semble se mouvoir dans le seigle ergoté. (Voyez SEIGLE.)

Les tiges des graminées n'offrent pas moins d'ailleurs de similitude que leurs semences, & renferment toutes, avant leur floraison, une quantité plus ou moins grande de mucilage sucré. Les racines des mêmes plantes, que l'on pourroit regarder comme des tiges souterraines, sont en général employées pour préparer des boissons émollientes & mucilagineuses.

Les tiges de l'*Andropogon schœnanthus*, les feuilles de l'*Andropogon nardus* & de l'*Anthoxanthum odoratum*, exhalent une odeur aromatique & jouissent de quelques propriétés toniques & cordiales, qui font seules exception à l'uniformité que présente la famille des graminées.

10°. FOUGÈRES. Les feuilles d'un grand nombre d'espèces, appartenant à cette famille, sont employées indifféremment sous le nom de *capillaires*, pour préparer des boissons assez peu efficaces. Le principe aromatique de ces plantes est beaucoup plus développé dans le *Polypodium calaguala* du Pérou. (Voyez ce mot.) Les fougères souterraines de nos fougères, improprement appelées racines, sont toutes remarquables par leur saveur aigre, qui les fait employer comme anthelmintiques (le *Polypodium filix mas* & le *Pteris aquilina*; l'*Qsmunda regalis*).

Tta

Les familles renfermées dans cette classe présentent, relativement aux propriétés médicales, des exceptions plus importantes & plus nombreuses que les plantes des familles précédentes. Les LICHENS, qui appartiennent à cette classe, ont des propriétés médicinales qui dépendent d'un principe plus ou moins amer, dans une substance mucilagineuse, & qui paroissent beaucoup plus développées dans les espèces dont la consistance est plus molle : plusieurs sont employées comme alimenes & comme médicaments ; tels sont la *Physcia Islandia*, toutes les *Scyphophores*, la *Rocella tinctoria*, la *Peltigera aphota* & la *Peltigera canina*.

Les champignons, qui appartiennent à la même classe, contiennent des poisons, des médicaments & des alimenes. On ne trouve d'ailleurs d'espèces comestibles que dans les genres HELVELLE, CLAVAIER, HYDNE, BOLET, MÉRULE, AGARIC, MORILLE & TARTRE. (Voy. ces deux derniers mots.)

Les FRALLONS, qui l'on avoit long-temps confondus dans le même genre que les morilles, sont vénéneux, fétides, ce qui est principalement dû à la volva qui enveloppe les jeunes phallus, & au liquide gluant qui recouvre leur chapeau. (Voyez FRALLONS.)

Parmi les Helvelles, les Hydnes, les Mérules, &c., on ne prend pour comestibles que les espèces qui sont charnues, & on abandonne celles qui sont gélatineuses ou coriaces, sans les regarder comme vénéneuses. On peut dire d'une manière générale que les anomalies, dans les champignons, se réduisent aux champignons à chapeaux bien distincts ; anomalies qui s'expliquent & qui disparaissent en quelque sorte par l'anatomie de ces champignons. L'hymenium, ou la partie du chapeau qui porte les graines, & qui forme des feuillets dans les agarics, est la partie la plus éminemment vénéneuse ; il suffit de l'enlever, lorsque cette opération est facile, pour diminuer de beaucoup l'acreté de la plante ; c'est ce que les cuisiniers appellent *ôter le fein du champignon*. La couleur bleue ou verte de ces champignons, lorsqu'on les coupe, appartient à toute la famille ; ce qui indique toujours des champignons suspects lorsqu'elle est très-développée.

Les Bolets, c'est-à-dire les champignons dont le chapeau présente des tubes ou des pores à la surface inférieure, sont mangeables, excepté dans les espèces qui présentent à un haut degré cette couleur bleue, ou qui ont un pédicule muni d'un callier, ainsi que les espèces dont la saveur est peivree. Les champignons qui n'offrent pas ces motifs d'exclusion sont :

1^o. Les POLYPORES. (Voyez ce mot.)

2^o. Les SOILLES. (Voyez ce mot.)

3^o. Les FISTULINES.

Parmi ces dernières, ou bolets à tubes libres, on ne compte qu'une seule-espèce qui soit comestible : le *Boletus hepaticus* (*Hypodiscus* des anciens auteurs de matière médicale, *foie de bœuf*, *langue de bœuf*, en langage vulgaire).

Les AGARICS ou champignons feuilletés en dessous, présentent une conformité remarquable entre leurs propriétés & leurs dispositions extérieures. On ne connoît aucune exception aux qualités vénéneuses dans plusieurs sections de ce genre, tels que les *Pleuropes*, les *Rotules*, les *Russules*, les *Omphalies*, &c. (Voyez ces mots.) En général, malgré tout le bien que l'on a dit de l'*Agaricus deliciosus*, de l'*A. subdulcis*, de l'*A. piperatus*, il est si facile de les confondre avec les agarics éminemment vénéneux, qu'il est plus prudent de les abandonner. On ne cite, d'une autre part, aucune espèce vénéneuse parmi les PRATELLES (voyez ce mot), qui soit aussi connue sous le nom de *paturons* (ou *Champignons de couche*). On ne cite pas également une seule espèce vénéneuse dans le groupe des GYMNES, qui présentent un grand nombre d'agarics comestibles très-employés ; l'*Agaricus albellus* (Mousseron blanc ou Champignon muscat), l'*A. eburneus*, l'*A. ericetorum*, l'*A. virgineus*, l'*A. auricula*, &c. &c.

Les LAPIOTES ne renferment également que des espèces salubres. Les Agarics mania de volva, les AMANITES rompent cette régularité, & nous offrent dans un même genre, les champignons les plus salubres ; l'Orange & la Coccoumelle, & les Champignons les plus vénéneux, l'*Agaricus bulbosus*, l'*A. muscarius*. (Voyez ONOSES.)

Quant aux autres Champignons, les diversités de leurs propriétés présentent un rapport assez marqué avec la division des genres ou des sections. Il importe même d'observer, en terminant cet article, que toutes les plantes de cette famille contiennent, dans différentes proportions, une matière particulière éminemment comestible ; la Fongine de M. Braconnot, qui fait la base de leur substance, & dont le mélange avec différentes matières, détermine les propriétés salubres ou nuisibles des différentes espèces. Ajoutons que d'après cette découverte il est probable que l'on parviendra, par différentes préparations, à faire servir indifféremment tous les champignons à la nourriture de l'homme.

LES ALGUES. Parmi les plantes de cette famille, aucune ne paroît vénéneuse, & toutes jouissent de propriétés hygroscopiques très-remarquables ; plusieurs fournissent des alimenes, tels sont les différentes espèces d'Ulves (voyez ce mot), le genre des Cérâmines. Ce dernier le distingue par les propriétés vermifuges, qui se retrouvent aussi dans quelques Fucus, tel que le *Fucus helminthocorton*. (Voyez MOUSSE DE CORSE.)

(MORSAU DE LA SARTHE.)

NATURELLES (Sciences). On donne aujourd'hui

ce nom à toute la portion de la physique particulière qui n'est pas du ressort des sciences mathématiques & physico-mathématiques.

M. le professeur Cuvier comprend en configuration sous cette dénomination, la chimie, l'histoire naturelle, les diverses branches & les sciences naturelles appliquées à la médecine humaine, à la médecine vétérinaire & à l'agriculture (1).

On s'est occupé de différentes parties des sciences naturelles, & de leur application à diverses parties de la médecine dans ce Dictionnaire. (Voyez *ATA*, *ATMOSPHERE*, *MÉDICALES* (Sciences), *MÉTÉOROLOGIE*, *NATURELLES* (Familles), *PLANTES*.)

(L. J. M.)

NATURISME. (*Philosophie médicale.* *Histoire de la médecine.*) Ce mot, qu'il ne faut pas confondre avec le mot *naturalisme*, ainsi qu'on l'a fait dans le *Dictionnaire des sciences médicales*, indique, en la considérant comme un système, la doctrine ou l'opinion des médecins qui préconisent la nature pour guide, dans l'observation & dans le traitement des maladies. Le naturisme est rationnel & pratique, lorsqu'il ne fait pas rejeter l'usage des médicaments dans le traitement des maladies, & qu'il se borne à imposer la loi d'étudier avec soin les phénomènes organiques, en procédant par indication & non *a priori*; méthode qui peut seule convenir aussi long-temps que la physiologie ne sera pas encore assez avancée pour donner des bases à la nosographie & à la thérapeutique. (Voyez *NATURE*.)

Le naturisme est exclusif & spéculatif, lorsque les médecins qui l'adoptent, se trouvant entraînés par des dispositions affectives & des habitudes contemplatives, ne se bornent pas à personifier le principe d'action vitale, mais lui attribuent des fonctions, des opérations & une sagesse admirable dans les vues & dans les desseins. (Voyez *NATURALISTES*.) (L. J. M.)

NATURALISTES. (*Médecine.* *Histoire de la médecine.* *Philosophie médicale.*) Borden a, je crois, employé le premier, ce titre de naturalistes, pour désigner & caractériser, en les rangeant dans une catégorie particulière, les médecins qui s'attachent à un empirisme philosophique, & qui font profession de s'en rapporter à la nature, comme à un guide & à un modèle dans l'observation & dans le traitement des maladies.

« Curieux de remonter à la connaissance des premières causes, qui sont la vie, les médecins naturalistes, dit cet ingénieux auteur, se contentent d'une histoire exacte de chaque maladie : ils en suivent & en observent la marche sans prétendre la déranger lorsqu'elle parcourt ses périodes & ses degrés avec précision ; ils se contentent d'ef-

fayer de la ramener à sa marche naturelle lorsqu'elle parolt s'en écarter.

« C'est ainsi que, pour toute physiologie, ils s'en tiennent à l'histoire de la vie & de ses phénomènes, à celle des tempéramens & des révolutions propres aux divers âges & aux deux sexes, sans remonter jusqu'aux principes élémentaires des corps, sans essayer de pénétrer leur structure intime, sans comparer les lois que le corps humain suit dans ses fonctions, aux lois générales du mouvement, ou à celles des machines particulières connues des physiciens. »

Les naturalistes par excellence portèrent jusqu'à l'exagération l'idée d'une nature qui veille sans cesse à la conservation du corps, & qui, dans les cas où sa vigilance se trouve en défaut, le ranime & combat les causes de la maladie par lesquelles elle s'est laissée surprendre avec plus ou moins de violence & d'énergie.

Stahl fut véritablement le chef des naturalistes, ou plutôt des ultra-naturalistes, qui furent essentiellement expédiateurs : médecins auxquels la science est redevable de plusieurs observations fort importantes sur les maladies, & d'aperçus très-ingénieux sur différents points très-délicats & très-élevés de physiologie & de pathologie. (Voyez *NATURE*, *STAHL*, *STABLENSIS*.) (L. J. M.)

NATUS (Pierre.) (*Biographie médicale.*) Ce médecin appartient au grand siècle. On lui doit quelques ouvrages de botanique, & Haller lui attribue les deux écrits suivans :

Phytologica Observatio, de malo limonio citrato vulgo Biturini. Florent., 1674, in-4°.

Intorno alla natura del Pepone. Fiorenza, 1676, in-12. (L. J. M.)

NAUCHIE (Guyon-Dolois, fleur de la) (*Biographie médic.*), exerçoit la médecine à Uzès en Limousin, vers la fin du seizième siècle. On lui doit le *Miroir de la beauté en santé corporelle*. Limoges, 1594, 2 vol. in-8° (1).

Discours sur deux fontaines minérales d'Encausse en Gascogne. Limoges, 1595, 1 vol. in-8° (L. J. M.)

NAUDÉ (Gabriel) (*Biographie médicale*), né à Paris en 1600, fit les premières études dans une communauté religieuse, & passa de là dans l'Université de cette ville, où il s'appliqua avec un zèle tout particulier à la philosophie, puis ensuite à la médecine. Il fut successivement bibliothécaire des cardinaux Bagny & Antoine Barberin à Rome, puis du cardinal Mazarin, qui lui donna un canonicat de Verdun, & le prieuré de l'artignac en Limousin. Naudé fut reçu docteur en médecine à Padoue, devint par la suite le médecin de Louis XIII,

(1) Voyez le Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles en France, depuis 1789, & sur leur état actuel.

(1) Ce premier ouvrage de Nauchie a été commenté par Meyssonnier, & a eu plusieurs éditions : la dernière parut à Lyon en 1673.

& se rendit, après l'éloignement de Mazarin, auprès de la reine Christine de Suède, qui l'avoit fait appeler à la cour. Son retour à Paris fut néanmoins très-prochain ; car l'air du pays n'étant point favorable à la santé, il fut obligé de revenir dans cette ville, malgré les témoignages publics d'estime & de bonté dont cette princesse ne cessoit de le combler. Naudé mourut à Abbeville, le 29 juillet 1653, âgé seulement de cinquante-trois ans.

Ce médecin joignoit à une critique habile des mœurs pures, une vie réglée, beaucoup d'esprit, d'érudition & de jugement (1). Plus littérateur que médecin, Naudé a laissé des preuves de son goût dans quelques-uns de ses ouvrages, dont voici les titres :

Apologie pour les grands personnages fausement soupçonnés de magie. Paris, 1625, 1628, 1669 (2).

Avis pour dresser une bibliothèque. Paris, 1627, in-12 ; 1644, in-8°.

Bibliographia politica, Lugd. Batav., 1632, in-16. Traduite en français par Chablain.

De antiquitate & dignitate Scholæ medicæ Parisiensis. Paris, 1628, in-8°.

Syntagma de Studio liberali, 1632, in-4°.

Syntagma de Studio militari. Romæ, 1637, in-12.

Panagæricus dictus Urbano VIII, 1644, 1663.

Pentastichonum Jatrotophilogorum, 1647.

Epistolæ, carmina, 1667, in-12.

(*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NAUSÉABOND, adj. (*Pathologie*.) On désigne ainsi, les corps, les substances, dont l'odeur ou la saveur excite les nausées ; ce qui est bien remarquable dans certaines plantes vireuses, dans les substances animales putréfiées, dans le produit de certaines sécrétions morbides ou non morbides, de certaines exhalaisons, &c. &c. Une odeur nauséabonde bien caractérisée est celle qui se répand dans la chambre des nouvelles accouchées, lorsque la membrane caduque commence à se détacher & à faire partie des lochies. (*Voyez NAUSÉE, ODEUR.*) (L. J. N.)

NAUSÉE, f. f., *nausea*, en grec *ναυα*, de *ναυς*, vaisseau, mot à mot, le genre de vomissement que produit le roulis du vaisseau : ce qui a été pris ensuite dans une acception plus étendue. (*Voyez VOMISSEMENT.*) (L. J. M.)

NAVALE. (*Hygiène*.) On désigne sous ce nom cette grande division de l'hygiène spéciale ou particulière, qui a pour objet de conserver la santé

des marins, & d'écarter ou d'affaiblir, autant qu'il est possible, les causes accidentelles d'insalubrité ou de maladies auxquelles les navigateurs sont exposés. Les objets que l'hygiène navale embrasse, sont variés & nombreux ; l'homme de mer le trouvant exposé, dans les longues expéditions, à une foule de dangers & d'accidens dont une surveillance active & éclairée peut affaiblir ou détourner l'influence. (*Voyez MEX (Homme de), NAVIGATION, &c.*)

On chercheroit à peine dans les ouvrages des Anciens, & même dans les écrits des Modernes, avant le dix-huitième siècle, quelques traits d'hygiène qui appartiennent à l'hygiène navale ; on pourroit même dire que pendant long-temps, la navigation, déjà si dangereuse par elle-même, nous présente dans ses annales, l'histoire de plusieurs calamités qu'il faut bien plutôt attribuer à la routine ou à la négligence, qu'à des causes d'insalubrité nécessaires & inévitables.

Les expéditions mémorables du seizième, du dix-septième, & même du dix-huitième siècle, nous offrent en particulier plusieurs exemples à l'appui de cette assertion ; tels sont le Voyage de Valco de Gama aux Indes orientales, & celui de l'amiral Anson autour du monde. Les appareillages les plus redoutables du scorbut ont appartenu, comme on fait, à ces expéditions : cette maladie le manifesta sur le *Centurion*, l'un des vaisseaux de la flotte du lord Anson, après avoir passé le détroit de Le Maire ; elle avoit commencé en doublant le cap de Horn. La longueur du voyage, les fatigues, la tristesse, augmentèrent beaucoup cette maladie ; vers la fin d'avril, tout l'équipage en étoit attaqué. Dans le courant de ce mois, le *Centurion* perdit quarante-trois hommes ; il en perit le double dans le mois de mai, quoiqu'on eût navigé vers le nord. Vers la mi-juin, deux cents hommes avoient succombé ; le reste étoit si malade que l'on comptoit à peine six hommes par quart en état de servir. Le scorbut acquit une telle intensité que les ulcères furent compliqués de carie ; ceux qui étoient guéris depuis long-temps le rouvrirent, &c. &c. Il continua d'exercer les ravages dans la mer Pacifique. Le temps devint plus beau ; le lord Anson croisa pendant quinze jours à la hauteur de l'île de Socoro ; il se détermina, ne voyant paroître aucun des autres vaisseaux, à relâcher à l'île Juan-Fernandez ; mais il la dépassa à l'est, & vit la terre du Chili : cette circonstance jeta le découragement parmi les malades, qui craignoient de rester long-temps à la mer.

Le manque d'eau douce commença à se faire sentir ; le calme & les vents contraires empêchèrent de voir la terre avant le 9 juin. Depuis le 28 mai jusqu'à ce jour, il périt à bord du *Centurion* soixante-dix à quatre-vingts hommes, qu'on eût peut-être sauvés si on eût rencontré l'île dans la première bordée. On eut vainement pour gagner le mouillage : à peine y avoit-il assez de monde

(1) Bayle & Lancelotti ont recueilli différents traits de la vie & des penées de Naudé, sous le titre de *NAUDÆANA PATRIANA*. Paris, 1701, & Amsterdam, 1703. Cette dernière édition a été considérablement augmentée.

(2) Reimpresion de Hollande en 1715. C'est le plus connu des ouvrages de Naudé : on y voit combien ce médecin étoit ennemi des préjugés.

pour orienter le vaisseau, qui, en passant le détroit de Le Maire, trois mois auparavant, avait tout son équipage bien portant. En mettant les malades à terre il en périt, dans la chaloupe, douze qui ne purent supporter le transport & l'exposition à l'air. On trouva dans cette rade le *fluop le Tryal*, qui avait perdu trente-trois hommes du scorbut, tout le reste de son équipage étoit sur les cadres, le capitaine, le lieutenant & trois matelots exceptés.

Depuis un mois le *Gloucester*, autre vaisseau de la même flotte, luyvoyoit sans pouvoir gagner le mouillage : il y vint enfin, & mit à terre quatre-vingt scorbutiques. La mortalité avait fait des ravages affreux sur ce vaisseau : il mourut peu des malades qu'il mit à terre ; ils se rétablirent même plutôt que ne l'avoient fait ceux du *Centurion*.

Au mois de septembre 1741, le *Centurion* avait perdu, depuis l'Angleterre, deux cent quatre-vingt-douze hommes ; il lui en restoit deux cent quatorze. Le *Gloucester* en perdit autant ; il ne lui en resta que quatre-vingt-deux. Sur le *Tryal*, qui avait été presque toujours sous l'eau, il périt quarante-deux hommes, trente-neuf se rétablirent ; mais il faut observer que ce bâtiment n'avait que des matelots, point de soldats, encore moins des invalides. A bord du *Centurion*, il y avait cinquante invalides, parmi lesquels les officiers & seulement quatre soldats réchappèrent. Sur sixante-dix-neuf soldats, on ne put en sauver que onze. Sur le *Gloucester*, tous les invalides périrent ; & de quarante-huit soldats, deux seulement survécurent, &c.

Lorsque l'escadre quitta l'île Juan-Fernandez, le 17 septembre 1741, les équipages jouissoient d'une bonne santé ; ils étoient augmentés de celui de la *Pucque*, qu'on avait coulée. Elle fit plusieurs prises, pilla Patia, & relâcha à Quibo, après avoir essuyé du calme, de la pluie & une chaleur étouffante au passage de la ligne, en eignant vers le nord. On fit de l'eau & du bois à Quibo ; on y prit assez de tortues pour s'en-nourrir entièrement pendant un mois. Le calme & la pluie firent beaucoup souffrir les équipages, qui commençoient à s'attrister de n'avoir aucune connoissance du *Gallion*, qu'ils attendoient dans ces parages. Il y avait quatre mois que l'escadre avait quitté Quibo, lorsqu'elle relâcha à Chéquetau, où elle prit de l'eau, du bois, quelques tortues, du poisson, mais fort peu de linas. On reprit la mer : bientôt la scorbut se manifesta à bord des vaisseaux ; il sévit fortement, malgré la douceur du climat & l'abondance de l'eau douce & des provisions fraîches de toute espèce portées à Païu. Cependant on nettoyoit soigneusement les vaisseaux ; mais le temps émit très-pluvieux, la maladie devint plus fâcheuse. Les vaisseaux essuyèrent une tempête affreuse ; le *Gloucester* démolit ; il sauta beaucoup d'eau ; on en retira les vivres & l'équipage. En transportant ses malades, au nombre de soixante-dix, il en mourut quatre en montant à bord du *Centurion*.

Le scorbut faisoit les plus horribles ravages ; chaque jour il périssoit huit à dix malades, & il en tombait de nouveaux. Il en mourut vingt-un sur le *Centurion* la veille de l'arrivée de ce vaisseau à l'île de Tiaian, où il mouilla, n'ayant en tout que soixante-onze hommes en état de servir, quoiqu'il eût grossi son équipage de ceux du *Tryal* & du *Gloucester* (1).

Lind, qui partage avec notre Duhamel la gloire d'avoir attiré le premier l'attention sur l'hygiène navale, ne craint pas d'avancer qu'il fût difficile de braver certaines routines, & de suivre avec activité & confiance un petit nombre de préceptes & de réglemens sanitaires, pour conserver la santé des hommes de mer. Il ne craint pas d'attribuer les maladies qui s'étoient montrées récemment sur les vaisseaux du Roi, à l'attachement opiniâtre & absurde des chefs ou des subordonnés pour des réglemens gothiques & des coutumes surannées (2).

La navigation en temps de paix, & lorsqu'elle n'avait pas pour objet la traite des nègres, n'est pas exposée sans doute à des causes d'insalubrité aussi graves, & n'exige pas aussi impérieusement pour l'homme de mer, la protection ou la surveillance de la civilisation la plus avancée ; toutefois, & même dans la circonstance d'une navigation moins étendue, une hygiène navale, combinée & appliquée d'après l'état présent des connoissances, présente les plus grands avantages, & amène la condition de l'homme de mer à devenir beaucoup moins insalubre que plusieurs professions sédentaires moins dangereuses en apparence.

Nous tâcherons de résumer sous les titres suivans, & en les resserrant, autant qu'il nous sera possible, les considérations & les faits qui appartiennent à cette hygiène.

S. 1^{re}. État, composition des équipages.

La composition de l'équipage, on pour parler le langage des écoles, le sujet de l'hygiène navale, est un des premiers objets que l'on doit avoir en vue dans cette hygiène, surtout pour les voyages de long cours. Tous les médecins qui le sont occupés de cette importante question, recommandent de se faire entrer dans cette composition que les sujets les mieux appropriés à un service maritime, de ne recevoir en particulier que des hommes dont la bonne santé a été constatée, de préférer les habitans des côtes, & s'il est possible, les personnes qui ont déjà navigué, &c., &c.

L'institution du corps des canoniers-matelots en France offroit de grands avantages sous ce rapport de la composition des équipages, surtout lorsqu'on avait le soin de le recruter avec des hommes choisis dans les départemens maritimes, que l'on

(1) Voyage du lord Anson autour du Monde.

(2) Lind, *Essai sur les moyens les plus propres à conserver la santé des gens de mer*, 1 vol. 8^{vo}, 1756, Pref., p. 12, 13 & 161.

devoit passer successivement sur les bâtimens stationnaires & sur les caboteurs, avant de les exercer aux grandes manœuvres des navires de haut-bord. Une disposition contraire a donné lieu plusieurs fois aux maladies les plus graves : ainsi, lorsque, dans l'an 2 de la république, on entassa indistinctement sur plusieurs vaisseaux un grand nombre de jeunes gens de la réquisition, sans avoir égard à leurs habitudes antérieures, le nombre des malades devint considérable. A bord du vaisseau *l'Aiglon*, en particulier, plusieurs de ces jeunes gens, qui avoient été habitués aux travaux agricoles, ne purent se plier à leur nouvel état. Ils étoient presque toujours dans leur hamac ou sur les lits des malades, dit M. Pallois, auquel nous empruntons cette remarque; ils furent les premiers & presque les seuls atteints du scorbut dans la grande croisière d'Irlande & dans la traversée de Brél à Toulon.

On trouve chez les Anglais, surtout pour les voyages de long cours, dans les Indes orientales & dans les Indes occidentales, des coutumes bien plus saines, relativement à la composition des équipages, & que Lind a signalées comme une des causes les plus nuisibles à la prospérité navale. On fait entrer dans la composition de ces équipages, soit par la *presse*, soit par le recrutement, soit par tout autre moyen, des hommes sains avec, pris au hasard dans les rues ou dans les prisons. L'auteur que nous venons de citer ne craint pas d'attribuer à ces hommes, souvent atteints de maladies, & réduits à un état de profonde altération par leur genre de vie, les épidémies qui se sont manifestées sur plusieurs flottes. Suivant Lind, le vaisseau, placé à quelque distance de Londres, & servant de dépôt pour les recrues de la marine, présente une disposition non moins défavorable. Une personne malsaine, des habits apportés des prisons de Newgate, ont occasionné plusieurs fois la fièvre carcéraire (typhus nosocomial), qui s'est même répandue, dans plusieurs circonstances, aux environs de Portsmouth & de Plymouth. Pour prévenir de pareils fléaux, & pour conserver les équipages, on ne sauroit trop multiplier les précautions au sujet de ces recrues, qu'il ne faudra admettre sur les vaisseaux, qu'après s'être assuré qu'ils ne pourront y apporter ni par eux-mêmes, ni par leurs vêtements, aucun germe de maladies.

L'usage d'acclimater les marins, également proposé par Lind, cet usage qui auroit pour objet de n'admettre dans les grandes expéditions que des hommes qui auroient déjà servi dans des croisières ou sur des équipages peu nombreux, offriroit sans doute de grands avantages. Du reste, quelle que soit la composition des équipages, les objets que doit embrasser l'hygiène navale se rapportent au régime sanitaire des vaisseaux & à la prophylactique particulière que peuvent exiger

les nouveaux climats ou les nouvelles contrées rencontrées par les navigateurs. (Voyez PROPYLACTIQUE NAVALE.)

S. II. Construction des vaisseaux.

Le bon état du vaisseau, la sècheresse des matériaux qui ont été employés dans la construction, le choix, la nature de ces matériaux, sont des objets non moins importants, pour la santé des marins, que l'heureuse exposition & l'excellence du sol & du territoire pour les habitants d'un pays quelconque. Ainsi, les vaisseaux construits avec les bois qui n'étoient pas très-sèches, ont occasionné plusieurs fois des maladies très-graves & entraîné la perte des équipages. Dans ces cas, & pour affaiblir les bâtimens sur lesquels de pareils défauts avoient eu lieu, il a fallu les laver à plusieurs reprises & allumer ensuite des feux pour les dessécher complètement. « Si nos vaisseaux, dit à ce sujet notre savant confrère M. Keraudren, font aujourd'hui moins insalubres, il faut attribuer cet avantage à la précaution de laisser leur membrure long-temps exposée à l'air libre avant de lui appliquer le bordage; il seroit par la même raison dangereux d'étendre de la peinture ou du goudron sur du bois encore humide. La méthode d'après laquelle on dispose les pièces de bois de construction par piles dans les arsenaux maritimes, paroît très-convenable au même auteur. Dans cet état, le bois se sèche, se conserve d'autant mieux, que l'on a ménagé dans l'intérieur des piles, des intervalles propres à favoriser l'introduction & la circulation de l'air. »

Les cloisons pleines qui se trouvent dans l'intérieur des navires, présentent de grands inconvénients lorsque le gros temps ou la trop grande humidité de l'atmosphère obligent de tenir toutes les ouvertures des vaisseaux fermées. L'auteur que nous venons de citer désireroit que l'on substituat, autant qu'il seroit possible, des soutes à claire-voie à ces cloisons pleines & solides. Ne pourroit-on pas encore, ajoute-t-il, pratiquer dans l'entrepont des écoutilles latérales pour tenir lieu de soupapes? ce seroit les ventouses les plus propres à livrer passage aux exhalaisons & aux vapeurs qui remplissent la cale & le faux-pont, où elles seroient immédiatement remplacées par un air plus frais & plus pur, qui y pénétreroit par les écoutilles principales.

La précaution de blanchir à la chaux la cale & le faux-pont paroît également très-utile à M. Keraudren, qui forme le vœu que cette opération, que l'on pratique à l'époque de l'armement, pût être souvent renouvelée.

La carène du vaisseau, les différentes substances qui composent le lest, sont le plus souvent altérées par l'eau de la mer qui s'insère à travers les coutures du navire & se rassemble au fond de la cale. Dans cette circonstance, il se dégage des miasmes sou-

vent

vent très-nuisibles à une quantité assez considérable de gaz hydrogène sulfuré ou phosphoré. Il ne suffit point alors de pomper l'air qui fournit ces terribles émanations, il faut en outre détrempier & détruire, autant qu'il est possible, le sédiment noirâtre qui en est pénétré; travail qui devient beaucoup plus facile depuis l'époque où, suivant le vœu de Duhamel, on a eu le courage de laisser à la mer un passage dans l'intérieur d'un vaisseau, à l'aide de robinets que l'on ouvre ou que l'on ferme à volonté, suivant les besoins de l'équipage. Il importe d'ailleurs de ne point laisser à sec les parties des vaisseaux précédemment immergées, & d'appliquer à ce point de l'hygiène navale, tout ce que l'on a fait pour rendre les marais moins insalubres.

S. III. *Atmosphère (Renouvellement de l').*

Il faut distinguer dans l'atmosphère, dont les marins reçoivent l'influence, l'air intérieur du vaisseau, de l'air extérieur ou de l'air de la mer.

La température & l'état hygrométrique de l'air de la mer ne présentent aucune cause d'insalubrité. Les degrés de chaleur ou de froid que l'on éprouve en naviguant dans les expéditions qui n'ont pas une très-grande étendue, ne font pas en général extrêmes, & la température de l'Océan est beaucoup plus modérée qu'à terre dans les mêmes latitudes, parce que l'eau de mer réfléchit en moindre quantité les rayons solaires qu'à la surface du sol, & que le déplacement continu du vaisseau, dans sa translation, rafraîchit nécessairement l'atmosphère. La chaleur la plus accablante que l'on éprouve à bord, est justement attribuée à des vents qui ont traversé une terre échauffée & sablonneuse. En général, le marin a bien moins à craindre des excès d'une température abusive, que des vicissitudes continuelles de température qu'il éprouve en passant rapidement d'un climat dans un climat tout opposé. Aussi, dit M. Keraudren, auquel nous empruntons ces remarques, « un vaisseau parti d'Europe pendant la saison froide, arrive en peu de jours sous un ciel brûlant. Après avoir séjourné quelque temps dans les Antilles, il pourra encore trouver dans les ports de l'Amérique septentrionale, les frimats & les rigueurs de l'hiver. Il en est ainsi de ceux qui, après avoir traversé la zone torride, portent leurs recherches ou leurs entreprises jusqu'aux latitudes les plus froides de l'hémisphère austral. »

La température & l'état hygrométrique de l'air de la mer ne peuvent être comparés trop soigneusement, sous le rapport de l'hygiène, avec la température & l'état hygrométrique de l'air intérieur des vaisseaux. De Morogues a porté le premier l'attention sur ces objets de recherches. Il plaça deux thermomètres, l'un dans la cale aux vivres, regardée comme le lieu le plus chaud du navire, &

l'autre dans la grande chambre de la frégate, où personne ne couchoit, & dont les fenêtres demeuroient ouvertes. La température de la cale ne différoit sensiblement de celle de la grande chambre, ou de l'air extérieur, que lorsque l'écoutille étoit fermée.

La chaleur accablante que l'on éprouve dans la cale ne dépend sûrement pas, d'après ces expériences, d'une grande élévation de température, mais d'une altération très-nuisible de l'atmosphère. Rompe a fait aussi des observations qui confirment les recherches dont nous venons de parler, & qui prouvent évidemment que, sans ouvrir les sabords & les portes de la sainte-barbe, il est impossible de relier entre les poutres, sans éprouver une chaleur insupportable.

Les recherches plus récentes du Péron sur la corvette le *Géographe*, qui se rapprochent des faits que nous venons de citer, ont fourni les corollaires suivans.

1^o. La température de l'intérieur du vaisseau étoit en général de trois à quatre degrés plus haute que celle de l'air extérieur.

2^o. La différence de température entre la sainte-barbe & l'entrepont étoit à peine d'un degré, lorsque, par l'ouverture des sabords & l'application des manches à vent, on a soin d'entretenir un courant salutaire dans la sainte-barbe.

3^o. Toutes choses égales d'ailleurs, la cale d'un vaisseau est la partie la plus chaude (1).

L'air n'est pas beaucoup plus humide sur mer que sur terre. Mais il n'en est pas ainsi de l'air intérieur du vaisseau; pourtant l'humidité y manifeste sa présence, & la source la plus abondante, se trouve pas seulement dans les salissures, soit végétales, soit animales, qui versent continuellement des vapeurs dans le navire ou dans l'eau qui découle des futailles & se rassemble au fond de la cale; elle vient encore des particules salines (de l'hy chlorate de soude ou de chaux) dont les vêtements des marins ou les différentes parties du vaisseau sont pénétrés, & qui attirent continuellement l'humidité. Voici à ce sujet le résultat véritablement instructif des expériences de Péron.

1^o. L'humidité est habituellement plus forte dans le vaisseau qu'à l'air libre.

2^o. La différence entre l'humidité de l'atmosphère & celle de l'intérieur du navire a été souvent jusqu'à dix & douze degrés.

3^o. Toutes choses égales d'ailleurs, l'entrepont étoit plus humide que la sainte-barbe, ce que l'auteur attribue aux inondations funelles que l'on fait-ici chaque jour dans l'entrepont, tandis que la sainte-barbe se nettoyoit à l'air, le voisinage des poudres s'opposant à l'introduction de l'eau dans cet endroit.

(1) Voyez *Annales maritimes & coloniales* de 1810, pag. 236 de la 1^{re} partie.

4°. La cale est à la fois le lieu le plus chaud, le plus humide & le plus insalubre.

Un grand nombre de maladies sont justement attribuées à l'humidité de l'air intérieur des vaisseaux (les affections catarrhales de toute espèce, tels que rhumes, dysenteries, diarrhées, &c.) les rhumatismes, le scorbut, les hydropisies générales ou partielles, les engorgemens des articulations).

Un des objets principaux de l'hygiène navale d'être sans doute dirigé vers les moyens qui peuvent combattre une cause aussi active de maladies. Le défaut d'activité, une espèce de repos forcé à la mer, rendent d'ailleurs les effets de l'humidité beaucoup plus dangereux. Les capitaines expérimentés qui ont fait cette remarque, ne se bornent pas aux mouvemens nécessaires pour la manœuvre; ils forcent leurs équipages à une activité constante, plus particulièrement dans la rade, où ils les occupent à divers travaux, tels que l'exercice du canot, le maniement des armes, les simulacres d'abordage.

L'humidité froide est surtout très-dangereuse & a souvent occasionné des maladies qui se font manifestes avec le caractère d'épidémie très-désastreuse, ce qui arrive surtout lorsque les matelots se sont livrés pendant le gros temps à des fatigues excessives, & sont forcés de travailler à même de se coucher avec des vêtements humides. Cette humidité froide a toujours été placée parmi les causes qui ont pu contribuer davantage aux développemens du scorbut dans un grand nombre d'expéditions célèbres; & lors même qu'elle n'agit pas d'une manière aussi désastreuse, les maladies qu'elle a souvent occasionnées aux Anglais, pendant leurs croisières prolongées dans la Manche, ont été assez graves ou assez nombreuses, pour les forcer à quitter ces croisières, soit par l'affaiblissement, soit par le découragement des équipages.

Linné, Ruyter, Cook, Vancouver, en ont noté tous les navigateurs qui ont écrit avec distinction sur la médecine navale, se sont accordés pour reconnaître l'humidité comme une des causes qui rendent la profession de l'homme de mer plus insalubre, & pour recommander de la combattre par tous les moyens que l'industrie & la sagesse peuvent suggérer. Tous se sont réunis pour recommander de sécher le navire par l'action du feu, de gratter, de balayer sans laver, de sabler, de fumer le faux-pont & l'entrepont, d'essuyer, de frotter avec l'éponge les parois antérieures du bâtiment & tous les objets qui renferme : précautions qui furent prises avec tout de soins par Cook dans son deuxième voyage, & qui ont été si fortement recommandées en France par l'ordonnance de 1766.

Le renouvellement, la désinfection de l'air intérieur des vaisseaux, ne font pas d'ailleurs moins importants que les précautions les plus judicieu-

sement prises contre l'humidité. Personne avant de Morogues, dit M. Paillos, n'avait donné à cet objet une attention suffisante. Ce savant, si recommandable, fit connaître le premier, par des expériences exactes, que la chaleur insupportable de la cale dont nous venons de parler, dépend bien moins d'une augmentation réelle de température que de l'altération de l'atmosphère.

L'air intérieur de cette partie du vaisseau forme une espèce d'atmosphère épaisse autour des personnes qui s'y trouvent plongées, & l'on éprouve souvent, dans un pareil milieu, une sensation de fadour tout-à-fait incommode & qui fait quelquefois tomber en syncope.

L'air de l'entrepont présente aussi des caractères d'altération manifeste; il s'en élève une vapeur chaude & infecte, que l'on sent très-bien, surtout la nuit, en passant près des écoutilles.

La respiration & l'exhalation cutanée des hommes qui y couchent, le mélange des vapeurs qui s'élèvent de la cale, de l'eau de la fontaine, dont la corruption est perdue d'autant plus loin, que l'on pompe moins souvent (ce qui a lieu dans les bâtimens qui font peu d'eau), les émanations infectes du corps des malades, de la matière de leurs excréations, celles qui s'élèvent des habits mouillés, quand, dans les temps pluvieux, les matelots n'ont pas soin de se changer, & viennent se coucher avec leurs vêtements humides; enfin l'humidité que laisse l'eau qui, dans les gros temps, embarque par les sabords, ou par les écoutilles, & celle qui exhale, à bord de quelques vaisseaux neufs, du bois qui entre dans leur construction, &c. : telles sont en général les causes qui altèrent la pureté de l'air de l'entrepont.

Un état de débilité, l'affaiblissement des organes de la digestion, les fièvres gastriques, adynamiques; quelquefois des fièvres intermittentes de mauvais caractère, telles sont les maladies qui dépendent le plus ordinairement des altérations de l'air de l'intérieur des vaisseaux.

Cette altération de l'air a souvent été augmentée, & de manière à devenir funeste, dans les traversées difficiles & lorsque l'on étoit forcé de tenir le vaisseau souvent fermé; dans les expéditions très-longues, & très-périlleuses; ou à bord de vaisseaux surchargés & encombrés, aussi qu'il est arrivé si souvent pour la traite des nègres.

La ventilation est un des moyens que l'on emploie avec le plus d'efficacité pour lutter avec avantage contre des circonstances aussi funestes.

Le ventilateur connu sous le nom de *manche à vent*, est assez généralement employé dans la marine française. C'est un grand tuyau légèrement courbé, fait de toile à voile, dont le canal est maintenu dilaté par des corbeaux placés de distance en distance. Sa partie supérieure, évasée & fendue en forme de peule, suivant sa longueur, est dirigée vers le lit du vent. La manche est suspendue à l'un des mâts; & sa partie inférieure

descend par une échelle dans la cale ou dans l'entrepont. L'air extérieur se jette dans ce tuyau avec d'autant plus de vitesse, que le vent est plus fort; & que l'air dans lequel plonge la partie inférieure est plus rare & plus dilaté par diverses causes. On reproche à la manche à vent de ne pouvoir servir dans les temps calmes, si quand il vente trop frais, de porter dans l'entrepont un air dense & froid, dont le contact brusque sur la peau de ceux qui y sont exposés (surtout si l'on s'en sert la nuit), supprime la transpiration, peut donner lieu à diverses maladies. Il existe encore un autre inconvénient dans cette machine, qu'elle partage avec les autres ventilateurs, & dont nous parlerons après avoir examiné celui de Hales.

Le ventilateur de Hales a sur la manche à vent, des avantages bien démontrés & les expériences faites par de Moragues, sur la frégate qu'il commandait, prouvent qu'à l'aide de cette machine on peut, en très-pen de temps, renouveler un grand volume d'air; qu'elle s'exige, pour être mise en jeu, ni un travail pénible, ni le concours d'un grand nombre de personnes. On peut aussi, en faisant brûler du soufre, des substances aromatiques, vis-à-vis les pompes aspirantes du ventilateur, porter ces vapeurs dans le lieu que l'on veut désinfecter, & au bout d'un certain temps, les remplacer par l'air extérieur. On peut se servir du ventilateur dans les calmes comme dans les tempêtes; mais ce moyen, très-utile quand il s'agit seulement de renouveler l'air, est comme la manche à vent & les moyens imaginés par Sutton, Dubamel, &c., insuffisant quand il faut corriger son humidité & élever la température.

D'après les rapproches faits au ventilateur de Hales, d'énumérer la vaisseau par son volume, & d'exiger, pour être employé, un certain travail, en a imaginé de faire servir au renouvellement de l'air de la cale & de l'entrepont, cette propriété qu'a l'air dilaté par la chaleur, d'être facilement déplacé par un air plus dense & plus pesant. Dubamel en France (1), & Sutton en Angleterre (2), s'occupèrent en même temps, & à l'insu l'un de l'autre, de recherches sur cet objet.

Pour atteindre ce but, Sutton s'est servi des cuisines en usage pour les bâtiments anglais. Ce sont des espèces de poêles qui ne reçoivent l'air nécessaire à la combustion, que par une ouverture pratiquée à la partie inférieure d'un de leurs côtés; il fit ajuster à cette ouverture, un tuyau de tôle qui, d'abord simple, le bifurquait bientôt après sous de ses branches descendait dans la cale & l'autre dans l'entrepont. L'air de ces deux endroits devoit enfler d'autant plus rapidement ces

tuyaux pour aller servir à la combustion, que le feu étoit plus vif; l'air extérieur trouvant moins de résistance, se précipitoit dans la cale & dans l'entrepont pour remplacer celui qui avoit été enflé par la combustion; &c. Ce moyen n'est pas applicable aux bâtiments français, dont les cuisines sont autrement construites, & à bord desquels on se brûle que du bois. Dubamel proposa de faire mettre sous le foyer des cuisines, un coffre qui seroit recouvert d'une sorte plaque de fer; d'y faire aboutir un tuyau qui peut descendre dans la cale, & de faire partir de ce même coffre un autre tuyau carré, le plus large qu'il seroit possible, que l'on placeroit dans l'épaisseur de la cloison qui sépare la cuisine de l'état-major, de celle de l'équipage. L'expérience n'a point confirmé l'efficacité présumée de ces deux moyens, beaucoup trop faibles pour rencontrer convenablement l'air de la cale & de l'entrepont.

Les avantages que présentent les différentes espèces de ventilateurs, ont d'ailleurs, suivant M. Keraudren, plusieurs inconvénients qui les rendent bien incommodes dans la pratique. La manche à vent dont nous venons de parler, qui doit être quelquefois très-utile, ne peut que devenir nuisible dans les temps très-humides. On ne peut s'en servir lorsque le vent souffle avec trop de force, & elle est absolument inutile pendant la calme. Ces espèces de troubles doivent d'ailleurs avoir assez de fréquence pour qu'il soit possible d'en porter les extrémités dans les toutes & dans tous les lieux profonds. Le poêle en potin ou en fer fondu, présenté par M. Porfait, & décrit dans le *Dictionnaire de Marine de l'Encyclopédie méthodique*, produit un effet bien inférieur au ventilateur à soufflet de Hales.

Le fourneau ventilateur de Woettig (1), paroit devoir remplir, suivant M. Keraudren, toutes les indications relatives au renouvellement de l'air sur les vaisseaux. Il agit par lui-même, & son effet constant doit être plus considérable que celui des autres ventilateurs (2).

On a fait souvent aussi usage d'une ignition momentanée, dans l'intention d'affaiblir l'atmosphère des vaisseaux. Une ou deux fois la semaine, dit Cook à ce sujet, on devoit le vaisseau avec des feux que l'on descendoit au fond du puits, ce qui servoit beaucoup à purifier l'air des parties basses du bâtiment. On le sert, pour de semblables ignitions, d'un bois-téger qui s'incinère plutôt que de laisser un résidu charbonneux.

Les fumigations avec le chlore, avec l'acide hydrochlorique ou l'acide nitrique, trouvent souvent leur application à bord, & dans toutes les circonstances où il y a encombrement. Les fumi-

(1) Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux.

(2) Sutton's new method of extracting the foul air out of ships, &c.

(1) *Annales de médecine politique* de Kopp, tome 2^e.

(2) Voyez, pour la description & le dessin de ce fourneau ventilateur, le Mémoire de M. Keraudren, sur les causes des maladies des marins, pages 8, 9 & 103.

gations d'acide sulfureux sont aussi employées avec avantage pour désinfecter les habillemens ou pour purifier les parties du vaisseau qui ne sont pas habitées. L'altération qui se manifeste au fond de la cale, & par l'effet de l'eau, qui tient en dissolution différentes substances végétales ou animales, présente beaucoup d'analogie avec l'insalubrité marécageuse, & doit être combattue de la même manière. Ainsi il ne suffit pas, comme nous l'avons déjà indiqué, de pomper cette eau vaseuse, il faut encore détrempier le sédiment noirâtre qu'elle a déposé, & recouvrir d'une nappe d'eau fraîche, le lieu précédemment immergé, soit pour arrêter, soit pour dissoudre les matières détectées qui sont susceptibles de se volatiliser. D'une autre part, il seroit bien dangereux d'insérer des lavages trop fréquens dans les vaisseaux, & de ne pas combattre avec courage la rouille de quelques anciens cliffiers, qui sont inonder chaque jour les vaisseaux avec l'eau de mer.

Le procédé pour le dégagement du chlore & des acides hydrochlorique & nitrique, n'offre rien de particulier relativement à l'hygiène navale. (Voyez MURIATIQUE, NITRIQUE, SULFURIQUE (Acides), POKIFICATION.)

Nous remarquons seulement que les lieux fournis à la désinfection, doivent être préalablement abandonnés par les personnes qui s'y trouvoient. M. Keraudren pense avec raison, que ces procédés de désinfection seroient tout-à-fait inutiles dans le cas d'une épidémie occasionnée par le froid humide, ou par les vicissitudes de chaleur & de froid dans l'atmosphère. On doit d'ailleurs employer les fumigations avec le chlore ou l'acide hydrochlorique, avec d'autant plus de réserve, que les vapeurs ont l'inconvénient grave, suivant l'auteur que nous venons de citer, de déposer une humidité considérable sur les corps qui les arrêtent.

Plusieurs météores qui s'observent plus particulièrement à la mer, mériteroient peut-être d'attirer quelque attention sous le rapport de l'hygiène navale : tels sont les aurores boréales, le feu Saint-Elme, la phosphorescence des eaux, les trombes marines, &c.

Le feu Saint-Elme, que les Anciens attribuoient, dès le temps d'Homère, aux dieux diocuriens, & qui, dans l'état présent des connoissances, est rapporté à l'électricité, se présente aux marins comme un signe du plus heureux présage. Il pourroit, relativement à cette opinion, devenir très-utile dans certains cas, pour un capitaine de navire qui sauroit en tirer parti au besoin, pour remonter les esprits découragés.

La phosphorescence des eaux de la mer, qui fixa l'attention de l'abbé Nollet, au commencement du siècle dernier, est généralement attribuée à une propriété particulière de certains insectes & de certains mollusques.

Les trombes aqueuses qui se trouvent accompagnées de phénomènes électriques, sans en dépendre d'une manière directe & positive, deviennent très-redoutables dans plusieurs circonstances. On est parvenu quelquefois à prévenir leurs effets les plus sinistres, par des décharges de canons assez fortes pour rompre la colonne avant qu'elle fût arrivée jusqu'au vaisseau, qu'elle auroit pu submerger : malheur qui fut sur le point d'arriver à Cook sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

L'état de l'atmosphère, comparé à la pleine mer & sur les côtes, l'air particulier des plages où l'on peut relâcher accidentellement, le lieu du mouillage, l'effet du flux & du reflux, présentent aussi, sous le point de vue de l'hygiène navale, des considérations qui doivent nous arrêter quelques instans. Il est bien connu, en général, que les vaisseaux, dans les croisières sur les côtes, ont beaucoup plus de malades qu'en pleine mer, & que des équipages qui n'ont point souffert d'une longue navigation, éprouvent tout-à-coup plusieurs maux, pendant une relâche momentanée, dans un lieu qui ne présente aucune cause d'insalubrité.

M. Keraudren recommande, dans les vues les plus éclairées, de prendre beaucoup de précautions lorsque l'on envoie les matelots à terre pour avoir de l'eau ou du bois; il veut qu'ils soient munis de tentes, qu'ils évitent de se coucher sur un sol humide, qu'ils entretiennent des feux allumés pendant la nuit, pour écarter les insectes.

Le même auteur fait remarquer aussi, qu'il est toujours nécessaire de se tenir à une distance convenable des côtes où régnent différentes épidémies : ce qui est conforme avec une remarque très-judicieuse de Pringle, & avec les observations que l'on a pu faire sur les opérations des Anglais dans l'Escaut, en 1809. Il est d'ailleurs constant que les malades guérissent plus facilement à bord que dans les hôpitaux des colonies.

D'après ces réflexions, il est évident que dans le choix d'un lieu pour le mouillage, on ne devrait pas seulement avoir égard à des considérations purement nautiques. Dans les climats brûlans, il sera toujours très-nécessaire d'éviter les mornes couverts de rochers, ou les vallons dans lesquels la chaleur se concentre. Il sera encore plus indispensable d'éviter, pour relâcher, les plages marécageuses & les terrains couverts d'eau stagnante. Si l'on se trouveoit contraint d'être placé dans l'atmosphère d'un lieu aussi insalubre, on devroit munir le vaisseau de manière qu'il présente le côté au vent. Dans cette situation, dit M. Keraudren, les sabords étant fermés, les vapeurs malfaisantes passent par-dessus le bord sans s'y arrêter; tandis que lorsqu'on est mouillé le vent en proue, toutes les émanations que fournit la terre voisine, pénètrent dans le vaisseau, parcourent les ponts d'une extrémité à l'autre, & peuvent produire sur l'équipage une impression pernicieuse. Enfin, à

l'on ne pouvoit mettre en travers, il resteroit encore une ressource, celle de masquer l'avant du vaisseau par des voiles telles que la *Civadière*, la *Misaine*, &c., pour opposer une barrière aux vapeurs qu'exhaleroit le rivage. (M. Keraudren, *Op. cit.*, pag. 70.)

La réunion de la plupart des hommes de l'équipage, qui se trouvent presque tous couchés en même temps, lorsque le vaisseau est à l'ancre, occasionne un véritable encombrement, & peut contribuer au développement du typhus naval, pendant certains mouillages. Les stations dans les rades, dans les climats très-chauds, sous les zones équatoriales, par exemple, mais surtout lorsque l'humidité se joint à la chaleur, comme il arrive entre les tropiques, occasionne, d'une autre part, au grand nombre de maladies. Sous le souffle brûlant des vents qui frappent les animaux de suffocation, les vaisseaux doivent avoir leurs sabords fermés du côté qui regarde la terre; dans les lieux où la brise souffle du côté de la mer, il faut exécuter une disposition contraire.

M. Keraudren, que nous ne pouvons citer trop souvent dans cet article, est persuadé que pendant le séjour des équipages dans les climats chauds, il seroit utile d'appareiller de temps en temps pour lodooyer à quelque distance du mouillage : mesure qui pourroit être plus facilement prise par des bâtiments légers ou de moyenne force, telles que des corvettes ou des frégates. (*Op. cit.*, pag. 74.)

Ces vaisseaux présentent, sous ce rapport, de grands avantages, & on les préférera, en temps de paix, pour les stations dans les colonies, aux vaisseaux de ligne, & avec d'autant plus de raison, que souvent on a observé que les équipages en sont bien moins atteints dans les grandes épidémies des flottes, les hommes s'y trouvant moins entassés, & l'air y circulant avec beaucoup plus de facilité.

§. IV. *Alimens, digestion.*

Alimens, boissons, assaisonnemens. La nourriture des équipages à la mer, est un des principaux objets de l'hygiène navale. Les viandes salées, le fromage, le beurre, différentes huiles, le biscuit & quelques végétaux secs, fournissent le fond de cette nourriture. On y joint, suivant le degré d'indulgence ou de privation, & d'après des motifs particuliers, des farines pour confectionner le pain frais, des provisions de légumes conservés avec des lits de sel, le *sawer-kout* (*choucroute*), des tablettes de bouillon, de la gélatine, ce que les Anglais ont appelé *soupe portative*; préparation dont l'introduction dans le régime alimentaire des marins, a été proclamée par Lind, comme un bienfait du gouvernement.

Le bœuf, le cochon, la morue, sont les principales substances animales dont on approvisionne les navires. L'altération du bœuf salé est toujours

fort à craindre, surtout lorsque l'on s'avance vers des climats très-chauds. Il importe du reste de ne point embarquer de nonvœux des salaisons qui ont déjà fait un voyage.

Le cochon salé se conserve mieux que le bœuf; la morue n'offre pas le même avantage; elle se détériore promptement, & il seroit à désirer que la provision de cet aliment fût consommée dans les premiers temps. On a sans doute exagéré, dans plusieurs circonstances, les mauvais effets attribués aux viandes salées, sur la santé des matelots. Ces effets, dit à ce sujet Poissonnier, n'étoient-ils pas plutôt produits par l'altération de ces substances alimentaires, que par des qualités inhérentes à leur nature? On a, à ce sujet, des faits à opposer à des faits, car on a vu des équipages entiers, conserver une santé parfaite, quoiqu'ils eussent fait un long usage de viandes salées. Il ne suffit pas que des alimens soient bons, soient sains quand on les embarque, il faut encore qu'ils ne perdent pas ces qualités dans les voyages de long cours. Y a-t-il quelqu'un qui ne convienne que le biscuit ne soit une nourriture très-saine? Quel désordre cependant n'a-t-il pas produit lorsqu'il a été atteint de quelque altération! La maladie terrible qui régna sur la flotte de M. le duc d'Anville, & à laquelle la biscuit gâté eut beaucoup de part, nous en fournit un exemple. Si les substances végétales peuvent avoir de pareils effets lorsqu'elles se dépravent, que ne doit-on pas craindre des substances animales!

Rien ne paroît donc plus essentiel pour maintenir la santé des matelots, qu'une scrupuleuse attention sur le choix & sur la conservation des alimens, dont on est forcé d'adopter l'usage sur mer. Les gens préposés pour cela dans les ports, ne seroient remplis leur devoir avec trop de fidélité & d'exactitude. La bonace ou mauvaise qualité des alimens dépend quelquefois de si peu de chose, que le moindre vélicement peut devenir très-préjudiciable. (Poissonnier, *Maladies des gens de mer.*)

L'usage de la viande salée, dans une trop grande proportion, offre d'autant plus d'inconvéniens, que l'on se trouve sous l'influence d'un climat plus chaud. La première chose que l'on doit avoir en vue, suivant Lind, dans les expéditions équatoriales, c'est de diminuer les provisions salées, article d'autant plus nécessaire, que l'on diminue à l'équipage la quantité d'eau : or, rien n'est plus déraisonnable que de boire moins d'eau en prenant la même quantité d'alimens; il n'en faut pas davantage pour causer des maladies scorbutiques & d'autres inconvéniens, que l'attention la plus légère de la part des ministres pourroit prévenir. Une autre remarque qui devoit engager à diminuer les salures, c'est que le sel marin, si propre à conserver les viandes dans nos climats, ne les préserve pas entièrement de la putréfaction dans les climats chauds; c'est ce qu'on voit évidemment par

les taches blanches que l'on remarque sur la graisse des viandes salées. On peut observer en partie à cet égard, en mettant un peu de nitre dans la saumure, car l'on fait que la force de ce sel augmente par la chaleur; mais comme cette considération est étrangère à mon sujet, je me contente de remarquer en général que la plus grande partie des maladies qui se font sentir dans les pays chauds, sont d'une nature putride, & par conséquent en ne sauroit durer trop d'attention à l'usage des viandes, qui, étant par elles-mêmes en germe fécond de putréfaction, ne peuvent que produire les maladies dont je parle.

« On pourroit citer bien des exemples en faveur de ce que je précéderai ici, touchant la nécessité de diminuer les provisions salées dans les vaisseaux destinés pour les Indes : un exemple connu de tout le monde pourroit suffire.

« Dans la dernière guerre, l'équipage du vaisseau le *Sheerness*, destiné pour les Indes orientales, craignant d'avancer les maladies, pria le capitaine de ne forcer personne à s'approvisionner de salures, mais de laisser à chacun la liberté de ne vivre que des autres denrées saines accordées par le Roi. Le capitaine *Pullifer* ordonna en conséquence qu'on ne feroit des viandes salées qu'une fois la semaine, & que cette salure seroit alternativement du bœuf & du porc. Le résultat de cette conduite fut que le vaisseau, arrivant au Cap de Bonne-Espérance, après cinq mois de navigation, n'avoit qu'un seul malade à bord. Il est vrai que le capitaine attribua la santé dont jouissoit son équipage, au ventilateur de M. Sutton, qu'on avoit embarqué; mais il n'avoit pas remarqué que ce ventilateur n'avoit produit aucun effet, les tuyaux se trouvant bouchés par la négligence du charpentier. Le *Sheerness* resta pendant quelques mois aux Indes, & personne, si l'on en excepte les gens de la chaloupe, ne mit pied à terre; cependant, tout le monde jouissoit d'une parfaite santé. Il est vrai que l'équipage se nourrissait pendant ce temps d'aliments frais & sains.

« Le vaisseau retournant ensuite au Cap de Bonne-Espérance, crut qu'il pouvoit faire usage impunément des viandes salées. Il faut remarquer que pendant tout le trajet, qui fut de dix semaines ou environ, on fit jurer le ventilateur de M. Sutton. Le résultat de cette conduite fut qu'en arrivant au Cap, il se trouvoit vingt personnes atteintes dangereusement du scorbut; mais les aliments qu'on leur fit prendre à terre, en débarquant, les rétablirent en peu de temps.

« Cet exemple frappant apprit à l'équipage, lorsqu'il quitta le Cap, à ne manger dans la route que le moins de viandes salées qu'il seroit possible. Le vaisseau arriva à Spithead, avec ses cent soixante-neuf hommes d'équipage, tous en parfaite santé, n'ayant perdu dans son voyage, qui fut de quatorze mois, qu'un seul homme, mort dans les

remèdes pour la maladie vénérienne. » (*Lettre, Moyens les plus propres à conserver la santé des gens de mer.*)

Les fromages de Gruyère & de Hollande sont, en général, préférés pour l'approvisionnement des vaisseaux, & on est assuré de leur conservation si l'on peut les tenir dans un lieu sec.

Le beurre salé, qui entre dans la provision des équipages, ne peut être conservé avec trop de soin, si on veut prévenir les inconvénients que produit son altération. Les autres corps gras ne sont pas moins altérables que le beurre. Cook & Vancouver regardent l'espèce de sémence grasseux que l'on recueille sur l'eau qui se forme à la cuisson des viandes salées, comme une des causes qui peut contribuer davantage au développement du scorbut.

Il importeroit beaucoup de s'embarquer pour les approvisionnements de l'huile d'olives récente & très-pure, quoique la matière verte inhérente à cette huile, dont elle relève le goût, passe pour la rendre plus altérable que les autres huiles.

Le biscuit, qui n'exige pas moins de soin que les salaisons, est un pain cuit deux fois, comme l'indique son nom. C'est, du reste, un pain à demi levé. Le meilleur, suivant un auteur que nous avons souvent cité dans cet article, est fait avec la farine de froment bien dépourvue du son, qui seroit des vides dans le biscuit & le disposeroit à la moisissure. Il faut le choisir récent, jaune, sonore, cassant net, & présentant dans sa cassure un brillant vitreux. Lorsqu'on le trempe dans l'eau, il doit se gonfler considérablement sans s'émietter ni gagner le fond du vase.

« On a proposé, pour faire le biscuit, de mêler à la farine du froment celle de seigle, de maïs, de pommes de terre, &c. Nous n'avons pas assez de faits pour prononcer d'une manière absolue sur les avantages ou les inconvénients de ces mélanges; cependant je suis porté à croire que la farine du froment doit être employée seule, & préférablement à toutes les autres, parce qu'elle est la seule aussi qui contienne les diverses substances amilacées, glutineuses, &c., dans les proportions qui la rendent si éminemment nourrissante.

« On a objecté que le peu de fermentation qu'on laissoit subir à la pâte destinée à faire le biscuit, rendoit cet aliment lourd & difficile à digérer. Pour parer en partie à cet inconvénient, on pourroit, comme l'a proposé Candou (du Havre), prendre du levain frais & du la farine à parties égales, du lieu de dix parties de farine sur une de levain, qui est la proportion ordinaire; tenir la pâte un peu plus molle pour la manier plus aisément; de reste, suivre le procédé ordinaire. Le biscuit ainsi préparé a été reconnu de très-bonne qualité.

« Le biscuit est sujet à éprouver diverses altérations à bord des vaisseaux. S'il est placé dans un

lieu humide, exposé au contact de l'air, il se ramollit, est disposé à moisir; divers insectes le rongent & y déposent leurs œufs. On détruit les insectes en passant le biscuit au four; mais s'il est humide, cette opération hâte sa moisissure. Le meilleur moyen de préserver le biscuit de l'humidité & des insectes, consiste à l'enfermer dans des futailles ou caisses bien sèches & exactement fermées. On pourra mettre dans les soutes celui qui devra être consommé dans les premiers mois de la campagne. » (Paillois, *Op. cit.*)

Le biscuit des Hollandais & des Russes est composé seulement avec la farine de seigle : on le regarde comme d'une qualité inférieure. On a fait avec la féculé de pommes de terre du biscuit assez bon. La préparation proposée par la Société royale de médecine, dans la réponse à M. le maréchal de Laffit, sur la nourriture des matelots; écrite par la Société pour objet de faire sécher du pain, de le réduire en poudre, & de le pétrir ensuite de nouveau pour en faire des galettes : elle a été essayée à Brest, & sans succès.

À bord des vaisseaux, lorsque le biscuit est altéré & que son usage peut occasionner des dysenteries, ou le soumet de nouveau à la chaleur du four pour le rendre moins nuisible. Franklin, pour éviter cette altération, proposa de doubler en étain les caisses dans lesquelles on embarque le biscuit ou la farine; & le capitaine King assure que cette expérience avait réussi sur les vaisseaux de Couk dans son dernier voyage.

Poissonnier recommande avec raison de n'employer que du biscuit bien salé, très-sec, récemment préparé, & de ne pas faire de trop grandes provisions. Malheureusement, d'après la remarque du même auteur, on n'a pas toujours suivi ces maximes en France; les farines & les biscuits se ressentent souvent du long séjour qu'ils ont fait dans nos magasins ou à bord des vaisseaux. Dans ce dernier cas, surtout, ces provisions ayant été retirées d'un vaisseau (après une campagne manquée) & étant embarquées de nouveau, se dépravent bien promptement lorsqu'on se rapproche des côtes chaudes d'Afrique; les matelots s'en débâtent, & s'ils sont forcés d'en manger, la dysenterie attaque bientôt tout l'équipage. (Paillois, *Op. cit.*)

Différens végétaux, les pois, les fèves, les haricots, les lentilles, &c., sont les légumes farineux secs, les plus employés à la mer. Il parait que l'on trouve quelque avantage à embarquer les haricots colorés plutôt que les blancs.

« Les provisions de farine de froment sont destinées à la confection du pain frais qui doit être servi sur la table de l'état-major, & distribué aux malades. On se donne, d'ailleurs, du pain frais à l'équipage que de temps en temps, & il seroit à désirer que l'on pût multiplier ces distributions. La consommation d'eau douce est peu considérable, puisqu'on se sert en grande partie d'eau de la mer

pour faire le pain : il ne faudroit pas beaucoup de bois de plus, puisque, comme l'a très-bien observé Poissonnier, le four étant chauffé pour une fournée, la dépense pour une seconde est très-médiocre, & moindre encore pour une troisième.

« On a proposé de mêler à la farine de froment celles des autres grains céréales. Nous répéterons ici ce que nous avons dit en faveur du biscuit, que nous ne pensons pas qu'aucune autre farine puisse suppléer ou remplacer celle de froment pour la mer. Dans les temps de disette, si l'on est forcé de faire ces mélanges, on embarquera ces diverses farines dans des futailles séparées, & un les mèlera au moment de faire le pain.

« La farine de froment, si elle n'est que grossièrement tamisée, & si on la garde dans des lieux chauds & humides, s'altère; elle s'échauffe, prend de l'odeur & ferment; elle devient moins propre à faire de bon pain. Il faut la choisir pure & bien tamisée, la faire passer à l'étuve avant de l'embarquer, & la placer à bord dans le lieu le plus sec.

« Pour les très-longes voyages, pour les stations de longue durée sur des côtes qui offrent peu de ressources, on pourroit, comme le fit la Peyronne, embarquer, au lieu de la farine, du froment passé à l'étuve : on le seroit mouliné à mesure qu'il faudroit faire du pain. Pour rendre celui-ci plus savoureux & plus nourrissant, on tamiserait la farine moins exactement que celle qu'on embarque pour la provision.

« Le sawer-krent & l'oseille confite sont au nombre des rafraichissemens nés sur nos vaisseaux. » (Paillois, *Op. cit.*)

Poissonnier, qui a si bien mérité de son pays par ses conseils sur l'hygiène navale, pense, avec raison, que l'on auroit d'ailleurs un grand avantage à réduire en grains plusieurs semences végétales qui sont parties des approvisionnements. (Les pois, les fèves, &c.)

Les légumes conservés avec soin par une demi-saison, & suivant le procédé recommandé par Lind, offriroient de grands avantages dans les longues expéditions. « Cette méthode, dit l'auteur, quoique simple, n'est pas moins efficace : elle n'a que l'inconvénient de ne pouvoir conserver une assez grande quantité de végétaux pour la consommation journalière de l'équipage; mais on en conservera suffisamment pour les cas de nécessité, & c'en est assez pour prendre la peine d'acquiescer ce que je vais prescrire.

« Le 5 de mars 1756, je pris des choux & des poireaux que je lavai bien, & que je fis sécher au feu; je coupai les poireaux de façon que chaque morceau pouvoit avoir environ six pouces de longueur; & quant aux choux, je me contentai d'en ôter les côtes. Je pris ensuite deux baquets de bois que je lavai bien avec de la saumure : les baquets étant secs, j'étendis dans le fond une couche

che légère de sel broyé, & sur cette couche je mis un lit de légumes, que je recouvris ensuite d'une légère couche de sel, & ainsi de suite jusqu'à ce que les baquets fussent pleins, l'un de choux & l'autre de poireaux. Je couvris chaque baquet d'une toile trempée deos une suite dissolution de sel, & sur le tout je mis des poids pour comprimer les légumes. Le 5 juin, trois mois environ après mon opération, je retirai une partie de mes poireaux; ils avoient parfaitement bien conservé l'odeur forte qui leur est particulière; j'en retirai tout le sel, en les laissant tremper dans de l'eau fraîche l'espace de dix minutes; après quoi je les fis cuire, & le goût de ces poireaux se trouva précisément le même que s'ils avoient été récemment cueillis. Les choux se trouvèrent parfaitement aussi verts, aussi tendres & aussi bons qu'ils eussent pu l'être avant cette opération, & ils ne retinrent aucun goût de saumure.

« Dans le temps que j'écris ceci, j'ai examiné des légumes préparés comme je viens de le dire, & qui le sont conservés pendant dix mois sans le moindre altération, soit dans le goût, la fraîcheur ou l'odeur. Je dois avouer qu'il faut préférer les vaisseaux de bois à ceux de terre, parce que ceux-ci se laissent pénétrer bientôt par le sel; ce qu'on remarque aisément à l'effluvescence qu'il forme sur les parois extérieures de ces sortes de vaisseaux. » (Linn, *Conservation de la santé des gens de mer.*)

Le *sawer-kroot*, lorsqu'on en fait des provisions elles abondantes, peut remplacer jusqu'à un certain point ces végétaux ainsi conservés par le procédé de Linn. Les substances végétales tenues à l'état frais, d'après la méthode de M. Appert, offriront aussi de grandes ressources à l'hygiène navale, en moins pour les malades, les convalescens & les passagers, qui, malgré la faiblesse habituelle de leur santé ou la délicatesse de leur organisation ou de leurs habitudes, sont forcés accidentellement de faire des voyages maritimes ou de longues traversées.

L'oseille contie est un très-bon assaisonnement & qui se conserve bien à la mer. Dubamel e conseille d'y mêler des poireaux.

Ce que les Anglais ont appelé *soupe portative*, dont Lind e proclamé les avantages, n'est autre chose qu'un extrait de viandes solides, une gelée de bœuf sans addition, à laquelle Poissonnier e proposé de faire quelques modifications qui le rendroient moins cher & plus facile à digérer. La gélatine préparée en grand & tirée des os, comme on fait le faire enjoud'hui, peut très-bien remplacer cette soupe portative & les tablettes de bouillon.

Les provisions de ce genre ont plus particulièrement pour but d'embarquer le plus petit nombre possible d'animaux, afin de s'opposer à l'encombrement qui résulterait d'une équipage plus ou moins nombreux. On embarque pour la table de

l'étoi-major, pour les malades & les convalescens; du sucre, du miel, des fruits, du résiné & différentes espèces de confitures.

Les précautions pour tenir ces différentes provisions à l'abri de l'humidité, ne peuvent être ni trop multipliées ni trop minutieuses.

Sur les vaisseaux de guerre, Poissonnier, qui a si bien senti la nécessité de cette conservation, voudrait que ces choses ne fussent embarquées qu'après tout ce qui constitue leur embaumement. Leur emplacement étant fini, rien n'empêcherait que cette opération ne se fît la dernière. A quel bon exposer ces substances au mauvais air du vaisseau long-temps avant son départ?

Il faudrait aussi n'embarquer les vivres que par un temps sec & beau. Par une conséquence difficile à croire, ajoute le même écrivain, ces précautions concernant l'alimentation des navires, sont souvent négligées, lorsqu'elles devaient d'autant plus nécessaires, que les provisions sont placées dans la cale, le lieu le plus chaud & le plus humide d'un vaisseau.

Le sel, le vinaigre, la moutarde, &c., sont employés dans le régime alimentaire des marins comme dans les autres usages de la vie civile. Le *sawer-kroot*, l'oseille couite, peuvent du reste remplacer à la mer la plupart des autres assaisonnemens. Lind attache d'une autre part, & avec raison, beaucoup de prix aux provisions de plantes toniques & alliées (échalotes, ail, oignons), & à l'usage de faire entrer ces plantes pour préparer des soupes de gruau, qui servent utilement substitues aux potages préparés avec des viandes salées. Il voudrait en outre, que pendant les frords excessifs on assaisonnât les aliments des matelots, soit avec la sauge, soit avec le fassiastr, les baies de genièvre rôties, ou même avec une petite quantité d'eau-de-vie à l'ail: il pense avec raison que les personnes employées à la manœuvre, ne montant sur le tillac qu'après avoir pris un léger repas avec des alimens aussi toniques, sont bien moins exposées aux maladies que ceux qui négligent ces précautions.

L'eau donc que l'on embarque sert à la fois comme boisson & comme véhicule pour la préparation des alimens. On prend en général de grandes précautions afin de la conserver sans altération à bord des équipages: dans ce dessein, plusieurs procédés ont été mis en usage, & ceux de la Peyre & de Luvitz paroissent justement estimés. Le procédé de la Peyre consiste à donner, pendant une semaine, une nouvelle couche de chaux à l'intérieur des pierres, à les lever & à les remplir ensuite avec de l'eau douce, à laquelle on ajoute quatre livres de chaux éteinte & quatre onces d'acide sulfurique par pièce de quatre barriques (1).

(1) *Histoire de la Société royale de médecine*, tome 1, page 349.

Suivant le procédé de Lowitz, on nettoie l'intérieur des pièces, & on le frotte ensuite avec du charbon en poudre, & l'on met par pièce de quatre barriques, six à huit livres de poudre de charbon, avec une quantité suffisante d'acide sulfureux pour aciduler l'eau.

La filtration de l'eau corrompue, au moyen du charbon pulvérisé & suivant le procédé de Smith, cette filtration qui fournit depuis plusieurs années à une grande partie de la consommation de Paris, mériterait d'être employée sur les vaisseaux. Diverses procédés moins perfectionnés, sont, du reste, mis chaque jour en usage, & quelquefois avec succès. « L'eau la plus altérée, dit Poissonnier Desperrières, se rétablit souvent d'elle-même dans son premier état, & lorsqu'on a l'attention de tenir les barriques ouvertes. Quant aux moyens que l'industrie des marins, abandonnée à elle-même, a trouvés pour purifier l'eau corrompue, ils ont tous pour but d'agiter l'eau, de la faire bouillir, d'en élever la température, & de faire évaporer ainsi, les substances végétales ou animales, en putréfaction, qui l'empêchent d'être potable. Suivant le même auteur, lorsque, d'ailleurs, on s'aperçoit que l'eau embarquée sur les vaisseaux tend à se corrompre, il importe de s'opposer promptement à cette corruption : dans ce dessein il faudroit la troubler, la faire tomber de très-haut dans un baquet, l'agiter fortement, y jeter quelques boulets rougis, & la mettre, encore chaude, dans un autre tonneau dans lequel on auroit fait éteindre de la chaux. Toute l'industrie, toutes les recherches paroissent, d'ailleurs, avoir pour objet aujourd'hui, de préparer des alambics disposés de manière à consommer le moins possible de combustible, & à distiller, dans un temps donné, une quantité suffisante d'eau de mer pour le besoin des équipages. L'eau fournie par la glace fondue, sous la latitude boréale, doit être employée seulement, autant qu'il est possible, pour les ablutions & pour la préparation des aliments. La bière, le cidre, offriroient des boissons bien plus toniques aux marins, & le prix des vins généreux n'en permet la consommation que pour l'état-major & pour les riches passagers.

L'eau-de-vie seule présente surtout, dans son usage immodéré, de graves inconvénients. Lind préfère le mélange que l'on forme avec un quart de cette liqueur & trois quarts de petite bière, suffisamment édulcorée & acidulée avec le miel & le vinaigre. Cette boisson est connue sous le nom d'*ashbotten* dans les armées russes ; chaque régiment en fait sa provision, & cette préparation tonique soutient les forces & le courage des soldats pendant les marches les plus longues & les plus pénibles.

L'eau-de-vie à l'ail est regardée par le même auteur comme très-saine & très-convenable pendant les temps humides, pour éloigner le développement du scorbut & des affections catarrhales. L'esprit de genièvre, la mixture que les Anglais

désignent sous le nom de *grog*, & dont l'usage s'est introduit sur nos vaisseaux, ont été également des boissons très-utiles. Lind préfère d'ailleurs, pour les malades & pour les convalescents, les vins généreux à toutes les eaux-de-vie, tels que *rum*, *kuchen-wasser*, &c. Il regrette qu'il ne soit pas possible d'avoir à meilleur marché les vins de Jumeau des Indes occidentales, dont Buntius a si judicieusement proclamé les bons effets dans les contrées les plus chaudes de la zone torride.

La crème de tartre est proposée, par l'un des auteurs que nous venons de citer, pour aciduler la plupart des boissons des marins, d'après des vues purement théoriques sur la nature des affections scorbutiques. L'usage si répandu des infusions de quinquina, en Hollande & dans tous les lieux humides, offriroit sans doute souvent de grands avantages aux gens de mer ; & l'un des philantropes qui s'est occupé de leur conservation avec le plus de zèle & de lumière, donne à ce sujet des conseils qui mériteroient d'être suivis (1).

Les Anglais, pendant leur séjour dans les ports de l'Amérique méridionale, sont avec avantage en usage journalier d'une espèce de punch préparé avec un mélange de tafia, de citron, de mélasse, dont ils jettent cinq à six bouteilles dans un grand baquet d'eau.

Le régime des marins, soit pour les aliments, soit pour les boissons, doit éprouver de grandes modifications suivant les lieux où ils naviguent. Dans les climats chauds, les organes de la digestion sont en général moins disposés à remplir leurs fonctions ; & tout invite à préférer, dans les colonies, une nourriture légère, & se composant plutôt de substances végétales que de substances animales.

Les indigènes sont entraînés par leur inclination vers un pareil régime, & l'exemple des Européens ne portera jamais sans doute les habitants des zones torrides, à préférer la viande au lait, aux fruits, aux semences des graminées ; l'usage immodéré des acides, auroit d'ailleurs de grands inconvénients.

Les épices, les aromates les plus énergiques, le bétel, le combinent très-bien avec ce régime végétal, & sont recherchés en général par les Indiens & par les créoles, avec une préférence que l'on peut regarder comme l'expression d'un besoin propre aux climats chauds.

Suivant M. Keraudren, l'usage diététique du quinquina dans les mêmes contrées, & surtout dans les régions à la fois chaudes & humides, seroit encore préférable au régime tonique des indigènes, pour prévenir certains fièvres intermittentes & plusieurs dysenteries non moins funestes.

(1) Lind, *Essai sur les moyens les plus propres à conserver la santé des gens de mer*, pag. 25.

La manière d'être vêtu ou d'être couché, si importante pour tous les hommes, le devient bien davantage pour les matelots.

Lorsque les habillemens sont humides, lorsque les lits sont pénétrés d'une trop grande quantité d'émanations animales, lorsqu'il y a disette de linge, plusieurs altérations morbides se développent nécessairement à bord, & tous les médecins qui ont écrit sur l'hygiène navale appellent, avec raison, toute la surveillance des chefs, sur ces objets.

Les vêtements, les lits des marins exigent les plus grandes précautions. Le lit se compose ordinairement d'un hamac, d'une ou de deux couvertures de laine, & d'un matelas pour les officiers : quelquefois un hamac sert pour deux hommes. Les malades sont couchés sur des cadres à pieds, fonceés en toile ou avec du litord arrangé en filet; ces lits sont garnis d'un matelas, d'un oreiller, de draps, d'une ou de plusieurs couvertures de laine. On ne sauroit apporter trop de surveillance dans ce qui concerne ces différens couchers, pour lesquels les matelots font naturellement portés à montrer beaucoup de malpropreté & de négligence.

L'équipement devoit être composé de six chemises, dont quatre bleues & deux blanches; une ou deux cravates, quatre paires de bas, deux de laine; deux pantalons de toile grise, & un d'étoffe de laine; deux gilets de laine, deux paires de souliers, & un sac. Il seroit bien important de surveiller le bon état de ces fournitures, qui sont le plus souvent de mauvaise qualité, quoique vendues fort cher dans les ports.

On a proposé, pour les voyages de long cours, d'embarquer des vêtements de différentes étoffes ou de diverses formes, pour être distribués au besoin dans les climats plus froids, ou pour servir pendant le quart, aux matelots qui se trouvent vivement exposés au froid & à l'humidité. Il seroit bien important que les chefs pussent empêcher les matelots de se coucher, de se reposer, ou même de descendre dans l'entrepont avec des habits mouillés. Il seroit également à désirer que cette surveillance fût appliquée aux soins de propreté, au renouvellement à temps du linge, à l'entretien de la chevelure.

Les vus de Duhamel, celles de Poissonnier & l'ordonnance de 1786, sont parvenues à proscrire la communauté des lits à bord des vaisseaux. Cette dernière ordonnance, qui recommande tant de pratiques utiles, & qui fut si dangereusement négligée à la fin du dernier siècle, n'a ouïlé aucun des soins relatifs aux vêtements & à la propreté des matelots, qu'elle place d'une manière immédiate, sous la surveillance d'un officier ayant sous ses ordres un surintendant de la marine, & un officier marinier, pour une division de matelots.

L'usage des bains, des frictions, quelques soins concernant la conservation des dents & des gencives; le nettoyage ou la désinfection de tous les objets de consommation concernant le vêtement & le coucher, sont spécialement indiqués dans cette ordonnance, qui laisse très-peu de chose à désirer sur l'hygiène navale.

M. Keraudren paroît persuadé que les Européens se couvrent trop légèrement dans les climats chauds, & surtout dans les Antilles, où l'on est exposé à des passages si rapides de température: il regrette que la toile, qui seroit autrefois la partie essentielle de l'habillement des marins, ne soit presque plus en usage. Suivant sa remarque, c'est principalement pour la campagne du Nord & les voyages de découvertes, qu'il importeroit d'avoir les provisions de vêtements dont nous venons de parler. Le savon de MM. Donovan & Church, employé pour le lavage des étoffes avec l'eau de mer, paroît au même auteur présenter de grands avantages.

§. V. Excrétions & sécrétions.

Plusieurs sécrétions & plusieurs excrétions sont tout-à-coup, ou suspendues, ou prodigieusement augmentées dans les différentes navigations. Les sueurs excessives, dans les climats chauds, sont généralement regardées comme la cause des coliques, des diarrhées, des dysenteries propres à ces climats. On a beaucoup loué l'efficacité des frictions huileuses, pour modérer & pour rapprocher, autant qu'il est possible, l'état de la peau chez les blancs, de la condition de cet organe qui, chez les nègres, semble approprié à la chaleur brûlante des régions équatoriales.

L'inertie de la peau, une diminution sensible dans la perspiration cutanée, l'engorgement consécutif du tissu cellulaire dans cette circonstance, & une augmentation de sécrétion dans les membranes muqueuses, avec ou sans inflammation, présentent une autre source d'altérations morbides qui appartiennent aux navigations, sous les latitudes boréales, & au mouillage des vaisseaux, dans des lieux remarquables par le froid & l'humidité de l'atmosphère.

L'usage du tabac mâché ou fumé, provoque, dans cette dernière circonstance, une augmentation de sécrétion, qui paroît utile pour les sujets d'un tempérament lymphatique & disposé à la bouffissure. L'usage de la saignée, ou des purgatifs répétés, paroît assez rarement convenir dans l'hygiène & dans la thérapeutique navale, suivant les auteurs qui ont le plus judicieusement écrit sur ces parties les plus importantes de la médecine. L'emploi du mercure exige encore plus de circonspection: les plus petites doses de ce médicament ayant suffi, dans plusieurs circonstances, chez les marins, pour occasionner une salivation très-abondante.

L'eau de la mer peut être utilement employée pour triompher de la constipation, qui paroît résulter directement de la navigation, & qui doit être combattue, quand elle devient par trop opiniâtre, ou trop prolongée.

S. VI. Exercices, affections morales.

Ces deux grands objets de l'hygiène, doivent éprouver beaucoup de modifications, relativement à l'hygiène navale. En général, le repos & l'exercice ne sont pas convenablement distribués dans la vie du matelot. Le temps accordé au sommeil est trop court, d'après la division par quart ou bordée des équipages pour le service.

Le partage de ce même service mieux entendu, & de telle sorte que les ouvriers puissent se reposer pendant huit heures de suite, a eu le plus grand succès dans les voyages des capitaines Cook, Vancoever & la Perouse.

L'inaction forcée, le repos prolongé des matelots, pendant le mouillage ou dans les relâches, n'auroient pas moins d'inconvénients que l'excès des fatigues. C'est surtout dans les climats chauds, que l'on doit éviter l'excès du travail pour les matelots, & qu'il importe de les empêcher de se livrer avec trop d'empressement, après une traversée pénible, au chargement & au déchargement des navires de commerce. M. Keraudren (*Op. cit.* pag. 94 & 95) voudroit que les équipages des chaloupes & des canots, dans les colonies, fussent doublés pour chaque vaisseau; ce qui permettroit que les chalonniers & les cautiens de l'un de ces bords, en revenant de terre, fussent remplacés par ceux de l'autre bord, aussitôt qu'il seroit nécessaire. Tout ce qui concerne l'exercice & le repos, devient d'ailleurs l'objet d'une attention particulière, pour les convalescents & pour les malades.

Dans ces circonstances, les capitaines expérimentés ont exécuté par les équipages différens exercices utiles ou agréables, tels que l'exercice du canon, celui de la mousqueterie, la danse, les évolutions militaires, &c.

La sensibilité morale est assez peu développée chez les matelots; cependant plusieurs sentimens douloureux, plusieurs affections tristes, les atteignent souvent dans les traversées trop longues ou trop pénibles.

Ces situations douloureuses de l'ame, exercent alors une grande influence sur l'organisme, & on n'a pas craint d'en accuser en grande partie, les développemens du scorbut, qui se sont manifestés dans plusieurs expéditions navales & militaires. Les sentimens opposés, la joie, le courage, l'espérance, peuvent contribuer tout-à-coup à rétablir la santé des équipages, & les annales de la médecine nautique présentent, à ce sujet, une foule de traits mémorables. Ainsi, d'après Lind,

lorsqu'on vint à savoir sur le vaisseau le *Dragon*, qu'on alloit en venir aux mains, les scorbutiques parurent se rétablir en peu de jours, & presque tout l'équipage se trouva à son poste le jour du combat. Pendant le siège de Bréda, l'espoir d'un secours annoncé par le prince d'Orange, & l'emploi de quelques médicamens, auxquels on attribuoit à dessein des propriétés merveilleuses, releva les courages abattus, & augmenta tout-à-coup le nombre des hommes disponibles pour le combat.

La musique, la danse, ont également opéré les effets les plus salubres sur les soldats & les matelots, pendant certains voyages de long cours. Bougainville, la Perouse, tirent le plus grand parti de cette ressource, dans leurs expéditions. La bienveillance des chefs, la confiance qu'ils inspirent, les preuves de savoir ou d'humanité qu'ils ont données au besoin, sont des ressorts encore plus puissans, & que les navigateurs ont employés souvent avec le plus grand succès. (Bougainville, Cook, la Perouse.)

Les encouragemens, l'émulation, la discipline, & tout ce qui concerne les délits & les peines, présentent, relativement au régime moral des marins, d'autres objets de méditation du plus grand intérêt. La substitution des fers, dans le nouveau Code pénal maritime, à diverses punitions corporelles, est justement critiquée par M. Pellois, & ne suppose pas chez les philosophes qui l'ont établie, une connoissance assez exacte, des mœurs & des caractères des matelots.

Toutefois, & en faisant cette concession, on ne doit pas oublier que les mauvais traitemens, que les peines arbitrairement imposées, les châtimens injustes ou trop rigoureux ont les inconvénients les plus graves, & qu'ils peuvent jeter tout un équipage dans la tristesse & le découragement, source inséparable des plus affreuses maladies.

Suivant M. Keraudren, auquel nous empruntons cette réflexion, la justice ne consiste pas moins à récompenser qu'à punir. « Le châtiement est toujours public; les récompenses doivent aussi être distribuées d'une manière offensive dans l'un & l'autre cas, il faut chercher à produire un effet moral propre à réprimer les délits & à exciter en même temps l'émulation. En procédant à la distribution des récompenses avec une sorte de cérémonial, on flatteroit l'amour-propre de ceux qui en seroient l'objet, & on inspireroit en même temps aux autres, le desir de mériter une pareille distinction. Toutes les fois, par exemple, qu'un marin obtient une augmentation de solde, qu'il entre parmi les gabiers, ou qu'il est fait officier-marinier, ne pourroit-on pas faire monter l'équipage sur le pont? Le capitaine l'iroit à haute voix les ordonnances d'après lesquelles il y a lieu à donner de l'avancement, & remettroit ensuite à ceux qui en auroient été jugés

dignes, un ordre en forme, énonçant les motifs de leur promotion : on je me trompe fort, ou ce simple appareil seroit l'esprit de l'équipage une vive impression, & contribueroit plus qu'aucun autre moyen à exciter son zèle & à enflammer son courage. »

Les principaux ouvrages que l'on peut consulter sur l'hygiène nautique, sont tous ceux que nous avons déjà cités dans l'article MÉDECINE NAVALE; nous indiquerons d'ailleurs ici, & d'une manière plus particulière, à l'attention de nos lecteurs, l'ordonnance de 1786, l'un des plus beaux monuments de la législation française; les *Annales maritimes & coloniales*; plusieurs Mémoires de M. Keraudren, mais principalement son Mémoire si justement élimé, sur les causes des maladies des marins, & quelques-uns des articles du même auteur dans le *Dictionnaire des Sciences médicales*, &c., &c.

Un grand nombre de recueils académiques, mais surtout différents journaux anglais (*l'Annal register*, le *Medical repository*, &c.), offriront aussi de nombreux matériaux aux médecins qui voudront écrire sur l'hygiène navale. Plusieurs journaux de médecine française pourroient en outre être consultés avec avantage, ainsi que la *Collection des thèses*, in-8°. & in-4°. de l'Ecole de Paris, parmi lesquelles on distinguera la Dissertation de M. Fallois, que nous avons souvent mise à contribution, & l'exposition curieuse des faits qui ont été observés par M. Savigny, dans le naufrage trop malheureusement célèbre de la *Méduse*.

L'établissement d'un vaisseau hôpital, à la suite des flottes françaises, cet établissement placé avec raison au premier rang parmi les institutions sanitaires qui appartiennent au dix-huitième siècle, se rapporte plutôt à la médecine nautique qu'à l'hygiène navale. (Voyez, relativement à cet objet, l'ÉPIGRAPHIQUE NAUTIQUE.)

(MOREAU DE LA SARTHE.)

NAVALE (Médecine). (Voyez MÉDECINE NAVALE, NAVIGATEURS, NAVIGATION.)

NAVET, f. m. (*Matière médicale*.) *Brassica napus*, de la famille des crucifères. Employé comme aliment, la racine de cette plante, dont la faveur est repoussée par certains estomacs, conviendrait comme nourriture à un plus grand nombre de personnes, si elle ne contenoit pas en principe un peu âcre, comme toutes les crucifères. Le sirop de navet, que l'on prépare dans les pharmacies, n'est pas entièrement à dédaigner, & paroit convenir dans le traitement de quelques affections catarrhales.

On reconnoît plusieurs espèces de navets, dont M. de Theis fait venir le nom du celtique *nap*. La plupart des auteurs pensent que notre navet est le même de Dioscoride. (L. J. M.)

NAVET DU DIABLE, f. m. Nom que l'on donne à la racine de bryone (*Bryonia dioica*, Jacq.).

NAVICULAIRE, adj. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie*.)

NAVIER (Pierre-Toussaint) (*Biographie médicale*), né à Saint-Dizier, près Châlons-sur-Marne, docteur en médecine, correspondant de l'Académie royale des Sciences de Paris, acquit de la réputation au siècle dernier, par des recherches intéressantes sur les poisons métalliques corrosifs. On a de lui :

Lettres sur quelques observations d'anatomie. Châlons, 1751, in-4°.

Lettre à M. Aubert, dans laquelle il examine si le péritoine enveloppe immédiatement les intestins. Châlons, 1751, in-4°.

François Aubert répondit à Navier, qui lui répondit à son tour par l'opuscule suivant :

Réplique à la critique de M. Aubert, dans laquelle on démontre évidemment la fausseté de son raisonnement sur le péritoine & sur plusieurs points essentiels d'anatomie, avec une refutation de son écrit sur une maladie qu'il a nommée NOIRE. Châlons, 1752, in-12.

Ces deux opuscules ne peuvent inspirer aujourd'hui aucun intérêt.

Dissertation sur plusieurs maladies populaires qui ont régné depuis quelque temps à Châlons-sur-Marne. Paris, 1753, in-12.

Navier s'attache à démontrer que dans une épidémie de dysenterie, le quinquina étoit le spécifique auquel il falloit recourir. Il voit la plus grande analogie entre la variole & la rougeole. La fièvre pourpre lui paroit devoir être traitée par la méthode antiphlogistique & les purgatifs.

Observations sur l'amollissement des os en général, & particulièrement sur celui qui a été observé dans la femme Supiot. Paris, 1755, in-12.

Divagations chimico-médicales.

Réflexions sur les dangers des exhumations précipitées, & sur les abus des inhumations dans les églises, suivies d'observations sur les plantations d'arbres dans les cimetières. Paris, 1775, in-12.

Contre-poisons de l'arsenic, du sublimé corrosif, du vert-de-gris & du plomb, suivis de trois dissertations intitulées : RECHERCHES MÉDICO-CHIMIQUES sur différents moyens de dissoudre le mercure ; Exposition de différents moyens d'unir le mercure au fer ; NOUVELLES OBSERVATIONS sur l'éther. Paris, 1777, 2 vol. in-12.

Dans un ouvrage encore moins élimé, Navier propose d'exclure du commerce français, l'arsenic, dont les diverses préparations peuvent être aisément remplacées par d'autres substances moins dangereuses. Cette proposition n'est pas indigne de l'attention de notre gouvernement. Tout ce

que dit l'auteur sur le traitement des personnes empoisonnées par l'arsenic, est fort rationnel, sauf l'usage des eaux sulfureuses alcalines, qui, données peu de temps après l'empoisonnement, sont plus dangereuses qu'utiles.

Les fils de Navier, docteurs en médecine de la Faculté de Paris, ont publié un extrait de l'ouvrage de leur père, sous le titre de : *Précis des moyens de secourir les personnes empoisonnées par les poisons corrosifs*. Paris, 1778, in-8°. Une introduction qu'ils ajoutèrent à ce précis, a été publiée par l'un d'eux, sous le titre de *Lettre à M. Miffa, contenant des essais sur les poisons & sur les contre-poisons*.

Un fils de Navier a publié un opuscule sous le titre de *Manuscrits trouvés dans les écoles de la Faculté de médecine de Reims, sur l'usage du vin de Champagne moussueux contre les fièvres putrides & autres maladies de cette nature*, Paris, 1778, in-8°. C'est la traduction de la thèse qu'il soutint en 1777 à Reims, & dont le texte est en regard. Cet opuscule étoit destiné aux gens du monde plutôt qu'aux médecins, car l'auteur y joignoit l'explication des termes de médecine dont il avoit été obligé de se servir. (F. G. BOISSEAU.)

NAVIGATEURS, f. pl. Ce mot, qui, d'après son étymologie, devroit être employé comme synonyme de *gens de mer*, de *marins*, se prend ordinairement dans une acception plus restreinte, & s'applique seulement aux personnes portées à un rang plus élevé dans cette profession. Du reste, la plupart des maladies auxquelles les marins sont exposés en général, peuvent également atteindre les navigateurs, qui ont toutefois plus de lumières & plus d'aïssance, soit pour s'en garantir, soit pour s'en préserver, soit enfin pour en affaiblir les effets, excepté dans certaines positions tout-à-fait périlleuses & accidentelles. (Voyez MARINS, NAVALE (Hygiène).) (L. J. M.)

NAVIGATION, f. f. (*Pathologie générale*.) *Navigation* : dans l'acception la plus étendue de ce mot, voyage, traïssance par eau, soit sur mer, soit sur les lacs, les grands lacs, &c.

La navigation, considérée en elle-même, & dérangée des accidents inséparables des grandes expéditions, n'occasionne qu'un très-petit nombre d'incommodités & de maladies, & ne peut pas être classée parmi les habitudes nuisibles à la santé. « Dans les temps de paix, dit Lind à ce sujet, où l'on n'emploie d'ordinaire pour le service du Roi, que de très-petits vaisseaux & des matelots choisis, où les croisières & les voyages sont de peu de durée, où l'équipage est mieux approvisionné de tout ce qui est nécessaire à la santé, on remarque que les gens de mer se portent beaucoup mieux & conservent plus long-temps leur santé. Un vaisseau de cinquante ou de soixante canons ne perd point alors plus d'hommes, que n'en perdrait

en Angleterre, un village qui contiendrait un égal nombre d'habitans. »

Les navigations les plus étendues peuvent offrir, relativement à la salubrité, des résultats aussi favorables, lorsque la surveillance la plus éclairée & la plus active éloigne de la position de l'homme de mer toutes les causes de maladies qui n'en sont point inséparables. Ainsi, notre Bougainville, long-temps avant Cook, confirma cette assertion par son expérience. Dans son voyage autour du monde, il ne perdit que sept hommes, sur trois cents & quelques qui composoient les équipages de ses vaisseaux. Cook, plus heureux, parvint, par la même surveillance, & en faisant usage des dispositions hygiéniques les plus récemment proposées pour les hommes de mer, à ne perdre qu'un seul homme après un voyage de trois ans & quelques mois, à travers les climats les plus variés, depuis le 52°. degré de latitude nord, jusqu'au 71°. de latitude sud. Dans la suite, *Vancouver*, chez les Anglais, & la *Perouse* chez les Français, ont également prouvé que malgré toutes les chances attachées au genre de vie des navigateurs, ce genre de vie peut se concilier beaucoup mieux que plusieurs autres, avec la longévité & l'intégrité des forces, dans des conditions données de surveillance hygiénique ou prophylactique. Toutefois la navigation, même en la considérant sous le rapport le plus favorable, présente au pathologiste plusieurs objets dignes de son attention, & mérite d'être placée au premier rang, parmi les causes occasionnelles de plusieurs maladies.

Ses effets les plus immédiats & les plus constants, sont, comme on sait, le mal de mer, la constipation & le scorbut, dans les expéditions difficiles & prolongées avec un concours de circonstances défavorables (tels que la disette d'eau douce, d'aliments frais, un gros temps, les fatigues excessives, des chagrins, le mauvais état des équipages).

Le mal de mer, la constipation, résultent du fait même de la navigation & de la présence sur mer d'individus dans un vaisseau. Quelques maladies ou quelques indispositions ne tardent pas à se manifester par le changement de régime pour ces individus, surtout lorsqu'ils n'ont point encore navigué. On pourroit élever quelques doutes sur cette assertion de Ruppée, que les maladies se terminent plus ordinairement par gangrène, à lamer que sur terre. Il seroit également nécessaire de confirmer par des observations particulières, l'opinion un peu vague de quelques auteurs, qui pensent que l'habitude habituellement enrobée des gens de mer, rend parmi les hommes de cette profession les hémorragies plus fréquentes.

Quant aux diverses maladies qui sont produites à bord par différentes causes accidentelles; les unes sont inhérentes à la disposition même du navire & de l'équipage, & les autres se rappor-

tent à l'influence des climats nouveaux & éloignés dont les marins sont exposés à recevoir l'influence.

Les maladies qui peuvent se développer par des causes inhérentes à l'état du vaisseau ou des équipages, doivent le plus souvent leur développement à un défaut du surveillance dans ce qui concerne la salubrité. Il doit arriver dans un vaisseau qu'on laisse encombrer, ou qui s'est pas aisé avec le plus grand soin, tout ce qui survient pour une prison ou pour un hôpital placés dans les mêmes circonstances. La chaleur, l'humidité, des alternatives d'un repos forcé ou d'agitation excessive, peuvent mettre en outre à la lanté pendant une navigation très-longue. Nous devons remarquer en même temps, que ce n'est que depuis les progrès les plus étendus de la navigation chez les Modernes, que certaines maladies très-défaillantes se sont manifestées ou sont devenues beaucoup plus communes, soit que la fatigue des voyages de loog oorta ait contribué à les développer, soit que les marins en aient rapporté le germe des contrées lointaines qu'ils avoient visitées (1).

Les exemples des maladies les plus funestes, occasionnées par l'encombrement des navires, ont été très-fréquentes, surtout avant l'abolition de la traite des nègres. Tout doit être employé pour éviter une disposition aussi dangereuse, & pour faire renouveler l'air dans les parties les plus basses du vaisseau, par tous les moyens de la ventilation qu'il est possible de mettre en usage. (Voyez NAVALE (Hygiène).)

Lorsque ces précautions sont négligées, on voit le typhus se manifester & faire périr une grande partie des équipages. Ainsi, il y a quelques années, il n'étoit pas rare de voir des bâtiments négriers chargés de plus de huit cents nègres, en débarquer à peine deux cents dans les colonies. Une mortalité non moins effrayante se manifesta à la fin du dernier siècle, parmi les malheureux passagers que l'on transporta de France à Cayenne;

(1) Cette remarque que nous jetons ici en avant, s'applique en particulier à la fièvre jaune.

Nous voyons dans l'histoire de cette effreuse maladie, qu'aucune des contrées où elle s'est montrée avec le plus de violence, n'a voulu reconnaître qu'elle en fût le berceau. Toujours, ou presque toujours, on a été les vaisseaux qui l'avoient apportée d'une terre étrangère. Ces navires, dont les malades sont devenus en effet, à plusieurs époques, le foyer d'une véritable contagion typhoïde, en avoient-ils apporté le germe d'une plage étrangère, ou avoient-ils été exposés spontanément à des causes aussi graves d'insalubrité, pour développer spontanément la maladie? Cette question, que nous ne faisons qu'indiquer, attirera sans doute l'attention des médecins, lorsque l'on commencera à considérer quelques notions positives sur la fiéction des viciés, & sur les conditions dans lesquelles cette fiéction s'opère pendant le cours des maladies, dont la contagion ne peut être évacuée ou doute. (La typhoïde, la variole, la rougeole, la vaccine, &c.)

Sur des bâtiments dont ils occupoient les parties basses & encombrées.

Des malheurs semblables ne se sont manifestés que trop souvent parmi les prisonniers de guerre que les Anglais & les Espagnols tenoient renfermés sur des pontons pendant les dernières guerres. (Voyez PORTONS.)

Les typhus contractés à bord des vaisseaux & dans les circonférences les plus défavorables, sont évidemment contagieux; & il paroît même probable, surtout d'après les excellentes remarques de M. Rochoux, sur le typhus amari de Barcelone, que ces typhus, spontanément développés à bord, sont devenus, dans quelques circonférences, en Espagne, le point de départ, la véritable origine de la contagion typhoïde, que l'on auroit confondue avec la fièvre jaune des Antilles.

Le scorbut appartient, comme le typhus, aux maladies qui se développent sur le vaisseau, indépendamment des nouveaux climats dont les marins reçoivent l'influence. Il sera toujours d'autant plus à craindre que les expéditions seront très-éloignées, & que l'on aura apporté très-peu de surveillance dans la tenue des équipages; ce qui a malheureusement été prouvé par de mémorables exemples de ce genre de calamités dans plusieurs navigations célèbres (celles de Vasco de Gama, de l'amiral Anson, &c.).

Parmi les maladies que la navigation peut occasionner par le seul fait de la différence des climats, les unes se développent sous une température chaude, & les autres sous une température froide. Roupe, qui établit cette division, en même parmi les maladies des climats chauds pour les marins, les céphalalgies, les douleurs rebelles, les boutons, le dragonneau, les fièvres ardentes, putrides, exanthématiques, & les fièvres bilieuses, dans lesquelles on a observé quelquefois le délire particulier connu sous le nom de *cafentura*, que Sauvages a si improprement considéré comme une maladie.

Les maladies développées dans la translocation rapide vers des régions boréales, sont les fièvres catarrhales, plusieurs fièvres intermittentes, le rhumatisme, la dysenterie, le scorbut. Il faut ajouter à ces maladies celles que les équipages peuvent contracter par contagion, & de toute autre manière, sur des rives inhospitalières, insalubres, & vastes par des affections épidémiques ou pestilentielles (la peste d'Inde, la fièvre jaune, la fièvre maligne de l'Inde, le cholera-morbus, &c.)

La navigation considérée à ces différentes époques, suivant les divers degrés de son extension, relativement à la marine militaire & à la marine marchande, chez les différents peuples qui surveillent plus ou moins leurs équipages, qui ont adopté ou rejeté les infâmes usages de la traite & de la *peste*, offre, sous le point de vue de la pathologie, un grand nombre d'objets qui se trou-

veront examinés dans plusieurs autres articles du Dictionnaire encyclopédique, & qui ont un droit égal à l'attention des médecins éclairés. (Voyez MÉDECINE NAVALE, MER (Hommes de), NAVALE (Hygiène).)

La découverte de la boussole, celle de la poudre à canon & l'usage de la traite des nègres, doivent occasionner d'ailleurs dans la navigation, chez les Modernes, des modifications qui ne méritent pas moins d'être indiquées dans l'exposition des maladies considérées dans leurs rapports avec l'hygiène générale des peuples.

Ce qui, du reste, contribue aujourd'hui à rendre la navigation de moins en moins dangereuse & insalubre, d'après les études travaux de Lind, de Duhamel, &c., ce sont les progrès mêmes de la navigation; les points de relâche plus nombreux & mieux connus; de grands perfectionnemens dans l'hygiène navale, pour ce qui concerne la pureté de l'air & le régime alimentaire, &c. &c.

NAVIGATION. (Thérapeutique.) Quelques médecins, & principalement Gilchrist, ont pensé que plusieurs maladies pouvoient se guérir par le fait même de la navigation.

La navigation, en nous transportant d'un pays froid vers des climats d'une chaleur habituelle, sans être excessive, justifieroit plus particulièrement cette opinion; & l'on conçoit très-bien qu'elle ait pu contribuer, dans plusieurs circonstances, à la guérison des engorgemens lymphatiques, des maladies scrophuleuses, & de plusieurs rhumatismes chroniques. On a même cité des exemples de la curation spontanée de plusieurs maladies de peau & d'affections générales, par le seul effet du séjour des malades sous les tropiques.

Il resteroit une question importante à établir, celle de savoir, si l'effet même du vaisseau, considéré abstraction faite de toute autre cause, pourroit, dans certaines circonstances, modifier utilement l'organisme & contribuer à guérir plusieurs maladies chroniques invétérées. Je ne connois, à ce sujet, aucune observation bien positive, & ce point de haute pratique me paroît entièrement abandonné aux discussions théoriques. Je citerai à cette occasion un seul fait qui m'est bien connu, & qui me paroît entièrement lui appartenir. M. L., de la Nouvelle-Orléans, âgé de vingt-deux ans, atteint d'une inflammation tuberculeuse à la partie supérieure & latérale droite du poulmon, s'embarqua pour venir chercher en Europe des secours contre une maladie que les médecins avoient entièrement méconnue. Avant son départ, ce jeune homme avoit continuellement une fièvre consécutive, avec le caractère d'une fièvre intermittente quotidienne; il étoit tourmenté par une toux continue, & maigrissoit de jour en jour. Quelques sébrifuges, & surtout le quinquina, lui furent administrés & parurent aggraver sensiblement la maladie. Pendant toute la traversée, qui fut très-

longue, M. L. se trouva presque entièrement sans fièvre; les redoublemens du soir, surtout, manquèrent évidemment, & il paroît que le poulmon conservoit à peine un peu de fréquence & d'élevation dans la journée. Le jeune malade se trouva, d'ailleurs, beaucoup mieux, & ne fut point tourmenté par le mal de mer. A peine arrivé à terre, il vit la fièvre revenir avec la même force, & la maladie reprendre une marche qui sembloit avoir été suspendue.

Lorsque M. L. fut remis entre mes mains, à Paris, cette fièvre étoit continue, & le poulmon, dans les redoublemens, avoit quelquefois jusqu'à 110 & 120 pulsations.

M. Kerandren, d'après des vues très-judicieuses, est porté à croire que la coagulation des marios, comme le mal de mer, doit dépendre de la manière dont la mobilité des intestins est modifiée par le mouvement du vaisseau.

(MOREAU DE LA SARTHE.)

NAVIRE ou NAVREUR (Médecine légale), ancien mot qui seroit à peu près synonyme du mot *nientrissure* (voyez ce mot), & qui vient du verbe *navrer*, *être brisé*, *être noir de coups & de blessures*, (suivant Ménage, & dont nous n'avons conservé que le participe passé *navré*).

Cette expression *navire*, qui est tombée en désuétude, conviendroit surtout pour désigner l'état d'un individu dont toutes les parties du corps ont été couvertes presque simultanément d'un grand nombre d'ecchymoses, ainsi qu'il arrive à la suite d'une fustigation violente, ou du supplice des baguettes dans les régimens autrichiens: c'étoit surtout dans ces cas de contusions & d'ecchymoses si étendues, ou de *navres*, que l'on faisoit usage avec succès d'un moyen qui a été peut-être trop légèrement abandonné, la peau d'un animal fraîchement écorché, que l'on appliquoit sur les parties malades.

Les Grecs, les Arabes, avoient souvent recours à ce topique, & Ambroise Paré, ainsi que plusieurs chirurgiens célèbres des seizième & dix-septième siècles, l'ont plusieurs fois mis en usage.

(L. J. M.)

NAYADÉES. (Matière médicale.) Famille de plantes monocotylédones, qui n'en fournit aucune à la médecine, si l'on en excepte la lentille d'eau, *lenna minor*, qui a quelquefois été employée comme topique. (L. J. M.)

NÉ (Nouveau-). (Anatomie, physiologie & médecine légale.) On donne le nom de *nouveau-né*, au fœtus à terme, lorsqu'il vient d'être expulsé de l'utérus, par le travail d'un accouchement plus ou moins difficile, & qu'il a commencé à respirer. La période de la vie, qui constitue l'âge du nouveau-né, se trouve comprise entre le moment de la naissance & le commencement de

la dentition, dans un espace de quatre à cinq mois. C'est la première partie de l'enfance, qui s'étend jusqu'au développement de la puberté.

Nonvel hôte de l'air, suivant l'heureuse expression de Haller, le nouveau-né présente des dispositions bien caractérisées, & dont la connoissance exacte, toujours intéressante & curieuse pour le naturaliste, devient quelquefois de la plus haute importance, sous le rapport de la médecine légale.

Pour bien apprécier ces dispositions, il faut porter successivement son attention sur le volume, les dimensions, les dispositions extérieures, les proportions du fœtus, l'état & la texture de ses organes intérieurs.

Un nouveau-né à terme, pèse ordinairement six livres & un quart. On cite des exemples d'enfants, dont le poids étoit beaucoup moins considérable. Mauriceau portoit ce poids à once & douze livres; Roderer à six & un quart. Sur plus de vingt mille accouchemens faits à la Maternité, on n'a vu qu'un très-petit nombre d'enfants de dix livres & demi, & le plus grand nombre de six à sept. On a vu des nouveau-nés, non à terme, ne peser que seize à vingt-quatre onces. Baudelocque cite l'exemple opposé d'un nouveau-né à terme, pesant treize livres.

Des recherches & des observations qui ont été faites, & poursuivies avec beaucoup de soin à l'hospice de la Maternité, ont donné les résultats suivans, relativement aux dimensions, à la longueur du fœtus à terme, & au moment de la naissance.

A 5 mois le fœtus a de longueur.	255 mil. ou	9 p. 1/2
A 6 mois.	325	12
A 7 mois.	380	14
A 8 mois.	440	16
A 9 mois.	498	18

Quelquefois cependant, on voit des fœtus à terme, n'avoir de longueur que trois cent dix ou quatre cents millimètres (environ treize à quinze pouces); d'autres fois on en a vu de cinq cent soixante-neuf millimètres (vingt-un pouces), rarement de six cent cinquante millimètres, plus rarement encore de six cent soixante-dix-sept millimètres (vingt-cinq pouces), comme Millot en cite un exemple; enfin les deux extrêmes sont généralement, comme le dit Baudelocque, de quatre cent quarante millimètres (soize pouces) à cinq cent quatre-vingt-seize, & même six cent soixante (vingt-deux, & même vingt-trois pouces des anciennes mesures).

Dès le septième mois, un grand nombre de dispositions extérieures, qui appartiennent encore au fœtus, s'affaiblissent, disparaissent, tandis que d'autres dispositions propres au nouveau-né commencent à se montrer. Ainsi, dès le septième mois, les paupières ne sont plus agglutinées, la membrane pupillaire n'existe plus, la peau est

moins rougeâtre, les glandes sébacées se développent, & on aperçoit faiblement l'endroit qu'elles fournaissent, & qui protégera incessamment une peau trop délicate, contre les premières impressions de l'atmosphère. A huit & surtout à neuf mois, toutes ces dispositions sont bien plus marquées. Les proportions propres à cet âge ne sont pas moins évidentes. La tête moins volumineuse, dans les premiers temps, est encore très-considérable, si on la compare aux autres parties. Le crâne paroît développé, la face petite; le thorax est court, arrondi, relevé; l'abdomen ample, fort étendu, saillant du côté de l'ombilic; le bassin étroit, peu développé; les membres, surtout les membres abdominaux, d'autant plus courts, que le fœtus est plus éloigné du terme de la maturité. La moitié de la longueur totale du corps répond, vers neuf mois, un pou au-dessus de l'ombilic, & se rapproche d'autant plus du sternum, que le fœtus est plus éloigné du moment de la naissance.

Du septième au huitième mois, la pulpe du cerveau acquiert de la consistance, & la substance intérieure le colore par le développement des vaisseaux sanguins qui la pénètrent. Les membranes de ce viscère commencent à paraitre plus adhérentes, & les circonvolutions des hémisphères apparaissent, & sont d'autant plus nombreuses, plus marquées, que le fœtus approche davantage de la maturité. La moëlle épinière, la moëlle allongée, le pont de Varolle, sont en même temps d'une consistance fort remarquable. Les poumons ont une teinte rougeâtre: toutes les parties du cœur sont bien distinctes: le foie, d'abord si volumineux, conserve cette disposition; mais il s'éloigne de l'ombilic. La bile se dispose à manifester les qualités qui lui sont propres, & qui la font contribuer à la digestion. Le méconium est plus abondant, & remplit la plus grande partie du gros intestin.

A la fin du neuvième mois, les circonvolutions sont nombreuses à la surface du cerveau. Les parties de cet organe, qui doivent prendre par la suite une teinte grisâtre ou cendrée, commencent à se distinguer par un changement de couleur; la fermété du prolongement rachidien & du mésocephale augmente; le cervelet, ainsi que toute la base du cerveau, mais spécialement les endroits qui correspondent aux cordons nerveux, ont acquis une consistance très-remarquable, tandis que la masse du cerveau conserve toute sa flexibilité. Le diamètre occipito-frontal de la tête, on longitudinal, est ordinairement de cent dix millimètres, à peu près quatre pouces. Le diamètre oblique, on occipito-mentonnier, est de cent cinquante millimètres, à peu près cinq pouces, & le transversal, ou bipariétal, est de quatre-vingt-cinq millimètres, ou à peu près trois pouces en dedans.

Dans le thorax, on trouve les poumons plus rouges, plus volumineux; la branche de l'artère pulmonaire,

pulmonaire, qui communique avec l'aorte, & que l'on nomme *pulmo-aortique*, ou *canal artériel*, loin de se rétrécir à mesure que la grossesse avance, comme l'ont dit quelques auteurs, a une grande capacité, mais ses parois sont plus fortes & plus denses; l'ouverture inter-auriculaire, ou *trou botal*, est aussi très-grande, mais la valvule, ou membrane qui doit la boucher après la naissance, a plus de fermeté, plus d'étendue que dans les premiers temps. Le foie a plus de consistance; la bile est plus amère; le méconium remplit tout le gros intestin; la vessie contient de l'urine; enfin tout annonce que les organes sont assez développés pour l'exercice des fonctions nécessaires après la naissance.

Les différents caractères que nous venons de tracer, pour en former en quelque sorte le signallement & l'histoire naturelle du fœtus à terme, ou du nouveau-né, ne sont pas toujours aussi évidens qu'il seroit désirable, dans plusieurs cas où les médecins sont appelés à prononcer sur des questions médico-légales. On cherche alors, & dans ces circonstances qui sont assez rares, à s'éclaircir par des caractères particuliers, regardés comme plus constants, plus invariables. Il nous suffira d'indiquer ici, parmi ces caractères, un point d'ossification entre les condyles des fémurs, qui n'a jamais été observé avant le neuvième mois, & sur lequel M. le professeur Bérard paroît avoir attiré le premier l'attention des anatomistes.

Né (Nouveau-) (*Hygiène*). (Maladies du). Sur un nombre déterminé d'enfans qui naissent à la même époque, sur dix mille, par exemple, les deux cinquièmes périssent avant d'avoir atteint la troisième année; vérité aussi alléguée qu'incontestable, & qui ne permet pas de douter que dans la carrière de la vie, les premiers pas ne soient encore plus difficiles, plus incertains que ceux qui tendent à nous rapprocher de son terme. Cette mortalité est d'ailleurs beaucoup plus grande pour les enfans nouveau-nés, pendant les trois premiers mois, surtout dans les hôpitaux & les maisons qui servent d'asiles aux enfans trouvés.

Plusieurs genres de causes contribuent à cette incertitude de la vie, à cette faible chance de longévité, pendant le premier âge. Parmi ces causes, on doit placer au premier rang l'essai d'un nouveau mode d'existence, & des nouvelles fonctions qui le caractérisent (1); plusieurs maladies, ou plusieurs vices de conformation, antérieurs à la naissance; quelques accidens même de l'accouchement, & le développement de plusieurs maladies propres à l'enfance, ou qui se manifestent le plus ordinairement à cette époque.

Tout n'appartient cependant pas à la mère, dans cette mortalité des nouveau-nés : la négligence,

le genre, les soins peu éclairés, peuvent également y contribuer. Il est certain du moins qu'elle est effrayante dans les hospices, à la porte desquels un misanthrope propoisoit de placer cette inscription :

Ici on tue les enfans aux frais du public.

Malgré l'intention philanthropique des fondateurs, la plupart des hospices consacrés à l'enfance justifient malheureusement un reproche aussi sévère. Dans celui de Dublin, par exemple, sur sept mille fix cent cinquante enfans que l'on a reçus, de 1781 à 1784, deux mille neuf cent quarante-quatre étoient morts quinze jours après leur entrée, & en 1790, sur deux mille quatre-vingts enfans admis dans le même hospice, cent quatre-vingt-neuf seulement avoient atteint l'âge d'un an. Dans la période de 1788 à 1805, il ne restoit, au bout de cinq ans, que cent trente-cinq enfans, sur douze mille sept cent trente-fix qui avoient été admis dans cette période.

A Londres, à Moscou, à Vienne, & dans les plus grandes villes d'Italie, les tables de mortalité des établissemens du même genre; n'offrent pas des résultats beaucoup plus favorables. Une grande sollicitude & une meilleure organisation ont donné un avantage sur tous ces établissemens, à l'hospice de la Maternité du Paris; & si la longévité des enfans nouveau-nés s'y trouve encore bien éliminée de ce qu'elle pourroit être au sein d'une famille, cette différence s'explique très-bien par l'impossibilité de suppléer entièrement à la sollicitude des mères. On sait d'ailleurs, par les recherches de M. le professeur Chaussier, que parmi les enfans qui ont péri dans cet hospice, plusieurs avoient des vices de conformation incompatibles avec la vie, & que d'autres étoient entrés avec des maladies mortelles : résultats importants, & qui doivent être pris en considération dans les tables de mortalité.

Ce qui concerne, dans cet article, la conservation des enfans nouveau-nés, doit embrasser successivement les soins hygiéniques & indépendans de toute circonstance de maladie; les vices de conformation, les états morbides antérieurs à la naissance, les maladies, les blessures, qui peuvent être l'effet de l'accouchement, enfin les maladies qui appartiennent spécialement au premier âge, ou qui se développent plus particulièrement dans cette période de la vie, & que nous considérerons autant qu'il nous sera possible, ainsi que les soins hygiéniques, qui en sont inséparables, dans leurs rapports avec les nouvelles fonctions qui s'exercent après la naissance.

Nous nous bornerons d'ailleurs le plus souvent, & comme il convient de le faire dans les articles d'une certaine étendue, à des énumérations rapides, on a des vues générales, en renvoyant pour plus de détail aux articles particuliers, dont nous

Y y

(1) La respiration, la circulation, la digestion.

indiquerons successivement l'objet, & les rapports avec l'ensemble du sujet auquel ils appartiennent.

Art. I^{er}. *Hygiène générale des nouveau-nés.*

L'enfant qui vient de naître, & qui tient encore à la mère par le cordon ombilical, n'en peut pas être brusquement détaché, par la rupture trop prompte de ce dernier lien. On recommande d'une manière générale, depuis Hippocrate, de n'opérer cette section que lorsque l'enfant a respiré & crié. Ce précepte qui présente quelques exceptions, surtout dans les cas d'une disposition apoplectique, doit avoir plus particulièrement son application dans toutes les circonstances où le nouveau-né paroit foible, languissant, peu disposé à vivre d'abord, ou moins de ses propres forces, c'est-à-dire, à respirer.

Le savant & ingénieux Antoine Petit, donne un jour une preuve bien remarquable de la nécessité d'une pareille conduite, & des avantages qu'un haut degré de savoir peut faire obtenir dans les moindres détails de la médecine. Il venoit de recevoir un enfant, dont le cœur & le poulx n'offroient aucun mouvement sensible. Bientôt il distingua les mouvements du cœur; mais les pargens l'ayant pressé de faire la section & la ligature du cordon ombilical, il s'y refusa; seulement il consentit à lier le cordon, & fit remarquer qu'alors les mouvements du cœur s'arrêtoient: expérience qu'il renouvela plusieurs fois: réfilant toujours à l'indiscret empiètement des assistants, & ne voulant opérer une ligature définitive & la section du cordon, que lorsqu'il eut entendu l'enfant annoncer par ses cris qu'il étoit enfin entré dans la vie extra-utérine.

Le sang qui continue d'arriver du placenta, à un enfant foible, dans une pareille occurrence, & dans toutes celles qui s'en rapprochent, est le stimulant le plus efficace & le plus énergique.

Pendant tout le temps de cette heureuse temporisation, tous les médecins qui se font spécialement occupés de l'hygiène des femmes & des enfants, recommandent de placer le nouveau-né au milieu d'une température très-douce, & qui ne soit pas éloignée de plus de dix à douze degrés de la chaleur de son premier asyle.

Du reste, tout ce qui concerne la ligature & la section du cordon ombilical, présente un mélange d'opinions populaires & de préceptes judicieux, qu'il est aussi curieux que philosophique de rappeler & de rapprocher dans l'histoire du nouveau-né. Pendant long-temps, on ne se contentoit pas de placer une ligature sur le cordon du côté du fœtus: on en faisoit une seconde du côté de la mère, voulant ainsi prévenir une perte qui ne peut avoir lieu que par l'inertie de l'utérus, & sans s'arrêter à l'idée que dans ce cas, la ligature du cordon n'empêcherait pas l'écoulement du sang, qui, ne pouvant se faire illue par la veine

ombilicale, se rendroit au placenta, dont il rompt bientôt les adhérences avec la matrice: ce qui donneroit lieu alors à une perte interne, d'autant plus dangereuse que l'écoulement de la ligature auroit fait perdre plus de temps à l'accoucheur.

L'opinion & la conduite que nous rappelons ici pour en signaler les dangers, appartiennent sans doute au long & interminable chapitre des erreurs populaires, dont les détails, pour tout ce qui concerne les soins donnés à l'enfance, ont été l'objet dans tous les temps & chez tous les peuples. Il n'en est pas ainsi d'une autre opinion avancée dans le dix-septième & le dix-huitième siècle, sur l'utilité de lier le cordon ombilical du côté du nouveau-né, en se bornant à la section.

Cette opinion, à laquelle Schulgius a particulièrement attaché son nom, est fondée sur des faits & sur une connaissance exacte de ce qui arrive après la respiration. En effet, lorsque cette fonction est bien établie, le sang change nécessairement de route, & on ne doit pas craindre qu'il puisse se porter du côté de l'ombilic & occasionner une hémorragie. Un semblable événement n'auroit lieu que si l'enfant n'avoit pas respiré, ou si la respiration, après s'être établie, venoit à se suspendre ou à s'exécuter difficilement, & c'est pour le prévenir que l'on a continué à lier le cordon ombilical: opération qui n'offre, d'ailleurs, aucun inconvénient lorsqu'elle est faite à temps & d'une manière convenable.

Avant de faire cette ligature on a souvent recommandé, & d'après une erreur populaire qui remonte jusqu'aux Arabes, de soumettre le cordon ombilical à des pressions légères, à des lotions répétées, pour en faire sortir le fluide muqueux dont il est pénétré; persuadé que par ces procédés on mettoit l'enfant à l'abri de la petite-vérole, de la janniss des nouveau-nés, des croûtes lactées & des convulsions.

L'opinion que la ligature peut contribuer à la chute du cordon n'est pas mieux fondée, mais ne remonte pas à une origine aussi théorique. La constriction de l'épiderme du fœtus, à l'endroit où il se termine sur le cordon, est la seule cause de cette chute, qui arrive par une véritable inflammation, du quatrième au cinquième jour; laissant une plaie qui est ordinairement cicatrisée le huitième: phénomènes qui ne sont, d'ailleurs, restreints par leur durée à aucune loi fixe, & qui présentent, sous ce rapport, de grandes variations.

La manière de faire la ligature, & tous les détails de ce procédé, les plus minutieux en apparence, doivent attirer toute attention.

Il est desirable que les brins de fil employés pour cet usage soient un peu larges & cirés. On les attache par un nœud, & il est prudent de faire une seconde ligature à quelque distance de la première: celle-ci pourroit devenir en effet insuffisante, si le tissu cellulaire subjacent venoit

à s'affaïffer, surtout lorsque le cordon vñ très-volumineux.

Dans ce dernier cas, il importe toujours à l'accoucheur de s'affaïffer, avant de placer la ligature, que l'intestin ne s'est pas échappé par l'anneau & qu'il ne se trouve pas accolé au cordon ombilical; disposition qui rendroit mortelle toute méprise.

Dans une pareille circonstance, doit-on faire, d'ailleurs, la ligature plus ou moins loin de l'abdomen, tant chez les garçons que chez les filles? Cette distinction peut-elle influer chez les uns & chez les autres sur les organes de la reproduction? Ces questions sont assez indifférentes, & si nous les examinons, ce ne seroit que pour rappeler encore plusieurs de ces erreurs populaires, qui semblent, en quelque sorte, attachées à tous les points de l'hygiène & de la médecine des enfans.

Divers soins, qui n'ont pas la même importance que la section & la ligature du cordon ombilical, ont pour objet de délayer le nouveau-né de l'enduit visqueux & fébéc dont il est couvert. Les partisans des caufes fines ont proposé de confervir cette espèce de caufte, destinée par la nature, disent-ils, à amortir l'exposé dans le nouveau-né auquel il vient habiter. La raison & l'expérience prescrivent une conduite bien différente: il faut laver l'enfant, détacher, dissoudre cette matière grasse qui le couvre, surtout à la tête, où son séjour prolongé dispose aux gales du cuir chevelu, & à la teigne. Les bains légers toniques, les linimens huileux ou huileux prouvent alors convenir, mais il faut éviter les lavages avec du vin pur, & surtout avec l'eau-de-vie, dont l'absorption ne seroit pas sans inconvénient.

La plus grande propreté vñ d'ailleurs nécessaire dans les soins que l'on prend du nouveau-né, & si elle peut paroître indifférente relativement à la vie, elle a bien évidemment pour but de lui épargner beaucoup de souffrances & de petites maladies. Il est, d'ailleurs, bien plus nécessaire de le défendre contre le froid; & si, dans les hôpitaux d'enfans, les mieux administrés, la mortalité vñ encore si considérable, c'est que l'enfance, qui n'y vñ pas protégée par la sollicitude maternelle, éprouve un grand nombre de maladies qui dépendent du défaut de cette sollicitude; & surtout des maladies occasionnées par le refroidissement, telle que la péripneumonie, si fréquente & si délétère dans les hspices, pendant les huit ou neuf premiers jours qui succèdent à la naissance.

L'enfant peut prendre le sein, plus ou moins promptement après sa naissance, depuis quelques heures jusqu'à vingt-quatre, suivant sa force. Le lait récent de la nourrice suffit, le plus souvent, pour favoriser l'expulsion du méconium: on y joint quelquefois, & lorsque la mère n'est pas elle-même la nourrice de son enfant, un peu de sirop de rhubarbe composé, ou de sirop de Beurs

de pêcher. Le choix d'une nourrice, son régime, les soins qui seroient nécessaires, font du son côté, soit de celui du nouveau-né, qu'elle doit inspirer toute sécurité, ne peuvent appartenir à cet article. (Voyez NOURRICE, NOURRISSON.)

Art. II. Maladies, vices d'organisation antérieures à la naissance.

Les états morbides, les vices de conformation qui ont précédé la naissance, & dont le développement appartient à la vie extra-utérine, se rangent sous deux titres: 1°. les états défectueux ou morbides, incurables ou incompatibles avec la vie extra-utérine, en du moins avec une longévité d'une certaine étendue, les monstruosités (voyez ce mot); 2°. les états morbides & défectueux qui sont curables, & qui ne rendent pas la vie extra-utérine impossible.

Les vices de conformation, qui peuvent être corrigés, en totalité ou en partie, sont assez nombreux & assez variés: nous les rangerons sous les titres suivans, savoir:

- 1°. Les occlusions ou imperforations;
- 2°. Les réunions ou adhérences;
- 3°. Les divisions ou séparations;
- 4°. Les déviations d'ouvertures;
- 5°. Les excroissances & les taches congéniales;
- 6°. L'irrégularité ou le défaut d'organes.

Parmi les occlusions qui peuvent être l'objet des différentes pratiques hygiéniques ou médicales, on distingue celles des narines, des paupières, de la pupille que l'on a désignée sous le nom savant de *synesis* (voyez ce mot); l'occlusion incomplète & superficielle des lèvres. (Voy. Occlusion.)

La disposition défectueuse, connue sous le nom vulgaire de *fiel*, est un des exemples d'adhérence morbide ou défectueuse, que l'on a le plus souvent l'occasion d'observer. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Chirurgie.)

La réunion de la langue aux gencives, exige une opération analogue à celle qui détruit le *fiel*, & qui ne seroit pas moins nécessaire.

La hideuse & cruelle infirmité que l'on connoît sous le nom de *bec-de-lièvre*, & qui peut rendre, lorsqu'elle est complète, le tétér très-difficile, ou même impossible, est le cas le plus remarquable des divisions morbides & congéniales des parties. (Voy. ce mot dans le Dictionnaire de Chirurgie.) Dans le *bec-de-lièvre*, & lorsque la division se prolonge jusqu'à la voûte palatine, l'action de téter devient fort difficile & peut s'opposer à une nutrition convenable du nouveau-né (1).

On ne parvient, dans ce cas, à rendre l'allaitement possible qu'avec le secours de l'art, & par des moyens qui se trouvent rarement à la portée du plus grand nombre, & dont la description n'appartient pas à cet article.

(1) Voyez les Mémoires de l'Académie de chirurgie. Y y 2

Si le frein de la langue est trop court, ce qui constitue le vice d'organisation d'où résulte dans les nouveau-nés ce que l'on appelle avoir le *filet*, l'action de téter peut aussi devenir très-difficile, & même impossible. Cette petite infirmité, à l'occasion de laquelle les praticiens vulgaires sont tombés souvent dans des méprises graves, n'est pas toujours facile à reconnaître : on ne doit pas la supposer, ni couper le filet, suivant les excellentes remarques de Jean-Louis Petit, si l'enfant peut porter sa langue sur le bord de ses lèvres & sucer le doigt que l'on introduit dans sa bouche. L'indication la plus décisive pour pratiquer cette section, est le refus & l'impossibilité de prendre le mamelon. Le savant auteur de ces remarques assure, d'après une longue expérience, que l'on a fait souvent la section du frein très-légalement & sans aucune nécessité : dans le cas même où le frein seroit un peu trop fort, mais sans gêner l'allaitement, cette infirmité peut diminuer avec le temps, & l'on pourroit toujours la faire disparaître plus tard, si elle s'opposait au développement de la parole.

J.-L. Petit cite plusieurs exemples d'une mort subite des nouveau-nés, par le renversement de la langue, à l'occasion d'une section intempestive du filet. Dans le cas où cette section est indispensable, il faut faire téter l'enfant le plus long-temps possible, aussitôt qu'elle est terminée, pour éviter qu'il ne détourne sa langue & ne la porte au-delà du gosier, & ne périsse ainsi par une véritable suffocation ; accident qui sera, du reste, d'autant plus à craindre que cette opération auroit été sans nécessité.

Cette disposition au renversement de la langue pourroit, d'ailleurs, exister par un état morbide ; & J.-L. Petit en cite un exemple remarquable. L'enfant qui présentait cet exemple étoit continuellement exposé à un état de suffocation, que l'on ne faisoit cesser que par l'allaitement, en tenant un doigt dans la bouche de l'enfant, afin qu'il sût occupé à le sucer. (Voyez Jean-Louis Petit, *Œuvres posthumes*, tom. III, pag. 260.)

L'ouverture du canal de l'urètre au-dessous de la verge ou en dessus ; cette difformité, que l'on a désignée, dans le premier cas, sous le nom d'*hypospadias*, & sous celui d'*épiispadias*, dans le second, présente un exemple remarquable de déviation dans les ouvertures chez le nouveau-né. Ce vice de conformation ne peut, d'ailleurs, intéresser le médecin que sous le rapport de l'anatomie & de la médecine légale. (Voyez UNKRAZ.)

La même remarque s'applique aux autres défectuosités qui se rapportent au même titre, & que l'on doit comprendre dans l'histoire des monstruosités. (Voyez ce mot.)

Le *strabisme*, la défectuosité connue sous le nom de *pieu-bef*, appartenant à notre sixième titre, & seront examinés à leur article dans ce

Didicennaire, avec l'attention & le développement qu'ils exigent.

Plusieurs maladies qui doivent, dans la suite, empoisonner l'existence ou en abrégier la durée, commencent avec la vie. Parmi celles qui ne se bornent pas à une aptitude ou à une prédisposition héréditaire, & dont le développement est plus ou moins avancé au moment de la naissance, on doit placer au premier rang plusieurs hydrocéphales, mais surtout l'hydrocéphale congéniale, l'hydrocrachis & l'hydrocèle également congéniales ; plusieurs hernies, la syphilis constitutionnelle, le rachitisme, les dartres, l'état tuberculeux, & même quelques inflammations des viscères de la poitrine ou du bas-ventre, qui sont pour la plupart méconnaissables, & qui deviennent la cause d'une mort prématurée. (Voyez ces différents mots.)

L'hydrocéphale congéniale & l'hydrocrachis s'opposent à la longévité, & même à l'établissement de la vie extra-utérine. Nous avons cru cependant devoir les comprendre dans notre énumération, parce que plusieurs auteurs ont cité quelques exemples d'individus atteints de ces maladies, qui ont vécu pendant plusieurs années, surtout dans les cas d'hydrocéphale. L'art, du reste, n'a rien à opposer à des états morbides aussi graves & aussi dangereux.

L'hydrocèle congéniale, observée pour la première fois par un chirurgien de Toulouse, est une maladie très-pen grave ; on la guérit dans quelques semaines par une compression méthodique & soutenue à l'aide d'un bandage.

La *hernie du cerveau*, ou *encéphalocèle*, peut à peine être regardée comme une maladie curable, quoique Ledran & Camper recommandent de ne pas abandonner à la nature, les malheureux nouveau-nés qui arrivent à la vie avec cette disposition. On doit craindre, d'ailleurs, cette hernie, lors même que, sans hydrocéphale, les sutures sont trop écartées ; il importe alors de la prévenir par des moyens convenables de protection & de compression. Ce qui concerne les autres hernies, appartient à l'histoire générale de ces maladies. (Voyez ces mots.) Il faut rapporter aux hernies, la disposition ou les dispositions des testicules arrêtés à l'aine. On a proposé, dans ce cas, & pour forcer ces organes d'arriver à leur place naturelle, de faire quelques efforts & de les abaisser avec le doigt ; on remplira bien plus naturellement & plus facilement cette indication, si l'on emploie, pour faciliter l'ouverture de l'anneau, des bains & quelques applications émollientes.

Ce qui concerne le *racitisme*, les *scrophules*, l'*affection tuberculeuse* chez les nouveau-nés, sera examiné à ces articles, qu'il nous suffit d'indiquer ici d'une manière générale, & avec le dessein de faire apercevoir comment plusieurs maladies, que l'on croit souvent acquises après la naissance, en les attribuant à des causes imaginaires, sont souvent beaucoup plus anciennes, & se confondent

avec le premier développement de l'organisme, dans des conditions d'existence défavorables.

Art. III. *Maladies, lésions, qui peuvent dépendre du mode d'accouchement.*

On pourroit placer parmi ces maladies l'état de mort apparente, la syncope ou l'asphyxie du nouveau-né au moment de la naissance : ces états, qui réclament des soins prompts & très-éclairés, étant presque toujours la suite d'un travail très-long, & le plus souvent accompagné de circonstances qui ont menacé l'existence du fœtus dans son passage de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine.

Les autres maladies qui peuvent résulter du fait même de l'accouchement trop difficile, sont les luxations, les fractures, diverses plaies, les contusions, les ecchymoses, les thrombus ou plusieurs autres tumeurs, surtout à la tête; la déformation de cette dernière, &c. &c.

Les ecchymoses, les thrombus mêmes qui ne feroient pas très-considérables, n'exigent que de légers résolutifs & une douce compression. Les tumeurs sanguines, plus volumineuses & déjà anciennes, doivent, au contraire, être ouvertes : on les distinguera aisément d'une hernie au cerveau par un très-grand écartement entre les futures, & par la grande étendue des fontanelles. La gravité du pronostic portera toute entière sur la complication de ces tumeurs avec des épanchemens internes. Dans le cas où une pareille complication n'a pas lieu, l'ouverture longitudinale de ces tumeurs favorise promptement le récolement du cuir chevelu, surtout si l'incision peut ne pas mettre l'os à découvert.

Quels que soient le rétrécissement & la déformation de la tête du fœtus pendant le travail de l'accouchement, on doit s'abstenir de toute manœuvre pour rétablir une conformation naturelle; ce qui ne peut manquer d'arriver par l'action des parties.

Les luxations qui paroissent résulter des efforts produits pendant l'accouchement, sont faciles à réduire, & sans difformité. Les fractures offrent un accident plus grave, & qui demande des soins & des procédés particuliers. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Chirurgie* de l'Encyclopédie méthodique.) La séparation ou le décollement des épiphyses, présente de bien plus grandes difficultés, & occasionne des difformités inévitables. La luxation de la première vertèbre cervicale est nécessairement mortelle; celle de la mâchoire inférieure, sans être aussi funeste, est très-dangereuse, & a occasionné plusieurs fois le tétonus.

Art. IV. *Maladies des nouveau-nés, qui se développent & se manifestent après la naissance.*

Les médecins qui se sont occupés d'une manière spéciale des maladies des enfans, ont compris

parmi ces maladies, un assez grand nombre d'affections morbides qui peuvent également se manifester à toute autre époque de la vie : différentes maladies des organes urinaires, les oreillons, la petite-vérole, la rougeole, la scarlatine, les aphthes, l'angine, les scrophules & plusieurs névroses. Nous ne donnerons pas cette extension aux maladies des nouveau-nés, & nous ne comprendrons sous ce titre que les maladies qui leur appartiennent d'une manière spéciale, ou qui trouvent dans leur mode d'organisation, une prédisposition toute particulière, ou des causes qui les modifient d'une manière remarquable.

Sous le premier titre, c'est-à-dire, parmi les maladies tout-à-fait propres aux nouveau-nés, se rangent naturellement l'inflammation de l'ombilic, la suppuration, les fongus pédiculés, la rétention du méconium, les sécrétions morbides & imparfaites des voies digestives, & la foiblesse de la circulation & de la respiration, qui paroit former une des circonstances principales du scélérème. (Endurcissement du tissu cellulaire.)

Ces maladies toutes spéciales des nouveau-nés, & les considérations hygiéniques qui s'y rattachent, se rapportent plus particulièrement aux nouvelles fonctions qui s'établissent après la naissance : fonctions dont les organes encore peu exercés & plus irritables, sont susceptibles d'un grand nombre de dérangemens.

La respiration, le nouveau mode de circulation qui en dévient la suite, doivent être placés au premier rang parmi ces fonctions : elles ne s'exécutent pas toujours avec facilité après la naissance, & le nouveau-né ne pouvant respirer, se présente quelquefois dans un état de mort apparente qui demande un prompt secours, soit que cette situation dangereuse dépende d'une congestion sanguine, & que l'on puisse regarder, jusqu'à un certain point, comme un état apoplectique; soit qu'elle n'ait d'autres causes que la foiblesse du fœtus, & qu'elle se rapporte à la syncope ou à l'asphyxie.

Les nouveau-nés dont le défaut de respiration & l'état de mort apparente ont pour cause une sorte d'apoplexie, sont ordinairement assez forts : ils ne naissent qu'après un accouchement très-long, très-difficile, ou même laborieux. Le visage est d'une couleur violacée, livide, tuméfiée, surtout aux lèvres; les yeux sont saillans, & la poitrine assez généralement couverte de vergetures; les paupières sont gonflées, entr'ouvertes; la conjonctive injectée, les pupilles dilatées.

Les membres sont ordinairement mous, pendant, & demeurent assez long-temps dans cet état après la mort, si la température est élevée; quelquefois aussi, & dans les cas où la vie ne peut être rappelée, la chaleur se conserve pendant douze heures; la couleur violacée de la peau pâlit par la pression.

L'état de mort apparente que nous décrivons, lors même qu'il peut cesser, résiste quelquefois d'abord aux secours les mieux administrés pendant un quart d'heure, & même une heure. Ces secours doivent être employés, en conséquence, jusqu'au moment où le refroidissement ne laisse aucun doute sur une mort absolue ou consommée : ils consistent principalement dans une évacuation suffisante de sang par la section prompte du cordon, ou par l'application de quelques sangsues.

Le précepte que nous avons donné, de ne lier le cordon que quelque temps après la naissance, n'a véritablement point lieu après l'application dans les cas de mort apparente par un état apoplectique.

Cette section, promptement exécutée dans ces cas, fait cesser la congestion sanguine; & si le sang sort par jet à la suite de cette opération, on voit bientôt la respiration commencer à devenir facile. Il importeroit, du reste, de renouveler la section, en la faisant plus près de l'ombilic; si le sang venoit à s'arrêter, ou s'il ne couloit pas assez abondamment, d'après les ingénieuses observations de Salyers. On lie ensuite le cordon; l'application des sangsues seroit tentée si l'écoulement du sang par le cordon paroît insuffisant, ou si l'on apercevoit quelques signes propres à faire craindre les convulsions. Cette dernière maladie a la même cause que l'apoplexie du nouveau-né; & le soin avec lequel M. Dugès recommande de la distinguer des convulsions propres à un âge plus avancé, n'est pas un des points les moins utiles de son excellente Dissertation (1).

On ne devoit pas employer peut-être, en parlant des nouveau-nés, le mot *asphyxie*, qui ne peut convenir que pour la suspension de la respiration bien établie, & non pour le défaut de cette fonction chez un individu qui n'a point encore respiré, & qui a pu vivre pendant neuf mois, sans le concours de cette fonction. Quoi qu'il en soit, l'état de mort apparente des nouveau-nés ne dépend pas toujours d'un état apoplectique; il peut aussi être occasionné par la faiblesse du cœur, la suspension plus ou moins longue de la communication entre la mère & le fœtus, par la compression du cordon ombilical; circonstances qui doivent faire employer d'autres moyens de traitement & de conservation.

L'état dont nous parlons doit surtout être suspect, lorsque l'accouchement s'est fait spontanément par les pieds, ou lorsque l'accoucheur l'a terminé de cette manière, & dans le cas où le cordon a été long-temps comprimé, ainsi que dans la circonstance non moins grave, d'une perte, pendant le travail. Alors le visage du nouveau-né est pâle, décoloré, les membres immobiles & flas-

ques. Il n'existe, ni essai de respiration, ni pulsations du cordon.

M. le professeur Chaussier, persuadé que l'action vitale des vaisseaux ombilicaux subsiste même après le détachement du placenta, recommande dans le cas de mort apparente, sans congestion sanguine, de disséquer la ligature & la section du cordon ombilical, & il pense qu'avec de la précaution, on réussira plutôt à ranimer l'enfant par les stimulans convenables, surtout par l'insufflation de l'air avec le tube laryngien. (*Voyez Noré, Traité laryngien.*)

Cet instrument, si simple dans sa confection & dans son emploi, sert continuellement à l'histoire de la Maternité, à conserver des enfans, dont la respiration tarde trop à s'établir, & feu madame Hachapelle, qui l'a beaucoup employé, disoit souvent que par ce moyen, elle avoit sauvé plusieurs centaines d'enfans, qui seroient infailliblement péri sans un pareil secours. M. Dugès, dans sa dissertation sur les maladies des nouveau-nés, recommande pour l'emploi de ce tube, les précautions suivantes, & une grande persévérance dans l'administration des autres secours.

1°. S'assurer que la canule est dans le larynx, en soulevant son extrémité, & en la portant à droite & à gauche; on voit alors au travers la peau, si le larynx marche avec elle, ou s'il reste immobile.

2°. Souffler avec modération & par alternatives qui permettent à l'air de sortir, & qui imitent les mouvemens de la respiration.

3°. Presser un peu la poitrine dans les intervalles pour simuler l'inspiration.

4°. Nettoyer de temps en temps le tube des mucosités qu'il contient. (*Doctes, Op. cit.*)

On excite aussi l'appareil respiratoire en faisant des frictions sur le thorax, en y jetant de l'eau froide en gouttelettes, en abilligeant & on enlevant les mucosités de l'arrière-bouche, & en stimulant la lèvre & la glotte avec la barbe d'une plume, &c.

L'appareil nerveux est excité aux diverses surfaces libres; ainsi les frictions sèches ou alcooliques, ou vinaigrées, le bain chaud aiguisé de vin ou de vinaigre, les linges chauds, le chatouillement des mains & des pieds, les lavemens, les suppositoires, qui en outre provoquent des évacuations utiles : l'excitation de la pituitaire avec une plume, avec la vapeur de l'éther, de l'alcali volatil : la stimulation de la langue par un peu de vinaigre, une goutte d'éther étendu d'eau; peut-être l'excitation de l'organe de la vue, par une vive lumière : voilà à peu près tous les moyens de ce genre que l'on peut mettre en usage. Ce sont, comme on voit, tous moyens prompts, extemporanés comme l'affection qu'ils doivent combattre.

Lorsque la respiration, ou le nouveau mode de circulation s'est librement ou difficilement établi après la naissance, ces fonctions & les ac-

(1) *Recherches sur les maladies les plus importantes, & les moins connues des nouveau-nés.* Thèse de la Faculté de Paris. Année 1821, in-4°, n°. 64.

ganes qui les exécutent, peuvent être facilement dérangés par diverses causes occasionnelles, ou se présenter que très-imparfaitement la disposition propre à la vie extra-utérine, c'est-à-dire, l'inséparable absolu de l'appareil veineux, & de l'appareil artériel.

Les poumons, au moment de la naissance, ne sont pas seulement plus susceptibles que les autres organes : souvent aussi, malgré leur inaction pendant la vie intra-utérine, ils se trouvent déjà entachés d'une affection morbide capsulotuberculeuse. Les exemples ne manqueraient pas pour appuyer cette assertion, & l'on s'est assuré par un assez grand nombre d'observations dans les hôpitaux, que plusieurs enfans qui paraissent y succomber à des maladies accidentelles, & que l'on pourroit attribuer à des causes occasionnelles, sont victimes de maladies déjà anciennes, & principalement d'affections tuberculeuses.

Quoi qu'il en soit, les poumons des nouveau-nés ne présentent une susceptibilité plus grande, que dans un âge plus avancé ; & l'on fait aujourd'hui que parmi cette foule d'enfans qui périssent d'un à trois mois, dans les hospices, le plus grand nombre est enlevé par des péripneumonies.

La péripneumonie des nouveau-nés, compliquée quelquefois de pleurésie, sans qu'il soit possible de reconnaître cette complication, se manifeste dans un grand nombre de cas, dès le deuxième & le troisième jour de la naissance. Sa cause directe est l'impression du froid, & surtout du froid humide. Ses symptômes sont assez difficiles à reconnaître : on peut la soupçonner, lorsqu'il y a de l'agitation générale, la fréquence du pouls, une respiration difficile, plutôt abdominale que thoracique, de la toux sans quinte. La percussion en l'emploi du stéthoscope ajoutera beaucoup à la valeur de ces signes, en faisant reconnaître par la qualité du son, un engorgement qui a plus souvent lieu en arrière, & du côté droit. Dans les derniers momens, la toux est plus rare, avec une voix faible & sifflante. Alors le pouls est petit, faible. On aperçoit une légère teinte icterique. La chaleur est diminuée : l'enfant ne tète plus ou refuse de boire, & il survient assez souvent une diarrhée verdâtre. Ce n'est guère, du reste, que dans le cas de ce dernier degré de la maladie que l'on découvre le son mat en ébauchant de la poitrine, s'il existe une complication avec la pleurésie.

On trouve à la suite de la maladie, un épanchement de sérosité visqueuse, rougeâtre, assez différente de la matière que l'on observe à la suite d'une maladie analogue chez les adultes. On a rencontré aussi l'engorgement du poumon, surtout en arrière, & la substance de cet organe, en tout ou en partie, plus compacte, plus pesante, & comme hépatisée ; ce qu'il faut distinguer avec soin, d'une apparence analogue du poumon chez les nouveau-

nés, dont la respiration ne s'est pas complètement établie.

Les poumons, dans ce cas, présentent une teinte violacée, ne sont pas pénétrés par l'air dans une partie de leur étendue, surtout du côté droit ; ils sont flasques, crâniés, peu développés, ne remplissant que très-imparfaitement le côté du thorax.

Le lait de la nourrice doit remplacer seul les médicamens que l'on feroit tenté d'administrer, dans le traitement d'une péripneumonie des nouveau-nés, reconnue à temps pour être combattue avec succès. Les boissons émoussées, le sirop d'ipécacuanha, ne sont indiqués que dans la dernière période de la maladie ; l'application de sangsues sur le côté de la poitrine, qui rend un son mat ou obscur, est la partie essentielle du traitement.

Le vésicatoire, dans la troisième période, peut offrir aussi de grands avantages, surtout en l'appliquant aussi sur le côté de la poitrine, qui rend un son mat & obscur.

Le rhume des fosses nasales (coryza), & le catarrhe pulmonaire, qui ne peuvent manquer d'altérer la respiration, sont des maladies très-fréquentes chez les nouveau-nés, & dépendantes, comme la péripneumonie, de la vivacité trop grande des impressions sur des organes qui jusqu'alors n'avaient rempli aucune fonction, & qui se trouvent livrés tout-à-coup à l'action excitante des causes extérieures.

Le coryza des nouveau-nés, maladie à laquelle M. Rayer a consacré assez récemment une excellente dissertation, est du reste bien moins fréquente que la péripneumonie. (Voyez *Revue des roses nasales*.)

Le catarrhe pulmonaire des nouveau-nés, qui règne quelquefois d'une manière épidémique, pourroit se confondre aisément avec le croup, & dans certains cas n'est pas moins funeste. Il se manifeste plus tard, chez les nouveau-nés, que la péripneumonie. La toux qui l'accompagne est plus forte, plus souvent suivie de vomissemens.

Les pédilaves un peu stimulans, le sirop d'ipécacuanha, s'il n'existe point de réaction fibriléo inflammatoire, l'application de quelques sangsues dans ce dernier cas, & plus tard l'emploi d'un vésicatoire sur la poitrine, au-dessous du sein, forment par leur ensemble, le *ratio medendi*, ou le mode de médication du catarrhe pulmonaire.

La maladie des nouveau-nés, connue sous le nom d'*endurcissement* ou d'*induration* du tissu cellulaire, d'après ses symptômes les plus apparens, cette maladie, qui a été si souvent funeste dans les hospices, doit être rapportée, au moins pour le plus grand nombre des cas, à une débilité excessive des organes de la respiration & de la circulation, d'après plusieurs observations très-judicieuses de M. Brochiet, qui n'ont pas encore été publiées, & dont nous devons la connaissance à l'amitié,

aussi généreuse que communicative, de ce savant collaborateur.

L'endurcissement du tissu cellulaire n'a guère été observé que dans les hôpices, c'est-à-dire, dans un concours de circonstances très-peu favorables à l'essai de la vie extra-utérine. Les enfans plus sujets à cette maladie sont le plus souvent nés avant terme, & plus faibles dans tous ces cas que les autres enfans du même âge. Les causes acridités de la maladie sont le froid, l'humidité, la mauvaise nourriture, dont l'effet se combine quelquefois avec une conformation défectueuse des organes de la circulation.

L'action de ces organes s'établit nécessairement d'une manière pénible, incomplète, sous l'influence de ces causes.

Les poumons s'engorgent, & l'hématoxe devient tout-à-fait insuffisante.

Du reste, chez plusieurs enfans qui ont succombé à cette maladie, les recherches anatomiques ont souvent fait reconnaître, d'une manière exacte, les causes & les traces de cette altération morbide. On a trouvé en effet, tantôt une communication des deux oreillettes, tantôt la persistance du canal artériel, & toujours une diminution sensible dans le volume & la consistance du cœur & des poumons. Dans tous ces cas, l'endurcissement du tissu cellulaire se développe, suivant la remarque judicieuse de M. Brechet, de la même manière que l'hydropisie ou l'œdème des extrémités inférieures, à la suite des maladies du cœur ou des gros vaisseaux, chez les adultes; & si l'endurcissement prend la forme de l'induration, il ne faut l'attribuer qu'à la disposition du tissu cellulaire sous-cutané, plus serré, plus résilient chez le nouveau-né que chez l'adulte : tels sont, sans doute, l'état morbide & la profonde altération que présente, dans son développement le plus grave, l'endurcissement du tissu cellulaire, auquel plusieurs causes diverses contribuent dans les hôpices. Mais, d'une autre part, on ne pourroit, sans accorder une trop grande généralité aux conséquences des remarques de M. Brechet, affirmer que la même maladie, portée à un plus faible degré, ne se rattache pas alors à un autre mode de lésion, & qu'elle ne doit pas être comprise parmi les hydropisies essentielles ou primitives, compliquées ou non compliquées d'un état inflammatoire, & offrant même dans une période plus avancée, une dégénérescence, une transformation de tissu, qui ne seroit pas sans analogie avec l'éléphantiasis des Arabes.

Quoi qu'il en soit, le froid très-humide, & peut-être l'encombrement, sont la cause évidente de l'endurcissement cellulaire des nouveau-nés. Plus les bivers sont rigoureux, plus cette maladie est fréquente; & l'on observe qu'elle se le manifeste presque jamais dans l'été, ni dans les contrées méridionales, ni au milieu des familles qui jouissent d'une certaine aisance.

On a distingué une variété assez tranchée dans l'histoire de cette maladie; savoir, l'*induration adémateuse*, l'*induration concrète*. Il n'est pas rare, en outre, d'observer chez des enfans robbles, des exemples d'induration partielle. Voyez, pour plus de détail, *Tissu cellulaire & Sclérose* (Endurcissement du tissu cellulaire), dénomination sous laquelle M. le professeur Chausnier a proposé de désigner cette maladie dans un seul mot, & d'une manière plus conforme au langage philosophique de la médecine.

L'infirmité connue sous le nom de *cyanose*, ou *maladie bleue*, chez les enfans ou chez les adultes, présente une grande analogie avec le sclérose, considéré d'après les vus de M. Brechet. On devroit même peut-être affirmer que son développement suppose un premier degré du mode d'altération qui auroit occasionné l'endurcissement du tissu cellulaire chez les enfans moins faibles, plus soignés & mieux protégés que ne peuvent l'être les enfans que l'on traite dans les hôpices.

La digestion, non moins nouvelle chez le nouveau-né, que la respiration, contribue également à étendre son existence, & l'expose par le fait de cette extension, à des dangers & à des causes de maladies qui ne pouvoient atteindre le fœtus. Si cette fonction, qui s'établit quelquefois avec difficulté, ne s'exerce pas dans un concours de circonstances favorables, elle éprouve bientôt diverses altérations qui contribuent évidemment à la mortalité des enfans dans les hôpices, & au milieu des familles ou trop indigentes, ou trop peu éclairées pour donner un degré suffisant d'attention à l'éducation physique. La difficulté pour l'enfant d'être nourri, soit au biberon, soit par une nourrice étrangère, ou par la mère; les conditions favorables ou défavorables qui le concernent, étant d'ailleurs égales, cette différence entraîne des conséquences que l'on croiroit à peine possibles, si elles n'étoient pas constamment appuyées par l'évidence des faits; je de nombreux exemples n'avoient pas appris qu'il avoit suffi plusieurs fois dans l'hospice des enfans, pour arrêter une mortalité effrayante & les progrès d'une maladie défectueuse, de substituer tout-à-coup l'allaitement naturel à un allaitement artificiel; allaitement qui ne peut, d'ailleurs, avoir quelque avantage que dans le sein d'une famille, & avec toutes les garanties que la surveillance maternelle peut seule donner, pour un semblable régime.

L'essai de l'allaitement & l'expulsion du méconium, chez le nouveau-né, commencent le cercle des opérations qui appartiennent à la digestion. Ces deux opérations ne s'accomplissent pas toujours sans difficulté : ainsi l'allaitement se trouve momentanément gêné, ou même impossible, par des causes qui dépendent d'un vice de conformation, d'un état de faiblesse ou de maladie chez le nouveau-né. Il peut également trouver un obstacle

tacle insurmontable dans la manière d'être de la mère, on ne fournit à l'enfant qu'un aliment insuffisant & même nuisible. Les principaux vices de conformation qui peuvent s'opposer à l'allaitement, ont été exposés au commencement de cet article, on nous occupant des maladies & des lésions organiques antérieures à la naissance.

Le plus ordinairement, & par une sorte de tradition populaire, on fait boire les enfans avant de leur donner le sein. Si le nourrisson est bien portant, s'il est assez heureux pour se trouver nourri par sa mère, cette précaution est assez indifférente : il peut, d'ailleurs, prendre le sein presque aussitôt après la naissance, comme les petits des mammifères, on peu plus tôt, un peu plus tard, depuis six, douze, ou même vingt-quatre heures, suivant qu'il paraît plus ou moins disposé à cette action. Il ne faut jamais oublier que l'action de téter deviendrait bien plus difficile après la montée du lait, & que le conseil donné par Levret de ne commencer l'allaitement que le quatrième jour, n'est point appuyé par l'expérience, mais qu'il ne tend rien moins qu'à augmenter ou à provoquer la fièvre de lait, sans empêcher les écoulemens du sein, que l'on croyoit prévenir par ce retard également nuisible à la mère & à l'enfant.

Dans quelques circonstances, l'enfant est trop faible pour exécuter cette action. Une boisson sucrée, légèrement vineuse, éthérée ou aromatique, le trouve alors indiquée, & on doit y joindre l'impression d'une douce chaleur & de frictions, ou des applications toniques sur les différentes parties du corps.

Un état de fluxus ou d'engourdissement à la suite d'une congestion cérébrale, d'une pléthore universelle, peut rendre aussi le nouveau-né incapable de téter, & doit être combattue par une application de saugfues derrière les oreilles, par une boisson laxative, &c. L'allaitement commence alors beaucoup plus tard, & peut être différé sans inconvénient pour le nouveau-né, pendant vingt-quatre heures. De reste, plusieurs nouveau-nés se lèvent très-librement dès leur premier essai : d'autres, au contraire, montrent moins d'habileté ou d'appétit dans cette opération, & comme si elle exigeoit de leur part une sorte d'habitude ou d'apprentissage.

Le lait de vache, donné seul ou coupé avec de l'eau, & pour le nouveau-né tous les inconvénients du lait d'une nourrice, qui est trop ancien & qui a trop de coagulation. D'après des observations très-judicieuses de M. le professeur Hallé, on doit préférer les boudilles bien faites, à un semblable aliment.

L'expulsion du méconium qui se trouve parvenue dans le gros intestin au moment de la naissance, est favorisée par le nouveau lait, on *colostrium*, auquel on attribue, une propriété laxative, que l'on peut remplacer par une petite dose de sirop de rhubarbe coupé (sirop de chicorée), pour

les enfans qui sont confiés à des nourrices dont le lait est plus ancien que leurs nourritures.

Sa rétention pendant plus de vingt-quatre heures est au état morbide qu'il faut s'empêcher de combattre, & dont l'effet, s'il étoit prolongé, pourroit avoir les conséquences les plus fâcheuses. Dans ce cas, l'enfant donne des signes de souffrances; il est agité; on observe même quelquefois des mouvemens convulsifs; & si l'on peut plus loin les recherches, on s'aperçoit que l'anus est serré, & assez contracté pour s'opposer à l'introduction d'une canule ou d'un suppositoire; il faut préférer, pour triompher d'une pareille constipation, le sirop de fleurs de pêcher, aux substances huileuses & mucosifères, telles que l'huile d'amandes douces, la manne, l'huile de ricin. On pourroit même avoir recours au sirop de nerprun, à la dose d'un on de deux gros, ainsi que le fit le savant médecin Doublet, pour sauver un enfant que la rétention prolongée du méconium avoit jeté dans une espèce de fluxus apoplectique.

La constipation des nouveau-nés, dont les fonctions digestives sont d'ailleurs bien établies, peut être l'effet, soit d'une irritation qui supprime ou diminue les sécrétions, soit d'un état de langueur ou d'inertie du canal intestinal ou du foie. Dans le premier cas, qui devra être soupçonné si le lait de la nourrice est déjà trop ancien, si son régime est devenu tout-à-coup plus nourrissant & plus tonique, & si, de son côté, le nouveau-né est agité, privé de sommeil; dans ce cas, dit-je, il faudra donner des alimens plus doux, plus légers à la nourrice, faire téter le nourrisson moins souvent, lui donner de l'eau d'orge sucrée ou miellée, le baigner, &c. &c. Dans le cas contraire, & est-il-dire, lorsque l'on doit supposer une foiblesse, une insuffisance d'action dans les voies digestives, la magnésie administrée, soit à la nourrice, soit au nourrisson, le sirop de rhubarbe composé, le sirop de fleurs de pêcher, le sirop d'ipécacuanha, le sirop de quinquina magnésien, offriront de grands avantages. On a observé, lorsque d'après un usage que nous sommes loin d'approuver, on associe le lait de vache au lait de la nourrice, qu'il n'est pas rare de distinguer deux sortes de matières dans les excréments, l'une qui semble formée sans le concours de la bile, & l'autre qui paraît colorée par ce fluide. Ces apparences dans les excréments, doivent attirer vivement l'attention. Les matières blanches à la surface, & même dans leur centre, annoncent toujours une nutrition & une digestion incomplètes; ce qui ne peut être attribué qu'à un lait trop consistant, trop ancien, & qui n'est point en proportion avec l'état des organes de la digestion du nouveau-né. Dans ces cas, si l'on ne change pas promptement de nourrice, ou si l'on ne cesse pas l'allaitement artificiel, l'enfant périra bientôt dans un état de marasme & de consomption.

Nous croyons pouvoir ranger sous le titre générale de sécrétions morbides des voies digestives des nouveau-nés, les maladies & les incommodités souvent pénibles, & quelquefois assez graves, que l'on désigne vulgairement sous le nom de *tranchées*, de *stomatites des enfants*, d'*acidités dans les premières voies*, de *diarrhées*, de *hémorrhées*, &c.

Toutes ces maladies se rattachent à un essai difficile de la digestion, qui donne lieu à des sécrétions morbides de la membrane muqueuse du conduit alimentaire, plus ou moins douloureuses & plus ou moins compliquées d'inflammation.

Le premier & le plus fréquent exemple de cette disposition morbide des sécrétions alvines, est annoncé par la couleur verdâtre des excréments, qui manque rarement d'avoir lieu pendant quelques jours lorsque l'enfant n'est pas nourri par sa propre mère. Ce symptôme se dissipe le plus ordinairement assez vite; mais s'il se prolonge, il faut promptement traiter le nourrisson & la nourrice, & faire surtout usage, pour l'un & pour l'autre, de la magnésie calcinée, qui n'agit point alors, suivant la façon vulgaire d'en concevoir l'effet, comme un simple absorbant, mais comme l'un des médicaments les plus propres à rappeler la sensibilité du canal intestinal à son mode habituel ou normal, lorsqu'elle s'en est écartée.

Les tranchées, les stomatites, soit seules, soit combinées avec la formation des excréments verdâtres, annoncent un haut degré d'irritation. Les premières sont le produit, dans quelques cas, de la constipation, & dans tous, d'une cause d'excitement qui change le mode des sécrétions & l'action des organes digestifs, soit qu'elles se rapportent à la nourrice, ce qui est le plus fréquent, soit qu'elles doivent être attribuées au nourrisson. Les tranchées sont ordinairement plus fréquentes de quatre à six mois: quelques nourrissons les éprouvent toutefois aussitôt après leur naissance. Elles ne sont pas continues; elles cessent, se renouvellent alternativement, troublent le sommeil de l'enfant, lui arrachent des cris, provoquent des agitations, quelquefois des mouvements spasmodiques, des véritables convulsions, de la tension, du méconisme, surtout du côté de l'ombilic.

Des bains, des fomentations émollientes, des changements bien entendus dans le régime de la nourrice, un retour vers des habitudes d'alimentation que l'on auroit d'oubliées, de légères purgatives, surtout l'usage de la magnésie, joints à ces changements, doivent faire également partie du régime & du traitement; on auroit recours avec avantage à quelques sangsues à l'anus, si le ventre étoit chaud, douloureux, & surtout si la respiration paroît difficile & un peu courte; ce qui permettroit de soupçonner un certain degré de péritonite ou d'entérite. L'emploi d'un ou de plusieurs émolloires auroit le plus grand succès, dans le cas où l'on pourroit raisonnablement attribuer le mal à la rétro-pulsion d'un

principe d'irritation morbide; ce qui auroit lieu si tout-à-coup des éructs laiteux, ou tout autre exanthème, s'étoient brusquement supprimés.

La diarrhée très-abondante annonce un mode de perversion dans les sécrétions intestinales qu'il importe souvent de réprimer, soit par des vomitifs, soit, & plus directement, par l'usage de l'opium à une dose convenable pour le premier âge. Cette diarrhée, qui doit être arrêtée par les opiacés, est excessive, fébrile, comme colliquative. Elle peut être sans douleur, & manque rarement d'avoir lieu lorsque l'enfant vient de téter. Le nourrisson s'affaiblit, maigrit de jour en jour sous l'influence d'une déperdition semblable. Il ne manque pas toujours d'appétit. On peut le faire sucer ou lui faisant prendre, à différents intervalles, une cuillerée à bouche d'eau sucrée, avec addition d'une goutte de laudanum, depuis un mois jusqu'à six; ce qui le répète de deux heures en deux heures, quatre à cinq fois dans les vingt-quatre heures, si la diarrhée continue.

Le nouveau-né, comme le fœtus, vit bien plus de la vie de nutrition que de la vie de relation; cependant, dès le premier mois, les fonctions du cerveau & toutes les actions qui en dépendent, c'est-à-dire, les actions des sens, l'entendement, le mouvement musculaire, le développement de plus en plus, exigent des soins hygiéniques, ou peuvent offrir plusieurs états morbides, dont quelques-uns se terminent souvent d'une manière fâcheuse. Nous avons déjà parlé de l'apoplexie des nouveau-nés, de l'hydrocéphale & de l'hydrorachis congénitales, maladies qui sont incompatibles avec une longévité d'une certaine étendue.

Les convulsions qui ont pour cause une congestion cérébrale, & le tétanos des négroillons, sont des maladies presque aussi graves.

Les convulsions essentielles & primitives ont lieu sans doute dans plusieurs cas avant la naissance, ainsi que plusieurs mères croient l'avoir reconnu à des mouvements du fœtus devenus tout-à-coup plus vifs & presque douloureux pour elles, par leur force & par leur étendue. Les convulsions accompagnent quelquefois, & assez ordinairement, l'état apoplectique, survient lorsque cet état, après avoir cessé, se renouvelle pour devenir funelle & elles surviennent aussi, sans apparition antérieure d'apoplexie, le jour même, le lendemain, le troisième & le quatrième jour après la naissance.

Lorsque la tête, après un accouchement très-long, présente les signes d'une forte compression, on doit craindre les convulsions dont nous parlons, & qui seront annoncées & caractérisées par les phénomènes suivants: l'embarras de la respiration, des bâillements avec tremblement de la mâchoire inférieure, un léger trismus, la rétention du méconium, la somnolence, la contraction des mains avec toideur des doigts étendus, le pouce demeurant placé sous les autres doigts; la roideur des avant-bras, avec la pronation forcée de la

main, symptôme auquel madame Lachapelle attachoit une grande importance.

L'application des sangsues du côté de la tuméfaction, qui fu présente au crâne, est le moyen le plus efficace à employer pour combattre les convulsions des nouveau-nés; on peut aussi avoir recours aux évacuans; mais on doit éloigner toute espèce de narcotique: l'expérience ayant appris qu'un enfant nouveau-né pourroit être empoisonné avec un gros de sirop diacode.

Le tétanos des nouveau-nés, appelé *tétanos des négillons*, de la fréquence de cette maladie chez les nègres, est caractérisé par le trismus, ou contraction permanente des mâchoires, d'où son nom de *mal de mâchoire*, qui lui a été donné à Cayenne. Il se manifeste ordinairement pendant les deux premières semaines, mais rarement dans les climats froids ou tempérés, & d'une manière désuésente dans les climats chauds, à Cayenne, par exemple, & dans les autres lieux des colonies européennes. On l'attribue au refroidissement subit de l'atmosphère, qui monte, dans plusieurs de ces contrées, à une température très-élevée.

Le spasme tétanique commence par la mâchoire inférieure; il s'étend progressivement aux muscles du cou, à la colonne dorsale qui se renverse, tandis que le ventre fait une très-forte saillie en devant. Les membres, suivant Bajon, qui a bien décrit cette maladie, sont quelquefois agités par des mouvemens convulsifs (*voyez Tétanos des végétoles.*) Le croup spasmodique, la coqueluche, la toux, le strabisme même & les aërvoles partielles de la vue & de l'ouïe, n'appartiennent point d'une manière particulière aux nouveau-nés.

Le ris sardonique, qui doit appeler si fortement l'attention, lorsque le travail de la dentition commence à se manifester, se rapporte, chez les nouveau-nés, à une irritation des voies digestives qui doit faire apporter quelques changemens dans le régime de la nourrice.

La même observation s'applique à la frayeur nocturne & à l'insomnie des nouveau-nés, qui donnent quelquefois tant d'inquiétude, & que l'on dissipe, soit en faisant prendre au nourrisson de légers purgatifs, associés aux antispasmodiques, soit en privant la nourrice de boissons aromatiques ou de vin, & en diminuant dans la nourriture la proportion des substances animales.

La peau & les membranes muqueuses, récemment & vivement excitées chez les nouveau-nés, deviennent nécessairement le siège de fluxions très-actives ou d'irritations dont la communication & les effets sympathiques exercent une grande influence; ces dispositions contribuent à développer plusieurs affections que nous venons de passer en revue; elles expliquent également un grand nombre de maladies propres au premier âge: les aphthes, le muguet, les ophthalmies, une foule d'eczémâtes, tels que les pustules miliaires, les

taches syphilitiques ou non syphilitiques, l'erysipèle, &c. &c.

Les aphthes, le muguet, sont assez souvent l'effet d'un état morbide, d'une altération dans la complexion des nouveau-nés. Ils s'étendent rarement à la propreté, à un genre de vie très-sain, ou à un changement d'une mauvaise nourrice, à quelques légers purgatifs habilement combinés avec le sirop de raisin composé, ou avec le sirop de quinquina magnésien. Le miel rosat, avec addition de quantité suffisante d'acide boracique, peut être employé avec avantage en gargarisme. Certaines éruptions miliaires du sein communiquent quelquefois le muguet à la mère, & les aphthes des nourrissons ont donné souvent lieu chez la nourrice, à des éruptions miliaires très-acrimonieuses & très-douleuruses.

L'ophthalmie des nouveau-nés est une des maladies auxquelles ils sont le plus exposés, surtout dans les hospices: elle est toujours à craindre lorsque l'on aperçoit le boursofflement des paupières & une légère vergeture à leur surface. Cette ophthalmie est très-opiniâtre, & ne se termine toutefois par la cécité, que lorsque elle est syphilitique. Il y a peu de chose à faire au commencement de cette maladie, au moins pour un traitement local. Les colyres astringens, & surtout les colyres avés le sulfate de zinc, sont très-nutiles dans les dernières périodes de la maladie. *VOY. L'OPHTHALMIE DES NOUVEAU-NÉS, ZINC (Sulfate de).*

Les pustules miliaires des nouveau-nés sont bien rarement syphilitiques. (*VOY. LES PUSTULES.*) Les taches qui présentent ce caractère sont d'un rouge cuivreux, bien différentes en cela des taches congéniales, des signes, ou du *navus* des nosographes, qui est d'un brun foncé & d'une couleur vineuse. (*VOY. NAVUS.*) Les pustules vésiculeuses sont en général fort suspectes, surtout si elles se montrent aux pieds & aux mains; & si elles succèdent à une tache rougeâtre ou cuivrée. (*VOY. LES STYLLIS DES NOUVEAU-NÉS.*)

Les pustules qui ne paroissent pas remonter à une origine syphilitique sont peu nombreuses, le dessèchent assez promptement, & ne succèdent pas à une inflammation; elles appartiennent au pemphigus. (*VOY. ce mot.*)

L'inflammation du tissu cellulaire sous-cutané du sein, & même de la glande mammaire, paroît avoir lieu, lorsque la sérosité qui se trouve dans ces parties s'accumule & peut exercer une espèce de compression. Les nourrices, qui regardent ce liquide comme une espèce de lait auquel elles attribuent des propriétés malfaisantes, cherchent à le faire sortir, & contribuent souvent aussi à l'inflammation dont nous parlons, par des compressions & des tractions imprudentes. Les abcès qui surviennent à la suite d'un pareil abcès, peuvent devenir très-considérables; il faut leur opposer de bonne heure des cataplasmes émolliens, &

donner promptement issue à la collection purulente.

La cicatrice ombilicale s'opère ordinairement dans un délai assez court ; mais dans quelques cas l'inflammation & la suppuration qui s'y rapportent, se prolongent & deviennent une véritable maladie. On oppose à un pareil état morbide beaucoup de patience & quelques émollients. Si diverses excroissances se forment un peu plus tard, on les réprime avec l'alun calciné, ou l'acétate de plomb liquide. Dans un petit nombre de cas, ces excroissances se font présentes sous la forme d'un noyau de cerise, qui ne tenait à l'ombilic que par un pédicule. M. le professeur Dubois, qui a bien observé ces tumeurs, dont quelques accoucheurs méconnoissent la nature, paroit préférer, pour les extirper, la ligature, à l'incision.

L'érysiপে des nouveau-nés a souvent été méconnu. Il commence presque toujours par se montrer à l'abdomen, autour de l'ombilic ; il se porte ensuite au ventre, aux cuisses, aux parties génitales, sur tous les points du corps en général, mais rarement & presque jamais à la face. On a vu aussi cet érysiপে se manifester d'abord au crâne, à la circonférence d'un thrombus abcédé : en quittant une partie pour se porter sur une autre, il laisse, comme signe de son passage, un ordème toujours très-considérable aux pieds, aux mains, au scrotum. La durée de la maladie est de huit à quinze jours ; rarement l'érysiপে demeure plus de deux à trois jours à la même place : il est accompagné de fièvre, & peut se terminer d'une manière fâcheuse par l'intensité des symptômes généraux.

Sa terminaison la plus ordinaire a lieu par résolution, avec une légère desquamation : elle peut aussi mener à une suppuration. L'ordème, & surtout l'ordème du scrotum, ne se dissipe que très-rarement.

Dans l'érysiপে il y a fièvre, chaleur âcre de la bouche, symptômes que les nourrices savent bien apprécier ; rougeur de la langue ; dérangement dans les digestions, &c. &c.

Cette maladie est grave & fait périr quelquefois en deux ou trois jours, surtout lorsqu'elle a son siège à la tête. Si elle prend le caractère phlegmonieux, elle produit des abcès dont la guérison est bien lente & bien difficile. Dans son invasion du côté des organes de la génération, elle a produit quelquefois la gonorée.

L'érysiপে des nouveau-nés exige presque toujours l'emploi des laxatifs très-doux, parfois la saignée révulsive.

Tous les exanthèmes & toutes les affections cutanées n'ont pas la gravité des maladies que nous venons de passer en revue : plusieurs sont regardées comme des indispositions légères, & quelques-unes même comme des espèces de déparations salutaires & critiques ; telles sont les croûtes laiteuses, la suppuration des oreilles, & même la teigne marginale chez les sujets scrophuleux.

La croûte laiteuse & la suppuration du derrière des oreilles appartiennent peut-être à l'enfant, plutôt qu'à un nouveau-né ; les plus ordinairement, elles ne se manifestent qu'après l'éruption des dents, avec laquelle elles ne paroissent pas sans liaison.

Cette éruption se montre d'abord au visage, dont elle recouvre toutes les parties, excepté les yeux & le bord des lèvres ; elle s'étend ensuite jusqu'au cou & aux oreilles, & même à la poitrine, au bas-ventre, aux bras, aux cuisses. Dans son premier état, l'éruption a la forme de pustules aplaties & saillantes, qui se remplissent d'une humeur limpide & un peu épaisse. Ces pustules fourmillent dans la soite un liquide glutineux, qui se dessèche par le contact de l'air, en donnant lieu à des écailles qui se fendent au moindre mouvement du visage ; ce qui rend parfois les enfans très-difficiles.

Les croûtes laiteuses, lorsqu'elles se rattachent à quelques dispositions morbides & constitutionnelles, ont une durée indéfinie, sans que d'ailleurs on doive les confondre avec la teigne marginale, qui commence toujours son invasion par la tête, d'où elle s'étend par d'autres parties.

Lorsque les croûtes laiteuses se bornent à une éruption simple & passagère, on les traite avec soin par d'heureux changements dans le régime de la nourrice ; une douce température, une extrême propreté, des lotions quelquefois calmantes, ou légèrement narcotiques, & les démangeoisons étoient trop vives. Dans le cas de complication, il faudra varier les moyens de traitement d'après les données ; qui seront admettre, dans ces cas, l'influence, soit d'une disposition scrophuleuse ou syphilitique, soit d'un mauvais état des organes de la digestion. La rétrocession, ou même la disposition spontanée, mais subite, des croûtes laiteuses, ne seroit pas sans danger, & c'est surtout dans ces circonstances que les émonctoires de divers genres seroient convenablement placés.

(MOREAU DE LA SARTRE.)

NEANDER (Michel) (*Biographie médicale*), habile médecin & apothicaire d'Iéna, naquit à Joachimthal en Bohême, au commencement du seizième siècle (1529). Il fit ses premières études & sa philosophie à Wittenberg, où il fut reçu maître-ès-arts en 1550, & peu de temps après il obtint à Iéna les chaires de mathématiques & de langue grecque : ces fonctions publiques ne l'empêchèrent pas de s'appliquer à l'étude de la médecine, pour laquelle il avoit toujours manifesté beaucoup de goût. Neander fut reçu docteur en médecine en 1558, & devint professeur en cette science en 1560.

Ce savant mourut à Iéna en 1581, avec la réputation d'un homme laborieux. On peut dire de lui qu'il passa la plus grande partie de sa vie à écrire ; il ne nous a néanmoins laissé aucun ouvrage sur la médecine. Ses productions littéraires

les plus remarquables sont plusieurs Traités sur la langue grecque, par Hicrate, Aristote, Eripiide, Lucien, sur la physique & sur les poids & mesures des Anciens. Voici les titres de ces deux derniers ouvrages :

1°. *Synopsis mensurarum & ponderum secundum Romanos, Athenienses, Georgos & Hippocratos, cum Galeno de ponderibus & mensuris*. Basileæ, 1544-1555, in-4°.

2°. *Physica, sive potius Sylloge physica rerum eruditum, ad omnem vitam utilem*. Lipsiæ, 1591, in-8°.

NEANDER (Jean) (*Biographie médicale*), qu'il ne faut pas confondre avec le précédent, étoit natif de Brème. On lui doit plusieurs écrits qui appartiennent d'une manière plus directe à la médecine & à la matière médicale ; on a surtout remarqué les suivans :

Tabacologia, id est, tabaci seu Nicotianæ descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Lugduni Batavorum, 1622-1626, in-4° ; Brème, 1627, in-4° ; Ultrajecti, 1644, in-12 ; en français, Lyon, 1626, in-8° (1).

Synagoga, in quo Medicinæ cum laudis & natalitii, Sectæ earumque placita, tum Cataphyses ejus, Restauratores & Propagatores, &c. descriptur. Brème, 1623, in-4° (2).

Susceptologia. Brème, 1627, in-4°.

(Extr. d'Eloy.) (A. J. T.)

NEBEL (Daniel) (*Biographie médicale*), membre de l'Académie impériale des curieux de la nature, sous le nom d'Achille II, étoit d'Heidelberg, où il naquit en 1664. Il fit d'excellentes études, fut reçu docteur en l'Université de cette ville, & parcourut en voyageant curieux & instruit les différens cantons de la Suisse & de la France. En 1691, Nebel obtint la chaire de professeur extraordinaire à Heidelberg ; mais des considérations particulières, & les événemens de la guerre l'ayant forcé de quitter cette ville en 1695, il se retira à Marburg, où on lui donna une chaire de médecine, qu'il remplit jusqu'en 1708, époque à laquelle il retourna à Heidelberg pour y occuper les charges de premier professeur de la Faculté & de médecin de la cour. Il fut le premier médecin de l'électeur Charles-Philippe, & mourut en 1753.

(1) Cet ouvrage, dont il a été tiré, on grand nombre d'éditions, est fort curieux, & très commun : on y trouve des détails très-étendus sur les différentes espèces de tabac, sur la culture, la préparation & les vertus médicinales de cette plante. L'auteur, qui regarde le tabac comme une panacée universelle, nous en fait voir connoître les moyens de le falsifier, nous apprend à en reconnaître la fraude.

(2) Cataphysique, qui est rempli de fautes & d'anacronismes, est très estimée aujourd'hui ; aussi ne le rappellons-nous ici, que pour avoir l'occasion de placer cette remarque, qui n'avoit point échappé à Eloy.

Nebel a consacré, dans les Mémoires de l'Académie impériale d'Allemagne, un grand nombre d'observations très-curieuses, & les titres de la plupart des dissertations que ce médecin a publiées à différentes époques de sa vie, sembleroient indiquer qu'il s'étoit beaucoup occupé de l'étude de la botanique. Les principaux ouvrages de ce médecin, sont :

De novis inensis botanicia hujus sæculi. Marburgi, 1694, in-4°.

Charakter plantarum naturalis. Francofurti, 1700, in-12..

De plantis verno tempore efflorescentibus. Heidelbergi, 1706, in-4°.

De plantis vernali æstate efflorescentibus. Ibid., 1707, in-4°.

De Rore marino. Ibid., 1710, in-4°.

De Lithotomiâ. Ibid., 1710, in-4°.

De medicamentis chalybeatis. Ibid., in-4°, 1711.

De methodo medendi proportionibus mechanis. Ibid., in-4°, 1712.

De factis extractione ex utero. Ibid., 1713, in-4°.

De morborum genesi & therapia. Ibid., 1715, in-4°.

Nebel eut un fils (Bernard-Guillaume) qui enseigna également la médecine. Il fut reçu membre de l'Académie des curieux de la nature, & publia les Dissertations suivantes :

Dissertatio physica de Mercurio lucente in vacuo. Basileæ, 1719, in-4°.

De Partu tredicesimestri legitimo. Heidelbergi, 1731, in-4°.

De Lethalitate vulneris pericardii. Ibid., 1759, in-4°. (Extr. d'Eloy.) (A. J. T.)

NECKER (Noël-Joseph de) (*Biographie médicale*), né en Flandre en 1729, médecin de l'Université de Douai, botaniste de l'électeur Palatin, historiographe du Palatin, des ducs de Berg & de Juliers, agrégé honoraire au Collège de médecine de Nancy, membre de plusieurs Académies savantes, se consacra dès la plus tendre jeunesse à l'étude & à la connoissance des plantes. Ses ouvrages sont :

Delicia Gallo-Belgica silvestres. Argentor., 1760, 2 vol. in-12.

Methodus muscorum. Manheim, 1771, in-8°, fig.

Physiologia muscorum. Manheim, 1774, in-8°, fig. (1).

Phytologia philosophica. Neuwied, 1790, in-8°, avec planches.

(1) Cet ouvrage a été traduit en français en 1773, sous le titre de *Physiologie des corps organiques*.

Elementa botanica cum corollario. Neoweda ad Rhenum, 1791, 5 vol. gr. in-8°.

Necker mourut à Mannheim en 1793, quelques années après la publication de ses *Éléments botaniques*.

Son nom, que la plupart de ceux qui l'ont porté ont rendu célèbre, rappelle encore celui d'une femme remarquable par sa bienfaisance & son humanité, *Σωζανη Νεκκη*, dont l'occupation favorite fut de contribuer à l'amélioration du régime intérieur des hôpitaux. Elle dirigea en elle-même un hôpital de charité qu'elle fit établir à ses frais à Paris, fut surnommée *la mère des pauvres*; & les gens les plus célèbres de son temps, parmi lesquels on distinguait Thomas & Buffon, lui accordèrent leur estime & leur amitié. On doit à cette femme estimable plusieurs ouvrages, dont voici les titres :

Des inhumations précipitées, 1790, in-8°.

Mémoire sur l'établissement des hospices, in-8°.

Réflexions sur le divorce, 1795, in-8°.

Mélanges extraits des Mémoires de madame Necker, 1798, 5 vol. in-8°. (A. J. T.)

NÉCROLOGIE, f. f. (*Hygiène publique*), de *νεκρός* & de *λόγος* (*Discours sur les morts*). Ce mot, emprunté de la littérature, appartient plutôt aujourd'hui à la langue vulgaire qu'à la nomenclature des sciences médicales. (Voyez *MORTALITÉ*, & le nom technique de *NÉCROLOGIE*, introduit par Plouquet dans le Vocabulaire de la médecine.) (L. J. M.)

NÉCROMANCIE, f. f. (*Médecine morale*), de *νεκρός*, mort, & de *μαννα*, divination (*la divination ou la révélation par les morts*). La croyance à cette révélation a été une des grandes maladies de l'esprit humain dans le seizième & le dix-septième siècle, & même dans la première moitié du dix-huitième.

La nécromancie accidentelle pourroit se présenter, dans certaines circonstances, comme une manière d'être, ou une variété du délire exclusif de la monomanie, & rentreroit alors dans ce qu'on appelle les *visions*. (L. J. M.)

NÉCROPHOBIE, f. f. (*Médecine morale*), crainte de la mort. Cette foiblesse, cette maladie de l'âme, résulte d'une exagération dans l'instinct de la conservation, chez les personnes pusillanimes, ou livrées aux idées les plus absurdes sur l'incertitude & sur les peines d'une seconde vie. Les médecins ne doivent jamais oublier que cette même crainte de la mort ne soit jamais entièrement, du cœur humain, & que les personnes les plus résignées, les plus courageuses en apparence, ont besoin d'être traitées, sous ce rapport, avec beaucoup de délicatesse & de ménagement. Il seroit fâcheux d'être inutile de leur recommander, à ce sujet, de ne pas imiter l'austérité brutale de ce médecin

grec, qui s'indignoit quand il voyoit ses malades avoir peur de mourir, & qu'il leur appliquoit alors ce terrible vers qu'Homère a mis dans la bouche d'Achille :

Paroître est mort, & qui te valoit bien.

Les ménagemens, les soins que plusieurs malades exigent relativement à la crainte de la mort, & à tout ce qui peut la prévenir ou l'affaiblir, appartiennent à l'euthanasie médicale, & pourroient donner lieu ici à des réflexions ou à des observations très-importantes, qui se retrouveront dans d'autres articles. (Voyez *MORT* & (*Rapports du physique & du*), *PASSIONS*, *PEUR*, *TRANQUILLITÉ*, &c.) (L. J. M.)

NÉCROSE, f. f. *necrosis*, du grec *νεκρός*, de *νεκρός*, je muris. On doit entendre par ce mot l'extinction des phénomènes vitaux dans le tissu osseux. Louis, le premier, s'est servi de cette expression dans l'acception que nous indiquons; mais quelques médecins modernes lui donnent un sens plus étendu, & veulent que la nécrose soit la mort & l'exfoliation des tissus organiques indistinctement, & sous ce rapport ce terme seroit, dans beaucoup de circonstances, le synonyme de celui de *gangrène* & de *mortification*. Dans un autre chapitre nous traiterons complètement de tout ce qui est relatif à l'extinction partielle de la vie dans les divers tissus; aujourd'hui nous devons nous borner à signaler les principaux phénomènes de la nécrose, considérée dans le système osseux; encore ne donnerons-nous que peu d'étendue à ce chapitre, parce que cette matière a déjà été traitée dans la partie chirurgicale de cet ouvrage. (Voyez *NÉCROSE* du *Dictionnaire de Chirurgie* de cette Encyclopédie.)

Avant Louis, on confondoit la nécrose avec la carie, ou la distinction se bornoit à reconnaître une carie sèche & une carie humide. Aujourd'hui on ne donne le nom de *nécrose* qu'aux parties solides dans lesquelles la vie est éteinte, & qu'un travail de la nature tend à séparer des parties vivantes, tandis que le mot *carie*, dont les mêmes tissus peuvent être atteints, désigne seulement une altération dans leur mode de vitalité. La nécrose rend les tissus qui en sont atteints, impropres à aucune fonction, & ils deviennent de véritables corps étrangers; tandis que dans la carie, les systèmes organiques peuvent être ramenés à leur état primitif de santé, & continuer à exécuter les fonctions auxquelles la nature les a destinés. M. le professeur Richerand compare la nécrose à la gangrène des parties molles, & la carie aux ulcères de ces mêmes parties. Weidmann est du même sentiment que M. Richerand. Suivant lui, dans la nécrose, la nutrition de l'os est empêchée, & par l'effet d'un travail morbide les éléments de l'os sont détachés. Quoique des parties pussent

sont être détruites par la suppuration, celles où le mal a son siège continuent pourtant à vivre. Au contraire, dans la nécrose, la nutrition & la vie cessent, & la partie devenant étrangère au corps animal, la séparation & l'expulsion deviennent nécessaires, & le plus souvent indispensables. Louis vouloit que la nécrose ne soit que la mort d'une portion de l'épaisseur de l'os : Weidmann critique avec raison le chirurgien français, & il étend la signification du mot, soit à la mort de quelques couches de la substance osseuse, soit à celle de tout le cylindre ou de toute l'épaisseur de l'os. (Voyez WEIDMANN, de *necrosi ossium*.) Chopart (1) & David (2) n'admettent de nécrose que lorsque la partie osseuse, frappée de mort, a été séparée & éliminée, & qu'une nouvelle substance osseuse l'a remplacée.

C'est ici que se confondent manifestement la nécrose proprement dite avec les phénomènes qui en sont la suite. Que dirait-on d'un chirurgien qui n'admettrait de fracture que lorsque le cal se soit formé & aurait consolidé les fragmens osseux ? Le tibia, le fémur, la mâchoire inférieure, la clavicule, l'humérus, le péroné, le radius, le cubitus, sont avec les os du crâne, les parties osseuses le plus communément frappées de nécrose. On voit par cette énumération que les os, dans la composition desquels entre beaucoup de substance cartilagineuse, sont plus spécialement atteints de cette maladie ; c'est implicitement indiquer que la partie moyenne des os longs, le centre des os plats, sont le siège ordinaire de la nécrose, & que dans les vieillards, où les os sont très-compacts & chargés de beaucoup de principes salins & inorganiques, la nécrose doit se montrer fréquemment, tandis qu'elle est rare pendant les premiers âges de la vie.

On a dit que les os superficiels étoient plus que les autres finement organisés, sujets à la nécrose ; c'est sans doute parce qu'ils sont exposés plus souvent à l'action des causes extérieures, car cette situation n'a par elle-même aucune autre influence. Nous voyons le fémur & l'apophyse mastoïde de l'os temporal n'avoir que le peau qui les sépare du contact des corps extérieurs, & cependant ces parties sont rarement nécrosées, tandis que la carie les attaque fréquemment. Ne peut-on pas dire, d'une manière générale, qu'un os est d'autant plus disposé à la nécrose, que ses éléments organiques sont pénétrés de plus de parties salines, & que la vie y est moins active ? Weidmann reconnoît que le climat, le sexe, le genre de vie, ne peuvent disposer à la nécrose. Les professions ne doivent être comptées parmi les causes prédisposantes, que parce qu'elles placent les individus plus ou moins fréquemment sous

l'influence des causes efficientes. Ainsi, les personnes livrées aux travaux corporels les plus pénibles, éprouvent souvent des injures physiques dont la nécrose peut être la conséquence.

Quoique les os cylindriques soient plus que les os plats sujets à la nécrose, cependant cette maladie n'est pas rare dans ces derniers. Percival Pott cite un exemple de nécrose dans lequel le pariétal se sépara en entier, & dans un autre cas ce fut la plus grande partie du frontal dont cette maladie produisit l'élimination.

J'ai vu M. le professeur Dupuytren enlever, sur plusieurs sujets, des pièces osseuses considérables, des os du crâne nécrosés, & dans quelques cas ces os venoient dans leur entier ; j'ai moi-même enlevé, sur des militaires blessés, des portions très-étendues du frontal, des pariétaux de l'occipital ; & je me rappelle surtout avoir extrait de son enveloppe osseuse de nouvelle formation, un tibia qui étoit à peu près dans son entier. Cette extraction fut faite à l'Hôtel-Dieu, dans une des salles des blessés que M. Dupuytren m'avoit chargé de traiter lors de l'occupation de la France par les troupes étrangères. Chopart a vu la plus grande partie du scapulum frappée de nécrose, & séparée du reste de l'os, & j'ai examiné, dans le Muséum de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, l'omoplate d'un cheval, complètement nécrosée & renfermée dans un étui osseux de nouvelle formation : ce qui prouve que les os plats peuvent, comme les os cylindriques à cavité médullaire, présenter des séquestres.

Lorsque la partie moyenne des os longs, ou le centre des os plats, sont atteints de nécrose, la maladie ne s'étend pas jusqu'aux articulations ; mais, dans quelques circonstances, l'os est frappé dans sa totalité & se sépare des os voisins ; c'est le cas que j'ai cité pour le tibia. Les exemples de ce genre ne sont pas très-rare, & M. Brodie en rapporte quelques-uns dans son *Traité des maladies des articulations*. Il en est surtout un où l'extrémité supérieure du tibia fut nécrosée, s'exfolia, & fut extraite de manière qu'il n'y eut plus d'articulation.

Les causes de la nécrose ne diffèrent pas essentiellement de celles de la mortification ou de la gangrène des parties molles. On les a divisées en internes, dépendantes de l'existence de vices généraux dans les humeurs & les solides, ou de la présence d'un virus, & en externes, qui sont l'effet d'une violence extérieure. Cette distinction de causes externes & internes de la nécrose, peut encore s'étendre du siège de l'altération dans le principe de la maladie. Ainsi la nécrose des couches superficielles d'un os long, à la suite de la destruction du périoste par une plaie aux parties molles, par une inflammation ou un abcès, a fait appeler cette nécrose par cause externe ; tandis qu'on a nommé nécrose par cause interne, celle

(1) *Dis. de necrosi ossium*. Paris, 1782.

(2) Observation sur une maladie connue sous le nom de *necrose*. Paris, 1782.

qui succédoit à une altération de la membrane du canal médullaire.

Les altérations, le décollement, la destruction, & en général toutes les maladies du périoste, sont les causes les plus communes de la nécrose, & la mort de l'os n'arrive ici que par défaut de nutrition. Dans d'autres circonstances, la cause a porté son action sur l'os lui-même, & en a attaqué le tissu. Ainsi, le feu, les caustiques, &c., détruisent, par leur action, le périoste, les vaisseaux nourriciers & les couches extérieures de l'os, dont la mort doit être une conséquence toute naturelle. Si le sujet est jeune, d'une bonne constitution, bien portant; si le périoste n'a été décollé que dans une petite étendue, la nécrose pourra ne pas survenir, ou n'être pas sensible, lorsque le chirurgien porte un prompt secours, obtient la réunion primitive, & s'oppose à l'inflammation vive & à la suppuration. Mais si le périoste est détaché dans une grande étendue; si l'os lui-même a été enduit, & que sa substance dénudée ait long-temps été exposée à l'action de l'air, alors une inflammation vive se développe, & la nécrose en fera la conséquence, surtout si le sujet est vicieux, d'une mauvaise constitution, & si le traitement a été vicieux.

Pott, & depuis lui beaucoup de chirurgiens, considèrent les plaies de tête comme pouvant amener après elles la nécrose des os du crâne, surtout lorsque le périoste est déchiré, détruit, que la table externe est contuse, & que l'altération s'étend jusqu'au diploë; alors l'inflammation se développe, gague la lame interne, & produisant le détachement de la membrane dure-mère, l'os se nécrose dans toute son épaisseur. Les mêmes altérations peuvent arriver d'après des causes semblables, sur les autres os.

Il est difficile de concevoir la liaison qui existe entre certaines fièvres dites essentielles & de mauvais caractère, en outre la scarlatine, la rougeole, la petite-vérole & d'autres exanthèmes, & la production de la nécrose; mais ces coïncidences ont été indiquées sans qu'on puisse en donner une raison valable. Il n'en est pas de même pour les scrophules, la syphilis, le scorbut, &c., dont la nécrose est souvent la suite ou la complication. Dans ces circonstances, les os sent réellement le siège d'une inflammation *fun genera*, dont la terminaison a été l'extinction de la vie dans les parties où la phlegmasie avoit son siège. La nécrose des dents, forcée à l'inflammation de la membrane de la cavité dentaire; & dans ces cas souvent l'os maxillaire inférieur est frappé de nécrose partielle, parce qu'en l'a touché, pour calmer l'odontalgie, avec des substances acres, acides ou corrosives. Nous pouvons donc considérer la nécrose comme une conséquence fréquente du mauvais traitement des phlegmasies du tissu osseux ou des tissus voisins, & principalement comme une suite de l'usage local des substances acres, irritantes ou corrosives.

On a dit que l'accumulation d'un liquide purulent, sur une surface osseuse, pouvoit en quelque temps amener la nécrose par l'acreté que ce liquide contractoit par son séjour; mais le pus n'a en lui-même aucune propriété corrosive, surtout s'il n'est pas en contact avec l'air atmosphérique.

Si les os ont été trouvés corrodés, nécrosés ou cariés, lorsque du pus exsilloit dans le voisinage, on a confondu l'effet avec la cause, c'est-à-dire que le pus a été le produit de l'inflammation des os & des tissus voisins, & que la nécrose n'a pu résulter que d'une altération de l'os antérieure à la formation du pus. Nous ne nions pourtant pas que le décollement du périoste & la destruction des vaisseaux ne puissent pas déterminer la mort de l'os; mais le pus n'agit ici par aucune propriété chimique, mais bien d'une manière mécanique.

La nécrose n'est pas une maladie proprement dite, une altération particulière du tissu osseux; il ne faut la considérer que comme un effet, ou le résultat d'un état inflammatoire dans la substance osseuse, quelle que soit la cause de cette inflammation. Jamais la nécrose ne survient sans qu'une altération n'ait existé dans les tissus voisins, & sans qu'un travail inflammatoire ne s'établisse, soit dans le périoste, soit dans l'os lui-même. La nécrose est aux os ce que les escarres, les bourbillons, sont aux parties molles. Il est aussi peu raisonnable de reconnoître l'existence d'une maladie sous le nom de *nécrose*, qu'il le seroit d'admettre celle d'altérations organiques qu'on nommeroit *escarres*, *bourbillons*, &c. Les os sont des organes solides, résistans; lorsque des parties de leur substance sont frappées de mort, ce phénomène est plus apparent que lorsqu'il arrive dans les parties molles, mais il reste toujours le même; & cependant on n'a pas regardé comme formant des maladies distinctes, la séparation par une inflammation eliminatoire des tissus osseux, musculaire, vasculaire, &c., qu'on caustique, une forte contusion ou déformations. Nous nous arrêtons trop facilement à ce que nous sentons nos sens, & notre esprit, naturellement paresseux, ne pousse pas plus loin son investigation. L'étude philosophique des altérations organiques sera découvrir le vide & l'insuffisance de ces distinctions, & démontrera qu'en s'est trop souvent arrêté aux phénomènes secondaires sans remonter au mode de production de la maladie, ou à son génie primitif & général. La nécrose dépend de l'inflammation du tissu osseux, & doit être étudiée avec cette phlegmasie, à peine indiquée dans les auteurs, mais dont la manifestation fréquente est facile à reconnoître. Voyez ORGANIQUES (Altérations).

(G. BACCHET.)

NECTAIRE (Saint-), en NITAIRE (Eau minérale de). St.-Nectaire, grand village bâti sur un rocher, au fond d'une gorge aride, creusée

sur

sur la rive gauche de la Conze, dans la partie méridionale du grand plateau granitique qui borde toute la Limagne à l'ouest, situé à l'ouest d'Issoire & au sud de Clermont. Ce village est éloigné de trois lieues de la première de ces deux villes, & de quatre de la seconde. On y remarque un grand nombre de sources minérales, dont la plus remarquable est la *grande source*, ou celle dite du *Gros-Bouillon*, laquelle, après avoir été perdue depuis l'invasion des Barbares (1), fut retrouvée en 1812, en faisant une source auprès d'une autre source plus petite.

Les eaux minérales de Saint-Nedaire forment d'une masse granitique dans la partie orientale de la masse volcanique du Mont Dore. Elles sont transparentes, & d'une couleur opale, tirant sur le bleu. Limpides près de leur source, elles couvrent le sol sur lequel elles coulent, d'incrustations calcaires qui s'accumulent avec le temps & forment, en divers endroits, des rochers considérables. Dans les journées chaudes & sèches de l'été, dit M. Berthier, auquel nous empruntons ces détails, elles garnissent les herbes dont elles mouillent le pied, d'efflorescences blanches qui sont très-fortement alcalines (2). Ces concrétions variées, celles qui se forment surtout près des sources, ont une saveur oracée qu'elles doivent à l'oxyde de fer que l'eau dépose dès qu'elle est soumise au contact de l'air; les autres sont grises ou blanches, composées de couches concentriques contournées, & affectant des formes bizarres. Elles ressemblent souvent à des choux-fleurs. Ces eaux pousse, en outre, le rempli de fucus qui y croissent avec une grande rapidité (3).

L'eau minérale de Saint-Nedaire a une odeur peu désagréable, dénotant, selon M. Boullay, la présence d'une matière organique azotée, qui aurait éprouvé un commencement de décomposition; odeur que l'on ne remarque pas sans doute sur les lieux mêmes. Ces eaux minérales ont une saveur légèrement salée, un goût de soude en très-grande proportion, & peuvent être regardées comme les eaux alcalines les plus fortes qu'on ait encore rencontrées en France : on a cru néanmoins reconnaître en elles quelque analogie avec les eaux de Vichy & du Mont-d'Ur. Leur pesanteur spécifique a été évaluée à 1,035; la température de celles de la fontaine dite du *Gros-Bouillon*, est de 32° Réaumur.

Chomel, en 1734, avait donné une analyse des

eaux minérales de Saint-Nedaire, mais elle étoit incomplète; aussi, aucun ouvrage sur les eaux minérales n'en fait mention. M. Boullay (1) vient, dans ces derniers temps, de s'occuper de ce travail d'une manière toute particulière, & il résulte des expériences de ce chimiste, qu'un litre d'eau minérale de Saint-Nedaire contient, en poids médicaux, sauf quelques fractions :

Acide carbonique, le quart du volume.	
Carbonate de soude sec.	56 grains.
Hydrochlorate de soude.	53
Sulfate de soude.	3
Carbonate de chaux.	6
Carbonate de magnésie.	6
Silice.	4
Matière azotée, traces de fer.	4
	93 grains..

Ces eaux minérales, prises intérieurement ou appliquées à l'extérieur, soit en douches, soit en bains, ont produit des résultats heureux. M. le docteur Marcon (2), inspecteur de l'établissement thermal de St-Nedaire, les a surtout employées avec succès dans les affections chroniques de l'estomac & des intestins, dans les engorgemens abdominaux, particulièrement dans ceux du foie, dans les leucorrhées rebelles & les affections syphilitiques. Des dartres invétérées semblent avoir cédé à l'usage interne & externe des eaux de Saint-Nedaire. (A. J. T.)

NEEDHAM (Gaspard), célèbre médecin anglais du dix-septième siècle, qui faisoit partie du collège des médecins de Londres, & qui fut un des membres de l'Académie royale de cette ville. Il jouissoit de la plus grande réputation lorsqu'il mourut en 1679.

NEEDHAM (Marchmont) (*Biographie médic.*), autre médecin anglais de la même époque, se fit surtout remarquer dans la patrie par les idées singulières qu'il manifesta publiquement sur l'état & l'exercice de la médecine en Angleterre. Il publia, en effet, plusieurs ouvrages sur ce sujet, dans lesquels il voulut fronder les réglemens qui accordent le droit d'exercer cette profession, seulement aux personnes qui ont donné des preuves de leur savoir & de leur érudition. Needham prétendit prouver, à sa manière, qu'il étoit permis à tout le monde de s'ériger en médecin, sans que l'on fût obligé de se soumettre aux épreuves du doctorat. La police s'en mêla, & l'on parvint à détruire ce chimérique projet, qui ne tendoit à rien moins qu'à favoriser

(1) Ces eaux minérales étoient connues des Anciens : on a trouvé près des sources, un pavé & un bassin, qui sont évidemment les restes de constructions romaines appropriées à l'usage des bains.

(2) *Annales de chimie & de physique*, tom. XIX.

(3) On observe la même production de fucus dans la plupart des eaux minérales. Ces plantes se développent par exemple en si grande quantité dans le bassin de la source dite de l'Hôpital, à Vichy, que si l'on ne vidait pas ce bassin tous les huit jours, il en seroit bientôt encombré. BARTHAZ, *Op. cit.*

(1) Voyez le *Mémoire* de ce chimiste, sur les eaux minérales de Saint-Nedaire, présenté à l'Académie royale de médecine, le 24 avril 1821, & les *Annales de chimie & de physique*, septième année, 1821 : ouvrage dans lequel on trouve des détails aussi exacts qu'intéressants sur ce sujet.

(2) *Nouveau Journal de médecine*, tome X, pag. 345.

le charlatanisme, en compromettant la réputation publique. Needham perfla néanmoins dans les idées jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1678.

NEEDHAM (Vantier) (1), médecin du dix-septième siècle, l'un des membres les plus distingués de la Société royale de Londres, à laquelle il donna un grand nombre de mémoires & d'observations très-curieuses. Il avoit fait la plus grande partie de ses études à Oxford; & son admission prématurée au Collège des médecins de Londres signala, d'une manière remarquable, ses premiers débuts dans les sciences médicales. Il fut médecin en chef de l'hôpital de Sutton, & mourut en 1691. On a de lui un petit ouvrage ayant pour titre : *Disquisition anatomica de formato fætu*. Londini, 1667, in-8°. Amstelodami, 1668, in-12; opuscule qui n'est pas sans mérite pour l'époque à laquelle il a été publié, & qui offrirait encore un plus grand intérêt, si l'auteur avoit davantage cherché à vérifier, par l'ouverture des cadavres humains, les nombreuses expériences qu'il avoit faites sur les animaux. (*Extrait d'Elph.*) (A. J. T.)

NÉFLE, f. f., fruit du néflier. (Voyez NÉFLIER.)

NÉFLIER (*Hygiène, matière médicale*), de la famille des pomacées. Les fruits de cet arbre sont astringens, ainsi que les feuilles, les jeunes pousses & l'écorce. On a attribué très-anciennement aux semences du néflier des propriétés diurétiques, & même la propriété de dissoudre les calculs urinaires; ce qui ne mérite pas d'être discuté ou réfuté, & ce qui ne pourroit exiger quelques développemens que comme un des nombreux exemples des folies & des absurdités vers lesquelles on fut entraîné par ce qu'on appelloit la doctrine des signatures, qui fut mise plus particulièrement en crédit dans le seizième siècle. Les fruits du néflier, comme celui de quelques poiriers, ne deviennent mangeables que lorsqu'ils ont subi,

dans un excès de maturation, le premier degré de décomposition, que l'on connoît sous le nom d'être bleus ou *bleches*; particularité assez remarquable pour devoir être indiquée dans cet article.

Plusieurs autres fruits font dans le même cas : tels sont les fruits de certains poiriers, du premier lauvage, du cormier, & de plusieurs plantes de la famille des ébénacées. Dans la nêfle, ainsi que dans tous ces fruits, l'évair & le calice sont soudés ensemble, de telle sorte que l'on peut établir, comme une règle générale, que l'on ne trouve de fruits bleus que dans des familles à ovaire adhérent. (L. J. M.)

NÉGATES, ou mieux NAGATES, f. m. (*Histoire littéraire de la médecine*.) C'est le nom des jongleurs de l'île de Caylan, qui sont aëliastrologues & médecins. Quelques voyageurs leur ont attribué une certaine sagacité & quelques notions empiriques qui ne seroient pas entièrement à dédaigner. Du reste, les Négates ne font pas seulement appelés pour les maladies, en les consulte aussi pour avoir des horoscopes & pour connoître l'avenir, sur les choses les plus importantes de la vie. Il est probable que, comme tous les charlatans, ils mêlent quelques pratiques d'astrologie à l'empirisme populaire.

(L. J. M.)

NÈGRE. (*Anthropologie*.) Une des grandes variétés de l'espèce humaine, admise par Blombach. (Voy. à ce sujet le *Dictionnaire d'Histoire naturelle* pour les mammifères, & le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*, auxquels appartient tout ce qui concerne la patrie, les caractères de la race humaine, sa coloration, ses mœurs, ses habitudes.)

L'esclavage, la traite des nègres & les maladies qui ont pu en résulter, font des circonstances qui appartiennent, dans leur histoire, à l'hygiène & à la pathologie en particulier. On a évalué pendant long-temps à vingt-quatre millions de francs d'Europe par an le prix des nègres qui se trouvoient exportés par les Européens. La traite fut légalement autorisée en Espagne sous l'empereur Charles-Quint; en Angleterre, sous le règne d'Élisabeth, & en France, sous Louis XIII. Les Quakers commencèrent dès l'année 1727 à y renoncer, & l'abolition entière eut lieu dans la Pensylvanie en 1774; cette abolition fut complètement prononcée en Angleterre en 1808, & en France en 1815.

La continuation de cette traite & l'esclavage des nègres, dans le dix-septième & le dix-huitième siècle, nous offrent dans l'histoire, une de ces grandes épreuves sur l'humanité, dont la philosophie doit, autant qu'il est possible, faire servir les détails au profit de la science, en formant des vœux sincères pour que de pareilles expériences ne soient plus renouvelées. (Voyez à ce sujet l'excellent ouvrage de Thomas Clarkson, sur l'esclavage & le commerce

(1) Plusieurs personnes, se distinguant par le nom de Needham, ont fait-il pas confondre ces trois médecins avec un autre Needham (Jean Tabernacle), recteur de l'Académie des sciences & belles-lettres de Bruxelles : ce dernier acquit à Londres en 1712, fut élevé dans la religion catholique, s'établit dans le diocèse d'Angoulême, à Paris, & devint correspondant de l'Académie des sciences de cette ville. On a de lui : 1°. *diverses observations*, insérées dans l'histoire naturelle de Buffon. — 2°. *Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques, & la génération des corps organisés*, traduit de l'italien, par l'abbé Regley, avec des notes, des recherches physiques & mathématiques sur la nature & la religion, & une nouvelle histoire de la terre. Paris, 1769, 2 volumes in-8°. — 3°. *Nouvelles observations microscopiques*, traduites en partie de l'anglais, par Louis Anne Lavroste, Paris, 1750, in-12. — 4°. *Lettre de Pékin, sur le génie de la langue des Chinois*. Bruxelles, 1753, in-4°. — 5°. *Principes d'histoire, contenant plusieurs thèses appuyées par des expériences nouvelles*, traduits de l'anglais, de lord Mahon. Bruxelles, 1781, in-8°.

de l'espèce humaine : *Essay on the slavery and commerce, of the human species*), & tous les détails de l'enquête dont l'abolition de la traite a été le sujet dans les débats qui ont immortalisé à jamais les noms de Wilberforce, Thomas Fox, Whitbread, &c.

Les maladies que la traite & l'esclavage des nègres ont développées le plus souvent parmi les nègres, appartiennent aux typhus, aux fièvres staxiques ou putrides, aux dysenteries adynamiques. La cupidité, avec le temps, devient plus ingénieuse, & cherche souvent à prévenir par pards défilés, mais d'une manière assez incomplète, & tout-à-fait insuffisante pour les autres maladies que l'esclavage & la nouvelle patrie des nègres ont développées.

Certaines affections plus ou moins graves, dans d'autres contrées, sont beaucoup plus funestes pour les nègres : les maladies éruptives en général, la petite-vérole en particulier. On assure que le peu, dont la contagion existe pour eux & entre eux, ne le communique pas aux blancs. (Voyez *Flax*.) On assure, d'une autre part, que la fièvre jaune respecte le plus souvent les nègres.

Plusieurs maladies convulsives (les convulsions, le tétanos) sont très-communes parmi les nègres. La diarrhée particulière, dont ils sont très-souvent tourmentés, a des signes évidemment inflammatoires, mais se trouve caractérisée par l'état des sécrétions qui sont noires, fuligineuses, sanguinolentes, avec gonflement des régions hypochondriques, un pouls serré & lent ; maladie qui est attribuée à plusieurs causes réunies, mais principalement à la chaleur du climat & à une mauvaise nourriture.

Ce que l'on appelle le *mal d'estomac* des nègres est caractérisé par l'altération de la peau & de la physionomie, par une apathie invincible, par les appétits les plus dépravés, par le désordre le plus grand dans les digestions, & le dérangement consécutif des fonctions digestives, qui se termine par la consomption. L'hépatite aiguë ou chronique, le choléra-morbus, plusieurs maladies de la peau, doivent aussi être distinguées parmi les maladies qui affectent le plus souvent les nègres. Consulter, pour plus de détails, les observations de Pouppe Desportes, de Darille, celles de Lind, de Nicolas Fontana ; les Mémoires de la Société royale, & ceux d'un grand nombre de médecins ou de voyageurs estimables. (L. J. M.)

NIGRE BLANC, ou ALBINO NIGRE. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie* .)

NEGRENDIS, f. f. Absence des dents, suivant Vogel.

NEGUNDO. (Matière médicale.) Arbre qui croît aux Indes, & dont nous ne connaissons pas

encore le véritable nom. Quelques botanistes l'ont confondu avec l'*Acer negundo* de Linné, dont il diffère essentiellement par ses caractères botaniques. Garcia & Lemery lui attribuent des propriétés merveilleuses. (A. J. T.)

NEHENIA (Abraham) (*Biographie médic.*), naît portugais, qui exerça la médecine vers la fin du seizième siècle. On lui doit l'ouvrage suivant, qui a été imprimé plusieurs fois.

Methodi universalis medendi per sanguinis missionem & purgationem Libri duo, quorum alter agit de tempore purgandi & ordine medendi. Accessit de tempore, aqua frigida in febribus ardentibus ad satietatem exhibenda Liber unus. Venetis, 1591-1604, in-4°. (*Extr. d'Elph.*) (A. J. T.)

NEIGE, Nix. (*Hygiène* .) La neige, comme les autres météores aqueux, ne peut être attribuée qu'au refroidissement de l'atmosphère, qui détermine la congélation de l'eau qui s'y trouve interposée. Ce qui concerne le degré de refroidissement nécessaire pour cette congélation, appartient aux *Dictionnaires de Physique & de Chimie* de l'Encyclopédie. (Voyez ce mot dans ces Dictionnaires.) Ce refroidissement est reconnu souvent plusieurs heures d'avance par le malaise qu'il fait éprouver à certaines personnes chez lesquelles on étai de foiblesse ou certaines maladies particulières, ont excessivement développé la sensibilité.

L'éclat de la neige, dans les pays qui en sont long-temps couverts, a été regardé comme la cause de certaines ophthalmies propres à ces contrées.

Six parties de neige non comprimées, & huit parties de marie de chaux, produisent, par leur mélange, un froid si considérable, qu'il peut déterminer la congélation du mercure.

La neige appliquée seule sur des parties que le froid a frappées, est un des moyens les plus utiles pour commencer à les réchauffer & à les ranimer : elle est généralement éphémère, sans ce rapport, pour arrêter les accidents de la congélation dans les contrées les plus froides de la terre. La neige, comme la glace, a été utilement mise en usage dans le traitement de certaines fièvres insidieuses : l'habitude a conduit graduellement, sans doute, les habitants de plusieurs pays très-froids à quitter promptement un bain de vapeurs pour se plonger & s'enlêvrir dans la neige ; habitude dont les heureux effets, dans certains cas, ont beaucoup d'analogie avec l'action des bains de mer & du bain froid. (L. J. M.)

NEIRAC (Eau minérale de), village de la paroisse de Mayres, près Viviers. La source minérale est près de ce village ; à peu de distance de la nouvelle route de Paris : on voit près de cette source des petites fosses que l'on croit avoir été

le cratère d'un volcan. Les animaux qu'on y jette périssent, dit-on, à l'instant. (*Extr. de Carrière.*) (A. J. T.)

NELUMBO. *Nymphaa nelumbo.* (*Matière médicale.*) Nom d'une plante du Nil, qu'on ne trouve aujourd'hui que dans l'Inde; on en voit les fruits figurés sur un grand nombre de monumens antiques: c'est qui doit faire rapporter cette plante à l'histoire des beaux-arts plutôt qu'à l'histoire de la médecine. (L. J. M.)

NENNDORF (Eau minérale de). Cette eau a sa source près de Nenndorf, à cinq lieues de Hanovre & dix lieues du Pyrmont. Elle peut être rangée dans la classe des eaux salino-sulfureuses: son odeur est fétide, sa faveur sulfureuse, balsamique. M. Brachmann, qui en a donné l'analyse, a remarqué qu'elle contenait beaucoup de sulfate de chaux.

On ordonne avec avantage les eaux de Nenndorf dans les affections catarrhales, dans les maladies cutanées, les suppreffions des règles, la chlorose, la paralysie, &c. (A. J. T.)

NENTER (Georges-Philippe), professeur à Strasbourg, vivoit dans la deuxième moitié du dix-septième siècle.

La méditation assidue des ouvrages de Stahl lui en fit adopter tous les principes, mais il admettoit aussi, en théorie comme en pratique, le *fluidum* & le *lacum* d'Holmann: il fut donc, comme il le disoit, éclectique & non Stahlien; comme Sprengel l'a prétendu. En médecine, de même qu'en politique, on se hâte trop d'imposer des dénominations de parti presque toujours plus ou moins illégitimes, puisque tout homme qui se soumet entièrement aux opioïnes, aux doctrines d'un autre homme, est un sot ou un esclave. Les ouvrages de Nenter se distinguent par une pureté de diction bien rare aujourd'hui, par une méthode parfaite & une admirable précision. Si cet auteur a peu fait pour les progrès de la médecine, on peut le citer comme modèle dans l'art d'écrire sur cette science. Personne, mieux que lui, n'a évité le verbiage que l'on a souvent blâmé avec raison chez la plupart des médecins. On a de Nenter:

De reficatorum usu. Strasbourg, 1704, in-4°.

De usua physica in medicinis. Ibid., 1707, in-4°.

Speciminum Commentarii in Dan. Ludovici pharmaciam. Strasbourg, 1708, in-4°.

De statu medicinis hodierno. Strasbourg, 1713, in-4°.

Theoria hominis sani sive physiologia medica. Strasbourg, 1714, in-8°; ibid., 1725, in-8°.

Pathologia medica pars generalis praeimitur introductio de navis pathologiae moderna & activa in morbis. Strasbourg, 1716, in-8°.

Fundamenta medicinae theoretico-practica se-

cundum Stahlii potissimum aliorumque celeberrimorum medicorum placita conscriptum & propriis experientia confirmatum. Strasbourg, 2 vol. in-4°. Venise, 1735, in-fol. (F. G. BOISSEAU.)

NENUPHAR, f. m. (*Matière médicale.*) (*Voy. Nymphaea.*)

NEOGALA, f. m., de νεος, nouveau, & de γάλα, lait. Mot à mot, nouveau lait. (*Voyez Colostrum & Noorrice.*)

NÉPENTHES. (*Histoire de la médecine.*) Les népenthès, rendus si célèbres par Homère, produisoient des effets qui ne peuvent guère être attribués qu'à des préparations opiacées; quelques auteurs cependant ont voulu rapporter l'action des népenthès à d'autres plantes; tels sont Pierre Petit, Adanson, M. Virey, &c.

D'une autre part, M. de Paw, dont les recherches sur les Egyptiens font à la fois si ingénieuses & si instructives, a parlé d'une préparation employée par les chefs arabes, pour opérer une forte d'ivresse, & dont la base étoit la jusquiame blanche. M. Sprengel, qui a porté beaucoup plus de savoir que de philosophie dans l'examen des népenthès d'Homère, ne balance point à les regarder comme une préparation opiatique. Il est du moins certain que le pavot & les différentes préparations, étoient déjà connus & très-célebres avant Homère, comme le prouvent l'histoire & les monumens de l'Egypte. L'usage de l'opium, dans l'Orient, depuis un temps immémorial, s'accorde parfaitement, en faisant un peu la part de l'exagération poétique, avec les merveilleux effets qui se trouvent attribués par Homère, aux népenthès. Il est d'ailleurs probable que le prince des poètes grecs s'est borné à indiquer un arcane dont l'opium pouvoit faire partie, sans vouloir désigner d'une manière particulière le végétal auquel on en étoit redevable. Le mot népenthès se borne lui-même à exprimer ce qui est opposé au chagrin, *νενθεσθαι*, *νενθεσθαι* (dissipant le chagrin & la colère). Il ne faut pas oublier qu'il faut venir cette précieuse composition, ce *φάρμακον* *νενθεσθαι*, de l'Egypte, en considérant d'ailleurs cette contrée comme le pays des prodiges & des merveilles, comme un pays célèbre par l'activité de ses médicaments, la force de ses plantes & le nombre de ses médecins.

Pour terminer cet article d'une manière philosophique & véritablement digne de l'histoire littéraire, on peut assurer que c'est assez mal employer l'érudition que de l'appliquer à la recherche de la plante qui peut correspondre au népenthès, & qu'il est bien plus rationnel de ne voir, dans ce qui le concerne, qu'une tradition populaire que le divin Homère n'a pas daigné de faire entrer dans ses chants immortels.

• NÉPETHES DISTILLATORIA. Genre de plantes naturelles à l'Inde, & dont plusieurs voyageurs ont parlé avec admiration. L'espèce d'urine qui se présente à l'extrémité des feuilles de ce végétal, contient une liqueur rafraîchissante qui ne s'évapore jamais entièrement. On attribue quelques propriétés astringentes à cette plante, & on en retire, par la distillation, une liqueur qui est employée dans les affections inflammatoires & les fièvres ardentes. (L. J. M.)

NÉPHÉLION, f. m., de νεφέλη, nuage. (*Pathologie.*) Dénomination qui se trouve dans quelques auteurs de l'antiquité, pour désigner une tache à peine sensible de la cornée, qui laisse passer les rayons lumineux comme à travers un nuage.

Sauvages, qui manque rarement de confondre les symptômes d'une maladie avec l'ensemble & la succession des phénomènes qui constituent un état morbide, a fait de ce genre, une espèce du genre *leucoma* ou *albago*, qui n'est lui-même qu'un effet consécutif, une suite de certaines ophthalmies. (L. J. M.)

NÉPHÉLOÏDE, adj. (*Pathologie.*) Ce mot a la même étymologie que *néphelon*; il a été employé par Hippocrate, pour caractériser les espèces de floccos ou de nuages qui se présentent à la surface des urines, dans le cours de certaines maladies aiguës, & qui indiquent d'une manière assez sûre, que le moment d'une terminaison heureuse est encore éloigné.

Il n'est pas rare de voir apparaître un pareil nuage aux approches du tétanos, ou du développement d'une maladie en apparence plus grave.

(L. J. M.)

NÉPHRALGIE, f. f. (*Pathologie.*) Mot à mot, *douleur de rein*: En distinguant la néphralgie de la néphrite, on devrait sans doute désigner sous la première dénomination, une névralgie particulière des reins; maladie dont sans doute il a existé des exemples, & qui auroit été confondue soit avec le lumbago très-profond, soit avec l'inflammation calculieuse ou non calculieuse des reins. Nous renvoyons à ce sujet, aux réflexions que nous avons placées dans l'article *MIKRALGIE*, sur les névralgies internes: domaine de la pathologie encore très-peu connu, & dans lequel on ne pourra faire de véritables découvertes que par de bonnes observations & des recherches un peu éloignées de la disposition trop exclusive à ne voir dans toutes les affections morales, que phlegmasies. (*Voyez NÉVRALGIE.*)

(L. J. M.)

NÉPHRE, de νεφρ, rein. (*Pathologie.*) Expression qui n'est pas en usage, mais qui a fourni un grand nombre de composés, tels que *néphralgie*, *néphrétique*, *néphrite*.

NÉPHRELMINTIQUE. (*Pathologie.*) Iscarie produite par la présence des vers dans les reins. (*Voyez NÉPHRITE vermineuse.*)

NÉPHREMPHRAXIS, f. f. (*Néologie.*) Obstruction, embarras des reins, avec douleur grave des lombes. M. Baumes & Plesquet ont voulu faire de ce symptôme une maladie particulière, en méconnaissant sans doute, comme Sauvages le fait si souvent, les vrais principes de la nomenclature médicale. (L. J. M.)

NÉPHRÉTIQUE ou **NÉPHRATIQUE, adj. (*Néologie.*)** Ce qui appartient aux reins. Douleurs ou coliques néphrétiques, par extension du mot *colique*, qui devient l'équivalent de douleur en général, quoique dans la signification primitive, il désigne seulement une douleur particulière du colon. (L. J. M.)

NÉPHRATIQUE (Bois). (*Matière médicale.*) *Guilandina moringa*, de la famille des légumineuses. Ce bois, dont la décoction fut regardée, pendant long-temps comme un médicament très-propre à calmer les douleurs néphrétiques, est tombé en désuétude. (L. J. M.)

NÉPHRIDION. (*Néologie.*) Graisse qui entoure les reins: dénomination employée par Hippocrate, ou plutôt par l'auteur des maladies des femmes, faiblement attribuée à Hippocrate. Ce mot n'est pas introduit dans la langue médicale. (L. J. M.)

NÉPHRITE, f. f. (*Pathologie.*) νεφρις, *néphritis*, de νεφρ, rein (inflammation des reins). On distingue cette maladie en idiopathique & en symptomatique; la première espèce est plus rare que la seconde.

1. *Néphrite idiopathique.* Cette inflammation est aiguë ou chronique: elle peut avoir son siège au bassinet, aux calices du rein; elle peut attaquer la substance mamelonnée, la tubuleuse ou la substance corticale, ou enfin la membrane qui recouvre le rein & le tissu cellulaire qui l'entoure. Toutes ces parties peuvent être atteintes à la fois: il peut arriver que l'une d'elles le soit séparément; mais il est rare que plusieurs ne le soient pas en même temps. Il y a des médecins qui croient que le rein droit est plus exposé à la néphrite que le gauche, qui est protégé par les côtes; d'autres, au contraire, croient que ce dernier est plus souvent atteint d'inflammation que le droit, qui est protégé par le foie. Pour moi, je pense que l'un & l'autre sont également susceptibles d'être atteints. En effet, on l'un des deux seulement est malade, ou tous les deux le sont en même temps, & ordinairement, comme l'observation le prouve, l'inflammation passe de l'un à l'autre de ces organes, & il est rare que tous les deux ne soient pas en même temps plus ou moins enflammés.

Lorsque les parties extérieures des reins sont primitivement attaquées, c'est presque toujours une maladie des parties voisines qui a communiqué cette inflammation; alors la néphrite est une maladie secondaire, & qui fixe moins l'attention des praticiens que la maladie qui a donné lieu à l'inflammation, & qui est très-souvent mortelle.

L'observation n'a pas encore prouvé que la néphrite idiopathique fût plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, ni qu'elle fût plus douloureuse chez ces dernières, excepté pendant la grossesse. On a remarqué que dans l'âge adulte on y étoit plus sujet qu'aux autres époques de la vie: quoi qu'en en dise, les personnes d'un tempérament bilio-sanguin ne paroissent pas être beaucoup plus disposées à la néphrite que les autres.

Cette maladie diffère encore, & par les causes qui peuvent la produire, & par les terminaisons, qui font la résolution, la suppuration, l'induration & la gangrène.

La néphrite peut être simple, ou compliquée d'inflammation ou d'altération organique des viscères de l'abdomen ou des parties voisines.

La péritonite, l'inflammation & les abcès du tissu cellulaire de la région lombaire, & qui environne les reins, la carie des dernières côtes ou des vertèbres lombaires sent au nombre des maladies qui peuvent compliquer la néphrite, & même elles y donnent souvent lieu.

II. Les causes sont extrêmement variées. On a observé que l'exercice violent, les coups, les chutes sur la région des reins, peuvent occasionner cette maladie, de même que les blessures de ces organes. L'usage de certaines espèces d'aliments & de boissons, aussi que la suppression de quelques évacuations, ou de certaines humeurs, sont suivis de la néphrite.

J'ai dit que les exercices violents pouvoient être la cause de l'inflammation des reins: en effet, les sauts, une course forcée, la danse prolongée, l'exercice du cheval, les efforts pour soulever & soutenir des fardeaux, peuvent produire des secousses sur les reins & y développer la néphrite. Les coups, les chutes sur la région lombaire ou sur les reins, les blessures de ces organes, produites par des instrumens tranchans ou par des corps poussés par la poudre à canon, donnent aussi lieu à cette maladie.

L'usage des aliments trop nourrissans, trop salés ou épicés, peut être cause de l'inflammation qui nous occupe, mais surtout l'usage habituel & fréquent des liqueurs spiritueuses, & les caustarides, prises intérieurement.

On a été dans l'erreur, quand on a pensé que l'huile essentielle de térébenthine pouvoit déterminer la néphrite; cette huile est au contraire une substance très-balsamique; je l'ai souvent donnée à très-forte dose dans la néphrite calcu-

leuse: les accidens ont toujours été apaisés, & les malades s'en sont constamment trouvés soulagés.

La suppression de la transpiration à la suite d'un froid subit, la suppression des règles, d'une genèrêe, la métastase sur les reins, de la goutte, d'un rhumatisme, d'une fièvre exanthématique, d'une humeur ptorique, dartreuse, sent souvent la cause de la néphrite. La rétention de l'urine dans la vessie & les orèteres, y donne quelquefois lieu.

L'irritation & l'inflammation de la vessie ou de l'urètre, produites par la présence d'un corps étranger dans ces parties, ou d'une sonde introduite dans l'urètre, peuvent sympathiquement déterminer la néphrite. La péritonite, la carie des vertèbres ou des fausses côtes, une inflammation ou un abcès dans le tissu cellulaire de la région lombaire, font aussi au nombre des causes de la néphrite.

III. *Phénomènes & signes.* La néphrite se distingue, comme nous l'avons dit, en aiguë & en chronique. Dans le premier cas, le malade ressent, après une irritation des reins, une douleur assez ordinairement subite, avec élancement, chaleur plus ou moins vive & profonde. Le rein se tuméfie: il n'est pas sans exemple, quoique ce soit cependant fort rare, que cette inflammation se soit communiquée aux parties voisines; alors la région où le rein se trouve placé, devient sensible, tendue, & augmente de volume. Le malade ne peut toucher la partie ni exécuter de mouvemens sans éprouver de la douleur; mais, dans tous les cas, la fièvre survient; le pouls est ordinairement serré, fréquent & dur. Le malade éprouve une soif souvent inextinguible, presque toujours des nausées, des vomissemens & des coliques. Il y a constipation, rarement diarrhée, & quand elle arrive, elle procure du soulagement. L'urine est d'abord rouge, & quelquefois sanguinolente; elle devient bientôt claire, décolorée. Sa quantité diminue, quoique les envies fréquentes de la rendre aillent en augmentant, & elle ne coule souvent que goutte à goutte. Lorsque les deux reins font ensemble temps enflammés, il survient suppression d'urine; le malade éprouve de l'oppression, des anxiétés, & un malaise général qui lui ôte le repos & le sommeil.

Les symptômes de la néphrite aiguë augmentent & marchent ordinairement sans discontinuer pendant quatre ou cinq jours, ensuite ils se ralentissent un peu, & quelquefois les douleurs diminuent pour reparoître bientôt. La néphrite marche d'ailleurs comme la plupart des inflammations, & va jusqu'à la fin du premier, second ou troisième septenaire; & si alors elle ne prend pas le caractère chronique, elle se dissipe ou se convertit en une autre maladie.

Dans la néphrite chronique, les symptômes

sont moins intenses, & la marche de la maladie est plus lente. L'irritation, la douleur, la chaleur & la pesanteur du rein sont moindres. La pâleur générale de la peau & la petitesse du pouls qui existent alors, annoncent une grande débilité. La foiblesse générale qui a déjà lieu va en augmentant, & cette inflammation donne souvent naissance à une maladie organique du rein qui conduit le malade dans le marasme & à la mort; ou bien, comme dans le cas où la néphrite affecte la marche aiguë, on voit cette inflammation se guérir quelquefois, ou se changer en une autre maladie.

Il n'est pas toujours facile de distinguer la néphrite de la colique & des affections rhumatismales des muscles des lombes & du bassin, parce que souvent ces maladies se compliquent; cependant, dans le cas de colique, la douleur est superficielle, vague, suit le trajet des intestins; dans le rhumatisme ou le lumbago, le douleur augmente par le moindre mouvement; dans la néphrite, au contraire, quand l'inflammation se borne au rein, la douleur est très-profonde: elle n'augmente pas par les mouvements du tronc ni par le toucher.

IV. La néphrite peut se terminer par résolution, par induration, par suppuration & par gangrène.

1°. On doit espérer la résolution, lorsque les symptômes de la néphrite n'augmentent pas d'intensité, que l'irritation, la douleur & la fièvre diminuent, que le malade est moins agité, que les fonctions de l'individu commencent à s'exercer plus librement, que l'urine devient plus abondante, trouble & sédimenteuse. Si la maladie n'est pas troublée par aucun accident, la résolution de la néphrite arrive avant le septième, le quatorzième ou le vingt-unième jour.

2°. Au lieu de se résoudre, la néphrite peut se terminer par induration. Cette terminaison a plus particulièrement lieu dans la néphrite chronique. Dans ce cas, le rein augmente de volume, devient dur, squirrheux; la sécrétion de l'urine est diminuée & altérée, la substance du rein se transforme en d'autres tissus ou se déorganise, & entraîne tôt ou tard la mort de l'individu. (Voyez REIN.)

3°. La suppuration s'annonce par la durée & par l'accroissement des symptômes inflammatoires, par la fréquence des accès de la fièvre, qui est avec frisson, toux & nausées, puis chaleur, soif & sueurs. On juge que le pus se forme, par les frissons plus rapprochés & irréguliers, par la diminution de la douleur, des élanchemens & de la chaleur du rein. On voit que la suppuration est faite, lorsque l'urine devient plus froide & plus trouble, qu'elle est sanguinolente & ensuite mêlée de pus. Ainsi, la suppuration peut être entraînée au dehors avec l'urine, ou bien le dépôt peut percer dans le colon, & le pus sortir

par les selles; mais très-souvent le pus s'amasse dans le rein, le déorganise ou se répand dans les parties voisines. (Voyez REIN.)

4°. La terminaison de la néphrite par gangrène n'est pas très-commune; cependant elle peut avoir lieu, & elle arrive eu effet. Chopart en rapporte un exemple: le malade mourut le neuvième jour de la maladie. L'abric de Hilden perdit son fils aîné d'une néphrite terminée par gangrène, le septième jour de la maladie. Cette terminaison funeste s'annonce par la cessation subite de tous les symptômes, par la petitesse & la foiblesse du pouls, par la prostration des forces, qui ne tarde pas à être suivie de la mort.

La néphrite & toutes les terminaisons peuvent faire subir un grand nombre d'altérations à l'organe qui en est le siège. (Voyez REIN.)

V. Pronostic. La néphrite idiopathique est en général moins fâcheuse que la symptomatique; la chronique présente plus de danger que la néphrite aiguë. Il y a plus à craindre, lorsque toutes les parties d'un rein sont atteintes, que lorsqu'il n'y en a qu'une; lorsque les deux reins sont au même temps malades, que lorsqu'il n'y en a qu'un seul. La néphrite superficielle est moins grave que celle qui siège profondément, parce que, dans ce cas, les fonctions des reins doivent être plus dérangées.

La néphrite simple est moins dangereuse que la néphrite compliquée, & celle-ci à un degré de gravité plus ou moins grand, selon la nature de la complication: ainsi, la péritonite, l'inflammation, & les abcès du tissu cellulaire qui environne les reins, la corré des os voisins, l'altération organique des viscères de l'abdomen, rendent la néphrite très-fâcheuse.

Quand la néphrite dépend d'une contusion ou de la blessure du rein, cette inflammation est en raison de la gravité de la lésion du cet organe: en général, le pronostic est plus ou moins fâcheux, selon la difficulté que l'on éprouve à détruire la cause de la maladie. Lorsque la néphrite est accidentelle, elle est moins grave que lorsqu'elle est constitutionnelle.

La terminaison de la néphrite par induration est une maladie qui est tôt ou tard suivie de la mort. Lorsque, dans cette maladie, la suppuration est arrivée, c'est une chose grave, & qui a ordinairement des suites très-fâcheuses. La gangrène du rein entraîne toujours la mort du malade.

VI. Traitement. Pour traiter cette maladie, il faut d'abord combattre le caractère essentiel de l'inflammation, ensuite les causes qui l'ont produite; après cela, on doit se conduire selon la terminaison qu'affecte la maladie, & enfin on cherchera à prévenir le retour de la néphrite.

On combattra efficacement le caractère essentiel de la néphrite, dans le commencement, par le repos, par une diète sévère, & par les saignées

générales du pied, du bras, plus ou moins abondantes & plus ou moins rapprochées, selon la force du malade & l'intensité de l'inflammation. L'application des sangsues à l'anus ne doit pas être négligée. Les ventouses scarifiées à la région lombaire sont toujours utilement employées. On fera prendre au malade un ou deux bains dans la journée, & il y restera une heure au moins chaque fois. On appliquera sur la région affectée, & même sur tout le ventre, un cataplasme fait avec la farine de graine de lin, ou bien des compresses trempées dans une décoction chaude de plantes émoullientes, & que l'on renouvellera toutes les deux heures. On propose, pour la même indication; l'application sur les lombes d'une vessie pleine de lait tiède. Les lavemens émoulliens ne doivent pas être négligés; on peut même les rendre de temps en temps légèrement purgatifs. Les boissons seront adoucissantes & un peu diurétiques. On donnera à cet effet du sirop d'orgeat étendu d'eau, ou des émoulliens d'abord simples; on pourra ensuite y faire entrer un peu de camphre & quelques grains de nitre. Dans l'inter valle, on pourra donner un peu d'eau de veau ou du puerlet, dans laquelle on aura fait bouillir quinze ou vingt amandes douces. L'eau de graine de lin est très en usage & très-utile. Comme la néphrite cause quelquefois de très-vives douleurs & de l'agitation, on pourra les calmer avec une once de sirop de diacode; on pourra même aller jusqu'à deux onces dans les vingt-quatre heures; on bien on fera entrer dans une potion appropriée vingt ou vingt-cinq gouttes de laudanum de Beaulieu & un demi-gros d'ether sulfurique; ou bien on donnera simplement un grain d'opium gommeux, & l'on pourra, si le cas l'exige, en porter à des fois jusqu'à deux grains. Si un état saburral se manifeste, soit dans le commencement, soit dans le cours de la néphrite, les vomitifs doivent être employés.

Il faut tâcher de rétablir la transpiration & les règles, lorsqu'elles sont supprimées, & qu'elles sont cause de la néphrite. Pour rappeler la goutte, ou déplacer une affection rhumatismale, on emploiera des sinapismes: on en fera de même dans le cas d'un érysipèle répercuté sur les reins, ainsi que pour les dartres & la gale, quand ces maladies sont la cause de la néphrite; mais souvent alors on est obligé de recourir aux vésicatoires, au cautère, que l'on applique aux cuisses ou aux jambes. Il faudra également rappeler la gonorrhée si elle est supprimée, fumer le malade & vider la vessie, si l'on croit que la rétention d'urine soit la cause de la néphrite. Lorsqu'une maladie environnant les reins a donné lieu à la néphrite, c'est cette maladie qui ordinairement fixe essentiellement l'attention du praticien.

Les moyens que nous venons d'indiquer sont ceux que l'on peut employer avec le plus d'espérance de succès pour obtenir la résolution de la

néphrite; mais si, malgré l'emploi de ces moyens, la maladie, au lieu de guérir, ne fait que changer de nature, & qu'elle se termine par induration, par suppuration ou par gangrène, ce sont trois maladies nouvelles qui demandent du détail & un traitement particulier que l'on trouvera à l'article REIN. (Voyez ce mot.)

On prévient le retour de la néphrite en combattant les causes qui peuvent la produire, & en éloignant toutes les irritations générales, & surtout celles qui pourroient agir directement sur les reins. C'est sur ces deux bases que doit s'appuyer la conduite du malade & du médecin pour éloigner & empêcher le retour de l'inflammation du rein.

1. *Néphrite calculieuse ou symptomatique*, d'après le chemin que parcourt ordinairement les petits graviers ou calculs qui se forment dans les reins. Cette inflammation peut avoir son siège à la substance tubuleuse, à la substance mamelonnée, aux calices ou au bassinet du rein. On conçoit effectivement que la néphrite peut avoir son siège dans une de ces parties séparément, ou sur plusieurs en même temps, & se propager de la substance du rein vers le bassinet, ou de celui-ci vers la substance du rein. Cette espèce de néphrite, comme la première, ne se rencontre pas plus souvent dans le rein gauche que dans le droit: l'enfance & la vieillesse y sont plus exposées que les personnes adultes. Cette maladie n'est pas plus fréquente chez les hommes que chez les femmes; il paroit cependant que les femmes, pendant la grossesse, y sont plus sujettes, de même que les personnes qui sont des excès de table, qui se livrent à la débauche, & celles qui ont beaucoup d'embonpoint.

Cette maladie a été observée aussi chez les personnes qui dorment long-temps dans une situation horizontale, & chez celles qui sont forcées de rester couchées sur le dos pendant plusieurs mois, comme dans le cas de fractures des membres inférieurs, dans la paralysie, & chez les gouteux qui ont des accès de longue durée. Les enfants nés de parents gouteux ou calculeux sont plus sujets à la néphrite que les autres individus.

II. Les causes de cette espèce de néphrite sont les pierres urinaires qui se forment dans les reins. Les graviers ou les calculs d'un petit volume, qui sont inégaux, raboteux, qui offrent des aspérités & qui sont mobiles, déterminent la néphrite en irritant continuellement, par leur présence & leur poids, la partie dans laquelle ils sont enfoncés, & produisent tous les symptômes & tous les accidents qui accompagnent cette maladie: ces graviers causent quelquefois plus de douleur que les calculs qui se forment dans les reins & qui prennent un grand volume.

III. *Phénomènes & signes*. On ne connoit la néphrite calculieuse que par la sortie des graviers avec l'urine. Si, chez des sujets qui ont rendu des pierres,

pièrres, il se manifeste tout-à-coup ou par degrés, à la suite d'abus dans le régime de vivre, & principalement après un exercice immodéré, des douleurs néphrétiques, des symptômes d'irritation, de spasme & d'inflammation, il n'est pas douteux que l'individu ne soit atteint de néphrite produite par de nouveaux calculs arrêtés dans l'épaisseur des reins ou leurs dépendances. Les calculs des reins peuvent être petits ou volumineux, fixes ou mobiles, & susceptibles d'être déplacés par l'exercice & les secousses du corps.

Si le calcul est gros, immobile, il produit un sentiment pénible de pesanteur dans la région des reins, & une douleur obtuse; mais la sécrétion & le cours de l'urine éprouvent peu de changements: s'il est aigu, hérissé d'aspérités ou de pointes, à ce sentiment de pesanteur se joignent des douleurs piquantes ou lancinantes, principalement lorsque le malade s'incline en avant ou se penche par le côté. Le poulx devient vis, fréquent; l'urine coule avec difficulté ou se supprime totalement; l'insomnie, l'agitation, surviennent; des nausées & d'autres symptômes d'irritation se manifestent.

Lorsque le calcul est petit, isolé, inégal, parsemé de pointes & mis en mouvement par l'exercice, par des secousses plus ou moins fortes, par le cours de l'urine ou par toute autre cause, alors la douleur devient aiguë, continuelle, ou laisse un peu d'intervalle: elle peut porter les effets sur l'estomac, aux intestins. Si le calcul siège dans la continuité de l'urètre, la douleur se propage le long de ce conduit jusqu'à l'aîne, au pubis, aux parties génitales. Quelquefois le testicule du côté affecté, & même tous les deux, souffrent une rétraction vers l'aîne: ces organes peuvent même s'atrophier & se détruire spontanément. Quelques malades ont la cuisse tremblante & engourdie; ils éprouvent une sensation de froid aux extrémités inférieures.

Le poulx est petit & serré; le malade est agité; il trouve du soulagement à se tenir courbé, à se coucher sur le côté. L'urine est brûlante, rouge, sanguinolente, & dépose du sang pur; elle devient ensuite limpide: elle coule en petite quantité, & quelquefois elle se supprime. Il survient des nausées, des vomissements de matières de différente nature. Le ventre est tendu, douloureux; les évacuations alvines font très rares.

Les accès peuvent durer plusieurs heures, un jour, & même davantage. Après la rémission, les urines font colorées, bourbeuses, graveleuses, & quelquefois mêlées de glaires. Dans quelques cas, le pissement de sang continue, les ardeurs & les cuissons en urinant subsistent; l'inflammation augmente; la fièvre a des redoublements avec frissons, ensuite chaleur & sueur; la suppuration s'établit, le rein s'ulcère, l'urine est troublée, mêlée de pus & de mucosités. Si ces matières discontinuent de sortir par l'urètre & la vessie, il peut se former un ou plusieurs foyers purulents, soit dans le bas-

sinet, les calices ou la substance du rein, soit dans le voisinage de ce viscère. (Voyez REIN.)

La néphrite calculueuse a été confondue avec le lumbago. Pour distinguer ces deux affections l'une de l'autre, il faut se rappeler que, dans la dernière, le siège de la douleur est aux muscles des lombes; elle augmente par le toucher & par le moindre mouvement; dans la néphrite, au contraire, la douleur est profonde, & les muscles de la région lombaire en sont exempts; mais quelquefois ces deux maladies se compliquent; alors on ne peut reconnaître le véritable caractère du mal, comme nous le verrons plus bas, que par les symptômes qui ont précédé.

On a vu des malades, lors de certains accès d'hystérie, éprouver des douleurs profondes dans la région des reins, accompagnées de suppression d'urine, de nausées & de vomissements de matières bilieuses, qu'on a pris pour les symptômes de la néphrite.

A l'ouverture du corps de plusieurs sujets qu'on avoit crus atteints de néphrite d'après les symptômes qui avoient précédé, on a trouvé des squirrhes, des abcès au pancréas, au méfentère. La rate a été trouvée dure, volumineuse, & couchée sur le rein. Des tumeurs des intestins, également appliquées sur ce viscère, avoient donné lieu à des accidents qui avoient fausement fait présumer l'existence de la néphrite, & chez ces sujets les reins étoient absolument sains & ne contenoient, dans leur épaisseur, ni graviers ni calculs.

Ainsi plusieurs affections peuvent en imposer & être prises pour l'inflammation des reins. Mais si le malade qui se plait de néphrite est né de parens calculueux; si, avant l'accès, il a rendu avec l'urine des graviers ou de petits calculs, surtout s'ils sont sortis après un exercice violent, des secousses de cheval ou de voiture, alors on est fondé à croire que les symptômes qu'il éprouve sont causés par une néphrite calculueuse: hors ce cas, on peut quelquefois se tromper sur la cause & le vrai caractère du mal.

IV. *Pronostic.* La néphrite calculueuse est, en général, plus fâcheuse chez les vieillards que chez les jeunes gens. Chez les femmes enceintes, cette maladie peut déterminer l'avortement; ainsi elle a alors un degré de gravité plus grand que hors l'état de la grossesse. La néphrite calculueuse est dangereuse chez les sujets très-irritables, chez ceux qui ont des accès fréquents de douleur, qui urinent difficilement, dont les pierres récales sont mobiles, anguleuses, hérissées de pointes: elle est toujours très-grave, & souvent mortelle, lorsqu'il y a pissement de sang, de pus, & fièvre lente. Le pissement de sang devient surtout dangereux lorsqu'il résiste aux moyens généraux de curation; lorsqu'il est abondant, que le malade est vieux, scorbutique, sujet à de fréquents accès de néphrite, ou de douleurs constantes dans les reins; qu'il urine en même temps des mucosités purulentes.

qu'il y a fièvre & des symptômes d'ulcération & de déorganisation de ces viscères.

V. Deux indications principales sont à remplir dans le cure de la néphrite calculuse; c'est de détruire l'inflammation & d'en prévenir le retour.

La première indication curative est de combattre les symptômes d'irritation inflammatoire. Pour atteindre ce but, la saignée doit être pratiquée dans les premiers momens de l'accès: l'âge, l'état du poulx & la violence des douleurs doivent régler le nombre des saignées & la quantité de sang qu'il convient de tirer. Chez les sujets sanguins & robules, on recommence quelquefois au bout de quelques heures: le poulx qui étoit petit & serré, se développe après la saignée & bat avec plus de force, de simplicité & moins de fréquence. Si, après les saignées générales, les malades n'éprouvent pas assez de soulagement, on emploiera avec succès des sangues à la marge du anus, surtout s'ils ont des hémorrhoides, ou s'ils ressentent encore de la chaleur dans la région des reins, ou dans l'hypogastre.

On leur prescrit l'usage du petit-lait, de l'eau de poulet, de veau, de gomme arabique, de grain de lin, de fleurs de mauves, les émulsions avec la graine de pavot & les amandes douces; on y ajoute du nitre à la dose de quinze à dix-huit grains par pinto, & l'on édulcore la boisson avec le sirop d'orgeat, de gomme, de guimauve: on bien on leur donne à boire de la limonade emuite, de l'orangeade, ou le sirop de groseille, de limon, dans l'eau légèrement nitrée; on leur fait prendre des bains, des demi-bains, & on les y laisse autant de temps qu'ils peuvent les soutenir; puis on emploie les fumigations, les vapeurs chaudes & humides, enfin les cataplasmes de riz, de graine de lin, sur la région des reins & de l'abdomen. Dès le commencement de l'accès on fait prendre des lavemens au malade, alternativement émoulliens & légèrement purgatifs, & l'on doit surtout continuer l'usage des premiers. Il est souvent nécessaire de lui administrer des potions calmantes & antispasmodiques.

L'introduction de la sonde dans la vessie est un des premiers secours, si l'urine est retenue dans ce viscère.

Lorsque ces moyens ne réussissent pas, & que les douleurs & l'inflammation persévèrent, la supuration & la déorganisation des reins sont à craindre; on ne peut alors administrer que des diurétiqes plus forts pour déterminer le pus à passer au dehors avec l'urine: s'il prend cette voie, la chose est moins grave, mais il reste souvent au rein un ulcère qui détruit cet organe, & qui conduit le malade au marasme. Ces ulcères sont ordinairement incurables, on d'une guérison très-difficile: pour modérer les progrès du mal, on continue les adoucissans. Si les symptômes diminuent, on emploie les boissons d'eau d'orge miellée, les balsamiques, très ou une potion faite avec quatre gros d'essence de térébenthine, six

gros d'éther sulfurique, & une once de sirop diacode; on mêle ces trois substances, & on en fait prendre au malade une cuillerée à café tous les soirs, dans un verre d'eau sucrée: on peut faire prendre aussi les émonues à petite dose. On recommande au malade le repos; on le met à l'usage d'alimens doux, du lait d'ânesse, du lait de vache coupé avec de l'eau de chaux. Quoique le pus s'écoule par les voies urinaires, il le forme quelquefois des abcès à la région des lombes ou à ses environs.

Lorsque les symptômes de la néphrite calculuse sont calmés, ou que l'accès de la colique est dissipé, on tâche d'en empêcher le retour en employant les moyens propres à diminuer le volume & les aspérités des calculs, afin qu'ils n'aient le moins possible, & l'on fait en sorte qu'ils n'aient procurer l'expulsion. (Voyez REN.)

(P. RIBES.)

NÉPHROGRAPHIE, f. f. (*Pathologie*.) *Nephrographia*, dérivé de *néphros*, rein, & de *graphein*, description. Partie de l'anatomie qui a pour objet la description des reins, de leurs fonctions & des maladies qui peuvent les affliger.

Dans la description de ces organes, il faut considérer, 1°. leur nombre, qui est variable: en effet, au lieu de deux reins qui existent ordinairement, il n'y en a quelquefois qu'un seul, & d'autres fois il y en a trois; 2°. leur situation & leur volume, qui éprouvent aussi quelques variations; 3°. leur forme, qui est assez constante, & n'est pas cependant sans subir quelques petits changemens pendant les différentes époques de la vie.

Après avoir vu ce que l'extérieur de ces organes offre de particulier, il faut examiner leur couleur, leur épaisseur & leur densité. La substance corticale, la tubuleuse & la mamelonnée, les calices & le bassinnet doivent être considérés, tant séparément que dans leur ensemble. On recherche ensuite comment les artères, les veines rénales, les vaisseaux lymphatiques & les nerfs vont se distribuer dans les reins. La membrane qui enveloppe ces organes, & le tissu cellulaire dans lequel ils sont plongés, méritent aussi qu'on y jette un coup d'œil.

Après avoir exposé tout ce qui est relatif à la structure du rein, on passe aux phénomenes & au mécanisme de la formation de l'urine, aux causes qui déterminent cette formation, aux usages de cette fonction & aux altérations morbides qu'elle peut éprouver. Telles sont ces altérations: l'urine peut être diminuée ou totalement supprimée, ou bien elle peut être augmentée. Elle peut changer de nature, être dépravée, sortir sanguinolente, mêlée de pus, de glaires ou de graviers.

On s'occupe ensuite des maladies du rein, qui sont les plaies, l'inflammation, les abcès, les ulcères, les fistules, le squirrhe, la gangrène,

les vers, les hydatides, les calculs, les dégénérescences, & les transformations de diverses substances du rein en d'autres tissus, &c., &c.

Comme le mot *néphrographie* est peu usité, il convient de renvoyer tous les détails de cet article au mot *REIN*. (F. RIES.)

NÉPHROLITHIE, adj. (*Pathologie*). *Nephrolithus*, de *νήσος*, rein, & de *λίθος*, pierre; rein calculeux ou contenant des pierres; ce qui tient à la pierre dans le rein. Ce mot est peu usité. (Voyez CALCUL DU REIN, NÉPHRITE CALCULEUSE, NÉPHROTOMIE, PIERRE.) (F. RIES.)

NÉPHROLOGIE (*Nosologie*), de *νήσος*, rein, & de *λόγος*, discours. Discours, dissertation sur les reins. Ce mot est peu usité. (L. J. M.)

NÉPHRO-PHLEGMATIQUE (*Nosographie*), maux des reins. Dénomination qui est peu employée: elle a été donnée par Sauvages à l'ischurie muqueuse, ou qui tient à la sécrétion d'une urine muqueuse. (L. J. M.)

NÉPHROPLÉGIQUE, **NÉPHRO-PLÉTHORIQUE**. (*Nosographie*). Ces deux mots qui ont été donnés, le premier à la paralysie, & le second à une espèce de plethore ou de congestion de ce viscère, ne sont presque pas en usage. (L. J. M.)

NÉPHROPYIQUE (*Nosographie*), suppuration des reins, du grec *νήσος*, rein, & de *πύον*, pus.

NÉPHROSPASTIQUE (*Nosographie*), de *νήσος*, rein, & de *σπασμός*, je serre. Spasme des reins; se dit de l'ischurie, qui dépend du spasme des reins. (L. J. M.)

NÉPHROTOMIE, f. f. (*Nosographie*). *Nephrotomia*, de *νήσος*, rein, & de *τομή*, je coupe; dissection des reins, ou incision faite à ces organes: de-là on donne le nom de *néphrotomie* à une opération par laquelle on ouvre les reins pour en extraire un ou plusieurs calculs.

On suppose que cette opération peut être pratiquée dans trois circonstances différentes: premièrement, dans le cas où la substance du rein contenant des pierres, est dans son intégrité; secondement, lorsque le rein est abscédé, que les calculs sont encore dans son tissu, mais que le pus s'est porté à la région lombaire; en troisième lieu, lorsque la pierre a été entraînée avec le pus, & qu'elle se trouve déjà dans le dépôt, ou qu'elle est plus ou moins rapprochée de la peau.

1. La néphrotomie est-elle praticable dans le cas où les reins sont dans leur intégrité? Cette question a été agitée dans deux thèses soutenues à la Faculté de médecine de Paris, l'une en 1622, par Jacques Coussinot, & l'autre en 1754, par Bordenave, & l'on conclut à la possibilité d'ouvrir le rein calculeux pour en tirer la pierre.

Dans une autre thèse, soutenue la même année 1754; au Collège de chirurgie de Paris, par *Musquelier*, sous la présidence de *Bordenave*, on nie que cette opération soit praticable sur le rein, lorsqu'il est dans son état d'intégrité. Cette opposition de sentiments entre les deux premières écoles d'alors, fut ce qui déterminait le professeur *Hévin* à entreprendre les recherches historiques & critiques sur la néphrotomie, recherches suivantes & très-profondes, qui ont contribué à assigner à leur auteur une place distinguée parmi les académiciens de son temps.

II. La néphrotomie n'a jamais été pratiquée. Elle n'est point praticable sur les reins, lorsqu'ils sont dans leur intégrité; & si l'on oseroit dans ce cas-là, elle pourroit être suivie des plus graves accidents.

Il n'y a rien de moins prouvé que les observations qu'on nous a transmises du succès de la néphrotomie, le rein étant dans son intégrité. En effet, quelle opinion se former de l'opération qu'on dit avoir été pratiquée à un certain criminel condamné à mort? Cette observation de néphrotomie, qui est la plus anciennement connue, est rapportée ainsi par *Mézerai*.

« Les docteurs de la Faculté en médecine de Paris ayant fu qu'un archer de Bagnolet, qui étoit depuis long-temps affligé de la pierre, avoit été condamné à mort pour les crimes, supplièrent le roi & les magistrats de vouloir bien permettre qu'on le mit entre leurs mains, pour éprouver sur lui si on ne pourroit pas lui ouvrir les reins pour en tirer le calcul, sans qu'il lui en coûtât la vie. Leur opération eut un si bon succès, que cet homme vécut plusieurs années après en fort bonne santé. Cet événement arriva sous le règne de Charles VIII. » (Voyez l'Abriégé de l'Histoire de France par *Mézerai*, tome V, pages 113 & 114, édition de 1687.)

Ce récit semble indiquer qu'on fit l'incision du rein; mais si l'on consulte *Ambroise Paré*, on voit qu'il n'en fait aucune mention. Voici dans ses propres termes ce qu'il dit à ce sujet :

« Je ne puis encore passer que je ne relate cette histoire, prise aux *Chroniques de Monsieur de Montmorency*, d'un franc-archer de Meudon, près Paris, qui étoit prisonnier au Châtelet pour plusieurs larcins, pour raison dequels il fut condamné d'être pendu & étranglé. Il en appela en la cour de Parlement, & par icelle cour fut dit qu'il avoit été bien jugé & mal appelé. En mesme jour fut remoustré au roi, par les médecins de la ville, que plusieurs estoient fort travaillés & molestés de pierre, colique, passion & maladie de custe dont estoit fort mortel le dit franc-archer, & aussi desdites malades estoit fort molesté monseigneur de Boffe, & qu'il seroit fort requis de voir les lieux où lesdites maladies sont conrées dedans le

Bbbb 2

» corps humain, laquelle chose ne pouvoit estre
 » mieux secuë qu'en incisant le corps d'un
 » homme vivant : ce qui pouvoit estre bien-
 » fait en la personne d'iceluy franc-archer, qui
 » ainsi bien étoit prest de souffrir la mort : la-
 » quelle ouverture fut faite au corps dudit franc-
 » Archer, & dedans iceluy qui, & regardé le lieu
 » desdites maladies, & après qu'ils eurent esté
 » veus, fut recouffu, & ses entrailles remises de-
 » dans, & par l'ordonnance du roy fut bien
 » pansé, tellement que dedans quelques jours il
 » fut bien guéri, & eut la rémission, & lui fut
 » donné avec ce argent. » (Voyez *Ambroise Paré, livre XXX, chapitre 16, édition de 1607.*)

Sainte-Foix, qui rapporte la même anecdote, d'après la *Chronique de Louis XI*, observe que cette opération, qui est, à ce qu'il croit, la première qu'on ait faite pour la pierre, se fit publiquement, au mois de janvier 1474, dans le cloître de l'église de Saint-Severin. (Voyez *Essais historiques sur Paris, partie II, page 15.*)

Ces deux récits sont si différents & si incertains, qu'on ne peut pas dire que réellement la néphrotomie a été pratiquée chez cet homme; & si cela est, on ignore complètement si les reins étoient sains ou malades.

C'est peu de chose cependant que ce fut véritablement la néphrotomie qui lui fut faite, mais le rein étoit malade & non dans son intégrité, car il la regarde, dans ce cas, comme absolument impraticable.

« Mais le rein de l'archer de Bagnolet, satisfait par la présence de la pierre qui s'y étoit faite (dit Colot) s'enflamma & abcéda, faisant une tumeur considérable qui fut ouverte. Les matières en étant sorties, le périmélie se trouva fondu dans la partie qui regardoit l'épaisseur des chairs, ce qui donna lieu, sans beaucoup fatiguer le malade, d'ouvrir la tumeur, de lui ôter la pierre; il en guérit, mais pour très-peu de temps. Ce fut le mauvais état de ses viscères qui lui causa la mort. » (Voyez *le Traité de la Taille, par François Colot, page 58, in-12, 1727.*)

Méry croit au contraire que la maladie du franc-archer de Meudon étoit la pierre dans la vessie, & que l'opération qu'on lui pratiqua réussit. (Voyez *Observations sur la manière de tailler dans les deux sexes, par Méry, page 3, année 1760.*)

Haller place dans le quinzième siècle le renouvellement de l'opération de la pierre; & en adoptant l'opinion de Méry sur le siège de la maladie, il juge qu'on pratiqua le haut appareil, jusqu'après avoir tiré la pierre, on remplaça les intestins, & qu'on fit une suture au ventre. (Voyez *Néon, dans le tome III des Mémoires de l'Académie de Chirurgie, page 845.*)

Tulet avoit adopté un sentiment tout diffé-

rent. Il est facile de juger, dit-il, que le franc-archer n'étoit point incommodé de la pierre; mais il y a apparence que l'opération qu'on lui fit étoit celle qui se pratique pour la maladie appelée *volvulus*, qui survient lorsqu'un intestin est redoublé ou replié en lui-même. (Voyez *Tolet, Traité de la Lithotomie, chapitre 15, page 140 & suivantes.*)

Il est difficile de porter un jugement sur la maladie du franc-archer, & sur le bien qu'occupoit la pierre dont on croit qu'on lui fit l'extraction. En effet, selon quelques-uns elle étoit dans le rein, selon quelques autres dans la vessie, & d'après ces derniers on est incertain si le corps étranger fut tiré par le haut appareil, par le petit appareil, ou par le grand appareil. Selon Paré, on le contenta de faire une visite exacte des parties où se forme la pierre. Parmi les historiens, les uns placent l'époque de l'opération sous le règne de Charles VIII, & d'autres sous celui de Louis XI: ceux-ci sont le malade, habitant de Meudon, censé de Bagnolet. Plusieurs affeurent qu'il vécut longtemps en parfaite santé, d'autres, qu'il ne survécut que très-peu de temps à l'opération, par le mauvais état des viscères qui lui causa la mort: ainsi on n'a rien de certain sur la maladie de cet individu, ni sur l'opération qui lui fut pratiquée.

L'exemple le plus circonscrit de néphrotomie est consigné dans les *Transactions philosophiques* pour l'année 1696, & il se trouve aussi dans l'*Histoire de la médecine*, de Freind, au mot *Albucasis*, partie 2^e, page 200, édition de Paris, 1728. On y lit que Hobson, consul anglais à Venise, ayant été long-temps tourmenté de douleurs néphrétiques, se rendit à Padoue, auprès de Dominique de Marchetti. Ce médecin lui dit qu'il ne connoissoit pas d'autre moyen de le soulager que celui de lui faire une opération, par laquelle on pût retirer le corps étranger dont il étoit incommodé.

Les parties furent incisées avec un bistouri droit, & le sang qui sortit en abondance fut à remettre l'extraction de la pierre au lendemain. On tira effectivement deux ou trois pierres, après quoi le malade fut pansé. Les accidents qui survinrent furent peu considérables, & Hobson se trouva bientôt en état de retourner à Venise, quoiqu'il lui restât une fistule par laquelle il sortoit du pus & des mucus. Quelque temps après il se présenta une pierre qui fut tirée avec facilité. Enfin le malade guérit. Il y avoit dix ans que le fait s'étoit passé, lorsque Hobson & sa femme le racontèrent au docteur Bernard, qui le communiqua à la Société de Londres.

Mais qui peut assurer que le rein étoit dans son intégrité quand on fit l'opération? Peut-être que Marchetti se déterminait à opérer par la présence d'un abcès situé profondément, & qui étoit ignoré de Hobson. Ce qui rend cette conjecture vraisemblable, c'est que personne n'a parlé de cette opération, qui sans doute auroit été faite devant des

témoins, & que Pierre de Marchettis, qui a survécu à son fils, mourut en 1673, n'en a point parlé.

Je citerai quelques autres exemples encore très-doutés. *Candau* rapporte, d'après le témoignage d'Albert, l'histoire d'une femme qui avoit été tourmentée de douleurs de reins, & à qui l'on ouvrit la partie malade d'où l'on tira dix-huit pierres.

Je me souviens, dit *Camerarius*, qu'un très-célèbre médecin m'a assuré avoir pris soin d'un gentilhomme qui souffroit des douleurs néphrétiques atroces, & à qui on ouvrit la partie souffrante, d'où l'on retira une pierre. Cette opération eut un heureux succès.

Schurrigius rapporte qu'un militaire racontoit en sa présence au seigneur de Birekoltz, officier-général au service du roi de Pologne, & qui étoit violemment tourmenté de la pierre dans le rein, que pendant le séjour qu'il avoit fait en France, il avoit assisté à une opération de la néphrotomie pratiquée à Paris, & qu'il avoit vu faire l'incision au rein & l'extraction d'une grosse pierre.

On ne peut raisonnablement fonder aucune espèce de certitude sur ces différents récits, parce qu'ils n'ont point un vrai caractère d'authenticité; ainsi, les prétendus faits que j'ai extraits des *Mémoires d'Hévin* ne méritent aucune attention. On peut conclure des divers exemples rapportés jusqu'ici, qu'il est probable que la taille du rein n'a jamais été pratiquée sans que cette opération ait été déterminée par quelque tumeur abscessée, ou par quelque ulcération fistuleuse, suite de suppuration dans le rein, qui s'étoit fait jour à l'extérieur dans la région lombaire.

Colot dit que la néphrotomie est d'elle-même, sans le secours de la fonte de la substance du rein, absolument impraticable. En effet, comment ouvrir le rein, & tirer une pierre de cet organe, lui qui se trouve placé dans le ventre, engagé dans les graisses & dans les membranes, sans soutien, & d'une substance compacte & si solide, que lorsque le chirurgien ouvre le cadavre, & qu'il tient le rein avec la main, à peine peut-il lui faire une plaie pour voir le dedans : son bassin? (*Colot, ouvrage cité, page 50.*)

J. Douglas essaya de faire l'opération de la néphrotomie sur le cadavre d'un individu qui avoit des calculs dans le rein; mais il rencontra beaucoup de difficulté, à cause de l'épaisseur des tégumens communs & des muscles, laquelle, dans ce sujet, étoit d'environ trois pouces & demi.

Lorsque le péritoine fut découvert, il observa que le colon étoit sur la surface convexe du rein. Après qu'il eut écarté cet intestin, la plaie étoit si profonde, qu'il lui parut impossible de pénétrer au travers de la substance du rein jusque dans le bassin : c'est pourquoi, ayant remis le cadavre

dans sa situation ordinaire, il ouvrit le rein, & il en tira deux pierres, l'une du poids de demi-once, & l'autre de seize grains. (*Voyez Éfluis de médecine d'Edimbourg, traduction de Demours, tome 1^{er}, page 278.*)

III. D'après tout ce qui vient d'être dit, & d'après la situation des reins, la structure de ces organes, & la manière d'être des pierres qui se forment dans leur intérieur, voyons s'il est prudent d'entreprendre la néphrotomie.

En arrière, les reins sont protégés dans leur moitié supérieure par les deux dernières côtes, & toute l'étendue de leur face postérieure se trouve appliquée sur le diaphragme, sur le feuillet antérieur de l'aponévrose du transverse & sur le muscle carré des lombes. La face antérieure du rein droit est recouverte par le péritoine, la portion montante du colon, la portion descendante du duodénum & la tête du pancréas. Celle du rein gauche est recouverte par le péritoine, & la portion descendante du colon. La face antérieure de l'un & de l'autre rein, est placée un peu derrière les circulations de l'intestin jéjunum. En haut, le rein du côté droit répond au foie, le gauche à la rate, & l'un & l'autre à la capsule surrénale. Quoi que le bord interne du rein droit soit placé un peu plus bas que le bord interne du rein gauche, ils sont tous les deux au niveau des deux dernières vertèbres dorsales & des deux premières lombaires. Le bord externe de chacun de ces organes est convexe & répond aux parois du ventre, & quelquefois ces bords sont cotoyés par la portion montante du colon à droite, & la portion descendante de cet intestin à gauche.

D'après les rapports de ces organes, on voit qu'il n'y a que la moitié inférieure de leur face postérieure qui soit accessible aux instrumens, puisque la moitié supérieure est protégée par les côtes, & encore on ne peut arriver à la portion inférieure qu'à travers des parties qui ont une grande épaisseur, & les reins étant solides, denses, & placés dans un tissu cellulaire lâche, qui offre très-peu de résistance, & qui ne les assujettit pas d'une manière ferme, il arrive que lorsqu'on veut les inciser, n'étant pas suffisamment affermis, ils fuient devant le tranchant de l'instrument qui cherche à les entamer, & l'on ne peut les atteindre qu'en tâtonnant, & sans être assuré d'où on fait. En incisant en avant ou sur le côté, on éprouve tout autant de difficulté à cause de la profondeur à laquelle on est obligé de pénétrer, & l'on ne peut y arriver qu'en exposant le malade aux plus grands dangers.

Mais en supposant qu'on soit arrivé aux reins & qu'on puisse les entamer, il faut les ouvrir dans le lieu où se trouvent les calculs, ou plutôt il faut les entamer sur les calculs mêmes; & ordinairement ces calculs sont assez petits pour n'être aperçus par le toucher que très-difficilement. Lorsque nous faisons l'ouverture du corps des per-

sonnes qui ont eu des douleurs néphrétiques, nous ne sommes assurés du lieu qu'occupent les calculs, qu'après avoir ouvert les reins dans toute leur épaisseur. Aussi, on doit juger de la difficulté qu'on éprouveroit, dans bien des cas, à savoir positivement dans quel lieu le rein devoit être incisé, pour en extraire un calcul. Mais en admettant qu'on ait reconnu par le toucher le lieu précis du rein où se trouve la pierre, voyons ce qui doit arriver.

Je suppose le rein dans son intégrité; la pierre doit se trouver dans la substance tubuleuse, au sommet du mamelon, dans les calices ou dans le bassin.

Dans le premier cas, quand j'examine le grand nombre d'artères qui le traversent dans les reins, leur grosseur, qui est très-considérable, je vois qu'il est impossible d'entamer le rein dans aucun point de son étendue, sans exposer le sujet à une hémorragie que rien ne pourroit arrêter, & qui deviendroit mortelle.

Si la pierre est dans l'un des calices ou dans le bassin, même difficulté & mêmes dangers se présentent. En effet, ces réservoirs membraneux sont appliqués en arrière sur les artères rénales, & en avant ils sont recouverts par les veines du même nom. Ainsi il est difficile d'entamer le bassin & les calices, sans s'exposer à nuir les vaisseaux rénaux qui donneroient lieu aux plus graves accidents par l'hémorragie qui en seroit la suite, & par l'écoulement & l'épouvement d'urine qui ne manqueroient pas d'arriver.

Mais enfin, je suppose qu'on ait eu le bonheur de surmonter tous ces obstacles, ce qui me paroît impossible, tout n'est pas encore terminé; il faut faire l'extraction des pierres, & l'on verra combien il est difficile d'arracher une pierre, si elle est enclavée dans le rein, & de la saisir avec un instrument, sans comprendre avec elle quelque portion de la substance de cet organe. En effet, les pierres qui se forment dans les reins, sont quelquefois trop profondément enclavées & adhérentes à la substance du rein par différentes racines ou branches, pour qu'il soit possible de les extraire sans occasionner des déchirements, des inflammations, des suppurations ou d'autres accidents plus funestes que le calcul même.

On trouve dans les auteurs un grand nombre d'observations de pierres branchues & ramifiées, implantées dans le tissu des reins. On a vu des calculs divisés en quatre branches qui étoient enclavées dans les mamelons du rein. On a trouvé aussi des pierres quadrangulaires arrondies près du pavillon de l'urètre. On parle d'une pierre à trois pointes accrochée dans la substance de ce viscère; on rapporte l'exemple d'un calcul qui avoit un troc & huit branches considérables, répondant par leur nombre & par leur figure aux tuyaux du bassin, & embrassant les mamelons du rein en

forme d'entonnoir. On a trouvé un calcul qui ressembloit assez bien, par ses ramifications, à une branche de corail. La substance du rein a été vue perforée d'un grand nombre de graviers ou de petites pierres que l'instrument reconottoit partout, & qu'il auroit été impossible d'extraire en totalité.

Ainsi la néphrotomie, dans le cas où le rein est dans son intégrité, me paroît d'une exécution très-périlleuse. Nous avons vu en effet, combien il est difficile d'arriver jusqu'aux reins; & lorsqu'on y est parvenu, il peut résulter de leur section les suites les plus graves; de plus, l'extraction des pierres peut offrir des difficultés insurmontables; enfin, toutes les parties de l'opération peuvent être suivies d'accidents mortels.

IV. Cependant, quand on voit les blessures des reins se guérir après un temps plus ou moins long, lorsqu'on voit des abcès considérables formés dans leur intérieur par des pierres qui s'y sont développées, détruire le tissu de cet organe, le porter au dehors, & finir aussi quelquefois à la longue par guérir, on seroit tenté de croire que l'opération de la néphrotomie devroit être pratiquée dans certains cas de calcul des reins, avec quelque espoir de succès.

En effet, si des blessures aux reins, faites par des instruments tranchans ou contondans, n'ont pas fait périr les blessés, si elles ont été guéries, pourqu'on ne seroit-il pas permis d'espérer une issue aussi favorable d'une ouverture faite avec art par un instrument bien tranchant? Mais les exemples très-rare de guérison du plaie aux reins, sont l'effet d'un heureux hasard, qui a conduit une épée ou toute autre arme offensive à travers le tissu des parties délicates, sans qu'elles soient blessées grièvement. Ces exemples ne font pas suffisans pour établir la possibilité de la néphrotomie: car si l'on réfléchit à la différence qu'il doit y avoir entre une plaie faite, à un rein supposé sain, par le trajet d'un instrument qui n'auroit heureusement ouvert que de petits vaisseaux, & celle qui doit résulter de la multiplicité de procédés que les circonstances peuvent exiger dans la néphrotomie, où l'on seroit toujours inévitablement exposé à couper un nombre considérable de vaisseaux; si l'on fait de plus attention à l'état du rein malade, par le long séjour d'une pierre souvent enclavée & raboteuse, à l'introduction successive de différents instruments pour la recherche & le dégagement du corps étranger, aux incisions hasardeuses ou aux déchiremens que peut nécessiter son extraction, ou concevra comment la plaie faite au rein pour en extraire une pierre, doit être bien plus grave que celle qui n'est qu'accidentelle. D'ailleurs, lors même que les reins ont été blessés par la région du dos, que l'instrument vulnérant n'a pas pénétré dans le ventre, & que le péricône est resté intact, circonscrit la plus heureuse dans ce cas, à peine, sur cent individus,

en est-il un qui ait survécu à de pareilles blessures. Ainsi, dans le paraille plus nous venons de faire entre ces deux différentes sortes de lésions, on ne trouve rien qui doive enhardir à pratiquer la néphrotomie.

La déchirure & la destruction du rein par des abcès, ne font pas non plus des exemples suffisants pour faire espérer le succès de l'opération qui nous occupe. On voit ici évidemment la nature qui ouvre aux pierres, par la suppuration, une voie à travers la substance de nos parties, agir autrement que le médecin qui procéderait à la même opération par l'instrument tranchant. La suppuration s'établit dans le tissu cellulaire du rein; elle détruit doucement & lentement; elle macère quelques plans de fibres, quelques lames membranées, & peu à peu elle les perce dans les endroits les plus faibles; elle ménage ordinairement les artères, les veines & les nerfs qui sont un peu considérables: l'instrument tranchant, au contraire, coupe tout ce qui se présente à lui; le main qui le dirige ne peut pas toujours éviter qu'il ne rencontre des parties qui ne peuvent être coupées sans un danger extrême, quelquefois même sans causer une mort certaine, & que la suppuration épargnerait. On fait d'ailleurs qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre les effets de la suppuration & les plaies; car il est très-certain que la destruction des viscères qui s'opère lentement par les suppurations, causerait la mort dans l'instant, si elle étoit produite par des plaies. Mais combien peu d'individus ont survécu aux hémorragies causées par la présence des pierres, aux suppurations & aux abcès des reins, suites de calculs formés dans ces organes! J'ai vu un grand nombre de malades de ce genre, & tous ceux qui en étoient atteints ont fini par y succomber. Ainsi, les ouvertures faites aux reins par des abcès, n'ont pas ordinairement de suites plus heureuses que celles qui sont faites par des instruments tranchants.

V. Si la néphrotomie ne doit pas être pratiquée lorsque le rein est dans son intégrité, tous les médecins la conseillent lorsque la présence de la pierre a donné lieu à l'inflammation & à la suppuration de cet organe, que le pus s'est épanché dans le tissu cellulaire, qu'il forme abcès & tumeur à la région lombaire; dans ce cas-là l'opération peut être tentée: c'est le sentiment d'Hippocrate & de presque tous les médecins qui sont venus après lui. Si la partie qu'occupe la douleur (dit Hippocrate) vient à se tuméfier, il faut alors faire une incision sur le rein pour en faire sortir le pus & chasser ensuite les graviers par le moyen des diurétiques; car cette incision peut sauver au malade, une vie qu'il ne manquerait pas de perdre sans ce secours. (De internis affectionibus, cap. 15, tom. 7, pag. 649, édition de Charter.)

Lors donc que le rein est suppuré (dit encore Hippocrate), il se forme une tumeur près de

l'épine; il faut, dans ces circonstances, faire sur la tumeur une incision très-profonde vis-à-vis du rein. Si vous y parvenez, vous guérissez le malade. (Ibid. cap. 16, pag. 650.) Forcetus & Marcatius se font élevés contre l'ouverture de ces abcès, par la raison que les plaies resteroient fistuleuses, & que les malades ne guérissent jamais; mais en supposant la difficulté de la consolidation de la plaie, on ne peut disconvenir qu'on ne prolonge les jours du malade par cette opération, sans laquelle le pus auroit fusi dans l'intérieur & auroit causé des accidents mortels.

D'après tout ce qui vient d'être dit, nous voyons que la néphrotomie peut être pratiquée dans deux circonstances particulières: la première, lorsqu'un abcès se montre à la région lombaire, & qu'une pierre ou calcul se trouve dans la substance du rein; la seconde, lorsque ce calcul a abandonné la substance du rein, & qu'il fait fistule dans la région lombaire; dans ces deux cas seulement, il est prudent de tenter la néphrotomie.

VI. Dans le premier cas, qui est le plus ordinaire, il est téméraire avec fluctuation se manifeste dans la région lombaire, précédée des symptômes de la néphrite calculuse, on est autorisé à penser que cet abcès est déterminé par des pierres rénales; on en fait l'ouverture avec le couteau ou l'instrument tranchant, & après l'évacuation du pus, on va à la recherche du calcul. Quelquefois il est très-difficile à reconnaître, & si on y parvient, on le trouvera dans la substance du rein ou dans le trajet de l'abcès. S'il est encore dans le rein, il faut s'assurer avec une sonde, s'il est adhérent ou mobile, ce que l'on peut distinguer par la difficulté à lui imprimer des mouvements. On tâche de l'ébranler & de le dégager avec une curette ou un crochet. Si on peut le saisir avec une tenette, on en fait l'extraction, & s'il n'y a pas d'autres calculs, la maladie guérira, pourvu qu'elle ne soit pas rendue fistuleuse par l'épanchement ou l'écoulement continu de l'urine, qui peut se faire par la plaie du rein.

Mais quelquefois on éprouve beaucoup de difficultés à faire cette extraction, & ces difficultés peuvent tenir à l'éroitesse du trajet qui conduit au rein, & à la forme hérissée de pointes que la pierre peut offrir, & qui la fixe dans le tissu du rein d'une manière invincible.

Si le trajet qui conduit au rein est trop étroit pour permettre de faire l'extraction d'une pierre qu'on a reconnue, & si l'on s'est bien assuré de son existence, il faut élargir ce trajet en l'agrandissant avec l'instrument tranchant; mais on doit, autant que possible, diriger avec le doigt & faire avec ménagement ces incisions, dans la crainte d'ouvrir quelques vaisseaux qui pourroient donner lieu à une hémorragie inquiétante, qu'il seroit cependant possible d'arrêter en introduisant des bourdonnets de charpie qu'on auroit soin d'assu-

jetter à'un fil, afin de pouvoir les retirer à volonté, & pour empêcher qu'ils ne se perdent dans le trajet de la plaie, ou qu'ils n'y séjourneront trop long-temps.

Mais quelquefois, au lieu de l'instrument tranchant, on pourroit encore se servir, pour dilater la plaie, d'un morceau d'éponge préparée, que l'on introduiroit dans le trajet de l'abès, & que l'on tâcheroit de conduire jusqu'au lieu qu'occupe la pierre dans le rein : si on parvenoit à la dilater suffisamment, on procédroit à l'extraction de la pierre avec des tenettes, le crochet ou la curette.

Lorsque la pierre est fichée dans le rein, qu'elle y est comme adhérente, ou parce qu'elle est bilonquée, ou parce qu'elle a un corps & plusieurs branches, si, après l'avoir bien faite, on sent qu'elle est immobile, qu'elle offre de la résistance, il faut en discontinuer l'extraction, parce qu'on ne pourroit l'obtenir qu'en déchirant la substance du rein & en donnant lieu à des accidens mortels. Il faut, dans ce cas, abandonner la maladie à la nature, qui, à la longue, pourra dégager la pierre & la pousser hors de la substance du rein : il sera possible alors de la laisser dans son trajet, & l'on en fera l'extraction plus facilement & sans danger.

VII. En second lieu, la pierre formée dans le rein a divisé la substance de cet organe & a été portée par l'action des parties vers la région lombaire; elle fait saillie sous la peau, ou bien elle peut se présenter à l'orifice d'un conduit fistuleux, résultat de l'ouverture d'un ancien dépôt. Dans les recherches d'Ilérin sur la néphrotomie, il y a deux observations que nous allons citer, qui prouvent que ces deux circonstances se sont rencontrées, & qu'elles peuvent se rencontrer de nouveau.

Dans l'une de ces observations, on voit qu'une jeune fille née de parens calculeux, fut atteinte d'une tumeur à la région des lombes, à la suite d'une suppuration totale d'urine. Ayant distingué un point dur dans la tumeur, on y fit une incision par laquelle on tira deux pierres, & la maladie guérit. (Voyez tom. III des *Mémoires de l'Académie de chirurgie*, pag. 551.)

Dans l'autre observation, il est dit qu'un ecclésiastique, après avoir ressenti pendant quelques jours une douleur des plus aigües au côté gauche des lombes, vit se former sur ce point une tumeur inflammatoire qui abécéda & s'ouvrit naturellement, mais l'ouverture demeura fistuleuse. Enfin, après avoir consacré pendant près de vingt ans l'écoulement habituel de cette fistule, un jour en se pansant, il sentit avec le doigt, à l'orifice du sinus, un corps dur & pointu qui vacilloit, & dont il fit aussitôt l'extraction en tirant avec un peu de force; c'étoit une pierre triangulaire & du volume d'une médiocre noix : après l'extraction

tion de ce calcul, la fistule se cicatrisa, & le malade fut parfaitement guéri. (Voyez l'ouvrage cité, pag. 524.)

D'après ces deux observations, si, à la suite de douleurs néphrétiques plus ou moins longues, une tumeur dure se manifestoit dans un des points de la région lombaire, on seroit autorisé à faire une incision suffisamment grande sur le lieu tuméfié, & si l'on rencontroit une pierre dans le fond de la plaie, on en feroit l'extraction en la saisissant avec les doigts ou des pincettes.

Il en seroit de même si une personne portoit un ulcère fistuleux dans cette même région, & qu'il fut entretenu par le passage continuel de l'urine. Si dans ce cas, en sondant la fistule, on rencontroit un corps dur près de l'ouverture extérieure de l'ulcère, on s'assureroit de la nature de ce corps par le choc de la sonde, & si c'étoit une pierre, on en feroit l'extraction comme il vient d'être exposé.

Ainsi, la néphrotomie peut être pratiquée sensiblement lorsque la néphrite calculeuse se termine par suppuration, & qu'un dépôt se manifeste dans la région lombaire. On peut alors inciser ce dépôt & aller à la recherche de la pierre, que l'on trouvera, soit sous la peau, soit dans le rein, soit enfin dans le trajet qui, de cet organe, conduit à l'ouverture extérieure de l'abès, & dans laquelle point qu'on rencontre le calcul, on en fera l'extraction.

Je termine ici ce que j'avois à dire sur la néphrotomie. On trouvera d'autres détails au mot *Rein*, sur les calculs & sur les abcs de cet organe. (Voyez *NEPHRITE CALCULEUSE*.) (F. RIES.)

NEPHROTOMORHÉE (*Nosographie*), de *νεφρον*, rein, & de *τομή*, caillot. Saug dans les reins : expression tombée en désuétude.

(L. J. M.) *

NÉPITYMIES. (*Nosologie*.) Maladies de la classe des *débilites*, d'après Sauvages.

(L. J. M.)

NERF, *nervus*, *νεῦρον*, force. Les nerfs sont des organes desquels dépendent le sentiment & le mouvement; ils forment le caractère principal de l'animalité; & si, dans les animaux dont la structure est très-simple, on se distingue pas de nerfs, il ne faut pas en conclure qu'ils n'existent pas; il n'y a sans doute que le névritisme ou l'enveloppe du nerf qui manque, mais la partie essentielle, la substance contenue dans le névritisme qui constitue ce mouvement par le nerf, est toujours présente.

Legallois considéroit avec raison le système nerveux comme la trame première & la partie principale de la structure des animaux. Quelques naturalistes

naturalistes ont critiqué Legalleis sur cette idée, & ont été jusqu'à dire qu'elle ne pouvoit être que celle de gens dont les études anatomiques se bornent à la connoissance de l'organisation de l'homme & des animaux des classes supérieures, puisque les espèces placées aux derniers rangs de la série animale manquent absolument de système nerveux. L'analogie & l'induction ne suffisent-elles pas pour admettre la présence de ces organes? Si, dans tous les animaux dont l'organisation est plus complexe, on voit les nerfs précéder aux phénomènes du mouvement & du sentiment, ne pouvons-nous pas tout naturellement penser que les nerfs le trouvent partout où nous apercevons le sentiment & le mouvement? Conçoit-on maintenant l'existence d'un organisme animal, sans qu'il présente un mode particulier de sentir & de se mouvoir?

Le système nerveux forme un ensemble compliqué, mais dont toutes les parties se tiennent & communiquent entr'elles. Il n'y a qu'un système nerveux, quoiqu'on ait admis dans ce système, 1°. une partie encéphalo-rachidienne; 2°. des nerfs cérébraux rachidiens; 3°. des nerfs ganglionnaires ou nerfs de la vie organique, nerf grand sympathique ou triplichien. Toutes ces parties se réunissent pour former un tout, qu'on peut diviser scholastiquement en trois systèmes; mais cette distinction, sous le rapport anatomique & sous le rapport physiologique, ne peut rigoureusement être admise.

Cependant, pour ne pas trop nous éloigner des méthodes reçues, & pour nous faire plus facilement concevoir, nous rapporterons l'appareil nerveux à trois sections principales.

1°. Section. Appareil encéphalo-rachidien.

2°. Section. Appareil nerveux de la vie extérieure, ou nerf de la vie animale.

3°. Section. Appareil nerveux ganglionnaire, ou nerf de la vie intérieure ou assimilatrice.

L'étude des nerfs a de tout temps occupé les plus grands anatomistes, les médecins les plus habiles & les philosophes les plus profonds. Depuis le commencement de ce siècle, ces organes ont été le sujet des recherches & des méditations de physiologistes très-distingués. Agil, Bichat, Prochaska, Gall, Spurzheim, Stenmerring, les frères Wenzel, Malaceni, Chaussier, Arlaky, Legalleis, Nasse, Camus, Tiedemann, Tréviranus, Rolenthal, J.-E. Meckel, Charles Bell, &c. &c., ont successivement apporté leur tribut pour enrichir de leurs découvertes cette partie de la science anatomique. Mais nous pouvons dire avec Sénèque : *Multum egerant qui ante nos fuerunt ; multum etiam adhuc restat operis ; multumque restabit ; nec ulli nato post mille secula precludetur occasio aliquid adjuvandi.*

Nous mettrons à contribution les travaux de

Médecine, Tome X.

tous ces savans, pour faire connoître l'état de la science, car nous devons nous borner ici à remplir les fonctions d'historien.

Sans avoir égard dans cette première partie au mode d'évolution du système nerveux, nous l'examinerons dans sa partie principale, dans les animaux des classes supérieures. C'est du cordon rachidien dont nous voulons parler, & auquel nous ferons procéder toutes les autres parties du système nerveux. L'encéphale n'est que le développement d'une des extrémités de ce cordon, & les nerfs eux-mêmes paroissent être l'épanouissement de cette tige principale.

Le corps animal est, dans les premiers temps de sa formation, composé de deux moitiés latérales correspondantes très-distinctes. Cette division seroit très-bien aussi pour le système nerveux. La séparation s'aperçoit sur la ligne médiane; elle existe non-seulement pour le cordon rachidien, mais encore pour l'encéphale & pour toutes les branches nerveuses du système périphérique. Les deux moitiés latérales se correspondent très-exactement dans la plus grande partie du système nerveux, de sorte qu'il y a entre l'une & l'autre, sous le rapport de la situation, de la forme & du volume, une différence bien moins marquée que dans les autres organes. Le système nerveux est donc la partie la plus rigoureusement symétrique du système animal, & Bichat a en raison de considérer cette symétrie comme un caractère des organes de la vie animale ou de relation.

Cette symétrie semble aller en décroissant de la tige encéphalo-rachidienne, que nous plaçons sur la ligne supérieure & dans une direction parallèle à l'horizon, vers les parties les plus éloignées de ce point de départ : aussi nous trouvons les nerfs cramo-rachidiens un peu moins symétriques que le cordon avec lequel ils communiquent, & plus réguliers que la troisième série, c'est-à-dire, que les nerfs ganglionnaires ou nerf grand sympathique. Cette différence tient sans doute à ce que les deux premières séries de nerfs appartiennent essentiellement à des appareils de la vie de relation, tandis que les dernières vont finir dans les organes de la vie d'assimilation.

La structure & la disposition du système nerveux sent peu sujettes à varier, & c'est sans contredit de tous les appareils celui où l'on rencontre le moins de déviations organiques. Nous répéterons ici pour la structure & la disposition, ce que nous venons de dire sur la symétrie : les nerfs ganglionnaires ou système du grand sympathique varient plus souvent & à des degrés beaucoup plus remarquables que le cordon encéphalo-rachidien & que les nerfs dont les rapports sont immédiats avec ce centre. On ne voit pas les nerfs cérébraux & spinaux, naître d'autres

Cccc

points que de ceux desquels ils doivent provenir, tandis que ces irrégularités se font remarquer dans la disposition des cordons du trisplanchnique, & les déviations ne sont pas encore à comparer à celles que l'on voit dans les systèmes vasculaires.

Le système nerveux de l'homme est plus constamment le même que celui des animaux. Vicq-d'Azyr, depuis long-temps, a découvert cette vérité dont Wenzel a donné la démonstration : il a vu que, dans les mammifères, les deux moitiés du système nerveux répondent moins parfaitement l'une à l'autre, & que les déviations de structure sont moins rares que dans l'homme. D'après les travaux de Fourcroy, & surtout d'après ceux de M. Vanquelin, il entre dans la composition chimique du cerveau, de l'albumine à demi coagulable, deux variétés de matière grasseuse, de la gelatine d'un brun rougeâtre, de l'osmazome, du phosphore, du sucre, du muriate de soude, des sulfates & des phosphates.

La moelle épinière proprement dite & la moelle allongée sont de même nature, mais se distinguent du cerveau par une proportion plus grande de matière grasse, par moins d'albumine, d'osmazome & d'eau. Les nerfs contiennent moins de matière grasse que le cerveau, mais l'albumine s'y trouve en plus grande abondance.

On considère en général le système nerveux comme formé de deux substances : une blanche, moelle, ou *substance médullaire*. Les nerfs en sont très-vraisemblablement constitués dans leur entier ; il y a en outre, soit au centre, soit plus souvent encore à la superficie, une substance de couleur grise ou cendrée, nommée *substance corticale* ; elle forme la couche extérieure du cerveau. On aperçoit encore, & entre ces deux parties, une substance plus ou moins distincte, d'une teinte jaune ; enfin, dans quelques points de l'encéphale, on reconnoît la présence d'une substance noire. Plusieurs anatomistes viennent que ces différences de couleur n'en indiquent aucune dans la nature de ces substances, qu'ils considèrent comme absolument identiques. On croit assez communément que la substance médullaire dépasse en quantité la substance corticale, quoique celle-ci occupe dans des proportions qui sont à son avantage. Dans certaines régions de l'encéphale, les dernières parties élémentaires de la forme sont les mêmes dans toutes ces substances ; cependant on remarque dans la substance médullaire une disposition plus distincte pour des formations secondaires. La substance cendrée est plus molle & même plus fluide que la médullaire, & par la disséction la première doit perdre beaucoup plus que la seconde. Cette substance grise contient beaucoup plus de vaisseaux que les autres parties du système nerveux. Quelques anatomistes vont jusqu'à la considérer comme formée uniquement de vaisseaux : cette

opinion ne peut s'appuyer sur des expériences anatomiques, car jamais les injections les plus heureuses n'ont pu servir à démontrer que la substance corticale soit essentiellement vasculaire. Il sembleroit aussi, d'après John, qu'il y auroit entre les deux substances des différences dans la composition chimique, puisque ces savans n'ont pu découvrir la présence du phosphore dans la substance corticale. Celle-ci n'offre pas, dans tous les points, une teinte uniforme ; par exemple, dans les tubercules quadrijumeaux elle est plus pâle que dans les prétendues couches des nerfs neuraires, & dans ces dernières parties, ainsi que dans la couche extérieure & corticale, cette couleur est plus claire que celle des corps blancs. Quant à la *substance jaune*, elle est dans une faible proportion, comparée aux deux parties précédentes ; on l'aperçoit comme une ligne ou bandelette située entre les substances grise & médullaire. Il est enfin deux autres variétés de substances d'après la coloration : l'une est noire, & ne se voit que dans un petit nombre de points individuels, & l'autre est bleuâtre, signalée d'abord par les frères Wenzel. Son existence, comme substance distincte, a été admise par J.-F. Meckel.

Les travaux sur la composition, la structure intime du système nerveux, démontrent que toutes ces substances sont les mêmes lorsqu'on les étudie dans leurs parties élémentaires. On les voit formées, suivant Della-Torre, de globules & d'une matière à demi fluide qui les réunit ; ces globules existent dans toutes ces substances, dans les nerfs, dans le cordon rachidien & l'encéphale. Les observateurs ne s'accordent pas sur la forme, sur la grandeur de ces globules, ni sur le degré de consistance de la matière qui les unit. D'après Della-Torre, ces globules n'ont pas la même grandeur ni la même transparence dans toutes les parties du système nerveux : plus gros dans le cerveau, plus petits dans la substance du cervelet, ils vont successivement en décroissant dans la moelle allongée, le cordon rachidien, jusque dans les nerfs. Enfin, dans ces dernières organes, ces globules vont encore en diminuant de volume de l'extrémité cranio-rachidienne du nerf vers son extrémité opposée. L'observateur italien prétend aussi que les globules de la substance corticale sont partout plus grands que ceux de la substance médullaire.

Suivant Prochaska (*De structura nervorum*, Vindob., 1779) & Barla (*Osservazione microscopiche sul cervello e sulle parti adiacenti*, Napoli, 1807), ces globules levoient du même volume dans toutes les parties de l'encéphale, & l'apparente différence proviendrait de ce que la force d'adhésion des globules entr'eux seroit différente à surmonter. Prochaska leur assigne pour grandeur absolue un huitième de celle des globules de sang. Les globules d'une partie quelcon-

que n'ont pas tous le même volume, & l'on n'a pas encore reconnu d'une manière certaine s'ils présentent des différences régulières de grosseur aux diverses périodes de la vie, quoiqu'on ait fait des recherches comparatives, & que cette différence soit reconnue & démontrée dans les animaux. Leur forme est-elle régulièrement sphérique ? L'observation n'a jusqu'ici rien fourni de certain à cet égard ; on ignore également si ces globules sont creux ou solides. Il sera, sans doute, très-difficile d'avoir des données positives sur ce point ; la petitesse des globules d'une part, & les illusions d'optique d'autre part, étant deux causes d'erreur presque insurmontables. Le lien par lequel ces globules sont unis, est un fluide tenace & transparent, faisant Della-Torre, ou un tissu cellulaire très-délié, selon Prochaska. L'fluide seroit plus visqueux dans la substance médullaire que dans la partie corticale ; sa résistance augmenteroit dans la portion médullaire des diverses régions du système nerveux au fur & mesure de la diminution du volume des globules. Barba voit encore ici que cette différence ne soit qu'une illusion d'optique, & qu'elle dépende du temps plus ou moins long qui s'est écoulé depuis la mort jusqu'au moment de l'expérience.

Les nerfs des animaux des quatre classes supérieures ne sont, d'après l'opinion des écrivains, que des tubes membranoux remplis d'une matière tenace, visqueuse, ou muelle nerveuse proprement dite, & ces tubes sont réunis en faisceaux par des lames ou cloisons du tissu cellulaire. Ces tubes restent parallèles les uns aux autres, aussi longtemps que le nerf ne s'unit pas à d'autres cordons par des ganglions ou des plexus. Onduleux pour la plupart dans des nerfs frais, ils deviennent droits lorsqu'on les laisse macérer dans l'eau pendant quelques jours. La matière dont ils sont remplis est un suc blanc. Des grossissements considérables obtenus par le microscope, font voir dans cette matière des trayaux très-déliés, en partie transparents, en partie ou peu plus obscurs, & de plus, des globules qui sont beaucoup plus petits que ceux du sang ; enfin, des masses régulières, stelliformes, qui semblent résulter de la réunion des globules. L'aspect de ces parties varie beaucoup. Dans les tubes des nerfs très-frais, M. Tréviranus n'aperçoit communément que les globules, & entre ceux-ci, par-ci, par-là, des raies obscures & irrégulières. Au bout de vingt-quatre heures de séjour dans de l'esprit-de-vin, les autres dispositions étoient visibles. La grandeur, tant des cylindres que des globules, varioit aussi dans les divers nerfs. Ce résultat des recherches de M. Tréviranus ressemble, dans les points principaux, aux observations de Fontana, qui vint que le nerf lui-même étoit composé d'un grand nombre de cylindres transparents, homogènes, très-simples. Ces cylindres semblent être formés d'une membrane uniforme, très-fine, remplie par une ma-

tière diaphane, gelatinieuse, indissoluble dans l'eau, & offrant des petits globules.

Or, Fontana prétend avoir reconnu que dans chacun des cylindres mentionnés, se trouve une membrane double ; le feuillet extérieur est irrégulier, & la lame interne est transparente & homogène. La membrane extérieure doit être formée du cylindre très-fine, oeduleux, descendant le long du grand cylindre & s'anastomosant entr'eux pour former un réseau. M. Tréviranus trouve ces observations du physiologiste italien en partie exactes, & suivant l'anatomie de Brègne, il est vrai qu'il descend des canaux onduleux le long des parois des derniers tubes des nerfs, mais il dit les avoir vus alter d'un côté à l'autre sans se réunir, & en formant des ondulations. Le plus souvent il n'a aperçu que deux de ces cylindres se comportant ainsi, tandis qu'en d'autres lieux, ils étoient en plus grand nombre & se portoit dans toutes les directions. Nulle part ces canaux onduleux n'étoient assez nombreux pour couvrir la membrane des tubes.

M. Tréviranus n'admet pas la présence de deux membranes aux nerfs. Sur plusieurs de ces cordons, après avoir enlevé le feuillet extérieur, il vit la substance médullaire à nu, sans offrir de vestiges d'une lame intérieure. Ces canaux onduleux dont nous parlons, ne sont d'aucune importance aux yeux de M. Tréviranus. Les canaux manquoient dans des points des tubes, où la membrane externe avoit été enlevée ; ils n'existoient pas non plus sur un nerf conservé pendant vingt-quatre heures dans l'alcool. La moelle s'y étoit contractée plus fortement que la gaine dont elle s'étoit séparée, & avoit pris la forme de globules, de cylindres noueux ou de masses irrégulières. D'après ces opérations, M. Tréviranus présume que les canaux onduleux ne sont que les endroits où la moelle nerveuse s'attache à la paroi intérieure des tubes. Les nerfs des mollusques & des insectes dans lesquels on ne distingue pas de canaux onduleux, feroient aussi une preuve que cette disposition n'a rien de bien essentiel dans les animaux d'un ordre plus élevé. Les nerfs des mollusques offrent plus d'une particularité dans leur structure. Dans l'*Helix pomatia*, ils présentent une gaine extérieure large, qui se reflète en rien à la structure ligamenteuse des nerfs des animaux des classes supérieures. Ils ne contiennent le plus souvent qu'un seul tube, & jamais plus de trois. Dans chacun de ces tubes on voit descendre des raies obscures qui indiquent la nature fibreuse de la substance nerveuse ; mais les cylindres simples de la moelle ne paroissent pas être renfermés, comme ceux des mammifères, des oiseaux, &c., dans des gaines membranées. Dans le nerf optique d'un escargot, on voit une portion dont la partie moyenne est couverte par la gaine, tandis que les deux extrémités sont à nu ; la moelle remplit tout le tube extérieur, & il

n'existe nulle part de cloisons membraneuses. Dans les nerfs de la moelle épinière de l'abeille, on aperçoit des files longitudinales de globules & de mailles irrégulières, mais aucune paroi membraneuse ne se montre entre ces tubes.

Dans la nerf optique d'un escargot de jardin, *Helix pomatia*, M. Tréviranus a découvert des globules & des mailles irrégulières, ainsi que les cylindres élémentaires, tandis que dans un nerf semblable, pris sur un escargot de forêt, *Helix nemoralis*, il ne put découvrir des cylindres parallèles, assez droits, mais tellement fins, qu'on pouvoit à peine les découvrir, malgré un grossissement de trois cent-cinquante fois. Il a fait des observations analogues sur plusieurs nerfs d'animaux à sang rouge. C'est dans ces changements d'éléments organiques de la moelle nerveuse, que réside la cause des différences dans les résultats obtenus par les micrographes.

Les mêmes éléments qui composent la moelle nerveuse, constituent aussi, selon M. Tréviranus, la moelle cérébrale & épinière; mais nulle part, dans ces substances, il n'existe d'enveloppes dégluées. En mettant une lamelle mince d'une des racines des nerfs de la moelle épinière, non encore revêtue de la membrane vasculaire d'une grenouille, sous une lentille grossissant considérablement, M. Tréviranus a vu les globules disposés en files parallèles & longitudinales; mais ils n'étoient plus renfermés dans des cylindres membraneux. Dans la moelle épinière elle-même, cette disposition par files n'existe plus. Les globules sont pêle-mêle, sans ordre apparent; entre eux il y a des cylindres grands, larges en quelques endroits, étroits dans d'autres, & au bord de la portion feuillée sous le microscope, sortent des tuyaux longs & transparents. Toutes ces parties élémentaires sont, comme dans la moelle nerveuse, enveloppées d'une matière muqueuse, inorganique, d'une espèce de rudiment de tissu cellulaire, duquel on peut faire sortir un suc blanc. Après quelques jours de macération du cerveau & de la moelle épinière dans l'alcool, M. Tréviranus trouva ce fluide blanc, durci, les parties élémentaires rapprochées les unes des autres, & leurs contours plus faciles à reconnaître.

D'après tout ce que nous venons de rapporter de la structure intime du système nerveux, il résulte que des globules ont été aperçus dans le cerveau par les plus grands observateurs micrographes. (Lewenhoeck, *De structura cerebri*, &c., pag. 37, & *encl. Anat.* — Della-Torre, *Nuove osserv. microsc.*, pag. 59. — Prochaska, *De struct. nerv.*, pag. 66. — Fumana, *Sur le sens de la vision*, &c. — J. & C. Wenzel, *De penitiori structura cerebri hominis & interum*, cap. 4.) Ils ne diffèrent d'opinion que sur la grosseur des globules & que sur la nature de la substance dans laquelle ils sont contenus. Or, celle-ci est si variable, qu'on ne peut rien donner de positif sur la

composition. Della-Torre voit que cette matière soit claire & tenace; Prochaska & les frères Wenzel la regardent seulement comme d'une grande ténuité. M. Tréviranus reproche à Prochaska & aux frères Wenzel, de n'avoir pas exactement observé le tissu cellulaire soumis au microscope. Ils auroient trouvé que cette substance n'est également composée de globules enveloppés d'un fluide tenace. Le tissu cellulaire enlèvent aussi, en même temps, des cylindres élémentaires, mais ceux-ci sont tellement délicats, qu'on a de la peine à les reconnaître. Lewenhoeck & Fontana les auroient d'ailleurs signalés dans le cerveau.

De toutes ces recherches, M. Tréviranus croit pouvoir en conclure que la moelle nerveuse, ainsi que la moelle cérébrale & épinière, sont simplement du tissu cellulaire. La forme & la composition de leurs parties élémentaires n'ont rien qui puisse donner des éclaircissements sur leur action particulière. Ce n'est que dans les éléments chimiques avec lesquels le tissu cellulaire est uni, que l'on peut chercher la cause des phénomènes vitaux particuliers du cerveau & des nerfs.

Il est à remarquer qu'un zootomiste français professe maintenant cette opinion du physiologiste allemand, mais il babilie de dire où il l'a puisée.

Ces deux éléments (les globules & le fluide qui les unit) du système nerveux se réunissent & se confondent pour former les fibres dont ce système est composé, lesquelles courent dans une direction longitudinale. C'est surtout dans les nerfs que cette structure fibreuse devient évidente. Ces organes se composent, pour la plupart, d'un plus ou moins grand nombre de faisceaux visibles à l'œil nu, formés eux-mêmes de cordons plus petits, lesquels résultent de filaments très-déliés. Les faisceaux, les cordons & les filaments se ramifient de diverses manières, & forment entre eux des anastomoses multipliées. Jamais un faisceau ne parcourt une grande étendue en ligne droite. Le nombre des ramifications & des communications nerveuses est moins grand vers les deux extrémités des cordons que vers le milieu de leur trajet. L'épaisseur des faisceaux varie d'un dixième de ligne à plusieurs lignes. La partie médullaire des nerfs n'est pas libre; chaque filament, même le plus délié, est étroitement renfermé dans une gaine particulière. Cette gaine, prise de la substance pulpeuse, représente un tube de la même forme que le nerf lui-même. (Voyez le mot NÉVRALGIE.)

Les nerfs essent des modifications dans leur structure intérieure; elles se rapportent, soit à la substance médullaire, soit au névrilème ou à l'une & à l'autre partie. Ils n'ont pas tous le même degré de solidité ou de consistance; ceux qui se rendent au cœur ou aux troncs vasculaires, ceux qui se distribuent aux viscères de l'abdo-

men, & quelques nerfs sensoriaux, sont moins. Cette première différence ne vient pas seulement de la consistance moindre de la moelle, elle paraît aussi tenir à l'état du système. Les nerfs du cœur & ceux des viscères abdominaux sont tous grisâtres, ou d'une teinte moins blanche que ceux des autres cordons nerveux. Le nerf olfactif contient dans son centre un peu de substance grise; c'est encore une raison pour ne pas considérer cette partie comme un nerf proprement dit.

Quant à la disposition des cordons & des filaments nerveux, leur volume n'est point en rapport avec celui du nerf lui-même & de son étendue. Les cordons des principaux troncs nerveux des membres abdominaux sont toujours plus minces que ceux des membres supérieurs. Les anastomoses, caractère commun à la plupart des nerfs, manquent aux cordons oculaires, formés de filets parallèles; ils n'ont aucune communication entr'eux, car on ne peut pas considérer comme une anastomose le prétendu entre-croisement de ces nerfs. Cette union des nerfs optiques tient à une commissure transversale dont l'apparition est postérieure à celle des nerfs eux-mêmes, en sorte que dans les premiers temps de l'évolution de l'encéphale, comme dans les espèces animales inférieures, cette jonction des nerfs optiques ne se fait pas remarquer.

Quant à leur figure, celle de tous les nerfs est cylindrique; la seule exception seroit pour le prétendu nerf olfactif, qui est triangulaire. Les nerfs sont disposés en longs cordons, desquels partent des branches, qui elles-mêmes se divisent en rameaux. Les faisceaux nerveux, composés de cordons serrés les uns contre les autres, excepté dans l'abdomen, où les cordons & les filaments séparés & isolés les uns des autres, ne constituent pas de faisceaux.

Les filaments dont l'assemblage forme les cordons, & dont la réunion de ceux-ci constitue les troncs ou faisceaux, ne restent pas collés ensemble. Leur séparation se fait en branches, puis en filaments ou rameaux. Ces rameaux partent les uns des autres sous des angles plus ou moins aigus; mais les branches qui fournissent des divisions plus délicates sont toujours séparées du tronc dans un point bien plus élevé que celui où cette séparation semble s'opérer; cette disposition diffère éminemment le système nerveux du système vasculaire. Les nerfs se distinguent encore des vaisseaux, en ce que de très-grands nerfs parcourent une étendue considérable sans fournir de branches, tandis que les vaisseaux en donnent sur presque tous les points de leur trajet, & souvent à de très-petites distances. Les vaisseaux spermiques & les artères carotides ne peuvent être donc considérées comme propres au contraire, car, dans leur état primitif, leur terminaison est près de leur origine, les testicules étant situés dans l'abdomen, chez le fœtus, &

le dos n'exhalait pas à cette première époque de la vie.

L'entrelacement des filets nerveux n'existe pas seulement dans leur épaisseur ou structure intérieure, il y a aussi divers modes de communications des nerfs entr'eux pendant leur trajet. Ces communications nerveuses se rapportent à trois formes principales, l'anastomose ou l'anneau, le plexus & le ganglion. L'anastomose se fait entre des branches séparées & distinctes, à peu près du même calibre; c'est ainsi que se réunissent les nerfs des bras entr'eux, les nerfs rachidiens les uns avec les autres, peu après leur sortie du canal vertébral, les rameaux du cinquième paire, ceux du nerf facial, &c. Il se forme en outre des anastomoses anastomotiques autour des vaisseaux. Tantôt elles proviennent des divers filets du même tronc, tantôt elles résultent de l'union de filets appartenant à des nerfs différents.

Les plexus nerveux ne sont encore qu'une anastomose disposée différemment par les cordons de plusieurs nerfs. Les cordons se réunissent à l'infini; des filets provenant de ces ramifications diverses produisent des cordons, des branches, de sorte que les nerfs qui sortent des plexus sont composés de filaments sortant de nerfs différents. Il est impossible de prouver que les plexus nerveux ne sont pas le produit d'anastomoses verveuses; il y a dans les deux circonstances fusion de la substance des nerfs.

Les ganglions, d'une structure plus complexe que celle des plexus, paroissent aussi être appelés à d'autres fonctions que les plexus. Plus indépendants que ces derniers, leur volume est plus considérable que celui des nerfs eux-mêmes & des plexus, dont le volume ne tient qu'à des anastomoses entre des nerfs voisins. Les ganglions n'ont point de forme générale, régulière; ce même ganglion varie beaucoup dans les divers sujets de la même espèce, sous le rapport de la grandeur, de la configuration, &c. Leur existence est aussi beaucoup moins constante que celle des plexus, & l'on voit quelquefois des ganglions considérables manquer. Ordinairement ronds, un peu aplatis, ils présentent une de leurs faces unies; plongés dans du tissu cellulaire, ils s'en distinguent par leur teinte grise ou rosée. Denses & fermes, leur substance, lorsqu'on l'incise, paroît homogène. Sous tous ces rapports, on peut les comparer aux ganglions lymphatiques. Leur substance est enveloppée étroitement par une membrane vasculaire, sur laquelle le tissu cellulaire forme encore une tunique fibreuse. La vascularisation les fait paroître composés de deux substances, 1°. de filaments diversément entrelacés, & qui se continuent avec les nerfs; 2°. d'une masse gélatineuse, d'un gris-rougeâtre, par laquelle ils sont enveloppés. Cette masse, d'apparence huileuse, fibreuse ou musculeuse, a été regardée par Scarpa comme n'étant que de la graisse sécr-

noire. Les ganglions sont simples ou composés; les premiers ne paroissent être que le développement des filets d'un seul nerf, car ils n'ont d'union ou de connexion avec aucun autre cordon, tandis que les autres ganglions doivent être considérés comme des centres au des points de réunion de plusieurs nerfs. Les ganglions simples ont une place fixe & une forme déterminée; ils ne manquent jamais; on en trouve à tous les nerfs de la moelle épinière, non loin de leur origine, & paroissent exclusivement dépendre de la racine postérieure de ces nerfs. Leurs enveloppes, ainsi que leur substance propre, sont plus consistantes que celles des ganglions composés, & leur tunique extérieure adhère à la membrane fibreuse du cordon rachidien, & leur membrane interne s'unit à l'enveloppe vasculaire du même cordon. Les filets de ces ganglions vont tous deux dans la même direction. Ces filets se ramifient, s'unissent entr'eux, & il ne sort de nerfs que des deux extrémités opposées de ces ganglions.

Les ganglions composés sont répandus dans tout le corps, mais ils se montrent surtout dans les cavités thoracique & abdominale. Plus nous que les premiers, leur enveloppe extérieure dépend du tissu cellulaire. Leur forme, leur situation, leur nombre, n'ont rien de constant; les fibres qui les constituent ne vont pas seulement d'une extrémité à l'autre de ces corps, & des nerfs sortent de divers points de leur contour.

La structure fibreuse des nerfs, bien distincte dans les plexus, se voit aussi dans l'encéphale & dans le cordon rachidien, où cependant elle se montre d'une manière moins claire que partout ailleurs. A la simple inspection des masses encéphaliques, on les croiroit formées d'une substance molle & pulpeuse; & c'est bien doute ce qui a fait croire à Bichat & à Wenzel que le cerveau & la moelle épinière n'avoient point de structure fibreuse. Des fibres bien manifestes sont aperçues sur des cerveaux d'adultes sans qu'on emploie aucun agent chimique pour en durcir la substance. En examinant les pédoncules cérébraux & cérébelleux, les corps striés, la grande commissure ou corps callosus, & la protubérance annulaire, on reconnoît aisément la présence des fibres. Quelques personnes ne pouvant nier cette disposition fibreuse, ne l'ont admise que dans quelques parties de la masse encéphalique; d'autres ont été jusqu'à dire que ces fibres étoient une apparence qu'on devoit à l'état de mort de l'organe; apparence qu'on ne pourroit reconnoître & démontrer pendant la vie. Cependant, pouvons-nous nier des faits que nos sens nous font voir, & que Malpighi, Gall & Reil ont signalés?

Les fibres sont-elles au caractère commun à la substance médullaire & à la substance corticale, ou n'y a-t-il que l'une des deux parties où cette disposition se rencontre? Malpighi, Haller, Swam-

mering, résolent à la substance grise ou corticale d'avoir des fibres comme en possède la substance médullaire. Vicq-d'Azyr & J.-F. Meckel font d'un avis différent, & dans leurs dissections ils ont pu poursuivre des filets ou petites fibres qui alluent de l'une à l'autre substance, & paroissent évidemment se continuer, quoique leur couleur changeât.

Suivant M. J.-F. Meckel, la moelle épinière fait la transition des nerfs au cerveau; comme ce dernier organe, elle est contenue dans une cavité osseuse, elle a des membranes semblables; mais, enveloppée immédiatement d'un feuillet membranéux formé par des vaisseaux & du tissu cellulaire, elle ressemble, par ce caractère, plus aux nerfs qu'au cerveau. La moelle épinière se compose de deux moitiés latérales, séparées antérieurement dans la plus grande partie de leur épaisseur. A son extrémité céphalique, un peu avant leur entrée dans le crâne, ces deux cordons se divisent en plusieurs faisceaux de fibres qui se croisent en montant; de telle sorte que le cordon d'un côté passe au côté opposé; ces cordons deviennent en même temps plus épais en traversant des masses de substance grise.

Les deux moitiés latérales de la moelle épinière & du cerveau ne sont pas à nu & à découvert l'une à côté de l'autre; liées ensemble par des fibres médullaires & par de la substance grise, elles tiennent l'une à l'autre par des cordons ronds ou par des rubans que l'on nomme *commissures*. Moins larges que les hémisphères, ces liens ont plus d'épaisseur qu'on ne le croit d'abord, car ils pénètrent profondément dans l'épaisseur de la substance des hémisphères, & leurs fibres se croisent avec celles qui s'élèvent du cordon rachidien. En développant le cerveau à la manière de M. Gall, on reconnoît & les fibres des commissures & celles qui procèdent d'arrière en avant; on peut même poursuivre les unes & les autres jusque dans la substance corticale des circonvolutions; mais bientôt leur écartement n'étant plus possible, on déclaire un des deux ordres de fibres.

Des fibres constituant le cerveau, les unes montent d'arrière en avant & proviennent du cordon rachidien, tandis que les autres font transversales & forment les commissures. Le premier ordre de fibres est appelé *disposition d'organisation*, & l'autre, *disposition de réunion*, ou *système des prolongemens ou pédoncules encéphaliques* & *système des commissures*. Ils se distinguent l'un de l'autre, non-seulement par leur direction, mais encore par leur origine, leur situation & leur consistance.

Les premières fibres, ou les divergentes, se terminent à la substance corticale, tandis que les fibres des commissures naissent de cette substance pour se terminer sur la ligne médiane; ces dernières sont plus molles & plus délicates que les fibres divergentes; elles forment des couches pas-

ticulaires qui enveloppent les cavités cérébrales. Il seroit difficile de dire avec rigueur comment ces deux systèmes de fibres se comportent réciproquement sous le rapport de leur liaison. M. Gall avoue que ses sens n'ont pu lui apprendre si les fibres des masses divergentes vont dans la substance grise, & si elles changent ensuite de direction pour former le système nerveux convergent, ou si ce dernier y naît sans communiquer avec le précédent. Le cerveau diffuse des nerfs sous le rapport de la structure & les fibres qui le composent, forment le plus souvent des feuillets; le névrylisme manque dans l'intérieur, ce qui rend les fibres libres, car la péripérie du cerveau paroît avoir seule une enveloppe comparable au névrylisme, & qu'on nomme *membrane vasculaire*, ou *pie-mère*. Les canaux névryliques manquent aussi sur des parties que l'on regarde habituellement comme des nerfs : ainsi les nerfs oculaires, derrière leur adossement ou union, & les prétendus nerfs olfactifs, sont dépourvus de névrylisme. On regardera avec plus de raison les nerfs olfactifs comme de simples prolongemens du cerveau ou des parties dépendantes de cet organe, que comme des nerfs proprement dits; alors les filets sortans de ces prolongemens seroient les véritables nerfs olfactifs ou ethmoïdaux.

La surface externe du cerveau présente, chez la plupart des animaux, des ondulations; soit dans toute son étendue, soit simplement dans quelques points. Chez l'homme & chez la plupart des mammifères, ces circonvolutions & les sillons qui les séparent, existent dans toutes les parties de l'organe; la membrane vasculaire recouvre les saillies, s'enfonce dans les sillons, & péètre de tous côtés la substance cérébrale. En outre, on voit dans l'encéphale des parties dont la disposition ressemble à celle des nerfs, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Par exemple, la commissure antérieure est entourée d'une gaine celluleuse, mince, provenant de la membrane vasculaire des cavités. Il est donc possible que tous les filamens du cerveau aient une enveloppe semblable, mais que leur liasse & celle du tissu cellulaire qui constitue cette enveloppe ne permettent pas de reconnaître.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que l'encéphale & le cordon rachidien se composent de faisceaux libres diversément entrelacés; que ces faisceaux de fibres sont plus distincts dans la substance médullaire que dans la substance cérébrale, & par ces observations il est constant que les masses nerveuses renfermées dans les cavités crâniennes & rachidiennes, sont disposées d'après le même type que les nerfs répandus dans tout le corps; qu'elles n'en diffèrent que par la masse & la réunion de ces faisceaux, ou par leurs divisions & leur écartement.

On pense alors généralement que les nerfs sortent de la moelle épinière dont ils sont les prolongemens : on a même prétendu que la substance

médullaire se trouve en dehors sur le cordon rachidien, pour que les nerfs qui en sortent eussent un plus petit trajet à parcourir, & n'eussent pas à traverser de substance grise; mais un examen attentif fait reconnaître que tous les nerfs communiquent plus ou moins avec de la substance cérébrale. Vicq-d'Azyr avoit depuis long-temps indiqué ces connexions, & avoit reconnu qu'il existe toujours de la substance cérébrale dans les points d'origine des cordons nerveux. M. Gall a démontré que cette disposition est générale, & que la naissance d'un nerf correspond toujours à la présence de la substance cérébrale.

M. J.-P. Meckel a vérifié, par un grand nombre de recherches, que les observations de Vicq-d'Azyr & de M. Gall étoient exactes. Il dit que ces rapports de coexistence des implantations ou origines nerveuses & de la présence de matière grise, sont très-visibles dans les insectes, les vers & les poissons, où tous les nerfs sortent d'une substance grise, avec des racines diversement ramifiées; cette dépendance des nerfs & de la substance corticale se voit également dans les animaux supérieurs. Dans les points d'où sortent les plus gros cordons, comme par exemple les nerfs des membres, on voit la substance grise plus abondante.

Les nerfs naissent-ils du même côté des centres cranio-rachidiens que celui où ils se distribuent aux organes, ou se croisent-ils, c'est-à-dire, tirent-ils leur origine du côté opposé à celui où ils se répandent? On a tout à tout répondu négativement & affirmativement à ces questions. L'opposition des sentimens sur ce point résulte des degrés différens d'exactitude & de férocité que l'on a apportés dans les recherches. Comme tous les animaux ne présentent pas le même arrangement organique, il a dû en suivre des opinions divergentes, suivant les espèces que l'on avoit étudiées.

Les nombreuses observations de paralysies de la moitié du corps opposée à celle où la lésion avoit été produite, fit d'abord admettre cet entre-croisement des nerfs; mais des recherches bien faites démontrèrent qu'il n'y a pas d'autre entre-croisement que celui dont nous avons parlé, & que l'on voit à la partie supérieure du cordon rachidien. Les dissections les plus attentives n'ont jamais pu permettre de suivre un cordon nerveux rachidien jusque dans la partie opposée à la sortie de ce cordon; les lésions de la moelle épinière n'entraînent la paralysie du côté opposé au point affecté, que dans cette même partie du cordon rachidien; on nous venons de dire que c'est le point d'entre-croisement.

Il faut donc bien distinguer les lésions du cerveau où cette opposition entre le côté sur lequel l'altération est produite & le côté paralysé ne se manifeste point, & les lésions de la moelle épinière du cordon rachidien où cette opposition doit exister, puisqu'elle dépend de l'entre-crois-

ment des faisceaux nerveux. Galien avoit signalé cette différence des kîuns du cerveau & de la moelle épinière.

On a prétendu qu'il y avoit un entre-croisement des fibres cérébrales dans les corps striés; mais cette opinion n'est pas admissible, parce qu'on fait que ces corps striés sont isolés l'un de l'autre, qu'ils ne communiquent pas ensemble, & que la commissure antérieure par laquelle ils paroissent unis, n'est pas liée à leur propre substance.

Les hémisphères cérébraux se développent séparément; leur union par les commissures appartient à une des dernières périodes de leur évolution. Dans les fœtus monstrueux où l'évolution cérébrale a été arrêtée, c'est toujours sur la ligne médiane qu'on trouve les marques d'un retard ou de cette cessation de développement. J'ai vu plusieurs exemples de cette séparation des hémisphères cérébraux chez des fœtus; & ce que je dis pour les hémisphères & pour leurs commissures, grandes ou petites, je puis le dire pour les nerfs optiques. Dans les premières périodes de l'évolution des organes, ils sont séparés l'un de l'autre; plus tard, une commissure transverse les unit; enfin, dans la dernière époque, ils se rapprochent de plus en plus & s'adossent l'un à l'autre sans s'entre-croiser; ici, l'anatomie pathologique vient encore éclairer l'anatomie & la physiologie.

Les nerfs appelés *cervinaux* sont considérés comme ne possédant qu'une racine simple, tandis que ceux du cordon rachidiens ont une racine double, une antérieure & l'autre postérieure, qui sortent des faces correspondantes de la moelle épinière. Ces deux rangées de racines sont séparées l'une de l'autre par un prolongement de l'arachnoïde, nommé *ligament dentelé*. Les faisceaux de l'une & l'autre origine restent séparés jusqu'à leur sortie de la gaine méningée du cordon rachidien, & ne sont tous réunis que par du tissu cellulaire assez lâche. Les faisceaux simples, dont se composent les nerfs du crâne, ne sortent, au contraire, de la dure-mère que par une seule ouverture, quoique les filaments ne soient pas encore étroitement liés ensemble.

La direction des nerfs près de leur origine, n'est pas la même pour tous: les nerfs du crâne diffèrent en cela de ceux de la moelle épinière. Les premiers se portent d'arrière en avant, tandis que les derniers se dirigent de haut en bas, ou de devant en arrière. Les nerfs crâniens forment avec leur point d'origine, des angles d'autant plus aigus, qu'on les considère plus haut; ceux du cordon rachidiens sortent sous des angles presque droits vers la partie supérieure du rachis, & ces angles deviennent de plus en plus aigus, à mesure que l'on considère les nerfs plus bas. La racine postérieure de tous les nerfs spiniaux se sent pour produire un ganglion simple, oblong, peu après que cette racine est sortie de la médulle. La racine antérieure n'a aucune liaison avec ce ganglion, &

cette première disposition a d'abord été aperçue par Halse, & indiquée postérieurement par Scarpa & Monro. Les rapports des nerfs avec les vaisseaux ne sont pas les mêmes partout; le plus communément ils sont accompagnés d'artères & de veines, comme, par exemple, le nerf crural, le médian, les nerfs intercostaux, ceux des viscères de l'abdomen. D'autres nerfs sont seulement accompagnés de veines; enfin il en est qui sont seuls pendant une partie de leur cours. Par exemple, le nerf radial, le cubital, le sciatique, &c.

Ils se terminent presque partout de la même manière; nous en excepterons le nerf oculaire, qui ne forme pas de branches ni de ramifications; il s'épanouit & produit une expansion membranaire. Les nerfs auditifs offrent une terminaison analogue à celle des précédents; elle est diffuse par son apparence pleuriforme, puis ces nerfs se perdent dans une membrane, mais ne la constituent pas essentiellement. La terminaison des autres nerfs est difficile à apprécier, ces cordons se confondant avec la substance propre des organes; on observe facilement que les nerfs deviennent très-mous dans leurs ramifications, & paroissent perdre leurs enveloppes en tout ou en partie; la substance médullaire devient alors prépondérante, & finirait par être la seule qui constituerait le nerf. Il résulteroit de cet état, que le système nerveux auroit une disposition semblable à ses deux extrémités. Ce qui se passe ici dans les ramifications nerveuses n'arrive-t-il pas dans les animaux les plus bas de la série zoologique, & ceux que l'on considère comme dépourvus du système nerveux ne différeroient-ils seulement des autres sous ce rapport, que par l'absence du névrileme & des autres enveloppes des cordons nerveux?

Le système nerveux n'est pas en rapport avec tous les organes, ni de la même manière avec ceux qui sont pourvus de ces cordons. Quelques anatomistes pensent que le tissu adipeux, ainsi que le tissu cellulaire, sont dépourvus de nerfs. Ils rangent dans la même catégorie les membranes fibreuses, l'épiderme & ses annexes, les ongles, les cheveux & quelques parties d'une structure particulière, comme, par exemple, la crosse transparente, le cristallin, le cordon ombilical, &c.

Parmi les parties qui reçoivent des nerfs dans leur texture, les viscères thoraciques & abdominaux sont les moins bien partagés sous le rapport du nombre & du volume des fîets. Ces viscères se composent de membranes fibreuses, de tissu cellulaire & de vaisseaux; il est facile de reconnaître que les nerfs doivent y être en petit nombre.

Le système vasculaire est sans doute plus favorisé que le tissu cellulaire par la présence & par la terminaison des cordons nerveux; l'on croit avoir reconnu que les artères possèdent plus

de nerfs que les veines & les vaisseaux lymphatiques. Les cordons nerveux des faisceaux musculaires sont considérables, mais c'est surtout dans les muscles de la vie organique que ces nerfs sont remarquables. Cependant le cœur a des cordons nerveux nombreux, mais plus petits que ceux des autres parties du système musculaire de la vie organique. Parmi les muscles volontaires, les fléchisseurs reçoivent des nerfs plus nombreux & plus gros que ceux des muscles extenseurs. Enfin, la plus grande quantité de substance nerveuse se trouve dans les organes des sens, qui doivent même, sous ce rapport comme sous celui de leurs fonctions, être considérés comme dépendans du système nerveux. Après les organes des sens proprement dits, vient le système cutané, dont quelques-unes de ses parties ne reçoivent que des nerfs très-déliés & en petit nombre; mais dans d'autres points, comme, par exemple, à l'extrémité des doigts, sur le gland, au clitoris, sur les lèvres, &c., les cordons nerveux sont multipliés & volumineux. Les organes sur lesquels s'exerce à la fois un tact, une espèce de toucher, & qui peuvent devenir des instrumens de mensuration & de préhension, sont pourvus de faisceaux nerveux abondans. Ainsi, les mains chez l'homme, les lèvres chez la plupart des mammifères, la queue dans certaines espèces de singes, & la trompe chez l'éléphant, sont dans ce cas.

Haller a calculé que l'encéphale recevoit un cinquième du sang en circulation; les nerfs eux-mêmes marchent accompagnés d'artères d'un assez gros calibre, & dont chacune se divise définitivement en deux branches, l'une ascendante, l'autre descendante, avant de traverser le névrilème. Tous ces vaisseaux arrivent en formant avec les cordons nerveux un angle à peu près droit. Dans l'intérieur du nerf, ces vaisseaux artériels offrent des anastomoses multipliées, qui favorisent la circulation sanguine. Ces communications vasculaires se voient de même dans l'encéphale, & les vaisseaux y présentent aussi de nombreuses flexuosités. Ce n'est qu'après avoir éprouvé de nombreuses divisions, après être devenues capillaires, que les artères pénètrent la substance nerveuse, soit dans ses masses pulpeuses, soit dans ses cordons.

Cette présence de beaucoup de vaisseaux doit faire naturellement présumer la fréquence des inflammations dans les nerfs, & pourtant la pathologie est presque muette sur ce point. Nous verrons que ce silence ne dépend pas de la rareté des phlegmasies dans le système nerveux, mais du peu d'attention des observateurs. Aujourd'hui on étudie mieux qu'autrefois les lésions des nerfs, & l'on a déjà découvert des phlegmasies du cerveau; du cordon rachidien & des nerfs eux-mêmes, dont les Anciens soupçonnaient à peine l'existence.

MÉDECINE. Tome X.

Les anatomistes sont assez généralement d'accord sur la plus grande vascularité de la substance grise que de la substance blanche ou médullaire. Certains physiologistes ont même été jusqu'à prétendre que la partie corticale du cerveau était essentiellement vasculaire. Que cette substance cendrée soit extérieure ou intérieure, toujours est-il bien manifeste que les vaisseaux s'y rendent en plus grand nombre que dans la partie médullaire. On ne voit point dans l'encéphale & dans ses annexes, un arrangement des artères & des veines semblable à celui que ces vaisseaux observent entr'eux dans les autres parties. Dans l'encéphale, ces deux ordres de canaux sanguins ne sont pas réunis; les veines ne marchent point comme satellites des artères; les unes & les autres sont séparées, & le plus souvent dans des lieux opposés. La disposition des veines a également cela de particulier, que les branches s'insèrent aux trunks principaux, dans une direction opposée au cours du sang, & qu'elles manquent de valvules. Cette disposition particulière des vaisseaux sanguins indique que la circulation est lente dans l'encéphale, & que le sang y séjourne long-temps. Ruisch pensoit que les veines font en nombre inférieur aux artères dans la substance corticale, & que les artères y existoient presque seules; la transition de ces vaisseaux aux premiers se faisant particulièrement dans la pie-mère. Les vaisseaux lymphatiques sont en si petit nombre dans quelques parties du système nerveux, par exemple dans l'encéphale, que plusieurs anatomistes ont douté de leur présence dans cet organe. Quant aux ganglions lymphatiques, personne n'a jusqu'ici démontré leur existence dans les tissus dont nous parlons. Les tumeurs appelées improprement lymphatiques, qu'on a découvertes dans la substance du cerveau, du cervelet, chez des sujets scrophuleux, ne démontrent nullement la présence des vaisseaux absorbans dans ces organes. Lorsqu'on étudiera mieux les affections scrophuleuses, on reconnaitra que les tumeurs qui les caractérisent sont le produit d'un état inflammatoire, & que ces tumeurs font de nouvelle formation, & quoique placées dans l'épaisseur des tissus, elles n'appartiennent pas à la substance des organes.

Le système nerveux est pourvu de plusieurs enveloppes; dans les cavités crâniennes & rachidiennes, on trouve la *pie-mère*, l'*arachnoïde* & la *dure-mère* (voyez ces mots), & sur les nerfs eux-mêmes on peut démontrer une tunique celluleuse, une membrane moyenne, dense & résistante, que Reil appelle le *névrilème* (voyez ce mot), & enfin, plus profondément, une membrane très-mince, qui est à la substance médullaire des nerfs, ce que la membrane interne des vaisseaux & du cœur est au sang. Ce feuillet intérieur n'est pas toujours bien distinct, quoique constant; mais il se voit aisément dans l'œuf,

Dddd

& coëssant une des deux parties de la ténine. Les ganglions ont des mêmes enveloppes que les nerfs.

La substance nerveuse possède à un certain degré la faculté de se dilater & de se contracter, mais cette faculté n'est pas la même partout, sous le rapport de son intensité. L'hydrupe des cavités cérébrales, dans laquelle parfois la substance de l'organe devient aussi mince qu'une feuille de papier, met l'étensibilité du tissu nerveux en évidence. Des nerfs, voisins de tumeurs anévrysmales, se laissent distendre & aplatis. Quant à la contractilité organique, elle se manifeste lors de la section d'un cordon nerveux; alors les deux bouts du nerf se séparent & s'écartent l'un de l'autre par le jeu de la contractilité. Ces phénomènes, que nous attribuons aux simples propriétés de tissu, ne sont pas pour nous des raisons suffisantes pour admettre, comme l'a fait le docteur Home (*Transfusions philosophiques*) une *faculté vitale de contraction*.

La sensibilité du système nerveux est hors de doute; on sait généralement que les nerfs sont très-sensibles, & l'on croit que cette propriété réside dans la substance propre du nerf & non dans son névrième. Les opinions sont partagées sur la sensibilité de la substance de l'encéphale. Des physiologistes refusent cette propriété à l'encéphale, tandis que d'autres la lui accordent. Haller pense que les parties profondes sont sensibles, tandis que les couches extérieures ne le sont pas.

Le système nerveux, aux diverses époques de la vie, offre des différences très-remarquables : ce système est un des premiers existants, s'il n'est pas le premier. Les diverses parties de l'appareil nerveux naissent-elles simultanément ou les unes après les autres? S'il y a des temps distincts pour ces origines, l'évolution des parties centrales précède-t-elle celle des parties périphériques, ou bien est-ce le contraire qui arrive?

L'observation a démontré que le système nerveux, le système vasculaire & le canal intestinal se forment simultanément, ou à peu près, car l'exiguité des parties ne permet guère de saisir les différences, & de les suivre avec certitude & rigueur. Il paraîtrait que l'évolution des parties centrales précède celle des organes périphériques. Döllinger, Tiedemann, Carus, se sont, dans ces derniers temps, occupés avec succès de ces recherches, & nous serions connaître les résultats de leurs travaux, si déjà nous n'avions pas dépassé les limites qui nous sont assignées.

Si les parties centrales naissent les premières, quelles sont celles de ces parties dont l'évolution s'opère primitivement? Il y a une masse centrale supérieure, formée du cerveau & de la moelle rachidienne, & une masse inférieure subordonnée à la précédente, c'est-à-dire, les ganglions du grand sympathique. (Voyez TISSERANDIQUX.)

Cette dernière naît-elle avant la première? L'hypothèse la plus spéciale & la plus probable est celle dans laquelle on admet que l'encéphale & le cordon rachidien naissent les premiers, & l'on rapporte, en faveur de cette opinion, 1°. des observations faites sur des embryons; 2°. l'analogie, d'après le développement connu du système nerveux dans plusieurs classes d'animaux; 3°. enfin on allègue pour dernière raison, que les parties les plus constantes dans l'échelle animale, sont celles dont nous parlons ou celles qui les représentent. Cette même raison fait penser que le cordon rachidien se développe avant l'encéphale. On fait que le rapport du volume du cerveau à la moelle épinière est tel, que le premier perd de plus en plus de sa prépondérance, à mesure qu'on se rapproche des animaux inférieurs. Il est bien reconnu que le cordon rachidien arrive plutôt que le cerveau à son développement parfait. Dans les foetus mal conformés, on voit fréquemment toute la partie supérieure du corps manquer; mais on n'en observe pas chez lesquels le cerveau ou les parties supérieures existent seules, c'est-à-dire, où l'encéphale soit dans son développement normal, tandis que les parties inférieures, le cordon rachidien par exemple font défaut.

On a encore cherché des raisons en faveur de cette priorité de la moelle épinière, & l'on a cru pouvoir en démontrer la nécessité, en disant que le cordon rachidien étoit l'organe central de la vie animale, & qu'il devoit le développer nécessairement vis-à-vis du cœur, qui est le centre de la vie végétative. Mais puisque la moelle épinière naît dans l'embryon avant le cœur, puisqu'on rencontre des nerfs & même une moelle épinière chez des animaux (les insectes) qui n'ont pas de cœur, puisque l'encéphale & le cordon rachidien se développent chez des monstres dépourvus de cœur; enfin, puisque, dans les animaux invertébrés, la situation du cœur est beaucoup moins constante que celle des parties centrales du système nerveux, cette raison, tirée de la nécessité de la priorité de la moelle épinière, n'est pas aussi péremptoire que certains auteurs l'ont prétendu.

Une opinion plus récente a été émise pour combattre la précédente; elle est trop hypothétique pour être accréditée, & ne reposant sur aucun fait, ne s'appuyant sur aucune observation, elle ne peut avoir aucune consistance, ni conserver de défenseurs. M. Ackermann a prétendu que le nerf, grand sympathique naîtoit le premier, & il dit en faveur de son sentiment, que le cœur, qui est pourvu du plus grand degré d'énergie vitale, est le centre de la vie végétative. Les globules de substance nerveuse forment à travers le tissu de l'organe central de la circulation; ces globules se rangeroient les uns à côté des autres pour former les cordons cardiaques dont la trans-

parente & la moelle font considérées comme une circonstance favorable à l'admission de la priorité de ce développement. Le système nerveux, d'après cette supposition de M. Ackermann, croit vers les gros troncs vasculaires forment de cet organe, & se dirigeroit vers la cavité du crâne, où, recevant un grand accroissement, il en résulteroit l'encéphale & le cordon rachidien, qui naîtroit le dernier, puisqu'il procéderoit du nerveu & du cerveau.

On peut reproduire contre cette assertion les raisons alléguées pour combattre l'idée que le système nerveux doit nécessairement se trouver vis-à-vis du cœur, & rapporter également celles qui démontrent la priorité d'apparition & de développement de la moelle épinière sur toutes les autres parties du système nerveux. M. Ackermann & tous les physiologistes qui ont adopté son opinion ont regardé la disposition du système nerveux des animaux invertébrés, comme ne correspondant point à l'encéphale & au cordon rachidien des animaux vertébrés, mais bien au système nerveux du grand sympathique. Cette idée de M. Ackermann est sans fondement; car, ainsi que le fait très-bien observer M. J.-R. Meckel, le système nerveux dans les animaux invertébrés présente, sous beaucoup de rapports, des dispositions qui portent naturellement à le comparer au système nerveux cérébro-rachidien des animaux vertébrés. Si les prétentions de M. Ackermann étoient fondées, le nerf grand sympathique devroit arriver sans contredit à une période de développement où il auroit une prépondérance marquée sur l'encéphale & le cordon rachidien, soit sous le rapport de sa masse, soit sous celui de son action.

Or, cette prépondérance n'existe jamais. L'hypothèse de M. Ackermann a encore contre'elle la dépendance bien reconnue par les expériences de Légallois, du nerf trisplanchnique & des organes qu'il anime, de la moelle épinière: dépendance qui certes n'existeroit point si les nerfs de la vie organique étoient la première partie formée du système nerveux, & si les nerfs cérébro-rachidiens naîssent du nerf grand sympathique. Soient l'opinion que nous combattons, le cordon rachidien ne précéderoit pas l'encéphale dans son apparition & son développement, & les faits fournis par les déviations organiques, les nombreux exemples de fœtus privés de tête ou de cerveau, mais pourvus de moelle épinière, ne seroient d'aucune valeur, ou bien il faudroit considérer ces monstruosités comme étant la suite des maladies dans lesquelles la tête ou l'encéphale seulement auroient éprouvé une destruction. Les assertions de M. Ackermann se trouvant invalidées par tous les faits que nous présentait l'anatomie comparée, la physiologie expérimentale & l'anatomie pathologique, je crois qu'on doit regarder comme démontré, que le cordon

rachidien est la partie du système nerveux qui naît la première.

Après la première manifestation du cordon rachidien & après son évolution, commence celle de l'encéphale, qui procède toujours de la moelle épinière. La marche du développement de ces organes dans l'embryon & le fœtus, ainsi que dans les divers ordres de la chaîne animale, ne laissent point de doute à cet égard.

Les parties situées le plus en avant, c'est-à-dire, celles qui sont les plus éloignées du premier point de la moelle épinière, sont les dernières à paraître & à se développer. Le nerf grand sympathique paraît & croît successivement au-devant de la moelle épinière, & se ramifie à une série de ganglions communicant entr'eux, & avec la moelle rachidienne, par des cordons médullaires.

Les caractères offerts par les organisations inférieures, ou ceux qu'on observe dans une évolution arrêtée ou en retard, se conservent plus long-temps, & quelquefois pendant la vie entière, plus distinctement dans le nerf grand sympathique ou dans l'encéphale, que dans la moelle épinière. Les premiers paroissent composés de plusieurs foyers situés plus ou moins près les uns des autres, sous une apparence analogue à la disposition de tout le système nerveux des animaux invertébrés inférieurs, tandis que la moelle épinière n'offre qu'une seule masse composée de deux moitiés latérales, & non de plusieurs ganglions individuels, rangés les uns près des autres, depuis la tête jusqu'à la queue. Le système nerveux a proportionnellement plus de volume, plus de moelle ou de liquidité aux premières périodes de la formation, que dans celles qui les suivent. La quantité de la substance fluide est d'autant plus abondante, & les parois des cavités qui doivent rester pendant toute la vie, sont d'autant plus minces, que l'organisme se rapproche davantage du moment de la création. Bientôt ces parois des ventricules prennent plus d'épaisseur & de consistance, & de très-bonne heure l'on voit les cavités du cordon rachidien disparaître. Aux diverses époques de la vie, la texture apparente du système nerveux présente des différences remarquables. On n'aperçoit point, dans les premiers temps, deux substances distinctes, l'une grise & l'autre blanche. Toute la masse a une teinte légèrement cendrée. Peu à peu, cette couleur devient blanche dans les nerfs & à l'intérieur du cordon vertébral. Ces modifications s'opèrent plus tard dans le cerveau, dont la substance interne paraît pendant long-temps d'écouleur plus foncée que celle de la substance corticale. On attribue généralement cette particularité à la présence d'un très-grand nombre de vaisseaux.

(G. BASSACR.)

NERION, f. m., *nerium oleander* (Matière médicale), de *neris*, humide. Dénomination sous laquelle

Dddd 2

quelle on a désigné l'arbrisseau appelé *laurier-rose*. (Voyez ces deux mots dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

Le nérian appartient à la famille des apocinées. L'eau distillée de ses feuilles ne parait devenir un poison on un médicament, suivant la force on la dose, que par la petite quantité d'acide prussique, qu'elle contient; les feuilles de cette plante renferment, en outre, une quantité assez considérable d'acide gallique, qui parait s'y trouver à l'état libre. (L. J. M.) *

NÉRIS ou **NART** (Eaux minérales de). Ce long, que les Latins nommoient *Nerius*, *Nerisus*, *Nera*, *Nerio-magus*, *Vicus neriensis*, est situé sur les bords du Cher, à une lieue & demie environ de Menthaon. Il nous offre quatre sources thermales, assez près les unes des autres, lesquelles forment avec force & abondance dans un vaste bassin de forme ovale, de cent vingt-six mètres de circonférence, & divisé en trois portions. On les distingue par les noms de *Grand-Puits*, de *Puits de la Croix*, *Puits-Carré*, & *Saure-Nouvelle*. Cette dernière n'est connue que depuis 1755, époque du fameux tremblement de terre de Lisbonne; il parait même que son apparition fut accompagnée de phénomènes géologiques extraordinaires, puisqu'an rapport de M. le comte Caylus (1), « les fondemens du *Grand-Puits* s'ébranlèrent, une source nouvelle s'éleva tout-à-coup de la profondeur d'un tonneau, à plus de trois pieds au-dessus de la surface ordinaire des eaux, & entraîna avec un bruit effroyable une quantité considérable de pierres & de sables qui comblèrent la plus grande partie du bassin. »

Les eaux minérales de Nérus sont limpides, onctueuses; elles ont une odeur animale, se rapprochant de l'hydrogène sulfuré. Froides, elles sont un peu nausabondes; ébantes, elles ont la faveur de l'eau tiède. Leur pesanteur spécifique est celle de l'eau distillée: leur température, qui est très-élevée, varie sensiblement dans les différentes sources; elle est, suivant M. Bours-Desserviers (2), de 42 à 45 degrés dans la Nouvelle-Source, de 40 à 41 dans le Puits de la Croix, de 40 à 39 dans le Puits de la Croix, & de 17 à 16 dans le Puits-Carré. Ces eaux thermales conservent très-long-temps leur chaleur, qui est très-forte, & pendant l'hiver elles ne refroidissent pas sensiblement: l'espèce de pétilllement que l'on entend en s'approchant du bassin, est même assez fort pour faire croire qu'elles sont en ébullition. Soumises à l'analyse la plus scrupuleuse, elles paraissent contenir pour principes minéralisateurs volatils, suivant l'auteur que nous venons de citer, les gaz acide car-

(1) *Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques & romaines*, tome IV.

(2) *Recherches historiques & Observations médicales sur les eaux thermales & minérales de Nérus*, 1 fort volume in-8°, avec planches. Paris, 1822.

bonique, azotique ou nitrogène, oxygène & hydrogène sulfuré, mais en très-petite quantité pour ce dernier.

100 parties de résidu des principes minéralisateurs fixes ont fourni:

Carbonate de soude.....	23 grains.
Sulfate de soude.....	17
Muriate de soude.....	12
Carbonate de chaux.....	1
Silice.....	7
Eau.....	8
Matière animale & terre....	5a

Total..... 100 grains.

Raspail, dans son *Traité analytique des eaux minérales*, ne fait aucune mention des propriétés médicales des eaux de Nérus, qui, d'après leurs principes constituans, doivent être placées dans la classe mixte des eaux *alkalino-salines*. Ces eaux ont été cependant remarquées par plusieurs praticiens: elles conviennent, en effet, & peuvent être particulièrement recommandées contre les dartres, la gale, le catarrhe de la vessie, la leucorrhée, la péritonite chronique, l'hypochondrie, l'hyssérie, les affections syphilitiques, surtout les douleurs ostéocopes, les scrophules, le scorbut, &c. &c. M. le professeur Alibert dit en avoir obtenu de très-bons effets dans des cas de gouttes atoniques; & selon M. Michal (1), elles ont opéré des cures miraculeuses dans la paralysie & les anciens rhumatismes, soit articulaires, soit cutanés. Ce praticien (*Op. cit.*) rapporte plusieurs observations à l'appui de son assertion; il régarde les eaux de Nérus comme nuisibles dans toutes les affections de poitrine, particulièrement dans les cas d'hémoptysie.

Les eaux minérales de Nérus s'administrent à l'intérieur & à l'extérieur, sous forme de boissons, de douches, de bains de vapeurs, & de boues. Comme leur chaleur élevée ne permet guère d'en faire usage dans le bassin même, ou se baigne dans des maisons particulières, où l'eau est conduite au moyen de plusieurs canaux souterrains.

On prescrit le plus ordinairement à l'intérieur l'eau du *Puits de la Croix*, prise à la source sucrée & à jeun, depuis la dose de deux jusqu'à cinq & six verres. Lorsque les malades sont très-irritables, on peut la crisper avec le lait sucré, l'eau de tilleul, l'eau de veau ou de poulet, les sirops de gomme, de guimauve, &c. Ces eaux minérales sont généralement assez fritées à la saison des eaux, c'est-à-dire, de la fin de mai à la fin d'octobre.

Le territoire de Nérus offre, dans quelques endroits, des tombeaux & des vestiges de momemens romains, qui prouvent que ces peuples y ont fait des incurursions: on y rencontre, en effet, plusieurs

(1) *Description analytique des eaux minérales de Nérus*. — 1. *Ann. Journal de médecine*, 1716, pag. 159.

restes d'aqueducs, plusieurs portions de colonnes, des pierres taillées, des inscriptions qui paroissent avoir appartenu à des temples ou à d'autres édifices antiques; on a même trouvé des médailles du Haut & du Bas-Empire, de tous les métaux, des hampes sépulcrales, des urnes, des petites statues. Il est probable, suivant la comte Caylus (*Op. cit.*), que les Romains avoient construit un théâtre auprès des eaux de Nérus; c'étoit, dit-on, sur un demi-cercle dont chaque rayon, tiré du centre à la circonférence, étoit de vingt toises. Ce monument n'existe plus; les restes en ont été déblayés, & forment aujourd'hui, au centre d'une promenade ornée de plantations indigènes & exotiques, un amphithéâtre aussi pittoresque qu'impofant. Des promenades étendues & bien plantées bordent les avenues du nouvel établissement thermal, non loin duquel on a encore trouvé, en 1831, en y faisant de nouvelles fouilles, cinq ou six piscines pavées en marbre & en faïence, ce qui feroit croire qu'il y avoit à Nérus le système de bain le plus complet qui ait jamais existé dans la Gaule.

Un hôpital civil contenant une cinquantaine de lits, desservi par des sœurs de la Charité, est placé près du bassin thermal; il offre une ressource assurée aux indigens: il est ouvert pendant la saison des eaux, & plus de deux cents malades y sont logés, baignés & nourris gratuitement (1).

(A. J. T.)

NEROLI. (*Matière médicale.*) Dénomination technique & assez peu usitée, sous laquelle on désigne, dans les pharmacies, l'huile essentielle des fleurs d'orange. (*Voyez* ce mot dans les *Dictionnaires de Pharmacie & de Chirurgie.*)

NERPRUN. (*Matière médicale.*) *Rhamnus*, de la famille des frangulacées, qui donne plusieurs espèces employées comme purgatif en médecine. (*Voyez* Nerprun, dans le *Dictionnaire de Botanique* de l'Encyclopédie méthodique.)

On trouve, chose digne de remarque, dans la plupart des espèces du genre des nerpruns, une ressemblance, une analogie entre les propriétés des baies & la propriété purgative, même vomitive du liber. Plusieurs oiseaux, & particulièrement les grives, recherchent les baies de nerprun, & l'on assure que leur chair se ressemble de cette nourriture.

Le sirop que l'on prépare avec les baies du nerprun purgatif (*Rhamnus cathartica*) est souvent employé, soit seul, soit à différentes doses, dans des potions purgatives. Ce sirop se donne à la dose d'une, de deux, & même de trois onces pour les personnes robustes, & chez lesquelles on se propose d'augmenter, en les évacuant, l'exhalation séreuse de la membrane muqueuse intestinale.

(1) *Revue Médicale*, Op. cit.

Le rob de sirop est moins employé que le sirop de nerprun; l'un & l'autre sont mis souvent en usage dans la médecine vétérinaire, surtout pour les chiens, qui sont très-bien purgés avec cette préparation.

Les paysans, dans quelques contrées où les traditions d'une médecine ancienne & populaire se sont conservées, se purgent en mettant vingt ou trente baies de nerprun dans leur soupe. On est porté à croire, d'après quelques essais de Garriol, que le prunier-nerprun grillé denoieroit des fruits légèrement purgatifs.

Les baies & le liber d'un autre nerprun (*la bourlaine*, *Rhamnus frangula*), étoient autrefois fort employés, & cependant l'usage ne s'en est conservé que dans la médecine traditionnelle & populaire de quelques contrées: les baies de bourlaine sont, du reste, très-peu purgatives & peuvent le manger. L'écorce des racines de la même plante est un violent purgatif. (*A. J. M.*)

NERVEUSES (Affections, maladies). (*Pathologie.*) Sous le nom d'*affections nerveuses* on désigne, d'une manière peut-être bien générale, en grand nombre de maladies très-différentes les uns des autres, pour être réunies sous le même titre: inconvénient inséparable d'une distribution des maladies, suivant un ordre anatomique; méthode de classification très-défectueuse, ainsi que Sauvages l'a judicieusement remarqué; & dont on voudroit qu'un médecin aussi éclairé que M. Joseph Frank n'eût pas fait usage (1). Dans une exception trop vaine, le mot *affection nerveuse* n'est pas synonyme du mot *névrose* ou *neurose*. (*Voyez* ces mots.) En effet, sous le titre d'affections nerveuses, les auteurs de pathologie, en général, & M. Frank en particulier, ne comprennent pas seulement les névroses proprement dites, ou les affections morbides caractérisées par une irrégularité soutenue & prolongée dans l'innervation, mais un grand nombre de maladies & de lésions, soit du cerveau, de la moelle épinière & de différents tissus qui entrent dans leur structure, soit des nerfs eux-mêmes, de leurs troncs, de leurs branches & de leurs nombreuses ramifications: distribution essentiellement vicieuse, qui, rapproche des maladies qui n'ont aucune similitude & qui seroient mieux placées sous un autre titre; ce qui est évident, par exemple, pour l'hydrocéphale, que l'on ne peut séparer des autres hydroopies, ou pour la céphalalgie, qui a beaucoup plus de rapport avec les autres phlegmasies parenchymateuses, qu'avec l'apoplexie.

(1) Dans les *principes de médecine pratique* (*Principes de médecine pratique*), M. Joseph Frank, a aussi dans son seul catalogue ou dictionnaire des maladies du système nerveux en général, & des maladies du cerveau en particulier. (*Op. cit.*, tome II: Leipzig 1818.)

Le mot *névrose*, dont l'acception est beaucoup plus restreinte, & qui paroit avoir été employé pour la première fois d'une manière judicieuse par Cullen, s'applique seulement à des affections morbides non fébriles, non inflammatoires, & souvent plus graves que douloureuses, qui se manifestent par une irrégularité évidente, par une perversion sensible dans les fonctions du système nerveux; dérangemens que l'on distingue avec soin d'une lésion organique quelconque du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs, quoique souvent ils en soient la suite ou la conséquence, comme l'apoplexie, la paralysie & quelques cas d'épilepsie. Ces maladies nerveuses, la catalepsie, la léthargie, les spasmes chroniques & atoniques; plusieurs affections nerveuses partielles, telles que l'hypochondrie, l'hystérie, font évidemment des *névroses*; & quelle que soit la lésion organique que l'on puisse regarder comme leur cause directe ou prochaine, on a toujours moins égard à cette cause, dans son étude oéographique, qu'à un trouble plus ou moins étendu de l'action nerveuse qui les caractérise.

Dans l'histoire des *névralgies* ou des *vésanies* que quelques auteurs ont comprises d'une manière si peu convenable parmi les *névroses*, ce dérangement, cette irrégularité dans les fonctions du système nerveux ne fait point l'essence de la maladie, qui est toute locale. Les *vésanies* en particulier le rapportent même à un ordre de fonctions qui ne peut être entièrement assigné à aucun appareil d'organe, & quelle que soit la connexion intime des facultés intellectuelles avec l'encéphale. Ajoutons que dans le cas où le cerveau pourroit être regardé comme l'organe de la pensée, on seroit forcé de convenir que ce viscère n'agit pas dans cette attribution comme une portion du système nerveux, mais bien comme un organe spécial, disposé, dans une portion très-étendue de sa structure; pour un aussi important usage. (*Voyez NÉVROSE, NÉVURALGIE, VÉSANIE.*) (L. J. M.)

NERVEUX (Système, appareil). On désigne sous le nom de *système nerveux*, l'ensemble des nerfs & de certains appareils particuliers d'organes qui semblent leur servir de centre ou de point de ralliement (les centres nerveux, composés de l'encéphale, du prolongement rachidien & du grand sympathique). Lorsque l'on parle du système nerveux, dans l'acception pathologique, on a bien moins égard aux phénomènes particuliers & locaux qui se rapportent aux nerfs, qu'aux phénomènes généraux qui dépendent de l'action des centres nerveux, considérés comme une fonction spéciale : fonction qui peut être plus ou moins troublée, tantôt par un dérangement dans l'ensemble ou dans quelques-uns de ces organes, & tantôt sans en dérangement appréciable de ces mêmes parties.

Les *névroses* se rapportent au système nerveux;

les *névralgies*, au contraire, se manifestent toujours sous la forme de l'altération morbide d'un nerf ou de plusieurs nerfs, sur la nature & sur les symptômes de laquelle on ne peut élever aucun doute, du moins pour les *névralgies* externes, (*Voyez NÉVURALGIE, NÉVROSE.*)

Si l'on considère plutôt l'étendue dans les progrès des connaissances, que la mesure du temps & l'ordre chronologique, on peut assigner trois grandes époques dans l'histoire des connaissances relatives au système nerveux; savoir : 1^{re} l'étude purement descriptive de ses formes extérieures, qui a commencé dans l'école d'Alexandrie, & qui a eu pour objet l'ensemble du système nerveux, depuis ses parties centrales jusqu'aux ramifications qui viennent s'épanouir dans les tégumens externes & internes, ou se perdre avec les terminaisons vasculaires dans le parenchyme des organes; 2^o les investigations relatives à la structure de ce même appareil nerveux; 3^o les expériences & les observations dirigées avec le dessein de connaître le développement & les fonctions particulières des nerfs, de la moelle épinière & des parties principales de l'encéphale.

Les recherches de Vicq-d'Azyr, de M. Chaussier, de M. Gall; celles de Reil; les observations de Tiedemann; le travail de M. Serres; les expériences de Legallois, & celles plus récentes encore de M. Flourens, répondent à ces différentes séries de travaux dont elles font la partie la plus nouvelle, & quelle que soit d'ailleurs l'importance que l'on attache à leurs conséquences & à leurs résultats physiologiques & pathologiques.

Les questions qui appartiennent à ces divers genres de considérations sont, d'ailleurs, étrangères à la nature de cet article, & se trouveront convenablement exposées dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*. Nous nous bornerons ici à quelques vues générales de pathologie qui sentent dans la médecine proprement dite.

Plus on étudie les fonctions du système nerveux, mieux on découvre l'influence qu'elles exercent sur le développement, sur la marche, sur la complication des maladies : le plus ordinairement cette influence ne laisse aucune trace après la mort, lors même qu'elle s'est manifestée pendant la vie avec tous les caractères d'une maladie spéciale & d'une véritable *névrose*; mais souvent elle les nerfs, ou toute autre partie du système nerveux, présentent, soit dans leurs formes, soit dans leur structure, certaines altérations dont il est facile de reconnaître les rapports avec plusieurs phénomènes morbides qui se font manifestes pendant la vie.

L'inflammation des nerfs, dont Reil a cru découvrir la trace dans quelques circonstances, est une maladie assez rare, & sur la réalité de laquelle les esprits sévères pourroient même élever des doutes : on a remarqué du moins que, dans les

plus grands défordres de l'économie animale, dans les progrès toujours croissans de la pourriture d'hôpital, par exemple, la suppuration paroît souvent persister pendant long-temps le tissu nerveux (1).

Les déchirures, les solutions de continuité qui s'opèrent spontanément dans la substance même du cerveau, ainsi qu'il arrive dans plusieurs apoplexies, ne sont pas toujours mortelles : on les reconnoît quelquefois, long-temps après une sensible lésion, à une couleur jaunâtre & rougeâtre dans le lieu du déchirement, ou à quelques débris qui s'étoient formés dans ce lieu, autour du sang épanché, & dont l'absorption graduelle avoit été suivie d'une guérison absolue. Voyez SOROTTEZ (Maladies soporeuses).

L'ossification de quelques points de l'encéphale est beaucoup moins rare qu'une altération analogue dans les nerfs. Il s'est formé plusieurs fois des kystes dans le cerveau, & ce phénomène, comme nous venons de le remarquer, est une suite ordinaire de l'apoplexie dans les cas les plus favorables.

Les hydatides, que l'on a rencontrées à diverses reprises dans le cerveau de quelques quadrupèdes, sont beaucoup plus rares chez l'homme. Il est vraisemblable que dans quelques observations rapportées à cette altération morbide, on avoit confondu les hydatides avec le simple kyste. Les tubercules se développent souvent dans le cerveau chez les sujets scrophuleux & à la suite de différens symptômes de maladie que l'on n'attribuoit pas à leur véritable cause.

Le cancer du même organe a été aussi observé : il paroît se manifester pendant la vie, & assez long-temps avant sa terminaison funeste, par une abolition graduée des facultés morales & mentales, sans aucun symptôme de résane. Il n'est pas bien certain que l'on puisse regarder comme de nature cancéreuse, certaines tumeurs qui se développent dans l'épaisseur des nerfs, ou même dans la substance de l'encéphale ou de la moelle épinière; tumeurs dures, grâsses, qui se bornent à écarter les fibres médullaires sans le confondre avec elles; & dont quelques chirurgiens célèbres ont fait hardiment l'extraction.

Le tissu des nerfs & la substance du cerveau présentent, dans les dissections, plusieurs altérations, plusieurs traces de lésion, qui dépendent d'une maladie fort ancienne, ou qui en sont la circonstance essentielle, ou même la cause prochaine; & il n'est pas toujours facile de faire cette distinction. Ainsi, dans plusieurs circonstances, le volume de certains nerfs paroît beaucoup augmenter, surtout à la suite des tumeurs blanches ou des névralgies, qui occasionnent aussi, du moins pour le nerf sciatique, ainsi

que l'a vu Cotugno, une infiltration de matière glutineuse.

Une compression prolongée des nerfs d'un organe, manque rarement d'amener une sorte d'atrophie ou de dessèchement.

Il importeroit de s'assurer, par de nouvelles observations, si les nerfs paroissent véritablement avoir perdu de leur consistance, dans le typhus & à la suite des hydropisies ou des hémorragies mortelles.

Le cerveau lui-même présente, & à différens degrés, un ramollissement fort remarquable, & qui paroît correspondre d'une manière assez constante avec certaines altérations morbides, sur le caractère desquelles MM. Rostan & Lallemand ont appelé tout récemment l'attention par des vues ingénieuses & par de nombreuses observations. On consultera avec avantage, sur les affections locales des nerfs, une très-bonne dissertation, dans laquelle M. Jules Desfont a été dirigé par M. le professeur Bichard. Paris, 1822, n°. 255.

(L. J. M.)

NERVIN, adjectif. (*Matière médicale*.) On a nommé ainsi les médicaments que l'on croyoit propres à fortifier les nerfs; mais il n'existe point de médicaments que l'on puisse judicieusement désigner sous ce nom. Les onguens & les linimens, ainsi que beaucoup de préparations que l'on a employées dans cette intention, se bornent à produire une action superficielle & passagère, qui est quelquefois indiquée à la suite des entorses, des luxations & des attaques de goutte. Le baume nerval ou nerval, assemblage assez bizarre de corps gras & de substances balsamiques, n'est presque plus en usage. En général, les nerfs les plus viciés peuvent être remplacés avec avantage par un liniment savonneux alcalin, ébéré & camphré, ou ébéré & térébenthiné. L'opodeldoch anglais, ou l'opodeldoch de Sanchez, considéré sous ce rapport, sont préférables à tous les nervins de la vieille pharmacie. (Voyez le mot NERVIN, dans les *Dictionnaires de Chirurgie* & de *Pharmacie* de l'Encyclopédie.) (L. J. M.)

NESSEL (Edmond) (*Biographie médicale*), premier médecin de Georges-Louis de Bergles, évêque & prince de Liège, naquit dans cette ville en 1658. Il étudia la médecine à Leyde, & voyagea en France pour y perfectionner ses études médicales. De retour dans sa patrie, où sa réputation l'avoit précédé; Nessel se distingua bientôt par ses cures brillantes qu'il fit, & pendant tout le cours de sa vie, il eut la douce satisfaction de mériter l'estime & la confiance de ses concitoyens. On a de lui un *Traité analytique des eaux de Spa, & de leurs vertus & usages*, publié à Liège en 1699, in-12, & deux thèses manuscrites qui sont devenues précieuses aujourd'hui. Nessel traite, dans l'un de ses Mémoires, des propriétés des plantes les plus médi-

(1) Voyez le Mémoire que j'ai publié avec M. le docteur Durbin, sur la gangrène humide des adultes, & à la suite duquel des détails.

en médecine, & dans l'autre, il fait connoître la méthode qui lui a le mieux réussi dans les maladies rares qu'il a eu l'occasion d'observer.

Nesfel mourut en 1751. Il laissa un fils (*Mathieu Nesfel*) qui fut aussi médecin, & de plus conseiller à la cour allosiale de Liège. Nous fous ses redoublables à ce dernier d'un ouvrage, également sur les eaux minérales, ayant pour titre : *Apologie des eaux de Spa*. Liège, 1715, in-8°. (*Extr. d'Éloy.*)

NEUCRANTZ (Jean) (*Biographie médicale*), médecin du dix-septième siècle, étoit docteur en philosophie & premier physicien de Stralsund dans la Poméranie. Il a publié un ouvrage ayant pour titre : *Auditorium pharmacopœiæ Stralsundensis*. Stralsund, 1645.

NEUCRANTZ (Paul) (*Biographie médicale*), étoit de Rostock, où il commença à exercer la médecine en 1652. Il obtint une charge de physicien à Lubeck, en 1655, & mourut en 1671, âgé de 66 ans. Nous avons de lui :

De purpurâ liber singularis, in que febrius malignarum natura & curatio proponitur. Lubeck, 1648, in-4°. Francfort, 1660, in-4°.

De Hæmorrhæ exercitatio medica, in quâ principis piscium exquississima bonitas, summæque gloria asserta & vindicata. Lubeck, 1654.

Idea perfecti medici. Ibid. in-4°. (C'est l'occasion fongere de Jean-Henri Meibomius.)

Neucrantz est un fils (Jean-Antoine) qui fit ses études médicales à Helmstadt, sous Henri Meibomius, & vint exercer la médecine dans la patrie. Ce médecin fut attaché au commencement du dix-huitième siècle à la cour de Schwerin-Mecklenbourg. (*Extr. d'Éloy.*)

(A. J. T.)

NEUFVILLE (Gérard de) (*Biographie médicale*), médecin du dix-septième siècle, naquit à Weiel, au duché de Cleves, où il fut reçu docteur en médecine. Les dispositions & le talent qu'il avoit manifestés, quoique très-jeune encore, pour le professorat, & les vaines connoissances qu'il avoit acquises dans tous les genres d'instruction, l'engagèrent à choisir, comme objet de ses principales études, les mathématiques, dont il fit des leçons publiques à Heidelberg, en qualité de professeur extraordinaire. Neufville passa ensuite à Brême, & non-seulement il y continua d'enseigner les mathématiques, mais encore la physique & la médecine. Il obtint une chaire de philosophie & de médecine à Groningue, où il mourut en 1648. Ce médecin ne nous a laissé que des ouvrages de physique en de mathématique.

NEUFVILLE (Louis de), disciple d'Albinus. Il fut reçu docteur en médecine à Leyde, où il publia, en 1730, une *Dissertation* in-4°, dans la-

quelle il soutient l'existence de la membrane allantoidé & de l'ouvrage dans le fatus humano (1). (*Extr. d'Éloy.*) (A. J. T.)

NEUMANN (Gaspard) (*Biographie médicale*), médecin distingué & chimiste célèbre du dix-huitième siècle, né à Zullichau, dans le duché de Crosse, vers la fin du dix-septième, marcella dès les premières années de la vie un goût particulier pour l'étude de la pharmacie. Frédéric 1^{er}, roi de Prusse, dont Neumann devint dans la suite conseiller aulique, voulut cultiver d'aussi heureuses dispositions & favoriser ses recherches scientifiques. Il le fit en conséquence voyager aux frais de la cour, & en 1711, Neumann partit, d'après les ordres du sen prince, pour aller visiter les principales mines d'Allemagne. Il se rendit d'abord en Hollande pour y suivre les travaux des plus célèbres chimistes de ce pays, sous les auspices de Boerhaave, & de la passa en Angleterre, où il apprit la mort de son puissant protecteur. Dès ce moment, les propositions les plus avantageuses furent faites à Neumann pour le rappeler à Berlin; il les refusa, & ne revint dans cette ville qu'en 1716, après avoir fait un voyage à Hanovre avec Georges 1^{er}, roi d'Angleterre. Stabl étoit alors médecin du roi Frédéric-Guillaume. Neumann devint bientôt le meilleur ami de ce se fant, & cette honorable relation lui ayant fait obtenir de nouveaux bienfaits de la cour, il en profita pour voir l'Angleterre, la France & l'Italie. De retour à Berlin, pour la seconde fois, Neumann fut fait pharmacien de la cour, devint professeur de chimie pratique au collège de médecine & de chirurgie que le roi fonda en 1723, fut nommé membre de la Société royale de Londres en 1725, & deux ans après, il fut reçu docteur en médecine de la Faculté de Hall. Neumann n'en continua pas moins le cours de ses voyages; il parvint la Silésie, la Moravie, la Bohême, visita les baies de Tarnitz, & se rendit de nouveau à Berlin par Dresde & Freyberg, dont il examina les principales mines avec toute l'attention d'un chimiste vraiment observateur.

Ce savant, qui fut agréé à l'Académie des curieux de la nature en 1728, & à l'Institut de Bologne en 1734, reçut le diplôme d'adjoint de la première de ces deux académies, en 1730, & presque en même temps, il fut nommé doyen du collège de médecine & de chirurgie de Berlin. Neumann ne put jouir long-temps de tous ces honneurs scientifiques, qu'il ne devoit qu'à son mérite & à son talent; il fut enlevé aux sciences le 20 octobre 1737, on a après sa nomination au décanat. Nous avons de lui plusieurs ouvrages

(1) Cette Dissertation fut réimprimée en 1736, sous format in-8°.

remarquables,

remarquables, & quelques Mémoires non moins intéressans, dont quelques-uns font partie des différens recueils des sociétés savantes auxquelles ce célèbre chimiste avoit l'honneur d'appartenir ; tels sont :

1°. *Tractatus de Oleo distillato formicarum aethereo* (1).

2°. *Tractatus de albumine, ovi succino finit* (2).

Disquisitionis de camphorâ (3).

De experimento probandi, spiritum vini gallici (4).

De salibus alcalino-fixis (5).

De camphorâ thymi (6).

On a séparément (7) :

Lectiones chymicae de salibus alcalino-fixis & de camphorâ. Betolui, 1727, in-4°.

De Succino, Opio, Caryophyllis aromaticis & Cafforeo. Ibid.

De ambri griseâ (8).

(Extr. d'Eloy.) (A. J. T.)

NEUMARKT (Eau minérale de), dans le Haut-Palatinat. La source est située près de la ville, dans une contrée fort agréable, & à quelques lieues du bourg de Wullstein. Cette eau, dont il se dégage à l'air du gaz acide carbonique, répand une odeur sulfureuse. Sa saveur est piquante, désagréable & astringente. Elle a donné, pour résultats d'analyse, de l'hydrogène sulfuré, de l'acide carbonique, du carbonate de chaux, du carbonate de magnésie, du sulfate de chaux, du sulfate de magnésie, du muriate de chaux, du muriate de magnésie, peu de carbonate de soude & une matière extractive.

L'eau de Neumarkt, qui contient beaucoup de fer, a été employée comme vermifuge : elle paroit également convenir dans les maladies de la peau, la gale, la paralysie, l'atonie de l'estomac.

(A. J. T.)

NEUTRE, adj., du mot latin *neuter*, ni l'un ni l'autre. Mot employé dans l'acception chimique, pour désigner les sels exactement combinés, & dans lesquels les proportions d'acide & de base sont si bien observées, que les propriétés des

composans ont disparu, & qu'il en est résulté des propriétés nouvelles. (Foyez SEL.)

(A. J. T.)

NEVIANUS (Marc). (*Biographie médicale*.) Médecin du seizième siècle (1), qui servit utilement sa patrie pendant plusieurs années, soit en qualité de bourgeois-mestre, soit en exerçant la profession d'une manière honorable. Il abandonna, au grand regret de ses concitoyens, la pratique de la médecine pour embrasser l'état ecclésiastique. Néviaus, qui avoit toujours montré beaucoup de goût pour la poésie, consacra ses talens poétiques à la médecine, mais ses vers manquent de pureté & d'élégance. On lui reproche de n'avoir point traité certaines matières qui sont le sujet de ses ouvrages, avec tout l'intérêt dont elles étoient susceptibles.

On a de lui plusieurs poèmes latins, dont voici les dates & les titres :

De plantarum viribus. Poemation. Lovanii, 1563, in-8°.

De qualitibus primis, secundis, tertiis, eisque quas natura tegit occultas additas. Poemation. Gandavi, 1573, in-8°.

De curandis morbis. Poemation. Ibid., 1573, in-8°.

In Poemation sumum, de curandis morbis, Comillariis de febribus agens. Ibid., 1575, in-8°. (Extr. d'Eloy.) (A. J. T.)

NEURALGIE, f. f. (*Pathologie*), douleur du nerf, du grec *αλγος*, douleur, & de *νευρ*, nerf. Affection morbide d'un nerf ou de plusieurs nerfs, constamment fixée sur un tronc ou sur une branche de ces nerfs, & qui, dans le temps du paroxysme, se propage & s'étend, du point primitivement attaqué, sur toutes ses ramifications.

Les névralgies ne doivent pas être confondues avec les névroses : ces dernières ont cela de remarquable, que leurs symptômes ne se rapportent jamais aux nerfs eux-mêmes, mais aux diverses parties qui en reçoivent évidemment l'action, & dont les propriétés ou les fonctions ne sont troublées que par l'effet d'un changement dans le rapport normal ou habituel de ces organes avec quelques parties principales de l'appareil nerveux. (La moelle épinière, la moelle allongée, les tubercules quadrijumeaux, les hémisphères du cerveau.)

La névralgie est au contraire la maladie locale, & si l'on peut s'exprimer ainsi, l'affection person-

(1) Voyez *Acta natura curiosorum*, &c.

(2) Ibid.

(3) *Mélanges de la Société royale de Berlin*.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem.

(6) *Traité d'histoire philosophique*.

(7) Ibidem.

(8) Neumann a publié en outre quelques ouvrages en allemand ; celui dans lequel se trouvent ses leçons orales sur le Tuf, le Café, le Bière & le Vin, parut à Leipzig en 1736, in-4°.

nelle d'un nerf externe ou interne. La névrose, plus étendue, se manifeste par un état irrégulier, par une disposition morbide, dans l'ensemble & dans quelques parties du système nerveux, quel que soit d'ailleurs le point de ce système, qui se trouve affecté, & dont la lésion, quand on parvient à la connaître, n'est considérée par le pathologiste que comme la cause prochaine ou organique de la maladie. (Voyez NÉVROSE.)

La névralgie, au contraire, consiste essentiellement, comme nous venons de le dire, dans la lésion même du nerf ou des nerfs, dont l'affection morbide constitue la maladie, quel que soit d'ailleurs l'irrégularité ou le désordre qui en résulte pour les fonctions du système nerveux.

Les névralgies ont beaucoup de rapport avec la goutte & le rhumatisme : elles se manifestent brusquement comme ces deux dernières maladies, avec tous les caractères d'une fluxion douloureuse, souvent insensible de déplacement ; quelquefois même elles sont produites par les mêmes causes, par l'impression subite du froid, par un changement, par une perversion dans la mode de perspiration, par la suppression d'une affection catarrhale, ou d'une hémorragie habituelle. On a observé en outre qu'il existait une affinité particulière entre la névralgie, la goutte & la gravelle, & que les personnes exposées à devenir goutteuses ou rhumatisées, par une disposition héréditaire, le trouvaient souvent tourmentées, dans le cours de leur vie, de migraines très-violentes & de plusieurs affections morbides, soit externes, soit internes, auxquelles il étoit difficile de ne pas reconnaître une origine névralgique (1).

Il existe sans doute, relativement à quelques cas particuliers de névralgies, quelques descriptions obscures, quelques observations incomplètes, soit dans les ouvrages des médecins les plus célèbres de l'antiquité, soit dans les écrits les plus recommandables du seizième & du dix-septième siècle ; mais il ne parait pas qu'avant la seconde moitié du dix-huitième on ait rien publié d'exact & de positif sur ces maladies (2) : à cette époque & vers l'année 1756, l'auteur d'un

ouvrage estimé, sur les maladies de l'homme, Anon, chirurgien de Versailles, publia plusieurs observations sur quelques névralgies particulières, auxquelles il donna des noms qui auroient dû être conservés dans le vocabulaire de la médecine, & qui du moins doivent être rappelés dans une bonne synonymie. (Le *tic douloureux de l'œil* ou (névralgie frontale), le *tic douloureux* (névralgie maxillaire), le *tic douloureux de la face* (névralgie sous-orbitaire).) Beaucoup plus tard, un savant médecin de Naples, Cotugno, que nous citerons encore avec complaisance parmi nos contemporains, publia une monographie sur la *névralgie du nerf sciatique*.

Mais aucun auteur, avant M. le professeur Chaussier, ne s'étoit élevé à l'idée générale des névralgies considérées dans leur ensemble, avec le dessein de former dans leur réunion une famille véritablement naturelle de maladies.

Dans l'état présent des connaissances, & d'après les aperçus qui nous font connaître avec plusieurs praticiens très-éclairés, il importe d'admettre des névralgies externes & des névralgies internes, en évitant de confondre ces dernières avec quelques affections morbides encore peu connues, & que l'on a trop légèrement comprises parmi les névroses (3).

Nous attacherons un grand prix à cette distinction dans tout le cours de cet article, que nous diviserons en deux parties, sous les titres suivants, savoir :

1°. Les névralgies externes ;

2°. Les névralgies internes.

Les névralgies ne peuvent d'ailleurs être rapportées à aucune des classes généralement reconnues par les principaux nosographes. Pour les placer convenablement dans le dénombrement des maladies, & faire apprécier comme il convient leurs affinités avec les affections morbides, dont il importe de les rapprocher, il faudroit établir une nouvelle classe ou grande famille naturelle & celle des *fluxions douloureuses*, qui se trouveroit sous-divisée en trois ordres ; savoir, 1°. le rhumatisme, 2°. les affections goutteuses, 3°. les névralgies.

NÉVRALGIES EXTERNES.

Les névralgies externes ont été spécialement l'objet du travail de M. le professeur Chaussier (2). Suivant cet habile observateur, elles sont caractérisées par la nature de la douleur vive & déchirante, tant à la fois avec torpeur, formation dans le commencement, pulsations, élanemens, tiraillemens successifs, sans rougeur, sans chaleur, sans tension ni gonflement appa-

(1) D'après ces analogies, qui sont bien plus remarquables relativement à la pratique que sous le point de vue de la théorie, on ne doit pas se fonder sur plusieurs névralgies particulières dont les mécanismes & les causes se trouvent souvent avec des symptômes de goutte ou de rhumatisme.

(2) Hippocrate a indiqué sous le nom d'*ischias*, plusieurs symptômes qui peuvent convenir à la névralgie, sans la caractériser d'une manière véritablement nosographique. Certains symptômes attribués par Galien à la sciatique, se rencontrent dans plusieurs autres maladies de l'articulation coxo-fémorale. Du reste, les auteurs qui voudraient tracer quelques traces d'une histoire de névralgie, antérieures à l'époque que nous venons d'indiquer, pourrions citer dans l'illustration de Wessel, sur la sciatique ; De dolore ischiacico, Lem., 1680, celle de V. Stok, sur la même maladie, en 1708, 1721.

(3) L'asthme, l'angine de poitrine, le proctus, le cardialgie, les névralgies abdominales indistinctes, &c. &c.
(2) Table synoptique des névralgies.

rent de la partie où l'irritation est éprouvée : symptômes qui reviennent par accès plus ou moins longs, plus ou moins rapprochés, souvent irréguliers, & quelquefois périodiques.

M. le professeur Chaussier fait entrer aussi parmi les caractères de la névralgie, le siège de la douleur qui occupe constamment un tronc ou une branche de nerfs, d'où la douleur, dans le temps du paroxysme, s'étend & se propage en parcourant rapidement & comme un éclair toutes les ramifications de ces nerfs jusques dans leurs dernières extrémités : irradiation qui amène sans irrégularité plusieurs symptômes secondaires, tels que le spasme, le frémissement & l'agitation convulsive, les gestes automatiques, ou véritable *tic*, ou une habitude vicieuse, un tel dérangement de plusieurs fonctions, suivait, la nerf allongé & la distribution des filets, suit à des muscles, suit à des organes sécrétoires.

Ces considérations générales, sur la nature, sur le caractère de la névralgie, résultent d'un grand nombre de faits & d'observations : ainsi, on a remarqué plusieurs fois que les symptômes névralgiques étoient le rigoureusement l'effet de l'altération morbide d'un tronc ou d'une branche de nerfs, que leur sédition interrompoit tout-à-coup ces symptômes ; que dans d'autres circonstances, l'irritation du nerf malade les augmentoit, & même la simple pression, ainsi que Coteugno a eu souvent l'occasion de s'en convaincre. Il est d'ailleurs prouvé que les nerfs les plus sujets à la névralgie externe, sont les nerfs placés sous la peau, mais principalement les nerfs de la face, & surtout ceux qui sont environnés d'un tissu cellulaire peu abondant, & qui se trouvent exposés à l'impression du froid & à des causes externes de lésion.

Le principe d'irritation qui semble s'attacher aux nerfs dans la névralgie, varie sans doute souvent dans sa nature ; mais ordinairement on a reconnu des analogies avec la disposition arthritique ou rhumatismale : du moins est-il arrivé plusieurs fois que la *névralgie sous-orbitaire* en particulier, a cessé tout-à-coup, au moment d'une attaque de goutte au pied, ou d'une attaque de rhumatisme sur un membre ; & que d'une autre part, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, plusieurs personnes, dont les pères avoient été atteints de gravelle, de goutte ou de maladies rhumatismales, s'étoient trouvées tourmentées d'allusions névralgiques à différentes époques de leur vie, & quelquefois sans le concours d'aucune cause occasionnelle connue.

Ces rapports de la névralgie avec une constitution morbide quelconque, leur mode de développement, la diversité des causes qui occasionnent ou qui entretiennent ces maladies, ont un droit particulier à notre attention.

Les névralgies, considérées relativement à

leurs causes, pourroient être sous-divisées en *névralgies sympathiques ou consécutives*, & en *névralgies primitives ou locales*. Nous venons de remarquer que plusieurs de ces maladies paroissent se développer souvent sous l'influence d'une disposition quatuor. On a fait la même observation relativement au rhumatisme invétéré, à la syphilis & à différentes maladies chroniques & constitutionnelles, ou entretenues par l'altération d'un organe souvent très-éloigné, & sans connexion particulière avec le siège de la névralgie. Nous devrions ajouter que peut-être on devroit regarder comme névralgiques, les douleurs intolérables qui accompagnent quelquefois la gangrène par cause interne, dans un âge avancé, & sous l'influence évidente d'une altération constitutionnelle.

Les causes locales de névralgies qui, du reste, paroissent presque toujours exiger une prédisposition constitutionnelle, sont l'impression subite du froid, & surtout du froid sec, la piqure, l'érosion d'un nerf, l'irritation qui résulte de la présence d'une tumeur, d'un ganglion, d'un tubercule, &c. &c. Quelle que soit la nature des causes qui occasionnent la névralgie, cette maladie suit une marche régulière ou irrégulière, ou non compliquée d'inflammation : ce qu'il importe de prendre en considération sous le rapport du pronostic & du traitement de la maladie. Mais il faut en convenir, ces nuances & ces distinctions sont subtiles entre les causes internes & les causes externes de maladies consécutives & de maladies primitives, sont bien difficiles à saisir. On y parvient cependant, au moins dans quelques cas, par une grande habitude, à l'aide du discernement & de la sagacité que développe, avec le temps, un exercice attentif de la médecine. Si la névralgie se rattache à une disposition constitutionnelle, mais sans être inflammatoire, la pression n'augmente pas la douleur, excepté pendant le paroxysme. Il y a peu ou point de gonflement. La douleur se déplace facilement, sans causes appréciables. On cite, à ce sujet, l'exemple d'une névralgie qui, après avoir occupé alternativement chaque épaule pendant quatre ans, s'étoit portée sur la cuisse, où elle se manifesta avec tous les caractères d'une sciatique. Dans le cours de ma pratique, j'ai eu l'occasion, dans deux circonstances, de voir cette même sciatique succéder brusquement à la plus forte hyponalgie, & se guérir par un traitement antiphlogistique, long-temps & convenablement administré ; il n'est pas rare aussi, que des attaques régniques de goutte succèdent à des migraines périodiques, remarquables par leur durée & par la violence de leurs symptômes. Dans la névralgie compliquée d'inflammation, le nerf se tuméfie, devient rougeâtre, ce que l'on doit observer s'il est superficiel. Dans ce cas, si on le comprime sur un de ses points, la douleur que l'on excite se répand

Ecc 2

avec une extrême rapidité dans toutes les ramifications. Il survient alors quelquefois une fièvre consécutive ou symptomatique. Ces névralgies inflammatoires, lorsqu'elles ne font pas très-violentes, se guérissent plus promptement & plus facilement que les autres, comme le prouvent quelques exemples de névralgies du nerf radial, qui le sont dissipées en douze jours.

C'étoit sans doute à la suite d'une complication inflammatoire, qui n'est rien moins que coullante, que Cotugno a observé dans la sciatique les différentes altérations du nerf crural postérieur, & de sa tunique cellulaire, qu'il a décrites dans sa dissertation.

D'autres observateurs ont eu l'occasion de voir à la suite de la névralgie, le même nerf, rougeâtre, à la sortie du bassin, & les filets pénétrés de pus avec épanchement sanguin dans l'épaisseur de la cuisse, tandis que le nerf du côté opposé étoit dans l'état sain.

Cette complication inflammatoire n'est pas inconnue aux névralgies, ainsi que quelques médecins l'ont pensé dans ces derniers temps. Elle est purement accidentelle, plus fréquente au début de la maladie qu'à une époque plus avancée, & ne pouvant être regardée dans tous les cas, comme une complication : point de vue sous lequel on devoit également considérer les fluxions rhumatismales & plusieurs fluxions catarrhales que les nosographes modernes n'ont pu comprendre dans les pleuragies, sans donner une extension illimitée à cette dénomination.

Les névralgies sont placées au premier rang parmi les maladies douloureuses; elles ne le terminent pas ordinairement d'une manière foudroyante; mais la fréquence de leur retour, quand elles sont périodiques, ou la continuité de leurs symptômes, quand elles sont irrégulières, amènent à la longue, & par l'effet de la souffrance, une grande maigreur & une altération profonde dans plusieurs fonctions.

La névralgie périodique se génère moins difficilement que la névralgie irrégulière ou atypique. Les moyens de traitement employés pour opérer cette guérison, ne sont pas uniformes, & souvent, sont très-peu efficaces. On les emploie d'une manière aussi rationnelle qu'il est possible, mais fréquemment aussi d'une manière tout-à-fait empirique, & sans pouvoir espérer le succès constant & assuré, que l'on obtient quelquefois par la même voie, de plusieurs autres médications.

Les saignées locales ou générales paroissent indiquées au début de la maladie, & surtout lorsqu'elles débutent coincident avec la suppression d'une évacuation sanguine. On y parvient obtenir quelques bons effets des révulsifs & des résolvans, employés comme moyens de révulsion. Le quinquina, donné seul, ou combiné avec la valériane, ne doit être abandonné, dans les cas de périodicité, qu'après plusieurs tentatives évidemment inutiles.

On a tiré plus ou moins de parti de certains narcotiques, mais surtout de la jujubine noire, de l'infusion alcoolique de stramonium, des préparations diverses d'aconit, de belladone, de ciguë. On a eu recours également, tantôt avec succès & tantôt sans succès, à divers exutoires, à des masques, à des rubéfiants.

La section du nerf malade a été tentée, mais elle ne donne pas un soulagement durable, & ordinairement la maladie se renouvelle quelque temps après la cicatrisation.

Ces premiers aperçus contiennent aux névralgies, considérées sous un point de vue général; ils doivent être modifiés suivant la marche & les phénomènes propres aux différentes espèces de cette maladie.

En considérant les névralgies extérieures relativement à leur siège, c'est-à-dire, aux nerfs allocés, M. le professeur Chaussier en a reconnu huit espèces, dont quelques-unes ont été observées par lui pour la première fois, tandis que les autres, plus ou moins bien décrites, le trouvoient confondues sous des dénominations différentes, avec des espèces d'un autre genre, ou même avec des affections d'un autre ordre, ou d'une autre classe.

Ces huit espèces de névralgies, que l'on pourroit considérer comme des modèles ou des types de ce qui constitue les espèces en nosographie, sont : 1°. la *névralgie frontale* (tic douloureux de l'œil); 2°. la *névralgie sous-orbitaire* (tic douloureux de la face); 3°. la *névralgie maxillaire* (tic douloureux); 4°. la *névralgie naso-frontale*, dont M. le professeur Chaussier a dû la connoissance à ses propres observations; 5°. la *névralgie simonophtée* (sciatique postérieure); 6°. la *névralgie simonophtée* (sciatique antérieure); 7°. la *névralgie plantaire*; 8°. la *névralgie cubito-digital*.

M. le professeur Chaussier admet en outre une neuvième espèce, sous le nom de *névralgies anomales*, afin de réunir sous un même titre, un grand nombre de symptômes irréguliers d'affections morbides, qui ne peuvent être rationnellement attribués qu'à une disposition névralgique.

1°. Espèce. *NEVRALGIE FRONTALE*. Sauvages a désigné cette maladie sous le nom de *nyctalagus catarrhalis*, & André l'a décrite dans l'ouvrage que nous avons cité, sous le titre du *tic douloureux de l'œil*.

Les ramifcations frontales du nerf trifacial sont principalement affectées dans cette névralgie. La douleur commence souvent au trou sourcilier; elle s'étend ensuite à la paupière supérieure, au sourcil, à la glande lacrymale, à l'angle nasal des paupières, & même quelquefois à tout un côté de la face. Ses retours sont le plus ordinairement périodiques; l'accès revient tous les jours, plus

souvent le soir que le matin, & après une durée de trois à quatre heures consécutives, il cesse entièrement. La névralgie, sous cette forme, constitue une variété que l'on trouve désignée dans les auteurs, sous le nom de *fièvre locale* (*febris topica*), douleur périodique. La névralgie frontale, sans cesser d'être périodique, présente une variété caractérisée par la direction de la douleur, qui se porte plus profondément dans l'orbite & à la surface de l'œil; disposition qui mérite plus particulièrement d'être remarquée, à la suite des opérations qui viennent d'être pratiquées sur l'œil. Plenck a désigné cette variété de la névralgie, sous le nom d'*ophthalmolymie périodique*.

Une troisième variété, qui succède souvent aux deux premières, suit une marche moins régulière; ses accès sont plus courts, mais plus fréquents; souvent la douleur est accompagnée d'un sentiment de gêne, de souffrance obscure dans les sinus frontaux, de sécheresse des cavités nasales, ou de quelques symptômes d'affections catarrhales. C'est plus particulièrement à cette variété, quoiqu'on ne lui ait pas donné le titre de *nyctagmus catarrhalis* de Sauvages, ou celui de *tic douloureux de l'œil* d'André,

2^e. Espèce. NÉVRALGIE SOUS-ORBITAIRE. (*Trismus dolorificus maxillaris* de Sauvages.) Les branches sous-maxillaires du nerf facial & de ses rameaux sous-orbitaires, sont le siège de cette névralgie. La maladie, après s'être manifestée d'abord, & comme un point de départ, au tron sous-orbitaire, se distribue à la joue, sous l'arcade zygomatique, s'étend à la lèvre supérieure, à l'aile du nez, à la paupière inférieure, à l'angle nasal des paupières. Quelquefois elle remonte vers le tron des nerfs, se porte vers les filets dentaires, dans les sinus sous-maxillaires, au palais, à la luette, à la base de la langue, ou même à tout le côté de la face. Le malade, pendant ses accès, craint de parler; souvent il y a des contractions spasmodiques ou atrociennes des lèvres, ou une sécrétion momentanément augmentée de salive ou de mucus nasal.

Si la névralgie sous-orbitaire est bornée à la joue & aux lèvres, on la nomme, dans la langue vulgaire, *froid, rhumatisme de la face, fièvre intermittente du visage*; ce qui peut être regardé comme une variété d'écologie sous-orbito-nasale & labiale).

On a désigné la même névralgie sous le nom d'*odontalgie rémittente & intermittente*, lorsqu'elle affecte plus particulièrement les filets dentaires.

La névralgie sous-orbitaire est quelquefois régulière ou périodique dans ses accès, mais la plus souvent elle ne suit aucun type, & ses paroxysmes sont très-irréguliers, très-variables, pour la durée, les intermittences, &c. &c. Elle paraît avoir été décrite pour la première fois par

André, sous le nom de *tic douloureux de la face*. Boerhaave en a cité plusieurs exemples dans ses *Observations de médecine*, pour l'année 1776, & Thourret, dans les *Mémoires de la Société royale de médecine* pour la même année. Chaque observateur lui a donné des noms, suivant la nature des symptômes qui l'ont frappé davantage dans cette maladie.

3^e. Espèce. NÉVRALGIE MAXILLAIRE. (*Trismus maxillaris catarrhalis* de Sauvages.)

Cette névralgie a son siège dans la branche maxillaire du nerf trifacial; elle en suit les diverses ramifications, se distribue au menton, aux lèvres, remonte dans le canal maxillaire, s'étend aux rameaux nerveux qui sont fournis à la tempe, aux dents, aux alvéoles. Cette espèce de névralgie est beaucoup plus rare que les précédentes, & suit une marche beaucoup plus irrégulière.

Les trois espèces de névralgies dont nous venons de faire l'énumération, sont assez généralement confondues, relativement au traitement, sous le nom de *tic douloureux de la face*; toutefois ce traitement, qui semble se rapporter aux mêmes indications dans ces trois espèces de névralgies, paraît un peu moins incertain & plus efficace, lorsqu'il s'applique à la névralgie frontale. Cette espèce de névralgie présente, en général, moins d'intensité, moins d'anomalies dans les symptômes; il n'est pas rare de la voir céder à l'usage bien administré du quinquina ou de l'opium, ou disparaître entièrement au moyen d'une dérivation puissante & prorroquée, soit par un moxa, soit par un purgatif.

Certaines céphalalgies habituelles, & que l'on pourroit regarder comme une névralgie frontale, obscure & indéterminée, ont été traitées avec avantage, par l'emploi de l'extrait de ciguë, progressivement augmenté depuis vingt jusqu'à trente grains, & même au-delà, on ne s'arrêtant pour rétrograder, qu'aux premiers symptômes de vertiges que le trouvant excités par cette préparation narcotique.

La même névralgie, & les névralgies de la face en général, paroissent d'ailleurs avoir été traitées avec beaucoup plus de succès, avec l'extrait de jusquiame noire, associé à l'extrait de valériane & à l'oxyde de zinc, dans les pilules dites de *Méglin*; chaque pilule est composée ainsi qu'il suit:

2^e. Extrait de jusquiame noire. 100 parties.
Oxyde de zinc. 200
Extrait de valériane. 200

Faites des pilules argentées de cinq grains.

On donne d'abord une de ces pilules soir & matin, & on augmente progressivement la dose jusqu'à dix, vingt, trente & même quarante grains. Un malade traité par M. Méglin, put supporter cette dernière dose, & ressentit une grande

amélioration, quoique son tir douloureux fût très-ancien & regardé comme incurable. (Voyez le Journ. gén. de méd. tom. XXII & XXVII.)

J'ai toujours employé, & bien souvent avec succès, la même préparation pour combattre des symptômes irréguliers de névralgies, soit internes, soit externes, qui avient émis à toute autre espèce de médications. L'infusion alcoolique de tiramoniun (*pomina épineuse*) paroît aussi avoir été prescrite d'une manière très-utile, dans le traitement de plusieurs névralgies invétérées, ou d'affections morbides de la face, qui peuvent être rationnellement attribuées à la disposition constitutionnelle que l'on avoit vue se manifester avant ou après ces névralgies.

4^e. Espèce. NÉVRALGIE ILIO-SACRALE. Cette espèce de névralgie, que M. le professeur Chaulfrier a reconnue, d'après deux observations qui lui sont propres, a pour siège le rameau de la première paire lombaire, qui accompagne le cordon des vaisseaux spermaticus; & se ramifie au foramen dans les deux exemples qui se présentent à M. Chaulfrier, la douleur étoit très-vive, revenoit tous les jours, s'étendoit aux diverses ramifications des nerfs, & se trouvoit accompagnée d'un resserrement spasmodique du foramen, & d'une rétraction du testicule, sans aucune altération dans la sécrétion de l'urine.

5^e. Espèce. NÉVRALGIE FÉMORO-POPLITÉE, *Ischias vers de Prosper Martien*. *Ischias notha de Riola* (sciatique poplitée). *Ischias nervosa postica de Corvicio*. Cette espèce a souvent été confondue sous le nom générique de sciatique, avec des affections morbides très-différentes. Elle a pour siège le nerf fémoro-poplitée ou crural postérieur. La douleur qui la caractérise se répand du fémur vers l'échancrure ischiatique correspondante au tronç du nerf, dans toutes les ramifications, au sacrum, au bord postérieur de la jambe, à la surface inférieure du pied, mais surtout à la partie postérieure de la cuisse, où elle se fait plus cruellement sentir. Dans quelques cas, cette même douleur semble partir du pied, pour se porter, par une direction anormale, vers la cuisse.

La névralgie fémoro-poplitée, dans ses commencemens, est presque continue; elle devient ensuite intermittente, mais avec des redoublemens irréguliers qui reviennent surtout vers le soir & pendant la nuit. Si l'on examine bien la nature de la douleur, son étendue, sa manière de se propager en suivant les différentes ramifications nerveuses; on ne la confondra pas avec la douleur gonale (*morbis coxaridis* de de Haen), qui se rapporte à une affection morbide des muscles ou des ligamens, & qui peut aussi être occasionnée par une carie, par une luxation, par une contusion profonde, enfin par une altération locale de l'articulation ou de ses parties environnantes. On doit rapporter à la névralgie fémoro-poplitée, la

douleur vive & irrégulière que Lentin a décrite; douleur qui se manifestoit ordinairement au mollet pendant plusieurs heures, & qui se renouveloit par la simple chute d'un morceau de papier sur cette partie.

6^e. Espèce. NÉVRALGIE FÉMORO-PRÉTIHALE. (*Ischias nervosa antica*, de Cotugno.) C'est la névralgie du nerf crural, qui, de la cuisse, où se trouve le tronç de ce nerf, s'étend à toute la surface antérieure de la cuisse, & jusqu'à la malléole interne & à la face supérieure du pied. Cette espèce de névralgie, qui est plus rare que la précédente, offre moins d'intensité & de résistance dans ses symptômes, & Cotugno, qui l'a observée plusieurs fois, remarque qu'il n'a jamais été obligé d'avoir recours, dans son traitement, à l'usage des vésicatoires.

Les deux espèces de sciatique que nous venons d'indiquer, ont été combattues dans ces derniers temps, avec quelque apparence de succès, par l'usage intérieur du tincture de térébenthine, d'après la prescription ci-jointe :

7^e. Essence de térébenthine..... 3 iv.

Miel rosat..... 3 iv.

Mélez avec soin, pour donner à la dose de trois cuillerées à bouche par jour.

L'usage de ce médicament paroît d'autant plus indiqué, que la névralgie se trouve indépendamment d'une lésion locale & permanente des nerfs cruraux antérieurs & postérieurs, ou de leurs ramifications. MM. Cheyne & Hume en Angleterre; MM. Lentin & Thilenius en Allemagne; M. Récamier en France, ont publié des observations relatives à ce mode de traitement. M. Martinet, dans une thèse présentée à la Faculté de Paris, & composée avec des matériaux tirés de la pratique de M. Récamier, a cité plusieurs exemples d'une curation complète de la sciatique par cette médication, mais sans indiquer si l'on avoit eu à traiter une sciatique fémoro-poplitée postérieure, ou non sciatique fémoro-poplitée antérieure; ce qu'il étoit important de distinguer, d'après une différence bien reconnue dans le degré de curabilité de ces deux névralgies. (Voy. la thèse de M. Martinet, 1818, n^o 70.)

7^e. Espèce. NÉVRALGIE PLANTAIRE. Espèce établie par M. Chaulfrier, d'après une seule observation qui lui est propre. Chez la personne qui fait le sujet de cette observation, la maladie se bornoit au nerf plantaire du pied gauche, dont elle parcourait toutes les ramifications; les accès ne suivoient aucun type: après avoir duré plusieurs mois, la maladie cessa tout-à-coup, sans aucune cause apparente, & il survint de même côté une névralgie sous-orbitaire qui affrila tellement les dents, qu'elles devinrent pulvérisantes & se brisèrent. Cette nouvelle névralgie s'étant terminée, la névralgie plantaire reparut avec les mêmes symptômes. Les bains, l'usage du lait pour toute

nerrière, diminueait beaucoup, avec le temps, l'intensité & la fréquence des douleurs.

8°. Espèce. *NEURALGIE CUBITO-DIGITALE*. Cette névralgie, qui affecte le nerf dont elle porte le nom, on le nerf cubital, commence ordinairement à paraître à la région du coude, où ce nerf est uniquement recouvert par la peau & par le tissu cellulaire. Elle en suit la direction, s'étend à tout & ses ramifications, mais surtout aux rameaux cutanés, qui se distribuent à la face antérieure & au côté interne de la main.

Cetuegne dit avoir vu cinq exemples de cette névralgie; il a souvent obtenu la guérison par un vésicatoire placé sur le siège principal de la douleur.

Il sera facile d'ajouter dans la suite plusieurs espèces nouvelles à celles que nous venons d'indiquer, & lorsque l'on rencontrera des exemples bien constatés de la névralgie de différents nerfs qui n'ont pas encore été observés jusqu'à ce jour. C'est un champ de découvertes qui s'ouvre aux observateurs, & qui déjà n'a pas été parcouru sans quelques succès, depuis la publication du travail si important de M. Chaulfrier; ainsi, d'après la remarque même de ce savant professeur, il existeroit déjà quelques exemples de ces névralgies obscurément indiquées par quelques médecins.

Un fait cité par Siebold sert d'appui en particulier à cette opinion, & présente l'exemple d'une névralgie intercostale. Une femme non mariée, & qui fait le sujet de cette observation, éprouva, après la cessation des règles, entre la huitième & la neuvième côte, une douleur vive, qui suivait toute la distribution du nerf intercostal, & revenoit par accès irrégulier: cette douleur ne le terminoit qu'avec la vie de la malade. Après sa mort on trouva le nerf qui avoit été le siège de la douleur, amaigri & rougeâtre.

L'auteur du cet article a eu lui-même occasion d'observer, il y a vingt ans, l'exemple d'une névralgie inflammatoire du nerf cubito-cutané chez un homme encore jeune & très-sanguin. Cet homme succomba quelques années plus tard à une apoplexie, après avoir éprouvé deux récidives de la névralgie dont nous venons de parler, & qui se termina, après trente jours de souffrances horribles, par l'emploi réitéré des évacuations sanguines & des vésicatoires. Le même observateur a vu en outre plusieurs affections morbides de la peau très-opiniâtres, qui, dans leurs causes, leur marche, le mode de leur développement, se rapprochoient beaucoup des névralgies.

Le savant estimable que nous avons si souvent l'occasion de citer dans cet article, admet comme très-probable la névralgie du nerf facial & de ses rameaux (portion dure du nerf auditif): névralgie qui seroit caractérisée par une douleur le

propageant du trou stylo-mastoïdien pour se répandre sur la face, l'oreille & une partie du cou.

L'auteur d'une bonne dissertation sur la névralgie, M. Conflays, a cité l'exemple d'une névralgie lombaire.

Les névralgies anormales, considérées collectivement, ne peuvent pas être regardées comme une espèce particulière de névralgie, mais comme un de ces groupes provisoires, dans lesquels on réunit plusieurs affections morbides, dont la place n'est pas encore bien indiquée dans le cadre nosographique.

Plusieurs névralgies anormales paroissent ordinairement déterminées ou entretenues par la pression; le tiraillement, l'altération locale de plusieurs filamens nerveux. Elles se manifestent par des symptômes qui varient suivant l'espèce de nerfs qui est le siège du mal & suivant ses connexions. Lorsque la névralgie est produite par un tubercule ou par un ganglion placé, dans l'épaisseur de la peau ou du tissu cellulaire, sur le trajet du nerf, les douleurs semblent partir du point comme d'un centre, & paroissent se répandre plus ou moins loin dans les parties environnantes. (Voyez *TUBERCULES NERVEUX*.)

D'autres névralgies anormales se sent manifestées à la suite de la saignée du bras ou du pied, par l'entaille d'un filet nerveux. On les a vues aussi manifester, après un coup, une contusion qui avoit intéressé quelques filamens nerveux, & donner lieu alors à des maux de tête opiniâtres, à des vertiges, à des douleurs intolérables de l'œil. (Voyez l'auteur, *Œuvres posthumes*.)

Le *trismus occipitalis* de Sauvages le rapporte évidemment à ces névralgies anormales.

NEURALGIES INTERNES.

La connoissance exacte, l'étude approfondie des névralgies externes, conduisent naturellement à reconnaître qu'il existe des affections morbides, ayant leur siège dans les nerfs profondément situés, & se réunissant dans leurs terminaisons avec le tissu lamineux & les dernières ramifications des vaisseaux, pour former le parenchyme des viscères. L'observation confirme cette induction. Elle nous engage, d'après un grand nombre de faits, & d'accord avec plusieurs praticiens très-éclairés, à réunir, sous le titre de *névralgies internes*, plusieurs maladies, dont la place & la nature n'ont pas été convenablement indiquées par les nosographes.

Quelques physiologistes modernes ont pensé que l'appareil des nerfs, qui sont le plus souvent atteints de ces névralgies internes, l'appareil des *grands sympathiques*, formoit un système nerveux particulier, & même indépendant, jusqu'à un certain point, de l'encéphale, & de ce que les physiologistes ont appelé d'une manière si peu exacte la *vie organique*.

Cette opinion, qui compte des partisans célèbres, est l'une de pouvoir être admise sans restriction, & ne doit être regardée que comme une hypothèse ingénieuse. Mais ce qui est plus évident, ce qui est plus conforme aux lois de l'organisation, c'est la texture particulière des nerfs, qui sont le plus souvent le siège des névralgies internes, leur origine, leurs complications, leurs anastomoses, leurs associations, la multiplicité de leurs ganglions, de leurs plexus, la manière de se terminer avec les vaisseaux dans la trame des viscères, enfin l'importance des organes dont ces mêmes nerfs sont partie, l'étendue de leurs fonctions, la sphère de leur influence & de leurs sympathies.

Toutes ces dispositions, toutes ces particularités du système nerveux intérieur, font naître pour ces névralgies internes, des complications, une variété d'accidens, une diversité de symptômes qui en rendent l'histoire très-difficile, & qui expliquent comment plusieurs de ces maladies ont été méconues jusqu'à ce jour par le plus grand nombre des médecins.

Dans les névralgies externes, même les plus graves, on peut reconnaître le tronc ou la branche du nerf affecté, & on tire de cette disposition, comme nous venons de le voir, des caractères suffisans pour pouvoir rapporter les névralgies, d'une manière exacte, à un certain nombre d'espèces. Dans ces mêmes névralgies, certaines altérations dans la sensibilité, dans la contractilité musculaire, ou même le dérangement de quelques sécrétions, dont le rapport avec la nature du nerf affecté est évidente, annoncent & caractérisent évidemment la maladie. Il n'en est pas ainsi dans les névralgies internes. Un plus grand nombre de fonctions se trouve perverti, & les symptômes essentiels ou primaires ne sont pas toujours faciles à reconnaître, tandis que des phénomènes purement sympathiques, des symptômes consécutifs, sont beaucoup plus évidens, & attirent toute l'attention de l'observateur. La maladie se manifeste en conséquence par une grande variété de symptômes, par plusieurs genres de douleur bien différens de la douleur qui caractérise les névralgies externes, & dans d'autres cas par des paralysies partielles, des impotences, des rétractions plus ou moins douloureuses, le changement ou la suspension de quelques fonctions, l'aphonie, le bégaiement, une grande difficulté dans la respiration ou dans la circulation, une perversion soudaine ou prolongée du mouvement péristaltique; ce qui explique ces redoutables coliques névralgiques, dont la véritable nature a été si souvent méconue.

Les causes diverses auxquelles on attribue les névralgies externes, peuvent occasionner, d'après certaines dispositions individuelles, des névralgies internes, & cette analogie n'est pas une des

moindres preuves qui nous font rapporter à ce titre un groupe d'affections morbides que l'on a séparées, en méconnaissant leur nature, dans les cadres anagoraphiques, & qui ont entrées des rapports qu'elles n'ont pas avec les autres maladies.

Ces causes sont inhérentes à l'organisation (*causes prédisposantes*) ou tout-à-fait extérieures, étrangères à cette même organisation (*causes excitantes & occasionnelles*).

Pour le développement des névralgies internes, comme pour celui des névralgies externes, les causes prédisposantes, c'est-à-dire, certaines dispositions morbides & constitutionnelles paroissent indispensables dans le plus grand nombre des cas, & surviennent lorsque ces maladies ont une marche lente ou chronique.

La plupart de ces causes ne sont pas toujours faciles à reconnaître; souvent même on ne parvient à en soupçonner la nature que par des analyses très-délicates, en rapprochant avec une grande sagacité, & pour en tirer d'utiles inductions, plusieurs particularités individuelles & idiosyncrasiques, pour parler le langage des écoles.

Quelques médecins ont pensé, mais sans s'appuyer sur un nombre suffisant d'observations, que la diathèse ou la constitution morbide cancéreuse dispoit en général aux névralgies. Il n'en est pas ainsi de l'opinion admise sur certaines dispositions héréditaires chez des personnes dont les ascendans ont éprouvé des angines de poitrine, certaines hypochondries, des affections calculeuses, la goutte, certaines migraines nerveuses très-invéterées, tels que le tic douloureux ou la sciatique. Dans tous ces cas, dans toutes ces circonstances, il existe sans doute plusieurs chances pour le développement des névralgies internes. Nous avons déjà remarqué que dans certains cas plusieurs personnes, que les parens avoient été cruellement tourmentés par la goutte, s'étoient vues en proie à des migraines névralgiques habituelles & périodiques; que ces migraines avoient alterné avec des attaques accidentelles de rhumatisme articulaire.

Je pourrais citer, & d'après mon Mémorial clinique, des faits analogues, relativement aux névralgies internes, & entre autres l'exemple d'une gastrodynie quotidienne, que je n'ai calmée qu'avec la magnésie décarbonatée, l'oxyde blanc de bismuth & l'eau de chaux, & qui fut suspendue entièrement par une névralgie orbito-frontale, qui dura six semaines. J'ai vu également, & plusieurs fois, divers symptômes névralgiques externes, ou quelques apparences fugaces de goutte, disparaître tout-à-coup, & être remplacés par des symptômes de névralgie du côté de l'estomac ou du côté de la poitrine.

Quelques affections catarrhales habituelles, &

l'été à une disposition orithrique, ont également été remplacées, après s'être imprimées tout-à-coup, par une névralgie accompagnée d'insomnie ou de paralysie partielle dans les parties qu'elle avoit frappées.

Un jeune Américain, très-étudieux, M. O.-C., de New-York, m'a offert un exemple bien remarquable de cette espèce de transformation morbide. Le père de ce jeune homme étoit mort à quarante ans, de la goutte. M. O.-C. éprouva lui-même, dès l'âge de quinze ans, quelques symptômes indistincts de la même maladie. Un peu plus tard, il s'en trouva tout-à-fait exempt; mais alors il fut le plus souvent tourmenté par un coryza qui le faisoit beaucoup souffrir, & qui se manifestoit toujours sans aucune cause occasionnelle.

Cette infirmité fut supprimée tout-à-coup, & sans une médication très-active, la fluxion morbide se porta sur les trocles ou sur quelques branches des nerfs glossopharyngiens & laryngiens. Alors M. O.-C. perdit entièrement la voix, par suite d'une impotence ou paralysie partielle, qu'il étoit impossible de méconnoître. Ce jeune homme vint en France pour y trouver des secours & pour y terminer son instruction, que ses infirmités avoient beaucoup retardée. Son aphonie alors s'étoit transformée en une espèce de bégaiement très-pénible, accompagné d'un embarras dans les idées & d'une faiblesse de tête, qui ne lui permettoient de se livrer à l'étude qu'avec beaucoup de difficulté & bien peu de succès, malgré son désir très-vif, très-lucide de s'instruire, & qui avoit pour lui tous les inconvénients d'une passion malheureuse. J'essayai, pour le guérir, mais sans aucun succès, plusieurs médications très-actives, soit internes, soit externes. Toutefois l'application soutenue des cataplasmes légèrement excitans, connus sous le nom vulgaire de *cataplasmes de Pradier*, produisit un effet très-singulier sur ce malade; cette application avoit eu lieu pendant quarante-huit heures, d'une manière à peu près insensible. Alors elle fut suivie de douleurs intolérables, déchirantes dans les talons, mais surtout dans toute l'étendue du tendon d'Achille (tibia-calcaneus); ce qui fut accompagné de la cessation complète du bégaiement & d'une lucidité, d'une facilité dans l'esprit, que M. O.-C. n'avoit jamais eues. Cette amélioration, qui sembloit annoncer une guérison absolue, se soutint pendant tout le temps où les cataplasmes continuèrent d'être appliqués, c'est-à-dire, pendant soixante heures. Mais lorsque cette application, qui avoit fini par occasionner des douleurs intolérables, fut suspendue, l'infirmité de M. O.-C. ne tarda point à reparaitre, & se fut même pas suspendue dans la suite, lorsqu'on eut recouru, pour les combattre, à un nouvel emploi des to-

piques, qui ontient opéré d'abord, & surtout promis de si grands avantages.

Les causes extérieures ou occasionnelles les plus capables de produire certaines névralgies internes, sont le froid sec, qui succède tout-à-coup à une température élevée; le vent du nord ou le vent du nord-est, dans certaines contrées; les dispositions locales de l'atmosphère, auxquelles on a judicieusement attribué la colique du Madrid dans ces derniers temps; les fatigues excessives; un régime irritant, mais surtout contraindre à une disposition morbide bien caractérisée; la suppression intempestive d'un exutoire; enfin certaines substances vénéneuses, mais principalement les poisons métalliques; le plomb en particulier, dont les effets sont si évidens, si remarquables dans la colique qui porte son nom, & que l'on doit regarder comme une névralgie.

Des causes moins graves, & même en apparence assez légères, un changement de régime, par exemple, un passage brusque d'une nourriture animale à une nourriture végétale, avec tout le zèle d'une austérité religieuse, ont suffi pour occasionner chez des personnes dévotement dérangées, chez des personnes dévotement dérangées, qui se rapportoit à la névralgie.

Une dame, à laquelle je donne habituellement des soins, m'a présenté, il y a deux ans, un exemple bien remarquable de l'effet dangereux d'un changement semblable dans les habitudes diététiques. A la fin d'un carême, & par un redoublement de zèle, elle avoit banni le principal repas qu'elle faisoit, le soir, à un plat de lentilles, assaisonnées avec de l'huile: aliment qui jusqu'alors n'avoit jamais fait partie de son régime. Aucun dérangement ne parut d'abord résulter de l'emploi d'un aliment aussi indigeste pour une personne qui n'étoit pas accoutumée à son usage. Mais, un peu plus tard, il survint tout-à-coup, & sans aucune cause occasionnelle préalable, une gastrodynie très-violente, caractérisée par des crampes d'estomac si fortes, qu'elles occasionnèrent les plus violentes angoisses, & déterminèrent, dans leur première attaque, plusieurs syncopes dans l'espace de quelques heures, sans qu'il fût possible d'ailleurs de soupçonner aucun symptôme d'indigestion. Le docteur étoit insensé pendant quelques minutes, & se renouveloit ensuite avec des redoublements intolérables.

Cette affection, qui d'ailleurs étoit sans fièvre, & même sans aucun symptôme inflammatoire, ne pouvoit être raisonnablement attribuée à une névrose. Elle se prolongea pendant vingt-quatre heures, & ne cessa qu'à l'usage de quelques heures, employé à grandes doses (plusieurs gros dans l'espace de quelques heures).

L'action des causes occasionnelles n'a pas toujours toute l'insensibilité dont elle est susceptible,

furtout lorsqu'elle n'est point favorisée par des causes prédisposantes très-développées. Dans ce dernier cas, elle se borne le plus souvent à certaines altérations de la voix, à un changement dans le mode de la sécrétion muqueuse des voies pulmonaires ou galliciques; à une perversion dans le mode de sensibilité ou de contractilité des mêmes organes, qui se manifeste, pour ce qui concerne la digestion, par le renvois continué de la saveur de certains aliments; par une sensation de pincement & de contraction à l'estomac, que les malades comparent à l'impression d'une grille; par un premier degré de gastrodynie ou de cardialgie, mais surtout par le soda; symptômes, sur le caractère névralgique desquels on ne pourra avoir aucun doute, lorsqu'on pourra les prévenir, les calmer, les dissiper, par l'emploi bien dirigé de l'eau de chaux, de la magnésie décarbonatée, de l'oxyde blanc de bismuth, & même, dans les cas plus graves, par l'usage de l'extrait de jusquiame noire, seul ou combiné de diverses manières avec l'opium.

La marche des névralgies internes présente de grandes variétés, suivant l'espèce & l'intensité de ces névralgies. Quelquefois la maladie a peu de développement, & se borne à quelques dérangemens passagers dans les fonctions, assez fréquents chez les personnes valétudinaires, qui ont éprouvé, à différentes époques, des douleurs rhumatismales ou des attaques de goutte très-incomplètes. Dans le cas où la névralgie interne se montre sous la forme d'une maladie moins équivoque, sa marche est tantôt aiguë, tantôt chronique, avec des rémittences ou avec des intermittences, mais toujours avec une tendance à la périodicité & à une disposition qui exclut toute idée d'inflammation & de névrose.

Le traitement général diffère très-peu de celui que l'on oppose aux névralgies externes. Le pronostic est beaucoup moins favorable, & toujours d'autant plus fâcheux que l'attaque est plus vive, plus subile, comme dans l'ileus nerveux, ou *colique de misère*, ou que les nerfs, qui sont le siège de l'affection morbide, contribuent à des fonctions plus importantes, à la circulation, par exemple, ou à la respiration, aussi qu'il est facile de le remarquer dans l'angine de poitrine, ou dans certains cas de catarrhe suffocant, qu'il est impossible de ne pas rapporter aux névralgies internes.

Les diverses espèces de névralgies internes ne peuvent pas toujours être reconnues exactement comme celles des névralgies externes. Il est évident, d'après les réflexions qui précèdent, que cette classification ne peut être rigoureusement fondée, pour ces névralgies internes, sur la nature des nerfs qui en sont le siège: la position de ces nerfs, les fonctions des organes qui en dépendent, ne permettant presque jamais de reconnoître avec précision l'affection primitive, qui n'est souvent annoncée que par des phénomènes sym-

pathiques ou consécutifs, dont l'analyse le plus exercé ne parvient pas toujours à saisir les rapports, avec la maladie essentielle ou primitive qui paroît comme masquée & enveloppée au milieu du trouble & des désordres qu'elle a fait naître. Il sera, d'ailleurs, assez facile de s'y perdre, soit dans les archives de l'art, soit dans les souvenirs d'une pratique un peu étendue, des exemples de symptômes névralgiques, ou de névralgies internes assez bien caractérisées, pour être rapportés d'une manière approximative, non-seulement aux divers points du grand sympathique ou des autres nerfs composés, mais encore à plusieurs nerfs encéphaliques, & aux divers organes où ces nerfs se distribuent.

Plusieurs migraines, qui paroissent avoir leur siège dans les sinus frontaux ou les sinus maxillaires; certaines oalgies, ou certaines odontalgies (maux d'oreilles & maux de dents), qui ont des retours périodiques, & qui, dépourvues du reste de tous les symptômes inflammatoires, alternent souvent avec des douleurs de goutte ou de rhumatisme, présentent évidemment des caractères *névralgiques*. Il en est ainsi de l'ophthalmodynie, surtout lorsqu'elle peut être rationnellement attribuée à l'impression soutenue d'une vive lumière (1), ou qu'elle peut se rattacher à une altération morbide constitutionnelle ou transmise. Il faut encore étendre la même façon de concevoir les écholes, à différents cas particuliers de dysphagie (difficulté d'avaler), d'aphonie (perte de la voix), ou même d'un simple bégaiement analogue à celui dont nous avons cité l'exemple: affections morbides, qui n'ont eu général rien de fébrile, rien d'inflammatoire, & qui ne sont bien comprises qu'en les attribuant à des paralysies partielles, ou à une impotence névralgique.

J'ai pu observer, pendant plusieurs années, les retours irréguliers d'une névralgie bien caractérisée, qui se manifestoit par une douleur que le malade cherchoit à diminuer par la pression, & qui avoit son siège dans l'amygdale du côté droit, dont les follicules enflammés sous l'impression d'une irritation morbide & constitutionnelle qui augmentoit leur volume, se détachaient sous la forme d'une espèce d'ampoule ou de petit kyste, ayant l'odeur la plus fétide. La douleur névralgique n'avoit, d'ailleurs, aucun rapport avec cette inflammation; tantôt elle l'accompagnoit, tantôt elle en étoit entièrement séparée: elle cessoit pendant la nuit, revenoit chaque matin avec divers redoublements dans la journée. Lorsqu'elle étoit plus forte, elle s'étendoit à toute la partie supérieure ou inférieure du cou, & même à la partie supérieure du bras. Le malade en étoit

(1) Les exemples de cette ophthalmodynie se rencontrent quelquefois parmi les ouvriers qui travaillent à de petits objets, & avec la lumière des quinquets, mais principalement parmi les horlogers. (Voyez *OPHTHALMOLOGIE*.)

encore plus incommode que tourmenté : il sentoit continuellement le besoin de presser, de comprimer le lieu douloureux, mais sans obtenir aucun soulagement de cette compression. L'application d'un vésicatoire au bras pendant deux mois, & quelques changements survenus dans le développement de l'état morbide général du malade, firent cesser entièrement cette espèce de névralgie.

Plusieurs affections aiguës ou chroniques des viscères de la poitrine, dont la véritable nature paroit encore bien peu connue, & qui n'ont été placées que provisoirement dans diverses divisions de l'ordre nosographique, pourroient & devoient également être comprises dans la même famille : telle est en particulier l'angine de poitrine, que sa marche, les causes prédisposantes, son analogie avec les maladies goutteuses, rapprochent si évidemment des névralgies externes les mieux caractérisées, dans les cas même où la coïncidence avec différentes lésions organiques qui n'ont rien de constant, seroit prendre le change aux observateurs sur la véritable cause & la véritable nature : tel est également l'asthme nerveux, asthme essentiel, quelle que soit sa liaison avec diverses maladies du cœur ou des poumons, qui peuvent exister en même temps que cette affection morbide, sans en être la cause constante & nécessaire. Il est probable que le cœur lui-même a dû éprouver, dans plusieurs circonstances, des altérations graves ou des atteintes mortelles qui avoient leur source dans une affection morbide de ses nerfs. Du reste, nous avouerons que, dans cette circonstance comme dans les cas d'asthme nerveux ou d'angine de poitrine, il est toujours très-difficile, pour ne pas dire impossible, de reconnoître quelle est l'espèce de nerfs compromise ou altérée; les communications multipliées de ces nerfs, & les sympathies des organes qui les reçoivent, faisoient naître nécessairement une difficulté de diagnostic qui n'existe pas pour les névralgies externes.

Plusieurs genres de mort que l'on a rapportés d'une manière vague & générale au catarrhe suffocant, n'ont vraisemblablement été occasionnés que par des névralgies pectorales, analogues à celles dont nous nous occupons en ce moment, & auxquelles il aura manqué des témoins assez éclairés pour en reconnoître la véritable nature. L'exemple suivant, dont nous devons la connaissance à l'un des médecins les plus distingués de notre âge, M. Fonquier, paroît au moins justifier ces conjectures. Il présente les symptômes d'une névralgie pectorale aiguë qu'il est impossible de méconnoître, sans que l'on puisse cependant indiquer, d'après des symptômes particuliers, les rameaux ou les branches de nerfs lésés dans cette affection morbide.

« Le lundi soir 18 mars, M. B**, traversant le Pont-des-Arts, fut pris d'un sentiment de défaillance & d'oppression qui lui permit à peine de regagner la rue de Grenelle; mais, redoublant ses

forces, il arriva chez lui sans autre accident. Il se coucha & dormit bien; le lendemain il étoit bien portant. Le mercredi soir, vers la même heure que le lundi, les mêmes sensations se renouvelèrent, & se dissipèrent aussi au bout de quelques heures. J'avois dîné chez lui ce jour-là, & on l'avoit quitté qu'à huit heures; rien n'annonçoit encore la récurrence dont il étoit menacé; il ne me parla pas même de ce qui lui étoit arrivé le lundi. Le jeudi, il me fit prier de le voir. Je l'avois soigné, plusieurs années auparavant, d'une douleur aiguë dans la partie droite de la poitrine, laquelle gênoit considérablement la respiration, & avoit cédé promptement à l'application des sangsues. Je me rappelai que souvent M. B** avoit été pris, depuis ce temps, d'une douleur très-vive & très-passagère, qui se faisoit tout-à-coup sentie dans un pied, soit la nuit, soit le jour. Je vis dans la dyspnée & l'espèce de défaillance qui s'y joignoit, & qui s'étoit renouvelée deux fois, les effets d'un rhumatisme pour lequel je conseillai des frictions stimulantes sur l'épine du dos, un bain tiède & une boisson diaphorétique. Ces remèdes ne furent employés que le vendredi; ce jour-là même, dès le matin, le malade éprouvoit déjà quelques atteintes de la maladie. Le bain ne le soulagea pas, & les frictions parurent peu utiles quoiqu'il y eût néanmoins la dyspnée & la faiblesse étoient peu considérables; le malade ne voulut pas qu'on vint m'en prévenir, & il se coucha, persuadé qu'il alloit dormir; mais la dyspnée ne fit qu'augmenter, elle s'accompagna d'une anxiété singulière. M. B** se leva, & se recoucha à tout moment. Je me rendis chez lui à sept heures du matin; il me dit qu'il sentoit une sorte de tiraillement douloureux, qui, du cou se propageoit le long des bras en suivant le trajet des nerfs cubitaux, & s'accompagnait par moments d'élançemens très-aigus. La respiration étoit extrêmement laborieuse, mais point sifflante; il ne s'y joignoit ni toux ni expédition; le pouls étoit très-fort & très-plein, un peu fréquent. Je lui fis pratiquer une forte saignée (de 12 à 14 onces); il sembla qu'un peu de soulagement en étoit la suite. Le malade prit aussitôt un bain entier, tiède; aussitôt après, un bain de pied sinapisé, puis il se remit au lit, prenant pour boisson une infusion de fleurs de bourrache & de connelicot, avec du sirop de vinaigre. Je le quittai à neuf heures; on vint m'avertir à midi qu'il étoit très-mal; je lui trouvai, en effet, le visage défilé, les extrémités froides, le pouls très-petit & très-foible, & une difficulté de respirer très-considérable. Le cas étoit grave & le danger pressant. Des sinapisés furent appliqués aux deux pieds; je prescrivis une potion stimulante, j'appliquai des liges imbibées de vinaigre bouillant au milieu & au devant de la poitrine; l'orthopnée paroit diminuer quelque peu; malgré cela il survint du délire, de la difficulté d'avaler. A six heures, la chaleur étoit rétablie aux extré-

mités, le poulx étoit relevé, une furar abondante couvroit tout le corps, & le malade expira dans une sorte de défaillance, le 23 mars, à huit heures du soir, en voulant prendre un verre de boisson (1). » (Voyez, pour plus de détail, OTHORNIÉ, POITAIN (Angoum de), STERNALGIE, SUFFOCATION NERVEUSE, &c.)

La plupart des affections morbides des viscères de l'abdomen, qui ne se rapportent pas d'une manière directe à certaines lésions organiques ou à un état inflammatoire bien caractérisé, se rapprochent également des névralgies, soit qu'elles se manifestent sous la forme d'une maladie essentielle, prolongée, soit qu'elles se bornent à divers symptômes passagers qui n'occasionnent qu'un état d'indisposition, soit qu'on ne puisse les regarder que comme des accidents ou des épiphénomènes dont l'apparition soudaine vient troubler & compliquer la marche d'une maladie fébrile & essentiellement inflammatoire.

Cette opinion, que l'on pourroit accuser d'être paradoxale, parce qu'elle s'éloigne de la façon commune & générale de voir du plus grand nombre, a dû se présenter & s'est présentée en effet à l'esprit de tous les médecins qui réfléchissent en observant, & qui, dans les investigations les plus difficiles, sur la nature de certaines affections morbides, font usage des données d'une haute & saine physiologie.

Ces remarques ont été faites d'un commun accord par plusieurs cliniciens distingués, pour ce qui concerne les coliques nerveuses, & les coliques nerveuses, & surtout la colique de plomb, dont la marche, les symptômes apparemment évidemment au type névralgique, & sont caractérisés par une perversion profonde de la contractilité des intestins : perversion que l'on regarde avec raison comme le symptôme caractéristique de cette maladie, dans le rapport d'ailleurs à aucun des centres nerveux.

Nous ne craignons pas d'avancer, & après y avoir long-temps & profondément réfléchi, à mesure que les détails de la pratique nous en ont fourni l'occasion, que ces mêmes remarques, qui tendent à agrander le cadre des névralgies dans le système otologique, s'appliquent également à la cardialgie, à la gastrodynie (gastralgie), au fer chaud & à plusieurs douleurs ou affections abdominales, que le peuple médecin & le peuple malade attribuent le plus souvent, tantôt à la gonitè, tantôt au rhumatisme, qui paroissent d'ailleurs avoir la même origine & de grands rapports dans leur nature.

Quelques-unes de ces douleurs indéterminées sont périodiques, & lorsqu'elles sont constantes, elles se manifestent souvent avec des redoublements réguliers que l'on cherche vainement à combattre par les fébrifuges.

(1) Observation communiquée.

Du reste, les affections nerveuses abdominales, qui semblent se rapporter aux névralgies, ne sont pas toujours accompagnées d'une douleur plus ou moins vive, ni même de ce genre de douleur que l'on cherche à diminuer par la compression. Elles n'offrent même pas toujours, une contractilité plus ou moins pénible, ou un resserrement spasmodique, comme dans la colique de plomb, ou un mouvement antipéristaltique qui remplace subitement ou graduellement le mouvement opposé & naturel, comme dans l'ileus, & pendant la durée de certaines contractions purement nerveuses qu'il faut regarder & traiter comme des maladies essentielles.

Les symptômes névralgiques peuvent exister en outre, & existent en effet, dans plusieurs cas, où ils se font seulement reconnaître par des phénomènes consécutifs ou sympathiques, par des vertiges, par exemple, par des perceptions erronées de l'ouïe ou de l'odorat; par l'inappétence ou par l'augmentation morbide d'appétit; par le resserrement convulsif du col, ou la sensation illusoire d'un corps étranger dans cette région ou à la poitrine; différentes espèces d'altérations ou d'impressions incommodes dans divers points du bas ventre, éprouvées & observées avec une exagération de sollicitude : ensemble de symptômes qui se rapportent tantôt à l'hypochondrie, tantôt à l'hystérie, & qui viennent tout-à-coup à se suspendre, lorsqu'il survient, pendant quelque temps, soit une douleur de rhumatisme ou de goutte, soit quelques symptômes fugaces de névralgie externe.

Parmi les différentes affections très douloureuses de l'utérus, que les auteurs ont décrites sous le nom de *métralgie* & d'*hystéralgie*, quelques-unes rentrent aussi, d'une manière quelquefois très évidente, dans les névralgies internes, & par un ensemble de traits & de phénomènes qui n'a pu manquer d'attirer souvent l'attention des médecins les plus éclairés de notre époque. (Voyez l'article MÉTRALGIE dans ce Dictionnaire.) *

(MOREAU DE LA SARTHE.)

NÉVRILÈME ou **NEURILÈME**; *neurilēma*, du grec *νεῦρον* nerf, & de *λίμα*, tunique, écorce, &c. Reil (*de structura nervorum*) s'a donné ce nom à l'enveloppe ou membrane extérieure des nerfs (1). Nous considérons le nerf comme composé de trois parties distinctes : 1°. une gaine extérieure en rapport avec le tissu cellulaire ambiant, de nature fibreuse ou albuginée, paraissant être la continuation de certaines membranes denses, fibreuses, résistantes, dont les foyers pulpeux du système nerveux sont entourés; 2°. un feuillet ou lamina très-déliée, ressemblant aux membranes fibreuses ou à la membrane interne des vaisseaux; en con-

(1) *Πῶς ἰσχύει ΝΕΥΡΟΣ ἢ ΝΕΥΡΙΤΙΣ, cum sensum obtingunt, quasi hac tunica e materia nervi conficitur, substantiam videtur; potius graecis vocabulis NEURILEMA ἢ NEURIMEMA utitur Reil, de structura nervorum, pag. 11. HALL Saxovium, 1796.*

tall par la surface extérieure avec la gaine fibreuse & par sa surface interne, envoyant des prolongemens par lesquels le canal névrlématique est divisé en canaux secondaires ou en cavités réticulées & cellulaires, comme l'intérieur de certains tiffus, celui de la rate ou des corps caverneux, par exemple; 3°. une fibroblance pulpeuse formant la troisième partie qui est contenue dans le réseau ou les compartimens de la membrane interne, en contact avec ce feuillet par lequel elle est accompagnée dans tout son trajet jusqu'à sa terminaison. La membrane interne des nerfs se voit très-bien avant la sortie de ces cordons des cavités crânienne & rachidienne; on la distingue aussi très-aisément sur les nerfs cérébraux de beaucoup de poissons, & dans l'homme & les animaux mammifères elle constitue le tiffu réticulé du nerf optique. Reil, qui le premier a fait connoître le névrlème & les moyens de l'obtenir isolément pour l'étudier, n'a rien dit de cette membrane : nous croyons qu'elle n'a pas été signalée avant nous. C'est ce même tiffu qui forme au fond de l'œil, un feuillet très-mince entre la partie médullaire de la rétine & la membrane choroïde.

On obtient le névrlème en plongeant les nerfs dans des solutions alcalines, & l'on sépare la partie médullaire des nerfs en se servant d'acide plus ou moins concentré, soit l'acide muriatique, soit l'acide nitrique (1). Les substances alcalines altèrent, décomposent & rendent dissoluble la moelle nerveuse, sans détruire le névrlème; les acides, au contraire, durcissent la substance médullaire & fondent l'enveloppe névrlématique. Si l'on se sert de solutions alcalines, il faut, après avoir fait sortir le suc médullaire altéré par l'alcali, laver ce nerf par une de ses extrémités, & le remplir d'air ou de mercure; on peut alors très-bien distinguer sa forme fasciculaire. Par les acides, & surtout par le chlore, les filamens nerveux deviennent apparents même à l'œil nu.

Les nerfs paroissent donc être composés d'une substance double, la moelle & les tubes qui la contiennent; quoiqu'en dernière analyse, comme sembleroit le faire penser les travaux de Tréviranus, les deux parties se réduisent à du tiffu cellulaire.

Les nerfs paroissent manifestement formés de tiffu cellulaire, & on leur a donné le nom d'*enveloppe des nerfs*, d'après les rapports qu'ils ont avec la moelle. Suivant Reil, le nerf est pourvu d'une enveloppe ou gaine qu'il nomme *névrlème*; elle s'étend en se divisant & se subdivisant d'une manière infinie à l'intérieur.

Ce névrlème reçoit une quantité considérable de vaisseaux qui, à leur entrée, se divisent en haut & en bas du cordon nerveux, sous des angles presque toujours droits, & vont en s'anastomosant diversément. Le névrlème est très-solide & très-

fort. Des physiologistes le considèrent comme étant l'organe sécréteur de la substance médullaire. A son extrémité encéphalique ou rachidienne, l'assemblage des canaux névrlématiques présente un enfoncement très-marqué au centre du faisceau. Indépendamment de la structure fibreuse du nerf, de sa composition apparente de moelle & de névrlème, nous avons vu, en parlant des nerfs en général, qu'à l'extérieur ces cordons offroient des inégalités & une apparence onduleuse & ligamenteuse. On aperçoit en effet, à l'œil nu ou au microscope, sur la surface extérieure du nerf, des raies spirales formant des zigzags. Si le nerf est disséqué, il perd cet aspect, mais il le reprend lorsqu'on cesse l'extection. Les nerfs, dans l'état de maladie, ceux qui sont flaccides & flétris, ceux qu'on a fait tremper dans l'alcool, ne présentent point cette disposition. Ce phénomène dépend du frocement du nerf, produit par son raccourcissement, la contractilité étant très-faible. Il paroît que ces rides ont leur siège au névrlème, car les nerfs les plus mous & les moins soumis de névrlème, présentent moins que les autres ce phénomène. Il est étranger aux nerfs olfactifs. Mais ces cordons font-ils réellement des nerfs, & ne sont-ils pas plutôt un prolongement de l'encéphale? Cependant, les nerfs ne sont pas tous formés d'après le même type; il est vraisemblable que les différences se rapportent à leur structure intérieure comme à leur forme extérieure. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*, de l'Encyclopédie.) (G. BRESCHET.)

NÉVRITE, f. f. (*Pathologie*), du grec *νεύρις*, & de la terminaison latine *itis*, inflammation des nerfs. Cette maladie, dont peu d'auteurs ont parlé, n'est cependant pas assez rare pour qu'on ne l'ait pas plusieurs fois observée; mais comme elle est souvent compliquée avec d'autres lésions, on doit moins s'étonner de ne pas la voir décrite séparément dans des traités *ex professo*. Néanmoins, les bornes de cet ouvrage nous forcent à regret d'y recourir. Nous rapporterons seulement quelques observations dont l'authenticité ne peut être mise en doute, & dont la précision égale l'exactitude.

Le 25 janvier 1821, une femme se présente à l'Hôtel-Dieu de Paris pour un ramollissement du fémur, au-dessous du grand trochanter, & peu de jours après l'arrivée de cette malade, de violentes douleurs dans la partie affectée, la conduisent à une mort aussi prompte que déplorable. L'autopsie faite avec les soins ordinaires qu'y donne M. Doppytren, présente les objets suivans:

Les nerfs cruraux qui passoient fur le devant de la tumeur, dans le pli de la laine, avoient conservé leurs dimensions ordinaires; seulement ils présentaient un aspect d'un rose tendre dans une étendue de plusieurs poudes de longueur. Les petits filets nerveux, & même les moyens, se confor-

(1) Reil, de *structura nervorum*, pag. 3 & 17.

doient dans la tumeur de manière à ne pouvoir être saisis qu'à peu de distance.

La seconde observation fournit un autre exemple de névrite qui s'est présentée dans le même hôpital, sur une personne morte par suite d'abcès à la hanche droite. Le nerf grand sciatique, placé à la partie interne & postérieure de l'abcès, offroit dans une étendue de cinq à six pouces, une tumeur noirâtre très-prononcée qui s'étendoit à une demi-ligne de profondeur, & pénétrait, en suivant les cloisons cellulaires, jusque dans la substance nerveuse. On enlevait facilement cette couche cellulaire névritique par petits feuillets minces comme une pelure d'oignon. Si, après avoir coupé le nerf transversalement, on venait à le presser, il en sortoit une substance médullaire plus rosée & plus molle que celle du nerf sciatique opposée. D'ailleurs, ce nerf étoit moins volumineux que dans l'état naturel.

On a vu aussi, après plusieurs amputations, les nerfs offrir des traces d'inflammation plus ou moins profondes. Telle étoit le cas d'un amputé mort quinze jours après l'opération, chez lequel l'on voyoit les nerfs sciatiques & sciatiques renflés & durcis à leur extrémité, & auxquels une injection très-fine du réseau capillaire enflammé donnoit un aspect rosé.

Sur un autre sujet mort cinquante jours après l'amputation du bras, on a constaté que le nerf médian ne présentait pas de renflement terminal comme dans les autres amputations, mais seulement des espèces de franges rouge-termeilles, minces, & d'une ligne de longueur environ. (G. B.)

Cet article a été entièrement omis dans le *Dictionnaire des Sciences médicales*. (M.)

NÉUROGRAPHIE, f. f. Description des nerfs. (*Voyez NÉVROLOGIE*.) (L. J. M.)

NÉVROLOGIE, f. f. Discours sur les nerfs. Exposition dogmatique de ce qui concerne la structure & les phénomènes du système nerveux. (*Voyez* ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie* de l'Encyclopédie méthodique. *Voyez* aussi dans ce Dictionnaire, les articles **NERF**, **SIXIÈME NERVEUX**.) (L. J. M.)

NÉVROSES, ou mieux **NEUROSES**, f. f. pl. (*Pathologie*.) (Maladies des nerfs, affections nerveuses.) Les maladies que l'on désigne sous le nom de *névroses* peuvent être attribuées, dans quelques circonstances, à une lésion bien déterminée du cerveau ou de la moelle épinière, quoique d'ailleurs on les distingue de ces lésions, comme l'effet est distingué de sa cause directe ou prochaine. Dans le plus grand nombre des cas, ces mêmes affections morbides remontent à un dérangement inconnu, & seulement présumé, de quelques parties du système nerveux, dont l'altération entraîne un genre de perversion & d'irrégularité dans certaines fonctions qui dépendent de ce système. Du reste, les névro-

ses se manifestent par différentes altérations de la sensibilité & de la contractilité, qui se rangent naturellement sous un certain nombre de titres, dans plusieurs genres & dans plusieurs espèces de maladies.

L'apoplexie, la paralysie, l'épilepsie, la catalepsie, une foule d'altérations partielles de la contractilité ou de la sensibilité, que l'on désigne sous le nom de *vapeurs*, sont des *névroses*, & doivent être distinguées avec soin des maladies organiques qui les occasionnent dans quelques circonstances, telles que l'hémorragie du cerveau dans l'apoplexie; l'inflammation chronique du même viscère, & celle du prolongement rachidien dans quelques cas d'épilepsie; certaines *névralgies* obscures & méconues dans plusieurs hypochondries spontanées, &c. &c.

Sauvages, dans son nombreux dénombrement des maladies que l'homme a éprouvées, & dont les annales de la médecine & les archives des calamités humaines renferment des exemples, n'eût point l'idée de rassembler les différentes espèces de *névroses* sous un seul titre particulier: il les a comme disséminées dans la plupart de ses classes; dans la cinquième, par exemple (1), dans la sixième (2) & dans la septième (3).

Whytt, médecin anglais, essaya le premier de réunir les maladies nerveuses dans une catégorie particulière, & pour leur consacrer une monographie, que l'on a beaucoup trop vantée. Cet auteur a renfermé du reste l'acception du mot *névrose*, pour se l'appliquer qu'aux affections abdominales chroniques, connues sous le nom de *vapeurs*, & devenues si communes chez les peuples modernes dans le dix-huitième siècle. Flemming, dans son poème latin sur les maladies des nerfs, employa ce mot dans la même acception (4).

Callen donna à la fois plus d'étendue & de justesse au mot *névroses*, en comprenant dans cette signification tous les états morbides de la sensibilité & du mouvement musculaire, indépendants d'une fièvre essentielle, & bien distincts de toute affection locale ou organique des nerfs eux-mêmes, & ne pouvant être rapportés qu'à une altération générale & indéterminée, dans les fonctions de ces organes.

D'après cette définition, que nous admettons, on voit au premier aperçu comment la paralysie, les convulsions, doivent naturellement venir se placer parmi les *névroses*; mais en même temps on reconnoît avec la même facilité & la même évidence, qu'il ne seroit pas possible de faire entrer dans la même classe, sans tout confondre, les

(1) Les anhélation, la hoquet, l'asthme, la toux.

(2) Les débilités, les *névroses* partielles des sens, la paralysie, la syncope.

(3) Les douleurs, les coliques nerveuses, la *colique de plomb*.

(4) De *NEUROPATHIA*, cetera.

maladies particulières du cerveau ou de la moelle épinière (1), les maladies mentales & les affections particulières des nerfs eux-mêmes; la névrite, par exemple, ou les névralgies externes, qui, en particulier, ont bien plus d'analogie avec la goutte qu'avec l'épilepsie ou l'apoplexie.

Callen, auquel ces réflexions, qui forment naturellement de sa définition, ont échappé, a compris les vécans dans les névroses, oubliant, ou ignorant sans doute que Sauvages, si rarement heureux dans ses distinctions, avait eu le bon esprit de circoncrire cette grande famille des maladies mentales dans une classe particulière, &c. Voyez NEVROSES (Affections).

Tous les nosographes qui ont succédé à Callen, sans en excepter M. le professeur Pinel, sont tombés dans la même méprise: aucun ne s'est aperçu que, dans le cas même où l'on pourroit faire dépendre les différentes espèces d'aliénations d'une lésion déterminée du cerveau, on ne devroit pas même les rapprocher ni les confondre sous le titre trop général de névroses des fonctions cérébrales avec l'apoplexie ou l'épilepsie, l'action du cerveau, dans l'exercice des facultés intellectuelles, étant tout-à-fait distincte & séparée de l'innervation ou de l'action générale du système nerveux, même pour les physiologistes & pour les psychologues, qui s'obtiennent, contre l'évidence des faits, à ne pas regarder tout ce qui concerne la pensée, comme un ordre particulier de phénomènes, quelle que soit d'ailleurs la liaison avec les fonctions des différents organes (2).

Nous tâcherons, autant qu'il est en notre pouvoir, de rectifier dans cet article les fautes que nous venons de signaler, & d'établir, pour les névroses, une classification plus conforme à la nature des choses & à l'état des connaissances. Mais avant d'offrir ainsi, sous ce point de vue qui nous est propre, & auquel nous avons été con-

duits par l'habitude de réfléchir sur un certain nombre de faits qu'une pratique assez étendue a présentés à notre observation, l'énumération & la distribution des principales névroses, nous devons jeter un coup d'œil sur ce que l'on pourroit appeler *pathologie générale de ces affections morbides*, & traiter successivement de ce qui est commun aux différentes espèces de ces maladies, au caractère générique de la famille que constitue le groupe de ces espèces dans le cadre nosographique, des causes prédisposantes & occasionnelles des névroses, de leur diagnostic & de leur traitement.

Art. I^{er}. PATHOLOGIE GÉNÉRALE DES NÉVROSES.

§. I. Nature, caractère des névroses.

Les névroses ont cela de particulier & de remarquable, que les organes ou les fonctions qui en présentent les principales symptômes, & dont les dérangements, insensiblement, constituent, suivant une seule de combinaisons diverses, ces maladies, ne sont jamais, ou presque jamais atteints que secondairement & à la suite d'un trouble plus ou moins grave, d'une lésion plus ou moins évidente, dans l'ensemble ou dans quelques parties du système nerveux.

Cette remarque sur le caractère des névroses s'applique, du reste, d'une manière particulière à quelques-unes d'entre elles, à la paralysie, à l'épilepsie, au tétanos, & à plusieurs névroses abdominales.

Le plus souvent les névroses, quelle que soit d'ailleurs la gravité de leurs symptômes, ne sont jamais, ou presque jamais accompagnées de fièvre, ainsi que nous le savons déjà par la définition de Callen; ce qui doit les faire distinguer de plusieurs inflammations dont les effets, éloignés ou symptomatiques, pourroient, dans ce caractère négatif, être confondus avec certaines affections nerveuses, quelquefois très-équivoques.

Plusieurs névroses se développent d'une manière aiguë, mais le plus grand nombre appartient aux maladies chroniques & présente une tendance à la périodicité.

Ces maladies sont, du reste, plus ou moins douloureuses; mais il est digne de remarquer que les névroses bien caractérisées, se manifestent plus souvent par un dérangement, par une diminution ou par une exaltation dans la contractilité des muscles des membres ou des viscères membraneux, que par des altérations morbides de sensibilité; de telle sorte, qu'avertis par ce symptôme, les praticiens seront utilement conduits à regarder comme des symptômes de névralgie interne (1), par cela

(1) Le monacisme, la céphalalgie, les accès de l'encéphalite, l'hydrocéphale aiguë & chronique, &c. &c.

(2) L'opinion que nous énonçons dans ce passage, n'est point une profanation de foi, ni une concession à des croyances religieuses, qui doivent toujours être respectées dans les méditations du naturaliste. C'est un simple énoncé des résultats, auxquels on a été conduit par nos longues expériences. L'encéphale, sans doute, exerce sur l'encéphalisme une plus grande influence qu'aucun autre organe; mais cette influence est loin de démontrer que ce viscère soit l'organe des fonctions intellectuelles, à peu près comme l'appareil alimentaire est l'organe de la digestion. On dirait même, que dans plusieurs circonstances, le cerveau agit sur l'encéphalisme, bien plutôt par l'effet de son importance, que par une spécialité de fonctions ou d'organes. On voit même, & comme pour donner plus de force à cette remarque, que son intérêt apparent se coïncide souvent avec plusieurs aliénations d'esprit très-promuées, avec des folies insensées, suivies de mort, de l'homme de Cabanis, tandis que des lésions assez graves, mais produites du même organe, n'ont pas occasionné d'une manière nécessaire, la perversion, l'état morbide des facultés intellectuelles.

(1) L'irritation soutenue, ou même une forte d'inflammation chronique d'un tronc ou d'une branche de nerf, conduisant à elle seule la névralgie, & s'annonce par tous les

même qu'ils sont très-douloureux, plusieurs phénomènes que les nosographes attribuent à des névroses partielles des viscères de la poitrine ou du bas-ventre (l'asthme, par exemple, l'angine de poitrine, la cardialgie, le pyrosis) (*voies ces mots*).

Les névroses peuvent être rarement rapportées à une cause aussi directe & aussi prochaine : les plus redoutables dépendent, en général, d'une lésion, d'une altération morbide dans quelques points des centres nerveux, annoncée par une *irrégularité*, un *désordre* dans l'innervation : ce qui constitue la maladie, qui est caractérisée d'ailleurs par un état morbide très-prononcé, de la contractilité ou de la sensibilité sensoriale.

L'épilepsie, dont la cause échappe souvent, même après la mort, aux recherches les plus rigoureuses, s'est trouvée liée dans plusieurs circonstances, ainsi que les convulsions, à ces maladies organiques des centres nerveux. Le vomissement, comme on sait, est le plus souvent excité d'une manière symptomatique dans les plaies de tête. La *paralyse* devient la conséquence presque nécessaire d'une apoplexie ; & , dans ces derniers temps, on est parvenu à se convaincre, par une suite d'expériences fondamentales, que le tétanos particulier, qui résulte de l'empoisonnement que l'on provoque, soit avec le poison des sauvages, soit avec l'extract de la noix vomique, dépend de l'action particulière & en quelque sorte élective de ce redoutable poison sur la moelle épinière, quelles que soient d'ailleurs les voies qui ont servi pour son introduction.

Des affections moins fortes, certaines irritations produites à une grande distance du cerveau & de la moelle épinière, peuvent aussi devenir, & sont devenues en effet la cause de différentes névroses très-graves chez certaines personnes qui réunissent toutes les conditions d'une grande mobilité & d'une grande susceptibilité nerveuse : ainsi des plaies légères, des irritations à peine sensibles, ont été suivies plusieurs fois d'un tétanos particulier ou général dans les climats chauds & chez quelques hommes dont un genre de vie particulier, ou l'impression soutenue d'affections morales très-vives, avoient développé sans mesure la sensibilité.

Haller a cité, entr'autres observations, plusieurs exemples de convulsions qui avoient été évidemment provoqués, tantôt par une douleur de dent, le nerf dentaire étant à découvert (1), tantôt par la présence d'un calcul dans le canal de l'urètre (2), ou par une douleur indéterminée de l'estomac (3).

Signes de cette irritation, & par un trouble dans les fonctions des parties qui reçoivent des nerfs de cette branche & de ce tronc nerveux, & se trouvent en quelque sorte dans sa sphère d'action ou d'influence.

(1) Un tétanos.

(2) Un vomissement continué ou symptomatique.

(3) L'aphonie ou perte de la voix, doit faire remarquer, à l'occasion de ce fait, que plusieurs irritations indé-

Le travail de l'attention, l'excitement vermineux, & dans plusieurs circonstances une impression vivement éprouvée dans une grande étendue par un organe très-sensible, l'impression du froid, par exemple, le spasme du tissu fibreux de la peau pendant le frisson de certaines fièvres inflammatoires, peuvent déterminer, soit d'une manière sympathique, soit par altération morbide, les névroses les plus graves, l'ileus, ou colique dite de *mifere*, la colique de Madrid, le vomissement sympathique, &c. &c.

Dans plusieurs autres cas, la sensibilité morbide d'un ou de plusieurs viscères, une augmentation sensible dans leur sphère d'action sous l'influence d'une irritation, tantôt habituelle, tantôt périodique, se présentent aussi comme la cause prochaine ou comme le point de départ d'une névrose très-opiniâtre, ainsi que l'on a si souvent occasion de l'observer pour l'hystérie & pour l'hypochondrie.

Cette espèce d'irritation locale est d'ailleurs, le plus souvent, méconnue, & dans ce cas, on regarde quelquefois comme imaginaires, comme de simples vapeurs, des souffrances malheureusement trop réelles & tout-à-fait indépendantes des causes morales auxquelles on se flatte à les attribuer.

Un de mes amis, M. B**, auquel j'ai donné des soins pendant plus de quinze à vingt ans, fut pour moi-même, pendant long-temps, le sujet d'une semblable méprise. Toutes les apparences extérieures & ses habitudes annonçoient la santé ; cependant il se plaignoit souvent d'une suite de petits maux, à la réalité desquels on avoit beaucoup de peine à croire ; de spasmes, par exemple, dans la poitrine, de serrement convulsif de la région temporale, de tremblements, de commotion subite, de treillisement, & même quelquefois de la sensation morbide, d'un étranglement ou de la présence d'un corps étranger à la partie inférieure du cou, comme dans un accès d'hystérie. Les causes les plus légères paroissent le plus ordinairement suffisantes pour exciter quelques-uns de ces symptômes, & l'attention que M. B** avoit apportée pour les observer ou pour les éviter ; la manière de les craindre, la faiblesse de ses aperçus, ou la délicatesse de ses remarques pour les prévenir, pour les reconnaître ou pour en exagérer l'importance, en avoient fait à la longue le modèle le plus accompli des hypochondriaques.

Vers l'âge de soixante-six ans, tous les symptômes morbides se développèrent avec plus d'intensité, & je commençai alors à soupçonner une cause permanente d'irritation, ou même peut-être une lésion organique dans quelques parties de l'hypogastre.

Cette conjecture ne fut que trop confirmée dans

mines de l'estomac, sans occasionner une aphonie absolue, ni éteindre complètement la voix, la rendant plus faible, paroissant l'éteindre, ou changer son timbre.

la suite : une maladie des voies urinaires, dont le développement progressif avoit d'abord été insensible, & s'étoit borné à l'excès de quelques phénomènes sympathiques en généraux, offrant toutes les apparences d'une hypochondrie assez forte, s'annonça enfin par les symptômes qui lui sont propres, & fit périr d'une manière longue & douloureuse un des hommes les plus aimables que j'aie connus, & dont je n'oublierai jamais l'attachement & la confiance immuable.

Chez les femmes, une maladie de la vessie, du rectum, l'irritation permanente, le rétrécissement d'une portion du gros intestin, d'où résulte la constipation la plus opiniâtre, ont également donné lieu à toutes les apparences d'une hystérie, & fait commettre dans le traitement, des méprises graves, ainsi que je pourrais le prouver par plusieurs exemples tirés de mon Mémorial clinique.

Plusieurs névralgies internes, que la difficulté de leur diagnostic a souvent fait méconnoître, peuvent également, & dans plusieurs circonstances, avoir occasionné un grand nombre d'affections morbides que l'on devroit rapporter peut-être aux névralgies : certaines paralysies, les paralysies partielles, par exemple, l'aphonie, la dysphagie, la perversion des appétits, la constipation, le serrement, & une multitude de douleurs abdominales que l'on ne peut rapporter ni à une inflammation aiguë ou chronique, ni aux suites de cette inflammation. (Voyez NÉVRALOGIE.)

Dans toutes ces occurrences, dans tous les cas où les différents foyers nerveux ne se présentent pas comme le point de départ des névroses, l'irritation locale, l'état morbide d'un ou de plusieurs viscères qui offrent ce point de départ, agissent-ils immédiatement, soit par une forte irradiation, soit par sympathie, ou ne produisent-ils leur effet dans tout son développement qu'après avoir porté le trouble dans quelques points de l'encéphale ?

Nous nous bornerons à poser ici cette question sans oser la discuter, persuadés que l'état présent des connoissances sur l'organisation & les fonctions du système nerveux, ne présente pas un nombre suffisant de données pour résoudre un semblable problème.

S. II. Des causes occasionnelles & des causes prédisposantes des névroses.

Les causes occasionnelles & les causes prédisposantes des névroses, peuvent se rapporter à un grand nombre & à une grande variété de circonstances.

Parmi les causes occasionnelles, on place avec raison, le climat, le genre de vie, le développement exagéré de l'existence morale, les abus du luxe, le trouble & l'agitation continuelle des passions.

Quelques philosophes ont même remarqué, à ce sujet, qu'une foule de névroses, connues sous

MAOISIAN. Tome X.

le nom de *neuropes*, n'avoient commencé à devenir assez fréquentes pour attirer l'attention des médecins, que dans la circonstance d'une haute civilisation, & dans la première moitié du dix-huitième siècle.

Quelques passions spontanément & vivement excitées, la colère, par exemple, la joie subite & inmodérée, la frayeur, doivent être placées au premier rang parmi les causes occasionnelles des névroses les plus puissantes, ainsi qu'il sera facile de s'en convaincre en parcourant plusieurs ouvrages médico-philosophiques du dix-huitième & du dix-neuvième siècle (1).

La douleur physique trop fortement et trop long-temps éprouvée, agit aussi de la même manière & peut provoquer des spasmes partiels, & même des convulsions générales. On a remarqué, en outre, lorsque l'abus insensible de la question étoit dans toute sa force, que les malheureux prévenus que l'on soumettoit à la torture, tombaient quelquefois, par l'excès de la douleur, dans une stupeur léthargique, qui, dès-lors, les empêchoit d'entendre les interpellations des juges, ou les menaces des bourreaux.

L'action de plusieurs poisons, des narcotiques, par exemple, du mercure, du plomb, ou de certains médicaments administrés intempestivement, ou à trop forte dose, appartient à l'histoire d'un ordre de causes occasionnelles des névroses, qui sont très-direktes & malheureusement très-énergiques. Les exemples de névroses par l'effet de ces causes occasionnelles sont très-fréquents. Des maladies nouvelles, & qui appartiennent aux névroses, ont même été introduites de cette manière, chez les peuples modernes ; tels sont la rachialgie ou colique de plomb, le tremblement mercuriel, qui abrège si cruellement la vie d'un grand nombre d'artisans, & la raphanie, que les médecins du Nord paroissent avoir décrite les premiers, en l'attribuant à la plante vénéneuse dont elle porte le nom.

Quelques maladies ou certains états particuliers & temporaires de l'organisation, sans rien produire de comparable aux empoisonnements qui ébranlent ou qui dérangent le plus l'action nerveuse, peuvent aussi troubler la même fonction & occasionner plusieurs symptômes de névroses : tels sont toutes les affections douloureuses des intestins & de l'estomac, & même l'irritation obscure à peine sensible de ces viscères ; les effets d'une méconstriction laborieuse ; le travail d'une denti-

(1) BARRER, *Prælectio de animi medicis*. Lond., 1750. GAUJUS, *de Regimine mentis*. Lugd. Batav., 1767.

FALCONER, *Disser. on the influence of the passions upon disorders of the body*. London, 1768.

COSSA, *a Philosophical treatise on the passions*. Bath, 1800.

Voyez aussi quelques dissertations dans la collection des thèses in-8°. de la Faculté de Paris.

tion morbide, l'excitement qui accompagne quelquefois le développement de la puberté (1); les effets d'une gestation difficile; l'accouchement lui-même & les suites de couches, &c. &c.

Les aliments irritans, les boissons, mais surtout les boissons fermentées, les liqueurs alcooliques prises en grande quantité, manquent rarement d'occasionner, avec le temps, des névroses partielles des organes de la digestion, ou un tremblement fébril précoce, & l'affaiblissement des facultés intellectuelles. La privation subite de ces mêmes boissons pour les personnes qui en abusoient habituellement, occasionne une névrose particulière assez remarquable, la *delirium tremens*, que l'on fait cesser par le retour aux anciennes habitudes, ou par l'effet de l'opium convenablement employé. Du reste, l'empire des causes occasionnelles dans le développement des névroses, est entièrement subordonné à la mobilité ou à la susceptibilité primitive ou acquise du système nerveux. Pour le prouver, il nous suffiroit de rappeler à ce sujet, & si les bornes de cet article nous le permettent, l'histoire de vapeurs qui ont souvent réclamé nos soins; les exemples & tout le mal que peuvent faire à ces valétudinaires, l'approche d'un orage, les changemens de temps, les plus légères variations dans le froid ou la chaleur, l'état hygométrique, électrique & barométrique de l'atmosphère.

Dans certaines éruptions du système nerveux, les équinoxes, les phases de la lune, les éclipses, la révolution diurne de la terre, peuvent occasionner des névroses, comme on pourroit le prouver par des exemples, dans lesquels on trouveroit toute l'impurité d'une observation médicale, réunie à l'intérêt d'une anecdote curieuse ou d'un trait biographique.

Dans ces mêmes conditions d'une grande mobilité nerveuse, il n'est pas sans exemple que l'imitation ou l'action particulière de certains individus les uns sur les autres, ait provoqué immédiatement une affection morbide qui se rapporte à la classe des névroses; ce qui se prouveroit aisément par de nombreux exemples, surtout pour les convulsions qui ont paru quelquefois contagieuses, par la rapidité de leur propagation sympathique; & ne fait-on pas d'ailleurs, que plusieurs passions, qui sont aussi des espèces de névroses, l'attendrissement, la coïté, la fureur, sont excitées, ou se communiquent souvent de la même manière, dans les grandes assemblées, au cirque, au théâtre ou dans les réunions populaires (2)?

(1) Quelques fièvres ataxiques & plusieurs maladies convulsives se font manifestes à cette époque. & en paraissent dépendre de l'excitement ou de la commotion que le système nerveux avoit éprouvée.

(2) Les historiens citent plusieurs exemples de convulsions, qui se manifestent à ces apparitions d'une affection

Les causes prédisposantes des névroses sont inhérentes à l'organisation même, & sont intérieures. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'effet de celle-ci, des causes occasionnelles. Ces dernières, lorsqu'elles n'agissent pas vivement & subitement, tendent plutôt à développer une aptitude morbide, qu'à exciter une affection verveuse bien décidée: ce qui est évident pour l'influence soutenue & graduée des régimes, des climats, des professions, des castes morales. D'une autre part, certaines dispositions inhérentes à l'organisation, agissent comme des causes occasionnelles; tels sont certaines passions, les maladies irritantes, la douleur, le mode d'excitement qui accompagne la dentition, la menstruation & les grossesses morbides.

Parmi les causes prédisposantes, sur lesquelles il n'existe aucune doute, on place au premier rang le genre de vie, certaines maladies qui ont changé le tempérament & augmenté avec le temps la mobilité nerveuse; l'état morbide de ce même système à la suite d'une névrose très-grave; l'aptitude dans ce cas à une recrudescence, & une récidive; une manière d'être, un mode de complexion de ce même système nerveux, qui peut remonter jusqu'au moment de la conception (3), ou dépendre d'une forte commotion dans l'organisme du fœtus, à une époque quelconque de la grossesse, mais plus particulièrement des quatrième & sixième mois; enfin les différentes maladies de la mère, soit aiguës, soit chroniques, pendant la grossesse.

On place aussi parmi les causes prédisposantes des névroses, certaines déficiences ou maladies congéniales du système nerveux (4), ainsi qu'une aptitude héréditaire qui se transmet des pères aux enfans, en épargnant quelques-uns une génération, pour s'étendre à la génération suivante; l'aptitude qui met ordinairement des bornes à la longévité, & qui fait éprouver sans aucune cause occasionnelle connue, & à une certaine époque de la vie, soit une attaque d'apoplexie ou d'épilepsie qui se renouvelle, soit les premiers symptômes d'une vélanie incurable (5).

contingente ou épiléptique. Nous avons rapporté, dans un autre article de ce Dictionnaire, ce qui arriva à y & à son oncle, dans l'église de Saint-Rich, chez des jeunes filles, pour un écou convulsif, qui ne fut interrompu que par leur séparation.

(1) L'état du père & de la mère au moment de la conception, ne paraît pas sans influence sur la constitution du fœtus; ce qui a été plus particulièrement remarqué pour l'ivresse, l'antipathie, une stupéfaction convulsive, au état d'amaigrissement, &c., ou la violence, l'espèce de fureur amoureuse avec laquelle le mariage a été consommé.

(2) Cette disposition peut exister, suivant Sprengel, d'un seul côté du système nerveux, tantôt à droite, tantôt à gauche. Vide *Insanabilis morbus*.

(3) Voyez la Dissertation d'Adam, *On the hereditary peculiarities of human constitution*. Lond., 1814.

ART. II. EXPOSITION NOGOGAPHIQUE DES NÉVROSES.

Dénombrement analytique & classification des différentes espèces de névroses.

Il n'exista peut-être pas un nosographe un objet plus important de méditations & de recherches, que ce qui concerne le dénombrement analytique des différentes espèces de névroses, & la classification de ces maladies, disposée, calculée de manière à faire convenablement ressortir pour chaque espèce, la nature de ses phénomènes & les principaux moyens de traitement qu'il convient d'en lui opposer. Mais ici, il faut l'avouer, les difficultés du sujet égalent au moins son importance. Il ne faut pas être étonné si les nosographes qui s'en sont occupés, soit dans quelques traités généraux, soit dans certaines monographies, ont laissé tant à désirer & à faire à leurs successeurs. Afin d'éviter, autant qu'il sera possible, des fautes déjà faites ou des erreurs déjà rencontrées, nous appliquerons aux névroses quelques principes généraux de classification qui nous sont propres : heureux de pouvoir démontrer tous les avantages que l'on peut retirer de la méthode analytique, dans le dénombrement & dans l'énumération des maladies, lorsque l'on procède avec une grande liberté d'esprit, sans rappeler, ni discuter, soit pour les adopter, soit pour les rejeter, les idées ou les opinions des auteurs qui ont suivi une autre marche, tout en proclamant la supériorité & les avantages de l'analyse.

Dans la classification établie d'après ces vues, nous nous sommes attachés à l'ensemble des rapports qui existent entre les maladies, que nous avons réunies dans un même genre, sans avoir égard aux appareils d'organes qui en sont le siège; persuadés, avec Sauvages, qu'une classification suivant l'ordre des parties, fait remonter à l'enfance de l'art, & n'amène aucun rapprochement physiologique. Les tissus qui entrent dans la composition d'un organe, les propriétés de ces tissus, les fonctions ou actions qui résultent de ces propriétés, le mode d'action, les dérangements de ces modes d'action, la nature des modifications & des modes de traitement, telles sont les bases de distribution auxquelles nous nous sommes attachés, & qui pourront conduire un jour à donner une bonne histoire des névroses. On verra aisément, au reste, que dans un pareil système de classification, on ne doit pas s'attendre à trouver des névroses des sens, des névroses des fonctions cérébrales, nutritives & vitales; des névroses de la circulation, de la respiration, &c. &c. : arrangement qui conserve tous les inconvénients attachés à la méthode anatomique, & qui semble plutôt calculé dans les intérêts d'une classification purement descriptive, que dirigé suivant des vues pratiques & curatives.

La première espèce de névroses qui appellera notre attention, sembleroit mériter à peine d'être comprise parmi ces maladies. Elle se manifeste du moins que pendant le sommeil, & consiste dans un rêve méthode particulier, pendant lequel la rêverie, quoique profondément endormi, & très-éloigné de l'espèce de sommeil qui favorise ordinairement les songes, parle, fort de son lit, exécute d'une manière plus ou moins étendue différentes séries d'action que l'habitude a rendues faciles, & qui correspondent à la série des idées, dont la succession & la combinaison constituent le fond du rêve : cette situation a été désignée sous le nom de SOMNAMBULISME. Nous croyons pouvoir en admettre quatre variétés principales; savoir : 1°. le somnambulisme pendant lequel on agit sans parler; 2°. le somnambulisme pendant lequel les rêves parlent & agissent en même temps; 3°. le somnambulisme avec parole, avec locomotion & avec quelques sensations corporelles mal appréciées (celles de la chaleur & du froid) (1).

Une seconde espèce nous est offerte par la SOMNOLENCE CATALEPTIQUE, maladie assez rare, dont il existe cependant quelques exemples assez bien constatés pour admettre cette névrose dans un tableau nosologique. La somnolence cataleptique revient par accès, & pendant chaque accès, les malades, profondément endormis, semblent doués de pouvoirs prophétiques, font & disent des choses qui ne froient pas à leur portée dans tout autre circonstance, n'ont horreur à réciter des passages de prose ou de vers, avec une facilité, une liberté de mémoire qu'ils n'acroient pas pendant la veille.

Trois espèces de névroses qui se manifestent avec le caractère d'un état comateux très-prononcé, viennent naturellement se placer à la suite de celles que nous venons d'indiquer : ce sont : 1°. la CATALEPSIE; 2°. l'EXTASE; 3°. la LÉTARGIE.

Dans la catalepsie, l'état soporeux est très-profond; mais les muscles, qui ne pourroient se mouvoir eux-mêmes, ont une sorte de souplesse remarquable, & les membres conservent toutes les attitudes ou les situations dans lesquelles on peut les placer, souvent d'une manière bizarre & en apparence pénible, sans réveiller le malade.

Cette disposition des membres, véritablement caractéristique dans la catalepsie, n'existe pas dans l'extase. Mais l'état soporeux se trouve accompagné d'une modification de la contractilité musculaire telle, que le malade demeure pendant toute la durée de l'accès dans la situation, dans l'attitude où il a été forcé : la bouche entr'ou-

(1) Voyez dans le Dictionnaire de l'Encyclopédie, les mots NÉVRE & SOMNAMBULISME.

verte, par exemple, les bras & la tête élevés, avec l'expressif de l'admiration ou de la prière; le coude appuyé, & la main & les doigts rapprochés comme pour écrire. Les muscles du visage deviennent contractés & relâchés, sans avoir perdu une seule once du caractère de la poussée ou du sentiment qu'ils exprimoient au moment de l'attaque.

Rien de semblable n'existe dans la léthargie; rien ne rappelle la vie de relation, & le sommeil est si profond, tout paroît tellement endormi, sans en excepter les organes dont l'activité, dans l'état naturel, n'est jamais interrompue, que cette situation constitue un état de mort apparente qui a été regardé plusieurs fois, & par une funeste méprise, comme une mort réelle: sommeil que l'on a vu se prolonger pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, & même pendant plusieurs mois.

Les cinq espèces de névroses que nous venons d'indiquer ont entr'elles des points d'analogie, des similitudes qu'elles n'ont point avec les autres affections nerveuses: rapports d'après lesquels nous comprenons dans un seul & même genre les *affections soporeuses ou sommeil morbides*, que Cullen & quelques nosographes ont si mal-à-propos confondus, soit avec l'apoplexie, soit avec différentes affections consécutives du cerveau dans les maladies aiguës, tels que le *carus* & le *cataphora*, le *coma somnolentum* & le *coma vigil*, &c.

Il est d'ailleurs bien digne de remarque, que parmi les cinq espèces comprises dans le genre des affections soporeuses, une seule, le *somnambulisme*, ne se manifeste que pendant la durée d'un sommeil habituel, tandis que les autres sont elles-mêmes une espèce de sommeil accidentel & morbide qui tend à la périodicité, & qui n'est accompagné d'aucun autre symptôme de maladie.

Voyez, pour plus de détail, l'article *Soporales* (Affections), dans lequel on trouvera plusieurs faits curieux qui appartiennent à l'histoire de ces névroses, entr'autres la description de la maladie singulière du savant anatomiste Bertin, que Condorcet a fait entrer dans la biographie de cet académicien. (Condorcet, *Eloges historiques*, édit. in-12.)

L'action du cerveau, les deux grandes propriétés vitales, qui dérivent de l'intégrité de cette action (la sensibilité de relation & la contractilité musculaire), sont profondément altérées ou modifiées, mais sans lésions organiques, qui suspendent ou gênent leur exercice ou leur développement.

Cette interruption visible & plus ou moins complète des principales fonctions du centre nerveux, par une cause évidente & mécanique, nous est offerte dans un petit nombre de névroses, toujours très-graves, souvent mortelles, &

que la rapidité, je dirois presque la *soudaineté* du dénouement insensible qui leur est propre, a fait désigner sous le nom d'*apoplexie* par les Anciens: dénomination que l'on a fait dériver du mot grec *αναπλην*, frapper, foudroyer.

L'*APOPLEXIE SANGUINE*, dont nous fîrmerons notre sixième espèce, est la plus fréquente, la mieux connue de ces maladies, la seule même que plusieurs auteurs modernes aient voulu admettre, élevant des dones sur les autres, on la regardant comme les effets consécutifs d'une lésion organique du cerveau ou de ses membranes.

L'apoplexie sanguine est caractérisée par la nature de l'obstacle, qui vient suspendre les fonctions cérébrales, par l'épanchement du sang plus ou moins considérable qui comprime le cerveau, qui gêne, qui suspend l'action de cet organe, de telle sorte que si la mort termine promptement la maladie, elle commence par l'encéphale, dont l'inaction entraîne progressivement la cessation de la respiration & de la circulation: ce qui est propre à toutes les apoplexies.

On doit rapporter à l'apoplexie sanguine, & comme autant de variétés de cette espèce, l'apoplexie traumatique de Sauvages, l'apoplexie consécutive de l'hypertrophie du cœur; l'apoplexie par strangulation; l'apoplexie des nouveau-nés, à la suite d'un accouchement très-long & très-difficile.

Les autres espèces d'apoplexies que nous croyons pouvoir admettre dans les névroses qui appartiennent au genre des affections soporeuses, sont: 1°. L'*APOPLEXIE NERVEUSE*, que Morgagni lui-même paroît reconnoître, & qu'il faudroit d'ailleurs établir, ne fût-ce que pour y faire entrer les apoplexies qui sont périr dans un troisième ou quatrième accès de fièvre soporeuse; 2°. L'*APOPLEXIE TÊMENTE* de Sauvages (apoplexie par l'ivresse, apoplexie par les narcotiques), qu'il faut regarder, contre l'opinion de quelques auteurs, comme une maladie essentielle, & comprendre dans le cadre nosologique, puisqu'elle ne se rapporte à aucune autre maladie, & qu'elle ne peut être attribuée, comme l'apoplexie fébrile, ou toute autre apoplexie consécutive, à une maladie organique bien déterminée du cerveau ou de ses membranes.

Ces trois espèces, l'apoplexie sanguine, l'apoplexie nerveuse & l'apoplexie ténue de Sauvages, évidemment distinguées les unes des autres par une différence sensible dans la cause ou le principe de lésion qui les occasionne, forment, par leur réunion, l'un des genres de maladies les mieux établis, & les plus naturels: le 2°. genre, ou les *APOPLEXIES CARACTÉRISÉES* par l'interruption des fonctions cérébrales & des actions organiques qui en dépendent, quels que soient d'ailleurs la cause & le mode de cette interruption qui forme le caractère générique, si évident, si prononcé dans le genre de mort, qui est propre à ces mala-

dies, lorsqu'elles sont promptement terminées par un dénouement favorable.

Plusieurs espèces de névroses caractérisées, soit par la perte, soit par une diminution du mouvement musculaire ou du sentiment, sont, dans un grand nombre de cas, la conséquence des apoplexies. Elles doivent donc en être rapprochées dans une bonne classification nosologique; elles forment d'ailleurs elles-mêmes deux groupes ou familles naturelles de maladies, notre troisième & notre quatrième genre de névroses: les *PARALYSIES des muscles*, ou *paralytiques* proprement dites, les *PARALYSIES des sens externes* & des sens internes, *paralytiques du sentiment*, ou, dans un seul mot, les *DYSSTHÉSIES*.

Faisons rapidement l'énumération de ces différentes névroses, qui, par leur nombre & par leur importance, occupent une grande place dans les catalogues nosologiques.

Les espèces que nous venons d'indiquer sont au nombre de huit. La première & la plus fréquente des espèces du genre *paralytiques*, forme l'hémiplegie.

9^e. *Espèce*. L'HÉMIPLÉGIE. Paralyse d'une moitié latérale du corps, sans en excepter le visage, ni même la langue, se manifestant le plus souvent à la suite d'une attaque d'apoplexie, & du côté opposé à celui de l'épanchement, dans le cas d'une apoplexie sanguine.

10^e. *Espèce*. LA PARAPLÈGE. Paralyse de la moitié inférieure du corps ou des parties sous-diaphragmatiques, suite ordinaire d'une lésion organique de la moelle épinière.

11^e. *Espèce*. LA PARALYSIE des muscles orbitaires des paupières. (Prolapsus des paupières.)

12^e. *Espèce*. LA PARALYSIE de la langue, ou *glossoplexie*.

13^e. *Espèce*. L'APRONIE, ou paralyse de l'appareil musculaire vocal.

14^e. *Espèce*. LA PARALYSIE du sphincter de l'anus.

15^e. *Espèce*. LA PARALYSIE des muscles érecteurs du pénis.

Ces différentes espèces de paralytiques que nous venons d'indiquer, ont entr'elles des similitudes qu'elles n'ont pas avec les autres espèces de névroses, & se trouvent rapprochées en cela, qu'elles affectent les muscles extérieurs ou de structure fasciculaire: circonstance qui permet d'en former un sous-genre, sous le titre de *PARALYSIES des muscles fasciculaires*.

Un autre sous-genre non moins naturel, comprend les paralytiques des muscles membranueux ou des muscles des viscères, qui sont en petit nombre. La *PARALYSIE de l'œsophage* (16^e. *Espèce*), névrose assez rare, & qui se observe qu'à la suite des apoplexies les plus graves, dont elle augmente d'ailleurs le danger.

17^e. *Espèce*. LA PARALYSIE de la vessie.

18^e. *Espèce*. LA PARALYSIE du rectum.

Peut-être devoit-on rapporter aux paralytiques, l'adynamie profonde de l'estomac, des intestins, de l'utérus, dans quelques circonstances de maladies, & l'atonie des vésicules pulmonaires dans le catarrhe suffoquant & dans quelques asphyxies; mais il faudroit bien se garder d'étendre cette idée, avec quelques auteurs, trop peu sévères dans leurs rapprochemens, à l'état du cœur, du foie, des reins, dans quelques affections morbides qui n'ont rien de commun avec la paralyse (1).

En poursuivant notre énumération, nous trouvons, pour les comprendre dans la grande famille des névroses, plusieurs espèces de paralytiques du sentiment, ou *dyssthésies*, que les nosographes modernes ont peut-être un peu trop négligées, & sans s'apercevoir qu'un système nosographique doit embrasser la totalité des infirmités humaines, dont il existe & dont il a existé des exemples.

Ces différentes espèces d'atonies ou de paralytiques partielles, qui sont le plus souvent indépendantes de l'état des muscles, forment par leur ensemble un sous-genre ou une section bien marquée, des paralytiques. Les affections morbides qui s'y trouvent comprises, sont l'*AMAUROSE* ou paralyse de la rétine (19^e. *Espèce*), & les espèces suivantes.

20^e. *Espèce*. L'AGNOSTIE PARALYTIQUE, des Sauvages (insensibilité complète ou partielle de la langue).

21^e. *Espèce*. L'ANOSMIE, paralyse de l'odorat.

22^e. *Espèce*. LA CORNOSE, ou l'état de sourd & muet, produit par la paralyse plus ou moins complète des nerfs de l'ouïe, congéniale ou acquise, & si bien appréciée dans ces derniers temps par M. Itard, qui a fondé, sur la connoissance approfondie de cette disposition morbide, le moyen de rendre l'ouïe à plusieurs sourds & muets de naissance, regardés comme incurables.

23^e. *Espèce*. L'ANESTHÉSIE, ou l'abolition partielle du toucher, dont il existe quelques exemples remarquables dans les différentes collections académiques (2).

(1) L'auteur de l'article *Paralyse des viscères*, dans le *Dictionnaire des Sciences médicales*, mérite en particulier le reproche, d'avoir porté trop loin les rapprochemens dont nous parlons, & même d'être tombé en cette occasion dans une erreur qui lui a fait confondre avec les paralytiques, les coïques métalliques par exemple, & la suspension momentanée d'une action vitale.

(2) Sauvages a rapporté sous le titre d'*amphibie phobique*, l'exemple d'une perte momentanée mais absolue de sensibilité, qui cessa au bout de deux jours, ainsi que l'aphonie qui l'accompagnait, par l'ouverture des saignées. On a aussi vu quelque-fois l'assès de chagrin, ou la violence d'un accès de mélancolie, produire une perte beaucoup plus longue de sensibilité. Sauvages en cite un exemple fort remarquable, d'après une thèse soutenue à Strasbourg en 1760.

Un jeune ouvrier ayant éprouvé de violents chagrins, et

24^e. *Espèce*. L'ANALYSE nerveuse & prolongée (l'usage on *apofthème* des écoles), caractérisée par l'absence absolue de toute espèce d'alarmes pendant plusieurs jours, & même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec une perversion de la sensibilité & de la contractilité des voies digestives, qui se trouve rarement indépendante de l'hygiène ou d'une disposition, soit catatonique, soit mélancolique, dont les exemples sont plus fréquents parmi les femmes que parmi les hommes. (La 10^e. *Espèce* du genre *ANALYSES* de Sauvages, absence miraculeuse, *abfentia mirabilis*). (1)

25^e. *Espèce*. L'AMUSE (défaut, suspension de la soif), phénomène morbide qui se présente plutôt comme un symptôme accidentel dans plusieurs maladies, que comme une maladie, bien caractérisée. Il n'est cependant pas sans exemple qu'il existe, sans aucune affection morbide commun, au défaut de soif, dépendant d'une altération purement nerveuse, & souvent en habitude chez quelques personnes qui ne boivent presque pas, & qui peuvent passer plusieurs jours sans prendre de liquides.

fréquent à coup les apparences d'une insensibilité absolue : on le piquoit, on le brûloit à plusieurs reprises, sans qu'il laissât entendre, à peine, le plus léger signe de douleur. Il restoit muet, ne répondant pas aux questions qu'on lui adressoit, immobile dans son lit, étranger à tout ce qui l'environnoit, & ne prenant que nourriture que lorsqu'on cherchoit à l'y contraindre. Cette espèce d'habitude générale dura pendant plus de deux ans. Le gale ayant alors été inoculé au malade, dans l'hôpital de Berlin, où il se trouvoit, il en résulta une fièvre assez vive, qui se terminoit par des sueurs & par une éruption. Alors le jeûne mélancolique & parut suite de son regain de sensibilité, & commença à parer & à répondre, ayant d'ailleurs perdu le souvenir de tout ce qu'il avoit précédé la guérison.

(1) Les collections académiques présentent plusieurs exemples de ces abstinences prolongées, qui dépendent de l'asthénie. Un est surtout parmi les plus remarquables, les deux exemples qui ont été décrits avec beaucoup de soin dans la *Bibliothèque française*. Le premier est tiré des *Transactions philosophiques*. Il a pour sujet une femme qui, après plusieurs observations graves dans la santé, tomba dans une espèce d'apathie, d'insensibilité apparente, qui pendant quatre ans ne lui laissa rien voir autre qu'un bouillon pour boisson médicamenteuse, & une prière d'usage simple. Pendant tout ce temps, toutes les secrétions & les excrétions ont été suspendues chez cette malade. Ce personnage eut été visité par Macbino, le 21 octobre 1767; il le fut de nouveau en 1772, cinq ans après, & comme cet état alors à essayé de prendre une petite quantité de bouillon ou de nourriture.

Une autre femme appelée *Jessyphie Dand*, est de sujet du deuxième exemple. Elle eut tout-à-coup, à la suite de plusieurs maux de tête, une suspension de toute appétence, & un maintien de vitalité tel, qu'elle fut nourrie seulement avec quelques petites quantités de bouillon qu'on lui donnoit à des époques très-régulières. Il est digne de remarque que cette femme gallicane, & l'habituelle habitude qui en est la conséquence, sont toujours, ou presque toujours l'effet d'une altération très-grave dans le système nerveux abdominal, & qu'elle soit beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

26^e. *Espèce*. L'ANAPHRODISIE (défaut, privation de Vénus), que Sauvages a divisée en plusieurs espèces, parmi lesquelles deux seulement appartiennent aux névroses : 1^o. l'anaphrodisie par paralyse; 2^o. l'anaphrodisie morigue ou des neurones d'aiguille, assez fréquente, suivant Kœmper, dans l'Inde, & qui remonte à une superstition fort ancienne, appelée, par Virgile, dans ces deux vers de la huitième églogue :

Nefas arbores medus terna, Amylli, colentes;
Nefas, Amylli, modo te, Pœnia, dic, vocula nefas.

27^e. *Espèce*. DYSPNÉMATISME atonique (espèce d'atonie ou de paralysie partielle, qui, chez les vieillards, ou à la suite de l'habitude immodérée de l'insaisance, ou par l'effet de toute autre disposition morbide, s'appelle à l'éjaculation, ou du moins la rend très-lente & très-difficile).

Plusieurs névroses, sans offrir tous les caractères d'une véritable paralysie, soit de la contractilité, soit de la sensibilité, se manifestent avec une apparence de faiblesse ou d'atonie, qui établit un rapprochement entre ce genre de lésion, & que nous croyons devoir placer à la suite des paralytiques, sous le titre de *débilité nerveuse* : catégorie dont la GONORRÉE (ou dans de Saint-Guy) est une des principales espèces, & que M. le professeur Pinel paroit avoir entièrement méconnue, en la regardant comme une paralysie incomplète.

Cette névrose, qui sera notre 28^e. espèce, n'a aucun rapport avec le scélotisme de Galien, dont Sauvages lui a donné le nom : elle paroit avoir été observée & décrite, pour la première fois, vers la fin du seizième siècle, & s'est trouvée, dans ces derniers temps, le sujet d'une nomenclature estimée (1).

La chorée, assez fréquente jusqu'à l'époque de la puberté, commence par un état de claudication : Elle est caractérisée par le tremblement convulsif & l'agitation spasmodique, fait du membre supérieur & du membre inférieur d'un côté, soit d'un bras seulement, qui exécute sans cesse des mouvements involontaires, & de telle sorte, que la main & le bras du côté opposé, ordinairement du côté droit, font employés continuellement à les retenir. (Voyez SAINT-GUY (dans de), SCÉLOTISME.)

29^e. *Espèce*. CORÉANTISME ou besoin de danser, ou d'entendre de la musique, dans une sorte de délire, d'après une impulsion maniaque, souvent liée à des idées superstitieuses, & dont il existe chez tous les peuples, anciens & modernes, plusieurs exemples, parmi lesquels le *tarantisme*, ou la *tarantule*, doit être placé au premier rang, quoique d'ailleurs on range aujourd'hui dans les

(1) Bourelli, *Traité de la chorée ou de la danse de Saint-Guy*, in-8°. Paris, 1810.

erreurs populaires l'opinion qui attribuoit cette singulière névrose à la morsure de l'insecte dont elle a pris le nom.

30^e. *Espèce.* Le TREMBLEMENT fénil, qui doit être considéré, contre l'opinion de M. le professeur Pinel, comme une maladie, & non pas comme un effet nécessaire au naturel de l'âge avancé, puisqu'il n'existe pas d'une manière constante chez tous les vieillards, & qu'on peut l'attribuer, lorsqu'il est porté à un certain degré, à des causes évidentes d'altérations morbiides.

31^e. *Espèce.* Le TREMBLEMENT métallique auquel les doreurs & fondeurs ouvriers qui emploient le mercure sont plus particulièrement exposés.

32^e. *Espèce.* Le TREMBLEMENT par les narcotiques & par l'abus des liqueurs spiritueuses.

33^e. *Espèce.* Le DELIRIUM tremens, ou tremblement avec délire chez les ivrognes qui se renouvellent privés de liqueurs spiritueuses, & que l'on guérit souvent par le retour à leurs anciennes habitudes.

Le bériberi des Indes, décrit par Bontias & par Tulpius, a été rapproché par M. le professeur Pinel, des tremblements allrhéniques. Nous ne partageons point cette opinion, & nous pensons que le bériberi des Indes paroit appartenir soit aux affections rhumatismales, soit aux névralgies, si l'on examine comme il convient les causes occasionnelles : l'impression subite du froid humide à la suite d'une grande chaleur ; la marche de la même maladie, la nature de ses symptômes, & des moyens de traitement qui leur ont été opposés avec le plus d'avantage (1).

D'après cette réflexion, nous ne comprendrons pas le bériberi dans les *débilités nerveuses*. En nous appuyant sur des motifs non moins fondés, nous croyons ne pas devoir rapporter à ces débilités, plusieurs phénomènes morbides, de la contractilité ou de la sensibilité, assez fréquens dans les hypochondries obscures & indéterminées, le vertige ; la vacillation ; la sensation inquiétante ou incommode d'un défaut d'équilibre ou d'équilibre ; le sentiment non moins pénible d'une gêne, d'une incertitude dans les opérations les plus faciles, comme si l'on avoit oublié tout-à-coup de marcher, de parler, ou de se livrer aux exercices que l'habitude journalière a rendus faciles.

Dans la plupart des névroses qui viennent d'être indiquées, la contractilité musculaire se trouve diversement suspendue, abolie, ou du moins considérablement diminuée, tantôt sous l'influence d'une lésion profonde & bien connue

des centres nerveux, & plus souvent par l'effet d'un dérangement moins grave & plus indéterminé, dans les fonctions de quelques troncs ou dans quelques branches de nerfs plus considérables.

Plusieurs autres genres de névroses sont caractérisés par l'augmentation & par la perversion de cette même contractilité, dont le développement se manifeste avec tout le caractère d'une violente irritation, dont les diverses espèces de spasmes & de convulsions que comprend ce mode de lésion.

Les spasmes ont pour caractères généraux une contraction involontaire des muscles, qui n'alternent point avec leur relâchement, & qui se trouve accompagnée d'une tension, d'une rigidité *tétanique*, dont l'excès distingue une des principales espèces de ce genre (la 6^{me}).

Les différentes espèces de spasmes se rangent naturellement dans deux sous-genres ; savoir : 1^o. les SPASMES des muscles locomoteurs ; 2^o. les SPASMES des muscles membraneux ou viscéraux.

Cinq espèces bien caractérisées se rapportent au premier sous-genre.

34^e. *Espèce.* Le STRABISME.

35^e. *Espèce.* Le RIXE sardonique.

36^e. *Espèce.* Le TETANUS.

37^e. *Espèce.* La SORCIS.

38^e. *Espèce.* Le TORTICOLIS.

39^e. *Espèce.* La CRAMPE ou les enroulements permanents des biceps & calcaneux, le plus souvent symptomatiques.

40^e. *Espèce.* Le TÉTANUS universel ou partiel, caractérisé par la contraction permanente de l'ensemble ou de quelques appareils musculaires, accompagnée de rigidité douloureuse & d'une réaction du cerveau, qui le rend insensible à des doses d'opium beaucoup plus fortes qu'il ne faudroit pour donner la mort dans toute autre situation.

41^e. *Espèce.* L'ÉPILEPSIE caractérisée par l'insensibilité absolue, qui se joint à une contraction involontaire, & qui offre en même temps des symptômes de spasmes ou de convulsions, & cet appareil de symptômes qui rend le spectacle de la maladie si horrible, quelquefois même dangereux pour certaines personnes qui ont une complexion trop délicate ou trop mobile rend plus accessibles aux effets de la sympathie & de l'imitation.

42^e. *Espèce.* Le RAPTUS de Linosé, que nous rapportons provisoirement aux spasmes, & qui se distingue des espèces précédentes, par la nature de la cause toujours liée à un empoisonnement, & par la nature de ses symptômes, qui consistent dans certaines contractions tétaniques très-douloureuses des articulations, accompagnées ou suivies de tous les phénomènes

(1) Nous aurons plusieurs fois occasion de rappeler la sottise dans laquelle M. le professeur Pinel est tombé, en attribuant au bériberi des Indes, une étiologie qui a fait souvent confondre dans la pratique, l'empoisonnement rhumatismal avec la paralysie.

d'une perversion remarquable dans les fonctions du cerveau.

43^e. *Espèce*. L'HYDROPHOBIE produite comme la rage, par empoisonnement, mais d'une manière contagieuse, le rapproche bien plus des spasmes que des véneries; ce qui est contraire à l'opinion de M. le professeur Pinel. On la distingue d'ailleurs des autres maladies spasmodiques par la nature même de sa cause, & par la manifestation spontanée de plusieurs contractions partielles de la poitrine, du visage, & surtout de l'œsophage, dont l'extrême sensibilité explique naturellement l'horreur de l'eau qui a donné son nom à cette maladie (l'hydrophobie).

44^e. *Espèce*. LA CONTRACTURE SPASTIQUE universelle, propre à la catalepsie, à l'extase & à la léthargie, accompagnée, dans quelques cas, d'une tumeur ou dureté spasmodique, que des observateurs peu éclairés ont confondue quelquefois, par une fautive méprise, avec la rigidité cadavérique, le phénomène le plus propre à faire distinguer, quand il est convenablement apprécié, la mort réelle, de la mort apparente, avant les premiers signes de la putréfaction.

Le deuxième sous-genre des spasmes, on les *spasmes internes*, présente cinq autres espèces de névroses à notre énumération; ce qui constitue nos 45^e, 46^e, 47^e, 48^e, & 49^e. & 50^e. espèces de névroses, dont nous allons rapidement tracer les principaux caractères.

45^e. *Espèce*. Les SPASMES des organes de la voix, tantôt essentiels, & se prolongeant quelquefois pendant plusieurs mois, tantôt symptomatiques ou consécutifs, dans certains accès d'hystérisme, & dénotant dans l'un & l'autre cas la voix humaine, de manière à la faire ressembler à une sorte d'aboiement.

46^e. *Espèce*. Le SPASME de l'ŒSOPHAGE.

47^e. *Espèce*. LA STENOPE SPASMODIQUE, que l'on n'a pas distinguée peut-être avec assez de soin, de la syncope *asthénique* ou *atonique*, dont les exemples sont beaucoup plus fréquents.

48^e. *Espèce*. Le TENESME ou l'augmentation, avec convulsion, de ce même mouvement périltalique dans la dernière portion du canal intestinal, avec resserrement, constriction du sphincter; affection morbide rarement essentielle, & plus ordinairement symptomatique ou consécutive dans la dysenterie, les hémorroïdes & la gonorrhée de l'anus.

49^e. *Espèce*. Le MÉTACISME (ou rumination accidentelle), infirmité assez rare, mais à laquelle on doit rapporter la confusion opiniâtre, que l'on peut attribuer à la perversion du mouvement périltalique.

50^e. *Espèce*. Les COLIQUES NERVEUSES.

51^e. *Espèce*. L'ILEUS, qui consiste dans l'inversion anli brusque que violence du mouvement périltalique, annoncée par la constipation la plus

opiniâtre, le vomissement, l'expulsion par cette voie des matières fécales; le compliquant d'ailleurs, & d'une manière assez coustume, de mouvements convulsifs des intestins dans divers sens, d'où résulte, tantôt le volvulus ou étranglement interne, & tantôt l'invagination ou intussusception, que quelques auteurs ont considérées, sans fondement, comme des névroses particulières (1).

52^e. *Espèce*. LA COLIQUE DE FLORE, qu'il importe de distinguer avec soin, soit du *l'ileus*, soit des coliques nerveuses, & qui se trouve caractérisée par un resserrement spasmodique des muscles de l'abdomen & de la tunique musculaire des intestins, porté à un tel degré que le ventre paroît se retirer vers la colonne vertébrale, & y demeurer comme collé ou attaché.

Pour compléter l'histoire des spasmes, peut-être aurions-nous dû y faire entrer la rétraction, la contraction morbide de la peau, de tous les tissus fibreux, mais principalement le resserrement de la peau, avec frisson, dans les fièvres intermittentes; le resserrement également spasmodique du scrotum & de la tunique érythroïde, dans certaines dysenteries chroniques, ou chez quelques hypochondriaques; la constriction de l'intérus ou de la vessie; celle de l'œsophage, qui se renouvelle à la vue des liquides chez les hydrophobes, par un effet de l'association entre les impressions & les mouvements: phénomène curieux, auquel les pathologistes n'ont pas donné toute l'attention qu'il mérite.

Du reste, les cinquante-deux espèces de névroses que nous venons d'énumérer se trouvent groupées, distribuées dans les huit genres où nous les avons fait entrer, d'après un ensemble de similitude & d'analogie si complet, qu'à un très-petit nombre d'exceptions près, aucune de ces espèces ne pourroit être placée hors du genre que nous lui avons assigné, sans paroître jolte, & comme exilé dans une famille étrangère: disposition qui constitue la base de toute classification, qui se rapproche le plus du degré de perfection que les botanistes & les zoologistes desireroient atteindre dans l'emploi des méthodes naturelles.

Les genres dont il nous restait à énumérer les différentes espèces laisseront peut-être plus à désirer on à reprendre, quoique moins arbitraires que les divisions adoptées par les nosographes les plus modernes, & plus évidemment établies sur une conformité, soit dans la nature des phénomènes morbides, soit dans les principes du traitement.

Ces genres sont au nombre de trois; savoir: 1^o. les convulsions; 2^o. les névroses abdominales

(1) Cette remarque s'applique en partie à M. Alibert, qui, dans sa Nosographie naturelle, a présenté le *volvulus* comme un genre particulier de névrose, sous le nom d'*entérisse*, tandis qu'il n'a considéré l'*ileus*, dont le *volvulus* n'est véritablement qu'un accident, que comme une espèce du genre *colique* ou *névralgie*.

indéterminées;

indéterminées ; 3°. les perceptions morbides, en dépravées de la sensibilité (anomalies nerveuses dans les organes des sensations).

Les convulsions ont pour caractère générique une contraction & un relâchement alternatifs, mais irréguliers & involontaires de l'ensemble ou de quelques appareils musculaires.

Les convulsions dépendent d'une congestion sanguine, ou d'une irritation quelconque du système nerveux ; & c'est avec raison qu'un auteur moderne propose de ne regarder comme symptomatiques ou consécutives, que les convulsions qui se déclarent dans le cours d'une lièvre ou à la suite d'une plaie, d'une phlegmasie interne, & dont les symptômes ne fournissent pas les indications du traitement. Du reste, on doit admettre, pour les convulsions comme pour les spasmes, deux sous-genres bien tranchés ; savoir : 1°. les convulsions externes ; 2°. les convulsions internes.

Quatre espèces de convulsions externes peuvent être admises, en s'attachant, comme on doit constamment le faire dans toutes les classifications nosographiques, à la diversité du traitement & des indications ; savoir : 1°. les convulsions habituelles & périodiques, qui s'établissent avec l'âge, & sous l'influence d'un traitement & d'un régime convenables ; 2°. les convulsions accidentelles des enfants (55°. *Espèce*) ; 3°. les convulsions des femmes enceintes ou des nouvelles accouchées (56°. *Espèce*) ; 4°. les convulsions symptomatiques (57°. *Espèce*).

Nous croyons devoir rapporter aux convulsions internes, la Toux convulsive ou *Coqueluche* (59°. *Espèce*) ; le Hoquet (60°. *Espèce*) ; les Palpitations nerveuses (61°. *Espèce*) ; les Palpitations épigastriques (62°. *Espèce*).

Nous rangerons sous le titre de névroses abdominales indéterminées, quelques affections nerveuses du bas-ventre qu'il est impossible de rapporter à aucun organe, ni à aucun nerf des viscères abdominaux en particulier.

Trois espèces de névroses appartiennent à ce genre. La première nous est offerte par le VOMISSEMENT SPASMODIQUE (63°. *Espèce*), qui se manifeste dans quelques cas avec tous les caractères d'une maladie essentielle, & quo l'on ne peut attribuer exclusivement ou particulièrement, ni aux nerfs de l'estomac, ni à ce viscère lui-même, comme le prouve M. Magendie, & lors même que l'on n'adopterait qu'avec la plus sage restriction le résultat des expériences ingénieuses de cet habile physiologiste.

Les deux autres névroses de l'abdomen, dont le siège est beaucoup bien moins déterminé que celui du vomissement, & qui se manifestent par un grand nombre de phénomènes généraux, sont, l'HYPEREMORRHOÏE (65°. *Espèce*) & l'HYSTÉRIE (66°. *Espèce*), qui se rapprochent en plusieurs points,

MÉDECINE. Tome X.

& qui doivent cependant être distinguées avec soin par plusieurs caractères auxquels les pathologistes modernes de l'École de Paris, ont donné toute l'attention nécessaire, pour rendre le diagnostic de ces maladies moins obscur & moins difficile. (Voyez NÉVROSES ABDOMINALES.)

Un assez grand nombre d'aberrations, dont quelques-unes se rattacheront aisément à l'étude de l'homme moral, se groupent & se pressent en quelque sorte dans la catégorie que nous désignons sous le titre d'*anomalies* ou de *perversions* de la sensibilité ; telles sont quelques névroses des sens externes, la berloc (1), la diplopie (2), l'héméralopie (3), la nyctalopie (4), le tintouin (5), la paracoïse (6) ; telles sont aussi plusieurs altérations ou dérangements des sens internes, la boulimie (7), le pica (8), le satyriasis (9), la nymphomanie (10), ou même peut-être cette foule de goûts dépravés (11), que les lois & l'esprit de la morale religieuse condamnent également, & que le médecin doit seulement considérer dans leurs rapports avec les vices ou les dérangements de l'organisation. (Voyez DISSOLUTION, SENS, SENSIBILITÉ, &c. &c.)

La classe des névroses, dont nous bornerons l'histoire à ce petit nombre de vices généraux, peut être rapportée, en rattachant les névralgies & les vésanies, à huit genres, d'après une classification dont la table suivante rappellera & fera ressortir les motifs & l'enchaînement.

Table synoptique, ou sommaire des divers genres et des différentes espèces de névroses.

Premier Genre.

AFFECTIONS SOPOREUSES.

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1°. <i>Espèce</i> . | Somnambulisme. |
| 2°. — | Somnolence cataleptique. |
| 3°. — | Catalepsie. |
| 4°. — | Eclat. |
| 5°. — | Léthargie. |

-
- | | |
|------|-------------------------------|
| (1) | Soixante-septième espèce. |
| (2) | Soixante-huitième espèce. |
| (3) | Soixante-neuvième espèce. |
| (4) | Soixante-dixième espèce. |
| (5) | Soixante-onzième espèce. |
| (6) | Soixante-douzième espèce. |
| (7) | Soixante-treizième espèce. |
| (8) | Soixante-quatorzième espèce. |
| (9) | Soixante-quinzième espèce. |
| (10) | Soixante-seizième espèce. |
| (11) | Soixante-dix-septième espèce. |

H b b b

Deuxième Genre.

APOPLEXIES.

- 6^e. *Espèce*. Apoplexie sanguine.
 7^e. — Apoplexie nerveuse.
 8^e. — Apoplexie ténulente.

Troisième Genre.

PARALYSIES.

Paralysies des muscles fasciculaires.

- 9^e. *Espèce*. Hémiplégie.
 10^e. — Paraplégie.
 11^e. — Paralysie des orbiculaires des paupières. (Prolapsus des paupières.)
 12^e. — Paralysie de la langue. (*Glossoplexie*.)
 13^e. — Aphonie.
 14^e. — Paralysie du sphincter de l'anus.
 15^e. — Paralysie des muscles érecteurs du pénis.

Paralysies des muscles membraneux.

- 16^e. *Espèce*. Paralysie de l'œsophage.
 17^e. — Paralysie de la vessie.
 18^e. — Paralysie du rectum.

Paralysies des sens externes & internes.

- 19^e. *Espèce*. Amaurose. (Goutte seréine.)
 20^e. — Agénésie. (Perte du goût.)
 21^e. — Anosmie. (Perte de l'odorat.)
 22^e. — Cophose. (Défaut ou perte de l'ouïe.)
 23^e. — Anesthésie. (Perte du toucher.)
 24^e. — Anorexie & Asthénie. (Abolition, diminution de l'énergie gastrique.)
 25^e. — Adipsie. (Perte, diminution de la soif.)
 26^e. — Anaphrodisie. (Diminution, perte des facultés reproductives.)
 27^e. — Dyspermatisme. (Éjaculation impossible ou difficile.)

Quatrième Genre.

DÉBILITÉS NERVEUSES.

- 28^e. *Espèce*. Chorée. (Danse de St.-Guy.)
 29^e. — Corymbantisme. (Le besoin de gesticuler ou d'entendre de la musique.) (*Turentulo, Turentulisme*.)
 30^e. — Tremblement fébrile.
 31^e. — Tremblement métallique.

- 32^e. *Espèce*. Tremblement par l'abus des narcotiques ou des boissons spiritueuses.
 33^e. — Délirium tremens.
 34^e. — Strabisme.

Cinquième Genre.

AFFECTIONS SPASMODIQUES.

Spasmes des muscles fasciculaires.

- 35^e. *Espèce*. Rire sardonique.
 36^e. — Trismus.
 37^e. — Souris (La).
 38^e. — Torticollis.
 39^e. — Crampe.
 40^e. — Tétanos universel.
 41^e. — Épilepsie.
 42^e. — Raphanie.
 43^e. — Hydriphobie.
 44^e. — Contracture spasmodique.
 45^e. — Spasmes des organes de la voix.

Spasmes des muscles membraneux & des tissus contractiles en général.

- 46^e. *Espèce*. Spasme de l'œsophage.
 47^e. — Spasme permanent, ou resserrement spasmodique de l'œsophage, qui peut-être seroit mieux placé dans les névralgies internes. (*Voyez ce mot*.)
 48^e. — Ténésie.
 49^e. — Méricisme & Constipation nerveuse, ou par dérangement du mouvement péristaltique.
 50^e. — Coliques nerveuses.
 51^e. — Ileus.
 52^e. — Colique de plomb, qui pourroit, comme le resserrement spasmodique de l'œsophage, être plutôt placée dans les névralgies que dans les névrotes.
 53^e. — Spasme de l'utérus.
 54^e. — Spasme de la vessie, surtout dans les fièvres adynamiques.

Sixième Genre.

AFFECTIONS CONVULSIVES.

- 55^e. *Espèce*. Convulsions accidentelles des enfants.
 56^e. — Convulsions des femmes enceintes & des accouchées.
 57^e. — Convulsions périodiques, régulières, & irrégulières.
 58^e. — Convulsions par mobilité nerveuse.
 59^e. — Toux convulsive. (*Coqueluche*.)

- 60^e. *Espèce.* Hoquet.
 61^e. — Palpitations nerveuses.
 62^e. — Palpitations épigastriques.

Septième Genre.

NÉVROSES ABDOMINALES INDÉTERMINÉES.

- 63^e. *Espèce.* Vomissement spasmodique.
 64^e. — Cholera-morbus.
 65^e. — Hypochondrie.
 66^e. — Hystérie.

Huitième Genre.

ANOMALIES, AARRATIONS DES SENS
EXTERNES ET INTERNES.

- 67^e. *Espèce.* Berlus.
 68^e. — Diplopie.
 69^e. — Héméralopie.
 70^e. — Nyctalopie.
 71^e. — Tintouin.
 72^e. — Paracousie.
 73^e. — Boulimie.
 74^e. — Pica.
 75^e. — Satyriasis.
 76^e. — Nymphomanie.
 77^e. — Aberrations émotives & Goûts dépravés, qui en sont la suite.

SECT. III. DIAGNOSTIC.

Aucune expression n'a peut-être jamais été employée d'une manière plus vague, plus illimitée & plus indéterminée dans son acception, que le mot *névrose* & *affection nerveuse*, non seulement par le vulgaire, mais aussi par la plupart des médecins. Les mots maladies inconnues ou maladies nerveuses sont presque synonymes, suivant la manière générale de s'exprimer; & lors même qu'une affection morbide, trop grave & trop vulgaire, est bien caractérisée, il est rare que les malades, dans une certaine classe de la société, ne prétendent découvrir quelques traits qui rattachent cette affection à la grande famille des maladies nerveuses, comme s'il étoit contraire à l'importance de leur être, en à la dignité de leur nature, d'éprouver une maladie dans laquelle leurs nerfs ne joueroient pas le premier rôle (1).

(1) Un médecin plus adroit que savant, & que son extrême médiocrité n'a pas empêché d'être à la mode pendant quelque temps, faisoit un grand usage, à son profit, de cette subtilité du cœur humain, relativement aux maladies nerveuses. Il manquoit rarement de flatter habilement cette disposition morale, soit dans ses visites, soit dans ses consultations écrites, & d'après son propre récit, les malades

Cette disposition générale des esprits a contribué sans doute à faire donner, dans la pratique de la médecine, beaucoup trop d'extension à l'acception du mot *névrose* ou *maladie nerveuse*; ce qui n'auroit pas en lieu cependant si le diagnostic de ces maladies n'étoit pas très-difficile dans plusieurs cas, surtout lorsqu'on range, parmi ces affections morbides, les *névralgies* & les *névrasies*. Cette obscurité & cette difficulté sont inhérentes à la nature même du sujet. On ne parviendra à en triompher que par une pratique conformée & par les habitudes de l'esprit que cette pratique développe avec le temps. Persuadés de cette vérité, nous ajouterons ici très-peu de développemens aux vues générales qui ont été placées, d'après Cullen, au commencement de cet article.

L'irrégularité dans les fonctions du système nerveux, & les symptômes qui en dérivent, diffèrent des lésions organiques, dont souvent ils sont la suite ou l'effet nécessaire. Ils constituent l'essence des *névroses*, qui sont également caractérisées par le défaut d'inflammation ou de fièvre, par la perversion, l'altération de la contractilité musculaire, & la tendance manifeste, soit à la chronicité, soit à la périodicité. Toute maladie qui offrira l'ensemble ou quelques-uns de ces symptômes, pourra être inscrite sans hésiter parmi les *névroses*; & en même temps il sera convenable & conforme aux principes de la philosophie nosographique, de ne pas comprendre dans cette famille de maladies, une lésion particulière des nerfs & du cerveau, où toute affection morbide qui ne présentera pas les principaux caractères que nous venons d'indiquer. Ainsi, l'apoplexie, en faisant abstraction de la cause prochaine la plus fréquente (l'hémorragie ou la congestion sanguine du cerveau), est évidemment une *névrose*, en ne la considérant que dans la suspension ou l'affaiblissement momentané de l'innervation, & dans les phénomènes qui dérivent de cette altération, toujours si grave & si profonde. Il en est ainsi des paralysies générales ou partielles, de l'épilepsie, du tétanos, de l'hydrophobie, des maladies convulsives en général & de plusieurs affections nerveuses des sens. Aucun médecin, quel que soit son scepticisme en nosographie, ne craindra pas de ranger ces maladies parmi les *névroses*. La même évidence, la même clarté du diagnostic n'existe pas, il faut l'avouer, pour la plupart des *névroses* partielles des différens viscères de la poitrine ou du bas-ventre, ou pour divers symptômes de *névroses*, qu'il est si facile, si fréquent de confondre avec les effets confi-

lui monnoient d'autant plus de confiance en de gratitude, qu'il les avoit mieux convaincus de l'insuffisance de leurs nerfs, dans les souffrances pour lesquelles ils réclamant ses avis.

eutifs d'une phlegmasie latente de l'estomac, des intestins ou de tout autre viscère.

Plusieurs autres maladies locales & organiques, soit du cerveau, soit de la moelle épinière, des nerfs & même d'organes placés à un degré moins élevé dans l'économie vivante, pourront également donner lieu à plusieurs symptômes, qu'il n'est pas toujours facile de distinguer d'une véritable névrose, on qui l'on doit placer quelquefois d'ailleurs dans cette classe de maladies, lorsqu'ils ont en quelque sorte survécu aux lésions diverses qui les avoient précédés (1).

La phthisie tuberculeuse, en particulier, a donné lieu plusieurs fois, surtout chez quelques personnes très-jeunes ou d'une complexion délicate, à des névroses confusives ou sympathiques fort singulières, & assez remarquables pour détourner l'attention de la maladie principale; à certaines douleurs nerveuses, par exemple; à des accès de catalepsie; à une somnolence cataleptique, spontanée ou provoquée, & à un développement, à une augmentation de sensibilité, pendant cette somnolence, dans différentes parties; phénomènes sur la nature desquels des observateurs enthousiastes ou peu éclairés se sont mépris, au point de leur attribuer de véritables prodiges (2).

Les névralgies internes sont de toutes les maladies avec lesquelles il est le plus facile de confondre un assez grand nombre d'affections morbides, qui sont rangées parmi les névroses, & que peut-être on devoit porter dans une autre classe, comme nous l'avons fait remarquer pour la colique de plomb, l'entéralgie, la gastrodynie, plusieurs douleurs abdominales indérminées, l'asthme oesveux, l'angine de poitrine. Du reste, loin de rien dissimuler relativement à ces obscurités, à ces lacunes de la science, il faut savoir les reconnaître, les signaler même, afin d'attirer de ce côté l'observation & les méditations des hommes les plus éclairés.

Quant aux moyens & aux procédés qui ont pour objet de diriger la marche du praticien dans ces voies difficiles, sur ces limites, où plusieurs maladies différentes semblent se réunir & se cou-

fondre, ils consistent dans l'analyse, dans l'esprit de rapprochement, & surtout dans la méthode d'élimination, qui, lorsqu'elle est habilement employée, réduit souvent à la plus grande simplicité les questions les plus délicates ou les plus difficiles. Rendons ces préceptes généraux plus clairs & plus évidens par des exemples.

Un médecin est consulté pour des douleurs de l'abdomen, tantôt plus, tantôt moins étendues, & dont le siège est indéterminé. Ces douleurs sont constantes, mais sous l'influence de la cause occasionnelle la plus légère, elles ont des redoublemens qui les rendent insupportables; elles alternent souvent avec des palpitations; la constipation est opiniâtre, l'appétit se soutient, mais l'insomnie la plus légère des alimens augmente sensiblement les souffrances; la personne malade maigrit de jour en jour & se trouve entièrement privée de sommeil, quoique d'ailleurs sans fièvre; elle a éprouvé & elle éprouve encore des chagrins violents, dont l'effet a été augmenté par d'excessives fatigues & par des inquiétudes continuelles, relativement à un de ses enfans, qui se trouve malade depuis plusieurs mois. Il n'a pas existé antérieurement d'affections, soit gouteuses, soit rhumatismales; ni aucun symptôme d'indigestion ou de maladie, que l'on puisse raisonnablement attribuer à un principe d'irritation morbide.

La privation presque absolue d'alimens, le régime le plus doux, les bains, l'application des sangsues à différentes reprises, n'ont donné aucun soulagement. Les préparations opiacées, employées soit en applications externes, soit en lavemens, calment seules la malade. Les recherches les plus attentives n'ont pu faire découvrir aucune apparence de lésions organiques.

D'après cet exposé, n'est-il pas évident qu'avec un peu d'analyse & en faisant usage de la méthode d'élimination dont nous avons parlé, que ces douleurs abdominales, pour lesquelles on est consulté, ne peuvent être rapportées, ni à la goutte, ni au rhumatisme, ni à aucun principe d'irritation morbide? Ne parait-il pas également démontré, que ces mêmes douleurs ne se rattachent point à une disposition fébrile, & qu'elles ne peuvent dépendre, ni d'une maladie organique ancienne, ni d'une entée, ni d'une péritonite latente ou obscure? Enfin, si l'on considère les causes de la maladie, les antécédens, la marche, qui n'est pas essentiellement périodique, on n'hésitera pas même pour refuser de la comprendre dans les névralgies internes, & pour la rapporter enfin à la grande famille des névralgies. S'il restait quelques doutes, les bons effets de l'opium achèveraient de les dissiper & de faire ressortir complètement la nature de l'affection morbide. *Naturam ostendunt morborum curationes.*

L'obscurité, la difficulté, sont quelquefois beaucoup plus grandes & ne le dissipent même que

(1) Une paralysie partielle, ou des convulsions périodiques, qui ont été l'effet d'une céphalite congénitale, ou d'un hydrocéphale aigü qui s'est heureusement dissipé, existent souvent longtemps après la termination de ces maladies, avec tous les caractères d'une insensibilité: ce qu'il seroit facile de prouver à l'auteur de cet article sans aucun frais d'induction médicale, & en faisant usage de quelques faits tirés de son Mémorial clinique.

(2) Ce que quelques physiologistes ont peu excentriques ont appelé le *dyslépisme*, la *transposition des sens*, ou admettent comme tel, & pour le classer parmi ces phénomènes, la facilité de lier par l'estomac, ou par toute autre partie aussi peu destinée à cet usage, dans certains cas de catalepsie cataleptique provoquée ou spontanée. (Poyet Dumas, & les Recherches de Ponsard.)

par l'événement, ou en observant mieux une circonstance que l'on avoit d'abord négligée, & qui fait concevoir tout-à-coup la cause de la maladie, & à un praticien plus exercé.

Mademoiselle de **, âgée de quatorze ans, d'une petite taille, mais d'une complexion forte, & remarquable par toutes les apparences d'une auhilité prématurée, éprouvoit depuis plusieurs mois différents symptômes nerveux, qu'il étoit difficile de ne pas attribuer à l'hystérie. Le mé-téorisme nerveux, par exemple, la tension douloureuse de l'abdomen; le gonflement subit du sein, & quelquefois des membres, une toux coarvative, de nombreuses altérations de la voix, des accès de suffocation, la sensation d'une boule, qui, après une marche ascendante, paroissoit se porter, tantôt vers le cou, tantôt vers le milieu de la poitrine, & quelquefois vers la région de l'estomac, où cette impression occasionnoit un sentiment d'angustie & d'anxiété inexprimable; la constipation la plus opiniâtre, l'appétence la plus invincible, & une perversion remarquable dans la digestion, accompagnoient ces différents symptômes. Cette situation se prolongea pendant plusieurs mois, sans être modifiée dans la plus petite de ses circonstances, par un grand nombre de traitemens, qui furent essayés d'après l'avis de plusieurs médecins, & toujours dans l'idée & la profonde conviction que la maladie ne pouvoit être rapportée qu'à l'hystérie. M. le professeur Dupuytren fut enfin appelé à la suite de ces tentatives infructueuses; aucune circonstance, aucun trait de l'histoire d'une maladie aussi singulière, ne parut se dérober aux lumières & à la sagacité d'un homme aussi habile. Mais quelques dispositions le frappèrent cependant davantage, l'inutilité de plusieurs traitemens, sagement conseillés & combinés, dans la supposition d'une hystérie essentielle; le dérangement des fonctions digestives, & surtout l'opiniâtreté de la constipation, qui lui parut différer de ce qui est propre à ce symptôme, lorsqu'il dépend des affections nerveuses, & qu'il ne consiste pas moins dans la suspension ou la diminution des sécrétions du gros intestin, que dans l'altération morbide de la contractilité & la perversion du mouvement péristaltique.

Dirigé par ses vues, M. Dupuytren palpa avec beaucoup de soin la malade, & reconnut que le colon, qui paroissloit sensiblement rétréci à sa partie inférieure, étoit d'ailleurs rempli, dans presque toute son étendue, d'une grande quantité de matières fécales. Le diagnostic, le pronostic, le mode de traitement, tout découloit & sortoit à la fois de cette observation. Des frictions sur l'abdomen, une légère compression, des purgatifs d'abord assez forts, & dans la suite des purgatifs plus doux, furent employés seuls pour combattre la maladie, qui s'évanouit avec sa cause, & comme M. Dupuytren l'avoit annoncé, avec une sûreté

de diagnostic bien rare, & que l'on ne peut acquiescer sans porter une connoissance approfondie de l'organisation dans la pratique de la médecine.

SECT. IV. TRAITEMENT.

Ce qui concerne les moyens de traitement communs à toutes les névrotes, se borne à un petit nombre de vnes générales: chaque espèce offrant des indications particulières, & ne pouvant être combattue que par des méthodes spéciales de médications.

Le traitement préservatif ou hygiénique auquel cette remarque se s'applique pas aussi directement qu'au traitement curatif, auroit une grande étendue, si on y faisoit entrer tous les moyens, tous les objets, toutes les pratiques qui lui appartiennent, & qui peuvent éloigner ou détruire les divers genres de causes propres à produire les névrotes. Nous avons vu que parmi ces causes, quelques-unes se confondent dans leur origine avec le premier moment de l'existence; qu'elles se transmettoient comme un véritable héritage, ou qu'elles pouvoient dépendre tout d'une situation particulière & momentanée des parents au moment de la conception, soit d'accidens arrivés à la mère pendant sa grossesse. Un traitement préservatif ne devoit-il pas aller, jusqu'à un certain point, au-devant de ces circonstances malheureuses, embarrasser des réglemens, des lois, qui protégeroient avec la plus grande sollicitude les femmes enceintes, comme on l'a vu chez quelques peuples, ou qui éloigneroient du mariage ces êtres défectueux que quelques nations anciennes condamnoient à mourir dès leur naissance (les personnes évidemment affectées de écrotes héréditaires, telles que la folie, l'épilepsie, quelques apoplexies).

Si l'on ne craignoit de se livrer aux illusions d'une trop décevante atopie, il faudroit encore desirer de faire entrer dans le même traitement, & en agrandissant l'hygiène publique, une réorganisation de la société, sur une foule de points importants; plusieurs mesures concernant les maladies des ouvriers qui sont exposés aux émanations du plomb ou du mercure; un régime & un genre de vie mieux appropriés à une distribution égale des forces organiques; des changemens importants dans l'éducation; une police mieux entendue pour les fêtes publiques ou les spectacles, & les moyens d'attacher l'idée d'un véritable déshonneur, d'une flétrissure, à l'usage des loteries, des jeux de hasard, de l'ivrognerie, de la mendicité, du vagabondage, c'est de tous les vices que l'oisiveté entretient ou fait naître dans les cités les plus populeuses de l'Europe.

Du reste, dans les classes riches, les maladies nerveuses se pourroient être prévenues

avec plus d'efficacité, que par les moyens hygiéniques. La gymnastique, que Tronchin introduisit avec une si puissante autorité dans quelques familles, il y a bientôt plus d'un siècle, & qui sont malheureusement tombés en désuétude. Les femmes des premières classes de la société trouveroient en particulier, ainsi que les gens de lettres, un grand avantage dans cette hygiène & dans un genre de vie qui ne tendroit pas sans cesse à rompre l'équilibre de leur organisation, en développant, au détriment de leur santé & de leur force physique, la sensibilité morale, le goût, l'imagination & toutes les puissances de l'entendement.

Les principaux moyens curatifs que l'on emploie aux névroses, sont désignés sous le nom d'*antispasmodiques*, & consistent dans l'opium, dans les narcotiques en général, dans quelques excitans diffusibles, tels que le camphre, le musc, la valériane, l'aila fétida, les huiles pyrogénées, soit simples, soit unies aux substances aromatiques.

Ces divers médicaments peuvent à la vérité être employés avec beaucoup d'avantage pour un grand nombre de névroses dans tous les cas où il faut en quelque sorte changer d'une manière spécifique ou autistique, une action morbide du système nerveux en général, un modifier systématiquement l'état du cerveau en particulier. (Voyez NARCOTIQUES.)

Du reste, ces moyens, dont l'emploi ne peut être convenablement examiné d'une manière pratique que dans l'histoire de chaque espèce de névrose, ne sont pas toujours indiqués, & souvent une forte saignée ou des ventouses scarifiées deviennent le plus nécessaire & le plus puissant des *antispasmodiques*. Dans d'autres circonstances de névroses, les narcotiques en général & l'opium en particulier demeurent sans action à des doses véniennes, ainsi que nous avons en déjà l'occasion de le remarquer. Ces mêmes médicaments sont repoussés d'une autre part chez plusieurs personnes, par l'effet d'une disposition constitutionnelle, idiosyncrasique; d'autres ne produisent un effet véritablement antispasmodique, ainsi que je l'ai remarqué plusieurs fois, que lorsqu'ils sont alliés au musc, au camphre, ou combinés entr'eux de diverses manières. L'huile animale de Dippel rectifiée, & l'esprit aromatique huileux de Sylvius, qui appartiennent aux huiles pyrogénées, sont du reste beaucoup plus efficaces que l'opium ou les autres narcotiques, dans les cas de spasmes ou de convulsions des muscles fasciculaires, mais surtout dans les convulsions des enfans.

Tout ce qui opère une diversion puissante, une véritable révolution dans l'organisation, soit qu'elle arrive spontanément, soit que le médecin contribue à son développement, a souvent suffi

pour faire cesser comme par enchantement une névrose très-involontaire. Ce seroit ici l'occasion de rappeler; & si le temps nous le permettoit, toutes les cures de ce genre qui ont été opérées par les voyages, par le renversement de fortune, les changements dans le genre de vie, le pouvoir des miracles, les impressions vives ou profondes en général, & mieux encore par l'apparition soudaine d'une nouvelle maladie. (Voyez HYPOCHONDRIE, HYSTÉRIE, NÉVROSES ABDOMINALES INDÉTERMINÉES, VAPEURS, &c.)

NÉVROSES ABDOMINALES INDÉTERMINÉES. (Voyez NÉVROSES, septième genre.)
(Voyez aussi COLÉRA-MORBUS, HYPOCHONDRIE, HYSTÉRIE, VAPEURS, VOMÈREMENT.)

NÉVROSES CÉRÉBRALES, NÉVROSES DES FONCTIONS CÉRÉBRALES. M. le professeur Pinel a réuni sous ce titre, & dans le deuxième ordre de ses névroses, les maladies les moins analogues (1), & que Sauvages lui-même a classées d'une manière beaucoup plus philosophique.

NÉVROSES DE LA CIRCULATION. M. Pinel rapporte à ce titre, assez incertain, les palpitations nerveuses, les syncopes, qui n'appartiennent pas à la circulation, & qui doivent être regardées comme des affections morbides particulières du cœur.

NÉVROSES DE LA DIGESTION. Dans le vocabulaire de l'auteur de la Nomenclature philosophique, on a rangé sous ce titre plusieurs affections morbides assez différentes les unes des autres, & dont quelques-unes doivent être regardées, dans l'état présent des connaissances, comme des névralgies.

NÉVROSES GÉNÉRALES DE LA FEMME. M. Pinel range dans un sous-ordre des névroses de la génération, la nymphomanie & l'hystérie, qui sont deux maladies assez différentes; la seconde, n'ayant souvent aucun rapport avec les desirs érotiques, tandis que l'autre consiste dans une exaltation furieuse & maniaque de ces desirs, manifestés le plus souvent avec tous les caractères de l'aliénation mentale: voulant d'ailleurs réunir sous un titre les névroses des fonctions générales de la femme, il falloit y rapporter un assez grand nombre d'affections qui dépendent d'un dérangement dans l'appareil nerveux qui contribue à ces fonctions (l'inertie de l'utérus, par exemple, son resserrement spasmodique, les convulsions, la métralgie).

(1) L'apoplexie, la cataleptie, l'épilepsie, l'hypochondrie, la mélancolie, la manie, la démence, l'idiotisme, le somnambulisme, le cauchemar, l'hydrophobie. (Voyez NÉVROSES EN GÉNÉRAL.)

NÉVROSES GÉNÉRALES DE L'HOMME. M. le professeur Pinel réunit sous ce titre le priapisme & le dyspermatisme, qui sont des altérations ou des maladies de la contradictibilité, avec le satyriasis ou l'anaphrodisie, qui sont deux modes bien caractérisés de l'écéc dans les sens internes, & tout-à-fait étrangers à la disposition morbide ou non morbide des muscles, dont le mode habituel a été dérangé suivant le nerf affecté dans la névralgie.

NÉVROSES DE LA RESPIRATION. Trois affections morbides sont différentes, & qui n'ont rien de commun entr'elles, que de les rapporter à un même appareil d'organe, ont été réunies par M. Pinel sous le titre de *névroses de la respiration*, savoir : l'asthme que tout porte à regarder comme une affection morbide du parenchyme du pommoe; la coqueluche, qui est une affection convulsive; l'apoplexie, dont une espèce seulement doit être rapportée aux névroses (l'apoplexie nerveuse).

NÉVROSES DE LA VOIX. Le savant estimable, dont nous avons signalé quelques méprises, pour ce qui concernait la classification des névroses, a réuni, sous le titre de *névroses de la voix*, l'aphonie, qui appartient aux paralysies & aux débilités nerveuses, & la voix convulsive, qui doit être regardée comme une espèce de spasme (affection convulsive ou spasme).

(MORÉAU DE LA SARTHE.)

NÉVROTICQUE ou **NÉVROTICQUE** (*Matière médicale*), adjectif employé dans la langue médicale pour désigner les médicaments propres à combattre les affections nerveuses; synonyme de *nervin*, qui est plus ordinairement employé. (Voyez NERVIN.)

NÉVROTOME, f. m. (*Chirurgie*), de *nevro*, nerf, & de *tome*, je coupe. On donne le nom de *névrotome* à un instrument propre à disséquer les nerfs. Tous les instruments qui servent à cette dissection sont en général aussi des névrotomes, tels que la scie, le ciseau, la gouge, le maillet, les seringues simples & doubles, les petits ciseaux à branches longues, à lames courtes, étroites, bien évidées & pointues; mais, rigoureusement parlant, on désigne par *névrotome*, un scalpel à lame longue, étroite, bien pointue, à dos, & tranchante d'un seul côté. Cependant, lorsque cet instrument a les deux tranchants vers la pointe, dans l'étendue d'environ deux ou trois lignes, il en est encore meilleur. Ces deux scalpels, également utiles & même nécessaires pour la dissection des nerfs, portent plus particulièrement le nom de *névrotomes*. (Voyez, dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*, NÉVROTOME.)

(F. RIBES.)

NÉVROTOMIE, f. f. (*Chirurgie*). On désigne

sous ce nom la dissection, la préparation anatomique des nerfs. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*.)

NEZ, f. m. (*Anatomie*). 1^{re} partie saillante en extérieure de l'appareil olfactif dans l'homme, composée d'os, de cartilages, de muscles particuliers, de nerfs, de vaisseaux, de téguments, & d'une membrane muqueuse qui le prolonge & fait partie de la membrane pituitaire. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie*.)

Un assez grand nombre de maladies & de lésions organiques, ou de vices de conformation, peut être rapporté à l'ensemble de l'appareil nasal, ou de ses différentes parties, dans l'ordre suivant :

- 1^o. Les plaies du nez;
- 2^o. La division, la réunion de ses parties divisées;
- 3^o. Le greffement de la peau sur le nez; opération de Taliac;
- 4^o. Les névroses ou les névralgies partielles du nez;
- 5^o. La privation accidentelle de l'odorat;
- 6^o. La fluxion catarrhale de la membrane muqueuse, nasale, inflammatoire ou non inflammatoire;
- 7^o. Les altérations organiques de cette membrane (voyez NASAL);
- 8^o. Les hémorragies de ses vaisseaux (*épistaxis*).

Nous renvoyons, pour ces différentes altérations morbides de nez, aux divers articles de ce Dictionnaire qui les concernent. Nous nous bornons ici à quelques remarques sur les signes d'altérations morbides que l'on peut tirer des dispositions variées de nez. Cette partie augmente sensiblement de volume, chez les scrophuleux, & dans l'érysiplé de la face; elle maigrit, parait éfilée, suivant l'expression vulgaire, à une époque avancée des maladies chroniques qui occasionnent beaucoup de dépérissement.

On attache les plus fausses préjugés, dans les maladies aiguës, aux changements très-remarquables dans la forme du nez, surtout lorsqu'il parait tout-à-coup allongé, aigu, ayant des cartilages affaiblis & pâles; lorsque la constriction des narines se joint à l'enfoncement des joues, ce signe est encore plus funeste: la température réelle du nez, & la sensation de chaleur que l'on y éprouve, présentent de nombreuses variétés dans les maladies; le mouvement des ailes du nez à quelque échelle de remarquable, dans tous les cas où la respiration se trouve très-gênée, mais surtout aux approches d'une mort qui commence par la respiration.

Le nez, plus qu'aucune autre partie, qui se trouve à une grande distance du cœur, pâlit & devient froid pendant le frisson de la fièvre. Cette même partie est beaucoup plus exposée que les autres à être gelée dans les temps très-froids &

dans les climats les plus rigoureux. On doit toujours regarder comme un symptôme favorable, la sécrétion unique du nez qui se rétablit dans les maladies, après avoir été supprimée.

Quoique le nez se prête peu de mobilité, il prend part à l'expression de plusieurs passions, au moins chez les personnes dont les muscles du visage sont très-exercés. Dans ce cas, les mouvements des ailes du nez se trouvent combinés avec ceux de la levre inférieure. Un aëlien célèbre du siècle dernier, n'aurait pas craint d'avancer qu'il y avait jusqu'à quarante manières de rompre le nez dans l'expression mimique; assertion sans doute un peu hasardée, & dont il eût été difficile de donner la preuve. (Voyez NAL.)

(L. J. M.)

NICANDRE (Nicander). (*Biographie médicale.*) Poète, grammairien & médecin grec, étoit de Glaros (1), ville d'Ionie, dans le voisinage de Colophon. Il demeura pendant quelque temps en Asie, & se fit une assez grande réputation par ses travaux littéraires.

Nicandre a donné en effet plusieurs ouvrages, qui sont cités par Euilathe, le Scholiaste d'Aristophane & Athénée. Il ne nous reste cependant de lui que deux poésies grec & latin assez généralement estimés: il traite dans l'un, des animaux réputés venimeux; & dans l'autre, des antidotes. On reproche à cet auteur d'avoir rangé cette classe de médicaments, sans choix & sans ordre. Ces deux ouvrages paroissent avoir été néanmoins recherchés avec empressement, comme on peut s'en convaincre par le grand nombre d'éditions qui en ont paru. Ils ont pour titres :

Theriaca & Alexipharmica, grec & latin, publiés dans le *Corpus poetarum graecorum*. Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fol., & séparément par Guriis, d'abord à Venise, 1522 & 1525, in-4°; Paris, 1537, in-4°; Hall, 1792, in-8°, avec les notes de J. Gottlieb Schneider; Florence, 1764, in-8°; traduit en français par Grévin, Auvers, 1567, in-4°. (*Extrait d'Éloy.*)

(A. J. T.)

(1) Nicandre, s'il on Suïtes, étoit fils de Xénophane de Colophon, ville d'Ionie. Poésies auteurs le sont: Étienne de nation; mais d'après le témoignage même de Nicandre, il paroît certain que ce médecin-poète étoit de Glaros en Ionie.

Les biographes s'accordent encore moins sur l'époque à laquelle Nicandre vivoit. Les uns disent qu'il vécut sous le règne d'Attale I, roi de Pergame, qui fut surnommé Galancton; les autres avancent que ce médecin étoit en réputation sous le règne du dernier des Attales, surnommé Philomator, & sous celui d'Antiochus. Éloy, dans son Dictionnaire biographique, s'étant adonné de préférence cette dernière époque, en observe judicieusement qu'Attale Philomator fut un prince qui cultiva les arts, & les fit aimer davantage qu'Attale I, qui ne s'occupa que de la guerre, & du soin d'étendre ses conquêtes.

NICÉRATUS, médecin de l'antiquité, auquel Galien attribue la découverte de quelques médicaments. Caelius Aurelianus en parle au sujet d'un livre où il traitoit de la maladie appelée *Cataleptis*. (*Extrait d'Éloy.*) (A. J. T.)

NICHOLS (François), célèbre médecin anglais du dix-huitième siècle, médecin du roi d'Angleterre, & professeur d'anatomie & de physiologie à Oxford, étoit membre de la Société royale de Londres, à laquelle il donna un grand nombre d'observations que l'on trouve consignées dans les *Transactions philosophiques* de cette ville. On lui doit séparément : 1°. *Compendium anatomicum & economicum*, Londini, 1753, 1756; ouvrage dans lequel Nichols a cherché à détruire, par des explications & non par des faits, les bases physiologiques généralement admises, concernant le mouvement du cœur & la circulation du sang; 2°. un Traité ayant pour titre, *Dynamia medicæ*, dont il a donné deux éditions; 3°. une Dissertation sur ce sujet, *De motu cordis & sanguinis in homine nato & non nato*. Ce médecin mourut en 1779. (*Extrait d'Éloy.*) (A. J. T.)

NICKEL, f. m. (*Matière médicale.*) Métal découvert par Cronstedt, dans une mine d'Helsingie. (Voyez ce mot dans les *Dictionnaires de Chimie & de Minéralogie.*) Cette substance n'est pas employée en médecine. (L. J. M.)

NICOLAÏ (Christophe), né à Nuremberg en 1618, suivit les Universités de Padoue & d'Altorf avec le plus grand succès, & fut reçu docteur en cette dernière Université en 1645. Nicolaï retourna à Nuremberg la même année de sa réception, le fit agréer au Collège de médecine, & mérita bientôt, par ses talens distingués, la confiance de ses concitoyens. En 1654, la Faculté d'Altorf le choisit pour remplir la chaire devenue vacante par la mort de Louis Juergeman. Nicolaï mourut à Altorf en 1652, & il n'a laissé au public que quelques dissertations sur différents points de médecine (1). (*Extrait d'Éloy.*) (A. J. T.)

(1) Plusieurs autres médecins paroissent avoir porté le nom de Nicolaï. Il en y a eu en effet d'un médecin de Lubec, Nicolaï (Henr-Albert), qui naquit au commencement du dix-huitième siècle, étudia la médecine à Strasbourg, où il se fit recevoir docteur. On lui doit deux dissertations académiques; dont les titres sont :

Dece Observatorem in scriptum anatomicum, Argentini, 1725, in-4°.

De doctrine vasorum. Ibid., 1725, in-4°.

Marges fait aussi mention d'un médecin qui fit nomme Nicolaï (Henricus), & auquel il attribue un ouvrage intitulé :

Tractatus singularis de Panis naturâ, usu, officiniis, operationibus, divinis & variis causis. Daniciæ, 1650, in-4°.

Lipinus en cite deux autres du même nom, dont l'un a donné : *Dissertatio inauguralis de Licetis officiniis & refectis*. Altorf, 1654, in-4°; & l'autre, l'opuscule suivant : *De viceribus scapularum*.

NICOLE (Nicolas) (*Biogr. médic.*), célèbre médecin du quinzième siècle, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la philosophie & la cosmographie. Nous avons encore de lui :

Sermones Medicinales septem. Venet., 1491-1507-1535.

Commentum super Aphorismos Hippocratis. Bononiæ, 1522, in-8°.

De Febribus Epitome (1).

Nicole, qui avoit appartenu à l'Ordre des Dominicains de Florence, mourut dans cette ville en 1450, dans un âge assez avancé.

(*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NICONITIUS (François) (*Biogr. méd.*), médecin polonois, qui vécut vers le milieu du seizième siècle. On le regarde comme auteur d'un ouvrage sur une question importante de médecine légale (*les naissances tardives*), ouvrage dont on n'auroit aujourd'hui que le manuscrit, si l'un des amis de ce médecin ne l'eût fait imprimer sous ce titre, en 1541.

Dis centum et viginti quatuor rationes dubitanda, seu argumenta non unius loci, sed plurium autoritativis, non scriptis abbi comprobata, quibus videbatur filium natum ex uore, absente marito per decennium, esse legitimum (2). (*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NICOT (Jean) (*Biogr. médic.*), ambassadeur français près la cour de Portugal, auquel nous sommes redevables de la plante appelée *tobac*, & à laquelle les botanistes modernes donneront son nom. (*Nicotiana tabacum.*) (*Voy. TABAC, partie historique.*)

Nicot étoit fils d'un notaire de Nîmes, la ville natale. Il obtint, par son mérite, la confiance des rois Henri II & François II, fut maître des requêtes, & passa ensuite à l'ambassade de Portugal : fonctions honorables qu'il remplit avec distinction pendant trois ans (de 1559 à 1561). Nicot mourut à Paris en 1600.

(*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NICOTIANE. (*Mat. médic.*) *Nicotiana.* Le genre Nicotiane appartient à la famille des solanées. Les semences, dans toutes les espèces de ce genre & dans celles du genre *Hyoscyamus* & *Datura*, possèdent à différents degrés la même propriété : la propriété d'exciter un mode particulier de *narcotisme*. Cette action, très-prononcée dans l'*Atropa belladonna*, est très-foible dans les morelles, qui servent d'aliments, & qu'il faut ranger

parmi les substances émoullientes, aqueuses & mucilagineuses. (*Voyez SOLANÉES, TABAC.*) (L. J. M.)

NICTATION, f. f. *Nictatio*, de *nictare*, cligner; clignotement, par une sorte de convulsion des paupières, ou par l'effet d'une impression trop vive de la lumière. Ce phénomène peut avoir quelque importance en *lémoctique*. (*Voyez CECI & FAURICAUS.*) (L. J. M.)

NID D'HIRONDELLE. (*Matière médicale.*) L'alumine qui se trouve en assez grande quantité dans les nids d'hirondelle, doit en faire ressortir l'application sur les parties enflammées, & lorsque d'ailleurs on ne doit attacher aucune espèce d'importance à l'opinion populaire, qui leur attribue des propriétés résolutive. (L. J. M.)

NIEDERBRONN (Eaux minérales de). Ce bonr, assez considérable, du département du Bas-Rhin (basse Alsace), à six lieues de Bitch, possède une source minérale qui jaillit dans une vallée étroite, & paroît s'écouler d'un banc de gravier. Deux bassins de forme hexagone, & dont la construction remonte à des temps très-reculés, sont destinés à en recevoir les eaux, qui, en parcourant les lieux de leur passage, déposent une matière jaunâtre floconneuse, abondante, ce qui pourroit faire pressentir qu'elles contiennent du fer en assez grande quantité.

Les eaux de Niederbronn sont limpides, incolores, d'une saveur saline & peu désagréable d'abord, mais à laquelle succède bientôt un goût fade, rappelant à peu près celui du petit-lait : elles sont froides (qualité qui leur est commune avec les sources nombreuses de la ci-devant Alsace), & leur pesanteur spécifique est supérieure à celle de l'eau commune.

Ces eaux minérales contiennent du muriate de soude en très-grande quantité : analysées par MM. Gerboin & Flecht (1), un demi-kilogramme ou environ (1 livre) a fourni :

Muriate de soude.....	33,30 grains.
Sulfate de chaux.....	0,18
Carbonate de chaux dissous dans l'acide carbonique..	0,90
Carbonate de magnésie....	0,42
Carbonate de fer.....	0,15
Muriate de magnésie.....	3,60
Muriate de chaux.....	5,90

Les eaux minérales de Niederbronn, prises à l'intérieur, sont regardées par M. Girard (2)

(1) Voyez *Annales de Chimie*, tome LXXIV, page 250. Ces recherches font partie d'un travail assez étendu sur ces eaux, lequel fut entrepris en 1809, à la demande de M. Shée, alors préfet du département de Bas-Rhin.

(2) *Traité analytique des eaux minérales de Niederbronn*, ouvrage dont on trouve un extrait dans le 2^e volume du *Journal militaire*, page 131.

(1) Voyez la Collection de Venise, page 285, de *Febribus*.
(2) Cet opuscule, qui portoit pour épigraphe : *Inevitabile est non tunc lege peremptis judicare*, fut imprimé à Cracovie en 1541, format in-8°.

comme toniques, apéritives, résolutives, dépuratives, diurétiques, & légèrement purgatives. Gubrin (1), dans son ouvrage sur les eaux minérales d'Alsace, en parle d'une manière toute particulière. On les a préconisées dans les débilités de l'estomac, les mauvaises digestions, les engorgements chroniques des viscères, les constipations, l'hypochondrie, les coliques néphrétiques, & l'expérience a prouvé qu'elles étoient nuisibles dans tous les cas de pléthore. (A. J. T.)

NIDOREUX, adj. (*Pathologie.*) Ce qui fait éprouver la sensation de matières animales en putréfaction, ou d'œufs cuivés, avec développement d'hydrogène sulfuré. Les rapports ou renvois nidoreux, sont les symptômes les plus certains d'une indigestion, ou même d'une digestion laborieuse. Lorsque ce phénomène se manifeste dans certaines indigestions-oblueses ou équivques des voies digestives, on doit prescrire la diète la plus sévère, l'usage de la magnésie, l'infusion de thé noir acidulée, ou toute autre boisson légèrement stimulante & propre à rétablir le mode d'action habituel des organes de la digestion.

(L. J. M.)

NIELLE ou **NIGELLE**. (*Matière médicale.*) Plante de la famille des elleboracées, dont les botanistes reconnaissent plusieurs espèces : trois seulement appartiennent à la matière médicale & à l'économie rurale ; la *nigella cultivée*, la *nigelle des champs* (*nigella arvensis*), la *nigelle de Damas* (*nigella Damascena*).

On a, du reste, abandonné l'usage de cette plante qui étoit employée par les Anciens, & que les Orientaux font encore entrer dans la cosmétique & les assaisonnements.

NIELLE. (*Matière médicale.*) Maladie des céréales : épidémie vulgaire par laquelle on désigne l'ergot & plusieurs autres altérations qui sont occasionnées par l'impression délétère de diverses plantes parasites. (*Voyez* **ERGOT**.)

(L. J. M.)

NIJEWENTYT (Bernard de) (*Biogr. méd.*), médecin célèbre, philosophe & mathématicien distingué du dix-septième siècle, montra dès sa première jeunesse une grande aptitude pour l'étude des sciences en général. Ce savant s'attacha en particulier à la philosophie & aux mathématiques, parvint en peu de temps à acquérir une certaine célébrité dans la médecine & la magistrature, & devint conseiller & bourguemestre de la ville de Furrerende, où ses vastes connaissances & son extrême intégrité lui méritèrent l'estime & la considération de tous ses concitoyens. Nieuwentyt, qui étoit né Wesselsdyk en Nord-Hollande,

en 1654, mourut en 1718, à l'âge seulement de soixante-quatre ans. Ses principaux ouvrages sont : 1°. un *Traité* en hollandais, traduit en français par Noguez, sous ce titre : *L'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature* ; in-4°. Paris, 1725 (1).

2°. *Analysin finitiorum*, in-4°. Amsterdam, 1698.

3°. *Considerationes secundæ circa calculi differentialis principia*. Amsterdam, 1696, in-4°.

(*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NIGELLE. (*Nat. méd.*) (*Voyez* **NIELLE**.)

NIGER ou **NIGRINI** (Antoine) (*Biogr. méd.*), médecin de l'Université de Padoue, enseigna l'histoire naturelle & la langue grecque à Marpurk, quelques temps avant sa réception en doctorat, qui eut lieu en 1556. Niger étoit de Breslaw ; il mourut à Brunswick en 1555, après avoir rempli avec distinction une place de médecin ordinaire ; fonction honorable qu'il accepta à la sollicitation des principaux habitants de cette ville. On a de lui les ouvrages suivants :

Consilium de tuenda valetudine. Lipsiæ, 1554-1558, in-8°. Vitebergæ, 1573-1581, in-8°.

De decem præcipuis erroribus & abusibus, propter quos apud nonnullas gentes præclaræ Medicinæ Ars Mulierculis, Judæis ac impostoribus veluti præda relicta, infestæque infamitæ conspurcataque jacet. Hamburgi, 1590, in-8°.

(*Extr. d'Eloy.*) (A. J. T.)

NIGRINI. (*Biographie.*) (*Voyez* **NIGER**.)

NIGRISOLI (Jérôme) (*Biogr. méd.*), savant médecin italien du dix-septième siècle, qui eut un si grand succès au début même de ses études médicales, que, malgré son extrême jeunesse, Gonzaga, duc de Guastalle, le nomma son médecin ordinaire. Nigrisoli ne démentit jamais l'opinion avantageuse que ce prince avoit conçue de ses talents ; car, aussi long-temps qu'il fut attaché à la cour de Guastalle, il mérita l'estime & la considération de tous ceux qui le connaissent. Des circonstances particulières l'ayant rappelé à Ferrare, il y enseigna publiquement la philosophie, & ce nouveau genre de travail ne l'empêcha pas de se livrer à l'exercice de la médecine.

Nigrisoli étoit né à Ferrare en 1621 ; il y mourut à l'âge de soixante-huit ans, en laissant un fils qui marcha dignement sur ses traces, & au-

(1) Cet ouvrage, imprimé en 1740, & dont une traduction allemande fut publiée à Leipzig en 1747, in-4°, est une espèce de physique, dans laquelle on traite, 1°. de la fluidité du corps humain, 2°. du système, 3°. des fibres & de leurs divers effets. On pourroit même le regarder comme un livre très curieux dans son genre, si l'auteur étoit moins docteur, & se trouvoit moins souvent dans les vices qu'il pèche au Cicéron.

(1) *De sensibus medicinis Alzani*, 1719, in-4°.

quel nous sommes redevables d'un grand nombre de productions littéraires en tous genres.

Nigrifoli (Jérôme) a donné l'ouvrage suivant, qui fut imprimé à Gualtalle en 1665 :

Progymnasmatia, in quibus novum prædium Medicum, appositio scilicet Hydrudinum interna parti uteri in puerperis ac menfium superflua exponitur : de veni in malignis febribus secunda differtur, & alia Medicis non solum, sed omnibus honorum artium cultoribus utilis simul, atque jucunda expenduntur. Gualtallæ, in-4°.

NIGRIBOLI (François-Marie) (*Biogr. méd.*), fils du précédent, étoit aussi de Ferrare, où il naquit en 1648. Son goût pour la médecine le développa à l'école de son père. Nigrifoli ne se rendit pas moins célèbre que son maître dans toutes les branches de l'art de guérir. Il se fit recevoir docteur à l'Université de Ferrare, fut nommé, peu de temps après, premier médecin de la ville de Comacchio, & revint ensuite enseigner l'anatomie dans sa ville natale, après avoir rempli avec honneur les différentes fonctions qui lui avoient été confiées. Nigrifoli, dont le zèle pour les sciences égalait le savoir, passa successivement de cette chaire à celles de Théorie, de Pratique & de Philosophie. Son amour pour le travail étoit tel, qu'il trouva encore le temps d'écrire, malgré les nombreuses occupations, une foule de traités très-savants. Il mourut à Ferrare en 1727 : voici le catalogue de ses différents ouvrages.

Febres Chinæ expugnata, seu illustrum aliquot virorum Opuscula quæ verum tradunt methodum febres Chinæ curandi. Ferrariæ, 1687-1700, in 4°.

Pharmacopœia Ferrariensis Prodrômus, seu determinationes & Animadversiones circa plurimum medicamentorum compositionem (2).

1°. *Dell' Anatomia Chirurgica delle glandole* (3).

2°. *Ad anchoram Sauciatorum Joannis Cornelii Weber Observationes.* Ferrariæ, 1687.

3°. *Anonymi Tractatus variæ de morbis, ad Recentiorum mentem conformati.* Ibid., 1690, 1700, in-8°.

(1) On trouve réunis dans ce recueil, 1°. le remède anglais pour la guérison des fièvres, par Nicotax de Blagov ; 2°. la méthode de traiter les fièvres par l'usage du quinquina, suivant François de Moulins ; 3°. Hippocrate, de l'usage du Chêne China, pour la guérison des fièvres, par Raymond-Restaurand ; 4°. une Observation, par de Blegny, sur le nouveau sérologie ; 5°. les Observations de Jacques Brien, sur les périodes & les fièvres.

(2) Ouvrage, que Nigrifoli publia à l'occasion d'une visite qu'il fit des apothicaires de Ferrare en 1723, en qualité de premier du collège des médecins de cette ville.

(3) La première partie parut à Ferrare en 1681, & la seconde en 1682.

4°. *Lettera sopra l'invasione fatta da Topi nelle Campagne da Roma l'anno 1690.* Ferrare, 1693, in-4°.

5°. *De Charti ejusque usu apud Antiquos.* Venetiis, 1699 (1).

6°. *Considerazioni intorno alla generazione de viventi, e particolarmente de Moschi.* Ferrare (2).

7°. *Parere intorno alla corrente Epidemia degl' animali bovini.* Ferrare, 1714, in-8°.

8°. *De Onocrotalo Exercitatio*, 1780 (3).

9°. *Configli Medici.* Ferrare, 1726, 2 volumes in-8°.

Ouvrages manuscrits du même auteur.

1°. *Annales Anatomici, in quibus à primo Anatomicis orta ad nostrum hæc usque tempora illustres quotquot fuerunt Anatomici juxta annorum seriem referuntur, scripta, observationes, inventa, liles & controversie recensentur.*

2°. *Historia nova Anatomica, seu, Historica enarratio illorum omnium quæ in Anatome fuerunt reperta & observata, ab ætate summissimæ Anatomicæ Andree Vesalii ad nostram hæc usque tempora.*

3°. *L'Anatomia delle Piante di Neemia Grew, & di molte osservazioni, accresciuta* (3).

4°. *Sturionis Descriptio Historico-Anatomica.*

5°. *De medicis Ferrariensibus, illis scilicet qui Ferrariæ nati, Ferrariæ etiam, & in Ferrariensi Gymnasio Medicinam professi sunt, & illis tandem qui aliunde nati, Ferrariæ Medicinam professi sunt, & ad docendum atque legendum in publico Gymnasio conducti sunt.*

6°. *Parere intorno all' uso di alcuni rimedii, parte prima, nella quale si considerano gli rimedii tolti della Chirurgia.*

7°. *Institutiones Medicæ ad recentiorum mentem conformatæ, quas juvenibus Medicinæ institutis dicantur.*

(1) Dissertation généralement estimée, que plusieurs écrivains attribuent à son père.

(2) L'auteur y traite, d'une manière assez étendue, de la reproduction des bêtes vivans, qu'il cherche à expliquer par l'existence des œufs. C'est la seule partie de l'ouvrage qui ait été publiée ; car la deuxième & la troisième, dans lesquelles Nigrifoli devoit parler des monstres, n'ont pas été imprimées.

(3) On trouve dans cet opuscule des détails d'histoire naturelle fort curieux, sur le Pelican.

(4) Il y a une partie de ces consultations en italien, & une autre en latin. Une troisième manuscrite, que l'auteur se préparoit à publier, est restée manuscrite, avec un grand nombre d'autres ouvrages, que nous avons vu le fun de citer dans cette notice.

(5) C'est une traduction d'après l'édition française de l'engouement des plantes, que Grew a publiée en anglais.

Un autre médecin du même nom, *Nigrifoli* (Sigismond), qu'il ne faut pas confondre avec les précédents, a également enseigné la médecine dans l'Université de Ferrare. Il étoit né dans cette ville, & obtint une certaine célébrité dans l'exercice de la profession. Sigismond Nigrifoli a écrit plusieurs ouvrages, mais un seul a été imprimé en 1557, sous ce titre :

Aliquot Facultatis Medicinæ Decisiones.
(*Extr. d'Éloy.*) (A. J. T.)

NIHELL (Jacques) (*Biogr. méd.*), médecin irlandais, qui pratiqua la médecine à Cadix, vers le milieu du dix-huitième siècle. On lui doit un abrégé, avec des commentaires, du grand ouvrage sur le Poulx, de François Solano de Lucques; ouvrage remarquable, que ce médecin espagnol fit paraître à Madrid en 1731, avec ce titre : *Lapis lydis Apollinis*, & qui fut assez mal accueilli de la plupart de ses confrères. Nihell, qui avoit été plusieurs fois témoin de la justesse des prédictions de Solano, porta un jugement beaucoup plus favorable sur ce précieux recueil. Il s'empresse d'en rendre compte au public, joignant à cet ouvrage les propres observations, & le fit publier à Londres, en 1741, sous ce titre :

New extraordinary observations, concerning the prediction of various crises, of the pulse.
Format in-8°. (1). (*Extr. d'Éloy.*)

(A. J. T.)

NIHIL-ALBUM. (*Mat. méd.*) Oxyde blanc de zinc par le feu : *pompholix*. (Voyez ce mot dans les *Dictionnaires de Chimie & de Pharmacie*, & le mot *Zinc*.)

NINNIN (Henri) (*Biogr. méd.*), docteur-régent de la Faculté de médecine de Rome, médecin consultant du roi de France, ancien médecin consultant des armées, & ex-inspecteur des hôpitaux militaires des trois évêchés.

Ce médecin vivoit dans le dix-huitième siècle; il a donné, en 1753, une traduction des ouvrages de Celse, sur la médecine & la chirurgie, format in-12, 2 volumes. (*Extr. d'Éloy.*)

(A. J. T.)

NINSI ou NINZIN (*Mat. méd.*), *siurn ninsi*. Plante de la famille des ombellifères, que l'on a souvent confondue avec le gingeng, quoiqu'elle ne soit ni du même genre ni de la même famille.

(1) Nihell dédia cet ouvrage à Richard Mead, célèbre médecin de Londres. Il en parut ensuite, en 1746, une traduction latine par Noortwick (Guillaume), intitulée : *Nova rarique observationes circa variorum cricum predictionem, et pulsus*. Amsterdam, in-8°, en 1758 : Ravavortz, médecin des Facultés de Montpellier & de Paris, en donna une traduction française, sous format in-12, avec ce titre : *Observations nouvelles & extraordinaires sur la prédiction des crises par le pouls*.

Le ninsi est bulbifère sur les tiges, ce qui l'a fait distinguer de notre chervi (*siurn sfarum*), dont il se rapproche beaucoup. Ses racines sont oblongues, tubéreuses & fasciculées; elles ont l'odeur du panais.

Le ninsi passe à la Chine & au Japon, où il est très-commun, pour un excellent cordial & un très-bon fortifiant. Cette racine est beaucoup moins recherchée à la Chine que celle du gingeng, dont le prix est excellent, sans doute à cause de la rareté.

Quoi qu'il en soit, aucune de ces deux racines n'est employée en France, & l'on n'en conserve dans les drogueries que comme objet de curiosité. (A. J. T.)

NINZIN ou NINZININ. (*Mat. méd.*) Plante de la famille des ombellifères. (Voyez NINZI.)

NIPIUS (1) (Auggstin) (*Biograph. méd.*), médecin de l'empereur Charles V, & l'un des plus célèbres philosophes du seizième siècle, naquit à Jopoli dans la Calabre, vers l'an 1475 (a). Il fit la plus grande partie de ses études à Tropea, se distingua par la suite dans la première école d'Italie, où il fut appelé pour enseigner, & les Universités de Padoue, de Pise, de Rome, de Naples, de Salerne, s'achetèrent à se l'attacher, en lui offrant des honoraires très-considérables. Nipius accepta à Naples une chaire de philosophie, genre de science dont il avoit puisé les premiers éléments sous Nicolas Vernia. Mais à peine eut-il obtenu cette place, qu'il composa son traité de *Intellectu & Dæmoniibus* (3), ouvrage dans lequel il soutenait qu'il n'y a qu'un seul entendement, & qui lui attira bientôt la haine de tous les religieux. Le pape Léon X, grand admirateur de son talent, le créa cependant comte palatin; il combla d'honneurs ce médecin philosophe, lui permit de joindre à ses armes celles de la maison de Médicis, & lui conféra même le pouvoir de créer des maîtres-ès-arts, des bacheliers, des licenciés, des docteurs en théologie & en droit civil & canonique, de légitimer des bâtards, &c. &c.

Nipius avoit de grandes connoissances dans l'art de guérir, bien qu'il n'exerçât pas publiquement la profession. Il mourut vers l'an 1550. Il a laissé plusieurs ouvrages, écrits en latin,

(1) Ce médecin philosophe prit encore le nom de d'Eurychius ou d'Eurychus Phileus, pour suivre l'usage de quelques savans de son époque, qui souvent changeoient leur nom.

(2) MATTHIAS dit qu'il naquit en 1460.

(3) Ce traité, qui souleva tous les religieux contre Nipius, auroit peut-être coûté la vie à ce philosophe, si Pierre Borrocci, évêque de Padoue, n'eût dévoué l'ouvrage en l'engageant à publier son traité avec des corrections. Il parut en effet en 1502, in folio, avec les changemens demandés, & fut réimprimé en 1503 & en 1527.

& dont le style est généralement regardé comme diffus & incohérent. Tels sont :

Des Commentaires en latin sur *Aristote* & *Averroès*, in-fol.

De *Jussu Diluvii Prognosticatione quæ ex conventu omnium Planetarum, qui in Piscibus contingit*, anno 1524, divulgata est. Romæ, 1521, in-4°. (1).

De *Diebus criticis seu decretoriis Liber unus*. Venetiis, 1500, in-fol. Argenteoratorii, 1528, in-8°.

De *Morbo Gallico Liber*. Neapoli, 1554, in-4°.

Commentarius in Aphorismos Hippocratis.

Spire, 1581, in-8°.

De *Auguriis Libri duo*. Marpurgi, 1614, in-4°.

avec *Uranica divinatrice, quodâ Astrologia generalia, Libri duo*, par Rodolphe Gucienus.

Traité de l'immortalité de l'âme contre Pomponace, 1618, in-fol.

De *Amore, de pulchro, Veneris & Cupidinis venales*. Leyde, 1641, vol. in-16.

Opuscula moralia & politica, cum Gabrielis Naudæ de auctore Judicio. Parisiis, 1645, in-4°.

(Extr. d'Eloy.)

NIPHUS (Fabio) (*Biogr. méd.*) ; petit-fils du précédent, enseigna la médecine à Padoue. Forcé de quitter cette ville, comme étant attaché à la religion des réformés, il se réfugia à Paris, où il fit un cours de mathématiques. Ce médecin voyagea ensuite en Angleterre, puis en Hollande, & composa à Leyde un ouvrage intitulé : *Ophium, sive, de cælesti animorum progænie*, lequel ne fut imprimé qu'en 1617, long-temps après que Niphus l'eût composé. (Extr. d'Eloy.)

(A. J. T.)

NISSOLE (Guillaume) (*Biogr. méd.*) ; célèbre académicien de Montpellier, naquit le 19 avril 1647, de Jeao Nissole, chirurgien-anatomiste royal des Universités de cette ville. Il fit ses études dans le collège des Jésuites, prit le parti de l'art de guérir, se fit recevoir docteur en médecine dans sa ville natale, & alla passer ensuite quelque temps à Paris, afin de se perfectionner dans l'exercice de la profession qu'il avoit embrassée, & pour laquelle il avoit toujours manifesté les plus brillantes dispositions. Nissole, de retour à Montpellier, après trois ans d'absence, se présenta, comme candidat, en 1675, pour obtenir une chaire de médecine, devenue vacante par la mort de Solignac, doyen des professeurs. La place fut mise au concours, & Nissole, ayant fait preuve, dans cette circonstance, du plus rare talent, fut jugé digne, à l'unanimité, de la remplir honorablement ; la place cependant ne lui fut pas adjugée, Solignac ayant nommé son survivant avant de mourir.

(1) Ouvrage devenu très rare aujourd'hui.

« Nissole, croyant avoir épuisé la théorie de la médecine, dit Ganteron (1), commença à visiter des malades. Il embrassa ensuite l'étude de l'histoire naturelle toute entière, & la botanique eut tant d'attrait pour lui, qu'il en fit dans la suite sa principale occupation ; prêtant une vie philosophique aux nombreux devoirs que lui imposoit la pratique de son art.

« Notre jardin royal des plantes, ajoute le même biographe, fondé par Ilcori IV, & qui a été pendant long-temps le seul qu'il y eût en France, fournissait en grande partie à M. Nissole les moyens de satisfaire la curiosité. Il recevoit de ses nombreux correspondans, répandus dans toute l'Europe, des graines ; des plantes du pays où ils habitoient, & il leur envoyoit celles qu'il ramassoit avec soin dans les jardins & dans les campagnes. Il ne se contentoit pas de semer dans nos jardins celles qu'il recevoit de tous côtés, il en jetoit indifféremment dans tous les lieux où il faisoit ses fréquentes promenades. Cette ardeur qu'il avoit pour la botanique lui fit mettre à profit une disette de grains très-considérable qui se fit sentir dans le Languedoc après le grand hiver de 1709. On ne trouva pas de plus sûr moyen pour subsister que d'envoyer des vaisseaux dans le Levant. Le retour de ces vaisseaux chargés de blé répandit la joie dans tout le pays ; mais M. Nissole ne songea qu'à profiter des ornières, où il trouva en effet des graines qui lui découvrirent des plantes nouvelles.

« On peut dire que Nissole a immortalisé son nom par le grand nombre de plantes qu'il a découvertes, & dont il a donné des descriptions très-exactes, de même que par celles auxquelles l'illustre Tournefort a donné le nom de *Nissolia*. » L'Académie royale des sciences de Montpellier conserve dans ses Mémoires une suite de ces descriptions, parmi lesquelles on distingue, surtout, celles du *Ricinoides*, de l'*Abypum Montpellieranum*, du *Phacelus Indicus*, du *Luffa Arabum*, &c. &c.

On y remarque encore une savante dissertation sur quelques nouveaux genres de plantes, & une belle suite d'observations sur le genre & la nature de l'insecte connu sous le nom de *kermès*, que plusieurs auteurs anciens ont appelé *graine d'acardite*. Nissole s'étoit encore proposé pendant long-temps de publier le catalogue de toutes les plantes du Languedoc, dont il vouloit corriger les descriptions peu exactes qui avoient déjà paru. Cet ouvrage, qu'il auroit enrichi de ses notes particulières, & d'un grand nombre d'observations recueillies dans le cours de ses voyages, fut en effet commencé, mais il ne put

(1) *Essais des académiciens de Montpellier, recueillis par M. le duc de Desfontaines. — Essai de Guillaume Nissole, par Ganteron.*

être continué. Nissolle étoit entré comme membre associé de l'Académie des sciences de Montpellier en 1701, c'est-à-dire, à peu près vers l'époque de sa formation. Il mourut à l'âge du quatre-vingt-sept ans.

NISOLLE (Pierre) (*Biogr. méd.*), démonstrateur d'anatomie & du chirurgie en l'Université de Montpellier, frère de l'académicien dont nous venons de parler, naquit dans cette ville en 1656. Comme ses autres frères, qui tous avoient excellé dans leur profession, Pierre Nissolle fit ses humanités chez les Jésuites. Il se distingua dans toutes ses classes, & voulut marcher sur les traces de son père, dont de nom étoit devenu depuis long-temps célèbre dans la Faculté de Montpellier, par la charge d'anatomiste royal qu'il y occupoit. Pierre Nissolle se livra donc tout entier à l'étude de la chirurgie, & les progrès qu'il fit dans cette branche de la médecine furent si rapides, que dès l'âge de vingt ans il avoit acquis la confiance du public. « Les nombreux encouragemens qu'il recevoit chaque jour, dit Gaultier (1), ne flatterent pas son amour-propre, mais le langage des anatomistes & des chirurgiens modernes commençoit à se faire entendre dans les écoles. Nissolle sentit la supériorité de la nouvelle doctrine. Il eut d'abord quelque peine à s'éloigner des opinions communes. Il les avoit apprises d'un homme très-respectable pour lui, c'étoit son père & son maître; mais ce même père aimoit la vérité, & il fut bien aise de voir dans son fils cette espèce de débâilliance.

» Pour lui laisser suivre ses sentimens avec liberté, il eut ne pouvoir mieux faire que de l'envoyer à Paris, comme au rendez-vous de toutes les sciences, & de l'adresser à un habile anatomiste, qui pût le mettre dans la bonne voie. Le commerce des grands maîtres, la lecture des bons livres, & les dissections de recherches, achevèrent de perfectionner Nissolle & de le mettre en état de remplir dignement la place d'anatomiste royal, dont il obtint les provisions en survivance en 1681, & dont son père avoit été pourvu depuis 1656. »

Pierre Nissolle donna constamment des preuves d'une grande dextérité dans les démonstrations publiques des opérations de chirurgie & opérations qu'il pratiquoit sur le cadavre avec autant de sagesse & de précautions, que s'il eût opéré sur le vivant.

Nissolle, qui devint un des membres les plus distingués de l'Académie de Montpellier, a donné à cette compagnie savante une foule d'observations de chirurgie du plus haut intérêt. Pierre Nissolle étoit un excellent chirurgien, & un habile anatomiste. Il mourut le 4 avril 1726, à l'âge de soixante-dix ans. (A. J.-T.)

(1) Op. cit.

NITRATE D'ARGENT. (*Mat. méd.*) *Pierre infernale, cristaux de lune, nitre lunaire.* On trouve ce sel en faisant dissoudre l'argent à l'état métallique dans l'acide nitrique pur. Le nitrate d'argent est cristallisable, & lorsqu'il est privé de son eau de cristallisation, par la sublim, il constitue ce que l'on appelle la *ierre infernale*. (Voyez ce mot dans ce Dictionnaire & dans le Dictionnaire de Chimie.) (L. J. M.)

NITRATES, f. pl. (*Matière médicale*.) On donne ce nom aux différents sels qui résultent de la combinaison de l'acide nitrique avec différents bases salissables. On n'a commencé à le faire que l'idée positive de ces combinaisons salines que depuis les travaux des chimistes modernes, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Chimie.)

Le Nitrate de potasse excepté, la plupart des nitrates à base alcaline sont peu ou point employés à l'intérieur. (Voyez NITRE.)

Il en est de même du plus grand nombre des nitrates à base métallique, sans en excepter le nitrate d'argent. On consultera l'article SELS INFERNALS, font pour l'usage externe, font pour les essais de l'usage intérieur, dans le traitement de l'épilepsie & de quelques névroses, principalement de la danse de Saint-Guy.

Le Nitrate de fer, incristallisable & liquide, lorsqu'il est traité par le sous-carbonate de potasse, se décompose & donne le *sulfate de mars apertif* de Stahl, avec lequel on prépare la teinture martiale alcaline. Quant au nitrate de mercure, voyez MERCURE. (L. J. M.)

NITRE, subst. masc. (*Matière médicale*.) Nitrate de potasse des Modernes, dans l'état minéral ou sous la forme de cristall minéral. (Voyez NITRE dans le Dictionnaire de Chimie.)

Le nitre commença à être beaucoup employé dans le seizième & le dix-septième siècle, depuis Angelus Sala jusqu'à Frédéric Hoffmann & Rivière. Le nitre se donne depuis huit à dix grains jusqu'à un gros. Son action est remarquable par l'espèce de préférence avec laquelle elle se porte vers les reins, dont elle augmente la sécrétion. Ce médicament, quoique rangé parmi les rafraichissans, se trouve contre-indiqué dans toutes les phlegmasies & dans les sabulnflammations plus ou moins intenses.

Cette action du nitre est-elle primitive ou secondaire? Cette question me paroît difficile à décider. On fait au moins que le nitre, donné à dose suffisante, diminue sensiblement les contractions du cœur & les palpitations des artères.

On fait aussi que son application extérieure sur un phlegmon, à la place de cataplasmes émoulliens, suspend la marche de cette phlegma-

fié, & paroit indiquer dans tous les cas où cette phlegmasie ne se trouve point liée avec un mouvement critique, dans les maladies aiguës. Le nitre, donné à la dose d'une once, ou même à plus petite dose, agit comme poison, & les archives de la médecine présentent plusieurs exemples de ce genre d'empoisonnement (1).

M. Orfila s'est assuré, d'une autre part, que le nitre agit aussi comme poison sur différents animaux, à la dose de deux gros, par exemple, dans une petite quantité de véhicule ou sous forme de poudre, avec une complication dans les divers accidens, qui dépendoit de la ligature de l'œsophage qui avoit été faite dans ces expériences.

Lorsque le nitre a été donné à très-forte dose, ce qui est arrivé assez souvent & sans effets dangereux, c'étoit par suite de la dissolution dans une grande quantité de véhicule.

Les détails de la pratique peuvent seuls faire connoître beaucoup de particularités fort intéressantes, concernant l'emploi thérapeutique du nitre, soit seul, soit combiné avec le camphre. Il paroit, du reste, qu'il agit en bien plutôt la sécrétion des urines à petite dose qu'à haute dose, & que, dans ce dernier cas, c'est-à-dire, à un gros ou deux gros, sous forme d'opiat, dans une conserve, on l'a vu produire des effets très-bonneurs dans l'hémoptysie active, au point de faire cesser presque immédiatement, la chaleur des mains, par exemple, la chaleur à la région épigastrique, les palpitations, &c.

L'eau durdrique camphrée, qui consiste dans le mélange d'une dissolution de nitre, avec quantité suffisante de camphre, préalablement dissous, est un moyen très-peu en usage aujourd'hui, & que j'ai souvent employé avec beaucoup de succès à la dose de vingt à trente gouttes, dans une potion de six à dix onces. On peut donner ce médicament à dose un peu plus forte.

Les effets extraordinaires du nitre, chez quelques personnes, une douleur gravative, par exemple, une sensation pénible quelconque, en un mot, tous les signes d'une irritation disproportionnée à la cause de l'excitement, doivent même être rapportés à ce qu'on appelle une idiosyncrasie, qu'un état morbide de l'estomac, à une inflammation chronique, à une altération, soit de la sensibilité, soit de la mobilité de cet organe, sous l'influence d'une disposition névralgique, rhumatismale ou goutteuse.

(L. J. M.)

NITREUX (Acide). (*Mat. méd.*) L'acide nitreux est constamment le produit de l'art. On l'obtient dans deux états, à l'état liquide & sans eau; à l'état gazeux & toujours mêlé avec quelques gaz.

Dans le premier état, l'acide nitreux a été récemment l'objet de recherches fort savantes, par M. Berzelius, en Suède, & par M. Gay-Lussac & Dulong, en France. Cet acide est formé de 100 parties d'azote & de 253 parties environ d'oxygène en poids. Il n'est point employé par les médecins.

Le gaz acide nitreux est également sans usage; non-seulement il ne peut servir à la respiration, mais il irrite la poitrine & peut donner la mort.

NITREUX (Gaz). Nitreux ou oxyde d'azote, acide nitreux.

L'oxyde d'azote, deutroxyde d'azote (de la nouvelle nomenclature chimique) est composé de 100 parties d'oxygène, & de 87 & quelques fractions d'azote en volume. Il est incolore & ne peut servir à la combustion ni à la respiration. On peut l'employer dans l'eudiométrie. (L. J. M.)

NITRIQUE (Acide). (*Mat. méd.*) Acide dont l'azote est le radical, & que l'on extrait en dissilant le nitrate de potasse ou salpêtre, avec l'argile ou l'acide sulfurique. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Chimie.)

Cet acide, qui est très-caustique, jannit toutes les substances végétales ou animales. On l'a employé comme le chloro, mais avec moins de succès, comme moyen de désinfection, dans les lieux devenus insalubres par l'encombrement des malades, ou par la présence d'un grand nombre de substances animales en putréfaction. Dans cette intention, ou versé dans un vase de verre, de porcelaine ou de poterie cuite & en grès, environ 66 à 67 parties d'acide sulfurique; on ajoute, & successivement, une quantité égale de nitrate de potasse pulvérisé; on agite ensuite le mélange avec une baguette de verre, le promenant ou le laissant en repos dans le local que l'on veut désinfecter, & dont les allées doivent être séparées avec soin.

Si la vapeur est dégagée à chaud, elle est plus explosive, mais men plus exposée à s'accompagner de gaz nitreux. La vapeur dégagée à froid offre beaucoup moins d'inconvénients; la dose, pour une chambre de vingt à trente mètres, sur chaque dimension, est d'un gros d'acide sulfurique & d'un gros de nitrate de potasse.

Carnichael-Smyth paroit avoir attaché son nom à la découverte de la facilité de désinfection de l'acide nitrique; ce qui a été reconnu dans un arrêté du Parlement d'Angleterre, qui accorda à l'auteur, & comme une récompense pécuniaire du service qu'il a rendu, une somme de 5000 livres sterl. (1).

(1) Journal de médecine, année 1797, tome LXXI; *ibid.*, tome LXXIII. — Nouveau Journal de médecine & de pharmacologie, août 1818, pag. 120.

(2) Consultes dans la Bibliothèque britannique, les observations d'Osler, sur la fièvre des prisonniers & sur les fumigations de gaz nitrique.

L'acide nitrique a été employé quelquefois dans une grande quantité de véhicule, pour former une limonade minérale, que quelques praticiens ont dit être préférable à la limonade, également minérale, qui se prépare avec l'acide sulfurique. Dans l'état présent des connoissances médicales, on préfère constamment, à de pailleuses préparations, les émollients, les infusions végétales ou animales, soit acides, soit émollientes, qui seules peuvent être impunément en contact avec les surfaces irritées ou phlogosées.

Ces doctrines iatro-chimiques, que Fourcroy avoit essayé de mettre en crédit, firent penser, il y a quelques années, que l'acide nitrique pouvoit être utilement employé comme anti-syphilitique, & les faits & les observations ne manquèrent pas pour appuyer ces brillantes théories.

Les praticiens d'un esprit sage, ramenés aux anciens résolutions d'une expérience consommée, par des notions plus exactes sur les lois & les phénomènes propres de l'organisation, ont entièrement abandonné aujourd'hui ces vaines hypothèses, & préférent à toutes les innovations qu'elles tendoient à faire établir, l'emploi bien dirigé & bien combiné des préparations mercurielles, quelle que soit la forme sous laquelle se présente la maladie syphilitique. Du reste, lorsque l'on veut administrer l'acide nitrique, cet acide doit être à 30 ou 32 degrés. On prend mille parties d'eau, pour une dose de deux à dix mille parties d'acide; la dose peut être d'un à deux gros en vingt-quatre heures. Les effets immédiats ou non thérapeutiques de cet acide, sont une sensation quelquefois très-pénible à la région de l'estomac, la fréquence du pouls, une augmentation dans la chaleur naturelle ou dans quelques sécrétions, mais principalement la perspiration cutanée, la sécrétion de l'urine.

Diverses irritations sympathiques, un état morbide de la sensibilité dans la membrane muqueuse gastro-intestinale, une disposition inflammatoire ou une pleurésie chronique de cette membrane, contre-indiquent évidemment l'usage de l'acide nitrique. Il surviendrait alors, si on employoit ce médicament, des symptômes plus ou moins incommodes, dont certains praticiens peu éclairés ne reconnoitroient pas la véritable cause, & qu'ils expliqueroient par les mots magiques, *sensibilité spécifique, affection constitutionnelle, idiosyncrasie*, &c. &c.

Quant à la pommade oxygénée, elle se prépare avec cent parties d'axonge & six à huit parties d'acide nitrique. Elle est assez irritante & paroît agir, en changeant le mode d'action, lorsqu'elle a été employée avec quelque avantage, comme anti-porique, anti-herpétique, anti-syphilitique.

L'acide nitrique concentré, c'est-à-dire, à 30 degrés & au-delà, est employé comme caustique, pour détruire certaines callosités, des verrues, &c. &c.

On l'applique alors, soit avec un tayan de plume, soit avec un tube de verre. Il est difficile de borner l'action de ce caustique.

L'acide nitrique, envisagé comme poison, présente deux ordres de considérations, savoir : 1°. des considérations hygiéniques; 2°. des considérations médico-légales.

1°. CONSIDÉRATIONS HYGIÉNIQUES.

L'empoisonnement par l'acide nitrique peut avoir souvent lieu, cette substance étant très-employée dans les arts, & se trouvant par cela même sous la main des personnes imprudentes ou perverses. Les symptômes d'empoisonnement que produit l'acide nitrique, diffèrent peu de ceux qui dépendent des autres acides, également pris à une dose véneuse. On observe toutefois, que dans le cas d'empoisonnement par l'acide nitrique, il survient des taches jaunes sur les lèvres & sur les parties de la peau que l'acide a touchées. La gangrène calcinée, lorsque l'on peut s'en procurer, est le médicament qu'il convient d'employer dans le cas d'empoisonnement, soit par l'acide nitrique, soit par tout autre acide. On la donne à la dose d'une once, délayée dans un litre d'eau, par verre, de deux minutes en deux minutes. En attendant ce médicament, qu'il est rare d'avoir sous la main, on doit faire prendre une quantité aussi considérable qu'il est possible, d'une boisson mucilagineuse. La potasse & la soude, proposées comme antidotes, doivent être entièrement rejetées; la thériaque seroit plutôt nuisible qu'utile. Si, malgré l'emploi de ces substances, des symptômes évidens d'inflammation apparoissent, on doit traiter cette maladie par les moyens convenables, mais surtout par l'emploi presque simultané de la saignée du bras & d'un grand nombre de sangsues sur la partie de l'abdomen qui paroît correspondre au siège de l'inflammation. L'état convulsif, mais principalement les crispations, les crampes qui se manifestent, comme phénomènes consécutifs, dans le cas dont nous parlons, exigent quelquefois une médecine du symptôme, c'est-à-dire, quelques anti-spasmodiques très-efficaces. Les stimulens froids & les boissons les plus légèrement toniques commencent à peine à convenir dans la convalescence très-avancée.

2°. CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES.

Comment peut-on reconnoître qu'un empoisonnement a eu lieu par l'acide nitrique?

Tout ce qui peut manifester les caractères de cet acide, les phénomènes, les lésions qui appartiennent à ses effets, soit pendant la vie, soit après la mort, peuvent seuls répandre quelque lumière sur cette question.

À l'acide

« L'acide nitrique qui se trouve dans le commerce, dit M. le professeur Orfila, est liquide, blanc, jaunâtre ou jaune, doué d'une odeur particulière & d'une saveur caustique. Il agit avec beaucoup d'énergie sur l'infusum de tournesol le cuivre, le fer, le zinc & le charbon pulvérisé, le décompose sur-le-champ en totalité ou en partie, s'emparant d'une portion de son oxygène, & le font passer à l'état de gaz deutoxyde d'azote, qui se dégage, s'unit à l'oxygène de l'air, & se transforme en gaz *acide nitreux*, orange ou rouge (vapeurs rutilantes). Cette expérience ne réussit bien qu'avec le charbon, quoiqu'il faut que l'on chauffe un peu le mélange : l'acide nitrique concentré jaunit la peau & toutes les substances animales, même à froid.

« Si l'acide nitrique, au lieu d'être concentré, étoit assez affaibli, pour ne pas présenter les propriétés que nous venons d'énumérer, il faudroit le saturer avec de la potasse pure, & faire évaporer jusqu'à siccité. Si le produit étoit du nitrate de potasse, nul doute que l'acide, dont on cherche à connaître la nature, en fût l'acide nitrique.

« Dans le cas où l'acide nitrique auroit été uni ou vu ou au vinaigre, on en démontreroit la présence par des réactifs convenables.

« Si l'acide dont nous parlons faisoit partie des matières vomies, ou de celles que l'on trouve dans le canal digestif, après la mort des individus, on chercheroit d'abord s'il n'aït point dans la portion liquide, de ces matières; pour cela, on décanteroit celle-ci, on bien on exprimeroit la masse dans un linge blanc, & on essayeroit le liquide par l'eau de tournesol, la tournure de cuivre & la potasse caustique. En supposant que ces essais fussent infructueux pour découvrir l'acide nitrique, singulièrement affaibli par les liquides avec lesquels il seroit mêlé, on le traiteroit par la potasse, comme nous l'avons conseillé en parlant de l'acide nitrique foible.

« Enfin, l'acide nitrique peut avoir été combiné avec les matières alimentaires solides & avec les tissus du canal digestif : or, le produit résultant de cette action est, le plus souvent, insoluble dans l'eau; nous devons donc avoir recours à d'autres procédés pour mettre la présence de l'acide nitrique hors de doute. Il faut faire bouillir pendant trois quarts d'heure, dans une fiole à médecine, les matières suspectes, préalablement mêlées avec une dissolution de potasse à l'alcool, parfaitement pure, filtrer le liquide, dont la couleur sera plus ou moins rouge, & l'évaporer dans une capsule de porcelaine : cette opération a pour objet de décomposer la matière animale, & de transformer la potasse en nitrate de potasse, aux dépens de l'acide nitrique. On fait bouillir avec une suffisante quantité d'alcool concentré, la masse provenant du liquide évaporé; l'alcool dissout les divers produits résultant de l'action de la potasse sur la matière animale, & n'agit point

sur le nitrate de potasse : celui-ci reste donc au fond de la fiole, & il est aisé de le reconnaître des caractères que nous indiquerons.

L'empoisonnement par l'acide nitrique, offre des symptômes qui lui sont propres; les taches citrines ou jaunâtres sur les lèvres ou le menton, ou les mains, dont nous avons parlé; le gonflement des genoux, une sensation de froid très-marquée, & qui persiste pendant long-temps.

Quant aux altérations dans les tissus, qui deviennent les suites inévitables de cet empoisonnement, & que l'on observe par les recherches anatomiques après la mort, on les reconnoît, d'après l'excellent & laborieux professeur que nous venons de citer, aux symptômes suivans : 1°. une teinte blanchâtre, & le plus souvent jaunâtre de la membrane muqueuse, qui tapisse la bouche, l'œsophage, & la couronne des dents; 2°. une consistance épaisse du mucus d'un jaune verdâtre à la surface interne de l'estomac, du duodénum & du jéjunum; néanmoins ce dernier caractère est loin d'être constant, car assez souvent la rougeur vive qui caractérise l'inflammation des membranes de l'estomac & des deux intestins grêles, a succédé à la nuance jaune que l'acide nitrique a fait naître dans les premiers momens de son action; d'ailleurs, d'autres acides que celui dont nous nous occupons, tels que l'acide sulfurique, l'acide hydrochlorique, &c., peuvent, dans certaines circonstances, teindre en jaune la membrane interne du duodénum; phénomène qui dépend de la décomposition de la bile contenue dans cet intestin, & de l'application de la matière jaune qui fait partie de cette humeur, sur la surface interne du duodénum.

L'acide nitrique introduit dans le canal digestif après la mort, produit plusieurs effets que M. Tartra a observés avec beaucoup de sagacité, mais qui sont purement chimiques, & qui n'ont rien de commun avec les traces de la phlegmasie & des irritations que ce même poison occasionne pendant la vie.

(Voyez l'excellente Dissertation de M. Tartra, thèse de l'Ecole de Médecine, in-8°. la Toxicologie de M. Orfila, tome I, & les Leçons de Médecine légale, du même auteur.)

(L. J. M.)

NITRIQUE (Acide nitrique alcoolisé). On a désigné cette préparation sous différents noms : *esprit de nitre dulcifié*, *acidum nitri-rinifum*. Pour préparer ce médicament, qui se rapproche des éthers, on mêle deux parties d'alcool & une d'acide nitrique à 36 degrés. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie.)

L'acide nitrique alcoolisé se donne depuis un scrupule jusqu'à deux gros, dans une potion de six à huit onces. Hoffmann l'a donné jusqu'à deux onces, au moment de l'accès de certaines fièvres intermittentes.

Kkkk

Ce médicament, dont un des effets les plus apparents est de diminuer les mouvements du cœur, de combattre certaines dispositions hémiplegiques & d'exciter les urines, ne peut être regardé, aussi que les autres éthers, que comme un calmant très-indirect, & dont l'emploi demande beaucoup de sagacité & d'expérience.

Quelques personnes, qui éprouvent de l'irritation, de la chaleur après le repas, de l'oppression & des palpitations, qui sont fortement incommodées par le vin ou même par l'opium à petite dose, font quelquefois très-soulagées par l'usage de l'alcool nitrique après le repas, à la dose de dix à trente gouttes, dans une demi-tasse d'eau sucrée.

On emploie avec succès le même médicament dans un grand nombre de maladies aiguës ou chroniques, pour exciter la sécrétion des urines. Enfin, l'usage de l'esprit de nitre diluifié parait sur-tout indiqué comme palliatif, pour les personnes qui luttent plus ou moins péniblement contre une dilatation anévrysmatique du cœur ou des gros vaisseaux, ou contre le développement d'une inflammation tuberculeuse du poulmon. (L. J. M.)

NITRITES, f. pl. (*Mat. méd.*) Sels formés par la combinaison de l'acide nitreux avec différentes bases. Ces sels ne sont d'aucun usage en médecine. (L. J. M.)

NITROGÈNE. (*Mat. méd.*) Quelques chimistes, & principalement M. Chaptal, ont voulu désigner l'azote sous ce nom, qui n'a pas été adopté. (L. J. M.)

NITRO-MURIATIQUE. (*Mat. méd.*) On donne ce nom à l'eau *régule*, composée d'un mélange d'acide nitrique & d'acide muriatique bien concentrés. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Chimie* de l'Encyclopédie.)

L'odeur de l'acide nitro-muriatique est pénétrante : cet acide n'est employé en pharmacie que pour déterminer, par son action sur le sulfure d'antimoine, les proportions du soufre & du métal qui se trouvent dans cette préparation. Plusieurs médecins anglais, & principalement M. Scott, ont employé d'une manière empirique, l'acide nitro-muriatique par immersion & par frictions, avec des effets immédiats & des effets thérapeutiques qui paraissent mériter l'attention de la médecine européenne, & dont nous allons parler avec quelques détails dans cet article. Les vues qui engagèrent M. Scott à tenter l'usage de l'acide nitro-muriatique, sont entièrement théoriques. Elles se présentèrent à son esprit lorsqu'il exerçoit la médecine dans l'Inde. Les résultats de sa pratique se trouvent consignés dans le Recueil des opérations chirurgicales de Charles Bell, & dans plusieurs autres écrits.

Suivant la méthode, on emploie environ deux gros d'acide nitro-muriatique dans une pinte d'eau

suffisamment tiède ; on fait usage tantôt de l'immersion des pieds seuls, tantôt de cette immersion avec ablution, au moyen d'une éponge, sur toute l'étendue des extrémités inférieures.

Cette immersion & cette ablution durent pendant une demi-heure ou même pendant une heure ; il paraît que ce traitement empirique se trouveroit indiqué le plus ordinairement chez les personnes d'une complexion scrophuleuse, & dans l'engorgement indolent du foie, qui succède quelquefois à une phlegmasie chronique de ce viscère.

Quelques essais tentés à Londres par M. Scudamore, n'ont pas répondu aux espérances données par M. Scott. J'ai vu à Paris plusieurs Anglais dont l'expérience personnelle étoit au contraire très-favorable à la réputation de ce médicament, & qui lui attribuoient, d'avoir été délivrés d'infirmités très-incommodes qui les avoient tourmentés pendant plusieurs années, & qui cédoient comme par miracle au traitement de M. Scott. J'ai essayé deux fois ce même traitement, mais sans aucun succès. Madame la comtesse de **, sur laquelle un de ces essais fut fait à deux reprises différentes, ne put jamais prolonger l'emploi de ce moyen au-delà du douzième jour. Des le troisième ou le quatrième jour, son caractère s'altéroit sensiblement, & en avançant, sa tristesse & sa mélancolie se trouvoient portées au plus haut degré ; la sécrétion des urines & la perspiration cutanée étoient d'ailleurs très-sensiblement modifiées par ce médicament. (L. J. M.)

NIVÉOLE. (*Mat. méd.*) (*Voy. PERCE-NEIGE*.)

NOBIEVILLE (Arnaut de) (*Biogr. méd.*), médecin du dix-huitième siècle, que sa grande humanité & son extrême dévouement avoient fait surnommer l'ami des pauvres. Il naquit à Orléans en 1711, & se livra avec autant de zèle que de distinction, à l'étude de la botanique, de la chimie, de l'anatomie & de la médecine. On a de lui, 1°. le *Manuel des Dames de la Charité*, 1 vol. in-12, 1750, 1758.

2°. *Hygiène naturelle des animaux*. Paris, 1756, 2 vol. in-10.

3°. *Cours de médecine pratique, d'après les principes de Ferrus*, 3 vol. in-10. Paris, 1769.

NOCERA (Joseph), né à Messine en Sicile, en 1645, étudia la médecine & la philosophie avec un si grand succès, qu'à l'âge de vingt-un ans il émit son doctorat en l'une & l'autre de ces sciences. François Benavides (alors viceroy de Sicile) le nomma, en 1679, à la charge d'assesseur du conseil de santé, & son successeur, lui donna l'emploi de médecin d'un régiment espagnol & de l'hôpital royal. Nous avons de lui un ouvrage sur la *jaunisse*, ayant pour titre :

Opus Medico-Physicum contemplativum, in quo variis medicamentum, Scilicet, circa phlebot-

niam & Pharmacia discutiuntur, syllenis de Febribus, nondum clare divulgatum, juxta Democriti & Epicuri dogmata novis rationibus & experimentis propagatur. Mélaomé, 1695, in-8°. (1) (*Extr. d'icoy.*) (A. J. T.)

NOCTAMBULE, adj. Celui ou celle qui marche la nuit & dans un état de rêve & de léthargie. (*Voyez SOMNAMBULE.*)

NODOSITÉ, f. f., *nodus*. (*Foyez NOOUS.*) (L. R. V.)

NODUS, f. m. (*Chirurgie*). Mot latin qui signifie *nœud*, & que l'on emploie en général pour désigner des tumeurs chroniques, dures, peu volumineuses, indolentes & bien ou mal circonscrites. Quelquefois cependant un nodus occasionne de la douleur, mais alors il n'en est point lui-même la cause; cette douleur dépend de la compression qu'il exerce sur un nerf voisin, &c.

La dénomination de nodus ou de nodosité s'applique à toute tumeur qui, s'élevant sur une superficie quelconque au-dessous de la peau, offre les caractères communs que je viens d'indiquer, quelle que soit la nature de cette tumeur & le lieu où elle se manifeste. C'est presque toujours une exostose, une périostose, ou plutôt arthritique, un gonflement de tendon, de ligament ou d'aponévrose. Aussi voit-on ordinairement les nodus sur les os, sur les articulations ou bien au voisinage de celles-ci. Les plus communes reconnaissent une cause syphilitique ou une cause arthritique. Quelques-uns sont produits, après les fractures, par un cal irrégulier; quelques autres sont la suite de la piqûre d'un tendon qui s'est gonflé à l'endroit de la plaie; il y en a qui ne sont autre chose que des petits ganglions, des gâines, des tendons, &c.

Cet exposé suffit pour faire voir que l'on nomme *nodus* des tumeurs d'espèces très-différentes, dont la dureté, la résistance, &c., ne sont point toujours des caractères essentiels. Ainsi, quand une exostose est volumineuse, très-étendue, ou qu'elle se perd en mourant, pour ainsi dire, sur la surface de l'os, on ne l'appelle plus *nodus*. Si un autre tumeur chronique, comparable dans les premiers temps à un *nœud*, vient aussi à acquiescer beaucoup de volume, ou bien à s'amollir, on cessera également de la désigner sous le nom de *nodus*. D'un autre côté, il n'est point rare de voir succéder à certaines inflammations aiguës une petite tumeur purifiante qui a les caractères du *nodus*: c'est ce qu'on observe quelquefois après un chancre.

On peut conclure de ce qui vient d'être dit,

(1) Cet ouvrage de Nocutus fut publié en réponse à celui de Dominique de la Scala, qui s'étoit mis à la tête d'une école de médecins qui condamnaient ouvertement la phlébotomie.

que c'est aux mots *Erysipte, Ganglions, Goutte, Périostose, Piqûre des tendons, Syphilis, Tumeurs*, &c., que l'on doit chercher tous les détails concernant les tumeurs appelées *nodus*, dont une histoire générale seroit d'autant plus déplacée, qu'elle n'utiliseroit que la répétition de ce qu'on lit ou lira à chacun des mots cités.

Les callosités de la peau & celles des bords des ulcères, quelle que soit leur forme, ne sont jamais appelées *nodus*. (L. R. VILLENNE.)

NOËDES ou **NOËZES** (Eaux minérales de), village du haut confluent à deux lieues & demi ouest-nord-ouest de Villacrenche, & sud-nord-ouest de Mont-Louis: on y trouve une source minérale froide, dont les eaux font rarement prescrites en médecine. (A. J. T.)

NOËSSLER (Georges) (*Biog. méd.*), médecin-poète, qui vivoit dans la première moitié du dix-huitième siècle. Il fit les études dans les différentes Universités d'Allemagne, & après avoir visité les principales écoles d'Italie, il vint le fixer momentanément à Padoue, où il se fit recevoir docteur en 1617. Il obtint, peu de temps après (en 1618), une chaire de philosophie & de médecine à Altorf, & l'année suivante il se fit agrégé au collège de médecine de Nuremberg, sans cesser cependant de remplir les fonctions académiques. Noëssler étoit de Berlin: il mourut en 1650, ne laissant d'autres ouvrages que des thèses & des opuscules académiques, dont le style, par sa pureté, le rapproche beaucoup de celui de Celse. (A. J. T.)

NOGUEZ (Pierre) (*Biog. méd.*), démonstrateur d'anatomie naturelle au Jardin du Roi, naquit à Sauveterre, petite ville de France dans le Béarn. Il s'étoit fait recevoir bachelier de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, & exerça la profession pendant quelques années dans l'île de Saint-Domingue en Amérique. Noguez a publié les ouvrages suivans, parmi lesquels on distingue plusieurs traductions anglaises.

1°. *Anatomie du corps humain*. Paris, 1723, in-12, & 1726, in-12, avec figures & explications.

2°. *Nouvelle manière de faire l'opération de la taille, pratiquée par Douglas*, avec ce qu'a écrit Roulet, & le *Tratté de Chetelden*. Paris, 1724, in-12.

3°. *Sanctorii Sanctorii de Statica Medicina Aphorismorum sectionibus septem diffusionum explanatio physico-medica; cui Statica Medicina, tum Gallica Cl. Dodartii, tum Britannica Cl. Keill, notis auctis, simul cum Appendice de variolarum institutione, accedit*. Parisus, 1725, 2 vol. in-12.

4°. *Relation du succès de l'innoculation de la petite-vérole dans la Grande-Bretagne*, traduite de l'anglais de Jurin. Paris, 1725, in-12.

5°. *Geographie physique, ou Essai sur l'Histoire*
Kkkk 2

Naturelle de la terre. Paris, 1755, in-4°, traduit de l'anglais de Woodward.

6°. *L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature*, traduit du hollandais de Bern. Nieuwenhuyt. Paris, 1725, in-4°.

7°. *Observations critiques sur l'article 6 du Journal des Savans*, au sujet d'un livre intitulé : *L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature.*

8°. *Traité des vertus médicales de l'eau commune.* Paris, 1725, trad. de Smith.

(A. J. T.)

NOINTOT (Eaux minérales de), paroisse à une demi-lieue de Bolbec, quatre de Candebec, dans laquelle on trouve trois sources d'eaux minérales, que l'on a regardées à tort comme thermales, & qui, selon Hardy, sont évidemment froides. Les eaux de Nointot, qui coulent dans le vallon du nord, sont connues sous le nom d'*eaux de Bolbec*. Elles inculcissent légèrement leurs réservoirs à los endroits par où elles passent, d'un limon cœrenx. Elles ont peu d'odeur; leur faveur est martialle, & leur surface se recouvre d'une pellicule grasse & irisée.

Les eaux de Nointot sont peu usitées en médecine. Lepeck de la Cloture en a parlé avec quelques détails dans son ouvrage ayant pour titre : *Collection d'Observations sur les maladies & constitutions épidémiques* (1). (A. J. T.)

NOIR DE FUMÉE. Le noir de fumée peut être employé comme vermifuge. Voyez SUIX (Fidules & Opiat de).

NOIRE (Maladie). (Voyez MELANA.)

Le *melana*, ou la maladie noire, que constitue une hématemèse chronique, forme sans doute une maladie essentielle, & mériterait seule d'être classée sous le nom de *maladie noire* dans le cadre nosographique; toutefois le vomissement ou l'aspect de matières noirâtres ou fuligineuses, a dépendu souvent de circonstances tout-à-fait étrangères à l'hématemèse; circonstances qui ne paroîtroient pas même avoir été bien connues dans le traité des maladies attribuées à Hippocrate, où l'on décrit sous le nom de *melancholia*, deux affections pathologiques très-distinctes l'une de l'autre.

L'*atrabile*, qui servoit aux Anciens pour expliquer ces deux affections & un grand nombre de phénomènes morbides, ne peut plus être admise; mais, d'une autre part, on conçoit facilement que dans plusieurs cas pathologiques très-graves, la peau s'altère, se rapproche de la couleur nègre, & que des matières noirâtres soient vomies ou expectorées par suite d'une altération profonde dans certaines sécrétions: phénomènes qui ne dépendroient pas seulement alors du sang épanché & altéré dans certaines cavités, quoique cette der-

nière circonstance paroît appartenir seule à une maladie essentielle & bien caractérisée par la constance de son siège & l'ensemble de ses symptômes. (Voyez MELANA.)

On donne aussi le nom de *matière noire* au noirâtre, à la dégénérescence morbide, qui constitue la mélancolie. M. Broussais, qui vient de porter toute son attention sur la théorie de ces altérations, paroît disposé à regarder les mélancolies, plutôt comme un produit des sécrétions morbides que comme une véritable altération de tissu; il a trouvé des mélancolies dans plusieurs espèces d'animaux, sous différentes formes, tantôt enkystées, tantôt exhalées à la surface des tissus, ou épanchées dans quelques cavités.

Les mélancolies enkystées ne peuvent pas être regardées comme de véritables kystes; elles se bornent à un dépôt de matière noirâtre, sans aucune apparence d'organisation, dans une portion du tissu adipeux. Ces mélancolies varient, d'ailleurs, par leur couleur, leur consistance, leur volume. On les a trouvées dans l'homme, mêlées avec des tumeurs d'apparence enkystée; dans les chevaux qui ont présenté plusieurs fois ce mode d'altération; on les a trouvées plus souvent sous l'omoplate, dans le bassin, aux aines, au pourtour de l'anus, à la vulve, &c. On a vu aussi les mélancolies se présenter sous la forme de fausses membranes plus ou moins molles, plus ou moins consistantes.

Suivant l'auteur dont nous nous empressons de recueillir ici les observations & les idées, la mélancolie, même dans les cas où il existe une apparence de kyste, est le produit d'une exhalation dans les urénales de la graisse, sans aucun vestige d'organisation.

La membrane muqueuse des intestins, la peau, le tissu cellulaire sous-cutané ou intermusculaire, le tissu fibreux, les muscles viscéraux, les vaisseaux sanguins, le tissu séreux, ont offert des exemples de mélancolie. Le parenchyme des viscères, celui du poulmon, du foie, du pancréas, des reins en particulier, ont présenté de semblables exemples à l'excellent observateur dont nous rappelons ici le travail d'une manière bien abrégée; nous avouerons avec lui qu'il existe la plus grande obscurité sur les rapports de ces altérations morbides & sur les phénomènes qui pourroient les annoncer, & qui sans doute les produisent pendant les maladies. Un reste, la plupart des mélancolies, dont l'analyse chimique a été faite avec le plus grand soin, paroissent n'être autre chose qu'un dépôt de la matière colorante du sang & de la fibrine; l'une & l'autre dans un état particulier qui présente trois matières grasses bien distinctes; l'une soluble dans l'alcool & cristallisable; l'autre non cristallisable, & soluble seulement dans l'alcool bouillant; la troisième liquide, à la température ordinaire de l'atmosphère.

On ne peut s'empêcher de reconnaître quelque analogie, ou du moins une sorte de ressemblance

(1) *Fide Op. cit.*, tome I, page 56.

entre la couleur des mélanosés & la matière noire de la choroidé, de l'ovaire, du placenta de quelques cancéreux, du principe colorant chez les nègres, &c. &c. Au reste, cette même matière, ou des matières noires qui paraissent s'en rapprocher, s'observent dans plusieurs maladies, dans les fièvres dites adynamiques, par exemple, dans le mélasma, dans quelques hématomèles, dans le vomissement d'une matière noire propre à la fièvre jaune, & que plusieurs observateurs très-éclairés ne regardent que comme du sang altéré (MM. Rochoux, Fritze). Il est probable, en outre, & suivant la remarque de M. Bresset, que l'ictère dans certains cas, mais principalement l'ictère des nouveau-nés, la couleur du bistré de la peau, sont occasionnés bien moins par la bile que par le sang, dont la couleur est devenue plus foncée, dans les aréoles de la graisse. (Voyez ces considérations sur une lésion organique appelée *digénérescence noire, mélanose, cancer mélané*, par M. Bresset.) (L. J. M.)

NOISETIER ou **COUDRIER**, f. m. (*Mat. méd.*) *Corylus*, Lin. *Monacra polyandria*. Genre de plantes dicotylédones squamifères, de la famille des balanifères, division de celle des aménacées de de Jussieu.

On en cultive plusieurs variétés qui diffèrent par la grosseur, la forme, la couleur des fruits.

Le noisetier & ses divers produits sont, au reste, tout-à-fait inusités dans la médecine. (Voyez **COUDRIER**, dans le *Dictionnaire de Botanique* de l'Encyclopédie.) (A. J. T.)

NOIX, *nux*, f. f. (*Mat. méd.*) On a désigné sous ce nom un grand nombre de fruits d'une consistance solide ou ligneuse. (Voyez ce mot dans le *Dictionnaire de Botanique* de l'Encyclopédie.)

NOIX COMMUNE, fruit du noyer, *Juglans regia*, de la famille des juglandées. Cet arbre, naturalisé aujourd'hui parmi nous, est originaire de la Perse. L'huile grasse de la noix est très-douce & très-désiccative; elle peut être employée, quand elle est fraîche, comme les autres huiles: l'enveloppe extérieure, que l'on appelle aussi le *brou de noix*, contient du tannin & de l'acide gallique. On l'a vanté comme antihémorrhagique: cette substance a été employée, au moins comme accessoire, dans le traitement de quelques maladies de la peau & d'affections syphilitiques. Fichet, celui des médecins qui s'en fait usage du brou de noix, faisait ordinairement dissoudre deux gros d'extrait de noix verte dans une demi-once d'eau distillée, pour l'administrer aux enfans, à la dose de vingt à trente gouttes. La noix entreit dans la fameuse composition que l'on connoît encore sous le nom de *nithardate*, & qui n'est pas moins de célébrité que la thériaque. (Consultez la Monographie de Bochner, ayant pour titre: *De Nuce juglandis*,

& les articles **NOIX** & **NOYER** dans le *Dictionnaire de Botanique*.)

NOIX D'ACAÏOU. C'est le fruit de l'acaïou à pommes; il appartient à la famille des térébinthacées; c'est le *castanum pomiferum* de Lamarck. (Voyez l'Encyclopédie botanique, *Illustrations*, tom. IV, pag. 322.) Le suc de cette noix est un peu corrosif, & a été quelquefois employé pour détruire les verrues & les cors.

NOIX D'ARZO. (*Arca catheca*, Lin.) On appelle ainsi l'amande d'une espèce de palmier: cette noix entre dans la composition du *bénel*, dont les Indiens font usage pour prévenir la dysenterie des pays chauds. (Voyez **ARZO**.)

NOIX DE BAMBA. Ce mot, qui n'a pas été conservé dans la nomenclature botanique, étoit employé du temps d'Avicenne pour signifier la *nuscade*.

NOIX DES BARBARES. (Voyez **PIGON** & **ISRE**.)

NOIX DE BEN. (*Guilandina moringa*, Lin.) Cet arbre de l'Inde, qui appartient à la famille des légumineuses, est cultivé aussi en Amérique. Son fruit, qui est légèrement purgatif, donne une huile qui se combine avec tous les arômes, & qui convient pour la fabrication des cosmétiques. Les feuilles de cette plante peuvent servir pour opérer une légère rubéfaction.

NOIX DE COCO (*Cocos nucifera*, Lin.), semé du cocotier, le plus fécond & le plus utile des palmiers. (Voyez **COCO** dans le *Dictionnaire de Botanique*.) Les Indiens tirent de cet arbre du lait, du vin, de l'alcool, une smande qui pèse plusieurs livres, & qui peut servir à la neuritane de l'homme & des animaux.

NOIX DE CYPRÈS. (*Cupressus sempervirens*, L.) Elle entre dans l'onguent de la *Contesse*, & dans l'emplâtre contre les ruptures.

NOIX DE GALLE. Végétation que l'on attribue à l'épanchement du suc des arbres par la piqûre d'un insecte. Les noix de galle les plus estimées sont recueillies sur un petit chêne de l'Asie mineure (*quercus infectoria* d'Olivier): elles servent à la fabrication de l'encre.

NOIX DE GÉROFLE, très-estimée comme assaisonnement.

NOIX MUSCADE (*Myrsica aromatica*, Lamarck), également estimée comme assaisonnement. (Voyez **MUSCADE**.)

NOIX DE TERRE. On désigne assez improprement sous ce nom, les gouffes de l'*Arachis hypogaea* de Linné, qui s'enfoncent dans la terre, & qui con-

tiennent des graines que l'on peut employer comme aliments. (L. J. M.)

Noix vomique, f. m. (*Matière médicale, Thérapeutique.*) *Strychnos nux. vomica*. Cette plante, qui fut long-temps regardée comme un poison, n'a été écumée que dans ces derniers temps parmi les médicaments les plus énergiques. Toutefois, quelques anciens auteurs de matière médicale lui avoient attribué vaguement des propriétés que l'expérience n'avait pas confirmées : on l'avoit conseillée indifféremment contre toutes espèces de fièvres, mais surtout des fièvres intermittentes, contre les suites de la morsure des serpents (1), dans la dysenterie, la migraine, l'hypochondrie ; dans presque toutes les affections nerveuses & convulsives, sans en excepter l'hydrophobie ; dans le rhumatisme, la goutte, le scorbut, les affections vermineuses, les maladies pelléennes, &c. (2) ; & par une singularité assez remarquable dans l'histoire de la médecine, la seule maladie à laquelle on peut opposer avec un véritable succès l'usage de la noix vomique, avoit été oubliée dans la nomenclature des nombreuses infirmités que l'on prétendoit combattre par l'emploi de cette substance vénéneuse.

La découverte très-récente des propriétés médicales de cette même substance, a été digue du siècle qui l'a vu naître. Très-différente dans son origine de tout ce qu'on rapporte du premier usage du mercure, de l'antimoine, du quinquina, &c., elle ne peut être attribuée à un simple effet du hasard, à un grossier empirisme ; c'est un bienfait direct de la nature, une conséquence immédiate des expériences physiologiques. Tout ce qui se rapporte à cet important objet se montre avec le caractère de l'époque actuelle des connaissances, & doit être rapporté, avec quelques détails, dans un ouvrage aussi éminemment disposé que le Dictionnaire encyclopédique à faire connaître, pour tous les genres d'art ou de doctrine, l'état le plus récent de leur culture, & même, quand il est possible, la perspective éloignée de leurs progrès.

D'après ces réflexions, nous croyons devoir exposer rapidement les différentes recherches dont la noix vomique a été l'objet depuis l'époque où, pour la première fois, elle a attiré l'attention des naturalistes, jusqu'aux travaux les plus récents des physiologistes & des médecins du dix-neuvième siècle ; persuadés que, dans une pareille question, les spéculations de la science & la pratique de l'art sont tellement unies, qu'il est impossible de les séparer.

(1) Les Arabes ont pris pendant long-temps deux ou trois grains de noix vomique par jour pour le prémuir contre les effets de la morsure des serpents.

(2) La composition appelée *Electuaire d'os* de l'empereur Maximilien I^{er}, contenait une petite quantité de noix vomique.

La noix vomique appartient à la petite famille des érythraées (*Strychnos*, de C.), dont elle possède à un haut degré toutes les propriétés.

Le principe amer dont elle jouit, aussi que la plupart des plantes de la même famille, le retrouve dans toutes les parties, mais paroit beaucoup plus développé dans les semences qui sont renfermées dans une pulpe aqueuse & acide.

L'amertume de ces semences, dont le tissu est dur, consistant, comme corré, est portée au plus haut degré. Juss. Bauhin, qui lit le premier, ou l'un des premiers, quelques expériences sur les chiens, avec la noix vomique, y reconnut l'effet vénéneux, & crut pouvoir le rapporter à l'action des narcotiques. Un autre naturaliste (Göermer) observa que cet effet, & les phénomènes de l'empoisonnement qui s'y rattachoient, avoient une grande analogie avec le tétanos. On croyoit d'ailleurs que ce poison, si redoutable pour les animaux, n'agissoit pas sur l'homme. Les résultats des expériences de Luss, rapportés par Murray, donnèrent sur la noix vomique des notions beaucoup plus exactes que tout ce qui avoit précédé (1).

L'analyse de la noix vomique, par M. Bracconot, y fit découvrir une matière animale très-amère, qui sembloit rendre compte des propriétés de la plante. M. Desportes, qui s'occupa aussi de la noix vomique, fit également mention de ce principe amer ; on favoit d'ailleurs que l'arsch, distillé avec les fruits de *Strychnos*, devenoit un poison. A peu près dans le même temps, quelques expériences de M. Dunai, savant botaniste de Montpellier, détruisirent l'opinion que la noix vomique n'étoit pas un poison pour les ruminans.

Tel étoit à peu près l'état des connaissances, lorsque M. Ralleneau-Deville & Magendie commencent leurs importantes recherches sur l'usage du poison des sauvages.

Les résultats aussi curieux que nouveaux de ces expériences, apprirent aux physiologistes, qu'il existoit dans la nature, un nouveau stimulant très-énergique, qui agissoit, comme par une vertu élective, sur la moelle épinière, & qui faisoit périr les animaux soumis à son influence, au milieu des symptômes d'un tétanos particulier, toujours compliqué d'une asphyxie consécutive à ce tétanos.

L'opinion que les propriétés les plus remarquables d'une plante se rencontrent ordinairement dans les autres végétaux de sa famille, engagea les savans que nous venons de citer, à répéter avec d'autres érythraées, mais principalement avec la noix vomique & la fève de Saint-Ignace, les expériences qu'elle avoit faites avec le suc desséché de l'upas préparé par les sauvages.

(1) Voyez *Appareil. méd.*, tome I, pag. 705.

Tous les faits qu'ils observèrent répondirent à leur attente, & n'offrirent, eo les comparant avec les effets du redoutable poison de Java, que quelques légères différences, qui dépendoient de la quantité de la noix vomique, de la préparation, du mode de son application, de l'âge, du volume, de la force, de la nature des animaux soumis aux diverses expériences. Dans tous ces essais, on a vu constamment la substance résineuse porter spécialement son action sur la moelle épinière, & les animaux périrent à la suite d'attaques plus ou moins nombreuses & plus ou moins rapprochées, suivant la quantité du poison qui avoit été employée & la longueur du trajet qu'il avoit dû faire, pour arriver jusqu'à l'organe qui devoit en éprouver le principal effet.

Les expériences des physiologistes s'arrêtèrent à ce résultat; des observations médicales non moins importantes ne tardèrent point à s'y rattacher. Un aperçu exprimé d'une manière générale par M. Delisle, dans sa dissertation, conduisit naturellement à tirer quelques avantages de ses expériences, sous le point de vue de la thérapeutique.

M. le professeur Fouquier, médecin de la Charité, remarqua le premier toute l'importance d'un semblable aperçu; il l'appliqua bientôt de la manière la plus utile à la pratique de la médecine. Une irritation de la moelle épinière, plus subtile, mais du même ordre que celle qui étoit produite dans les expériences avec les extraits d'opium ou de noix vomique, lui parut indiquée dans les cas d'hémiplegie ou de paralysie qui ne se trouvoient compliqués par aucune disposition inflammatoire du cerveau ou du prolongement rachidien.

Plusieurs essais, commencés d'après cette heureuse idée, furent couronnés par le succès, comme on le voit par la notice placée à la suite de ces considérations, & que l'auteur a bien voulu rédiger, d'après notre demande, pour en former la partie principale de cet article.

Les expériences de MM. Raffenan-Delisle (voyez la Thèse de M. Raffenan-Delisle) & Magendie, ayant prouvé que les chiens, auxquels on faisoit prendre de la noix vomique, éprouvoient un véritable tétanos, M. Fouquier jugea que cette substance pourroit avoir des effets insulaires dans certains cas de paralysie. D'après cette présomption, il administra de la noix vomique en poudre à plusieurs paralytiques. Il en fit de suite préparer un extrait aqueux & un extrait alcoolique, dont l'action devoit être plus sûre & plus prompte. Dès que M. Affligé eut connaissance de ces premiers essais, il imagina d'administrer la décoction de noix vomique en lavement. Ce médicament, sous forme de teinture, fut encore employé par la suite, soit à l'intérieur, soit en frictions. Voici le résultat des observations faites sur ces diverses préparations.

« La substance entière de la noix vomique o'a guère d'effet qu'à la dose de quarante à cinquante grains par jour, chez les adultes.

« L'extrait aqueux attire l'humidité de l'air & s'altère promptement.

« L'extrait alcoolique, moins altérable, a beaucoup plus de vertu. Il en possède d'autant plus, qu'il a été préparé par l'alcool le plus rectifié.

« L'extrême amertume de ce médicament ne permet guère de l'administrer par la bouche, sous forme liquide; pris en lavement, il peut avoir des effets très-différents, selon que l'absorption en est plus ou moins complète.

« La teinture alcoolique n'est d'usage qu'en frictions, & ne peut être, suivant ce mode d'administration, que d'un avantage très-secondaire.

« L'extrait alcoolique de noix vomique, la meilleure de toutes les préparations de cette substance, se prend en pilules de demi-grain, d'un grain & même de deux grains chacune. On répète cette dose toutes les trois, quatre & cinq heures. On commence par une ou deux pilules; on en fait prendre une de plus tous les deux jours; la dose en est ainsi graduellement augmentée, jusqu'à ce qu'il en résulte des effets remarquables. Ceux-ci consistent communément en un spasme tonique, qui s'établit par degrés dans les parties malades, demi-heure environ après l'ingestion de ce médicament. Ce spasme éprouve des exacerbations plus ou moins fréquentes & plus incommodes que douloureuses. Il se suit plus vivement sentir aux parties affectées de paralysie; il cesse de lui-même par degrés, à moins que la dose de noix vomique n'ait été excessive. Dans ce dernier cas, toutes les parties du corps sont prises d'un véritable tétanos, qui peut devenir mortel.

« Un spasme modéré, renouvelé journellement par une quantité suffisante de ce remède, rappelle peu à peu la force, le mouvement, le sentiment & la chaleur dans les parties malades. Des spasmes violents, provoqués par une trop forte dose de noix vomique, laissent à leur suite de la fatigue & proviennent ordinairement des changements avantageux; mais la guérison peut s'effectuer sans secousse & même sans spasmes bien prononcés.

« Il n'est pas nécessaire d'augmenter la dose de plus en plus pour obtenir des effets marqués. Quelquefois, une dose modérée de noix vomique, continuée pendant long-temps, suffit pour procurer le spasme désiré.

« Le médicament suspendu de temps en temps, lorsque le malade en est fatigué, doit être repris à une dose un peu moindre que celle qu'on a discontinuée.

« Ce remède, doit-il être considéré comme spécifique, il ne faut en attendre que les effets d'un excitant énergique, dirigé spécialement sur le système nerveux, appartenant à la vie de re-

lation. Ainsi donc il ne fera presque d'aucun secours contre la paralysie produite & entretenue par une compression permanente, telle que celle qui résulte d'un épanchement sanguin, leurreux ou purulent, ou d'une anévrisme, ou d'une coarcture vésiculaire. Il sera sans succès contre la paralysie qui a pour cause l'altération du tissu cérébral ou nerveux, & même contre celle qui s'accompagne de spasme. L'administration de la noix vomique sera contre-indiquée par la plethore sanguine générale, & notamment par la plethore cérébrale, par la toure, par une grande susceptibilité nerveuse.

» Enfin, on est obligé de recourir à l'usage de la noix vomique, à une petite dose elle aide le diaphragme, de manière à gêner considérablement la respiration (1). » (L. J. M.)

NOLI ME TANGERE. (*Chirurgie.*) Dénomination populaire par laquelle on a désigné certaines plaies, certains ulcères de nature cancéreuse, qui s'aggravent lorsqu'on les irrite par l'application de certains topiques. Voyez PEAU (Cancer de la).

NOLI ME TANGERE. (*Botanique.*) Dénomination employée pour plusieurs plantes qui lancent leurs grains avec force, quand on touche leurs fruits : la balsamine, le concombre, &c.

(L. J. M.)

NOMADE (*Histoire de la médecine*), adjectif, pris aussi comme substantif. On a désigné sous ce nom, le deuxième degré ou stade de la civilisation; celui qui succède à l'état sauvage, & dont la principale circonstance consiste dans la nourriture & la possession d'un grand nombre de troupeaux. Hippocrate a très-bien décrit le genre de vie propre à cet âge de la société, en parlant des Scythes, qui en offroient le modèle. (L. J. M.)

NOMBRIIL, f. m. *Umbilicus*. Cavité où se remarque une faille, reste du cordon ombilical, située au milieu du ventre des animaux. (Voyez OMBILIC.)

NOMBRIIL DE VÉNUS. (*Mat. méd.*) *Calydon umbilicus*. Le pombriil de Vénus appartient à la famille des *Craissulées*: cette plante est comprise parmi les espèces qui doivent entrer dans la composition de l'*angustepopuleum*. Dans les contrées où cette plante est très-abondante, on fait usage quelquefois de ses feuilles écorées & réduites en pulpe, pour former un cataplasme avec de l'huile, & pour calmer les douleurs des hémorroïdes.

(L. J. M.)

NOMENCLATURE. (*Philosophie médicale. Histoire de la médecine.*)

(1) Notice communiquée par M. le professeur Fouquier.

NOMENCLATURE. L'ensemble régulier, le catalogue systématique des mots particuliers qui appartiennent à une science. La langue, l'idiotisme, le vocabulaire de cette science (la nomenclature chimique, les nomenclatures anatomique, botanique, zoologique, &c.).

Chez les Anciens, c'est-à-dire, chez les Grecs & les Romains, les sciences naturelles n'étoient point assez avancées pour avoir une langue spéciale & particulière, & les philosophes ne s'étoient pas d'ailleurs occupés de ces méthodes de classification, & de dispositions systématiques qui exigent ces nomenclatures, & sans lesquelles les faits, les notions qui appartiennent à l'ensemble ou à quelques points de la physique particulière, ne pourroient fournir un corps de science ou de doctrine.

Avant cette inspiration mémorable de l'esprit humain, que l'on regarde avec raison comme une des plus grandes époques de son histoire, les mots employés par les savans, se multiplioient indéfiniment sans aucune régularité, en offrant le plus souvent qu'un rapport très-éloigné avec les objets qu'ils désignaient, & en rappelant quelquefois, relativement à ces objets, les opinions populaires les plus absurdes, ou les théories les plus en crédit, au moment de leur emploi ou de leur création: point de vue sous lequel les termes d'une science, même ceux qui sont tombés en désuétude, ne doivent pas être négligés, & peuvent répandre quelque intérêt ou quelques lumières sur son histoire.

Ces mots, employés, soit dans les sciences, soit dans les arts, prirent dès-lors le nom de *techniques*, en se séparant de la langue vulgaire, & furent composés pour la plupart avec des éléments tirés de la langue grecque ou de la langue latine: circonstance remarquable dans l'histoire des nations modernes, & qui rappelle comment, à la fin du moyen âge, les savans auroient vainement cherché dans les idiomes contemporains, des noms ou des expressions, pour les objets d'arts ou de science.

Les noms qui appartiennent aux sciences naturelles, varient d'ailleurs beaucoup aux différentes époques ou à la même époque de leur histoire, & l'étude, qui a pour objet de retrouver l'accord ou la conformité de leur signification, & que l'on appelle la *synonymie*, n'est pas une des parties les moins importantes & les moins difficiles de l'érudition.

Gruyer, qui a montré beaucoup de savoir & de sagacité dans ce genre de recherches, rapporte à trois titres principaux les maladies considérées sous le point de vue de leur antiquité & de leur nomenclature, comparées chez les Anciens & chez les Modernes.

1°. *Genres de maladies dont on cherchoit vainement le nom dans les manuscrits littéraires de l'antiquité.*

2°. *Genres*

2°. Genres de maladies sur la nature desquelles les Anciens & les Modernes se sont accordés, tout en différant dans la nomenclature.

3°. Genres de maladies dont les noms & la description se trouvent d'accord chez les Anciens & chez les Modernes.

4°. De quelques genres de maladies que les Anciens pourroient avoir décries avec beaucoup plus de soin que les Modernes.

Les philosophes, qui se placent au premier rang parmi les promoteurs des connoissances humaines, & qui en deviennent en quelque sorte les législateurs, ne se bornent pas toujours à réformer les nomenclatures & à former des synonymes. Etablissant de nouveaux points de vue dans la science, ou voulant attacher des idées plus justes & moins populaires, aux dénominations qui lui sont consacrées, ils se trouvent le plus souvent obligés de créer, dans les vues d'un esprit scientifique, plusieurs mots dont le nombre est ensuite augmenté d'une manière régulière, d'après les mêmes données, à mesure que les besoins de la science le réclament, & que des faits entièrement nouveaux se présentent spontanément à l'observation des sçavans, ou résultent de leurs expériences, ou devinant eussent le prix de leurs découvertes.

Linné, qui occupe un rang si élevé parmi les promoteurs des sciences naturelles, fut frappé, & presque au moment où il commençoit à se livrer à l'étude des sciences, de la nécessité d'en revoir & d'en refaire la nomenclature, soit pour les différentes parties de l'histoire naturelle en général, soit pour la botanique en particulier.

Rer, Rivis & Tournefort avoient déjà essayé de faire quelques changements à l'ancienne nomenclature de la botanique; mais le grand homme dont ils avoient été les précurseurs, sentit vivement, & avec tout l'entraînement de son génie, que la réforme devoit être entière, générale, soit sous le rapport de la composition des mots, la plus souvent irrégulière & bizarre, soit relativement à la différence & à l'espèce d'hétérogénéité de leur origine. Ainsi, les combinaisons illégitimes d'un mot grec & d'un mot latin, que les grammairiens appellent des *barbarismes*, n'obtinent de lui aucune grâce. Il rejeta également les mots empruntés à d'autres sciences, ainsi que les mots qui avoient été introduits par des hommes étrangers à l'étude de la botanique, ou qui portoient le nom de ces hommes, en consacrant leur mémoire par une espèce d'inspiration. D'une autre part, Linné se vit obligé, dans la position élevée & difficile où il s'étoit placé, de créer un grand nombre de dénominations, parce que plusieurs de ses pensées étoient entièrement nouvelles, & qu'il avoit vainement cherché dans le vocabulaire de ses contemporains ou de ses prédécesseurs, les mots dont il avoit besoin, soit pour caractériser les fondemens de la science

qu'il vouloit établir, soit pour désigner les nombreux objets dont l'histoire naturelle a dû la connoissance à ce grand homme & à ses disciples.

Les Anciens n'avoient pas même reconnu combien il importoit d'établir des caractères en botanique, & même, depuis Gesner, les genres n'étoient pas déterminés avec assez d'exactitude ou d'uniformité.

Linné, en cherchant d'autres bases de classification, en les choisissant, en les prenant, pour ainsi dire, dans le corps de la science, forma pour lui & pour ses disciples, une langue qui parut entièrement nouvelle, & qui, après avoir éprouvé de grands obstacles, a été généralement adoptée, & est demeurée classique & universelle.

Ce que Linné avoit fait pour la botanique, Sauvages essaya de l'exécuter pour la nosographie. La langue moitié populaire & moitié scientifique, qui contenoit les noms successivement donnés aux différentes maladies, dans une longue suite de siècles, avec des impressions ou des idées très-différentes, sur leurs symptômes ou sur leur nature, cette langue, dont Sauvages se trouva conduit à étudier l'esprit & les origines, exigeoit encore des réformes plus étendues que les nomenclatures & les dénominations des botanistes, fournies par Linné à une critique si nouvelle & si judicieuse; en effet, observées le plus souvent par des témoins peu éclairés, & qui n'avoient envisagé que des particularités extraordinaires ou saillantes, sans être essentielles, les affections morbides diverses ont été désignées dans un grand nombre de circonstances, par des dénominations inexactes ou ridicules, & qui rappellent, relativement à leurs causes, à leur origine, des idées absurdes, ou des théories précaires & entièrement abandonnées.

Plusieurs de ces dénominations se rencontrent même dans les monuments littéraires de l'antiquité, dans les ouvrages classiques, & par exemple dans les écrits d'Hippocrate, dont le vocabulaire présente quelquefois à un historien philosophe de la médecine, des traits instructifs & des renseignements curieux, sur les traditions populaires, que les contemporains d'un grand homme avoient adoptées, sur la nature & le caractère de certaines maladies. Tels sont, pour en citer des exemples, les mots *Apoplexie* (1), *Cachexie* (2), *Cancer* (3), *Epilepsie* (4), *Mut mal* (5), *Mal*

(1) Mot à mot, maladie du regard; ce qui seroit supposer que cette maladie (la chute des paupières) auroit d'abord été observée par les Chalcéens.

(2) *Quæcia*, mot à mot, la corruption, ou la ramollissement des humeurs.

(3) *Krakusma*, *akakur*, mot à mot, un crabe, me décrivait, ainsi qu'il doit l'aspect hideux d'un individu de donner son nom à l'horrible maladie à laquelle on l'a comparé.

(4) Hippocrate n'employant pas ce mot dans le même sens que les modernes, l'applique à toutes les inflammations supérieures des viscères.

(5) *Epilepsia*, mot à mot, la convulsion.

caduc, Maladie sacrée, Maladie d'Hercule, Feu sauvage, Lichen, Maladie phénicienne, Déplacement, Translocation de l'utérus, &c. &c. Tels sont encore quelques autres noms donnés par Hippocrate à des maladies que les Modernes n'ont pas décriées, ou qu'ils ont désignées par d'autres dénominations. La *maladie desséchante*, par exemple, la *maladie funeste*, la *maladie noire*, la *maladie des Scythes*, la *maladie des grandes nates*.

Le vocabulaire général de la médecine renferme plusieurs autres noms de maladies qui ne sont guère plus exacts, & qui paroissent bien moins propres à consacrer des vérités scientifiques, que des erreurs ou des traditions populaires. La *dansie de Saint-Guy*, par exemple, la *grande vérole*, le *mal napolitain*, le *mal de Saint-Jean*, le *feu Saint-Antoine*, le *mal des ardens*, le *feu persien*, la *goutte serena*, la *colique de Poitou*, dont les Miracles & les Hongrois ne font point exempts; le *mal des vierges*, qui n'a pas toujours respecté les femmes mariées ou les courtisanes, &c. &c. Sauvages trouve de grands obstacles & de grandes difficultés dans une nomenclature aussi inexacte, aussi irrégulière, qu'il fut obligé de réformer d'une part & de compléter de l'autre, en introduisant dans le vocabulaire nosologique, un grand nombre de mots qui, tous ou presque tous, méritent d'être conservés.

Pélis PLATER l'avoit à la vérité précédé dans la distribution méthodique des maladies; mais Plater, dont nous rappellerons ailleurs l'initiative, ne donna pas à la nomenclature nosographique, toute l'importance qu'elle méritoit, & qui fut bien fautive, bien appréciée par Sauvages. Ce médecin, si justement célèbre, entraîné par sa réflexion, & dirigé par la philosophie aujourd'hui bien surannée de Wolf, se montra sous ce rapport le digne ennemi de Linné.

La dénomination & le véritable caractère des genres dans les nosographies, lui parurent plus particulièrement d'une haute importance. A l'exemple de Linné, il propose dans sa nomenclature, de rejeter tous les noms qui seroient empruntés, soit à la physiologie, soit à la botanique, à la zoologie, ou même à la langue vulgaire. Ainsi, les mots *Appétit*, *Fueur utérine*, *Passion iliaque*, *Saint-Erasmus*, *Pissement de sang*, *Déjections fréquentes*, *Fleurs blanches*, *Dansie de Saint-Guy*, *Dégoût pour la nourriture*, &c. &c. ne doivent pas, suivant Sauvages, être employés par les médecins, & seront remplacés avec avantage par les mots *ANOREXIE*, *NEPHRITIS*, *HEMORRHOÏDE*, *BOULIE*, *HÉMATURIE*, *DIARRHÉE*, *LEUCORRÉE*, *SCLOTTÈRE*, *CACOTIE*, *CATALEPSIE*. (*Voiez ces mots dans ce Dictionnaire.*)

Le même auteur remarque également, avec beaucoup de justice, que dans le plus grand nombre de cas, il importe, pour éviter toute confusion, de ne point appliquer le nom des classes

aux ordres, ceux des ordres aux genres, ceux des genres aux espèces.

Sauvages a très-bien senti en même temps, que l'on ne doit pas exprimer par plusieurs noms, un genre de maladie qui peut être indiqué par une seule dénomination, & sans rien préjuger sur sa nature. Ainsi, dans ces vers d'un esprit véritablement philosophique, il désigne sous le nom de *STYRILIS*, qui a prévalu, la maladie d'engène tantôt sous le nom de *Mal français*, *Mal napolitain*, *Mal portugais*, *Mal bavarois*, *Grande ou Grosse vérole*, *Mal vénérien*, &c. &c.; sous le nom d'*EPITRIS*, qui a également prévalu, le *Mal sacré*, le *Mal caduc*, le *Mal de Saint-Jean*; enfin, sous le nom d'*EMMALIS*, l'assèdion morbide appelée tantôt *Incube*, tantôt *Succube*, *Epibole*, *Cauchemar*, &c.

C'est également d'après l'impulsion & par l'autorité de Sauvages, que, sans vouloir assésir un air scientifique dans leur langage, des médecins prêtèrent certaines dénominations techniques qui ne forment qu'un seul mot, à des locutions populaires & usuelles, plus ou moins composées: l'*Hépatitis*, par exemple, l'*entérite*, la *gastro*, &c., à l'inflammation du foie, à l'inflammation des intestins. Il faut, continue le même auteur, rejeter du vocabulaire nosographique, tous les mots, toutes les dénominations qui ne sont pas rigoureusement d'accord avec la nature des choses, ou qui en sont préjuger intempérativement la nature: le *flux hépatique*, par exemple, pour un flux qui n'est pas toujours hépatique (l'hépatirrhée), la *faim canine*, qui est aussi la faim des loups & des hommes; les *fleurs blanches*, qui sont quelquefois vertes ou jaunes; la *frayeur nocturne*, qui se manifeste souvent le jour (panophtobie); le *mal italien*, qui est aussi le *mal français*; le *mal américain*; le *mal de roi*, qui n'épargne pas les sujets (ictere ou jaunisse).

Les noms génériques empruntés par les nosographes, à la botanique ou à la zoologie, ne doivent pas plus être épargnés; tels sont les noms de *tortue*, de *taupé*, de *loup*, de *cancer*, d'*œuf*, de *raisin*, d'*ongle*, de *lichen*, de *paronychie*, &c.

Une autre série de noms, & qui peut répandre beaucoup plus d'erreurs ou d'obscurité, à paraître encore plus répugnante à Sauvages; elle comprend toutes les dénominations des causes ou des principes supposés des maladies, appliqués aux genres de ces mêmes maladies; coup de vent, par exemple, pour *pleurésie* ou pour *angine*, effort pour *pleurésie*, coup de loieil pour *phrénésie*, flatulences pour *emphyseme* ou pour *météorisme*. On trouve dans les auteurs, dit Sauvages, un grand nombre de ces locutions inexactes; on n'a pas même rougi de mettre au nombre des maladies, les vers & les graviers: que n'y place-t-on aussi les épées, les cailloux, les dents des bêtes féroces, l'air, le feu, puisque toutes ces choses dé-

font, & portent dans l'économie animale, un trouble non moins grand que celui qui peut être occasionné par les vers, par les calculs ou par toute autre cause d'irritation?

Parmi les Anciens, on parmi les Modernes qui ont précédé Sauvages, plusieurs auteurs, sans chercher à réformer les nomenclatures médicales, employèrent plusieurs dénominations nouvelles, pour indiquer ou pour caractériser certaines affections morbides qui n'avoient pas été observées ou décrites par leurs prédécesseurs. C'est ainsi que les mots *Catarrhe*, *Hydrophobie*, *Phagédène*, *Oncorogone* (1), *Celaque* (*flux*), *Elephantose*, *Afrite*, *Tympanite*, ont été introduits dans le vocabulaire médical, par Celsus Aurelianus. Suivant Pléne, on auroit comencé seulement dans le siècle où il vécut, à se servir du mot *coïque*.

Zwixora employa le premier le mot *potopartridalgie*, auquel on a prêté, comme plus court & plus expressif, *nosalgie*, mot à mot, maladie du pays; Baglivi, le mot *Afrite*; Boerhaave, les mots *gastro*, *entéritis*, & FRACASTOR, le nom de *Syphilis*.

SAUVAGES a choisi dans cette langue médicale, moitié scientifique, moitié populaire & formée à différentes époques, un grand nombre de mots pour en composer son vocabulaire, créant d'ailleurs à son gré un assez grand nombre de dénominations, suivant les nouveaux genres ou les nouvelles espèces qu'il vouloit établir. Ce vocabulaire, ainsi combiné dans les vus & les besoins de la nomenclature de l'auteur, s'est conservé, au moins en grande partie, & se retrouve aujourd'hui dans une nomenclature médicale aussi complète & aussi étendue, que l'exige la composition d'un dictionnaire. Toutefois, & dans le cours d'un siècle, ce vocabulaire a reçu de nombreuses modifications. Certaines dénominations usuelles ou vulgaires, que Sauvages avoit proscrites, ont été rétablies (la rougeole, la variole, la goutte, le rhumatisme, &c.). Le nom de pyrexie a été remplacé par celui de fièvre; la plupart des classes, telles que la première, les *vices*, la cinquième, les *effouffemens*, la sixième, les *foiblesse*, la septième, les *douleurs*, n'ont pas été conservées, ainsi que leurs dénominations, qui ont paru indiquer seulement, & d'une manière trop peu médicale, des symptômes communs à un grand nombre de maladies: symptômes qui ne se montrent jamais avec cette combinaison, cet arrangement, cette succession de phénomènes dont l'ensemble, plus ou moins régulier, est représenté par l'idée & la dénomination générale de maladies.

Plusieurs mots techniques ont en outre été substitués aux dénominations de Sauvages, par les

sucoffiers les plus distingués, tels que Vogel, Cullen, & surtout M. Puel, qui, vers la fin du dix-huitième siècle, s'attacha sans succès, à introduire plusieurs expressions composées, dans le dessein de caractériser certaines inflammations & certaines fièvres, en indiquant leur siège ou leur nature (1).

Un assez grand nombre de maladies que l'on a mieux étudiées, & que l'on a même observées dans ces derniers temps, les nouveaux genres, les nouvelles espèces, les nouvelles variétés, que plusieurs nosographes célèbres ont établis, en le montrant, sous ce rapport, les dignes émules des botanistes, ont également amené des augmentations étendues dans la nomenclature médicale. De nouveaux noms ont été empruntés d'une autre part, à l'histoire naturelle & à la chimie, pour plusieurs substances employées comme médicaments ou faisant partie des médicaments (2). En même temps le vocabulaire anatomique, & surtout la nouvelle nomenclature que M. le professeur Chaussier a proposée, & en grande partie établie, pour l'anatomie de l'homme, se sont introduits en grande partie dans la médecine proprement dite, tandis qu'un assez grand nombre de dénominations ont été reléguées ou créées pour les besoins d'une étude plus dogmatique de l'anatomie pathologique (3).

La nomenclature médicale, ainsi composée dans divers temps, suivant différents besoins & sans aucune règle fixe, pourra servir toutefois aux besoins de la science, lorsque les mots nombreux dont elle est formée seront définis dans un vocabulaire, avec exactitude, & de manière à indiquer le sens que les hommes les plus éclairés ont attaché à ces mots dans leurs discours écrits. Considérée sous ce rapport, la nomenclature des sciences médicales ne peut être isolée de ces sciences, & on doit lui appliquer à ce sujet les judicieuses réflexions de Lavoisier sur la nouvelle nomenclature chimique. L'impossibilité d'isoler la nomenclature de la science & la science de la nomenclature, cette impossibilité, dit ce philosophe, tient à ce que toute science physique est nécessairement formée de trois choses: la série des faits qui constituent les sciences, les idées qui les rappellent, les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître l'idée, l'idée doit peindre le fait: ce sont trois

(1) Les fièvres méningo-gastro, la fièvre angiotonique, &c.

(2) La morphine, la strychnine, l'émétine, la picrotoxine, &c., l'osmazome.

(3) On doit rapporter à cette étude de l'anatomie pathologique, les dénominations que M. Leennec a proposées dans son *anatomie médicale*, pour caractériser différents foyers, que la poutrière fait entendre à l'aide du stéthoscope dans les maladies des vésicules rachiques.

(1) Pollution noduræ.

empruntés d'un même cachet; & comme ce font les mots qui conservent les idées & qui les transmettent, il en résulte qu'on ne peut perfectionner le langage, sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, & que, quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auroient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses, si nous n'avions pas les expressions exactes pour les rendre (1).

Lorsque l'auteur judicieux de ce passage écrivait, une science vraiment nouvelle s'élevait sur les ruines de quelques pratiques incomplètes & de quelques spéculations frivoles, désignées jusqu'alors sous le nom de *chimie*, dont quelques théosophes n'avoient pas craint de faire remonter l'origine jusqu'aux Egyptiens. La série des faits qui serviroient de bases à la nouvelle chimie, n'étoit pas moins nouvelle que les paroles dont ses promoteurs crurent devoir faire usage pour indiquer la nature & le caractère d'un petit nombre de phénomènes auxquels on pouvoit attacher, en dernière analyse, tous les détails de la science qui pût en trouver représentés alors par une nomenclature peu compliquée & dans un petit nombre de tables synoptiques.

La médecine en général, & chaque partie des sciences médicales, en particulier, ne se trouvoient pas, sous le rapport des nomenclatures, dans une position aussi favorable que la chimie. Pluieurs de ces connaissances avoient déjà une certaine étendue & un vocabulaire, lorsque les promoteurs ou les réformateurs les plus célèbres essayèrent, à certaines époques, d'en régulariser l'étude ou d'en étendre les progrès. D'une autre part, les phénomènes dont ces sciences s'occupent ne sont ni aussi simples, ni aussi peu nombreux, ni aussi bien connus dans leur essence que les faits qui appartiennent à la chimie: ce qui rend presque impossible de les désigner & de les caractériser par un petit nombre de mots qui en indiquent les éléments principaux & la composition. Toute tentative d'imitation en ce genre, pour l'ensemble ou pour quelques parties des études zoonomiques, se borna à de vains efforts pour atteindre un idéal de perfection, & cette même tentative se produisit même dans le monde savant, avec le plus grand discrédit & sans pouvoir obtenir aucune espèce d'approbation ou de suffrage, si elle se rattachoit à une vaine hypothèse, aussi que nous pourrions le prouver par un mémorable exemple.

Les sciences dont nous parlons; les sciences qui ont pour objet la structure, les phénomènes, les altérations morbides de l'organisme, ne sont, quand on les compare à la physique proprement

dite, que des sciences purement descriptives & historiques. Tout ce que l'on peut faire dans leur nomenclature se borne à d'utiles réformes, à la substitution bien entendue d'expressions exactes & techniques, à des mots vagues & souvent populaires: tels que les mots d'après lesquels on voudroit indiquer le siège ou la nature de certains maladies sur lesquels les pathologistes sont loin de s'accorder, ou d'anciennes locations, dont le sens étymologique ne répond plus à l'acception actuelle, tels que les mots *rhume*, *fièvre bilieuse*, *fièvre inflammatoire*, *fièvre maligne*, &c.

Les mots qui seront formés de toutes pièces pour désigner des maladies nouvellement observées, & des nouveaux symptômes de maladies, & des altérations organiques récemment découvertes, ces mots ne devront également rien indiquer au-delà de la plus stricte observation; l'étude des sciences zoonomiques a été jusqu'à ce jour, & sera sans doute, pendant long-temps encore, une succession continuelle de voyages & de découvertes. C'est ce que nous connaissons est bien peu de choses, si nous le comparons avec ce qui nous reste à connaître, & nous voyons même chaque jour que les connaissances acquises sont modifiées, ou même quelquefois ébranlées par les connaissances que l'on vient d'acquies. Toute nomenclature qui voudroit dissimuler ces lacunes, & se produire avec incertitude, état qui n'est point dans la nature des choses, pour l'histoire des corps organisés, sera dévouée par la véritable philosophie, & reléguée parmi les chimères & les hypothèses les plus folles & les plus frivoles.

(L. J. MOREAU DE LA SARTHE.)

NONNIUS. (*Biographie médicale.*) (Voyez NUNNEX.)

NONOY (Eaux minérales de). On trouve dans ce village, situé à une lieue environ de Pont-a-Mousson, plusieurs sources d'eaux minérales que l'on voit sourdre dans les vignes.

(Estr. de Carrière.) (A. J. T.)

NOPAL (*Mat. médic.*), nom français sous lequel on désigne l'arbre sur lequel habite la cochenille. *Cactus cochenillifer* de Linné. (Voyez COCHENILLE.) (L. J. M.)

NORMAL. On emploie cet adjectif pour désigner l'état fondamental ou régulier de l'organisme; ce que l'on exprime encore par la situation naturelle ou habituelle des parties, l'état sain, l'intégrité des fonctions. (L. J. M.)

NOSOGÉNIE, f. f. (*Patholog. génér.*) C'est mot, beaucoup plus étendu dans la signification que celui d'*étiologie*, s'applique à cette grande division de la pathologie générale, qui

(1) Lavocher, *Traité élémentaire de chimie*, édit. de 1783, discours préliminaire, (pag. vi), vii.

a pour objet de faire connoître la formation, le développement des maladies. Reil est un des derniers auteurs qui se soit occupé spécialement de la nosogénie, mais en la considérant sous un point de vue purement théorique. De reste, les différens systèmes qui ont successivement régné, en médecine, depuis les hypothèses des anciens dogmatiques qui succédèrent à l'empirisme rationnel d'Hippocrate, jusqu'aux pathogénies des chefs d'école les plus fameux du dix-huitième & du dix-neuvième siècle, pourroient être regardés comme autant de nosogénies : les auteurs de ces différens systèmes ayant ou spécialement en vue d'expliquer & de faire comprendre la formation des maladies, en les rapportant à un petit nombre de causes premières purement hypothétiques, ou qui manquoient du degré de généralité qu'on leur attribuoit dans ces différentes théories (1). Voyez dans ce Dictionnaire POLYBE, PARACELSE, THESALE pour l'ancien dogmatisme; voyez aussi PRACMATISTES, MÉTHODISTES, SÉRAPION pour la secte des empiriques; SARACUS (opinion des médecins); PARACELSE, VAN-ILMOREN, SYLVIVS (2); PARACELSE (3), SPIRITUALISTES, VITALISTES, ORACISME (4).

L'auteur de l'article NOSOGÉNIE, dans un volumineux Dictionnaire, estimable d'ailleurs sous plusieurs rapports, ne paroit pas s'être fait une juste idée de l'étendue & de l'importance de cet article, lorsqu'il s'y est borné à exprimer une admiration stérile pour les vues ingénieuses, mais parfois trop subtiles ou trop peu médicales que son collaborateur, M. Pariset, a développées dans l'article CAUSES DES MALADIES du même ouvrage.

La nosogénie embrasse une grande variété d'objets dans son étude, même en se renfermant, suivant l'acception littéraire ou étymologique de ce mot, dans une suite de remarques sur les causes des maladies & sur les principaux phénomènes qu'il est possible d'apercevoir pendant le premier effet de ces causes, & au moment de la formation des différens états morbides.

(1) Le reproche de manquer ainsi d'un certain degré de généralité, s'applique plus particulièrement à quelques systèmes modernes de pathologie, à la théorie de Brown, par exemple, & à celle de MM. Tonnain, Broussais, &c.

(2) Pour la secte des humanistes.

(3) Nous rapporterons à ce titre tous ce qui concerne le système iatromécanique, qui n'est qu'un promettre les membres de l'Académie del Cimento en général, & le célèbre Borelli en particulier.

(4) Nous désignons sous ce dernier titre, toutes les doctrines dont les auteurs ont abusé de l'anatomie & de la physiologie, pour localiser sans mesure, le siège des maladies, en donnant à certains organes une importance qu'ils ont exagérée, & en parvenant à méconnoître que tout le système vivant, isolé même, pourroit n'être regardé que comme un quilibre unique, très compliqué dans la structure, & que nous ne partageons; & dirions que par un artifice de notre esprit.

Pour les maladies, comme pour les autres phénomènes de la nature, il n'existeroit sans doute que l'on puisse rigoureusement désigner sous le nom de causes. Ce que nous appelons ainsi se borne à certains effets antérieurs à d'autres effets qui leur succèdent d'une manière constante, & dont l'origine nous paroit expliquée & comprise par cette succession.

Tels sont, en prenant nos exemples dans la pratique même de la médecine, certaines altérations organiques très-graves qui se transmettent d'une manière héréditaire; les apititudes morbides qui remontent quelquefois jusqu'à des circonstances de la vie intra-utérine; l'application, l'introduction des poisons, des virus, des virus, des épreuves délétères; les intempéries atmosphériques; les fautes graves dans le régime; les agitations morales; les effets des grandes passions, &c. &c.

Les causes des maladies sont aussi nombreuses que variées. Plusieurs sont si délicates, & agissent souvent d'une manière si rapide ou si fugitive, qu'elles nous échappent, & nous sommes alors obligés d'admettre des maladies sans causes ou de les attribuer au hasard, à des causes locales; puissances imaginaires, dit M. de Laplace, & qui disparaissent devant les progrès de la science & de la saine philosophie.

Dans d'autres circonstances, des observateurs superficiels attribuent plusieurs maladies à des phénomènes qui les ont précédées ou accompagnées, quoiqu'étrangers à leur production, s'appuyant ridiculement sur cet adage latin : *post hoc, ergo propter hoc*; ce qui manque rarement d'avoir lieu pendant le règne des grandes épidémies ou des maladies pestilentiennes, dont l'apparition effrayante ne laisse jamais assez de pénétration & de calme d'esprit pour observer comme il convient, l'origine & le véritable principe de ces redoutables phénomènes.

Du reste, les causes malheureusement trop réelles des maladies ont des sources bien différentes les unes des autres, soit qu'elles viennent du dehors, avec des impellions, des atteintes plus ou moins hostiles; soit qu'elles se développent, comme une conséquence des altérations constitutionnelles ou de l'exercice prédominant de certains organes; soit enfin qu'elles n'aient de cette sorte, de cette maturation progressive, qui, à travers les révolutions des âges, conduit tout ce qui a vécu, de l'animation à la naissance, & de la naissance à la mort.

Rien n'égale le nombre & la variété de ces causes pour l'espèce humaine dans les conditions d'une haute civilisation & au milieu des complications de l'existence sociale. L'homme alors ne s'avance dans la carrière de la vie qu'au milieu d'une multitude de causes d'altération qui la remplissent; & ces causes, il peut en recevoir,

& il en reçoit souvent le germe fœtal avec l'existence. Elles se développent, elles s'acquièrent, elles se conservent à certaines époques de la vie, ou apparaissent, éventuellement & tout-à-coup, dans les lieux agrestes & sauvages que l'on veut conquérir pour l'agriculture, dans les grandes cités, où la pauvreté & l'intempérance les multiplient, dans l'air que nous respirons, dans l'aliment qui nous nourrit, dans l'exercice de plusieurs professions, dans nos commotions morales; dans le raffinement de l'art; dans l'usage immodéré, l'abus de toutes les jouissances, de tous les plaisirs, & dans les privations & le dénuement le plus absolu de la misère & de l'indigence.

Nous ne couvrons pas les causes premières ou étiologiques des maladies, & ce que l'on a appelé leurs causes prochaines pendant long-temps dans les écoles est déjà la maladie elle-même, c'est-à-dire, l'état morbide d'un organe ou d'un système d'organe que l'on parvient à reconnaître par des analyses & par des inductions physiologiques.

Depuis Hippocrate jusqu'aux temps les plus modernes, on s'est trop attaché à l'idée plus poétique que philosophique, que la maladie n'étoit autre chose qu'une espèce de lutte ou du combat entre la nature vivante & une cause morbide, une *matière peccante*; que la médecine elle-même ne pouvoit que poursuivre cette cause, & qu'elle devoit être expulcée dans tous les cas où il devenoit impossible de la connaître ou de se diriger avec un espoir motivé de l'atteindre. Sans doute certaines causes d'altérations morbides peuvent être combattues, peuvent être détruites avec efficacité, & l'adage latin, *sublata causa, sublatur effectus*, se trouve judicieusement appliqué à ces circonstances; mais le plus souvent les causes des maladies n'existent plus, ont été évanouies, neutralisées, ou se trouvent placées au-delà de nos moyens d'observation & d'action, & cependant la maladie subsiste & doit alors être combattue, sans avoir égard à ses causes, & en s'attachant seulement à bien constater la nature, le caractère du mal, son siège, ses phénomènes primitifs & consécutifs, mais surtout son rapport avec certaines situations morbides analogues déjà observées, pour lesquelles on emploie constamment certaines méthodes de traitement purement empiriques, & sans savoir si l'on agit sur les effets ou sur les causes.

Quelque variées, quelque nombreuses que soient les causes des maladies, il est assez facile, à l'aide de la méthode dichotomique, dont nous avons déjà fait de si utiles applications (1), de

tracer rapidement l'énumération de ces causes en les rapportant, dans un dénombrement philosophique, à un petit nombre de divisions fondées sur leur nature appréciable, d'après les données immédiates de l'expérience médicale & de l'anatomie pathologique.

Les causes des maladies, envisagées d'après cette méthode sous le point de vue le plus général, se rangent naturellement dans deux grandes classes; savoir: 1°. les causes inhérentes à l'organisation (*CAUSES INTERNES*); 2°. les causes placées en dehors de l'organisation (*CAUSES EXTERNES*).

Les causes inhérentes à l'organisation agissent seulement, & sans le concours des causes externes, dans plusieurs circonstances, & à une certaine époque de leur développement, comme on le voit pour les affections tuberculeuses, l'état scrophuleux, les dartres, le cancer, &c.

Souvent aussi ces mêmes causes, long-temps silencieuses & comme assoupies, ne se manifestent que sous l'influence de certaines irritations extérieures, qui semblent développer tout-à-coup ces genres de souffrance & de destruction.

Parmi les causes internes, les unes sont acquises & secondaires, tandis que les autres sont originales & antérieures à la naissance, soit qu'elles coulent dans une aptitude morbide héréditaire, soit qu'elles dépendent d'une altération, d'une perturbation éventuelle de l'organisation pendant la vie intra-utérine, surtout du troisième au sixième mois de la gestation.

Les causes acquises & secondaires, se forment avec le temps, par le genre de vie, par les suites ou par les effets ultérieurs de plusieurs maladies; (presque toutes les phlegmies intenses, les maladies syphilitiques & le traitement qu'elles exigent, certaines fièvres intermittentes, &c. &c.) par l'impression soutenue de plusieurs causes occasionnelles d'altération, par le fait même de l'exercice de plusieurs organes, & par cette maturation (1) des organes que nous avons déjà indiquée comme une des circonstances les plus propres à développer ce genre de causes).

Ces nombreuses variétés dans l'organisation de l'homme, que nous considérons ici comme des aptitudes morbides, se trouvent comprises, si on les envisage sous un point de vue très-étendu, & sous le rapport le plus philosophique; entre deux termes de comparaison bien remarquables; savoir: la conformation des monstres non viables, & le mode d'organisation le plus régulier, d'une personne capable de se prêter au développement d'une heu-

(1) Voyez notre article MÉTHODES dans ce Dictionnaire, & la table synoptique qui le termine.

(1) On doit rapporter naturellement à cette maturation les aptitudes morales, ou les causes internes des maladies qui dépendent de la vieillesse, & dont les plus remarquables se rapportent dans des changements opérés dans la circulation, dans la structure des poumons, la structure des os, les fractures des membranes muqueuses, &c. &c.

reule longévité. Suivant Corvisart, auquel nous empruntons cette remarque, on trouve entre ces deux extrêmes, une foule de complexions plus ou moins irrégulières, & dont les déficiences, les imperfections qui en produisant, avec le temps & d'une manière inévitable, plusieurs maladies organiques, rendent la santé impossible pour une foule de valétudinaires; troublent, empoisonnent la vie, & en marquent la fin à des époques si différentes pour l'espèce humaine.

Ces aptitudes morbides, ces causes intermédiaires de maladies, que l'école de la complication de la vie rendent si nombreuses chez les nations civilisées, se rangent naturellement sous deux grandes sous-divisions; les aptitudes morbides *générales*; 1°. les aptitudes morbides *partielles*, ou organiques.

Les aptitudes morbides *générales* embrassent, comme ce titre l'indique, l'ensemble de l'organisation, & forment ce que les médecins modernes désignent sous le nom de *constitutions morbides*, pour les distinguer des tempéramens & des complexions physiques, qui ne sont pas toujours incompatibles avec la santé, bien que l'exagération de l'ensemble ou de quelques-uns de leurs caractères devienne le plus souvent une cause prédisposante de maladie.

Les constitutions morbides *générales* se rapportent à trois principaux titres, si nous voulons en poursuivre l'énumération avec quelque détail; savoir: 1°. les constitutions morbides primitives & héréditaires; 2°. les complexions morbides *connées*, mais *éventuelles*, & non héréditaires; 3°. les constitutions morbides acquises.

Il est facile de voir que l'on doit ranger sous le premier titre, ces dispositions à certaines maladies générales qui se transmettent avec la vie, & sous la forme d'un funeste héritage, telles que les aptitudes scrophuleuses, gouteuses, cancéreuses & tuberculeuses; plusieurs névroses très graves (1), & certaines maladies mentales.

Les constitutions morbides originelles, mais *éventuelles* & non héréditaires, qui ne se manifestent quelquefois qu'à une époque déjà avancée de l'enfance ou de la jeunesse, ne peuvent se concevoir que par l'idée des grandes perturbations ou des maladies graves qui pèsent avoir lieu pendant le cours de la vie intra-utérine, & influer d'une manière durable par leurs effets ultérieurs, soit sur la totalité de l'organisation, soit sur l'ensemble de quelques parties du système nerveux. (Voyez NOSTRIS, NÉ (Nouveau), ORGANISME, VICIES.)

L'étude des complexions morbides acquises, dont nous avons pu marquer à peine la place dans cette rapide énumération, nous entraînerait dans les détails les plus étendus d'une pathologie trans-

cedante, si nous donnions à cet objet de recherches, tous les développemens dont il est susceptible. Nous devons nous borner à dire ici, que cette étude n'embrasserait rien moins que ce qui concerne l'effet ultérieur ou les suites de plusieurs maladies qui ne laissent jamais l'organisation dans l'état où elles l'ont trouvée; il nous importe aussi d'ajouter, que ces mêmes recherches comprennent, en outre, l'influence des tempéramens, des âges, celle du genre de vie, des climats, des professions, du régime, & surtout de l'impression soutenue & prolongée de certaines causes occasionnelles, souvent inspergées, mais qu'il est impossible de ne pas supposer si l'on veut comprendre certaines affections sporadiques ou certaines épidémies, dont la gravité ne correspond en aucune manière à la nature des causes auxquelles on les attribue.

L'exposition des causes internes & partielles des maladies n'offre pas moins d'étendue que l'énumération des complexions morbides acquises; elle doit naturellement embrasser tous les vices particuliers d'organisation, originaires ou développés, qui deviennent des obstacles souvent invincibles à la santé, ou même à l'entretien de la vie; objet de recherches de la plus haute importance sans doute, & dont les différentes parties appartiennent à plusieurs articles de ce Dictionnaire. (Voyez ANATOMIE PATHOLOGIQUE, SIÈGE DES MALADIES, VICIES D'ORGANISATION, ORGANIQUE (Défective).)

Les causes extérieures des maladies rentrent aisément, comme les causes internes, & quels que soient leurs variétés & leur nombre, dans deux grandes sous-classes; savoir: 1°. les causes *externes simples*; 2°. les causes *externes récurrentes*; distribution bien plus réelle, bien mieux fondée que celle qui fut proposée, il y a bientôt deux siècles, par le grand Boerhaave pour la pathologie, & qu'un professeur moderne, bien digne d'auteurs de sa célébrité, applique d'une manière si peu convenable à l'hygiène (2).

Parmi les causes externes simples, un grand nombre agit d'une manière insidieuse & occasionne des désordres plus ou moins graves, suivant leur intensité & leur concours avec les

(1) Dans la classification à laquelle nous faisons allusion dans ce passage, Boerhaave, plus occupé du mode d'introduction des causes des maladies, que de la véritable nature de ces causes; les rapporte aux trois suivans: 1°. les *exotiques*, 2°. les *applicables*, 3°. les *infectes*, 4°. les *exotiques*, 5°. les *applicables*, 6°. les *infectes*. Cette répartition introduite, pour la méthode de l'hygiène, par le professeur Hallé, a couronné pendant quelque temps dans les écoles une sorte de crédit & de prépondérance contre laquelle tous les bons esprits se sont puissamment élevés, persuadés que les bases d'une bonne distribution de l'hygiène devaient être empruntées à la physiologie, & à la recherche d'organisation, en transmissant tout un même point de vue, les fonctions qui établissent l'harmonie dans les rapports de l'homme avec les choses extérieures, & ces choses extérieures elles-mêmes, lorsqu'on les considère dans leur liaison avec l'organisation de la vie & la configuration de la face.

(1) L'apoplexie, l'épilepsie, &c.

causes prédisposantes. Parmi les causes mécaniques, nous plaçons au premier rang les causes vulnérantes si variées, qui sont les chocs divers, les ligatures, les compressions, l'introduction & le séjour des corps étrangers, solides ou liquides; la présence des différentes espèces de vers intestinaux; les changements dans la température ou dans l'état hygrométrique, barométrique & électrique de l'atmosphère & le froid excessif, l'action de la lumière; causes diverses, & qui, pour la plupart, tendent nécessairement à se condenser comme l'anguille de van Helmont, & à produire des inflammations plus ou moins intenses lorsque les individus blessés survivent pendant quelque temps à ces différentes espèces de lésions. (Voyez Articulo dans ce Dictionnaire.)

Parmi les causes externes de maladies, quelques-unes agissent aussi d'une manière chimique, en corrodant & en détruisant le tissu même des organes avec la substance desquels elles tendent à se combiner; comme on le voit pour les poisons corrosifs, dont l'effet est quelquefois assez violent & assez promptement sensible pour ne pas donner lieu au développement d'une véritable phlegmasie.

Les causes extérieures vénéneuses sont caractérisées dans leur effet, par une gravité qui ne parait pas expliquée par la nature chimique ou physique de ces causes; & qui fait nécessairement supposer une atteinte profonde dans les forces vitales, quoique le plus souvent on découvre à peine quelques traces de lésions dans la structure des organes. On doit les ranger sous deux titres: 1°. les causes vénéneuses simples & indépendantes d'un état morbide; 2°. les causes vénéneuses, contagieuses, & développées par un état morbide.

Parmi les causes vénéneuses simples, on doit comprendre les gaz délétères, l'huile essentielle des fleurs de plusieurs plantes d'où résultent les odeurs, les émanations viruleuses ou septiques des effluves marécageuses, les différentes espèces de venins, & les poisons végétaux.

Quant aux agens vénéneux qui se propagent par contagion, & qui forment par un état morbide, souvent à le renouveler à la manière des germes ou des ferments; les uns, connus sous le nom de virus, sont visibles, appréciables, peuvent être inoculés à volonté (1), tandis que les autres, que l'on désigne sous le nom de miasmes, sont invisibles, insaisissables, & pourroient même être mis en question, si l'apparition soudaine des fièvres qu'on leur attribue dans la translocation, ou pendant le règne des maladies pestilentielles, ne seroit pas l'incertitude même à les admettre (2).

(1) Le virus syphilitique, le virus de la variole, la vaccine, la rougeole, l'hydrephobie.

(2) Les miasmes ou les émanations morbides, auxquels on attribue le développement de la propagation du typhus, de la fièvre jaune, ou de certaines épidémies ou épidémies pestilentielles, de la peste elle-même.

Telles sont les principales espèces de causes, qui, suivant une foule de combinaisons diverses, ont contribué & peuvent contribuer au développement des maladies parmi les hommes, dans une foule de conditions & de situations dont quelques-unes sont assez importantes ou assez graves pour devoir appartenir aux annales des nations.

Ajoutons que plusieurs maladies peuvent aussi être produites ou rappelées presque spontanément & sans aucune des causes externes ou internes que nous avons indiquées, mais par le simple effet des grandes agitations morales, par le trouble des passions, le pouvoir de l'imitation (3) ou de l'association, dont l'influence n'a peut-être pas été assez appréciée par les pathologistes, par la tendance à la périodicité, l'influence de l'habitude.

On tenteroit bien vainement sans doute de rapporter à un seul mode d'action le développement des causes diverses des maladies.

Les causes internes & inhérentes à l'organisation; héréditaires ou non héréditaires, peuvent ne jamais se manifester, ou se trouver subjuguées, anéanties, par l'effet d'une situation favorable, ou par l'influence d'un régime particulier ou d'un traitement prophylactique, qui commence au moment de la naissance, & qui est continué sans interruption jusqu'à l'époque de la puberté: cette époque elle-même, le travail de la seconde dentition, le mariage pour les femmes, & l'exercice de toutes les nouvelles fonctions qui se rattachent à cette situation, suffisent quelquefois pour changer tout-à-coup le mode primitif d'organisation, & pour effacer jusqu'aux dernières traces de l'aptitude morbide dont il étoit entaché.

Ces mêmes aptitudes morbides, dans d'autres circonstances, ne le montrent, ni ne s'annoncent presque par aucun signe, avant l'âge de quarante ou cinquante ans, époque où elles donnent lieu tout-à-coup aux maladies les plus graves ou les plus funestes, telles que la goutte, la gravelle, l'apoplexie, l'épilepsie, & différentes espèces de véneries.

Ces mêmes causes internes, lorsqu'elles sont locales, c'est-à-dire, lorsqu'elles se rapportent à l'imperfection d'un organe, à sa sensibilité ou à sa prédominance, ne produisent ou ne font véritablement morbide que dans le cas où ces déficiences partielles de l'organisme se font augmentées avec l'âge, & souvent par l'effet du genre de vie ou d'une profession particulière.

Enfin, plusieurs causes également internes & inhérentes à l'organisation, mais tout-à-fait acci-

(3) Plusieurs exemples, mais principalement certains affections convulsives, se communiquent & se propagent évidemment par imitation; phénomènes dont les recueils d'observations médicales contiennent plusieurs exemples.

dentelles & plus ou moins promptement acquises, exigent, pour agir, le concours des causes extérieures, d'un changement dans les habitudes, par exemple d'un effet des intempéries atmosphériques, d'un nouveau climat, d'un travail excessif, & de toutes ces profondes altérations dans l'organisme, qui se montrent presque toujours, & comme des conséquences inévitables, à la suite des guerres & des famines les plus dévastatrices.

Peut-être, doit-on rapporter à des causes extérieures & développées d'une manière éventuelle, la plupart des maladies épidémiques & certaines fièvres essentielles, qui se manifestent sous la forme de fièvres putrides, ou de fièvres ataxiques : maladies dont le développement ne peut guère être expliqué sans la supposition d'un grand dérangement dans l'hématose, ou sans la supposition d'une formation spontanée d'une matière vénéreuse qui agiroit à la manière de l'extract de noix vomique & de l'opium, en se portant avec une prédilection marquée sur certains points de l'encéphale : opinion bien plus appuyée sur les données physiologiques, que le système moderne qui fait dépendre la plupart de ces fièvres, de gastrites & de gastro-entérites, que l'on n'observe souvent qu'à une époque déjà avancée de la maladie, & comme un épiphénomène, comme une complication souvent provoquée par l'abus ou par l'usage intempestif des médications toniques.

Il seroit évident que dans ces cas de maladies si aiguës & si graves, dont nous parlons, les causes internes agiroient à la manière des causes extérieures vénéreuses ; ce que l'on ne peut mettre en doute dans le typhus spontané, ou chez les animaux surmenés, dont le sang altéré agit à la manière des venins les plus actifs, en donnant lieu tout-à-coup, & par son application sur une surface donnée, à la pustule gangréneuse. (*Voyez ce mot.*)

D'autres causes internes de maladies moins graves, mais moins subtiles & plus évidentes, peuvent aussi produire leur effet à la manière des causes extérieures ; tels sont les topas gouteux, les calculs de la vessie, ceux de la vésicule du fiel, les vers, ou même certains produits excrétoires devenus corps étrangers, tels que le lait dans les engorgemens lacteux, les excréments retenus trop long-temps dans le canal intestinal, l'urine ou la bile, qui, venant tout-à-coup à s'épancher, donnent lieu à une péritonite, phénomène dont il existe des exemples.

Quant aux causes extérieures, soit qu'elles se bornent dans leur action à des irritations simples, soit qu'elles aient le caractère d'une irritation vénéreuse, on a désigné le premier temps, la première période de leur effet, sous le nom d'*irritation*, pour le plus grand nombre des maladies aiguës, & sous le nom d'*incubation*, dans les circonstances où cette cause extérieure, quelle que soit sa nature, paroît se comporter à la

Médecine. Tome X.

manière des germes ou des ferments, avant l'époque de l'apparition complète ou décidée de la maladie, que l'on attribue à des causes semblables ; ce qui s'observe plus particulièrement dans la syphilis, la rougeole, la variole, la vaccine, la clavelle, l'hydrophobie, dont les premiers symptômes ne succèdent jamais à l'application du principe délétère, qui tend à le produire, en agissant presque toujours d'une manière générale, & sur des organes & des systèmes d'organe qui n'avoient pas été exposés à leur première impression.

Ces causes externes, quelle que soit d'ailleurs la variété presque infinie de leurs effets divers, ont trois principales manières d'agir, auxquelles on peut rapporter ces effets, & en faisant un usage convenable de l'analyse & de l'induction.

Parmi les autres causes, les unes sont bornées à des irritations mécaniques & chimiques, ou une action locale, qui est à la fois le point de départ & le phénomène essentiel de la maladie ; les autres, plus compliquées, n'agissent qu'indirectement.

Les causes des maladies, dont le principal effet est directement produit sur l'organe qui en reçoit la première atteinte, occasionnent différentes séries de phénomènes, parmi lesquelles on peut aisément reconnaître le stade d'irritation dont nous venons de parler ; période qui se manifeste plus ou moins promptement & avec des phénomènes sympathiques plus ou moins graves, plus ou moins nombreux, suivant les dispositions individuelles, la nature de l'organe compromis, l'importance de ses fonctions & la sphère de son influence.

Cette manière d'agir appartient à toutes les causes chimiques ou physiques capables de produire une inflammation & pouvant être ramenées à l'action de l'aiguillon, si bien exposée dans l'article que nous avons déjà cité : article que l'on devroit trouver dans tous les traités élémentaires de physiologie & de pathologie.

Les causes moins immédiates & plus compliquées que celles dont nous venons de parler, consistent dans tous les genres de dérangement brusque & de commotion subite de l'organisme : telles que les agitations morales, l'impression soudaine du froid à l'intérieur & à l'extérieur ; l'excèsive chaleur, les intempéries atmosphériques en général : circonstances qui produisent toujours un effet subordonné à l'état antérieur de l'individu affecté, & qui échappent le plus souvent dans leur première action à toutes nos observations, de telle sorte, que l'origine, le point de départ de la maladie occasionnée par ces causes, est le plus souvent environné de la plus grande obscurité, & ne s'annonce que par les signes incertains & vagues, que l'on désigne sous le nom de *prodromes* ; symptômes qui, par cela même qu'ils

Mmm

sement appartenir à toutes les maladies, ne peuvent en caractériser aucune. Rien n'est uniforme ni constant dans l'action de ces causes, dont l'effet ne se compliquant pas seulement avec l'état antérieur, avec les dispositions individuelles des malades, le trouve modifié en outre par l'influence d'un autre genre de causes, qui a précédé celles que l'on désigne sous le nom de *causes déterminantes ou occasionnelles*; tels qu'un travail forcé, des fatigues immodérées, un mauvais régime : circonstances qui s'étoient bornées d'abord au développement d'une aptitude morbide, que l'on n'avoit point aperçue, & sans le concours de laquelle on ne pourroit jamais comprendre la gravité de certaines épidémies.

M. Broussais, pour lequel nous professons une haute estime, & dont nous aurons incessamment occasion d'examiner la doctrine, avec la plus grande impartialité, s'est fait, sous certains rapports, une juste idée de la manière d'agir de ces causes extérieures, très-complicquées, qui produisent le plus grand nombre des maladies, & dont il est toujours si difficile de reconnoître le premier effet, le période d'irritation ou d'incubation des pathologistes, & d'indiquer *a priori*, c'est-à-dire, d'après la connoissance de ces causes, l'organe qui en recevra la principale atteinte, & l'espèce, le genre de maladie qui doit avoir lieu, dans cette circonstance.

« Onze personnes, dit-il, reçoivent l'impression d'un air froid & humide, ou sont mouillées, soit par la pluie, soit par une chute dans l'eau; la première éprouve ce que l'on appelle une fièvre inflammatoire; la seconde, une fièvre dite *gastrique*; les troisième & quatrième, un embarras gastrique; la cinquième, une fièvre rémittente; les sixième, septième & huitième, contraignent les types quotidiens; tierce ou quarte, avec apyrexie entre les accès; la neuvième est atteinte d'une fièvre pernicieuse; la dixième, d'une phlegmasie continue, & la onzième, d'une phlegmasie intermittente. »

Dans les exemples que nous venons de citer, & dans tous les cas analogues à ces exemples, une suspension brusque dans les soufflons de la peau, l'irritation nerveuse qui accompagne ou précède cette interruption, se trouve bientôt suivie, par l'effet inévitable d'une rupture d'équilibre, d'une affection locale, qui appartient tantôt aux phlegmasies, tantôt aux fluxions douloureuses, & tantôt aux augmentations morbides de sécrétion.

Les causes qui agissent d'une manière plus directe, mais sans affecter à peine l'organe auquel elles sont appliquées, paroissent modifier tout l'organisme, le répandre & se propager le plus souvent sous des formes & par des voies qui nous sont inconnues. Ces causes ne produisent l'effet

qui leur est propre, que lorsqu'elles sont absorbées, & ce qui appartient à cette absorption se confond dans un grand nombre de cas, avec le période de ces maladies, désigné sous le nom d'*incubation*, dont il est bien difficile de le distinguer.

On fait d'ailleurs, & d'après diverses expériences qui ont été faites sur les animaux, que l'action de ces causes, qui sont ordinairement vénéneuses ou vireuses, est beaucoup plus prompte, lorsque le poison est porté immédiatement & par injection dans les voies circulatoires.

Le temps qui s'écoule entre l'introduction d'un agent morbide & la première apparition des symptômes de la maladie, devrait être seul désigné par le nom d'*incubation*; dénomination que l'on ne peut véritablement employer pour les affections qui ne sont pas évidemment l'effet d'un agent, d'une cause morbide bien déterminée, & dont l'action puisse être comparée, soit au développement progressif d'un germe, soit au mouvement intérieur d'une matière fermentescible.

Ce qui concerne ce phénomène de l'incubation, ayant été omis dans ce Dictionnaire, nous croyons devoir nous y arrêter un instant & en faire le sujet de quelques remarques, par lesquelles nous terminerons cet article.

L'incubation dans les maladies, mais surtout dans les maladies contagieuses, ou dans des maladies qui se rapportent à des miasmes septiques, animaux ou végétaux, & à des matières vénéneuses; cette incubation est-elle le simple effet d'une stimulation pernicieuse & ataxique de quelques régions des centres nerveux, analogue à ce qui se passe dans l'empoisonnement par la noix vomique, ou, cette même incubation ne consiste-t-elle pas dans une *altération profonde de l'hématose*, qu'il est toujours si difficile de ne pas admettre dans les *typhus* & dans les maladies des animaux surmenés, dont le sang acquiert des propriétés vénéneuses? Il nous seroit difficile de répondre à ces questions, & c'est peut-être déjà beaucoup de les avoir posées, & d'y rattacher, dans le silence d'une profonde méditation, des réflexions très-éloignées de l'opinion généralement admise sur cette partie transcendante de la pathogénie.

Quoi qu'il en soit, le temps ou période d'incubation est évident, lorsque le virus est *inoculé*, ou lorsque la matière vénéneuse, quelle qu'elle soit, se trouve déposée dans une plaie ou à la surface d'une partie dénudée d'épiderme.

La durée & la promptitude de l'incubation sont ordinairement déterminées par la nature ou par la force du virus ou du poison, & par la disposition particulière du sujet, ce que l'on appelle ses *précédents*, son *idiosyncrasie*. La plus légère marque de cette incubation, ou d'un effet général de la substance vénéneuse, manque constamment d'avoir lieu pour certains virus, si l'a-

mal auquel on les applique, soit par une plaie, soit par toute autre voie, se trouve à l'abri de leur effet par une atteinte antérieure : phénomène si remarquable pour la variole ou la rougeole, qui échappe à toutes nos explications, qui est, comme beaucoup d'autres faits, parce qu'il est, & d'après la constante répétition duquel nous nous croyons à l'abri de toute récidive de la petite-vérole, tandis qu'une semblable sécurité seroit absurde pour la syphilis, la peste, le typhus ou la fièvre jaune.

Le virus de la rage est celui de tous les virus qui paroit agir le plus, par sa nature, sur la durée de l'incubation, que l'on voit se prolonger, non-seulement pendant plusieurs mois, mais pendant plusieurs semaines, & que l'en prévient en interrompant, en cautérisant profondément la plaie, & sans doute en s'opposant en même temps à l'absorption, qui paroit moins prompte pour le virus hydrophobique que pour les autres & les autres virus.

L'incubation, dans les cas d'une inoculation syphilitique, varicéleuse ou morbillieuse, ne peut être révoquée en doute; elle est ou plus ou moins prompte, plus ou moins compliquée de symptômes généraux & consécutifs, suivant les dispositions individuelles. On a cité toutefois, pour la syphilis, des exemples d'une invasion presque subite & comme d'emblée; ce qui est toujours fort rare. (Voyez Syphilis, Variolæ.)

L'incubation, dans la vaccine, n'est pas moins évidente que dans les maladies que nous venons de citer, & se trouve également subordonnée, pour sa durée ou pour ses complications, aux dispositions individuelles.

L'incubation dans plusieurs autres maladies contagieuses, dans la peste, par exemple, dans le typhus, la fièvre jaune, soit une marche fort irrégulière & présente des anomalies, des variétés, que nous aurons soin d'indiquer en parlant de ces maladies. (Voyez Peste, Typhus, Carcinome, Typhus, Ictère ou Typhus Amaril.)

Nous manquons d'observations exactes sur ce qui pourroit être regardé comme la période d'incubation, dans la série déterminée des phénomènes qui résultent de l'action des effluves marécageux ou des autres miasmes, soit végétaux, soit animaux, capables de produire des maladies.

Dans les effets du venin de la vipère, mais surtout dans l'effet des poisons, qui, à la manière de l'opium, de l'opas, de l'extrait de noix vomique, réunissent toute leur action délétère sur un des centres nerveux, on ne peut pas, on ne doit pas même admettre une période d'incubation : période qui suppose toujours, dans l'effet d'une cause morbide, une altération progressive dans les parenchymes & dans les proprié-

tés vitales, qui devient comme la condition & le point de départ de la maladie.

(MORTEAU DE LA SARTHE.)

NO SOGRAPHIE, subst. fem., description des maladies, de nos, maladie, & de γραφω, je décris. On désigne sous ce nom la partie des études médicales, qui a pour objet de décrire & de classer, sous un certain nombre de titres, les nombreuses variétés des maladies auxquelles l'espèce humaine est exposée, & qui ont été observées depuis un temps immémorial, jusqu'à ce jour, dans les différents siècles & chez les différents peuples.

Fues préliminaires. Les Anciens n'eurent point l'idée de ces descriptions régulières, de ces arrangements méthodiques, ni pour les maladies, ni pour les productions de la nature, qui furent cependant pour eux l'objet de recherches & de connoissances de détail très-étendues. Quelques Modernes ont pensé que ce travail étoit assez inutile, ou qu'il étoit même contraire au véritable génie de la science médicale, en s'appuyant beaucoup moins toutefois sur l'exemple des Anciens, que sur les idées d'un perfectionnement idéal dans la médecine, & sur l'espérance de pouvoir connoître & de pouvoir traiter à la première vue, le plus grand nombre des affections morbides; opinion qui seroit assez plausible, si la partie transcendante ou physiologique de la médecine étoit plus avancée, & si l'étoit toujours possible de reconnoître dans l'ensemble, dans la succession des symptômes d'une maladie, ses véritables causes, son siège, le mode de lésion, & le rapport de toutes ces choses avec les indications curatives.

Malheureusement nous sommes bien éloignés d'un semblable degré de progrès dans les sciences médicales, & peut-être n'en approcherons-nous jamais, quels que soient à ce sujet les sentimens ou les motifs des détracteurs de la nosographie, & le crédit de ces novateurs qui semblent méconnoître que le titre de *médecins physiologistes* dont ils se parent, appartient également aux divers chefs de secte, depuis les anciens dogmatistes jusqu'à Brown & Darwin : tous convaincus, comme leurs successeurs du dix-neuvième siècle, que la science de l'homme, la connoissance de l'organisation, leur a été révélée, ou qu'elle se rattache du moins à un petit nombre de principes, dont ils disposent à leur gré, pour en former les seules bases d'une médecine rationnelle.

L'état très-avancé de la physiologie & de l'anatomie pathologique ne justifie point encore ces hautes prétentions de la théorie; & si un très-petit nombre de maladies peut être reconnu & convenablement traité par un médecin, qui en les voyant pour la première fois, est uniquement dirigé par des inductions physiologiques

M m m m

concernant la structure & les fonctions des organes qui sont principalement affectés, le plus grand nombre des états morbides ne se montre pas avec cette simplicité, & appartient à un empirisme qui seroit très-borné & réduit à quelques traditions populaires, s'il n'étoit pas fondé sur la nomenclature.

Cette nomenclature, dont nous ne craignons pas de proclamer l'importance & l'utilité au commencement de cet article, se trouve nécessairement comprise, ainsi que la zoologie & la botanique, parmi cette partie des sciences naturelles que M. le professeur Cuvier désigne & caractérise sous le nom de *science d'observation*: science qui a pour objet des êtres ou des phénomènes, dans lesquels il est le plus souvent très-difficile de reconnoître l'effet des lois générales.

Ces êtres, ces phénomènes, qui sont le sujet des sciences d'observation, se trouvent presque toujours placés au milieu des circonstances qui ne dépendent pas du savant qui les soumet à ses recherches, & qui, pour nous servir d'une expression du philosophe auquel nous empruntons ces réflexions, est obligé de les prendre tout entières, avec toutes leurs conditions à la fois, sans pouvoir les analyser autrement que par la pensée (1).

Dans cet état d'indépendance & de complication, les phénomènes & les productions de la nature exigent tous les moyens, tous les procédés d'une observation minutieuse, éclairée d'ailleurs par toutes les données des sciences physiques.

A mesure que l'on avance dans ces observations, à mesure que les descriptions, que les faits se multiplient, que les richesses ou les conquêtes de la science augmentent, il importe de plus en plus de conserver & de ranger, dans un certain ordre, les connaissances acquises, & d'en rapporter le sommaire, l'expression abrégée, en un mot la nomenclature, à un certain nombre de divisions ou de distributions, dont l'arrangement permet de retrouver au besoin, suivant leur degré d'analogie, tous les êtres, toutes les choses qui ont été observées ou décrites, & qui, dès ce moment, doivent avoir leur place dans le grand tableau de la science, comme dans le système général de la nature.

Des naturalistes & des nomenclateurs : des caractères & des difficultés de la nomenclature. Dans l'état présent des connaissances, le botaniste & le zoologiste possèdent de grands avantages pour établir leurs classifications, d'une manière régulière. Les notions, les idées qu'ils se font des es-

pèces de plantes ou d'animaux, & d'où ils doivent partir pour s'élever, en suivant la méthode analytique, aux idées plus générales de genres, de familles, d'ordres, de classes : ces notions premières ne résultent pas, pour les naturalistes, de caractères superficiels ou arbitraires, mais d'une identité, d'une conformité de nature entre des êtres qui, tous nés les uns des autres, depuis un temps immémorial, se transmettent continuellement, & comme en contrant, le flambeau de la vie, suivant l'expression d'un poète philosophe :

Et quasi corporis, vivai lampada traditur.

Dans la botanique, dans la zoologie, les principes de distribution sont d'ailleurs constants. La valeur de ces principes, celle des caractères, & ce que l'on peut appeler leur subordination, sont connus, & de telle sorte, qu'il n'est plus permis de choisir des bases de classification d'une manière artificielle ou arbitraire, c'est-à-dire, sans avoir égard, soit à l'importance des organes, soit au rapport de ces mêmes organes avec l'existence des êtres que l'on veut classer, de ces animaux, par exemple, dont il a fallu plusieurs fois à l'un de nos plus savants contemporains, de posséder quelques notions, pour en retrouver par induction, toute la structure, & reconnoître que leurs genres ou leurs espèces existent encore, ou ont cessé d'exister dans la nature.

La plupart de ces avantages sont refusés aux nomenclateurs, dont la tâche est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate que les classifications des naturalistes, & suivant une réflexion du philosophe que nous venons de citer, les maladies ne sont pas aussi aises à décrire & à caractériser que les plantes. Cette difficulté se trouve dans la nature même des choses que comprend la nomenclature.

Les botanistes, les zoologistes opèrent sur des êtres qui existent par eux-mêmes, que l'on peut observer, comparer un grand nombre de fois, qui se divisent par séries d'individus semblables, & dont la succession continue est désignée sous le nom d'espèces.

Le nomenclateur ne rencontre pas cette fixité dans les sujets divers de ses peintures & de ses classifications; il ne décrit pas des individus qu'il puisse observer à loisir, mais des situations fugitives, des modifications passagères d'un même individu ou de plusieurs individus de la même espèce, ou de plusieurs espèces différentes, toutes remarquables par la composition de leur structure & la complication de leur existence.

Nous venons de faire remarquer que, dans la zoologie & dans la botanique, le principe de distribution étoit constant & tiré de la distribution de certains organes, dont les différen-

(1) Voyez le *Règne animal*, distribué d'après son organisation, par M. Cuvier, tome I, introduction, page 5.

degrés d'importance, bien reconnus & bien observés, avoient fait établir une subordination & comme une espèce d'hierarchie dans les caractères. Rien de semblable n'existe en nosographie; les principes de distribution y sont toujours variables, arbitraires, & tirés tantôt du mode de lésion, tantôt du siège de la maladie ou de ses principaux symptômes, de ses causes ou même de certaines causes, plutôt supposées que démontrées, & trop souvent admises d'après de vaines théories.

Il existe à la vérité, pour les maladies comme pour les plantes ou les animaux, de grandes divisions assez régulières, des ordres ou des sous-ordres bien établis, de véritables familles naturelles, que l'on retrouve presque à la même place, dans presque toutes les classifications, comme on le voit plus particulièrement pour les fièvres; les inflammations; les névroses, l'augmentation morbide des sécrétions, sous le nom de *flux*; les altérations profondes & constitutionnelles de tous les fluides & de tous les tissus, sous le nom de *cachexies*, &c. &c.

Certaines familles de maladies, dont les unes sont héréditaires & les autres contagieuses, présentent des divisions moins étendues & qui sont complètement analogues à celles que l'on désigne sous le nom d'*espèces* & de *genres*, dans les familles naturelles; ce qui est évident pour les affections gouteuses; la dégénérescence tuberculeuse; certaines névroses; les maladies syphilitiques; plusieurs inflammations exanthématiques & la plupart des fièvres éruptives. Toutefois, ces dispositions, qui rapprochent sensiblement dans quelques points, la nosographie de la zoologie & de la botanique, sont malheureusement en trop petit nombre pour qu'il soit possible de les employer d'une manière générale dans la classification des altérations morbides.

Il n'existe point, il faut en convenir, de maladies dans la nature; il n'existe que des malades, c'est-à-dire, des individus dont la santé a éprouvé différentes altérations plus ou moins graves, & caractérisées par un certain nombre de symptômes, dont l'origine & l'enchaînement se débrouent souvent aux analyses les plus sévères & aux observations les plus exactes. Se représenter une maladie individuelle comme une chose existante, la péripneumonie, par exemple, ou une fièvre tierce quelconque, c'est une véritable abstraction, ainsi que Bayle l'a judicieusement observé, dans ses excellentes réflexions sur la nosographie. Se faire ensuite l'idée d'un petit groupe de maladies individuelles qui se ressemblent dans le plus grand nombre de leurs symptômes, telles que les petites véroles confluentes & les petites véroles discrètes; se faire cette idée & la personnifier en quelque sorte sous le nom de *variété*, présente l'exemple

d'une seconde abstraction beaucoup plus forte que la première, sans avoir cependant le degré de généralité, auquel on s'élève dans la notion d'espèces, si importante pour la nosographie, & qu'il ne peut établir, dans le plus grand nombre des cas, que d'une manière arbitraire; tandis que le botaniste ou le zoologiste rapporte invariablement, & comme nous l'avons déjà remarqué, cette même notion d'espèce à une chose de fait, à une succession non interrompue d'individus semblables, qui se perpétuent d'une manière constante & par reproduction.

D'autres obstacles résultent pour la nosographie, du petit nombre de documents exacts & d'observations bien faites que peuvent lui offrir les annales de la médecine pratique; insuffisance qui est telle sous ce rapport, que le philosophe qui a contribué le plus, dans ces derniers temps, aux progrès de la nosographie, n'est parvenu à remplir la tâche importante qu'il s'étoit imposée, qu'en décrivant lui-même, & d'après ses observations, le plus grand nombre des maladies qu'il vouloit classer d'une manière régulière, mais dont les auteurs ne lui fournissent le plus souvent que des peintures infidèles ou des descriptions incomplètes.

Telles sont, relativement à la classification des maladies, les hautes généralités qui se font présentes d'abord à notre esprit, & que l'on regrette de ne pas trouver à la tête de l'ouvrage du savant auteur de la *Nosographie philosophique* (1).

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur ce qui a été fait & sur ce qu'il convient de faire, dans cette partie aride des études médicales.

Considérations historiques. L'auteur d'un opuscule recueilli par Baldinger (2), a montré plus d'érudition que de critique & d'esprit philosophique, en croyant retrouver quelques idées, concernant la nosographie, dans les ouvrages des Anciens; opinion qui se borne d'ailleurs à prétendre, que l'auteur du *Traité de Flatusibus* auroit saisi les rapports qui unissent les maladies inflammatoires des principaux viscères, & qu'Hippocrate regardoit comme des maladies analogues, toutes celles qui paroissent se rapprocher, par une grande conformité dans leurs causes, dans leurs symptômes, dans leur mode de traitement & leur termin-

(1) M. le professeur Pinel, dans l'introduction de sa *Nosographie*, & dans ses réflexions sur la méthode d'Hooder & d'observer en médecine, méritent véritablement le reproche d'avoir négligé d'appeler à leur secours les principes de la zoologie, & de n'avoir pas même rappelé à ce sujet, ce que l'on sait pour les comparer à une judicieuse critique, les vues générales qui se trouvent dans Sauvages.

(2) *Opuscula medica Baldingeri*. Ia-12, page 215. Gering, 1782.

naïves. *Ostendunt morborum naturam, curationes.*

L'auteur auroit pu ajouter, & avec beaucoup plus d'exactitude, qu'Hippocrate avoit rapproché avec soin, & sous un même titre, dans un de ses écrits les plus authentiques, les maladies aiguës qui sent les plus communes & dont il a formé une grande famille, en indiquant avec détail les principales maladies qu'il comprend dans cette division; savoir, les différentes espèces de fièvres, les fièvres ardentes, la fièvre de plénitude, la fièvre asode, la diarrhée, l'équinancie, la pleurésie & la péripneumonie, &c. &c. (1).

La division des maladies par Thémisun, reproduite sous une nouvelle forme dans le dix-huitième siècle (2), & par un chef de secte non moins fameux, cette division & celle de Galien, sent entièrement subordonnées à des vues théoriques, & ne peuvent pas être rapportées à la nosographie.

Dans les écoles arabes, & pendant la plus grande partie du moyen âge, on décrit les maladies en les rapportant aux différentes régions du corps qu'elles pouvoient affecter : division du reste fort ancienne, & d'après laquelle, suivant Hérodote, en avoit établi en Egypte des médecins particuliers pour toutes les parties : des médecins, par exemple, pour les yeux, pour le nez, pour les oreilles ; façon de voir qui, tout exacte qu'elle paroît, se rattache à une des opinions populaires les plus profondément enracinées dans l'esprit humain, puisque nous la retrouvons non-seulement chez les peuples de la plus haute antiquité, dans les beaux siècles de Rome, dans le moyen âge, mais encore chez les nations modernes les plus éclairées, parmi lesquelles cette espèce de classification nous est rappelée par les pédicures, par les médecins-accoucheurs, les dentistes, les oculistes, les lithotomistes, les orthopédistes, &c. &c.

Travaux de Félix Plater chez les Modernes. Le premier qui s'éloigna d'une distribution des maladies aussi peu conforme au génie de la science, fut Félix Plater, médecin du dix-septième siècle, qui, sans faire usage du mot *nosographie*, suivit un ordre analytique dans la description des affections morbides, dont il rapporte les genres & les espèces aux différentes fonctions altérées ou dérangées dans leur développement, & aux divers modes de lésions extérieures, sans s'occuper d'ailleurs d'une nomenclature, & en ne distinguant pas avec assez de soin, plusieurs symp-

tômes que l'on rencontre dans presque toutes les maladies, sans appartenir à aucune en particulier : tels que le hequet, la toux, l'insomnie, la douleur de l'ensemble des phénomènes, dont la combinaison ou la succession, suivant un certain ordre plus ou moins régulier, constituë seule une maladie.

D'après ce rapide aperçu, il est évident que Félix Plater, dont le nom ne se retrouve même pas dans l'ouvrage de M. Puel, ni dans la table de M. le professeur Chausser, doit être regardé comme le fondateur de la nosographie, ainsi que Sauvages l'a reconnu, de la manière la plus solennelle, en déclarant qu'il a suivi les traces & sa méthode. On doit ranger aussi parmi les promoteurs du même genre d'étude, deux des médecins les plus célèbres du dix-septième siècle, Sydenham & Baglivi, qui, sans avoir jeté les bases d'un système de nosographie, en indiquèrent vivement le véritable objet & les plus grands avantages. Leurs réflexions, mais principalement celles de Sydenham, & la révolution que les travaux de Linnaé venoient d'opérer dans les sciences naturelles, donnèrent à Sauvages, encore très-jeune, l'idée d'appliquer aux différentes espèces de maladies, dont il fit monter le nombre à dix-huit cents, la méthode de classification que le savant auteur de la philosophie botanique avoit employée pour la classification de tous les produits de la nature dans tous les règnes. Le but de son travail, la méthode & les caractères de sa nomenclature, les principes de distribution qu'il devoit suivre, furent exposés avec beaucoup de soin par Sauvages, ainsi que les premiers essais on les peultes secondes de ses prédécesseurs, qui lui avoient ouvert la carrière. Suivant cet auteur, la nosologie doit être essentiellement descriptive ou historique, & avoir pour fondement la méthode & la nomenclature.

La méthode anatomique essayée par Jonhston & Senneri, la méthode étiologique, & la méthode fondée sur une notion des causes des maladies, ne pourroient être admises d'une manière utile pour la pratique, suivant Sauvages, qui s'attacha à une classification d'après les symptômes, en s'appuyant d'ailleurs de l'autorité de Sydenham & de Baglivi, qui ont très-bien senti que dans l'état des connaissances médicales, cette méthode offroit seule des avantages réels & directs, dans la pratique de la médecine.

Méthode & système de Sauvages & de plusieurs autres nosographes. Sauvages a bien reconnu les véritables principes de la nosographie, mais plus particulièrement l'importance & la difficulté de tout ce qui concerne l'établissement, la nomenclature des espèces ou des genres, & le choix des caractères que le nosographe ne peut employer que lorsqu'ils se rapportent à des symptômes constants, réguliers & propres à faire ressortir, suivant

(1) Hippocr. de vitâ ratione in morbis acutis.

(2) Dans cette division de Thémisun, toutes les maladies devoient entrer dans les trois classes suivantes : les maladies par excès de tension, les maladies par relâchement (e levo), les maladies mixtes.

le vœu & la pensée de Baglivi, les indications curatives.

L'exécution ne répondit pas malheureusement à ces vœux judicieux & développés par l'auteur, dans une introduction qui mérite d'être comparée à la philosophie botanique du grand Linné, du moins dans quelques-unes de ses parties, mais surtout pour les principes relatifs à la nomenclature nomenclographique. (Voyez ce mot dans ce Dictionnaire.)

Le système nomenclographique de Sauvages, plus vaste, plus étendu que tous ceux qui ont été publiés jusqu'à ce jour, embrasse en quelque sorte, dans un même point de vue, les maladies qui sont traitées par le régime ou par les médicaments, sous le nom impropre de *maladies internes*, & les affections locales qui sont ordinairement combattues par les secours de la chirurgie.

Dans son dénombrement, Sauvages ne comprend pas seulement d'ailleurs les maladies bien caractérisées que l'on observe dans une pratique très-étendue, il l'étend aussi aux symptômes les plus généraux, tels que la douleur, l'insomnie, la toux : à tous les genres d'infirmités ou d'altérations morbides ; aux dégénérescences ; aux vices d'organisation, ou même aux conformations bizarres ; aux déformations accidentelles & volontaires, dont les peuplades sauvages présentent des exemples. L'érudition dont il a fait usage pour embrasser une aussi grande variété d'objets dans un seul & même catalogue, est immense : les traités anciens & modernes de médecine, les recueils volumineux d'observations, les récits des voyageurs, les archives des académies, les annales & l'histoire des peuples, &c., ont été également mis à contribution pour un travail aussi étendu.

Dans le système qui sert de base à ce travail, l'auteur admet dix classes, quarante-quatre ordres, trois cent quinze genres & dix-huit cents espèces. L'idée d'une *subordination* dans les caractères, pour ces différentes divisions & sous-divisions, ne s'est même pas présentée à l'esprit de Sauvages. On peut également lui reprocher, comme à Plater, d'avoir désigné comme un genre, comme une espèce, ou même comme une classe de maladies, certains symptômes qui ne doivent pas occuper une place particulière dans les tables nomenclographiques, par cela même qu'ils se rencontrent dans le plus grand nombre des affections morbides. Les *douleurs*, par exemple, qui forment la huitième classe de Sauvages, les *débités*, qui font la sixième, &c. &c.

Le même auteur ne parait pas même, d'ailleurs, avoir eu l'idée, soit dans ses ordres ou dans ses classes, soit dans ses genres ou dans ses espèces, d'éviter, au moins d'une manière approximative, une variation continuelle dans les principes de distribution dont il fait usage, & qui se rapportent, tantôt à des phénomènes essentiels, tels que

le dérangement d'une fonction, & tantôt à des circonstances purement essentielles, aux modifications qui résultent du climat, par exemple, & de toute autre cause encore plus étrangère au caractère principal d'une maladie.

L'idée d'employer les symptômes apparents des maladies d'une manière artificielle, sans en connaître, sans en apprécier d'après quelques données physiologiques, la véritable nature & les rapports avec l'ensemble des affections morbides & leur véritable similitude ; ce qui peut-être étoit impossible dans la première moitié du dix-huitième siècle ; cette idée, & la méthode défectueuse qui en fut la conséquence, se joignent à tous les autres défauts que nous venons d'indiquer : ce qui nous explique facilement toutes les réunions bizarres, tous les rapprochements incomplets que l'on trouve à chaque page dans les énumérations de Sauvages, ou dans les classifications du plus grand nombre des auteurs qui ont marché sur ses traces, sans s'éclairer par la physiologie & l'anatomie pathologique.

Justifions cette opinion par une exposition rapide de son système de classification, & en jetant successivement un simple coup d'œil sur ses classes, ses ordres, ses genres & ses espèces.

Les classes de Sauvages sont au nombre de dix, ainsi que nous venons de le remarquer.

La première, sous le nom de *Vices*, est hors de proportion, par son étendue, avec les autres classes. Loin de se borner à comprendre, suivant son titre, les affections superficielles, elle embrasse tous les genres de lésions qui exigent les secours de la chirurgie, groupés & réunis d'ailleurs sans avoir égard à leur véritable similitude, de manière, par exemple, à placer dans un même ordre, avec le titre de *taches*, les signes de naissance, ou les roufleurs de la peau, qui sont à peine des altérations morbides, la taie de la cornée, suite inévitable de certaines ophtalmies, & l'ecchymose, qui est inséparable de la contusion.

D'autres états encore plus éloignés peut-être les uns des autres, l'érysipèle, par exemple, l'œdème, le charbon, le cancer, &c., sont confondus dans un troisième ordre de la même classe, sous le nom de *tumeurs* (*phymata*), sans doute parce que l'auteur avoit négligé d'apercevoir que ce caractère d'intumescence avoit peu de valeur, & que les lésions qui n'avoient entr'elles que ce trait de similitude, pouvoient & devoient, d'ailleurs, différer prodigieusement par leur véritable nature & par l'ensemble de leurs phénomènes.

Les trois classes suivantes, savoir, les *Fixités*, les *Inflammations* & les *Spasmes*, sont établies d'une manière plus rationnelle : elles ont été conservées par le plus grand nombre des nomenclographes, qui n'ont pu méconnaître l'analogie, les caractères généraux de la famille du plus grand nombre des affections morbides qui s'y trouvent rapprochées.

Les trois autres classes : les *ESOUFFLEMENTS*, les *DIAÏRRÉES* & les *DOULEURS*, se rapportent, comme nous l'avons déjà observé, à des symptômes qui se rencontrent en général dans le plus grand nombre des maladies, sans appartenir à aucune en particulier.

La huitième & la neuvième classe : les *DÉMENCES* & les *FLUX*, offroient encore quelques rapprochemens peu fondés, mais sont établis toutefois sur des caractères importans, & que certaines séries de maladie ne peuvent offrir sans avoir entr'elles des véritables analogies.

La dixième classe, les *CACHEXIES*, ne mériteroit pas les reproches dont elle est objet, si l'on en retranchoit quelques ordres, & si l'auteur, en suivant son idée fondamentale, s'étoit borné à réunir sous ce titre, toutes les affections morbides qui se rapportent à un mode de lésion général & constitutionnel de l'organisme, telles que les affections tuberculeuses, les dartres, qu'il auroit fallu alors rapprocher de la pique, des éléphantiasis, des affections cancéreuses, de la gangrène par cause interne, des scrophules, du rachitisme, & de plusieurs autres modes de lésions. Les *maladies mentales*, qui forment avec raison une classe dans Sauvages, n'ont pas été considérées d'une manière aussi philosophique par le plus grand nombre des autres nosographes, mais surtout par M. Pinel, qui a en le tort bien grave de n'en former qu'une sous-division des *névroses*, quelle que soit d'ailleurs leur affinité avec les maladies de cette classe, à la suite de laquelle elles seroient favorablement placées entre cette classe & celle des *fièvres*.

Les lecteurs qui adopteront ou qui discuteront ces réflexions, ne pourront manquer d'observer en même temps que, même dans cette grande coupe des classes, le principe de distribution adopté par Sauvages n'a pas seulement les défauts que nous lui avons reprochés, mais qu'il varie continuellement, & qu'il se rapporte tantôt au siège des phénomènes morbides (1), tantôt au mode de lésion, tantôt aux fonctions lésées.

La même irrégularité se fait apercevoir dans les ordres; ce qui est plus remarquable peut-être dans ceux de la dixième classe, pour lesquels le principe de distribution dont nous parlons n'offre rien de fixe, & se rapporte tantôt à une simple *intumescence*, causée par des parties solides ou fluides, tantôt à une diminution de volume, & tantôt à une dégénérescence profonde & grave de tissu (de tubercule), ou à une maladie éminemment critique & constitutionnelle (les dartres). Il seroit inutile d'ajouter que la même irrégularité se retrouve dans les genres. Quant aux espèces, quoique Sauvages ait très-bien senti que tout ce

qui les concerne est la partie fondamentale de la nosographie, il les a multipliées outre mesure, & eu variant continuellement sur les principes de distribution, qu'il a rapportés indifféremment à tous les symptômes de la maladie, au point de considérer le plus souvent comme des espèces, des nuances, des modifications que l'on pourroit à peine regarder comme des variétés.

La méthode de Sauvages étant toute artificielle, comme celle de Linné, une partie des imperfections que nous venons de signaler étoit indispensable : les nosographes qui l'ont suivie, ont commis les mêmes fautes, en différenciant d'ailleurs beaucoup les uns des autres, pour le nombre des espèces, & en se rapprochant pour les classes & pour les ordres, dont plusieurs ne sont pas sans analogie avec les familles naturelles des botanistes & des zoologistes, comme on le voit pour les *fièvres*, les *phlegmasies*, &c. &c.

On doit placer, d'ailleurs, dans une catégorie particulière les auteurs qui, avant ou après Sauvages, cherchèrent, à l'exemple des Méthodistes & des Galénistes, à classer les maladies, dans les vues d'un système exclusif qui rendoit toute nomenclature inutile, en réduisant de beaucoup les divisions, & en simplifiant, en généralisant de la manière la plus contraire au génie de la médecine, les indications curatives.

Cette méthode, que Sauvages désigne avec raison sous le nom de *méthode étologique*, eut tantôt pour principe, depuis le seizième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième, quelques applications intempestives de la chimie à la médecine, ou quelques doctrines iatro-mathématiques ou iatro-physiologiques plus ou moins célebres. Parmi les nosographes iatro-chimiques, nous citerons seulement, & sans en faire le sujet d'une exposition historique, la manière de voir & de classer les maladies, par le fameux Paracelse, dans le seizième siècle, & la classification aussi peu exacte, aussi peu motivée, que M. Baumes n'a pas craint de proposer dans le dix-huitième.

La nosographie iatro-physiologique la plus célèbre est sans doute celle de Darwin, fondée, d'une part, sur le système de Brown, & d'une autre part, sur les idées de l'auteur, dont la brillante imagination & l'esprit indépendant, abordent sans cesse, dans le dénombrement & la théorie des maladies, les profondeurs les plus impénétrables ou les fondemens les moins accessibles de la médecine philosophique.

Les principes de distribution de Darwin, pour les classes, sont confus, & se rapportent aux quatre grands phénomènes généraux de l'organisme; savoir : l'irritation, la sensation, la volition & l'association. L'auteur, qui n'est point arrêté par les difficultés de la pratique, qui se rencontrent en foule lorsque l'on cesse de considérer les hommes ou les choses sur le papier, présente la même confusion, la même

simplicité

(1) Les vices.

simplicité pour les principes de distribution dans l'établissement des ordres ou des genres dont l'enumeration, du reste, ressemble bien moins à un système nomenclographique qu'à une exposition d'une doctrine médicale.

M. le professeur Chausser rétrace, ainsi qu'il fuit, la classification de Darwin dans le table synoptique qu'il a consacrée à l'exposition des principales méthodes nosologiques.

Le système de nomenclature de Darwin comprend quatre classes, onze ordres, quarante-neuf genres.

CLASSE PREMIÈRE. MALADIES D'IRRITATION.
(Trois ordres, treize genres.)

1^{er}. Ordre. *Irritation avec augmentation d'action* : 1^o. du système sanguin ; 2^o. du système sécrétoire ; 3^o. du système absorbant ; 4^o. des viscères & des membranes ; 5^o. des sens.

2^e. Ordre. *Irritation avec diminution d'action* : 1^o. du système sanguin ; 2^o. du système sécrétoire ; 3^o. du système absorbant ; 4^o. des viscères & des membranes ; 5^o. des sens.

3^e. Ordre. *Irritation avec mouvements rétrogrades* : 1^o. dans le canal alimentaire ; 2^o. dans le système absorbant ; 3^o. dans le système sanguin.

DEUXIÈME CLASSE. MALADIES DE SENSATION.
(Trois ordres, douze genres.)

1^{er}. Ordre. *Augmentation de sensation* : 1^o. avec accroissement d'action musculaire ; 2^o. avec fièvre & formation de vaisseaux par les membranes internes, ou les glandes ; 3^o. *idem*, par les membranes externes ou les glandes ; 4^o. *idem*, mais sans fièvre, par les membranes internes ; 5^o. *idem*, par les membranes externes ; 6^o. avec fièvre consécutive à la formation de vaisseaux nus ou fluides ; 7^o. avec augmentation de l'action des sens.

2^e. Ordre. *Diminution de sensation* : 1^o. avec diminution d'action de tout le système ; 2^o. avec diminution d'action de quelque organe seulement.

3^e. Ordre. *Rétroversion des mouvements sensitifs* : 1^o. du système artériel ; 2^o. du système absorbant ; 3^o. des canaux excréteurs.

TROISIÈME CLASSE. MALADIES DE VOLITION.
(Deux ordres, quatre genres.)

1^{er}. Ordre. *Volition augmentée* : 1^o. avec accroissement d'action musculaire ; 2^o. avec accroissement de l'action des sens.

2^e. Ordre. *Volition diminuée* : 1^o. avec diminution de l'action musculaire ; 2^o. avec diminution de l'action des sens.

MALADIES. Toine X.

QUATRIÈME CLASSE. MALADIES D'ASSOCIATION.
(Trois ordres, douze genres.)

1^{er}. Ordre. *Augmentation des mouvements d'association qui existe* : 1^o. avec les mouvements d'irritation ; 2^o. avec les mouvements sensitifs ; 3^o. avec les mouvements volontaires ; 4^o. avec les influences externes.

2^e. Ordre. *Diminution des mouvements d'association qui existe* : 1^o. avec les mouvements d'irritation ; 2^o. avec les mouvements sensitifs ; 3^o. avec les mouvements volontaires ; 4^o. avec les influences externes.

3^e. Ordre. *Perversion ou rétroversion des mouvements d'association qui existe* : 1^o. avec les mouvements d'irritation ; 2^o. avec les mouvements sensitifs ; 3^o. avec les mouvements volontaires ; 4^o. avec les influences externes.

Il existe encore une autre série de méthodes nosologiques, les *méthodes anatomiques*, dont les partisans se trouvent placés entre les nomenclatures étiologiques & les nomenclatures qui tiennent leurs caractères des différents symptômes des maladies. Il seroit difficile du rien ajouter aux objections de Sauvages, contre ces méthodes anatomiques ; objections qu'il a développées d'une manière si lumineuse & si forte, en rendant compte de la méthode de Juntun, qui fut entraîné par l'insuffisance & par les inconvénients inévitables de cette méthode, à refuser le nom de maladie à l'apoplexie, à la manie, à la rage, à la migraine, pour le donner aux rouilles, aux vertus & aux blessures les plus légères.

L'objection la plus forte de Sauvages, porte principalement sur la difficulté de déterminer le siège des maladies, sans se livrer à de vaines hypothèses, comme celles de Lowee, qui rapporte le cauchemar au quatrième ventricule du cerveau.

Les progrès de l'anatomie pathologique & de la physiologie parviendront peut-être, dans la suite, à rendre cette méthode plus facile & moins défectueuse ; mais rien de sensible n'existe encore à l'époque actuelle des connaissances, bien que l'étude très-avancée de l'organisme dans l'état de santé ou dans l'état de maladie, puisse déjà servir au perfectionnement de la nomenclature, en faisant mieux apprécier l'importance ou la valeur des symptômes que l'on a introduits dans les différentes classifications. Nous ne pourrions pas même entrevoir aujourd'hui la possibilité d'une classification fondée sur le siège des affections morbides qui attaquent le plus souvent, & presque simultanément, un grand nombre d'organes, soit par la nature même de plusieurs de ces affections essentiellement générales ou universelles, soit par l'effet nécessaire de la sympathie & de la connexion qui existent entre toutes les parties.

N a n n

M. Tourdes, à l'esprit-duquel ces réflexions ne se font pas pressenties, a cru pouvoir établir, au commencement du dix-neuvième siècle, un système de nomenclature anatomique, qui méritait une grande partie des reproches que Sauvages a faits à Jussieu & à Sennert. Dans cette distribution des maladies, qui semble appartenir à un temps déjà bien éloigné, l'auteur admet quatre classes, dix-neuf ordres & cinquante-un genres, pour les trois premières classes. Le principe de distribution n'est pas toujours le même dans cette méthode, soit pour les classes, soit pour les ordres.

Les trois premières classes se rapportent aux tissus, que M. Tourdes suppose grossièrement les plus répandus dans l'organisation; ce qui fournit les trois divisions suivantes : 1^{re}. les *maladies du tissu fibreux ou irritable*; 2^o. les *maladies du tissu nerveux ou sensible*; 3^o. les *maladies du tissu cellulaire ou lymphatique*.

Un état plus marqué de complication, a servi de base pour une quatrième classe, sous le nom de *maladies compliquées*, & sous doute on sera surpris de voir qu'en faisant usage d'un semblable principe de distribution, l'auteur n'ait pas eu l'idée de rattacher toutes les maladies à deux grandes classes, savoir : 1^{re}. les *maladies simples*, 2^o. les *maladies compliquées*; ce qui paraitroit conforme à la méthode dichotomique, dont l'usage bien entendu pourroit d'ailleurs répandre tant de lumière sur la nomenclature.

Les ordres de M. Tourdes ne sont pas mieux fondés, du reste, que les classes, comme il sera facile de le voir par leur simple énumération; ces ordres, comme nous l'avons déjà indiqué, sont au nombre de dix-neuf; savoir : 1^o. cinq ordres pour la première classe, sous-divisés en neuf genres; 2^o. sept ordres pour la deuxième, sous-divisés en quatorze genres; 3^o. sept ordres pour la troisième classe, sous-divisés en vingt-huit genres.

Travaux; classification de M. le professeur Pinel. Un système de nomenclature entièrement fondé sur l'observation, & bien supérieur à tous ceux que nous venons de rappeler, a eu pour auteur, vers la fin du dix-huitième siècle, l'un de nos contemporains les plus recommandables, M. le professeur Pinel, dont le nom, si célèbre à tant d'autres titres, est devenu désormais, & comme celui de Willis, inséparable des institutions qui ont déjà contribué, ou qui pourront contribuer par la suite, à améliorer la situation des malheureux aliénés.

L'auteur de cet ouvrage si connu sous le nom de *Nosographie philosophique*, s'est renfermé à la vérité dans un cercle plus étroit que celui de Sauvages; mais il s'est fait des idées plus exactes des maladies en général, qu'il a distinguées avec soin de certains phénomènes généraux & purement symptomatiques, ou de certaines indispositions légères ou constitutionnelles, qui appartiennent

plutôt à une histoire des variétés de l'espèce humaine, qu'à un catalogue nosologique. En même temps, & par une heureuse application de l'analyse, M. Pinel a bien mieux déterminé les espèces qu'on ne l'avait fait avant lui, en rattachant l'ensemble ou les détails de son travail, aux progrès, soit de l'anatomie pathologique, soit de l'anatomie physiologique, dont il a ouvert en quelque sorte la carrière à l'ingénieux auteur de l'*Anatomie générale* & du *Traité des membranes*.

La méthode de classification de M. Pinel, qu'il suffiroit de parcourir pour apprécier les services qu'elle a rendus aux études médicales, ne comprend que les maladies appelées assez improprement *maladies internes*; & nous venons ici de la situation particulière dans laquelle l'auteur se trouvoit placé.

Suivant ce plan on admet, dans la nosographie philosophique, cinq classes, vingt-neuf ordres & soixante-seize genres.

Le principe de distribution est constant pour les classes que M. Pinel a fondées sur le mode de lésion; savoir : 1^{re}. classe, les *fièvres*; 2^o. classe, les *pleurésies*; 3^o. classe, les *hémorragies*; 4^o. classe, les *névroses*; 5^o. classe, les *lésions organiques*.

Le principe de distribution que M. Pinel a suivi pour l'établissement des classes, est employé pour les ordres de la première, qui sont au nombre de six, évidemment fondés sur le mode de lésion; savoir : 1^o. les *fièvres inflammatoires*; 2^o. les *fièvres bilieuses*; 3^o. les *fièvres muqueuses*; 4^o. les *fièvres adynamiques*; 5^o. les *fièvres ataxiques*; 6^o. les *fièvres adeno-nerveuses ou pestilentielles*.

Un autre principe de distribution a été mis en usage par le même auteur, pour les ordres de la deuxième classe, qu'il a rapportés au siège de l'affection morbide, & qui sont au nombre de cinq; savoir : 1^{er}. ordre, les *pleurésies cutanées*; 2^o. ordre, les *pleurésies des membranes muqueuses*; 3^o. ordre, les *pleurésies des membranes fibreuses*; 4^o. ordre, les *pleurésies du tissu cellulaire*; 5^o. ordre, les *pleurésies du tissu fibreux*.

La même base de classification se retrouve dans les quatre ordres qui comprennent les *hémorragies*; savoir : 1^{er}. ordre, les *hémorragies des membranes muqueuses*; 2^o. 3^o. & 4^o. ordres, les *hémorragies des systèmes fibreux, cellulaire & cutané*.

La quatrième classe, qui embrasse une plus grande variété d'objets que la troisième, a été partagée en quatre ordres, divisés en sous-ordres, à chacun desquels correspond un certain nombre de genres & d'espèces que nous allons indiquer dans l'énumération suivante.

CLASSE QUATRIÈME. NÉVROSES.

Ordre 1^{er}. *Névroses des sens.*1^{re}. *Sous-ordre. Névroses de l'ouïe.*2^o. *Sous-ordre. Névroses de la vue.*Ordre 2^o. *Névroses des fonctions cérébrales.*1^{re}. *Sous-ordre. Comets.*2^o. *Sous-ordre. Vénéries.*Ordre 3^o. *Névroses de la locomotion & de la voix.*1^{re}. *Sous-ordre. Névroses de la locomotion.*2^o. *Sous-ordre. Névroses de la voix.*Ordre 4^o. *Névroses des fonctions nutritives.*1^{re}. *Sous-ordre. Névroses de la digestion.*2^o. *Sous-ordre. Névroses de la respiration.*3^o. *Sous-ordre. Névroses de la circulation.*Ordre 5^o. *Névroses de la génération.*1^{re}. *Sous-ordre. Névroses génitales de l'homme.*2^o. *Sous-ordre. Névroses génitales de la femme.*

M. Picoel a suivi pour la cinquième classe, un mode de distribution analogue à celui qui a été employé pour le dénombrement des névroses.

CLASSE CINQUIÈME. LÉSIONS ORGANIQUES.

Changement dans la structure intime des organes.

Ordre 1^{er}. *Lésions organiques générales.*1^{re}. *Sous-ordre. Lésions organiques affectant en même temps la plupart des tissus.*2^o. *Sous-ordre. Lésions organiques affectant indifféremment tel ou tel tissu.*Ordre 2^o. *Lésions organiques particulières.*1^{re}. *Sous-ordre. Lésions organiques du cœur & des vaisseaux.*2^o. *Sous-ordre. Lésions organiques du système lymphatique ou hydropisies.*3^o. *Sous-ordre. Lésions organiques du tissu cellulaire.*4^o. *Sous-ordre. Lésions organiques du système pileux.*5^o. *Sous-ordre. Lésions organiques particulières du cerveau.*6^o. *Sous-ordre. Lésions particulières du poulmon.*7^o. *Sous-ordre. Lésions organiques particulières du foie.*8^o. *Sous-ordre. Lésions organiques particulières de la rate.*9^o. *Sous-ordre. Lésions organiques particulières des voies urinaires.*10^o. *Sous-ordre. Lésions organiques particulières du canal alimentaire.*

Tel est l'établissement des classes & des ordres dans le système nosographique de M. Picoel.

La formation des genres & des espèces n'offre pas un principe de distribution aussi uniforme. Ce principe porte, tantôt sur la marche continue ou in-

termittente de la maladie, tantôt sur ses complications, tantôt sur quelques phénomènes qui n'en sont pas inséparables, ou sur des apparences, sur des manières d'être plus ou moins importantes. Les genres sont au nombre de soixante-seize, & celui des espèces est beaucoup moins considérable que dans Sauvages & dans la plupart des autres nosographes.

Parmi les soixante-seize genres, dix-huit appartiennent aux fièvres & dans l'ordre suivant 1^{er}. & 2^o. *Genres. Fièvre inflammatoire, fièvre bilieuse, bilieuse continue.*

3^o. *Genre. Fièvre bilieuse; 4^o. G. fièvre gastrique intermittente; 5^o. G. fièvre muqueuse continue; 6^o. G. fièvre muqueuse rémittente; 7^o. G. fièvre muqueuse intermittente; 8^o. G. fièvre putride continue; 9^o. G. fièvre putride rémittente; 10^o. G. fièvre putride intermittente; 11^o. G. fièvre maligne continue; 12^o. G. fièvre ataxique rémittente; 13^o. G. fièvre ataxique intermittente; 14^o. G. peste continue; 15^o. & 16^o. G. peste rémittente & intermittente; 17^o. G. fièvre hectique continue; 18^o. G. fièvre hectique rémittente.*

Les genres, dans les phlegmasies, succèdent dans l'ordre qui suit, & en se fondant sur des caractères particuliers. *Genre 1^{er}. variolo. G. 2, varicelle. G. 3, rougeole. G. 4, scarlatine. G. 5, érysipèle. G. 6, zona. G. 7, éruption miliaire. G. 8, éruption urticaire; G. 9, pemphigus. G. 10, dartres. G. 11, teigne. G. 12, gale. G. 13, pityriasis. G. 14, psoriasis. G. 15, ophthalmie. G. 16, coryza. G. 17, otite. G. 18, angine gutturale. G. 19, angine trachéale. G. 20, catarrhe pulmonaire. G. 21, gastrite. G. 22, entérite. G. 23, dysenterie. G. 24, catarrhe vésical. G. 25, leucorrhée. G. 26, blennorrhagie. G. 27, aphtes. G. 28, frénésie. G. 29, pleurésie. G. 30, péritonite. G. 31, phlegmon. G. 32, oreillons. G. 33, éphélie. G. 34, péripleurésie. G. 35, endite. G. 36, hépatite. G. 37, néphrite. G. 38, rhumatisme musculaire. G. 39, rhumatisme fibreux. G. 40, goitre.*

Les genres des hémorragies ont été rapportés, comme les inflammations, aux divers éléments de l'organisation, qui en sont le siège, & aux diverses régions de ces éléments. Ils sont au nombre de six, savoir: *Genre 1^{er}. épistaxis. G. 2, hémoptysie. G. 3, hémorrhagie ou hémorrhagie par la surface muqueuse gastrique. G. 4, flux hémorrhoidal. G. 5, hématurie. G. 6, flux menstruel.*

Les genres beaucoup plus nombreux de la quatrième classe ou des névroses, ont été établis sur le mode de lésions des organes des sens ou des centres nerveux. *Genre 1^{er}. dyslexie (addition double ou audition affaiblie). G. 2, paracousie (addition confuse ou irrégulière, surtout lorsque*

les sons ont de la force & de l'acuité). *G. 3*, ténacité (perception morbide d'un son incommode sans causes extérieures). *G. 4*, surdité. *G. 5*, berlus. *G. 6*, diplopie (ou vue double des objets qui sont simples). *G. 7*, héméralopie (affaiblissement de la vue, qui ne permet de voir qu'avec une grande lumière). *G. 8*, nyctalopie (état opposé à l'héméralopie). *G. 9*, amaurose (opacité ferreuse ou privation complète de la vue). *G. 10*, agglutination. *G. 11*, catalepsie. *G. 12*, épistaxis. *G. 13*, hypochondrie. *G. 14*, mélanconie. *G. 15*, manie. *G. 16*, démence. *G. 17*, idiotisme. *G. 18*, somnambulisme. *G. 19*, hydrophobie. *G. 20*, névralgie. *G. 21*, tétanos. *G. 22*, convulsions. *G. 23*, paralysie. *G. 24*, convulsions des organes de la voix. *G. 25*, aphonie. *G. 26*, spasme de l'œsophage. *G. 27*, cardialgie. *G. 28*, pyrosis ou fer chaud. *G. 29*, vomissement. *G. 30*, dyspepsie (inappétence habituelle & digestions difficiles). *G. 31*, boulimie. *G. 32*, pica. *G. 33*, coliques. *G. 34*, colique de plomb. *G. 35*, ticus. *G. 36*, asthme. *G. 37*, conqueluche. *G. 38*, asphyxie. *G. 39*, palpitations. *G. 40*, syncopes. *G. 41*, anapnoë. *G. 42*, fatyrisme. *G. 43*, priapisme. *G. 44*, nymphomanie. *G. 45*, hystérie.

Vingt-six genres ont suffi pour la distribution de la cinquième classe, consacrée à des lésions organiques, malgré son étendue; savoir: 1^{er}, *Genre*, syphilis. *G. 2*, yaws. *G. 3*, scorbut. *G. 4*, strophules. *G. 5*, trachitisme. *G. 6*, éléphantiasis des Grecs. *G. 7*, éléphantiasis des Arabes. *G. 8*, tubercules. *G. 9*, cancers. *G. 10*, gangrène. *G. 11*, anévrysme du cœur. *G. 12*, rétrécissement des orifices du cœur. *G. 13*, anévrysme de l'aorte. *G. 14*, hémorroïdes. *G. 15*, anasarque. *G. 16*, hydrocéphale. *G. 17*, hydrothorax. *G. 18*, hydro-péricarde. *G. 19*, ascite. *G. 20*, endurcissement du tissu cellulaire. *G. 21*, piqure. *G. 22*, hydropisie enkystée du foie. *G. 23*, concrétions biliaires. *G. 24*, ictere des nouveau-nés. *G. 25*, diabète. *G. 26*, concrétions urinaires.

Cette rapide esquisse du système nosographique de M. Pinel suffira sans doute pour appuyer l'opinion que la méthode a de grands avantages sur toutes celles qui l'ont précédée. On distinguera plus particulièrement dans cette classification, & comme un des caractères de la supériorité, la confiance dans les principes de distribution qui se trouvent presque toujours rapportés, pour les classes, au mode de lésion, & pour les ordres, aux tissus organiques, ou à différentes régions du corps & à diverses fonctions dont le dérangement se présente comme la circonstance essentielle ou comme le symptôme principal de la maladie; méthode dont M. Pinel ne s'est écarté que dans un petit nombre de cas trop compliqués ou trop difficiles pour se prêter à la simplicité, ou à la rigueur de la théorie.

Un autre genre de mérite non moins grand

dans le travail de M. Pinel, résulte du soin & des efforts avec lesquels il a formé d'une manière entièrement nouvelle, le plus grand nombre de ses genres & de ses espèces, c'est-à-dire, en commençant par une suite d'observations sur un certain nombre de maladies individuelles, & en s'élevant, comme d'un point de départ, de certaines affections élémentaires bien reconnues, bien caractérisées par des exemples, pour arriver à des affections plus ou moins compliquées; travail immense, & pour lequel nous avons déjà remarqué que les archives de la médecine pratique ne fournissent pas toujours des matériaux convenables; de telle sorte que l'auteur d'est parvenu à l'exécuter qu'en faisant également usage des observations qui lui étoient propres & d'une étude aussi étendue que judicieuse.

Le savant auquel nous décernons sans restriction comme son partialité d'aussi justes éloges, a-t-il atteint complètement le but qu'il s'étoit proposé, & vers lequel on doit tendre, dans un système de nosographie philosophique? a-t-il apprécié le travail de Sauvages, tant en méritant quelques-uns des reproches qu'il lui a adressés? s'est-il rendu compte des hautes généralités de la nosologie? ses classes sont-elles également bien fondées? les maladies qui s'y trouvent rapprochées, ont-elles un nombre suffisant de rapports pour motiver cette réunion? les ordres ne laissent-ils rien à désirer, & le nombre des espèces est-il aussi restreint qu'il devoit l'être pour ne rien donner à une curiosité scientifique & pour se borner à faire ressortir les indications curatives? Parcourons rapidement ces différentes questions, dont l'examen nous conduira à mieux voir, qu'on ne l'a fait peut-être jusqu'à ce jour, le véritable but & les bases les plus solides d'une bonne nosographie.

Dans un système de nosographie, comme dans les méthodes nosologiques ou botaniques, on se propose de réunir & de combiner les choses que l'on veut distribuer dans un ordre tel, que les objets classés dans une catégorie quelconque s'y trouvent rapprochés comme dans la nature, c'est-à-dire, d'après un ensemble de rapport & de conformité qu'ils n'ont pas avec les objets que l'on a rassemblés dans toute autre partie du même tableau; arrangement, coordination véritablement philosophique, qui se rapprocheront d'autant plus de la perfection, qu'ils conserveront un plus grand nombre de ces groupes ou de ces partitions, que l'on a désignés sous le nom de *familles naturelles*.

Le système de M. Pinel, s'éloigne évidemment dans plusieurs de ces parties, d'une disposition aussi heureuse & aussi désirable.

Un simple coup d'œil sur le cadre que nous venons de rappeler y fera aisément percevoir, relativement au point qui nous occupe, plusieurs

lacunes & plusieurs imperfections. Citons des exemples ou parcourant successivement les divers parrus de ce cadre.

Le groupe naturel des fièvres intermittentes & la division particulière des fièvres perniciosues ont été détruits, & les membres éparés de ces familles se sont pas aussi liés avec les fièvres bilieuses, muqueuses, ataxiques, dont on les a rapprochés, qu'ils le sont entr'eux, lorsque l'on considère la nature de la maladie ou le caractère des indications curatives.

La variole, la scarlatine, la rougeole, rapportées à l'ordre des phlegmasies cutanées, appartenaient bien moins à la classe des inflammations qu'à la classe des pyrexies, dans laquelle M. Pinel auroit dû naturellement les placer, à l'exemple de tous les praticiens, sous le nom de *fièvres éruptives*, & de manière à établir une transition entre les inflammations & les fièvres: distribution qui auroit servi eu même temps à donner une idée plus exacte de la nature de ces maladies, de leur affinité particulière, & du mode de traitement relatif à cette affinité.

Les dartres, la teigne, la gale, placées dans la même classe, à côté du pemphigus & de l'érysipèle, n'ont que très-peu de rapport avec ces affections morbides; elles formeroient au contraire une *famille naturelle* très-bien établie sous le nom d'*exanthèmes constitutionnels & chroniques*, avec la pique & les éléphantiasis, qui ont été rejetés dans la cinquième classe.

Les névralgies, le rhumatisme, la goutte, la gravelle, qui ont également beaucoup d'analogie, & dont la nature seroit mieux appréciée si on les réunissoit sous le nom de *fluxions douloureuses*, ainsi que le professeur Hallé l'auroit proposé, se trouvent placés à une très-grande distance les uns des autres, dans le système de M. Pinel, savoir, le rhumatisme & la goutte dans la classe des *phlegmasies*, les névralgies dans les *névroses*, & les irritations calculées dans la cinquième classe, c'est-à-dire, parmi les *lésions organiques*.

Cette cinquième classe nous paroît d'ailleurs beaucoup plus déficiente que les précédentes: son titre de lésions organiques supposeroit qu'il existeroit des maladies sans altération d'organe; ce qui seroit évidemment contraire aux idées de l'auteur & à l'état présent des connoissances pathologiques; en conservant même cette division, sous une dénomination plus convenable, il eût été important de remarquer qu'elle a beaucoup trop d'étendue, qu'elle embrasse des objets trop différens pour ne former qu'une seule classe; réflexion qui auroit pu conduire M. Pinel à rapporter, d'après la méthode dichotomique, toutes les maladies à deux grandes sections; savoir: 1°. les maladies avec lésion organique passagère, & souvent inappréciable; 2°. les

maladies avec lésion organique appréciable & permanente. Chaque section eût ensuite été subdivisée par classes, en introduisant d'ailleurs dans ce système de classification, plusieurs classes dont quelques-unes sont indiquées par Sauvages, & que M. Pinel auroit dû conserver, après les avoir modifiées, suivant les vus d'une judicieuse critique (1).

De reste, les familles catarrhales que M. Pinel auroit pu souvent respecter & laisser à leur rang, d'après ses principes de classification, sont assez nombreuses, soit dans les classes, soit dans les ordres ou même parmi les genres. Nous nous bornerons à indiquer les fièvres intermittentes que nous avons déjà citées, les fièvres éruptives contagieuses, les fièvres éruptives non contagieuses, les exanthèmes aigus, les exanthèmes constitutionnels & chroniques, les fluxions fébriles (flux), les fluxions douloureuses, les maladies convulsives, les maladies mentales, &c. &c.

Sauvages, dont la méthode étoit comme celle de Linné, entièrement artificielle, s'est encore bien plus éloigné que M. Pinel du véritable objet d'une bonne nomenclature, soit en ne réunissant qu'un petit nombre de familles naturelles, soit en réunissant sous un même titre, des affections morbides qui n'avoient entr'elles aucune similitude importante, ou qui même ne pouvoient pas être regardées comme des maladies. Son illustre successeur, à l'observation duquel des fautes aussi graves n'ont point échappé, a eu parfois le malheur d'en commettre de semblables, au point même de confondre à son tour, dans le décombrement nomenclastique, des phénomènes purement consécutifs ou symptomatiques, avec les maladies; reproche qu'il méritoit surtout par la manière dont il a établi le plus grand nombre de ses névroses partielles, dans le tableau défectueux on ne voit pas, sans en être surpris, la *voix convulsive* (2), l'*aphonie* (3), le *lerchaud* (4), la *dyspepsie* ou *inappétence* (5), le *pica* ou l'*appétit dépravé* (6), les *palpitations* (7), le *vomissement* (8), &c. On n'est pas moins étonné sans doute de trouver placées au

(1) Les augmentations morbides de liquide, sous le nom de *flux*; les altérations constitutionnelles des parenchymes (*CACHEXIES*), les *vésantes* ou *maladies mentales*, que M. Pinel a rapportées à un 2°. sous ordre des névroses; les *fièvres morbides*; division qui auroit permis de rapprocher, d'une manière très-philosophique, les *affections vermineuses*, les *catarrhes chroniques*, la *diabète*, l'*asthme*, &c. &c.

(2) Genre 24°. des *névroses*.

(3) Genre 25°. de la même classe.

(4) Genre 26°.

(5) Genre 30°.

(6) Genre 32°.

(7) Genre 39°.

(8) Genre 29°.

rang des maladies, dans le même système, les concrémens urinaires (1), les vers intestinaux (2), &c. En outre, il est pénible de voir que, dans son introduction, M. Pinel n'a point, à l'exemple de Sauvages, donné aucune importance ni à la nomenclature nosographique, ni aux principes sur lesquels un bon système de classification des maladies devoit être fondé : sujet de méditation bien important à développer à l'époque où la nosographie philosophique a été publiée, ainsi qu'il sera facile de s'en convaincre, en parcourant nos rapides aperçus ou les réflexions judicieuses que Bayle a placées dans sa dissertation inaugurale.

La troisième question qui se présente dans cet examen critique de la nosographie, devoit nous porter à discuter avec détail les ordres, les classes, ou même les genres & les espèces adoptés dans cette nosographie ; mais une grande partie de cet objet se trouve déjà remplie dans les considérations précédentes.

Les classes de M. Pinel, si l'on en excepte la cinquième, sont bien établies, & sur un même principe de distribution (le mode de lésion) ; mais il reste à désirer que certains groupes de maladies, qui ont beaucoup de rapport avec les familles naturelles des botanistes ou des zoologistes, soient retirés de la classe où ils se trouvent placés, contre toute espèce d'analogie dans la nature respective de leurs principaux phénomènes : remarque que nous avons déjà faite pour les affections éruptives aiguës, les exanthèmes constitutionnels & chroniques, les névralgies & les maladies cutanées, & qu'il faut également étendre au genre annexé des fièvres hémiques, à l'embarras gastrique, & aux fièvres hépatiques, qui ne devoient pas être compris dans la classe des pyrexies.

Il sera également facile de reconnaître que M. Pinel auroit dû agrandir le domaine de ses classes, & ne pas toujours dédaigner quelques-unes des divisions établies par Sauvages, lors même que, pour les introduire, il eût fallu faire fléchir la théorie devant les traditions empiriques, si d'ailleurs on avoit trouvé un nombre suffisant de conformités & de rapports pour ces introductions (3).

La sous-division des classes en ordres & la formation des genres & des espèces laissent du reste dans l'ouvrage de M. Pinel une part beaucoup plus grande à la critique que l'établissement de ces mêmes classes : ainsi, avant de partager

les fièvres en ordres, il eût été nécessaire de les rapporter d'abord à deux grandes sous-classes, d'après deux caractères de la plus haute importance (la continuité & l'intermittence dans les phénomènes morbides) ; chaque sous-classe eût ensuite été divisée en ordres, les uns comprenant ni l'embarras gastrique, ni les fièvres hémiques, qui s'y trouvoient remplacés par les affections éruptives aiguës, sous le nom de *fièvres éruptives contagieuses* & de *fièvres éruptives non contagieuses*.

Il n'eût pas été moins utile de rapporter à deux sous-classes les phlegmasies ; savoir : deux ordres de phlegmasies, 1^o les phlegmasies simples, 2^o les phlegmasies exanthématiques ; division que l'on établit constamment dans la pratique, & dont le titre indique, soit dans la nature de ces maladies, soit dans leur mode de traitement, un ensemble de similitudes & de rapports, que l'on chercheroit vainement dans la classification plus scientifique de M. le professeur Pinel.

Parmi les ordres que nous voudrions voir rapportés à ces titres, soit dans les fièvres, soit dans les phlegmasies, plusieurs ne sont ni convenablement établis, ni convenablement désignés. Ainsi, l'ordre des fièvres, si peu convenablement indiqué sous le nom de *fièvres adynamiques*, ne peut être regardé que comme un sous-ordre, ou même comme un genre de fièvres ataxiques, auquel il auroit fallu ajouter un nouveau genre, celui des *typhus* proprement dits, ou des fièvres typhoïdes, sur la véritable nature & la véritable place desquelles M. Pinel ne s'est pas convenablement expliqué. Quant à son ordre des fièvres hépatiques, nous avons déjà remarqué qu'il étoit véritablement déplacé parai les fièvres, & nous ajouterons que si l'on vouloit l'admettre, il faudroit aussi reconnaître des fièvres *pleurétiques*, *entériques*, *gastriques*, *cystitiques*, *nutritives*, &c. &c. ; l'inflammation de la plèvre pulmonaire, celles des intestins, de l'estomac, de la vésicule du fiel, de l'utérus, n'existant presque jamais sans fièvre, du moins à l'état aigu.

L'ordre des phlegmasies cutanées, en admettant même que l'on pût rapporter aux inflammations, les maladies qu'il comprend, & l'inconvénient grave de rapprocher plusieurs affections morbides qui ont entr'elles très-peu d'analogie, les affections éruptives aiguës, contagieuses & non contagieuses, par exemple, telles que la variole, la rougeole, la scarlatine, & les exanthèmes chroniques, les dartres, la teigne, qui devoient au contraire être compris dans une seule & même famille, avec les érythémateux, la lepre, la plaie, rejetés par M. Pinel dans la cinquième classe.

La famille des phlegmasies cutanées, judicieusement établie par M. Pinel dans ce même ordre des phlegmasies de la peau, auroit dû être agrandie, pour y comprendre les anchara, les

(1) Genre 26 de la 5^e classe.

(2) Genre annexé, du 1^{er} sous-ordre, de la même classe.

(3) Cette remarque s'applique surtout aux *véfies* de Sauvages, à ses *flux*, à ses *catarrhes*, en les considérant comme une altération générale des parenchymes, &c.

charbon, les inflammations pernioeuses & gangréneuses. Les autres ordres de la même classe, uniquement rapportés aux membranes & aux divers tissus organiques qui peuvent être affectés d'inflammation, ont été adoptés avec empressement par tous les praticiens, & doivent être placés au premier rang, parmi les canons de la révolution qui s'est opérée dans la médecine depuis quelques années, par une impulsion dont l'honneur appartient tout entier à l'école de médecine de Paris.

On désireroit seulement que parmi ces phlegmasies des divers éléments organiques, l'auteur eût distingué le catarrhe simple, du catarrhe chronique, & qu'il n'eût pas considéré comme une affection du tissu fibreux, la goutte, qui est essentiellement une affection constitutionnelle spéciale, & non moins caractérisée par son origine, par son développement, & même par les aberrations, que par le siège ou la nature des douleurs qui se manifestent dans ses attaques périodiques & régulières.

Les ordres de la classe suivante (classe des hémorragies) n'ont été admis qu'en sacrifiant la pratique à la théorie, puisque de l'aveu de l'auteur, trois de ces ordres ne sont pas assez connus, les hémorragies du système fibreux & les hémorragies des systèmes cellulaires & cutanés.

Il auroit évidemment suffi de n'admettre que des genres dans cette classe qui pourroit n'être considérée que comme un ordre, si le nomenclateur ne devoit pas respecter les divisions généralement, & je dirais presque populairement établies, lorsqu'elles n'offrent rien de contraire à une pratique judicieuse & éclairée.

Les ordres compris dans la famille des névroses, ne sont pas mieux fondés que la plupart en général, toute l'histoire de cette classe est peinte la partie la plus défectueuse du grand tableau, dont elle fait partie. Nous avons déjà remarqué que plusieurs des ordres dans lesquels les symptômes des névroses partielles avoient été rangés, n'offroient pas même de véritables maladies, mais bien des phénomènes purement consécutifs ou symptomatiques. D'une autre part, ce qui concerne les vésanies a trop d'étendue & trop peu d'analogie d'ailleurs avec les affections comateuses, qui en font voisines dans la classification de M. Pinel, pour ne pas être le sujet d'une classe, non moins séparée en quelque sorte de toutes les autres, que les facultés mentales le sont elles-mêmes, des phénomènes qui appartiennent à la physiologie; de telle sorte que l'étude spéciale & empirique de ces facultés, est la première des conditions pour étudier convenablement les maladies mentales.

Ce que nous disons des vésanies, s'applique aux névralgies qui sont rapportées à un genre, & qui sont indiquées d'une manière si opposée à leur na-

ture, comme des névroses de la locomotion, quoique la douleur, l'altération de la sensibilité, & le dérangement d'un grand nombre de fonctions qui dépendent de cette altération, les caractérisent bien davantage qu'une perversion quelconque de l'action musculaire. En donnant plus d'importance à la pratique qu'à des vues trop rigoureuses sur un principe de distinction rapporté au siège des phénomènes morbides, M. Pinel auroit aisément aperçu lui-même ces défauts, & sans doute il eût été porté par la même voie, à reconnaître un groupe de névralgies internes, dans lequel seroient venus se placer naturellement la cardiologie, le pyrosis, les dépravations gastriques, les coliques, & surtout la colique de plomb, l'asthme nerveux, l'angine de poitrine, certaines hypochondries, certaines hydropies, quelques éolozes névralgiques, &c.; affections morbides qui souvent, à la vérité, il est plus facile de soupçonner que de démontrer, mais dont les aperçus que nous indiquons ici concernant leurs classifications, sont bien plus liés à des idées de pratique que l'opinion qui les rapporte vaguement à la famille des névroses, quoiqu'il soit impossible de reconnaître aucune influence des centres nerveux dans le développement de ces maladies.

L'établissement des genres & des espèces, qui sont d'une plus haute importance & d'une plus grande difficulté en nomenclature qu'en histoire naturelle, a été pour M. Pinel, le sujet d'une longue méditation & d'une suite d'efforts qui ont apporté des améliorations nombreuses dans cette partie de la science. Toutefois, il a laissé encore beaucoup à faire sous ce rapport, & tout juge impartial de son travail, avouera avec Bayle, que le savant auteur de la nomenclature philosophique, n'a point assez réduit la nombre de ses genres & de ses espèces.

« Je prendrai, dit l'auteur que je viens de citer, je prendrai deux exemples dans la classe des phlegmasies, pour justifier ma manière de voir à cet égard.

« 1°. La variole discrète & la variole confluente ne sont-elles pas simplement des variétés de la même espèce? Les différences qu'elles présentent ne suffisent pas pour en former deux espèces. Voit-on les botanistes former deux espèces du chèvrefeuille mâle & du chèvrefeuille femelle? Ce ne sont que des variétés constantes & naturelles. Le sureau commun (*Sambucus nigra*) & le sureau à feuilles laciniées, ne sont regardés que comme des variétés, quoique leur aspect soit fort différent. D'ailleurs, ne fait-on pas que la variole confluente imculée, produit indistinctement, tantôt une variole discrète, tantôt une variole confluente? Que faut-il de plus pour caractériser leur identité spécifique?

« 2°. Ne diminueroit-on pas avantageusement le nombre des espèces & des genres, en rapprochant

sous un seul genre, les maladies qui ont les plus grands rapports dans leur nature intime; par exemple, en formant un seul genre des phlegmasies des membranes muqueuses? Les espèces de ce genre seroient les suivantes :

- a 1^{re}. *Espèce*. Catarrhe de la membrane qui tapisse les voies aériennes;
- 2^e. Dysenterie;
- 3^e. Aphthes;
- 4^e. Catarrhe de la vessie urinaire;
- 5^e. Blennorrhagie;
- 6^e. Lencorrhée;
- 7^e. Ophthalmie.

On devroit regarder comme des variétés de ces espèces, celles que l'on regarde comme des espèces particulières, par la seule raison qu'elles procèdent de causes occasionnelles différentes; & comme complications, celles que l'on nomme *espèces compliquées*. On donneroit l'histoire naturelle de chaque espèce: de manière qu'en traitant de la première espèce du genre que je viens de proposer, on parleroit de l'enclenchement, du coryza, de l'enrouement, du rhume, de la fièvre catarrhale, de l'angine bronchiale de Stoll, & peut-être du eroup & de certains autres affections rangées parmi les angines. Toutes ces lésions ne doivent être regardées que comme des modifications différentes de la même maladie, & ne peuvent constituer des espèces diverses. Il y a entr'elles bien moins de différence qu'entre le ver à soie à peine éclos, le ver à soie qui file, la chrysalide du même insecte, & enfin la phalène qui sort de cocon; cependant, on n'a jamais pensé que les différences que présente cet animal dans ces quatre états, fussent suffisantes pour le distinguer en quatre espèces.

Il est indubitable, d'après ce que nous avons dit plus haut, que moins les espèces seront nombreuses, plus elles seront naturelles, & plus il sera facile d'y rapporter les maladies individuelles, ce qui donnera à la nosologie, les bases les plus solides.

Les noms sont indispensables pour rappeler à la mémoire les espèces caractérisées, mais lorsqu'ils se multiplient trop, ils surchargent la science, tandis que d'un autre côté, les mauvaises dénominations sont extrêmement préjudiciables. Pour prévenir ces inconvénients, il seroit utile d'établir des règles constantes de nomenclature, & de les suivre, en donnant aux maladies des noms génériques & triviaux. Linné & Sauvages ont développé à cet égard des principes excellents.

On doit conserver toute dénomination grecque ou latine reçue, excepté quand elle est évidemment mauvaise, & la définir dans le cas où sa signification seroit devenue vague par l'abus que l'on en auroit fait dans les livres.

Quand ces noms sont insuffisants, ceux qu'on

inventera seront simples, & tirés du grec ou du latin, pour être facilement entendus & adoptés par les savans de tous les pays.

Ils ne doivent être tirés de rien de ce qui est variable dans la science, quoique d'ailleurs, paroissant incontestable. Cell pour n'avoir pas suivi ce principe, que l'on voit les noms de *fièvre méningo-gastrique*, succéder à celui de *fièvre bilieuse*, celui de *fièvre adynamique* à celui de *fièvre putride*, &c., & qu'indubitablement ces nouveaux noms seroient dans la suite remplacés par d'autres (1).

Nous ne donnerons pas plus d'étendue à cet examen du système nosographique de M. Pinel, bien qu'il soit dans notre conviction personnelle, que ce qui concerne l'éloge & la critique de cet important travail, est loiu d'être épuisé par ce petit nombre de considérations.

Cet examen, & les réflexions qui l'ont précédé, ont fait ressortir, je pense, quelques-unes de vérités fondamentales que doit embrasser la *philosophie nosologique*, & qui n'auroient pas été sans doute aussi bien comprises, ni aussi bien apprécies, si elles n'avoient pas été exposées dans un cadre historique.

De l'état présent de la nosographie, & des bases de classification proposées par l'auteur de cet article. Essayons maintenant, en prenant ces vérités fondamentales pour guides, de tracer rapidement les parties principales de l'ordre dans lequel il paraît convenable de comprendre aujourd'hui l'ensemble des affections morbides, sans séparer d'ailleurs ce que l'on appelle la *nosologie chimurgicale*, de la nosographie interne & de l'histoire des maladies organiques; travail dont les développemens devroient d'ailleurs sans objet, si d'une part, le principe de distribution étoit trop artificiel pour être invariable, & si d'une autre part, on n'avoit pas uniquement pour objet, de faire ressortir dans les divisions & sous-divisions, les médications curatives, en conservant le plus grand nombre des groupes généralement reconnus par les praticiens, & qui ne sont pas sans analogie avec les familles naturelles des botanistes & des zoologistes.

Un système complet de nosographie, exposé d'après cette première donnée, doit comprendre, mais sans les confondre, ainsi que Sauvages le fait constamment, & les maladies bien caractérisées par l'ensemble, par la succession d'un certain nombre de symptômes principaux, & les divers phénomènes que l'on rencontre dans le plus grand nombre des maladies, sans appartenir à aucune. Le hoquet, par exemple, le vomissement, la

(1) *Considérations sur la nosographie, la médecine d'observation, la médecine pratique*, 6^e Paris, 1802. Thèse, in 8^e, n^o 70.

teux, que l'on cherche vainement dans le dénombrément de M. Pinel, & qui ne sont point placés dans les tableaux des autres nosologistes.

Du reste, on doit abandonner la dénomination de *maladie* ou d'*altération de propriétés*, que l'on a voulu récemment introduire dans le vocabulaire de la pathologie, pour l'opposer aux altérations de tissus.

Aucune affection morbide ne peut être supposée indépendante d'une altération ou d'une lésion d'organe quelconque, plus ou moins visible, déterminée ou indéterminée, temporaire ou permanente, primitive ou secondaire, se manifestant tantôt par un simple dérangement dans les fonctions, tantôt par des changements appréciables dans la forme ou la structure des parties, & quelquefois par ces deux genres de phénomènes.

D'après ces réflexions préliminaires, & en procédant d'une manière conséquente aux principes qui ont été énoncés dans divers passages de cet article, nous pensons qu'il faut rapporter les différentes classes de maladies à deux sections principales; savoir:

1^{re}. Section. *Maladies avec lésion organique passagère & souvent inappréciable.*

2^e. Section. *Maladies avec lésion organique appréciable & permanente.* L'énumération qui suit, & que nous allons tracer de la manière la plus rapide, a pour objet d'indiquer & de montrer à leur véritable place, sans caractère artificiel & avec un ensemble suffisant d'analogie, les classes, les sous-classes & les ordres de maladies qui nous paraissent se ranger naturellement dans les deux sections que nous avons admises, & dont chacune pourroit être regardée comme un système particulier de pathologie.

Première section.

Maladies avec lésion organique passagère & souvent inappréciable.

La classe des *fièvres* (*Pyrexies* de Sauvages) se trouve au premier rang dans cette section. Nous n'examinerons point ici la grande question de savoir s'il existe réellement des fièvres essentielles ou primitives, & si la fièvre, comme le prétendent quelques pathologistes modernes, ne devroit pas être regardée, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaisse, comme l'effet, la conséquence particulière d'un organe irrité ou enflammé; question qui sera examinée avec toute l'attention qu'elle mérite dans un autre article de ce Dictionnaire. (*Voyez* *Phlegmasie* & *Pyrexie*.)

Nous admettons provisoirement ici l'opinion généralement adoptée par les praticiens de tous les pays & de tous les âges, & nous ne considérons, d'ailleurs, les fièvres que sous le point de

MÉDECINE. Tome A.

vue de leur classification, sans avoir égard, ni à leur nature, ni à leurs causes prochaines. La continuité & la suspension de leur marche sont deux circonstances si constantes & si remarquables, que tous les praticiens les ont rapportées d'un commun accord à deux divisions, que nous croyons pouvoir regarder comme deux sous-classes; savoir: 1^{re}. *sous-classe, les fièvres continues*; 2^e. *sous-classe, les fièvres intermittentes*: distribution presque populaire, que M. Pinel auroit dû respecter, avec d'autant plus de raison que d'excellentes observations publiées par M. Fizzani, ont démontré que les types quotidiens, quartes & tierces des fièvres intermittentes, n'avoient pas une connexion nécessaire avec la fièvre muqueuse ni avec la fièvre bilieuse, ainsi que l'a prétendu le savant auteur de la *Nosographie philosophique*.

Les deux sous-classes que nous venons d'indiquer comprennent les ordres suivants, composés d'un petit nombre d'espèces dont il n'est guère possible de former des genres sans développer inutilement un appareil scientifique.

Fièvres continues, & quelquefois avec ou sans rémission.

1^{er}. Ordre. *Fièvre inflammatoire* { éphémère.
prolongée.

2^{er}. Ordre. Lié au précédent, & composé des fièvres éruptives, division qui, elle-même, est formée de deux genres bien distincts; savoir:

1^{er}. Genre. *Les fièvres éruptives contagieuses* (1).

2^e. Genre. *Les fièvres éruptives non contagieuses* (2).

3^e. Ordre. *Fièvre bilieuse* { simple, catarrhale.
bilioso-inflammatoire.

4^e. Ordre. *Fièvre muqueuse*.

La circonstance d'une irritation gastrique dans la fièvre muqueuse, le développement d'une disposition vermineuse, l'apparition des aphides, ne nous paraissent ni assez constants, ni assez importants, pour en former, à l'exemple de la plupart des nosographes, des caractères d'espèces. Il n'en est point ainsi de la continuité & de la rémission, ni de la complication avec une sorte d'ataxie; dispositions d'après lesquelles on peut établir les trois espèces suivantes. Savoir:

1^{re}. *Fièvre muqueuse continue*.

2^e. *Fièvre muqueuse rémittente*, sous les différents types de tierce, quarte, quotidiens, qui forment autant de variétés.

3^e. *Fièvre lente nerveuse*, de Huxham.

(1) Ce genre est composé de cinq espèces, 1^{re}. la variolo, 2^e. la varicelle, 3^e. la vaccine, 4^e. la rougeole, 5^e. la scarlatine.

(2) Quelques fièvres miliaires, & les fièvres éruptives anomales.

5°. Ordre. *Fièvre adynamique ou putride.*

6°. Ordre. *Fièvre ataxique.*

Les différentes espèces que l'on rapporte au premier de ces ordres, sont fondées sur la complication de la fièvre principale avec d'autres fièvres ; principe de distribution très peu convenable, sans doute, mais qu'il seroit peut-être difficile de remplacer dans l'état présent des connaissances.

Quant aux fièvres ataxiques, si on les considère sous un point de vue général, & surtout si l'on comprend sous ce titre les affections épidémiques & pestilentielles les plus désastreuses, on pourra trouver dans leur mode de développement, dans les régions du globe où elles apparaissent, & dans la nature de certains symptômes graves & funestes, des bases de classification beaucoup moins incertaines, & d'après lesquelles nous croyons qu'il est facile d'établir les genres suivants :

1°. Genre. *Fièvre ataxique, sporadique, spontanée ou indéterminée.*

2°. Genre. *Fièvre des prisons, typhus carcénaire, ou nosocomial.*

3°. Genre. *Fièvre pestilentielle*, ordinairement renfermée dans la portion orientale de l'Asie, & dans quelques parties de l'Afrique.

4°. Genre. *Fièvre sudatoire*, ou *fièvre de Londres, fièvre des Picards*, si redoutable dans le quinzième siècle & dans le seizième, qui ne parait pas avoir jamais dépassé le 40°. ou le 42°. degré de latitude.

5°. Genre. *Fièvre jaune*, ou *typhus idiole*, qui semble appartenir aux contrées les plus chaudes du Nouveau-Monde, observée & décrite pour la première fois vers la fin du dix-septième siècle, & transportée en Espagne au commencement du dix-huitième.

6°. Genre. *Fièvre des prisons* (1).

FIÈVRES INTERMITTENTES.

Deux ordres bien tranchés, les *fièvres intermittentes simples* & les *fièvres pernicieuses*, sont compris dans cette sous-classe, & se trouvent formés eux-mêmes de plusieurs genres, fondés sur la durée de l'intermittence ; ce qui donne, 1°. les fièvres tierces, les fièvres quarts, les fièvres quotidiennes simples ; 2°. les fièvres tierces, les fièvres quarts, les fièvres quotidiennes pernicieuses, sous-divisées en un grand nombre d'espèces, suivant la prédominance de certains symptômes constants, & d'après lesquels Torti a composé son arbre pyrétologique.

La *Deuxième classe*, qui se lie par plusieurs genres intermédiaires à la première, comprend un assez grand nombre de groupes de maladies

qui ont entr'eux de grandes analogies, & que tous les pathologistes s'accordent à ranger sous le titre de *phlegmasies*. Ces groupes, qui forment de véritables familles naturelles de maladies, présentent une soite d'ordres dont les caractères sont établis d'après un principe constant de distribution (le siège des principaux symptômes de ces affections). Voici ces ordres, d'après quelques modifications, dans la classification de M. Pinel.

1°. Ordre. *Phlegmasies exanthématiques*, qui unissent les inflammations aux pyrexies, par les fièvres éruptives, & qui se composent du genre *érysipèle, pemphigus, furoncles, anthrax, charbon, pustules*, &c.

2°. Ordre. *Phlegmasies des membranes muqueuses*, dont plusieurs genres & plusieurs espèces, ou même plusieurs variétés, sont caractérisés par des phénomènes importants sous le rapport des indications curatives.

3°. Ordre. *Phlegmasies des membranes séreuses.*

4°. Ordre. *Phlegmasies des membranes fibreuses.*

5°. Ordre. *Phlegmasies du tissu cellulaire & des parenchymes.*

6°. Ordre. *Phlegmasies des nerfs (névrites).*

7°. Ordre. *Phlegmasies des vaisseaux (phlébites).*

La *Troisième classe*, beaucoup moins étendue que les précédentes, comprend les hémorragies qui se rapportent à trois ordres fondés sur un seul & unique principe de distribution, le mode de l'écoulement sanguin & les indications curatives qui en sont la conséquence. Ces trois ordres sont : 1°. Ordre, les hémorragies actives ; 2°. Ordre, les hémorragies passives ; 3°. Ordre, les hémorragies traumatiques. Les hémorragies actives sont toujours précédées d'un état d'irritation & de congestion qui n'est pas toujours suivi d'un écoulement sanguin, & que l'on désigne sous le nom de *pléthore générale*, ou de *plénitude partielle*, beaucoup plus redoutable du côté du cerveau, où il porte le nom de *coup de sang*, de *prodrome apoplectique*, dénomination que l'on a voulu étendre, dans ces derniers temps, au pommex, au foie, & même à la peau.

Le plus grand nombre des hémorragies actives s'opère à la surface des membranes muqueuses & dans tous les tissus abondamment pourvus de vaisseaux capillaires : leurs divers genres sont établis d'après le siège de ces hémorragies ; tels sont : 1°. genre, l'hémorragie cérébrale ; 2°. genre, l'épistaxis ; 3°. genre, l'hémoptysie ; 4°. genre, l'hématurie ; 5°. genre, l'hématurie ; 6°. genre, la métrorrhagie.

On admet des dénominations & des bases semblables pour les hémorragies passives.

Les hémorragies traumatiques, qui présentent toutes les mêmes indications curatives, la ligature, la compression, l'exclusion quelconque du vaisseau ouvert, ne pourroient être divisées & sous-divisées en genres & en espèces, que d'une manière purement théorique.

(1) Cette distribution des fièvres ataxiques se rapporte, comme il est facile de s'en apercevoir, à quelques vues particulières sur la pathologie spéciale de ces fièvres.

Deux groupes d'affections morbides, non moins généralement reconnus dans la pratique que les divers ordres d'hémorragies qui viennent d'être indiqués (les hydropisies & les flux de Sauvages), contribuent à former une classe que nous croyons devoir désigner & caractériser sous le titre d'*affections*, d'*augmentations morbides*, dans les *secrétions*; division très-étendue, & dans laquelle viennent naturellement se ranger les catarrhes simples, aigus ou chroniques, l'ostéite, les hydropisies actives & passives, l'emphyseme, le diabète & le choléra-morbus qui ont cette classe à celle des névroses affections morales qui, sans avoir entre elles cette connexion, ce caractère des familles, que l'on observe entre les divers genres d'inflammation ou d'hémorragie, ont cependant un nombre de rapports suffisant pour être rapprochés sous un titre générique; de telle sorte qu'aucune de ces maladies ne soit aussi convenablement placée dans aucune autre classe que dans celle où nous les réunissons; disposition qui est le véritable critérium de toute bonne distribution nosographique.

Ce nombre de rapports suffisant pour établir une classe, nous le trouvons également entre le rhumatisme, la gonorrhée & la névralgie; trois ordres de maladies qui réunissent d'une manière évidente tous les caractères d'une famille naturelle, & que nous groupons sous le titre de *fluxions douloureuses*, en laissant d'ailleurs honneur de ce rapprochement à notre savant maître Hallé, qui l'a souvent indiqué, d'après des vues pratiques, soit dans ses leçons, soit dans les épreuves manuelles des candidats pour la médecine clinique ou pratique. Voyez, pour les divisions & sous-divisions, les mots NÉURALGIE, PŒMONIE, RHEUMATISME.

Cette série, composée de fluxions douloureuses, forme notre première classe. Celle que nous désignons, avec la plupart des nosographies, sous le titre de *névroses*, n'a presque rien de commun que le nom avec la grande famille désignée sous le même titre par M. Pinel; elle constitue notre cinquième classe. Voyez NÉVROSES (Affections), NÉVROSES.

À l'exemple de Sauvages, nous plaçons au rang des classes, la série si importante & si étendue des maladies mentales, primitives & consécutives, sous le titre de *névroses*; d'où notre septième classe. Voyez MENTALES (Médecine & Maladies mentales), VÉSICALES.

DEUXIÈME SECTION.

Maladies avec lésion organique, permanente & appréciable (ALTERATIONS, MALADIES ORGANIQUES).

Le plus grand nombre des maladies que nous comprenons dans cette section, fait une marche

chronique, & quelques-unes ont été précédées de maladies aiguës (1), principalement de maladies inflammatoires, dont elles sont la suite ou la conséquence inévitable. D'autres affections, renfermées dans le même cadre, ont une origine différente & dépendent d'une altération générale ou constitutionnelle, quelquefois originaire (2), quelquefois acquise (3) & même provoquée par des causes violentes de lésions (4), ou communiquée d'une manière contagieuse (5).

Du reste, les maladies avec lésion organique prolongée ou permanente, ont cela de remarquable, que plusieurs d'entr'elles constituent plutôt des infirmités incurables, des dyscrasies ou des variétés morbides de l'espèce humaine, que de véritables maladies; tandis que les autres, dont la place est bien plus évidemment assignée dans le cadre nosographique, sont principalement l'objet de la nosographie chirurgicale dans les écoles.

Toutes ces affections morbides, quelle que soit d'ailleurs leur gravité ou leur nature, doivent être distinguées avec soin des nombreuses lésions organiques, qui ont été étudiées & classées avec tant de soin dans ces derniers temps, & dont la connaissance répand une si vive lumière sur la partie de la nosographie qui nous occupe en ce moment.

Plusieurs de ces lésions se rencontrent indistinctement dans un grand nombre de maladies, suivant leur degré d'intensité ou le mode de leur terminaison, sans leur appartenir essentiellement, & sans fournir des principes de classification, même pour les genres ou les espèces. Ainsi, les fausses membranes, dans les inflammations des surfaces muqueuses, la formation des cicatrices & du cal, la formation du pus, les adhérences, le développement des kistes autour des liquides épanchés, ou à la circonférence des corps étrangers, l'excrétion morbide qui produit les incrustations propres à la terminaison de la gonorrhée, & sous le nom de *tophus*, l'ossification & plusieurs autres transformations diverses d'un grand nombre de tissus: toutes ces lésions organiques, si bien étudiées, à la fin du dix-huitième siècle & au commencement du dix-neuvième, par les anatomistes de l'École de Paris, ne constituent pas des états de maladies, & se présentent accidentellement à la suite d'affections morbides, dont la marche habituelle n'est point accompagnée de lésions organiques appréciables ou permanentes (les phlegmasies, le rhumatisme, la goutte).

(1) Les affections tuberculeuses & cancéreuses, siégeant plus ou moins profondément, les engorgements, les indurations, les tumeurs brisées, &c. &c.

(2) Le rachitisme, les scrophules.

(3) Le scorbut, la dégénérescence gangréneuse.

(4) Les brûlures.

(5) Les affections syphilitiques.

Les altérations organiques beaucoup plus graves, & dont l'origine & le développement ne remontent pas à une maladie antérieure, mais se lient à un état morbide présent, dont elles forment la circonstance principale; ces lésions, bien différentes de celles que nous venons d'indiquer, constituent de véritables maladies, & doivent figurer à ce titre dans le cadre nosographique; telles sont les différentes espèces de blessures, & un changement morbide dans la position ou dans la structure des parties (1), certaines dégénérescences constitutionnelles (2), un développement de matières & de tissus étrangers à l'organisation (3).

Ces altérations organiques & les autres maladies, qui sont accompagnées d'une lésion tellement prononcée, que les arts du peintre ou du modelleur peuvent en conserver aisément les hideuses & tristes images, ces altérations se réunissent, comme les maladies de la première section, dans un certain nombre de groupes ou de classes, que nous croyons devoir rapporter à deux titres principaux; savoir :

1°. Les altérations organiques constitutionnelles & générales.

2°. Les altérations organiques partielles.

ALTÉRATIONS ORGANIQUES GÉNÉRALES ET CONSTITUTIONNELLES.

Les diverses classes de maladies que nous rapportons à ce titre, ont toutes cela de remarquable, que les matières dégénérées & les tissus morbides, dont la production est une de leurs circonstances principales, n'ont point d'analogue dans l'organisation, à l'état sain.

Ces mêmes maladies sont également liées entre elles par une similitude, par un trait de famille non moins important, la disposition indiquée par leur titre, la dégradation générale & constitutionnelle.

Le mode de lésion avec altération organique ne diffère pas moins, du reste, dans la manifestation des différentes classes de maladies qui se rapportent à ce titre, que dans les maladies avec lésion organique, inappréciable & passagère; il forme le principe de distribution, d'après lequel nous les établissons dans l'ordre suivant.

1°. Classe. Les affections scrophuleuses & tuberculeuses (4).

2°. Classe. La dégénérescence rachitique.

(1) Les déplacements, ce qui comprend les hernies, les luxations.

(2) Les scrophules.

(3) Les affections tuberculeuses, cancéreuses, &c.

(4) Le tubercule, la production du tubercule, ces divers changements d'état, les excavations qui résultent de la suppuration dans le poulmon, &c., se rapportent à cette classe. (Voyez TUBERCULE.)

3°. Classe. Les maladies cancéreuses (1).

4°. Classe. Les maladies syphilitiques (2), & surtout la syphilis ancienne & invétérée.

5°. Classe. Les exanthèmes chroniques de la peau, dont les ordres sont :

1°. La LÈVRE ou l'éléphantiasis des Grecs, auquel il faut rapporter le mal rouge de Cayenne, l'yau ou le pian, la ludrene de Java;

2°. L'ÉLÉPHANTIASIS des Arabes (maladie glandulaire des Barbades);

3°. Les DARTRES;

4°. La GALE;

5°. La TRICHIE;

6°. La PLAQUE.

ALTÉRATIONS ORGANIQUES PARTIELLES.

Les divers modes de lésions que nous rangeons sous ce titre sont plus particulièrement l'objet de l'anatomie pathologique. Ceux que nous croyons pouvoir comprendre dans le dénombrement des maladies, se trouvent renfermés dans un petit nombre de classes énoncées par l'énumération suivante, & par des locutions scientifiques qu'il nous a paru indispensable de substituer, pour les caractériser, à des expressions univoques & populaires.

1°. CLASSE. Lésions provoquées par des causes physiques ou externes. BLESSURES : rapportées à 2 titres suivans; savoir : 1°. les contusions, 2°. les commotions, 3°. les fractures, 4°. les entorses ou distensions, 5°. les luxations, 6°. les plaies, 7°. les brûlures, 8°. les empoisonnements.

2°. CLASSE. Lésions spontanées. Plusieurs ordres sont compris dans cette classe, qui a beaucoup d'étendue. Un premier ordre présente, sous le titre de lésions dans la position, les déplacements, les hernies, les renversemens, les courbures, les procidences, les laxations spontanées. Un deuxième ordre, les lésions dans la conformation, presque toujours congéniales, renferme les occlusions ou imperforations, les adhérences & les divisions intestinales, qui sont plutôt regardées comme des vices organiques, des monstruosités, que comme des maladies, & que l'on ne devrait pas même faire entrer dans le cadre nosographique, si quelques-unes de ces imperfections & de ces infirmités ne pouvoient pas être détruites par les secours de la médecine (le bec de lièvre, l'infirmité appelée le filet, quelques occlusions, &c.).

Les diverses lésions de structure, telles que

(1) Les anatomistes rapportent à cette dégénérescence, le tissu cancéreux qui passe par deux états, l'état de crudité, l'état de ramollissement, ordinairement accompagnés d'un développement de sensibilité très considérable.

(2) Parmi les divers modes de lésions qui appartiennent à ces maladies, les uns sont primitifs (les ulcères apelés chancre), les autres secondaires (les dartres, les excroissances syphilitiques diverses, les exfolies, &c. &c.).

les varices, les dilatations anévrysmales des artères, du cœur, les perforations spontanées de plusieurs viscères membraneux, nous ont paru avoir entr'elles un nombre suffisant de rapports pour en former un quatrième ordre, d'après les données & les faits que nous offroit l'anatomie pathologique.

Un cinquième ordre, établi sur une base non moins fondée, la *lésion dans la texture*, dans la composition des organes, embrasse les *transformations diverses*. Il présente réunies & rapprochées, comme dans une famille naturelle, les ossifications de différentes parties, sans en excepter les organes les plus nécessaires à la vie; le ramollissement des os, du cerveau; le *transformation gélatiniforme* du canal intestinal chez les enfans; maladie si bien observée, si bien décrite dans ces derniers temps par M. Cruveilhier; les *dégénérescences graisseuses*, les *transformations cartilagineuses, fibreuses, épidermoïques*, les *transformations curianées*, dont l'étude est inséparable de l'histoire de la cicatrisation & de l'opération si improprement regardée comme *régénération* des chairs, à la suite des plaies avec perte de substance. On doit encore rapporter en même ordre plusieurs altérations des différents organes, spontanées, ou consécutives à différentes maladies, l'hépatification, par exemple, l'endurcissement du tissu cellulaire chez les enfans, l'engorgement, l'induration de plusieurs parenchymes, &c. &c.

3^e. CLASSE. *Développemens ou productions de tissus morbides*. Parmi les lésions que nous désignons sous ce titre, le plus grand nombre ne peut être placé au rang des maladies. Celles qui méritent de faire exception, par cela même qu'elles peuvent exiger les secours de la chirurgie, sont les fausses membranes, propres à certaines angines, que l'on a désignées sous le nom de *dyptériques*, & parmi lesquelles le croop doit être compris; les pseudo-membranes des voies urinaires, qui sont l'objet de médications spéciales; les différentes espèces de tumeurs enkystées ou enkystées; les polypes, soit muqueux, fibreux, soit vésiculeux; le développement des corps fibreux & des môles dans l'utérus; la présence des tumeurs érétils & des tumeurs hémorroidaires; les saillies ou végétations épidermoïques, tels que les cors, les verrues, &c. (*Voyez ces mots.*) (MORÉAU DE LA SARTHE.)

NOSOLOGIE, f. f. *Nosologia*, de *nos*, maladie, & de *logos*, discours, mot à mot: discours sur les maladies; partie de la médecine qui a pour objet la description, les différences & le classement des maladies. (*Voyez NOSOLOGIE.*) (L. J. M.)

NOSSA (Eaux minérales de). (*Voyez VINCA.*)

NOSTALGIE, f. f. (*Nosographie*). La nostalgie, qu'on a appelée long-temps, & que beaucoup de personnes appellent encore aujourd'hui *maladie du pays*, est caractérisée par le besoin impérieux qu'éprouvent ceux qui en sont atteints, de retourner dans leur pays, de revoir les lieux qu'ils ont habités dans leur enfance; et en un mot, par le besoin pressant de retrouver leur première demeure. Si on leur refuse d'y aller, ils sont tourmentés de chagrin, d'agrypie, d'anorexie & de plusieurs autres symptômes graves.

Depuis les animaux jusqu'à l'homme sauvage, & depuis l'homme sauvage jusqu'à l'homme civilisé, tous les êtres, qui respirent éprouvent ce besoin. Pour ne citer qu'un exemple parmi les animaux, voyez le cerf que des chasseurs impitoyables ont lancé loin de sa paisible retraite; il y revient d'un pas rapide dès qu'il est libre, & verse, en la retrouvant, des larmes de joie. Le bruit de ses ennemis le force-t-il une seconde fois à la fuite? il s'en éloigne de nouveau, mais c'est pour y revenir encore lorsqu'il a échappé à ses ennemis: c'est cet invincible besoin d'y revenir qui est la cause de sa perte.

Voyez le montagnard, espèce d'homme sauvage dont la cabane est entourée de neiges & de glaces presque éternelles; chassé de sa demeure par la faim, il va dans les pays lointains chercher les moyens d'assurer son existence; il se livre pendant vingt ans aux travaux les plus pénibles pour s'élever au-dessus de la misère. Quand il l'a surmontée; quand, à la sueur de son corps, il a pu s'assurer une médiocre aisance, tourmenté du désir de retourner dans son pays, rien ne l'arrête, il retourne dans sa cabane; il la revoit avec des larmes d'attendrissement pour ne la plus quitter. Pendant les vingt ans qu'il en a été éloigné, il aspireroit chaque jour au moment d'y passer les vieux jours & d'y finir sa carrière.

Voyez l'homme civilisé, l'habitant des villes, voyez l'Européen, transporté par la soif de l'or sur un autre hémisphère: il travaille nuit & jour pour s'enrichir; il ne craint ni peines ni fatigues quand elles lui servent à grossir la fortune, à accumuler des sommes immenses: de l'or, de l'or, c'est le seul mot qu'il profère, le seul objet qui l'occupe. Il entasse millions sur millions; mais il n'aura pas plutôt étanché la cruelle soif qui lui a fait quitter son pays, que le besoin d'y retourner naîtra dans son cœur: chaque jour le développement de plus en plus; c'est pour le malheureux un tourment continu, & s'il ne peut remplir l'espérance qu'il a de revoir les lieux qu'il a quittés, il périra de tristesse & d'ennui au lieu de ses richesses.

Quel est donc ce besoin que l'homme éprouve quand il est loin des lieux qui l'ont vu naître, de ces lieux témoins du bonheur de son premier âge? Il seroit absurde de le regarder comme un mouvement seulement machinal, comme un besoin purement physique. Les regrets qui voyagent avec

celui qui sort de son pays, qui le suivent partout, à quoi les attribuer ? Au désir qu'il conserve toujours de revoir un arbre, un champ, une maison qui lui sont chers ? Séparé de tout ce qu'il aime, tous les liens qui l'attachaient à la vie sont rompus ; le monde entier n'est plus pour lui qu'un vaste désert : tout l'ennui, tout le tourment, tout l'arabie. Un découragement total s'empare de lui : il veut en vain le surmonter ; efforts inutiles ! Il reste, malgré lui, livré continuellement à un état de tristesse & d'ennui qui mine chaque jour son existence. C'est cet état de tristesse profonde & douloureuse qui a fait donner à cette maladie le nom de *nostalgia*, des mots grecs *nerin*, revenir, & *noia*, dérivé d'*noios*, qui signifie douleur, affection douloureuse, malade, chagrin. On l'a encore appelée *nostromania*, *philopatridomania*, *pathopatralgia*, *nostalfia*.

Cette maladie est répandue d'une manière presque générale sur toute la surface du globe ; elle règne indistinctement dans toutes les saisons, dans tous les pays, attaque tous les tempéramens & tous les âges, reconnoît une infinité de causes, telles que des pertes considérables, des projets de fortune échoués, une ambition trompée, une jalousie inquiète, un amour malheureux, l'éloignement du centre de ses affaires, l'incertitude sur son sort à venir.

La *nostalgia* est simple ou compliquée.

La *nostalgia* simple, ou proprement dite, est cette maladie qui pouvoit au dire sensibler à mesure qu'il s'éloigne de tout ce qu'il a de plus cher au monde. L'état de solitude qui devient chaque jour pour lui plus effrayant, le plonge dans les réflexions les plus noires : le souvenir du passé excite les regrets ; il craint d'envisager l'avenir ; il souffre, languit & meurt, si rien ne le soulage ; la malheureuse position. Cette terminaison funeste est heureusement assez rare quand la *nostalgia* est simple ; mais quand elle est compliquée avec les maladies régnantes, elle en aggrave les divers symptômes, & en rend ordinairement les suites bien plus fâcheuses.

La *nostalgia*, dans son état de simplicité, peut exister dans tous les âges, dans l'enfance la plus tendre comme dans la vieillesse la plus avancée. Et en effet, voyez un enfant de trois ans seulement, que sa nourrice vient rendre à ses parents : Il gémit, il pleure & se déssole, quand il la voit partir ; il reste attaché à la perte par laquelle elle est partie. En vain lui prodigue-t-on de bonsbons & caresses, il refuse tout ; il demande à chaque instant si on revient, il l'appelle sans cesse. Ce n'est point l'idée de l'avenir qui le tourmente ; il ne l'a point, il ne peut pas encore l'avoir. C'est donc le souvenir seul du passé ; c'est la première peine qu'il éprouve, rien ne peut l'adoucir : quelquefois même, pour calmer le chagrin dans lequel l'a plongé cette séparation, on est obligé de la faire cesser. Il est vrai que chez le plus grand

nombre, grâces à l'extrême mobilité des impressions de cet âge, un laps de temps peu considérable, des distractions légères, quelques émoions gauges de bienveillance suffisent pour faire oublier à ces enfans celle qui leur a prodigé des soins depuis leur naissance ; mais ils n'en ont pas moins éprouvé, à l'instant de son départ, le mal affreux d'un aussi cruel moment. Mères courageuses, mères respectables, qui, satisfaisant au plus doux vœu de la nature, nourrissez vos enfans de votre propre lait, qui leur consacrez tous vos soins, tous vos instans, foyez mille fois heureuses en songeant que vous leur donnez plus que la vie, puisque vous leur assurez, du moins pour leurs tendres années, un bonheur qui sera sans nuage !

Le vieillard, que des circonstances malheureuses ont arraché à ses foyers, à sa famille, à ses amis, & ont forcé de se transporter dans une terre étrangère, ne soupire-t-il pas chaque jour après le pays qu'il habitoit ? Il y joudoit de l'estime, de l'attachement, de la considération, & peut-être de la reconnaissance de ses voisins. Que de motifs de regrets ! Que lui fait alors la vie ? Elle lui devient insupportable ; il appelle la mort, & bientôt son corps, affoibli par l'âge & accablé par la douleur, cesse d'exister s'il ne peut entrevoir la fin de son exil.

Si, comme nous venons de le voir, aux deux extrémités de la vie l'homme est sujet à la *nostalgia*, que sera-ce si elle s'agit le jeune homme de vingt ans ? à cet âge où le cœur agit tout aimant, où il commence à goûter d'une manière délicate le bonheur d'être aimé. Quel désespoir ne doit-il pas éprouver quand, brusquement & sans y être préparé, il fait s'arracher des bras d'une mère, d'une sœur, &c. la plus souvent, d'une amante ! . . . Quel vide affreux doit succéder à cette cruelle séparation ! quelle tristesse profonde doit en être la suite !

La *nostalgia* attaque, en effet, fréquemment les jeunes gens qui, mollement élevés dans le sein de leur famille, & voyageant pour la première fois, éprouvent des revers de fortune ou tombent malades. Dans cet état, chagrinés de leurs habitudes & de leurs ressources, ils rappellent dans leur souvenir les délices de leur patrie, & désirent d'autant plus de la revoir qu'ils sont malades. Autrefois les soldats suisses étoient fort sujets à la *nostalgia* quand ils étoient hors de leur patrie, & c'étoit cette maladie qui les faisoit désertir si souvent. Les troupes belgiques avoient une chanson qui étoit propre à leur rappeler les délices de la Suisse, & à les faire tomber dans cette maladie ; mais on défendit de la chanter sous peine de la vie. (Voyez ZWINGLI.)

Les lois sur la réquisition & la conscription militaires, celles sur le recrutement, nous ont donné & nous donnent encore des preuves malheureusement trop vraies des effets malheureux & terribles de la *nostalgia*.

Foibles, forts, pauvres, riches, campagnards, citadins, sont obligés d'être soldats. Les uns traient péniblement un corps frêle & souffrant de pays en pays; les autres, plus robustes, sentent plus fortement les pertes qu'ils ont faites, & emportent avec eux des regrets plus profonds. Celui-ci pleure la chaudière, celui-là regrette une douce existence; un autre verse des larmes au seul aspect d'une charrue; un autre enfin, songe que dans la ville qu'il a quittée, il a abandonné les haïsons les plus attachantes; plusieurs ont été obligés de renoncer à l'espoir d'un établissement prochain; tous laissent à parents & amis, & avec eux le seul bonheur qu'ils pouvoient goûter. Ils vont commencer une vie toute nouvelle; & quel aveu leur promet cette vie! Chaque jour qui les éloigne du toit paternel est un jour donné tout entier aux regrets. Ils se croient voués à une mort certaine; ils reportent au arrière leurs regards comme pour dire au dernier adieu aux pays qu'ils viennent de quitter. Une tristesse profonde & continuelle s'empare d'eux; on vain ils s'efforcent de la repousser, elle s'acharne à leur poursuite, leur enlève leurs forces, & plusieurs, incapables de soutenir les fatigues d'une armée active, entrent à l'hôpital, où souvent ils ne trouvent la fin de leurs maux qu'avec celle de leur vie.

Les principaux symptômes que l'on remarque chez la plupart d'entr'eux, consistent dans un air triste, mélancolique, dans un regard stupide, les yeux parfois hagards; une figure inanimée, un dégoût général, une indifférence pour tout; le pouls est foible, lent, d'autres fois fréquent, mais à peine sensible; on s'assoupit assez souvent pendant le sommeil, quelques expressions échappées avec des sanglots & des larmes; la presque impossibilité de quitter le lit; un silence opiniâtre; le refus des boissons & d'aliments, l'amaigrissement, le marasme & la mort. La maladie n'est pas, chez tous, portée à ce dernier degré; mais si elle n'est pas funeste d'une manière directe, elle le devient d'une manière indirecte. Quelques-uns ont assez de force pour la surmonter; chez quelques autres elle est plus longue, & prolonge par conséquent leur séjour dans l'hôpital; mais ce séjour prolongé leur devient presque toujours funeste, car ils sont tôt ou tard atteints par les maladies qui règnent quelquefois d'une manière terrible dans les hôpitaux militaires, telles que les dysenteries, les fièvres rémittentes, les fièvres adynamiques, ataxiques, &c. Ces différentes maladies compliquent, en effet, assez souvent la nostalgie.

Traitement. Il n'a fait chercher la cure de la nostalgie, quand elle est simple, que dans les secours moraux. On tâchera de dissiper les malades par le jeu, les amusements, les spectacles, des occupations agréables, & on leur offrira tout ce qu'ils désireront. Si la maladie est avancée & rebelle à ces moyens, le seul capable de la guérir,

c'est de renvoyer les malades dans leur pays. Quelque foibles & abattus qu'ils paroissent, ils ont assez de force pour se lever de leur lit quand on leur permet de croire qu'ils vont revoir leur patrie; ils reprennent des forces, & ils se guérissent en route. Au contraire, les petits orphelins que leurs parents ne peuvent recevoir chez eux, & faire sortir de nos hôpitaux, meurent presque tous de cette maladie sans qu'ils puissent éprouver aucun soulagement des différents moyens que l'on peut mettre en usage, pour améliorer leur situation.

Dans la nostalgie compliquée, on doit avoir grand soin de conserver les forces & de faire recevoir aux malades, l'espérance de revoir bientôt leur pays, & de leur ouvrir dans des voitures commodément vus leurs parents, quelque foibles qu'ils soient; car le seul appareil du voyage contribuera plutôt à guérir la maladie que tous les remèdes ordinaires. Il y en a même qui deviennent convalescents dès qu'on leur permet de retourner dans leur pays. D'autres font délivrés de la nostalgie, sans même y aller, ou du moins les malades recouvrent leurs forces au milieu du chemin, & peu après, leur santé.

Sauvages cite l'exemple d'une femme nostalgique à laquelle on avoit fait inutilement tous les remèdes possibles. C'étoit une paysanne qui avoit perdu son embonpoint dans l'espace de trois semaines, quoiqu'elle ne mangât de rien & vécût parmi des gens de sa connaissance & très-sains; elle étoit triste, languissante, abattue; elle n'avoit point d'appétit, aucun goût pour les beautés de la Capitale, & ne vouloit même pas sortir de l'hôtel où elle étoit logée. Je soupçonnai d'abord la cause du mal, dit Sauvages, lui parlai de son pays, de ses amis, de ses proches, &c. cette femme sembloit remuée. Je défendis expressément qu'on lui fit aucun remède, & conseillai de la faire partir promptement. Elle me quitta Paris que le lendemain, entièrement rétablie. (Piss.)

Si l'exercice de l'art de guérir aux armées & dans les hôpitaux militaires ne m'avoit fourni de nombreuses occasions d'observer la nostalgie, quelque honorable qu'il puisse être pour un élève d'ajouter à l'œuvre de son maître, je me honorerois à configurer ici le tribut d'admiration dû à l'immortel auteur du *Traité de l'aliénation mentale*. Sans avoir la prétention d'être le vrai interprète, je vais dire ce que j'ai vu, ce que j'ai éprouvé, & les réflexions que mes remarques & mes propres sentimens m'ont inspirées.

On a cherché la cause de la nostalgie, dans le changement d'air ou d'alimens qu'une peut éviter le jeune soldat enlevé aux foyers paternels. Mais le changement d'air a lieu pour tous; celui de régime alimentaire devoit agir principalement sur les habitans nés des villes, subitement transportés d'une table abondamment servie, au chétif ordinaire des casernes. C'est dans la perte des ha-

bitudes de famille, de voisinage, de patrie enfin, qu'il faut chercher la cause de la nœstalgie, & moins encore dans l'absence de tout cela que dans la privation de sensations dont on a coutume de se sentir la douce habitude : ces sensations développent le besoin impérieux de les éprouver toujours ; en être privé, c'est pâtir autant qu'être privé de l'air. Une correspondance active entretient l'espérance de revoir la famille qu'on regrette, c'est le meilleur remède à opposer aux tourmens cruels de la nœstalgie.

Cette maladie du cerveau se dévot que surtout chez les jeunes gens que l'ignorance prive de cette consolation, de ce merveilleux moyen de rapporter l'avenir en faisant supporter le présent, & surtout en empêchant de penser trop souvent au passé. On a remarqué que de fréquentes conversations entre de jeunes soldats du même pays favorisoient l'établissement de la nœstalgie ; c'est parce que leurs entretiens ne roulent jamais que sur le passé qu'ils ne peuvent faire resnaître, & qui est pour eux une source intarissable de regrets. A la nouvelle de la paix, les mêmes conversations naissent entre eux l'espérance au lieu d'avoir leur courage ; c'est qu'alors elles n'ont pas d'autre objet que l'avenir. Les souvenirs sont presque toujours tristes, car ce sont des regrets ou des remords ; l'espérance est toujours agréable, parce que l'imagination lui prête les plus riantes couleurs.

Les jeunes soldats n'éprouvent pas seule la nœstalgie ; c'est la torture de l'exil ; c'est elle qui désèche en lui les sources de la vie. L'exil, pour un cœur ami de la patrie, est une sentence de mort dont l'exécution commence à l'instant du départ & finit avec la vie. En ignorant cette peine affreuse aux hommes illustres dont elles redoutoient les menées ambitieuses, la vieille Rome & Athènes lavoient bien qu'elles punissoient le plus grand crime par le plus grand supplice ; ce n'est que dans notre siècle qu'il s'est trouvé d'honnêtes bourgeois admettant la prétendue douceur de cette loi rigoureuse, que l'ingratitude & la jalousie d'un peuple trop léger fit passer sur le juste Arrière.

Le diagnostic de la nœstalgie offre souvent des difficultés insurmontables. Un liche, ridé, seint de regretter sa famille & la ville natale ; vous le reconnoissez à ses gémissemens assésés, à l'étalage de ses chagrins, au refus qu'il fait de tous les médecins dont on lui confie l'usage. Un jeune homme plein d'honneur a quitté volontairement le toit paternel, & déjà, malgré le noble motif qui l'en a éloigné, un mal secret le consume ; il cherche la solitude aussiit que ses devoirs lui en laissent le loisir. Il parle peu ; il s'éloigne des lieux de plaisir ; il perd l'appétit ; ses yeux sont à la fois enfoncés dans les orbites, fixes & brillans. Si on lui demande la cause de son état, il baisse les paupières & répond d'une voix foible & tremblante ; qu'il ignore. Docile à tout ce qu'on lui

prescrit, il cache son mal & desire guérir. Observez-le dans le silence des nuits, un sanglot étouffé vous révélera le secret de sa douleur. Il dort peu ; lorsqu'il s'endort, des songes lui rappellent son père, sa mère, sa femme, ses enfans, les plaisirs & les travaux qu'il a quittés ; mais ces rêves consolateurs sont troublés par des réveils en sursaut qui le rappellent tout-à-coup au présent & lui arrachent des larmes amères.

Je dois fixer l'attention de mes confrères sur l'état tout particulier des yeux dans la nœstalgie. Il m'est très-souvent arrivé de la reconnoître à ce seul signe. Dans ces momens où, pour se consoler de quelques injustices, on cherche à se ressouvenir du bien qu'on a pu faire, j'aime à me retracer ce passage subit du chagrin le plus dévorant à la mieux carée, à la joie la plus vive, que je suis allés heureux pour déterminer, chez le fils d'un avocat de la Bretagne, qu'on aie irrésistible avoit jeté dans les régimens français depuis la paix. Des accès fébriles, irréguliers, une douleur fixe à la région frontale, un poids petit & serré, une maigreur rapidement croissante, annoncèrent la fin prochaine de ce malheureux jeune homme ; l'annonce qu'il reverroit bientôt sa famille & son pays, agit sur lui comme l'électricité électrique : ses yeux seuls m'avoient dévoilé la nature de sa maladie. Je ne puis comparer l'œil du nœstalgique qu'à celui d'une tendre mère qui a perdu depuis peu un fils chéri, & qui suppose cette perte en silence, mais non sans éprouver une douleur déchirante.

On a beaucoup parlé des cas où le nœstalgique part pour retourner dans ses foyers, puis revient lassé d'avoir lentement vu de loin le lieu de sa naissance ; ces cas sont rares. Le nœstalgique étoit peu prononcé en pareil cas ; elle étoit combattue par des motifs qui n'auroient pu la vaincre, si elle eût été assez marquée pour compromettre, je ne dirai pas la vie, mais seulement la santé du sujet. Toutefois, je ne nie point la possibilité de ces faits, car la nœstalgie cesse dès que celui qui en est affecté demeure convaincu de la possibilité du retour. Ce qui tue le malheureux nœstalgique, c'est la persuasion que les habitudes de sa vie sont changées pour toujours.

M. Pinel ne parle pas du siège de la nœstalgie ; mais il a trop de philosophie & il est trop vert dans les sciences physiologiques, pour le chercher ailleurs que dans le cerveau. Qui voudroit placer le siège de l'amour de la patrie dans l'abdomen ? Les organes digestifs ne peuvent guère inspirer que certains hommes, qui se prétendent amis d'une si belle passion, mais que le seul amour de la bonne chère dirige, & qui perdent toute idée d'opposition à la vac d'une table splendide servie.

Lorsque le plaisir d'une vie dissipée, le désir de l'avancement, l'espoir de faire fortune ou d'acquies

quérir la gloire, ne l'emportent pas sur la nostalgie, elle conduit celui qui l'éprouve au tombeau.

Tout soldat qui en est profondément affecté doit être congédié avant qu'un de ses organes ne soit irrémédiablement lésé. En faisant cet acte de justice, on conserve à l'État un citoyen, dont on n'aurait pu faire un bon défenseur. Une civilité non moins équitable doit châtier le militaire qui se voit d'être nostalgique. Quelques médecins d'une faveur désagréable le chassent de l'hôpital, & la honte lui tient bientôt lieu de courage.

Lorsque la nostalgie cause la mort de l'infortuné qui l'éprouve, ce n'est pas précisément parce qu'elle se complique d'une autre maladie, car elle suffit trop souvent pour occasionner la mort, mais le plus ordinairement c'est parce que le cerveau, douloureusement affecté sans interruption, réagit sur les viscères, dont l'un d'eux s'altère à son tour; c'est surtout l'estomac ou le poulmon qui en ressent les atteintes. Ce dernier viscère s'affecte de préférence, pour peu que les circonstances soient favorables au développement des péripneumonies & des pleurysies éhrouiques. L'estomac est presque toujours lésé le premier après le cerveau. On connoît la puissante influence de l'encéphale sur la digestion, dans l'étude, le chagrin & l'apoplexie.

A l'ouverture des cadavres, on ne trouve quelquefois aucune trace de maladie; mais c'est fort rare. Presque toujours la méninge est devenue opaque, rouge, épaisse, sur la portion de son étendue qui recouvre la partie antérieure des hémisphères cérébraux. Souvent cette lésion est la seule que l'on trouve; elle est presque toujours méconnue. L'absence de toute lésion dans l'encéphale, à la suite de la nostalgie, est un des arguments dont on se sert pour prétendre que la nostalgie ne laisse point de traces, & que le cerveau n'est point l'organe de la pensée. Que ceux qui s'élèvent contre ce qu'il y a de vrai dans les écrits de Cabanis, les relisent avec attention, & qu'ils ajoutent ce qu'on leur a enseigné les progrès récents de l'anatomie pathologique, & qu'ils cessent de nier un fait qui ne leur paroît inadmissible, que parce qu'ils ne l'envisagent que dans ce qu'il a d'inexplicable. (F.-G. Boissau.)

NOSTALGIE, f. f. *Nostalgia*, de *nos*, dos, & de *algos*, douleur; mot à mot, douleur du dos. Ce symptôme existe dans un grand nombre de maladies. Il a quelquefois lieu en effet dans la pleurésie, la péripneumonie, dans la carie vertébrale, l'auvéryisme interne des gros vaisseaux. La nostalgie est souvent une variété du lumbago; elle est alors rhumatismale. Ce symptôme se remarque fort souvent dans la phthisie pulmonaire, & quoiqu'il ne soit dans ce cas que symptomatique, il est très-redouté dans le peuple,

MÉDECINE. Tome X.

qui le regarde comme le signe infailible de cette cruelle maladie. (A. J. T.)

NOSTOCH (*Tremella nostoch*). Plante acotylédone, aphyllée, de la famille naturelle des Algues, dont le parenchyme est gélatineux. Elle est comestible, dans diverses contrées, comme on le voit pour les *Uva edulis*, *U. fagarina*, *U. lactuca*, &c. &c. Quelques plantes de la même famille sont parties de la substance comestible, qui se trouve dans le commerce, sous le nom de *mousse de cerise*, & qui, d'après les recherches de M. de Candolle, contient à peine un huitième du suc, dont elle porte le nom (*sucus helminthocorton*).

(L. J. M.)

NOSTOMANIE, f. f. *Nostomania*, de *nos*, retour, & de *mania*, passion. Desir de revoir son pays. (Voyez NOSTALGIE.)

NOSTRADAMUS ou NOSTRE-DAME (Michel) (*Biograph. méd.*), médecin-astrologue, naquit à Saint-Remy, petite ville de Provence, au commencement du seizième siècle (le 14 décembre 1503). Arrière petit-fils de médecin, tant du côté paternel que maternel, il suivit l'exemple de ses aïeux, & profita des instructions d'un de ses parents, qui étoit médecin & conseiller du roi René, & se rendit dans la suite à Avignon, pour y continuer ses études & y faire sa philosophie.

Nostradamus, dont le seul desir étoit de se livrer un jour à la pratique de la médecine, vint à Montpellier pour y acquérir des nouvelles connoissances; mais, au moment où il commençoit à se distinguer parmi ses confrères, la peste se déclara dans cette ville, & ce qui le força, quoique très-jeune encore, à s'en éloigner. Cette circonstance malheureuse ne l'empêcha pas du reste d'exercer une profession dont il n'avoit encore reçu que les premiers éléments. Il séjourna en conséquence, pendant plusieurs années, dans le haut Languedoc, à Toulouse, à Bordeaux ou dans la plupart des villes qui sont sur la Garonne, & revint prendre ses degrés à Montpellier, où il fut reçu docteur, sous la présidence d'Antoine Romier.

Les épreuves pour le doctorat terminées, Nostradamus retourna à Toulouse, demeura ensuite quelque temps à Agen, auprès de Scaliger (Jules-César), son ami, & ne quitta cette ville que pour satisfaire son goût pour les voyages. Onze années de sa vie furent en effet employées à parcourir la France & l'Italie, & ce ne fut qu'en 1543 ou 1544, époque de son retour dans sa patrie, qu'il se fixa à Salon, petite ville qui, par son voisinage de Marseille, d'Aix, d'Avignon & d'Arles, lui avoit paru le séjour le plus avantageux pour se livrer à l'exercice de l'art de guérir. L'avenir prouva en effet qu'il ne s'étoit pas trompé; car

PPP

en 1546, la communauté d'Aix le pria, par une délibération solennelle, de veoir arrêter les progrès de la contagion qui régnoit dans leur ville. Nostredamus ne balança point à accepter cet emploi dangereux, & tant que la contagion dura, il ne négligea rien pour contribuer au soulagement de ceux qui en étoient atteints (1). Sa conduite dévouée à l'égard des habitants de la ville d'Aix, le fit aussi appeler à Lyon en 1547, pour donner ses avis dans une circonstance à peu près semblable; mais quelques discussions s'étant élevées entre lui & Jean-Antoine Sarrazin, l'un des médecins les plus distingués de cette ville, Nostredamus revint à Salo, où il s'appliqua de nouveau à l'étude de la médecine, en profitant du loisir que lui laissoit sa pratique pour composer différents ouvrages.

Nostredamus, qui avoit pris un goût décidé pour l'astrologie, pendant le cours de ses voyages, commença à prédire l'avenir, & ce genre de jonglerie, qu'il avoit mis en pratique pour la première fois en Lorraine, contribua pour beaucoup à terminer sa réputation. Voici comment s'exprime l'auteur du *Dictionnaire des portraits*, à l'égard de ce prétendu prophète.

« Las d'exercer la médecine, où il ne faisoit rien, Nostredamus prit le métier incertain de charlatan : c'étoit autrefois le règne de l'astrologie & des prédications. Le peuple, à force de lui entendre dire qu'il étoit dans les astres & qu'il étoit instruit de l'avenir comme du passé, le crut, quoiqu'il ne connût ni l'un ni l'autre; mais, ce qu'il savoit le mieux, c'étoit de mettre à profit la crédulité publique (2). La meilleure de ses visions étoit celle qui lui annonçoit qu'il seroit fortuné à son nouveau métier. »

Nostredamus renferma ses prédications dans des quatrains rimés, qu'il divisa en centuries. En 1555, il publia les sept premières à Lyon, sous format in-18, & leur obscurité impénétrable, l'assurance avec laquelle il parle, jointes à l'espoir de réputation qu'il avoit, firent rechercher cet ouvrage extravagant (3). Embardi par ses pré-

(1) On trouve dans son traité des *sermons & des sentences*, la recette d'une poudre miraculeuse, dont il se servoit avec avantage dans cette circonstance, pour neutraliser les miasmes pestiférés.

(2) Nostredamus, à l'époque où il vivoit, fut regardé par le peuple comme un savant qui lisoit l'avenir dans les astres, quoiqu'il n'ait vu des philosophes il passât pour n'y connaître rien. Ses partisans ont été jusqu'à dire que tout ce qu'il avoit prédit lui avoit été révélé : cependant, je crois, ne s'a mépris point qu'Etienne Jodelle dans ces deux vers, qui forment un jeu de mot assez ingénieux.

*Nostredamus, cum falsa damus, non fallere nostrum est,
Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus.*

(3) Naudé compare ces pro- hèles, qui pouvoient s'appliquer à plusieurs événements arrivés à différents temps, au *livre de Thémis*, qui pouvoit être consulté indistinctement par toutes sortes de personnes, ou à la *machine* Les-

miers succès, il fit paroître les huitième, neuvième & dixième centuries, qu'il dédia au roi Henri II. Ce prince & la reine Catherine de Médicis, qui avoient une grande confiance dans la science de l'astrologie, demandèrent à voir un homme aussi extraordinaire. Nostredamus leur ayant été présenté, fut reçu comme un savant, comme un grand homme, & comblé de bienfaits. Plusieurs personnages illustres vinrent même lui rendre visite à Salo, & Charles IX l'ayant fait venir dans la suite à Arles, pour s'entretenir avec lui, ce monarque lui fit remettre une somme d'argent assez considérable, & lui accorda la charge de médecin du Roi, avec des honoraires.

Nostredamus mourut à Salo en 1566, & les ouvrages qu'il nous a laissés, indépendamment de ses *Prophéties*, sont les suivans :

Des Fondemens & des Sentences. Lyon, 1552.

Traité des singulières recettes pour entretenir la santé du corps. Poitiers, 1556.

Des Confitures, 1557. Lyon, 1572; autre édition allemande, Amboise 1572, in-8.

Son dernier ouvrage médical est une traduction française de la paraphrase de Galien, sur l'exhortation de Mésopotamie à l'étude, & surtout à celle de la médecine. Lyon, 1557.

(*Extr. d'Éloy.*) (A. J. T.)

NOTRE-DANE DE CONSOLATION (Eau minérale de). Hermitage du *Rus-Fallegny*, situé sur le haut de la montagne de Collioure, à une lieue de cette ville & fix de Perpignan. La source minérale appelée de *Consolation* est à côté de cet hermitage. Elle est froide & ferrugineuse, suivant quelques-auteurs. (A. J. T.)

NOUÉ, adj. *Nodofus*. On donne ce nom, dans le langage vulgaire, aux enfans atteints de rachitisme, & dont la croissance est arrêtée. (*Voyez* GIBBOUSITÉ & RACHITISME.)

On a appelé *goutte nouée*, pour la distinguer de la goutte vague ou vésiculaire, celle qui laisse des nodus aux articulations. (L. J. M.)

NOUET, f. m. On désigne sous ce nom un lingé, dans lequel on a renfermé, sous la forme d'un nœud, différentes substances médicamenteuses, pour les faire infuser ou macérer. (*Voyez* ce mot dans le *Dictionnaire de Chimie & de Pharmacie*.)

NOUEURE, f. f. C'est le nom que les gens du peuple donnent au rachitisme. (*Voyez* ce mot.)

NOUFFER (Remède de madame). (*Voyez* TARTAR.)

bonne, qui étoit de plomb, afin qu'elle pût s'appliquer facilement aux figures droites, obliques, rondes, cylindriques, &c. &c.

NOURRICE, f. f. (*Physiologie, médecine pratique & Hygiène.*)

Nourrice, nutrit. Ce mot, dans une acception assez étendue pour être exacte, ne s'applique pas seulement, suivant la définition du *Dictionnaire de l'Académie*, à la femme chargée de nourrir un enfant qui n'est pas le sien, mais à toute mère qui allaite, soit son propre enfant, soit l'enfant d'une autre mère.

L'état de nourrice (l'allaitement) est la suite, la conséquence naturelle de l'accouchement, & se trouve compris dans le cercle des fonctions & des phénomènes de la maternité. La nature se prépare, en quelque sorte, à cette fonction dès le troisième ou le quatrième mois de la grossesse, & lorsque la femme est délivrée, la sécrétion du lait, à peine sensible jusqu'à cette époque, s'opère avec une activité remarquable. Si la femme peut nourrir, & si elle donne le sein quelques heures après l'accouchement, le mouvement sécrétoire du lait s'établit sans effort, sans phénomène morbide, & devient une source de rapports mutuels entre la mère & l'enfant (1). La fièvre de lait ne survient que très-rarement dans ce cas. La tuméfaction des mamelles est beaucoup moins forte, beaucoup moins incommode, les sueurs moins abondantes, le régime moins fébrile; enfin, les lochies ont beaucoup moins de durée & sont moins fortes. Dans le cas contraire, & lorsque, par l'impolissibilité ou par le refus de nourrir, la série des phénomènes de la maternité est intervertie, la fièvre de lait est ordinairement inévitable, & les femmes sont le plus souvent très-incommodées par le gonflement du sein, qui s'étend jusque sous les bras, ou même jusqu'à la partie antérieure & supérieure de la poitrine; le plus souvent aussi, & dans le même cas, les sueurs sont plus fortes, & plus fréquemment accompagnées d'éruptions miliaires, tandis que l'écoulement des lochies, qui se prolonge beaucoup plus long-temps, ne peut guère être interrompu sans occasionner un véritable état de maladie.

La sécrétion du lait ne diffère point des autres sécrétions, quoique la disposition des organes qui l'exécutent présente quelques particularités dans sa structure, & dont la connaissance très-détaillée est indispensable pour se rendre compte des phénomènes de l'allaitement, de leurs anomalies & des maladies des mamelles. (*Voyez Seix.*)

La nécessité & les avantages de l'allaitement,

(1) *Voyez dans le Dictionnaire d'Anatomie & de Physiologie les mots ALLAITEMENT, LAIT, LACTATION, MAMELLES, SEIN; voyez aussi dans le Dictionnaire l'article ALLAITEMENT, rédigé en 1790; d'après des vues bien élogées de l'état des connaissances de ce qui nous a déterminé à donner quelques développements à l'article NOURRICE.*

considérés dans les rapports de cette fonction avec les suites naturelles de l'accouchement & l'ensemble des phénomènes qui constituent la maternité, ne peuvent être mis en question; mais plusieurs médecins & quelques philosophes les ont évidemment exagérés, en supposant que le lait s'altère, & que, se portant vers différents organes il les irrite, les engorge, ce qui donne lieu à une suite de maladies prétendues lacteuses : opinion qui conserve encore quelques partisans; quoiqu'il soit impossible de la soutenir, & qu'elle ne soit pas moins contraire aux données physiologiques qu'aux résultats, aux conséquences d'une observation judicieuse.

Un médecin du siècle dernier, qui ne fut pas sans quelque réputation, & qui se croyait l'avocat obligé de toutes les doctrines surannées, n'a pas craint d'adopter, dans un livre sur l'éducation physique, assez répandu, toute cette doctrine des maladies lacteuses, pour en tirer, en faveur de l'allaitement maternel, un argument & des préceptes qu'il importe de signaler parmi les erreurs populaires les plus répréhensibles.

Suivant ce médecin : *Chez les femmes qui ne nourrissent pas, le lait se grumele dans le sein, il y forme des obstructions, des squirrhes, des cancers. . . . Cette liqueur, naturellement douce, échauffée par son mélange & sa circulation avec le sang, s'augmente, devient irritante & allume le feu de la fièvre; produit des inflammations dans tout le bas-ventre, qui devient fort tendu & enflé, des palpitations de cœur, des syncopes, des convulsions, des éruptions, pourpreuses ou erysipeleuses, qui défigurent le visage* (1).

Quel style! quelles idées! & cependant ce passage fut écrit dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, & dans un ouvrage que l'on croit avoir été consulté avec confiance par J. J. Rousseau. L'état, les qualités du lait, pendant les premiers temps de la sécrétion, & chez la femme qui vient d'être mère, conviennent d'une manière particulière à son enfant, & se trouvent sans doute au premier rang parmi les motifs qui l'engagent à le nourrir, lorsque des raisons trop graves ne l'empêchent pas de remplir un devoir aussi doux & aussi sacré. Du reste, cette question, considérée sous le point de vue de l'enfant, & dans les intérêts de l'éducation & de la morale, a souvent été traitée avec beaucoup d'éloquence, mais souvent aussi avec très-peu de savoir ou de lumière, & par des écrivains qui n'auraient pu que quelques faces d'un sujet aussi important.

On connaît, relativement à cette matière, les opinions de Rousseau & l'influence qu'elles ont

(1) *Traité de l'éducation corporelle des enfants en bas âge, par Desfontaines, 1^{re} édition, page 185.*

exercée sur les mœurs de son siècle, dans les hautes classes de la société. Mais en proursot, en proclamant les avantages de l'allaitement maternel, Rousseau a-t-il renfermé ses assertions dans les limites du possible & du vrai ?

Cette folle idée maternelle, qui ne peut être suppléée ; les résultats fâcheux d'une négligence si fréquente chez les nourrices mercenaires ; enfin, l'effet général d'un allaitement maternel sur les mœurs d'une nation & son influence particulière, soit sur la santé des enfans, soit sur le bonheur des mères ; tels sont les différens points que le philosophe de Genève a traités avec tout l'entraînement & toute la conviction d'une ame généreuse & d'un esprit éclairé.

Malheureusement divers objets qui appartiennent à la même question, n'ont pas même été entrevus par Jean-Jacques ; & lorsqu'il faut décider si, dans toutes les circonstances de la vie, l'enfant doit être allaité par sa mère ou par toute autre nourrice, ce philosophe, tranchant le noeud de la difficulté, ne résout pas le problème, & affirme qu'il n'existe pas d'obstacle à l'allaitement maternel, & que l'enfant ne peut avoir de nouveau mal à craindre du sang dont il est formé.

Ces obstacles à l'allaitement, méconnus par Rousseau, sont malheureusement trop réels & trop nombreux, soit relativement aux mères, soit dans l'intérêt de l'enfant, dont la santé ou même l'existence seroit compromise, sans le secours d'une nourrice étrangère.

Parmi les causes locales, se trouvent les détachemens de l'état morbide du sein.

Quelquefois même, les mamelles manquent presque entièrement ou présentent un développement exagéré du tissu adipeux qui est propre à ces organes. Dans d'autres circonstances, le sein, quoique bien conformé, est sans énergie, & ne possède point ou ne possède qu'à un faible degré, l'irritabilité sécrétaire, nécessaire pour l'élaboration d'un lait véritablement nourricier : disposition qui se rencontre assez souvent chez les femmes d'une complexion lymphatique & sensiblement entachées de la diathèse scrophuleuse.

Le mamelon, de son côté, peut offrir & offre trop souvent des vices de conformation, ou un état morbide qui s'oppose à l'allaitement. Il peut être trop long, trop gros ; manquer entièrement, ou se trouver comme rentré ou effacé dans le corps de la mamelle ; ce qui ne permet point à l'enfant de le saisir, quelle que soit la force de succion dont on le suppose capable.

La peau des mêmes organes est quelquefois altérée & déformée par des maladies antérieures : les orifices des conduits lactifères sont obstrués ou trop dilatés.

La sensibilité de ces mêmes parties manque quelquefois ou est excessive ; ce qui devient

comme une autre source de difficultés ou d'obstacles pour l'allaitement.

Parmi les causes générales, on place surtout les altérations profondes & constitutionnelles, les dispositions scorbutiques, cancéreuses, tuberculeuses & les maladies héréditaires, en un mot, les altérations, les complexions morbides tellement profondes, que l'allaitement ne pourroit que prolonger sur l'enfant, l'influence malheureuse de l'être affaibli & dégénéré qui lui donna le jour.

L'enfant, si intimement uni à sa mère pendant la gestation, a déjà sans doute été modifié, au moment de sa naissance, par ces dispositions funestes ; mais, dans le cas où sa mère viendrait à le nourrir, n'a-t-il en effet rien à craindre du sang dont il est formé, suivant l'imprudente & dangereuse assertion de Rousseau ?

Des rapports continus & suivis avec une nourrice infirme ou malade, & que peut-être il eût fallu condamner au célibat, pourroient-ils ne pas augmenter & développer les germes du mal qui ont été reçus par lui, avec le don funeste de la vie ?

Le paradoxe le plus hardi ou le septicisme le plus coupable, pourroit seul élever les plus légers doutes sur de pareilles questions. Le genre de vie le plus habituel, les caractères trop passionnés & une indisposition morale, qui doivent faire éprouver habituellement des émotions pénibles ou exaltées, sont aussi, pour plusieurs femmes, un motif qui doit les priver du bonheur de nourrir leur enfant.

Les mêmes motifs & les divers obstacles qui doivent empêcher d'allaiter, & que nous venons d'indiquer, sont d'une bien plus haute importance, lorsque leur examen a pour objet le choix d'une nourrice.

La conservation du sein, l'état général de la santé, ne peuvent pas, dans un cas semblable, être observés avec légèreté ou avec indifférence.

On exige, en général, que chez les femmes qui se présentent pour nourrir, le sein ne soit ni trop volumineux ni trop chargé d'un embonpoint qui annonce toujours une sorte de dégénérescence ou d'altération dans le tissu de l'organe qui se prête à une pareille surcharge. On désire aussi que les mamelles ne soient pas entièrement rondes, mais un peu allongées, en forme de paire, parce que les enfans peuvent alors, comme le remarque Haller, prendre, non-seulement le mamelon dans leur bouche, mais une petite partie du sommet de la mamelle.

Un lait récent, de deux ou trois mois, par exemple, est toujours celui qui convient le mieux au nouveau-né ; toutefois un lait plus ancien, un lait de six ou huit mois, peut n'être pas rejeté, & l'opinion que le jeune nourrisson

renouvelle le lait, ne doit pas être rangée parmi les erreurs populaires; un excitements beaucoup moins fort devant nécessairement affaiblir ou diminuer la sécrétion des mamelles.

Le retour des règles & une situation de la femme qui n'offre aucune garantie sous le rapport des relations conjugales, sont des motifs d'exclusion beaucoup plus réels & beaucoup plus graves que l'époque d'un allaitement déjà assez avancé.

Une complexion morbide, qui n'est pas toujours annoncée par les apparences extérieures, est un autre motif d'exclusion encore plus puissant : en conséquence, on ne peut apporter trop d'attention ou de surveillance à tout ce qui concerne la constitution ou la vie privée de la femme qui se présente pour être nourrice, ni rejeter trop franchement, pour une semblable fonction, toutes les femmes auxquelles on pourrait supposer une disposition scorbutique ou rachitique, scrophuleuse ou tuberculeuse, lymphatique, caucéreuse, &c.

Plusieurs femmes dont la complexion est sensiblement scrophuleuse, & qui présentent néanmoins toutes les apparences de la santé & de la fraîcheur à un observateur superficiel ou peu éclairé, seroient nécessairement de très-mauvaises nourrices : leur nourrisson, qui d'abord pourroit être assez fort, ou même paroître remarquable par son embonpoint, dégénère ou maigrit le plus souvent après le sevrage. Le conseil de chercher, dans une nourrice étrangère, tous les traits d'une constitution analogue à celle de la mère, ne peut convenir que dans le cas où celle-ci jouiroit d'une santé parfaite, ou n'offrirait pas, avec une sorte d'exagération, les caractères les plus prononcés d'un tempérament particulier, du tempérament nerveux, ou du tempérament lymphatique, par exemple.

La femme qui nourrit pour la première fois, soit son propre enfant, soit celui d'une autre mère, doit commencer l'allaitement quelques heures après avoir été délivrée, & lorsque la fatigue de l'accouchement est dissipée. Son lait alors est beaucoup plus utile au nouveau-né par des qualités légèrement purgatives qui contribuent à évacuer le méconium. Le mouvement de réaction, la fièvre de lait, sont ainsi prévenus, ou sensiblement diminués.

Si, négligeant de se conformer à ce précepte, les nourrices négligent au préjugé qui les porte à différer le premier essai de l'allaitement jusqu'au troisième & au quatrième jour, l'ouverture des conduits lactifères, déignée sous le nom de *cassement des cordes* par les gardes-malades, sera beaucoup plus difficile, plus douloureuse, plus souvent suivie d'engorgement, de gerçures, d'abcès, &c.

Young, à qui ces remarques n'ont point échappé, rapporte que dans la plupart des hôpitaux consacrés aux femmes enceintes, en Angleterre, on voit à peine, sur 1,400 accouchées, deux nour-

rices qui soient affectées de maux de sein; ce qu'il attribue à l'usage de faire téter l'enfant, vingt-quatre heures après la délivrance, ou plus tard.

D'après ces vues, il seroit même utile de disposer les mamelles à leurs nouvelles fonctions, en rendant le mamelon plus souple au moyen de quelques lotions adoucissantes, ou même en dilatait, par une succion préparatoire, l'orifice des conduits lactifères. Quand le lait coule, vers la fin de la grossesse, la précaution que nous venons de conseiller ne peut avoir pour objet que de rendre le bout du sein moins sensible, moins irritable, en le familiarisant avec une action dont l'essai est le plus ordinairement pénible (1).

Ces divers soins, cette hygiène toute spéciale des nourrices, sont d'autant plus nécessaires que la conformation du sein est moins favorable à l'allaitement. Lorsque le mamelon est affaissé, on entièrement effacé & comme rentré dans le corps de la mamelle, il importe surtout de redoubler de sollicitude, on doit alors, & par des préparations bien entendues, faire ressortir le mamelon & lui donner une saillie sans laquelle l'allaitement deviendroit impossible.

La succion préparatoire remplit ordinairement cette indication; mais cette action demande beaucoup d'ordre, beaucoup d'habitude. White cite à ce sujet une famille anglaise consacrée aux soins des femmes en couches, dans laquelle on avoit acquis une grande réputation pour cet allaitement préliminaire, dont tout l'art consistait, du reste, à imiter un nourrisson bien conformé.

La succion avec la pompe à sein, qui n'est rien autre chose qu'une ventouse, n'agit pas d'une manière aussi douce, & ne dispose pas aussi bien le sein à remplir ses fonctions. On seroit cependant obligé d'avoir recours à ce moyen si le mamelon étoit entièrement effacé; on y renonceroit ensuite, & l'on seroit usage de la bonche aussitôt qu'il seroit possible de saisir le mamelon & de l'embrasser.

Pour empêcher le mamelon de s'effacer de nouveau, ou pour prévenir les éruptions, les gerçures, les érythèmes, on emploie quelquefois de petits étuis de cuir percés à leur extrémité, & qui peuvent par leur souplesse s'adapter exactement à la forme de l'organe délicat & sensible qui s'y trouve renfermé. Le soin qui a pour objet de développer les mamelons, ou de former les bords, doit commencer dès la finisme ou le septième mois de la grossesse, si la déformation de ces parties est très-considérable.

(1) La traite des vaches exige quelquefois ces précautions, & c. comme l'observent MM. Parmelee & Deyou, pour accoutumer insensiblement les vaches à se laisser toucher, il convient de manier quelquefois le pis des génisses pendant leur première lactation, parce qu'il y en a qui font tellement chahuteuses, qu'on ne sauroit les traire, &c. (*Expériences & observations sur le lait*, page 208.)

La conduite de l'allaitement pendant la durée de la nourritrice & jusqu'à l'époque du sevrage, doit être dirigée d'après des vues & des principes qui se trouvent souvent en opposition avec plusieurs erreurs populaires; mais il est impossible de tout dire, de tout prévoir à ce sujet, qui présente d'ailleurs un aussi grand intérêt. Nous nous bornerons à recommander aux femmes de ne pas donner trop souvent le sein à leur nourrisson, & d'être bien persuadées que les têter trop fréquents, trop rapprochés, fatiguent les mamelles, & les privent du repos qui leur est nécessaire pour fournir un lait bien élaboré & bien nourrissant. L'usage d'allaiter de bonne heure quelques aliments au lait de la nourrice ne trouve son application que lorsque celui-ci n'est point assez abondant; & son examen, du reste, appartient plutôt à l'hygiène des nouveau-nés qu'à l'hygiène des nourrices.

Les femmes un peu délicates, & qui néanmoins nourrissent elles-mêmes leur enfant, doivent plus particulièrement avoir recouru à cette allocation, & faire en sorte de suspendre l'allaitement pendant la nuit : ces femmes, & toutes les nourrices en général, ne doivent jamais perdre de vue que pendant toute la durée de l'allaitement, le sein est en quelque sorte un foyer, un centre de fluxion vers lequel toute espèce de mouvement, de sentiment ou d'émotion se rapporte d'une manière sympathique. Cette correspondance si étendue, si remarquable, se manifeste continuellement par des changements dans la sécrétion du lait, & sont la principale cause des variations que ce fluide a toujours présentées aux chimistes qui ont voulu l'analyser; variations qui ont fait dire à MM. Parmentier & Deyeux « que le lait de femme présente, soit dans sa composition, des différences bien » plus nombreuses que celles qui sont observées » dans tous les autres laits, & qu'il ne fournissait » jamais à l'analyse des résultats parfaitement » semblables. »

Un régime uniforme, une vie égale, & jamais ou rarement troublée par des émotions vives, sont les moyens les plus sûrs de diminuer ces variations & de les empêcher de se manifester avec une disposition morbide. Toute mère qui nourrit son propre enfant doit en conséquence se rapprocher, autant qu'il est possible, des conditions qu'elle aurait désirées ou exigées dans une nourrice étrangère : elle apportera donc le plus grand soin au choix, à la quantité de ses aliments, à l'état de sa digestion ou de sa nutrition, dont le plus léger dérangement lui sera révélé par les coliques, les cris, l'insatiabilité de l'humeur de son nourrisson, son insomnie & ses déjections véritables : déjections qui exigent presque toujours que la nourrice diminue ou modifie sa nourriture, ou soit légèrement purgée par la magnésie calcinée. Ce qui concerne l'allaitance que produit sur le lait un grand nombre de substances qui servent

comme aliments ou comme assaisonnements, doit être ajouté à ces remarques.

Le lait est bien plus sensiblement modifié que le chyle, par ces diverses substances, dont quelques principes, qui résistent à l'élaboration digestive, sont absorbés, & produisent des effets remarquables sur plusieurs sécrétions. Ainsi, l'absorbé en particulier, rend le lait amer; quelques purgatifs lui communiquent des propriétés laxatives, & le parfum de certaines fleurs lui donne une saveur ou une odeur aromatique, tandis que la semence d'anis, suivant Cullen, le rend propre à remédier aux épilepsies dont quelques enfants sont tourmentés. La quantité, l'abondance du lait, peut également dépendre de la qualité ou de la quantité des aliments; mais on ne sauroit trop répéter, avec l'accent de la conviction & le désir de propager une vérité utile, que rien ne peut contribuer autant à l'abondance & aux bonnes qualités du lait, que l'uniformité du régime des nourrices : vérité qui s'applique également aux femmes des mammifères, de telle sorte que le plus léger changement dans la nourriture, diminue, chez les vaches, la quantité de leur lait, dont les traites ne demeurent constamment abondantes, que par l'usage non interrompu des mêmes fourrages. Les passions, les affections morales, en général, agissent presque aussi puissamment sur la sécrétion du lait, que les différences dans le régime, ou les qualités trop stimulantes des aliments; on a même remarqué cette espèce de réaction chez les femelles de plusieurs animaux : ainsi, plusieurs vaches, par exemple, ne laissent pas couler leur lait quand on veut les traire, si on ne cherche pas à les amuser en les faisant manger; d'autres le refusent si elles éprouvent la plus légère distraction; d'autres le donnent en plus grande quantité à l'aspect de leur veau, ou d'un manège qu'il leur en présente l'image. Borden parle d'une chèvre chez laquelle ces rapports de la sensibilité avec la sécrétion lactée étoient si marqués, que ses conduits lactifères ne s'ouvraient qu'au moment où l'on entroit dans l'étable pour la mettre en liberté. Le même auteur dit avoir vu le lait s'épaissir & comme se coaguler chez une nourrice qui avoit vu tomber son enfant. La sécrétion se rétablit ensuite, & la nourrice, agitée tour à tour par des sentiments divers, sentoit la chaleur, la souplesse du sein, le remonte du lait, à mesure que le rétablissement du nourrisson se manifestoit.

En général, une grande terreur occasionne l'engorgement subit des mamelles; une tristesse profonde & un violent chagrin, les tarissent ou en diminuent sensiblement la sécrétion. La colère, la haine, la jalousie, mais surtout une inquiétude profonde & que rien ne peut distraire, altèrent directement les qualités du lait, peuvent l'empêcher jusqu'à un certain point, de le rendre très-nutritif; & l'observation, la connaissance de ces

effets est un des motifs les plus puissans qui doit, toutes choses égales d'ailleurs, déterminer, dans les hautes classes de la société, à prendre une nourrice étrangère, très-souvent moins exposée à cette foule d'accidens & de perturbations, qui dépendoient des rapports de l'état moral & de l'état physique pendant l'allaitement.

Sans porter jusqu'à l'excès les précautions relatives à la chaleur, les femmes qui nourrissent ne peuvent éviter avec trop de vigilance, l'humidité, le froid & tous les changemens brusques & rapides de la température. L'usage, l'habitude, un certain degré de force & de réaction, sont continuellement & impuissamment braver toute précaution à ce sujet, par les femmes du peuple, mais sans qu'il soit possible de se rassurer ou de se diriger d'après de semblables exemples. Dans ce cas même, ou à vu plusieurs fois un coup de vent porté sur le sein, ou l'impression subite du froid, occasionner l'engorgement des mamelles; il ne faut donc pas s'étonner si tous les médecins qui se sont occupés d'une manière spéciale de la santé des femmes, ont donné le conseil d'user de vêtements plus chauds, moins légers pendant l'allaitement, de se trouver rarement dans une atmosphère qui ait moins de dix à douze degrés de chaleur, au thermomètre de Réaumur.

Une inaction absolue, une vie trop sédentaire, n'est sans doute à l'allaitement, & les femmes dont la vie est régulière, ne doivent pas changer, pendant toute la durée de cette fonction. Elles doivent cependant éviter tous les genres de travaux & d'ouvrages qui pourroient fatiguer les yeux, ébranler le système nerveux & porter trop loin la contention d'esprit ou l'exercice de l'imagination. Quant au sommeil, les nourrices en ont constamment besoin; elles doivent donc mettre des bornes à leur sollicitude, & ne pas céder pendant la nuit, avec trop de complaisance, au moindre désir du nourrisson, pour diminuer autant qu'il est possible, les fatigues de l'allaitement. White leur conseille de faire en sorte, qu'obéissant à la voix du besoin, leur enfant n'emploie pas à téter, une partie du temps qu'il doit consacrer au sommeil. On fait contracter cette habitude, également utile à l'enfant & à la mère, & lorsque celle-ci a amené son nourrisson au point de ne téter que toutes les deux heures, ou même plus rarement, elle finit, après quelques épreuves dont son courage doit triompher, par consacrer au repos & au sommeil, une grande partie de la nuit, pendant laquelle, cessant d'être sollicitée par une irritation fatigante, le sein se remplit d'un lait plus abondant & mieux élaboré.

La continence que l'on recommande en général aux femmes qui allaitent, convient dans le plus grand nombre des cas, & doit être exigée de la part des nourrices étrangères. Cette même continence ne seroit pas sans inconvénient, si elle fai-

soit cesser d'une manière trop brusque des habitudes qui seroient devenues un besoin, & dont la continuation, avec une certaine réserve, pourroit même se trouver nécessaire pour contribuer à la sécrétion du lait, par l'effet des rapports sympathiques qui existent entre le sein & les organes de la reproduction; mais, il faut l'avouer, les lipites entre le vœu de la nature & l'exigence ou le caprice de l'imagination, sont difficiles à tracer en pareille circonstance, & trop souvent l'oubli d'une sage réserve altère la qualité du lait, le rend plus irritant ou moins nutritif, & occasionne ou nourrit des coliques, des tranchées, des digestions pénibles, lorsque la menstruation surtout n'est pas suspendue chez la nourrice.

Quelques auteurs ont pensé que la grossesse ne devenoit un motif pour sevrer, que lorsqu'elle étoit trop laborieuse. Il nous paroitroit utile, dans l'intérêt de l'enfant, de n'admettre que bien rarement une semblable opinion, quelle que soit d'ailleurs la confiance que mérite, relativement à cette question, le sentiment de Puzos, de van Swieten, & même de Laurent Joubert, qui s'appuie, dans un sens opposé à notre réserve, de son expérience personnelle (1). Quant à la durée de l'allaitement qui n'est interrompue par aucune cause accidentelle, elle s'étend naturellement jusqu'à la première dentition, quoiqu'elle puisse être portée beaucoup au-delà de cette époque, ainsi que les voyageurs l'ont observé chez plusieurs peuplades sauvages. On peut avancer de beaucoup le même terme, si, de très-bonne heure, on accoutumoit l'enfant à des alimens étrangers.

Quello que soit l'époque du sevrage, cette espèce de révolution exige beaucoup de précautions & de soins, & si la suppression brusque d'un dsrte ou d'un exutoire donnoit lieu à des craintes réelles & fondées, comment l'interruption subite de l'allaitement pourroit-elle paroître sans danger ou sans importance? Dans ce cas, & pour prévenir toute espèce d'accidens, il importe de ne sevrer qu'par degrés. Lorsque le sevrage est opéré, les plus grandes précautions doivent être prises relativement au froid & à l'humidité; on doit même exiger que la femme reste couchée, ou renfermée dans la chambre au moins pendant quelques jours, si la constitution est faible & délicate. Quelques sudorifiques & de légers purgatifs fussent ordinairement pour changer le point d'irritation, & faire cesser en quelque sorte l'habitude laiteuse. Mais il ne faut jamais oublier que chez le plus grand nombre des femmes, cette

(1) « La femme de ce monde que je chéris le plus, dit-il, à nourrir mes enfans, tant qu'elle a eu du lait, & je n'ai pas cessé pour cela de coucher avec elle, & lui faire l'amour comme un bon mari doit à sa bonne moitié, suivant la disposition du mariage; & Dieu merci nos enfans ont été bien portés, & sont bien venus. »

révolution ne s'opère que d'une manière incomplète. Le sein continue de demeurer un centre de fluxion; de telle sorte que les causes occasionnelles les plus légères peuvent en déterminer l'inflammation ou l'engorgement: d'une autre part, l'ensemble de l'organisation le trouve le plus souvent dans une insuffisance de réaction, & dans un état de faiblesse relative, qui expose à ces nombreuses variétés de névralgie ou de rhumatisme, que le vulgaire désigne si improprement sous le nom de *maladies laiteuses*.

Les femmes qui, avant la grossesse & l'allaitement, avoient éprouvé des atteintes de quelques *maladies constitutionnelles*, & principalement d'affections tuberculeuses, doivent être l'objet d'une surveillance particulière, & l'emploi d'un ou de plusieurs exutoires peut même devenir alors indispensable.

Les maladies des nourrices sont en très-petit nombre, en ne comprenant sous ce titre que les affections qui se rapportent d'une manière directe à l'allaitement.

La fièvre de lait, qui se trouve comprise parmi ces maladies, est le plus souvent prévenue, comme nous l'avons déjà remarqué, si l'allaitement est commencé quelques heures après la délivrance. Cette fièvre ne commence guère ordinairement que du troisième au quatrième jour, & dure rarement plus de vingt-quatre heures; elle n'est presque jamais accompagnée, chez les femmes qui nourrissent, d'un mal de tête violent & de cette tuméfaction excessive des seins, qui le plus souvent est si incommode & si douloureuse.

L'éruption des règles, qui se trouvent ordinairement suspendues pendant l'allaitement, ne doit pas être regardée comme un état morbide, mais comme une indisposition, lorsqu'elle survient chez quelques nourrices. Ce phénomène, qui diminue & qui altère sensiblement la sécrétion du lait, ne pourroit même déterminer un serrage, si le nourrisson n'étoit que très-faiblement dérangé par cette indisposition passagère; il seroit seulement convenable, pendant toute la durée, de le faire téter moins souvent, & de lui donner jusqu'à la cessation des règles, un breuvage alimentaire. Une panade légère, & mieux encore une benille préparée, soit avec la fécula de pomme de terre ou d'arrow-root, soit avec de la farine de froment préalablement torréfié.

Un léger embarras gastrique, qui paroît dépendre des suites de l'accouchement, peut exiger quelquefois, pendant les dix ou douze premiers jours de l'allaitement, certaines médications propres à rappeler à son état normal ou habituel, la sécrétion de la membrane muqueuse de l'estomac, & des intestins, d'une manière très-douce & sans pouvoir altérer ou déranger le mouvement fluxionnaire qui se dirige du côté des mamelles. Les substances les plus propres à remplir cette indication, sont la magnésie à petite dose, soit

seule, soit combinée avec une petite quantité de soufre, ou de rhubarbe ou d'opéacuanba en poudre: l'huile de palma christi à très-faible dose, & associée à l'éther, ou à l'esu dissilée de quelques plantes aromatiques (de la mélisse, par exemple, ou de la menthe poivrée).

La diminution ou la suppression des lochies, chez la femme qui commence à nourrir, peut être à peine regardée comme une maladie. On donneroit cependant quelque importance à ce symptôme, s'il paroît dépendre de l'impression du froid ou d'une irritation qui seroit éprouvée, soit du côté de la poitrine, soit du côté des voies gastriques. Dans le premier cas, le repos, la chaleur du lit, deviendroient indispensables, ainsi que quelques émollients, ou même l'application d'un cataplasme épais & gras sur l'abdomen, pendant quinze à vingt heures. L'idée d'une irritation vers quelques-uns des viscères de la poitrine ou de l'abdomen, conduiroit à un traitement plus efficace, & qui ne peut être qu'indiqué dans cette rapide exposition. Voyez MULLIAR (Fièvre), PUERPERAL (État), PUERPERAL (Fièvre).

Les mères qui sont d'une complexion foible, & dont le double travail de la grossesse & de l'accouchement a épuisé les forces, ne tardent pas à éprouver, lorsqu'elles essaient de nourrir, contre l'avis d'un médecin ou d'une sage-femme sagement éclairée, un dérangement assez grave dans leur santé, pour être regardé comme un état morbide; leur appétit se perd; elles sont privées de sommeil & très-altérées; la langue est sèche & d'un rouge très-vif à sa pointe & sur ses bords; le pouls présente de la fréquence & quelquefois de la dureté, & tous ces symptômes augmentent sensiblement vers le soir. Cette disposition morbide, que l'on ne trouve pas dans les classifications nosographiques, pourroit s'y trouver placée dans le voisinage de la fièvre lente nerveuse. Il n'est pas rare de voir une indisposition à peu près semblable se manifester à une époque plus avancée de l'allaitement, avec des symptômes d'irritation plus marqués du côté de la poitrine, de telle sorte qu'il survient alors de la chaleur dans cette partie, une douleur entre les épaules, cette petite toux, si grave, si inquiétante, que les praticiens désignent sous le nom de *toux nerveuse*.

Dans ces deux circonstances de maladie, qui se rapportent évidemment à l'état de nourrice, le serrage devient indispensable dans l'intérêt de la mère & dans l'intérêt de l'enfant, qui seroit infailliblement la victime du moindre retard, dans une circonstance aussi grave.

L'ouverture des conduits lactifères, dont nous avons parlé, peut être assez difficile ou assez douloureuse pour être regardée comme un état morbide. L'irritation qui en résulte, en celle qui peut

péut être occasionnée par les gerçures ou crevasses du sein. Cette irritation & l'impression subite du froid, sont les causes les plus fréquentes de la maladie la plus douloureuse des nourrices, de l'engorgement du sein, que le vulgaire désigne sous le nom de *poil*, d'après une erreur populaire, qui remonte jusqu'au temps & même jusqu'aux écrits d'Aristote. Voyez POIL, SÈNE (Engorgement du).

Il n'est pas sans exemple que certains enfans qui ont des aphthes ou qui présentent un premier degré de muguet, ne déterminent, par une locie de communication contagieuse ou par l'impression de la salive, une éruption miliaire à la surface du sein de leur nourrice, & dans une partie plus ou moins étendue de cette surface : affection quelquefois très-incommode & qui peut devenir, lorsqu'elle n'est pas dissipée assez promptement, une cause directe des engorgemens dont nous venons de parler.

On a rangé aussi, parmi les causes des gerçures & des crevasses du sein, le peu de soin des nourrices, qui, après chaque têter, négligent tout ce qui tient à la propreté & à l'intégrité du mamelon.

Dans le cas des maladies locales dont nous parlons, l'allaitement peut devenir assez douloureux pour forcer la mère à ne donner à têter que du côté où de pareilles souffrances ne se font pas éprouver. Pendant cette interruption, on a recours à tous les moyens les plus propres à rafraîchir la peau & à faire cesser les érosions & les gerçures; on s'occupe en même temps des indications relatives à l'engorgement de la mamelle.

La sécrétion du lait, sans offrir aucun symptôme de souffrance, se rapproche quelquefois d'un état morbide. Il n'est pas sans exemple que, par l'effet d'une disposition qui n'est pas sans analogie avec la salivation ou le diabète, elle se trouve sensiblement augmentée & portée au point de devenir, si elle n'étoit réprimée, la cause d'une véritable consomption, la *consomption laiteuse*. On arrête ou l'on modère ce mouvement sécrétoire, par des applications légèrement toniques, mais surtout par le serrage & par l'emploi des moyens les plus propres à diminuer en général les sécrétions ou à les rappeler à leur état normal (les résineux ou les substances balsamiques combinées avec les opiacés).

D'une autre part, sans admettre les métastases laiteuses, il est difficile de ne pas reconnaître que, dans quelques circonstances, l'interruption brusque de la sécrétion du lait, par des causes violentes de perturbation, occasionne, par le changement dans le point d'irritation, les accidents les plus graves, un état passager d'aliénation, par exemple (1), une ophtalmie rebelle,

une péripneumonie aiguë ou une phlegmasie lactée, soit de la plèvre, soit des poumons, l'engorgement phlegmoneux ou l'engorgement téréux des membres.

Les secours les plus efficaces de la médecine sont évidemment indiqués dans ces diverses circonstances, les évacuations sanguines, locales ou générales; ainsi, une saignée du bras, ou mieux encore une saignée du pied, sera indispensable, si les phénomènes morbides, dont nous venons de parler, se manifestent chez une femme d'une complexion robuste & pléthorique.

L'application des sangsues à la vulve conviendra davantage chez une nourrice moins forte, surtout si quelques-uns des mêmes accidens se manifestent à l'époque où les règles arrivent le plus ordinairement. Un emploi aussi, & comme d'utiles auxiliaires de la saignée, les bains de jambes sinapisés, ou une application soutenue sur une grande partie des extrémités inférieures, de cataplasmes composés, dans l'intention d'exciter fortement la perspiration cutanée de ces parties, & d'opérer ainsi une dérivation très-douce & très-efficace (1). Lorsque l'on a sensiblement diminué les symptômes de l'inflammation & de la première réaction, on doit faire usage, suivant les indications, des dérivatifs, soit au moyen des sudorifiques ou des purgatifs, soit par l'usage plus efficace d'un séton, d'un vésicatoire, ou de la pomade connue sous le nom de *pomade de Goudet*, appliquée à une distance convenable du centre de l'action morbide : on s'occupe en même temps, & dès le commencement de la maladie, de tous les moyens les plus convenables pour rappeler un mouvement sécrétoire vers les mamelles, on du côté de l'intérieur & du gros intestin, si les accidens dont nous parlons s'étoient manifestés pendant les douze ou quinze premiers jours de la nourriture. Il existe à cette époque plusieurs exemples de la péritonite particulière, que l'on a désignée sous le nom de *fièvre puerpérale*, qui toutefois doit être plutôt rapportée à la médecine spéciale des femmes en couches, qu'aux maladies

(1) Ces cataplasmes sont les cataplasmes de Praetorius, ou un cataplasme plus simple, & préparé d'après la formule suivante :

℞. Riz. ℥ij.

Fairez crever avec soin dans quantité suffisante l'eau; ajoutez ensuite axonge. ℥ij.

Mouillez au poud. ℥ij.

Mélez & faites bouillir également pendant dix minutes.

Ces cataplasmes doivent être étendus sur un morceau de linge assez grand pour couvrir chaque pied & chaque jambe jusqu'aux genoux. On les arrête au moment de l'usage avec quelques cuillerées de rhum ou d'eau de Cologne. Il est nécessaire de les recouvrir avec une seconde enveloppe en laine, & avec une troisième en taffetas ciré, pour les conserver chauds pendant vingt quatre heures ou moins.

Qggg

(1) Le délire, la vénération des femmes en couches.
MÉDECINE. Tome X.

des nourrices. *VOYEZ* *Couches* (femmes en couches); *POZARÉAL* (état puerpéral morbide); *VOYEZ* aussi, pour plus de développement, l'article *PUERÉAL* (état puerpéral, maladie puerpérale), dans lequel on reviendra, soit pour dissiper des erreurs, soit pour remplir des lacunes, sur les articles *ACCOUCHEMENT*, *ALLAITEMENT*, *COUCHES* (femmes en couches), *GROSSESSE*, &c. &c., & sur l'article *LACTATION*, qui a été oublié dans ce Dictionnaire. (MORÉAU DE LA SARTRE.)

NOURRICIER ou **NUTRICIER**, adj. On donne ce nom aux liquides que l'on suppose entretenir la nutrition dans les parties. On appelle *artères nutritives* celles qui s'enfoncent dans les os longs pour les soutenir. (A. J. T.)

NOURRITURE, f. f. (*Physiologie & Hygiène*.) Le mot *nourriture*, dans l'acception usuelle, s'éloigne très-peu du mot *aliment*, & s'applique également, mais d'une manière plus abstraite, aux substances, aux matériaux qui servent à nourrir, après avoir été soumis à l'action des voies digestives. En nous attachant à ce sens consacré par l'usage, nous allons placer ici quelques aperçus, quelques notions, que l'on chercheroit en vain dans l'article *ALIMENT*, déjà assez éloigné de l'état présent des connaissances, & dont l'auteur, préoccupé par des vues théoriques & par des recherches d'érudition, n'a point embrassé le sujet qu'il traitoit, dans toute son étendue, surtout pour ce qui concerne l'hygiène usuelle, la pratique journalière & la médecine légale.

Une première division a pour objet dans cet article *ALIMENT*, la matière nutritive, considérée abstractivement, soit d'après Hippocrate, soit d'après Lorry, soit enfin d'après les réflexions de l'auteur & l'état des connaissances chimiques, à l'époque où il écrivait.

L'aliment, considéré en général, présente sans doute plusieurs sujets très-importants d'observation. Son objet, soit relativement à la nutrition proprement dite, soit relativement à l'action des organes, que la nourriture excite & réveille d'une manière périodique; l'effet immédiat de l'aliment, la durée de cet effet, modifié par l'habitude, &c. : toutes ces questions, qui appartiennent à un point de vue général & très-élevé d'un pareil sujet, ne sont pas même indiquées dans le travail de notre savant collaborateur, beaucoup moins satisfaisant sous ce rapport, que les considérations consacrées au même objet par Haller, dans sa grande physiologie.

La matière nutritive, son véritable caractère, ce qui la distingue de l'aliment d'Hippocrate⁽¹⁾,

(1) *Alimentum unum & alimentis species multe*. Hippocrate, et l'auteur, quel qu'il soit, du livre de *ALIMENTA*.

cette matière adoptée par Lorry, & qui ne peut plus être regardée aujourd'hui que comme un être de raison, a beaucoup trop occupé Hallé, & ne put être admise qu'à une époque où l'esprit philosophique qui commençoit à s'introduire dans la médecine, étoit encore modifié par un reste de philosophie scolastique, sous la plume des écrivains qui accorderoient malheureusement plus d'importance à la spéculation & au savoir littéraire, qu'à l'étude immédiate & positive de la nature. Quant à la théorie de l'assimilation, que notre auteur fait entrer dans ses observations sur la matière nutritive, abstractivement considérée, elle ne peut plus appartenir aujourd'hui qu'à l'histoire des hypothèses, qui ont en pour objet d'expliquer l'ensemble ou quelques parties de l'économie vivante, & que l'on abandonne souvent, avec un injuste mépris, après les avoir admises avec un aveugle enthousiasme. Une deuxième division a pour objet la matière nutritive, considérée dans les différents corps de la nature. Une première partie de cette division, consacrée toute entière à l'examen des propriétés que présentent les différentes espèces d'aliments, d'après Hippocrate, appartient bien moins à l'hygiène qu'à une histoire de cette science très-détaillée & rédigée suivant le goût des érudits qui travaillent pour l'Académie des inscriptions & belles-lettres.

On apprend dans ces recherches ce que les Anciens en général, ou l'auteur inconnu des *Traité du régime & de l'aliment*, ont pensé sur les effets du sec & de l'humide dans les substances qui nourrissent, sur les propriétés laxatives de ces substances, leur température, leur manière d'être pesantes ou légères, relativement à l'action qu'elles produisent.

La deuxième partie du même article, moins théorique & plus usuelle que la première, fait connoître la doctrine des Anciens sur les graines céréales & sur leurs préparations diverses, sur les autres semences nutritives, sur les fruits, sur les liges, sur le miel, le vin, sur les substances animales fournies par les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, que les Anciens confondoient le plus souvent avec les insectes & les mollusques.

Ce qui concerne la nourriture de l'homme en général, les différentes espèces d'aliments en particulier, la manière d'en faire usage, & les principes généraux de la diététique, ne se trouvent que très-incomplètement indiqués dans cet article. Nous désirons sincèrement remplir une pareille lacune dans les considérations suivantes.

Un article *Nourriture* seroit d'ailleurs fort imparfait, bien peu conforme à son objet & à l'ordre encyclopédique, s'il n'étoit pas traité avec autant de méthode que d'étendue, c'est-à-dire,

de manière à répondre non-seulement au mot *nourriture*, en le prenant dans une acception très-restrictive, mais aux articles *BAUMATOLOGIE, VITALE, SUBSISTANCES, ALIMENT, ALIMENTATION, RÉGIME, DIÈTE, DIÉTÉTIQUE, FAIM, SOIF, BOISSON, ASSAISONNEMENTS en général, COLLÉRIE (art culinaire), police sanitaire* concernant les comestibles. Pouvant choisir entre le développement systématique & l'exposition morcelée ou détachée qui se rapporte à ces divers articles, nous avons préféré ce développement méthodique. Cette préférence, dont nous avons pensé que les lecteurs devoient être avertis, expliquera naturellement l'étendue de notre travail, qui est devenu insensiblement un véritable traité sur l'alimentation, ouvrage qui manquoit peut-être à la science, & dont la place se trouve si bien assignée dans un Dictionnaire qui, par son objet particulier, est bien plus ordonné qu'aucun autre ouvrage du même genre, à comprendre dans tous leurs développements les vérités scientifiques qui se rattachent en même temps à la philologie générale, aux intérêts les plus élevés de la société, & aux besoins journaliers de la vie privée & de l'économie domestique.

Les nourritures, considérées sous un point de vue général, & tout à la fois hygiénique & physiologique, l'indication rapide, ou même la simple énumération des productions de la nature qui sont employées dans l'alimentation, attireront d'abord toute notre attention. Nous nous occuperons ensuite de la composition, de la préparation des aliments, & après avoir traité séparément des boissons, nous terminerons l'ensemble du travail par un petit nombre de remarques sur les nourritures solides & liquides, envisagées sous le point de vue de la médecine légale & de l'hygiène publique.

DE L'ALIMENTATION EN GÉNÉRAL.

L'alimentation, considérée sous un point de vue général, embrasse naturellement plusieurs objets qui, sans pouvoir être rapportés à l'examen particulier des différentes espèces d'aliments, leur appartient en commun, & doivent être réunis dans un seul & même ordre de considération. Enfin, la première question qui se présente dans ce point de vue, a pour objet les rapports de la nourriture ou du fonds de subsistance avec la population, qui ne peut s'élever subitement au-delà de certaines limites, sans occasionner les famines les plus redoutables ou d'autres fléaux non moins terribles, les révolutions populaires, les calamités de la guerre ou les ravages de la peste, les maladies épidémiques, &c.

Le besoin de la nourriture, les effets que les

aliments font éprouver, les modifications qu'ils éprouvent à leur tour, leur composition, la diversité de leur nature, leur préparation, leur quantité, & les lois fondamentales du régime ou de la diététique, telles sont les autres questions qui se présentent dans l'exposition générale des aliments, & dont l'examen le plus spéculatif ou le plus scientifique en apparence se rattache toujours à la pratique dans ses applications.

Des rapports des nourritures ou des subsistances, avec la population.

La nourriture ou les nourritures ne sont pas également abondantes dans tous les lieux ni pour tous les peuples. Elles présentent à ce sujet une foule de variétés & de différences qui dépendent également d'une grande inégalité dans l'industrie de l'homme, & d'une grande diversité dans la fécondité de la nature. Les nourritures, considérées sous ce rapport, & dans les conséquences étendues qui s'y rattachent, sont désignées souvent par les économistes sous le nom de *consommation* ou de *subsistances*. Elles exercent nécessairement une influence remarquable sur la population, qui doit augmenter ou décroître avec elles, suivant des lois & des proportions qui ont été & qui sont encore aujourd'hui un sujet de discussion pour les savans, que la nature de leurs méditations appelle à prononcer sur de pareilles matières.

M. Malthus, l'un des philosophes qui se sont le plus occupés d'une question aussi importante, a été conduit à penser que pour l'homme comme pour les animaux, l'accroissement de la population, même dans les conditions les plus heureuses, étoit toujours plus rapide, plus considérable que l'augmentation dans les moyens de subsistances, & que cette disproportion, si funeste dans ses conséquences, avoit constamment agi depuis l'origine des sociétés, dans le sens le plus contraire au bonheur de l'espèce humaine.

Cette opinion, si on la considère sous le point de vue de l'économie politique, à laquelle elle appartient essentiellement, se trouve tout-à-fait étrangère à cet article; mais il n'en est pas ainsi du développement de les preuves que l'auteur a puées dans l'histoire de l'espèce humaine, & dont la recherche l'a conduit à traiter l'un des points les plus importants de l'hygiène & de l'anthropologie, l'état des subsistances, & leur rapport avec la population, dans les différentes situations sociales, soit chez les peuples modernes, soit chez les nations les plus considérables de l'antiquité.

Dans l'enfance de la civilisation, chez les malheureux naturels de la terre de Feu, & de la

terre de Vae-Diemee, ou chez les peuplades de la Nouvelle-Hollande, une foule de causes tendent sans cesse à diminuer le nombre des habitants ; tels sont la férocité générale des mœurs, le défaut de toute prévoyance, le malheur de la condition des femmes, le pen de sollicitude pour les enfans, & la difficulté de les nourrir, au milieu des dangers continuel d'une vie errante & pénible ; & cependant, dans un concours de circonstances aussi défavorables, une population aussi foible, aussi nombreuse qu'il est possible de le supposer, se trouve si exactement au niveau des subsistances, qu'une petite diminution de celles-ci occasionne les plus redoutables famines.

Chez les sauvages de l'Amérique, la population, à un petit nombre d'exceptions près, semble toucher également à des limites qu'elle ne peut jamais dépasser, malgré les causes permanentes (1) & les circonstances accidentelles (2) qui s'opposent à ses progrès. Partout, chez ces sauvages, on trouve une preuve de cette vérité & de la difficulté de se nourrir. Un voyageur espagnol (3), qui vécut pendant près de neuf ans parmi les sauvages de la Floride, voyoit continuellement ces infatigables épreuveurs, sous toutes les formes, les tourmens de la faim, & dévorer, pour l'appaiser, des araignées, des œufs de fourmis, & même une terre onctueuse. Si le sel de ces sauvages produisoit des pierres, ajoute ce voyageur, ils les avaleroient ; j'ai appris du moins qu'ils recueilloient & conservoient les os des serpens ou des poissons qu'ils avoient mangés, pour les broyer & pour s'en nourrir au besoin.

Ellis ne parle pas d'une manière moins touchante de la disette & des jeûnes prolongés des naturels placés aux environs de la baie d'Hudson, forcés souvent aux horreurs de l'anthropophagie.

On pourroit conclure, d'après les récits les plus récents des missionnaires, que dans l'état actuel, la population des îles de la mer du Sud, mais surtout la population d'Otaïhti, se trouveroit au-dessous du niveau des subsistances ; mais il est évident qu'un semblable résultat ne peut être que temporaire, & qu'il faut l'attribuer à un effet fondaiu & violent des causes, soit permanentes, soit accidentelles, qui tendent à diminuer le nombre des hommes dans ces contrées.

Une disproportion sans cesse renaissante entre la population & les moyens de la nourrir ; cette

disproportion, combinée avec les habitudes vagabondes & guerrières de la vie nomade, explique naturellement les invasions successives, les émigrations à main armée des barbares, au commencement du moyen âge, & les calamités si longues, si profondément senties, qui accompagnèrent ces tragiques événemens ; une tendance non moins évidente de la population, pour dépasser le niveau des moyens de subsistance, se manifeste également aujourd'hui chez les nomades stériles de l'Asie, & ne s'y trouve contrebalancée que par l'inegalité des conditions, la difficulté d'acheter une femme dans les classes inférieures, la facilité d'une vie licencieuse, & surtout par la fréquence des guerres, des famines & des épidémies.

Des causes de destruction du même genre, mais encore plus nombreuses, plus fréquentes, plus actives, retiennent la population au niveau d'un fonds de subsistance restreint, non-seulement parmi les peuplades saines ou éteintes, qui se trouvent disséminées sur les côtes de l'Afrique, mais dans l'Egypte, jadis si florissante & si peuplée, & réduite aujourd'hui au dernier degré du malheur & de la servitude, ainsi que la plupart des autres provinces soumises à l'empire des Turcs.

Chez les nations les plus septentrionales de l'Asie, le même résultat est amené par des moyens assez analogues à ceux qui agissent chez les indigènes de l'Amérique, avec cette différence que chez les premiers, les vices de la famille l'emportent beaucoup sur les calamités de la guerre, & n'en font pas ordinairement la plus fâcheuse conséquence.

Un semblable état, assez fréquent à la Chine, où plusieurs causes tendent à la faire croître, y retient continuellement la population dans des limites d'où elle tend sans cesse à sortir ; ce qui a fait dire au jésuite Parrenin, que si la famine ne paroissoit pas aussi de temps en temps, il seroit impossible que le pays fût tranquille. L'esclavage de l'infanticide se joint, d'ailleurs, à cette cause accidentelle d'abaissément de la population parmi les Chinois.

La famine & les maladies qui en deviennent la suite, sont également très-fréquentes, très-différentes au Japon & ce qui est produit par l'infanticide chez les Chinois, se produit chez leurs voisins par le libertinage, les troubles intestins & les calamités de la guerre. Dans un état de civilisation plus avancé, chez les Anciens en général, & chez les Grecs en particulier, la tendance continuelle de la population à dépasser de beaucoup dans ses progrès les moyens de subsistance, attira de bonne heure l'attention & la surveillance des législateurs, ou des philosophes qui s'occupaient de matières politiques dans leurs spéculations ; mais principalement de Platon & d'Aristote. Plusieurs traits de la république sont vantés de l'un

(1) Le genre de vie, celui des peuples chasseurs ou pêcheurs, les guerres continuelles qui retiennent d'une malheureuse concurrence, la frigidité des hommes, la misérable condition des femmes, leur stérilité, &c.

(2) Plusieurs maladies graves, les épidémies destructives, &c.

(3) Alvar Nunez Cabeza de Vaca.

de ces philosophes, font voir évidemment, dit M. Malthus, que Platon avoit été vivement frappé de la tendance qui se manifeste dans la population à s'élever continuellement dans les progrès au-delà du fonds des subsistances. Les moyens qu'il proposa font exécration, sans doute, mais ils prouvent qu'il s'étoit fait une juste idée de la force & de la grandeur de l'obstacle qu'il vouloit combattre. Lycurgue & quelques autres législateurs, qui jetèrent un coup d'œil moins pénétrant sur la réalité des choses & sur la véritable nature de l'espèce humaine, s'attachèrent à encourager la naissance des enfants sans pourvoir à leur entretien; ce qui faisoit un très-petit accroissement de population au prix d'un très-grand accroissement de misère & de souffrance. Du reste, les causes accidentelles qui tendoient à diminuer la population chez les Grecs, indépendamment des mesures ou des institutions, ne manquèrent point à ce peuple, ainsi qu'il est facile de le voir par le tableau de ses divisions intestines & des guerres continuelles & sanglantes auxquelles il fut en proie pendant plusieurs siècles.

Des causes du même genre agissent dans le même sens, & peut-être encore avec plus de force parmi les Romains. Ajoutons que cet effet se joignoit à celui des maladies épidémiques beaucoup plus fréquentes, & à l'influence de la corruption des mœurs, de l'inégalité des fortunes, & à plusieurs institutions éminemment contraires au travail, à l'industrie, & par cela même à la population.

Un coup d'œil sur l'état de la société chez les peuples modernes, ce coup d'œil, quelque rapide qu'il pût être, nous entraîneroit beaucoup au-delà du sujet particulier du cet article; il ne seroit, d'ailleurs, qu'ajouter une nouvelle preuve à l'appui de cette opinion, que pour l'espèce humaine comme pour les autres créatures vivantes, la nourriture cesse bientôt de suivre son d'atteindre dans les progrès, l'accroissement de la population abandonné à lui-même, ou encouragé par des institutions ou par des habitudes impolitiques, ce qui produit, avec le temps, les plus redoutables fléaux, la famine & les épidémies qui en sont la suite inévitable: vérité si frappante aujourd'hui pour l'Inde, dont le malheur doit être également attribué à l'espèce d'insouciance barbare des classes inférieures, & à la négligence du Gouvernement.

D'après ce qui précède, la nourriture, les moyens de subsistance se trouvent donc toujours bien peu abondants, bien insuffisants, si on les compare aux générations qui se succèdent avec une telle rapidité, qu'une seule espèce de végétal, le fennec, par exemple, suffiroit bientôt, suivant la remarque ingénieuse de Franklin, pour couvrir rapidement de sa verdure toute la surface

de la terre, si, par une catastrophe quelconque, notre planète se trouvoit dépouillée tout-à-coup de toute autre espèce de plantes.

Du besoin de la nourriture, de ses causes, de la faim, du jeûne & de l'abstinence.

La nourriture, que l'homme & les animaux ne se procurent presque jamais qu'avec une extrême difficulté, & par des efforts inséparables d'une pénible concurrence; cette nourriture qui se trouve toujours bien restreinte, bien insuffisante dans tous les lieux, si on la compare aux progrès de la population, répond à différents besoins, & demande, soit pour être obtenue, le plus souvent par force, soit pour être élaborée & transformée de diverses manières, l'emploi de divers appareils d'organe & l'exercice de plusieurs facultés.

De l'ensemble de toutes ces actions résultent la digestion & l'emploi de différents genres de nourritures. Deux ordres de dispositions également importantes ont pour objet cette fonction, dont la suspension ne peut jamais s'étendre au-delà de certaines limites, au moins pour le plus grand nombre des animaux, sans rendre leur mort inévitable. Ces dispositions sont, d'une part, l'excitement même des organes de la digestion, qui est une des conditions de la santé & de l'existence; d'une autre part, la réparation des pertes qui résultent continuellement de l'activité consomptive & dévorante du principe de la vie.

Les déperditions variées des subsistances, que le fait même de la vie rend indispensables, est une chose d'observation journalière, & que les esprits les moins attentifs & les moins éclairés ne peuvent méconnoître: ces pertes ne s'effectuent pas seulement par la transpiration, elles ont lieu en outre par l'exhalation pulmonaire & par d'autres excretions. Pour l'espèce humaine, & dans un espace de vingt-quatre heures, ce déchet, que la digestion doit réparer, varie pour un individu adulte, la quelle que soit la quantité de nourriture qu'il ait prise, depuis une livre onze onces jusqu'à cinq livres. Si l'on prend une moyenne proportionnelle, autant qu'on a pu le faire de recherches en est susceptible, ce déchet peut être évalué à deux livres treize onces; savoir, une livre quatorze onces par la perspiration cutanée, & quinze onces par la respiration (1).

D'autres pertes que l'on ne pourroit évaluer, même d'une manière approximative, varient suivant une foule de causes individuelles, & s'effectuent par différentes excretions.

L'accroissement dans les jeunes animaux, & la réparation prompte, régulière, des pertes conti-

(1) Voyez les Mémoires de l'Académie des sciences, 1780, pag. 620. — Mémoire de Lavoisier & Berthollet sur la respiration.

anueles de l'organisation à toutes les époques de la vie, font le véritable objet, le but final de toute alimentation; mais un motif plus puissant peut-être, plus direct, consiste dans l'excitement périodique des organes de la digestion, dont nous vivons de parler; dans le renouvellement, soit par sympathie, soit par allocation, de plusieurs actions nerveuses qui se rattachent à ce même excitemment, & qui le sont liées, avec le temps, au développement des forces *épiguistiques*.

Le cœur & les autres viscères creux, quelle que soit d'ailleurs leur structure, renferment en eux-mêmes, & doivent à l'exercice même de la vie, le stimulant, le principe d'action qui les fait vivre, qui entretient le mouvement continu des uns, ou provoque les mouvements, soit accidentels & irréguliers, soit habituels ou périodiques des autres. L'appareil gastrique en général, & l'estomac en particulier, le trouvent comme en dehors de cette condition.

Leur action, l'exercice de leurs fonctions, le développement de leur énergie, ne peuvent être suspendus pendant un certain temps sans qu'il résulte de cette interruption *irritation, souffrance, mal-être*. L'entretien de cette action est attaché à un stimulant extérieur, à une certaine quantité de nourriture, dont le premier effet se montre dans le rétablissement presque instantané des forces épuisées, c'est-à-dire dans une *resuscitation* rapidement opérée par l'impression des aliments sur les voies digestives; effet immédiat, toujours pressant, toujours impérieux, & qui ne peut être différé au-delà d'une certaine limite, sans que la mort, & une mort douloureuse & horrible, ne soit la suite de cette interruption.

Cette mort, qui n'est point la conséquence d'une déperdition de substance encore peu avancée, est plus ou moins prompte, suivant une foule de circonstances, dont les unes se rapportent à l'individu même, qui éprouve le supplice de la faim; tandis que les autres lui sont étrangères, & se rapportent au milieu dans lequel il se trouve placé, à son humidité, à sa température, à son exposition, &c.

Dans l'état le plus ordinaire, les personnes qui périssent par la faim succombent du quatrième au septième jour, quelquefois le dixième, & même le treizième & le dix-neuvième; variétés dont plusieurs auteurs ont cité des exemples (1).

L'âge exerce une assez grande influence sur ces différences, ce qui n'a point échappé aux habiles observateurs de l'homme, & aux grands peintres de ses malheurs & de ses passions.

Hippocrate a dit, dans ses immortels *Aphorismes*, & sans doute d'après une expérience bien

antérieure à ses observations: ceux qui supportent le mieux la faim, ce sont les vieillards, ensuite les hommes d'un âge mûr, beaucoup moins bien les adolescents, beaucoup moins bien encore les enfants, & surtout les enfans qui ont le plus d'activité:

1°. *Senes facillimè jejuniū ferunt; secundò ætate consilientes, minusc adolescentēs, omnium minusc pueri; ex his autem qui inter ipsos sunt alacriores* (1).

Nous moins judicieux observateur de la nature, le Dante s'est conforcé à cette gradation des âges dans son dramatique *Épisode du comte Ugolin*, condamné par un ennemi implacable à périr de faim avec sa famille. Les plus jeunes de ses fils périssent les premiers; les plus âgés un plus tard, du cinquième au sixième jour, & l'infortuné comte, le huitième.

À toutes les époques de la vie, certains états morbides, que l'on ne peut rapporter qu'à la classe des névroses, paroissent suspendre la nutrition. On a observé alors des abstinences de plusieurs semaines, de plusieurs mois, & même de plusieurs années. Haller, qui cite plusieurs exemples de ces prodiges, remarque, avec beaucoup de raison, que les personnes qui les ont offerts, étoient, pour la plupart, des vaporeux, des hypochondriaques, des femmes hystériques, ou des malheureux vilains privés à la fois de leur raison & de leur santé par un fol enthousiasme, ou par les habitudes d'une vie contemplative & ascétique. Nous devons ajouter à cette remarque, que pendant ces abstinences, merveilleusement prolongées, la vie se trouvoit sensiblement diminuée & bornée à une somnolence habituelle pendant laquelle les excréments paroissent suspendus, ainsi que toute manifestation de mouvement & d'activité. Un sommeil plus profond, une torpeur pendant laquelle la vie ne se soutient que par les stimulans internes évidemment diminués, font jullemeot regardés comme une des circonstances qui sont le mieux comprises les longs jeûnes des animaux à sommeil hibernical, qui maigrissent, d'ailleurs, beaucoup pendant leur abstinence périodique, & dont la nutrition paroît s'opérer pendant toute la durée de cette abstinence, aux dépens de la graisse dont ils sont abondamment pourvus à la fin de l'hiver.

L'abstinence & la faim qui l'accompagne, produisent des effets bien plus rapides dans le plus grand nombre des cas, & surtout chez les animaux qui ne sont pas sujets à la torpeur hibernale, ni modifiés par un état accidentel de maladie, capable de suspendre ou du moins d'affoiblir le mouvement de la nutrition.

(1) Haller, *Element. physiologia*, vol. VI, in-4°, pag. 168 & 169.

(1) Voyez Hippocrate. *Aphor.*, édition Parisc. scilicet. *prima*, Aphor. XIII, que l'on pourra confronter avec le passage de la Préface de Celse, & un autre passage remarquable de van Swaeten, tome II, pag. 99.

Une altération morbide très-profonde, ne tarde pas alors à s'établir. L'individu qui subit un pareil supplice, perd bientôt les forces, avec un sentiment d'angoisse souvent accompagné de vertiges; le sang paroît même diminuer de volume, suivant les observations de Haller, sur les grenouilles. Tous les autres fluides, toutes les autres humeurs s'altèrent; le foie, l'exhalation pulmonaire, devient bientôt stérile; le lait n'a plus la douceur ni les propriétés alimentaires; l'urine devient d'une acreté presque corrosive, comme l'éprouvèrent Bontekoe & son compagnon dans un naufrage, pendant le cours d'un voyage aux Terres australes (1). Pendant cette même abstinence, l'état des chairs est entièrement changé; la graisse se consume, toutes les excréments sont dénatürées ou affoiblies, & il est probable que dans une pareille situation, les serpents les plus dangereux ne pourroient faire que d'innocentes morsures (2). (Voyez Notation.)

Des effets qu'éprouvent & que font éprouver les aliments pendant la digestion.

Le premier effet que les aliments font éprouver pendant la digestion, dépend uniquement de leurs propriétés plus ou moins excitantes; il ne paroît point du moins se rapporter encore à la réparation des pertes qui ont été faites pendant la durée d'un jeûne plus ou moins long. Un état de foiblesse & de langueur, un sentiment inexprimable de souffrance vague & de malaise indéterminé, avoient annoncé le besoin de cet excitement; ils cessent aussitôt, & par la première impression de la nourriture sur les voies digestives. Le rétablissement des forces est l'effet immédiat & prompt de cette impression. L'ébranlement, le nouvel état qui a été imprimé à l'estomac, se communique au système général des entrailles, & est à dire, à tous les viscères de la poitrine & du bas-ventre, qui paroissent retrouver un point d'appui. Cette réaction s'étend bientôt, & presque simultanément, à tous les autres organes. Le centre épigastrique reprend toute sa force, tout son ascendant, toute son influence, sur les diverses fonctions, & jamais, dans aucune autre circonstance, les sympathies de l'estomac, ce que Borden appelle si judicieusement le *département, l'empire de cet organe*, ne se manifestent avec autant d'énergie & d'étendue. L'épigastre, dans ce premier phénomène, devient ordinairement le centre d'un mouvement splanchnique. Tous les organes qui fa réaction animés, réagissant à leur tour, paroissent contribuer à la digestion, & la

belle question, *an omnes partes digestioni opitulentur*, proposée par Borden, se trouve décidée pour l'affirmative, si l'on observe, comme il coïncide, ces importants phénomènes.

Le premier résultat de l'action des aliments, & les divers effets qui lui succèdent, sont évidemment fournis à l'action nerveuse. On s'y appose, du moins par la section ou par la ligature de la huitième paire sur les animaux, & ces effets sont troublés, affoiblis dans l'homme, par les narcotiques, par une affection morale trop vive, ou par toute autre cause de distraction ou de perturbation.

Plusieurs causes diverses modifient sensiblement les mêmes phénomènes, & présentent, relativement à l'hygiène, d'importantes considérations. Les qualités des nourritures, leur température, leur masse, leur poids, leur consistance, leur mélange avec des liquides fermentés ou avec des boissons stimulantes quelconques, apportent nécessairement de grandes variétés dans la première impression des aliments. Cette première impression sera nulle ou presque nulle sans doute, si se proposant seulement de nourrir, comme on l'a fait trop souvent, dans la guerre des soupes économiques, ou dans plusieurs calculs relatifs à l'alimentation des indigènes ou des prisonniers, on perd entièrement de vue tout ce qui concerne l'assaisonnement de la nourriture, la résistance mécanique, en un mot les propriétés stimulantes. On a même souvent remarqué, & surtout pendant les temps très-froids, que les hommes qui se livrent accidentellement à de violents exercices, ou qui sont employés à des travaux plus pénibles, avoient alors besoin d'un régime moins délicat, d'un pain plus grossier, de viandes plus consistantes & plus fortement assaisonnées: d'une autre part, les hommes qui sont peu d'exercice, qui vivent dans l'oisiveté, ou qui se consacrent à des professions sédentaires, doivent plutôt chercher à affoiblir qu'à augmenter la première impression des aliments sur les voies digestives, surtout dans un âge un peu avancé. Cette première impression est quelquefois pénible dans cette circonstance, surtout si elle se trouve sensiblement augmentée par une nourriture exclusivement animale, & par des boissons alcooliques. Elle occasionne alors de l'assoupissement, la céphalée, la chaleur du visage, une congestion sanguine évidente, vers les parties supérieures, la gêne de la respiration, l'accélération, la dureté du pouls. Dans quelques cas particuliers, les inconveniens de cette même impression sont annoncés par un défaut d'équilibre, par un affoiblissement ou par une augmentation d'énergie dans certains organes (le cerveau, les organes de la reproduction) (1).

(1) Ces introuvables navigateurs, pressés par la soif la plus impérieuse, buvoient leur urine pendant les deux premiers jours de leur abstinence; ce qui devenoit impossible un peu plus tard.

(2) Voyez Haller, *Op. cit.*

(1) Les organes urinaux offrent peut-être plus souvent qu'aucun autre, l'exemple de cette irritation partielle, de

Le célèbre ministre Targot offroit un exemple remarquable de ces anomalies. Suivant Cabanis, il n'avoit jamais plus de mouvement dans l'esprit, plus de disposition à l'étude & au travail littéraire, que pendant le premier période de la digestion, & sous l'influence que le centre épigastrique paroissoit exercer sur le cerveau. Un très-grand personnage politique du dernier siècle, dont j'ai souvent entendu citer l'exemple, se trouvoit encore bien plus directement placé sous cette même influence, qui lui étoit devenue indispensable, & à un tel point, qu'il avoit fini par ne travailler jamais qu'après son dîner, & dans un état de demi-ivresse, pendant lequel son entendement acquéroit un accroissement d'énergie.

La durée du travail de la digestion ne peut d'ailleurs être déterminée d'une manière exacte; cette opération, ordinairement annoncée par un sentiment de vigueur, par un accroissement d'énergie, devient quelquefois assez pénible & assez laborieuse. Elle est souvent accompagnée, chez les personnes nerveuses, d'un frisson assez incommode, & d'un mouvement fébrile. Elle exige, dans ce cas, beaucoup de calme & de repos. Le moindre fatigue, la plus légère émotion, le moindre effort de la pensée, pourroient aisément la troubler; dans une occurrence opposée, le mouvement, l'exercice, une distraction active, un grand emploi des muscles, sont nécessaires pour s'opposer à la concentration des forces, & entre ces deux extrêmes, l'observation fait continuellement découvrir une foule de nuances & de particularités que nous ne pouvons indiquer dans ces considérations générales.

Le sommeil présente une autre disposition qui paroît sensiblement modifier l'action digestive. On a dit, peut-être d'une manière trop générale, qu'il la favorisoit & la rendoit plus rapide & plus complète; cette assertion, comme mille autres, ne peut être aduise qu'avec de nombreuses exceptions: le sommeil paroit même suspendre entièrement la digestion pour quelques personnes, chez lesquelles cette opération, tout-à-fait arrêtée, ne reprend qu'au moment du réveil, & souvent après avoir occasionné des symptômes très-pénibles. Pendant la veille, & quel que soit d'ailleurs le bon état de l'organisation, le premier travail de la digestion ne pourroit être impuement troublé, au moins dans le plus grand nombre des cas. La saignée, un grand emploi de force, une commotion morale trop violente, seroient alors très-nuisibles, & le travail de la digestion auroit à son tour les inconvénients les plus graves, pendant

cette augmentation d'excitement produisant le travail de la digestion. Les personnes plus ou moins disposées à l'hypochondrie, usinent, comme on sait, plusieurs fois pendant ce premier travail, & comme si elles se trouvoient sous l'influence d'une affection spasmodique ou nerveuse.

le cours d'une maladie aiguë, surtout au moment des paroxysmes, on dans les circonstances d'une crise quelconque, à l'époque d'une éruption, par exemple, d'une sueur, d'une expectoration.

Quant aux changements que la nourriture elle-même, & les organes employés à la digestion éprouvent, ils commencent dans la bouche, par la mastication, par un mélange avec la salive, & continuent d'avoir lieu sur tous les points de la membrane muqueuse des voies digestives, jusqu'à la fin du canal intestinal. Les aliments, déjà modifiés par la mastication, arrivent par portions, par bouchées dans l'estomac, avec une certaine quantité d'air. Ce viscère change dès-lors de position; le pylore se ferme, & tout l'ensemble de l'organe se développe par une expansion active.

De nouvelles portions d'aliments & de nouvelles quantités d'air continuent d'arriver jusqu'à un degré convenable de répletion, annoncé par la satiété. L'estomac est alors entièrement développé, avec ses deux orifices fermés, & dans l'état que les physiologistes ont désigné sous le nom de *peristole*. A cette époque de la digestion, commence la chymification des aliments, qui n'est, ni une trituration, ni une dissolution, ni le produit d'une fermentation, ou d'une putréfaction, mais une opération *sui generis*, & véritablement spécifique.

La masse alimentaire ainsi travaillée, ne tarde pas à se convertir en une pâte chymeuse, & par les mouvements oscillatoires des fibres musculaires de l'estomac, & par son mélange avec les sucs perspiratoires & folliculaires de ce viscère, alors plus abondants, plus actifs & plus éminemment doués des qualités qui leur sont propres, ainsi qu'il arrive pour tous les fluides de l'économie animale, à l'époque où l'organe qui les fournit se trouve accidentellement ou régulièrement soumis à une cause puissante d'excitement & de stimulation.

La pâte chymeuse offre déjà, dans cet état, une conversion assez avancée de la masse alimentaire: c'est un mélange composé de cette masse atténuée, offrant une apparence d'homogénéité, avec des matériaux fournis par l'animal lui-même, qui, dans tous les périodes de la digestion & de la nutrition, n'opère jamais sans mêler la propre substance à des substances étrangères. Le chyme varie sans doute, suivant la nature des animaux. La circonstance d'une maladie très-grave (d'une ouverture fistuleuse de l'estomac), a fourni, à Paris, il y a plusieurs années, l'occasion d'avoir un petit nombre d'aperçus sur la composition du chyme dans l'homme.

La malheureuse femme chez laquelle on observoit cette ouverture fistuleuse, qui avoit progressivement augmenté, mangeoit beaucoup, mais rendoit, très-peu de temps après avoir mangé, une grande partie de la nourriture qu'elle

qu'elle avoit prise, sous la forme d'une pâte chymeuse & grâilée. Cette pâte ayant été analysée & comparée avec la nourriture de la malade, on vit que le premier travail de la digestion n'avoit développé aucun aïde, & que le principal changement se réduisoit à une augmentation de gélasse, à la formation d'une matière d'apparence fibrineuse, & à une plus forte proportion d'hydrochlorate de soude, de phosphate de soude, de phosphate de chaux.

Cette somme, qui venoit encore pendant quelque temps dans un parfait état, n'étoit véritablement nourrie que par une très-petite portion de la masse alimentaire, qui, échappée à l'ouverture fistuleuse, étoit poussée du côté du pylore, par des mouvements périllatiques de l'estomac (1).

Les expériences de M. Marcet sur le chyme produit par une nourriture végétale, ont appris qu'il ne présentait pas de gélatine, & qu'il contenait de l'albumine, quoiqu'elle dernière ne se trouvât point dans la masse alimentaire.

La chymification, dont la durée a été évaluée d'une manière fort approximative, à quatre ou cinq heures, est fort inégale pour les divers aliments, dont il est dit à ce sujet, qu'ils sont plus ou moins digestibles, & qu'ils ne passent pas dans le duodénum, suivant l'ordre de leur arrivée dans l'estomac. Les mouvements périllatiques, opérés par les fibres longitudinales de ce viscère, entraînent les portions qui sont dirigées du côté du pylore : anneau éminemment sensible & contractile, qui paroit ne s'ouvrir & ne se dilater d'abord, que pour les nourritures bien chymifiées, jusqu'à ce que, fatigué & comme épuisé par cette surveillance, il laisse ensuite passer les matières les plus réfractaires ou les moins avancées dans leur digestion.

La pâte chymeuse arrivée dans le duodénum, s'y mêle avec la bile & le suc pancréatique, dont les qualités très-variables, & subordonnées à l'état de l'organe qui les sécrète, apportent nécessairement de grandes différences dans le travail de la digestion. La partie la plus fluide, la plus assimilable de ce nouveau mélange, est absorbée sous le nom de *chyle*, par les vaisseaux lactés ou chylifères. D'autres parties, également absorbables, mais plus résistantes au travail de la nutrition & de l'assimilation, sont absorbées par les veines, & manifestent alors souvent leur présence & leur action par des phénomènes très-remarquables (2).

(1) Les résultats de cette observation sont d'accord avec les remarques de M. Lallemand, professeur de la Faculté de Montpellier, sur les *causæ originæ*. (Voyez la Dissertation. Thèse de Paris, in-4^e, année 1818.)

(2) L'odeur des urines après avoir mangé des asperges, ou des aliments qui contiennent des parties résineuses ou balsamiques; la coloration des os par la garance; l'odeur, la saveur, la couleur du lait, sont l'influence de certaines nourritures : enfin l'odeur de la perspiration pulmonaire sous la même influence, & surtout après avoir mangé des aliments imprégnés avec de l'ail.

La partie la plus grossière, la plus solide, passe dans le gros intestin, y séjourne plus ou moins long-temps, fournit même encore des matériaux à l'absorption qui la modifie, & se trouve expulsée sous la forme de déjections ou de matière fécale; matière qui n'est pas un simple déchet, un simple résidu de la masse alimentaire, mais un produit très-composé de la digestion, & par lequel l'animal fournit de nouveau sa propre substance d'une manière fixe, régulière, lorsque sa santé n'a éprouvé aucune altération.

La conversion de la substance alimentaire & les divers produits de la digestion, que nous venons d'indiquer d'une manière générale, ces produits, qui ne présentent leur degré de perfection que dans l'état de santé le plus parfait, doivent être regardés comme un ordre de phénomènes particuliers ou spécifiques. Nous les indiquerons sous le nom de *phénomènes zoologiques* ou *organiques*, pour les distinguer des phénomènes purement physiques ou chimiques, que la matière nutritive éprouveroit si elle étoit livrée à elle-même, ou modifiée par le travail d'une digestion incomplète & laborieuse.

Dans plusieurs circonstances d'indisposition ou de faiblesse relative, qui forment l'état le plus habituel d'un grand nombre de personnes, des digestions incomplètes & laborieuses ont souvent lieu; alors, plusieurs aliments ne peuvent être digérés ou ne se digèrent qu'avec une extrême difficulté, en occasionnant beaucoup de souffrance, & en laissant apparaitre souvent plusieurs effets d'un changement purement physique ou chimique dans la pâte alimentaire, auquel un meilleur état des organes se seroit opposé (l'acidité, la dissolution gazeuse, des rapports malsains).

Parmi les aliments dont la conversion organique ne peut s'opérer complètement dans l'état d'indisposition ou de faiblesse dont nous parlons, on doit placer les nourritures végétales en général & la chair des animaux trop jeunes, mais en particulier, les semences de plusieurs légumineuses, la pomme de terre, les farineux unis à du mucilage ou à des matières sucrées, le navet, les choux, plusieurs autres plantes de la famille des Crucifères, presque tous les fruits, &c. &c.

L'opinion commune, qui attribue à plusieurs de ces nourritures d'être venteuses, fermentescibles, acides; cette opinion, que quelques savans ont trop légèrement raogée parmi les erreurs populaires, est fondée jusqu'à un certain point, surtout si on veut la restreindre & ne l'appliquer qu'aux circonstances de faiblesse ou d'incapacité digestive, que nous venons d'indiquer. Du reste, cette faiblesse, cette incapacité, qui peut dépendre d'un grand nombre de causes très-différentes, présente une foule de

considérations, qui s'appliquent d'une manière directe à la partie pratique ou usuelle de l'hygiène.

Dans plusieurs circonstances, la débilité des organes de la digestion & la langueur des sécrétions, qui contribuent à l'élaboration de la masse alimentaire, sont évidentes, mais constitutionnelles & indépendantes, jusqu'à un certain point, d'un état morbide; alors, la digestion ne peut s'exercer que sur des aliments à la fois très-digéssibles & très-peu disposés à éprouver les changements chimiques. Les chairs visqueuses ou trop gélatineuses des jeunes animaux, les substances grasses, les matières trop consistantes, quelle que soit d'ailleurs leur composition, la plupart des fruits, les substances végétales en général, lorsqu'elles n'ont pas été modifiées par des préparations convenables, sont nuisibles dans tous les cas de cette débilité absolue, & ne peuvent manquer d'occasionner, si on en fait usage, une première ou une seconde digestion très-laborieuse, ou même une véritable indigestion.

Si la faiblesse, si l'inertie est partielle, si elle se rapporte plus particulièrement, soit à l'estomac lui-même, soit au foie, soit aux surfaces muqueuses des intestins, d'autres anomalies, d'autres symptômes d'indigestion se manifesteront pendant les concrétions variées des substances alimentaires; ainsi, par exemple, dans le cas où le foie n'aurait pas un degré suffisant de sensibilité, pour être excité comme il convient par tous les genres de nourriture, les corps sucrés, le lait sous toutes les formes, les corps gras, les matières gélatineuses & peu sapides, n'attaqueront pas comme il convient cette sensibilité peu développée du foie, & contribueront par cela même à rendre la première digestion assez difficile, & de telle sorte, que la formation & l'expulsion des matières fécales souffriront elles-mêmes de ce dérangement.

L'état d'indigestion, les sensations plus ou moins douloureuses, les divers symptômes de souffrance, qui accompagnent les digestions laborieuses ou incomplètes à leurs diverses époques, présentent, si on les considère dans leur ensemble, de nombreuses variétés. Eu les analysant comme il convient, c'est-à-dire, en portant dans cette recherche une observation attentive & toutes les données d'une saine physiologie, on reconnoîtra au moins, dans plusieurs cas, la véritable cause de ces anomalies, ainsi que les motifs des différents régimes que ces dispositions exigent, & que la plupart des médecins ne savent malheureusement ni apprécier ni prescrire.

Il existe en particulier quelques dispositions morbides des voies digestives, auxquelles il importe de donner la plus grande attention dans

l'hygiène pratique ou usuelle; telles sont les diversités que nous venons d'indiquer, relativement à la faiblesse radicale ou générale des organes de la digestion, à l'inertie, à l'altération dans la sécrétion de la bile ou dans les sécrétions folliculaires & perspiratoires. D'autres dispositions morbides, qui ne sont pas moins graves, occasionnent chez plusieurs personnes des irrégularités assez remarquables dans les digestions, & paroissent se rapporter, tantôt à un principe d'irritation névralgique, tantôt à un principe d'irritation goniteuse ou rhumatismale; dérangement dont la véritable nature s'est souvent bien reconnue que par les choses qui nuisent ou qui soulagent, *a laudentibus & utentibus, indicatio*. Dans le premier cas, le travail de la digestion est souvent accompagné, à des différentes époques, d'un spasme plus ou moins pénible, d'un sentiment de pesanteur ou de constriction, d'un resserrement convulsif, que la personne qui souffre compare à l'effet d'une griffe & de plusieurs phénomènes consécutifs ni sympathiques, quelques-uns très-extraordinaires.

L'oxyde blanc de bismuth, l'eau de chaux convenablement opiacée, l'extrait de jujube uni à l'extrait gommeux d'opium, le sirop d'éther, &c., sont les moyens à l'aide desquels on parvient le mieux à soulager ou à guérir, dans ces circonstances, surtout si on en favorise l'effet par un régime convenable, par la privation des stimulans alcooliques & des assaisonnemens, par l'usage exclusif ou presque exclusif des viandes blanches ou du lait, par l'emploi des végétaux non farineux, des poissons faatiles (les limandes, les merlans).

Dans d'autres occurrences, la plupart des symptômes que nous venons d'indiquer sont éprouvés; mais ils se manifestent chez des personnes qui ont eu quelques atteintes de goutte, ou dont les ascendans étoient sujets, soit à cette maladie, soit à des affections calculeuses. On observe en même temps, que ces mêmes symptômes sont le plus ordinairement excités par des aliments trop animalisés, par les vins acides, par le froid sec, le vent du nord, & qu'ils sont presque toujours accompagnés de renvois d'alimens, mais surtout de renvois de pain & de la plupart des alimens assés, nés ou aromatisés. On remarque aussi que l'éther & l'opium modifient très-peu ces symptômes, que l'on combat avec avantage par les demi-bains, les pétilures irritans, l'eau de chaux, la magnésie pure & donnée à dose purgative, par la privation presque absolue du pain, des substances animales, des vins les plus légèrement acides, des fruits acidulés.

Ce principe d'irritation rhumatismale, qui n'est pas un être de raison, comme beaucoup d'esprits forts en médecine paroissent le croire, se porte rarement sur les voies digestives, sans

avoir préalablement attaqué quelqu'autre partie de l'organisation. Ces atteintes sont rarement chroniques; elles s'arrêtent ou se manifestent tout-à-coup dans les temps humides, sous la forme d'une véritable fluxion, qui envahit l'estomac, & détermine une sensation de courbature ou des nausées qui augmentent pendant la digestion, qui deviennent alors quelquefois très-douloireuses, qui sont accompagnées de renvois d'aliments, d'angoisses, & parfois d'une augmentation dans la sécrétion perspiratoire, qui donne lieu à des vomissements de matières visqueuses ou à une diarrhée très-pénible, & qu'il faut s'empêcher d'arrêter par les opiacés donnés en lavemens. Il n'est pas rare de rencontrer des individus chez lesquels les souffrances que nous venons d'indiquer, en les attribuant à une affection rhumatismale de la tunique musculaire de l'estomac ou des intestins, alteraient avec un catarrhe des mêmes organes.

Dans tous les cas que nous venons d'indiquer, d'une manière trop rapide sans doute, la moindre réaction fébrile, la constipation opiniâtre, l'insomnie, une exacerbation sensible dans les souffrances, par les plus légers toniques, surtout par les acides ou par les alcooliques, doivent faire craindre une phlegmasie chronique, mais surtout une entérite, une gastrite ou une gastro-entérite; présomptions qui fournissent d'autres données pour le régime & pour le traitement. Ajoutons qu'il n'est pas sans exemple, que plusieurs digestions très-laborieuses, très-pénibles, soient des phénomènes purement sympathiques & consécutifs, dont la cause première doit être rapportée à une métrite latente, à un catarrhe utérin inflammatoire, ou même au travail trop difficile de la menstruation; circonstances dans lesquelles les indications vulgaires manquent rarement de se comprendre, & d'aggraver par leur méprise les maux qu'ils sont appelés à soulager.

D'après l'opinion des Anciens, qui d'âge en âge s'est transmise en grande partie par des traditions populaires, dont l'origine scientifique ne peut être méconnue, on a attribué aux aliments diverses qualités relatives aux effets qu'ils éprouvent dans les voies digestives. On a dit qu'ils étoient légers ou pesans, *leves* & *lours*; sèches ou forts, *seches* & *moites*; nourrissans ou peu nourrissans, *nutritifs* & *non nutritifs*; humides ou secs, *humides* & *secs*; laxatifs ou ressermans, *laxatifs* & *ressermans*; échauffans ou rafraîchissans, *chauds* & *froids*; flatueux & non flatueux, expansibles & peu expansibles, occasionnant ou diminuant l'embonpoint, &c. &c.

Ces différences dans les effets qu'éprouve la masse alimentaire, ou qui accompagnent sa conversion, n'existent pas sans doute ou n'existent que faiblement dans les conditions d'une santé parfaite, mais se laissent apercevoir parmi les nations civilisées, chez un grand nombre de

personnes, dont les facultés digestives, affaiblies ou dépravées, n'exécutent que d'une manière laborieuse, & par cela même très-insuffisante, le grand œuvre de la chymification. Quoi qu'il en soit, les aliments, lorsque leur première métamorphose est opérée d'une manière plus ou moins complète & plus ou moins difficile, produisent divers effets qui dépendent jusqu'à un certain point de la nature de ces mêmes aliments & de leur composition, à l'examen desquels le paragraphe suivant est consacré.

Choix, quantité des aliments, & principes généraux de diététique.

Le choix des nourritures, d'ailleurs si important, ne peut être indiqué *a priori*, c'est-à-dire, d'après des principes fixes de conduite. Il est nécessairement subordonné à l'âge, au tempérament, au genre de vie, mais surtout à ces particularités individuelles de complexion & que les médecins désignent sous la dénomination technique d'*idiosyncrasie*.

L'homme, considéré dans les différens climats, dans les différens siècles, & au milieu des conditions diverses d'existence qui dépendent de l'état de civilisation, présente à ce sujet des variétés infinies, depuis les peuplades sauvages qui peuvent se nourrir de chairs crues, & quelquefois en putréfaction, jusqu'à ces hommes soibles & délicats, qui, chez les nations policées, ne peuvent, à l'exemple de Santorius, digérer que la balance à la main, & en donnant aussi peu de résistance ou de travail qu'il est possible aux organes de la digestion.

Entre ces deux extrêmes, tout sembleroit devoir être indifférent, relativement à la qualité & au choix des nourritures. *Sania omnia fano*, dit le proverbe : toutefois cette règle, comme tous les axiomes & les assertions trop générales, ne peut être admise qu'avec de nombreuses exceptions. Les aliments les plus convenables en apparence se digèrent souvent assez mal par des personnes robustes. Dans d'autres circonstances, des aliments grossiers, & que l'hygiène paroîtroit devoir proscrire, sont plus promptement, plus facilement élaborés que certaines suaves en général très-digestibles. Les uns retrouvent leur santé pendant les rigueurs d'un carême, ainsi que Baglivi l'a souvent observé d'autres les perdent. Ceux-ci ne digèrent bien que les crues, & les autres très-fiches & très-noires; d'autres ne peuvent les supporter, & ne font bien nourris que des viandes blanches, du poisson ou des pulpes végétales. Le plus grand nombre n'est pas incommode par l'usage des fruits, lors même qu'il est obligé de s'abstenir d'un régime très-friqué pour le volume & la quantité des aliments. Ces mêmes fruits, en général, ou quelques espèces de fruits en particulier, tels que l'abricot, le raisin, les

fraîches, tous les fruits acides, &c., ne font jamais impunément partie d'un repas pour certaines personnes, qui sont d'ailleurs pourvues d'un appareil digestif assez fort pour consommer une quantité considérable d'alimens.

Le médecin Lorry, dont l'exemple a été souvent cité, manquoit rarement d'avoir une éruption lorsqu'il avoit mangé du riz : quelques personnes éprouvent bien plus sûrement & bien plus douloureusement le même symptôme, par l'effet du poisson, des écrevisses ou des moules.

L'expérience individuelle est le seul guide sans doute que l'on puisse prendre pour se diriger au milieu de ces variétés & de ces anomalies. En essayant de cette vérité avec la plupart des auteurs qui ont écrit sur la diététique, nous serons cependant la remarque, que l'on a peut-être trop exagéré les conséquences de ces spécialités relatives au régime, & pour donner plus de latitude au caprice & à la gourmandise. Les exceptions elles-mêmes confirment la règle, loin de lui porter atteinte, & nous ne dirons pas avec Boerhaave, *nullum alimentum, universalitudo, salubre dici potest, & qui rogat quodnam est salubre alimentum, idem facit, ac quaerere quifnum sit ventus secundus, non cognito itinere.*

Les variétés, les diversités dans les appétences & dans la faculté digestive, lorsqu'elles ne sont pas trop éloignées d'un certain état naturel ou normal, prouvent seulement la force de certaines habitudes ou l'effet d'un état irrégulier & morbide des organes de la digestion, qui n'est pas incompatible avec la santé, & dont les exemples ne sont jamais si frappans ou si remarquables que pendant certaines grossesses.

Dans le plus grand nombre des cas qui nous rapprochent pas de ces singularités, les connoissances positives, exposées dans différentes parties de cet article, trouveront journellement leur application à la diététique usuelle & aux détails de l'économie domestique : on doit avoir égard, dans ces applications, aux propriétés toniques ou débilitantes des alimens, à leur consistance, à leur nature, au degré de résistance qu'elles opposent, comparés aux divers degrés de force ou de faiblesse de cet appareil ; ce qui permettra alors de se former une opinion assez éclairée, & d'accord d'ailleurs avec l'expérience, sur le régime échauffant & rafraîchissant, la convenance & l'indication particulière des nourritures animales ou des nourritures végétales, des alimens fibro-gélatineux, albumineux, gras, farineux, gommeux ; des corps sucrés & des substances qui, comme les fruits, contiennent des acides tout formés, un mucilage plus ou moins visqueux ou plus ou moins parfumé ; un ferment, ou du moins une matière propre à fermenter par la plus légère addition d'oxygène. On devra également combiner les données scientifiques & les

résultats des expériences individuelles, en les rectifiant par un contrôle mutuel & réciproque pour tout ce qui concerne la quantité des nourritures que chaque individu doit utilement ou peut impunément consommer dans l'espace de vingt-quatre heures, lorsque la santé n'a éprouvé aucune altération.

Ce nouvel objet de la diététique paroît peut-être encore moins susceptible d'être limité ou déterminé que tout ce qui appartient au choix & à la qualité des alimens. La déperdition journalière des corps se présente à la vérité comme une donnée principale pour rattacher cette mesure des alimens à quelques points fixes ; mais cette donnée elle-même ne peut être obtenue que d'une manière approximative. Ainsi, d'après les ingénieuses expériences de Lavoisier & de M. Seguin, les pertes d'un individu qui ne se livre pas à des travaux de corps très-pénibles, varient depuis une livre onze onces & quatre gros jusqu'à cinq livres par la transpiration cutanée, la transpiration pulmonaire & la respiration.

En prenant à cet égard une moyenne, cette déperdition peut être évaluée à deux livres treize onces : toutefois, & toujours d'après Lavoisier, un individu quelconque, sans s'attacher à ne prendre chaque jour la même quantité de nourriture, sans s'astreindre à un genre de vie déterminé, & si les repas étant pris à des heures à peu près réglées, on évite les excès, cet individu, après avoir augmenté de poids de toute la nourriture qu'il a prise, revient tous les jours, après la révolution de vingt-quatre heures, au même poids qu'il avoit la veille. Si cet effet n'a pas lieu, l'animal est dans un état de souffrance ou de maladie. (*Académie des sciences, 1790.*)

La quantité & la mesure des alimens qui sont ordinairement employés chaque jour, paroissent assez d'accord avec ces évacuations ou ces pertes qui motivent si rigoureusement le besoin d'une alimentation journalière. L'habitude, l'influence du climat & une foule de causes générales ou particulières peuvent faire augmenter ou diminuer beaucoup cette même proportion, sans l'influence d'aucun état morbide.

La nature même des alimens exige souvent que leur quantité soit beaucoup plus considérable, comme le prouve la manière de se nourrir des animaux ruminans, qui consomment dans vingt-quatre heures une quantité de fourrage égale au huitième de leur poids total, tandis que cette même quantité d'alimens est à peine la quarantième partie du poids total de l'homme. Mais sans sortir de l'espèce humaine, pour les exemples de variétés dans la quantité des nourritures, quelles différences n'apercevons-nous pas dans ce rapport dans le régime particulier des individus & des nations ? Cornaro, si souvent cité lorsque l'on parle de diététique ou d'hygiène, ne con-

ferre la santé, pendant près d'un demi-siècle, qu'en ne consommant par jour que dix onces de nourritures solides.

Plusieurs solitaires de la Thébaïde, Paul l'Hermite, le vénéral Antoine Arfene, Epiphane, ont surpassé cette sobriété, dont une étonnante longévité a été la conséquence. Des nations entières, des peuplades de sauvages ou de nomades ne font pas beaucoup plus nourries au milieu d'une vie active, & on a cité souvent l'exemple des Américains, qui consommoient dans une semaine une dose de nourriture à peine suffisante pour la journée d'un Espagnol, renommé d'ailleurs pour sa tempérance. On connoît d'une autre part la sobriété éblouissante des montagnards d'Écosse, des Irlandais, des pères des Alpes & des Pyrénées, & du malheureux paysan d'Égypte dont parle Veluey, qui, après avoir fait croître le maïs ou le blé pour les oppresseurs, ne réserve pour lui qu'une mauvaise galette préparée avec le *durra*, qui fait, avec un peu d'eau & des oignons, la seule nourriture.

Des exemples appétés à ces preuves nombreuses de tempérance & de faible consommation, ne manquent sûrement pas ni chez les sauvages, ni chez les nations civilisées, & même en faisant abstraction des cas extraordinaires de voracité & de polyphagie, qui dépendent toujours de singularité dans l'organisation, & même d'un état morbide. (Voyez PELTAPROIE.)

En donnant à ces variétés dans le régime toute l'attention qu'elle mérite, on y voit au reste de nouvelles preuves de cette flexibilité & de cette force de l'organisation de l'homme, également capable de supporter l'abus & la privation, l'usage le plus immodéré & la sobriété la plus sévère, ou même les rigueurs du jeûne le plus long & de l'abstinence la plus pénible.

On ne peut se lasser d'admirer, dit à ce sujet un philosophe dont nous venons de rappeler les importantes expériences sur la transpiration, « on ne peut se lasser d'admirer le système de liberté générale que la nature semble avoir voulu établir dans tout ce qui a rapport aux êtres vivans. » En leur donnant la vie, le mouvement spontané, une force active, des besoins, des passions, elle ne leur a point interdit d'en faire usage. Elle a voulu qu'ils fussent libres même d'en abuser; mais, prudente & sage, elle a mis partout des régulateurs, elle a fait marcher la sagesse à la suite de la jouissance. L'animal, excité par la qualité ou par la variété des mets, a-t-il franchi la limite qui lui avoit été marquée, arrive l'indigestion, qui est à la fois le préservatif & le remède : la purgation qu'elle opère, le dégoût qui succède, rétablissent bientôt l'animal dans son état naturel. » (*Mémoires de l'Acad. des sc.*, pag. 611, année 1790.)

Toutefois cette faculté d'abuser ne pourroit

être mise souvent en jeu sans qu'il en résultât des inconvéniens plus ou moins graves, surtout dans un âge avancé & à cette époque de la vie où la nutrition ayant perdu toute son activité, ou demeurant même sans but, la digestion doit être par cela même resserrée de plus en plus dans de justes limites. La tempérance, la sobriété, conservent la santé & la font même retrouver aux vétéranaires, ainsi que le prouve la biographie d'un si grand nombre de personnalités plus ou moins célèbres, chez tous les peuples & dans tous les siècles.

Mais cette sobriété, cette tempérance, sont nécessairement relatives & ne peuvent être déterminées exactement pour personne d'après le poids ou la valeur des alimens liquides ou solides, tel individu étant beaucoup plus nourri en consommant trois à quatre livres de nourritures solides dans les vingt-quatre heures, que tel autre qui n'en consommeroit que douze à quinze onces pendant le même espace de temps. Quelques auteurs ont voulu cependant évaluer & fixer la quantité moyenne d'alimens qui pouvoient convenir au plus grand nombre : on a même été jusqu'à vouloir compter, avec bien plus d'exactitude que de philosophie, ce qu'un homme pouvoit coûter par jour dans certaines positions, & comment il pouvoit être alimenté, sans le faire mourir de faim à la vérité, mais sans avoir égard à la conservation de la santé & de ses forces. La diversité de toutes ces évaluations suffiroit seule pour prouver combien elles sont incertaines. Ainsi, d'après les expériences de Lavoisier, il sembleroit que l'on pourroit fixer la quantité moyenne de nourriture comme la quantité moyenne des pertes à deux livres treize onces en vingt-quatre heures, & cependant Santorini avoit porté beaucoup plus haut cette évaluation.

Georges Rye, qui fit sur lui-même, & comme Santorini, plusieurs recherches importantes, propose aussi une autre mesure. L'Anglois Home accorde quatre livres trois onces; ce qui, pour le dire en passant, étoit la mesure du dîner de Charles II, qui augmentoit de tout ce poids immédiatement après son repas. Cheyne admettoit aussi cette proportion de quatre livres. Le médecin Wood, dont nous avons cité l'exemple d'après Sainclair, se trouvoit très-bien nourri avec une quantité plus faible d'un aliment qui étoit toujours le même, & qui ne contenoit aucune substance animale.

On voit aisément que, dans une foule de cas, les exceptions seroient aussi nombreuses que l'application des principes que l'on voudroit établir d'après ces évaluations. En effet, la quantité des alimens doit varier d'abord suivant leur nature, & ensuite d'après le climat, la saison, les habitudes nationales, l'âge, le tempérament, la complexion, le genre de vie, & mille autres dispositions individuelles ou générales. Ces choses di-

verbes étant prises en considération, nous croyons pouvoir terminer cet article en recommandant, d'une manière générale, le régime le plus simple, l'uniformité constante pour les nourritures solides en liquides dans chaque repas, la conservation la plus attentive de la sensibilité gastrique & de l'appétence naturelle; l'abstinence dans tous les cas accidentels de plénitude ou de réplétion; enfin, une proportion dans la quantité des aliments assez variable, & pour laquelle on ne devra consulter chaque jour que le sentiment individuel de la satiété, aussi exact, plus exact peut-être que la balance de Sanctorius, lorsqu'un pareil sentiment n'a éprouvé aucune altération.

DEUXIÈME PARTIE.

Des différentes productions de la nature, qui sont employées pour composer des alimens et des boissons.

Tout ce qui a vécu, tout ce qui provient de la vie, peut seul fournir des matériaux alimentaires; & la terre, que quelques animaux, pressés par la faim, avalent dans les forêts, ou les boulettes de terre glaise dont les malheureux sauvages des bords de l'Orénoque font usage pendant leurs longues & douloureuses abstinences, ne peuvent pas être regardées comme une véritable nourriture, mais comme un moyen de tromper la faim, & du la rendre, pendant quelque temps, un peu moins insupportable.

Les différentes productions organiques ne sont pas, d'ailleurs, également alimentaires, du moins pour les animaux, dont les divers genres, que l'on a désignés sous les noms de *genres*, de *familles*, d'*ordres*, sont disposés & comme calculés par leur conformation particulière pour s'alimenter, les uns avec des tiges ou avec des feuilles, d'autres avec des fruits, d'autres avec des semences, & un très-grand nombre avec des substances animales.

Si l'on vouloit s'en rapporter à des traditions plus pétriques que philosophiques, la nature de l'homme lui auroit également alloué un fonds de subsistance bien déterminé (une alimentation végétale), dont il n'auroit été écarté avec le temps que par une succession d'événemens, de révolutions, qui l'auroit éloigné de la nature primitive. En effet, plusieurs peuples de l'intérieur du continent ont trouvé pendant plusieurs siècles leurs nourritures parmi les végétaux avant d'avoir recours aux substances animales; cet usage même se retrouve encore dans diverses contrées de l'Afrique, où plusieurs classes d'hommes se nourrissent exclusivement de fruits, beaucoup moins alimentaires que les figues & les dattes. On a vu conservé le souvenir d'un genre de vie semblable chez les premiers habitans de la Grèce, qui, suivant la tradition, n'auroient donné une certaine

étendue à leur fonds de subsistance qu'après s'être alimentés pendant long-temps avec le gland nourricier. Pourroit-on conclure avec Haller, & d'après ce petit nombre de faits, que dans son état primitif & naturel, le genre de vie a été pour l'homme un régime véritablement végétal, & que l'invention des arts, les progrès successifs de la civilisation n'ont amené qu'avec le temps, & par une révélation lente & difficile dans les mœurs & dans les usages, l'habitude de se nourrir de substances animales? L'expérience, les faits, sont évidemment contraires à cette conclusion.

Les hommes n'ont point ainsi passé par degrés, des fruits ou des racines alimentaires, aux nourritures animales; les localités seules ont déterminé ces différences. En effet, des peuples également sauvages sont indifféremment occupés de la pêche ou de la chasse, ou portées à se nourrir de coquillages, de fruits, de racines, suivant les lieux qu'elles habitent, suivant que le hasard les a placées près du rivage de la mer, sur le bord des fleuves ou des lacs, au milieu des forêts, &c. &c.

Par la conformation particulière de ses organes digestifs, l'homme se trouve merveilleusement propre à subir la nécessité ou la différence de ces divers régimes: il n'est exclusivement ni un violent carnassier, ni un paisible frugivore; ses dents canines, égales à ses incisives; la forme de ses molaires; la disposition de son canal intestinal, le placent en quelque sorte entre ces deux natures, & lui donnent le besoin, quoi qu'en puissent dire certains philosophes, d'une nourriture mixte ou végétalo-animale. D'autre part, la flexibilité, la force de sa complexion, lui laissent la faculté de donner au besoin la plus grande étendue, la plus grande variété à sa nourriture, soit pendant les famines chez les peuples civilisés, soit dans l'état habituel de malheur & de dénuement de la vie sauvage.

Tout ce qui peut renfermer la plus légère portion de matière nutritive est employé dans ces circonstances impérieuses & difficiles: les débris en partie putréfiés des grands animaux, leurs tégumens, leurs matières fécales, le poisson altéré & si souvent vénéneux dans les mers équatoriales, l'huile & la chair de la baleine, dont plusieurs peuplades hyperboriennes font leur délice; différents mollusques, plusieurs vers, plusieurs insectes, mais principalement les fourmis, les fourmis, ainsi que leurs larves & leurs excréments; les racines, les écorces des plantes les plus incultes; en un mot, toutes les productions organiques, soit végétales, soit animales, depuis le mucilage d'une simple mousse jusqu'au fruit de l'arbre à pain, depuis le ver du gommier nain, dont le nourrit le sauvage de la Nouvelle-Hollande, jusqu'aux grands quadrupèdes, que l'industrie agricole a multipliés pour améliorer & pour étendre le fonds de subsistance des nations civilisées.

Nous avons pour objet dans ce paragraphe d'in-

diquer rapidement ces productions variées que l'homme a fait servir à sa nourriture, suivant l'époque de la civilisation, les localités des territoires & la nécessité des circonstances. Afin de ne rien oublier dans une énumération qui contient des matières aussi diverses, nous passerons successivement en revue toutes les grandes divisions, toutes les familles du monde végétal ou animal ; nous bornant, d'ailleurs, à nommer d'une manière négative toutes les productions qui n'ont rien fourni jusqu'à ce jour, soit aux besoins, soit aux caprices de l'homme.

DES VÉGÉTAUX. Dans aucun lieu de la terre l'homme ne seroit nourri d'une manière convenable à sa nature, ainsi que nous venons d'en faire la remarque, s'il faisoit un usage exclusif de substances végétales : celles-ci ne sont pas, d'ailleurs, également nutritives dans les différentes espèces de plantes, ni même dans les diverses parties d'une même plante, ou dans la même partie, dans le même organe aux différentes époques de la végétation.

Toutes choses étant égales d'ailleurs, la propriété alimentaire des végétaux, suivant la remarque d'un savant moderne, est plus développée dans les temps où certaines parties d'une plante contiennent plus abondamment divers suc, divers principes, qui doivent servir à la nutrition générale de la plante, ou à l'accroissement de quelques-uns de ses organes. Ainsi, les racines de plusieurs Umbellifères, qui sont servies sur nos tables, ne deviennent très-alimentaires qu'au moment où leur tissu est rempli d'un suc destiné au développement de la tige : la tige elle-même ne partage ordinairement cette propriété nutritive que lorsqu'elle est herbacée & qu'elle forme ce que nous appelons les *bourgeons*, les *summités* du végétal, qui fournissent des légumes si agréables dans quelques familles de plantes.

Le réceptacle charnu de l'attachant cesse bientôt d'être comestible lorsque les fleurs qu'il est chargé de nourrir ont acquis tout leur développement ; enfin, les semences, les graines, ne doivent leurs propriétés d'être beaucoup plus nourrissantes que les autres parties du végétal, qu'à l'abondance des matériaux alimentaires qui sont contenus dans le péricarpe de quelques familles & dans les cotylédons du plus grand nombre, à l'époque où ces parties doivent servir au développement de la plume (1).

Tanter ces parties des plantes, qu'il nous importe d'ailleurs de comparer relativement à leurs propriétés alimentaires, plus ou moins développées, doivent être rapidement passées en revue dans l'ordre suivant :

1°. Les racines & les tubercules ;

(1) Voir M. J. B. Baubert, *Traité d'hygiène*, tome II, page 41.

- 2°. Les tiges & les bulbes ;
- 3°. Les fleurs ;
- 4°. Les fruits proprement dits ;
- 5°. Les graines & les semences.

DES RACINES. Les racines, qui ne doivent pas être confondues avec les tiges souterraines, ont pour caractère de descendre constamment & de ne jamais verdir, même lorsqu'elles sont exposées à la lumière : semblables aux tiges dans les monocotylédones, elles en diffèrent dans les Dicotylédones, où elles n'ont point de moelle centrale. Les racines les plus employées à des usages diététiques, sont tantôt bulbueuses, tantôt tubéreuses, tantôt filiformes.

Parmi ces racines, les unes servent comme aliments & contiennent une quantité plus considérable de fécula ; les autres fournissent des assaisonnemens, & sont pénétrées, ou d'un principe aromatique & huileux, comme dans le Gingembre, la Zedoaire, ou d'un principe stimulant, quelquefois purgatif, quelquefois diurétique, comme on le voit dans les Liliacées. Dans la classe des monocotylédones, un assez grand nombre de racines fournissent des assaisonnemens ou des aliments ; les racines charnues des Aroïdes, les racines tubéreuses des Orchidées, la racine d'Arrow-Root (*Maranta indica*).

Les racines les plus nutritives présentent ordinairement des tubercules, qui se sont développés sur leurs fibres, sans participer souvent aux propriétés générales de la plante ; telles sont les racines tubéreuses de plusieurs *Solanum*, du topinambour, de la patate, &c.

Dans plusieurs racines, la substance nutritive est combinée avec une matière âcre & vénéneuse ; dans les racines des aroïdes, que nous avons citées, dans celle du manioc (*Jatropha manihot*) ; d'autres racines contiennent une quantité assez considérable de sucre qui à la sécula on à du mucilage, les racines de Carottes, de Laitue, des Berries, dans les Umbellifères ; les racines de Salsifis, de Scorfonnière, dans les Composées ; les Betteraves, &c.

DES TIGES. Les Tiges, que l'on confond quelquefois avec les racines, en sont distinguées par leur tendance à se diriger verticalement, en s'élevant du collet de la racine. Dans quelques familles, dans les palmiers, par exemple, la tige, lorsqu'elle est âgée, contient une seule *donce* & nourrissante, que l'on connoît sous le nom de *sagou* ; mais en général, on ne doit regarder comme alimentaires, que les tiges herbacées, les jeunes pousses, les bourgeons. Les tiges de plusieurs Graminées, mais principalement de la Canne à sucre, du Maïs & du Sorgho, sont véritablement alimentaires ; la plupart des autres tiges, ainsi que les feuilles, ne servent point à une véritable alimentation, & ne sont employées que pour former ce que nous appelons *légumes* &

salades. Plusieurs s'écroissent dans leur écorce, des assaisonnemens très-recherchés; telles sont les tiges de l'écorce de la Cannelle blanche (*Cannella alba*), de plusieurs Myrtinées, &c.

FEUILLES. Les **FEUILLES** sont également mises à contribution pour fournir des condimens, ou pour contribuer à des bouillons aromatiques; les feuilles du Thé, de quelques Frangulacées, qui le remplacent dans plusieurs pays, du houblon, de presque toutes les Labiées.

Les tiges de plusieurs plantes contribuent en outre à la nourriture de l'homme, par la gomme qui transsude de leur écorce, comme nous le voyons dans plusieurs Légumineuses & dans l'espèce de liège qui donne la manne. Les bulbes, qui doivent être assimilés aux tiges, & qu'il faut distinguer avec soin des racines bulbeuses, contiennent une assez grande quantité de fécule, & pourroient devenir alimentaires dans quelques Liliacées; tandis que les racines bulbeuses du plus grand nombre de plantes de la même famille, sont irritantes & purgatives.

FLURS. Les **FLURS**, dans leur ensemble ou dans leurs différentes parties, ne jouissent pas de propriétés véritablement alimentaires; il faut cependant en excepter le réceptacle de l'artichaut & de plusieurs plantes de la famille des Cyranophales, qui forme la partie essentiellement nutritive de ces plantes.

Les corolles de quelques plantes de la même famille ont la propriété de cailler le lait, & remplacent la crème dans quelques provinces de la France. Les fleurs de plusieurs plantes pourroient servir & servent en effet comme assaisonnement; telles sont les fleurs d'Oranger desséchées & les boutons desséchés du Gérorliar, qui forment les clous de girofle.

FRUITS. Les **FRUITS** fournissent abondamment des bouillons, des assaisonnemens & des substances alimentaires. Dans l'idiome des Savans, ce mot s'emploie pour désigner un ovaire fécondé, qui porte des graines, & on reconnoît des fruits *simples*, fournis d'un seul ovaire; des fruits *multi-plex*, résultant de plusieurs ovaires (la framboise); enfin, des fruits *agregés* ou *composés*, formés par le rapprochement de plusieurs ovaires, qui proviennent originairement de fleurs différentes. Dans l'acception usuelle, on donne seulement le nom de fruit au péricarpe qui se trouve plus ou moins alimentaire, & qui doit protéger le germe jusqu'au moment de la dissémination. Le surnom de *semence* on de *graine* est réservé à la partie du fruit destinée pour la reproduction de la plante.

Les principales sortes de fruits, qui servent comme alimens, peuvent être rapportées à un petit nombre de titres; savoir: 1°. les fruits *composés*, tels que les fruits appelés *darions*, les grognes, & un grand nombre de fruits des deux

Jades, la mûre, le fruit de l'arbre à pain, la figue, la fraise, &c. &c.; 2°. les *baies*, celles du raisin, de la groseille & un grand nombre de baies exotiques, les baies de quelques Solanées, employées comme assaisonnemens, les tomates; 3°. les fruits *pommacés*; 4°. les *Hespe-rides* (l'orange, le citron); 5°. les *pépônides*, fruits particuliers aux courges (le melon, la citrouille); 6°. les *drupes* ou fruits à noyau; 7°. les *glands*.

Parmi les fruits composés, les plus alimentaires, du même les fruits qui méritent seuls ce nom, sont les figues & les fruits de l'arbre à pain; les autres fruits composés, que quelques botanistes appellent aussi des *clairsans*, sont en général moins propres à nourrir qu'à rafraîchir, & à préparer différentes espèces de bouillons; presque toutes les baies sont dans le même cas; la gelée contenue dans quelques-unes ne fait pas même exception. Le sucre qui présente abondamment une de ces baies, celle de la vigne cultivée, explique comment le raisin se trouve employé à former, par la fermentation spiritueuse, les bouillons alcooliques les plus répandus & les plus générales. Parmi les autres fruits, quelques drupes & les glands sont les seuls que l'on puisse regarder comme véritablement alimentaires, aussi que nous le verrons bientôt en parlant des ressources nutritives que la famille des Amentacées fournit à l'homme & aux animaux. Un petit nombre de fruits, quel que soit la tige auquel ils appartiennent, mériteroient peut-être de nous attirer par des dispositions particulières: tel est, par exemple, le fruit de l'Olivier, dont le péricarpe, par une exception fort remarquable, contient de l'huile, que l'on en retire par la pression; tels sont encore les fruits de plusieurs Rosacées, dont les noyaux contiennent de l'acide hydrocyanique, & quelques autres fruits, qui contiennent une huile concrète & butyrique.

Les fruits succulents & pulpeux ont cela de remarquable, qu'ils ne deviennent mucilagineux, sucrés & comestibles, qu'à l'époque de leur maturité, & qu'avant cette époque ils sont astringens & astringens: disposons qui se conserve au reste dans tous les fruits dont l'ovaire adhère au calice, comme on le voit pour plusieurs plantes de la famille des Rosacées, & pour le plus grand nombre de plantes d'une autre famille, celle des Eléacées, si remarquables d'ailleurs par la couleur noire foncée & la dureté de leur bois.

La plupart des fruits succulents contiennent du sucre, du mucilage, un ou deux acides, un ferment ou une matière propre à fermenter; une certaine quantité de gélée, dans quelques espèces, & une substance végétale-diversifiée.

Les fruits présentent une si grande diversité dans leur saveur, leur consistance, leur composition chimique, les principes aromatiques & stimulans

Simulans qui contribuent plus ou moins à les rendre digestifs, qu'il seroit difficile d'établir aucune règle générale sur leur usage.

Certaines baies (1), & d'autres fruits, les Cerises, par exemple, la Fraise, les Pêches, &c., sont la base d'un régime rafraîchissant; ils conviennent aux personnes qui, pourvues d'un appareil digestif assez fort & non modifié par une disposition goutteuse ou rhumatismale, éprouvent habituellement des symptômes de souffrance & d'indisposition, que l'on peut attribuer à une irritation prolongée des voies biliaires, à un excès de nutrition, ou à une augmentation sensible dans l'activité des stimulans internes, qui, dans plusieurs cas, est la seule & unique cause de différentes affections chroniques, que l'on a vues quelquefois disparaître sous l'influence d'un semblable régime, tandis qu'elles avoient résisté aux moyens les plus puissans de la thérapeutique; singularité dont les annales de la médecine fournissent un grand nombre d'exemples, relativement à l'hypochondrie & à la mélancolie (2).

On ne doit pas oublier, d'une autre part, l'effet dangereux de ces mêmes fruits, dans le diabète sacré, qu'ils entretiennent de la manière la plus fâcheuse & qu'ils rappellent si rapidement, lorsque cette maladie avoit cédé à un traitement convenable. De reste, certaines personnes ne digèrent point les fruits en général, & digèrent très-bien quelques fruits; d'autres sont gravement incommodées & même empoisonnées par un petit nombre de fruits, & sont impunément usagés de tous les autres.

Les fruits qui ont un arôme pénétrant & doux, comme on le voit dans l'abricot, la Pêche, paroissent du moins, suivant quelques praticiens, agir d'une manière spéciale sur les voies génitales; ce qui doit les faire prescrire dans tous les cas où les pollutions nocturnes font à craindre. Au milieu de toutes ces variétés & de toutes ces anomalies, chacun doit trouver, dans son expérience particulière, les notions pratiques propres à le diriger & les principes de la diététique spéciale. Il n'existe peut-être de reste, qu'une seule règle générale relativement à l'usage des fruits, & cette règle générale, que nous avons déjà énoncée, & que nous aurons souvent occasion de rappeler, aura pour objet de les prescrire dans tous les cas où les organes de la digestion, affaiblis ou sensiblement modifiés par une disposition rhumatif-

male, ne peuvent maîtriser que d'une manière insuffisante ou incomplète, la disposition à fermenter du plus grand nombre des fruits qui sont employés comme alimens.

Quelques fruits secs, ou certaines portions de ces fruits, forment plusieurs assainissemens très-efficaces; tels sont le Girofle, que nous avons déjà cité, la muscade & son macis, la Badiane ou Anis étoilé (dans la famille des *MAGNOLIACÉES*), le Cananga (dans la famille des *ANNOUACÉES*), le Piment toute-épice (*Myrtus pimenta*), dans les *MYRTINÉES*, &c. &c., substances que l'on désigne en général sous le nom d'épices, & dont les productions & l'usage semblent propres aux régions équatoriales.

DES GRAINES. Les botanistes donnent le nom de graine au germe fécondé, qu'ils regardent comme l'œuf du végétal; ils distinguent plusieurs parties dans une graine; savoir: 1°. les tunique extérieures ou accubatoires; 2°. les tuniques propres; 3°. le noyau ou la substance de la graine. Le noyau d'une graine mûre présente à l'analyse du botaniste, 1°. l'embryon & les annexes; 2°. les cotylédons; 3°. le péricarpe, dans quelques familles. Ce dernier, très-important sous le rapport de l'hygiène, paroît d'autant plus développé que les cotylédons le sont moins. Il est farineux dans les *GRAMINÉES*, & forme la partie essentiellement alimentaire de leurs graines. C'est ce même péricarpe qui est employé dans le café & qui acquiert, dans cette espèce de fève, une saveur & un parfum agréables, par une légère torréfaction. Les cotylédons servent à la nourriture de l'embryon; dans plusieurs plantes, ils sont épais & charnus au moment de la germination; ils en forment la partie alimentaire dans un grand nombre de graines, mais principalement dans les *LÉGUMINEUSES*.

L'embryon, la partie essentielle de la graine, possède quelquefois des propriétés stimulantes ou même vénéneuses, que l'on ne retrouve pas dans les autres parties de la graine: disposition qui paroît fort remarquable dans les *EUPHORBES*.

Les semences les plus riches en matières nutritives sont celles des *GRAMINÉES*, & principalement des *CÉRÉALES*, auxquelles on donne le nom de grains (1), & dont quelques-unes contiennent la fécule, tantôt presque pure (2), tantôt combinée avec une substance qui ajoute encore à la propriété nutritive (3).

On peut également rapporter aux grains les semences de blé farrales (*polygonum sagopyrum*), & de quelques autres *POLYGOUES*, qui sont farineuses. Une autre classe de graines, dont quel-

(1) Celles du Groëffier, de la Vigne cultivée, &c.

(2) On peut lire à ce sujet, parmi les Anciens, le livre XII, chapitre V, de *Fructibus pomaceis*, dans *ALEXANDRE DE TRALLÈSE*, & parmi les Modernes, VAN SWIETER, *Comment. in Aph. Boerhaave*, tome III, pag. 480. *HORWART, Medic. tatarici systema*, tome III, page 394.

MÉDECINE. Tome X.

(1) Les *Caryopées* de Richard, & le *Cerion* de Mirbel.

(2) Le Riz, l'Orge.

(3) Le Blé, l'Épeautre des Anciens (*Triticum spelta*).

ques-nous sont très-nutritives, nous est offerte dans les semences des Légumineuses ou des semences à gouffres, dont les cotylédons très-développés contiennent une certaine quantité de féculé, combinée avec des matières sucrées, de la matière propre à fermenter, des substances extractives, des principes amers, des matières colorantes, aromatiques, stimulantes, &c. La gouffe qui renferme les semences, dans plusieurs espèces de légumineuses, est employée elle-même comme aliment ou comme assaisonnement : les gouffes vertes des Haricots, les gouffes de la Vanille.

Les graines à capsules ne fournissent à l'hygiène que les graines de Sésame & celles de Pavot, qui donnent une huile que l'on peut employer dans les préparations alimentaires.

Les graines à siliques ne sont employées que comme assaisonnement, & parmi ces graines, on place au premier rang les semences de Moutarde. Les semences des Umbellifères, auxquelles les botanistes ont donné un nom particulier (1), ne fournissent que des condiments, quoiqu'elles contiennent une assez grande quantité de féculé. Les plus employées sont les semences d'Aïis, de Fenouil, de Coriandre, de Cumin; enfin, une classe de graines, qui présente le plus grand intérêt sous le rapport de l'hygiène, comprend les féucueuses émulsives, qui sont renfermées dans un noyau ou dans une amande. Les plus employées sont celles du Carao (*Theobroma cacao*), qui donne une huile couverte si agréable; le Coco, éminemment alimentaire; les Amandes douces & amères, la Pistache, la semence de l'arbre de beurre, celle des Bananiers & d'un grand nombre de plantes exotiques. Toutes ces graines étant abondamment pénétrées d'huile dans toutes leurs parties, on parvient difficilement à les dissoudre, même dans l'eau bouillante, lorsqu'elles n'ont pas été préalablement concassées. On se borne ordinairement à en former des émulsions, mais on en retire abondamment, par la pression, une huile convenable pour tous les usages domestiques, & qui même quelquefois est assez solide & assez pure pour être employée comme aliment, ainsi que nous le voyons dans le Cacao & dans les semences de l'arbre de beurre (*Jussia butyracea*).

Telles sont les notions que l'on peut recueillir dans un premier aperçu sur les propriétés alimentaires des plantes, considérées dans chaque organe du végétal, sans avoir égard aux rapports de ces propriétés avec les caractères botaniques, qui ont servi dans ces derniers temps pour établir les familles naturelles. Entrons maintenant dans le détail de cette exposition, où

(1) Les Crémocarpes de Michx.

nous ferons constamment soutenus & dirigés par l'excellent ouvrage dans lequel M. de Candolle s'est occupé de la manière la plus philosophique & la plus générale, de l'heureux accord qui existe entre tous les genres de propriétés des plantes, & les caractères botaniques de ces familles naturelles.

Dans l'état présent des connoissances, toutes les plantes, dont l'anatomie n'est guère moins avancée que celle des animaux, sont divisées en trois grandes classes; savoir : 1°. les plantes acotylédones; 2°. les plantes monocotylédones; 3°. les plantes dicotylédones (1).

Ces trois grandes classes fournissent toutes ou presque toutes, quoique d'une manière très-inegale, des nourritures à l'homme, ainsi qu'il nous sera facile de le voir, dans un rapide coup d'œil sur les différentes familles qui appartiennent à chacune de ces classes.

DES ACOTYLÉDONES. Les deux premières familles de cette classe, les Mousses & les Hépatiques, n'ont pas été ou n'ont été employées que très-accidentellement pour servir de nourriture; la famille suivante, celle des Lichens, fournit au contraire plusieurs plantes nutritives : la *Cladonia Rangiferina*, & plusieurs autres Symplophores; la *Physcia islandica* (Lichen d'Islande); la *Lobaria pulmonaria*, la *Roccella tinctoria*.

Ces plantes, & toutes celles qui appartiennent à la sous-division des lichens, remarquables par des propriétés médicales, ont un pécotisme d'une consistance assez molle, qui donne, à l'analyse du mucilage, une petite quantité de gélule & une substance coagulable, analogue à de la gélatine. Pour rendre ces plantes comestibles, on se borne à les dépouiller de leur amertume, par la cuisson & par le lavage.

CHAMPIGNONS. Les champignons dont les botanistes se sont beaucoup occupés dans ces derniers temps, renferment sixante genres. La composition chimique de toutes les plantes de cette famille est remarquable, & paraît sensiblement se rapprocher des substances animales. Les chimistes qui s'en sont occupés récemment, ont trouvé dans

(1) Si la nature de notre sujet nous permettoit de faire quelques remarques sur cette classification, il seroit facile de prouver qu'elle gagneroit beaucoup à se retrouver ramifiée, comme celle des animaux, & d'après la méthode dichotomique, à deux titres principaux; savoir : 1°. les plantes sans cotylédons, non moins différentes de la plupart des autres végétaux que les animaux invertébrés le sont des animaux, qui ont un squelette & des vertèbres; se rapprochant même peut-être plus des derniers rangs de ces animaux (les zoophytes) que les plantes; 2°. les plantes munies de cotylédons, qui seroient ensuite partagées en deux sous-classes; savoir, les plantes monocotylédones & les plantes dicotylédones.

les espèces qu'ils ont examinées, une substance particulière qui parait faire la base du parenchyme de la plante, & qu'ils ont désigné sous le nom de *fungine* : substance qui parait avoir beaucoup d'analogie avec le gluten ou la fibrine, & qui peut servir d'aliment lorsqu'elle est pure, quelle que soit d'ailleurs l'espèce qui la fournit. On est parvenu aussi à obtenir, par l'analyse du champignon, de l'albumine, de l'osmazome, une matière animale insoluble dans l'alcool, mais surtout une substance grasse, molle, d'une couleur jaune & d'une saveur acre, qui parait contribuer plus particulièrement, suivant M. Vauquelin, aux propriétés délicieuses des champignons dans les espèces les plus vénéneuses.

On est porté à croire qu'il ne seroit pas impossible, par diverses préparations, de faire servir indistinctement toutes les espèces du champignons à la nourriture de l'homme. En attendant une découverte aussi importante, il convient de donner le plus grand soin à l'étude des champignons, qui a pour objet de faire distinguer les espèces vénéneuses des espèces comestibles, & de porter dans cette partie de l'hygiène publique, les documents que peuvent offrir les sciences naturelles ; il importe, relativement à ce dernier objet, d'offrir des vues particulières & des considérations générales.

Dans genres entiers, que l'on rapporte aux Champignons, les Morilles & les Truffes, ne présentent aucune espèce vénéneuse ; les genres Helvelle, Hydne, Mécule, Clavaire, qui ne contiennent qu'un très-petit nombre d'espèces comestibles, ne renferment d'ailleurs aucune espèce nuisible. Les distinctions difficiles à établir existent principalement pour les nombreuses espèces des genres *Agaric* & *Bolet*, dont les unes sont violemment vénéneuses, tandis que les autres sont agréables & comestibles. Toutes choses égales d'ailleurs, les champignons de couche, quo l'on appelle souvent *champignons* par excellence, ou *potirons*, ne sont jamais nuisibles. Les espèces parasites sont au contraire presque toujours vénéneuses, surtout lorsqu'elles ont été anciennement cueillies. On ne sauroit recommander avec trop de soin, dans l'hygiène usuelle & dans les instructions destinées pour le peuple, de regarder comme suspects les champignons qui croissent dans l'ombre & à l'humidité, dont l'aspect a quelque chose de repoussant, tous ceux dont la surface est mouillée ou dont l'odeur est nauséabonde, tous ceux dont la couleur devient bleue ou verte lorsqu'on les coupe.

On ne proscrira pas avec moins de soin tous les champignons que les insectes paraissent avoir abandonnés après les avoir attaqués, tous ceux dont la végétation est rapide & qui pourrissent avec une grande facilité.

Les champignons auxquels ces vues générales

s'appliquent d'une manière toute particulière, & que Bulliard s'est attaché à signaler dans son excellent *Manuel sur les plantes vénéneuses de la France*, sont les différentes espèces d'*Agarics*, la fausse Oronge (*Agaricus muscarius*), l'*Agaric bulbeux* (*Agaricus bulbosus*), qui a si souvent & si malheureusement été confondu avec les champignons de couche ou avec l'*Agaric comestible*, l'*Agaric bulbeux printanier* (*Agaricus bulbosus vernus*), enfin l'*Agaric meurtrier*.

Tous ces champignons appartiennent à la section des Amaoites, dans le genre *Agaric*. Ils ont une volva incomplète & un pédicule muni d'un collier.

Les empoisonnements par les champignons ont presque toujours lieu à la suite des méprises, relativement à ces différentes espèces, que l'on a confondues avec des espèces comestibles : ce qui arrive surtout pour l'*Agaricus muscarius*, qui a tant de ressemblance avec l'Oronge. Les symptômes les plus graves dans cet empoisonnement ne se manifestent ordinairement que six heures, douze & même vingt-quatre heures après l'ingestion de cet aliment. Ce sont des nausées accompagnées du frisson & d'abattement, des vomissements, des évacuations alvines, avec tranchées, chaleur d'entrailles presque continues, mouvements convulsifs sympathiques. Dans cette cruelle situation, il y a beaucoup de soif, le pouls est petit, fréquent, abdominal. Il survient un état soporeux, quelquefois une forte d'irritation de délire, mais toujours, & vers la fin, un redoublement de douleurs & de convulsions accompagnées de sueurs, de sueurs froides & de défaillances qui se terminent par la mort.

Plusieurs boissons que l'on a souvent employées dans l'empoisonnement par les champignons, ajoutent beaucoup à sa gravité, & l'opinion d'après laquelle on les conseille ne peut être rangée avec trop de soin parmi les erreurs populaires les plus dangereuses. Ces boissons, telles que l'eau salée, l'eau éthérée, dissolvent la partie active du poison, & deviennent alors elles-mêmes vénéneuses.

La première indication à remplir est celle du vomissement : on la remplit en effet en faisant prendre deux ou même trois grains d'émétique dans un verre d'eau, deux ou trois fois, de quart d'heure en quart d'heure. On cherche ensuite à exciter les défécations alvines. Si on ne peut y parvenir, si les vomissements avoient échoué, il faudroit cependant à tous prix expulser l'aliment vénéneux, & qui n'a été digéré qu'en partie. Dans ces cas extrêmes, la décoction du tabac a été donnée en lavement, & le vomissement qui n'avoit pas été provoqué par six & même huit grains d'émétique, a été seulement l'effet de cette médication. Les potions éméteriques & légèrement toniques conviennent à la suite de ce traitement, & lorsque la nouvelle indication qui se présente à uniquement pour objet

de faire cesser l'irritation spasmodique qui continue d'avoir lieu après l'expulsion de la matière vénéneuse. On porte la dose de l'éther dans ce cas, où il agit d'une manière en quelque sorte antidiarrhéique, comme dans l'empoisonnement par les monies, jusqu'à deux gros pour quatre onces ou six onces de potion.

Lorsque les secours sont administrés au point, il n'est pas sans exemple qu'une phlegmie devienne l'effet de l'empoisonnement par les champignons. Le traitement doit alors être subordonné aux symptômes qui résultent d'une complication aussi grave, & consiste dans l'emploi des émollients & des évacuations sanguines.

Les champignons sur lesquels nous avons dû présenter d'abord ces vues générales, en les considérant sous le point de vue de leurs propriétés vénéneuses, présentent plusieurs plantes alimentaires dans divers genres, que nous devons indiquer avec quelques détails. Ces genres sont au nombre de huit; savoir : 1°. les *Morilles*, 2°. les *Truffes*, 3°. les *Helvelles*, 4°. les *Clavaires*, 5°. les *Hydnes*, 6°. les *Mérules*, 7°. les *Bolets*, 8°. les *Agarics*.

Les *MORILLES* (*Morchella*), qu'il ne faut pas confondre avec les *Phallus*, champignons vénéneux & stériles, n'offrent que des espèces agréables, & qui sont employées ou comme un assaisonnement, ou comme un aliment : la morille commune (*Morchella esculenta*), la morille géante de Florence.

Les *TRUFFES*, que l'on a mal-à-propos confondues avec les Lycoperdons, comprennent un assez grand nombre d'espèces, toutes très-comestibles. Parmi les espèces si recherchées par les Modernes, plusieurs étoient pas moins estimées chez les Anciens, qui les employoient comme assaisonnement & comme aliment, surtout la Truffe de Lybie. L'espèce la plus employée aujourd'hui est la Truffe noire, assez commune dans le midi de la France. On fait aussi usage du *Tuber moschatum*, du *Tuber album*, des environs d'Agen, des Truffes du Piémont, mais surtout de la Truffe grise (*Tuber griseum*), qui est remarquable par son odeur alliée toute particulière. Cette truffe convient pour l'assaisonnement des substances végétales, mais on préfère la Truffe noire pour l'assaisonnement des substances animales.

Les *HELVELLES* ne renferment aucune espèce vénéneuse, mais un grand nombre d'espèces coriaces & grâtieuses non comestibles. Les espèces les plus estimées sont l'Helvelle comestible (*Helvella esculenta*), que l'on mange en Allemagne, & l'Helvelle nitrée (*Helvella nitra*), en usage dans le Piémont. M. de Candeille dit avoir vu employer dans les environs d'Aigues-Mortes une espèce d'Helvelle très-analogue à l'Helvelle nitrée.

Les *CLAVAIRES* qui, comme les Helvelles, ne présentent aucune espèce vénéneuse, ne fournissent

seulement cependant que quelques espèces comestibles; savoir : la Clavaire coralloïde (*barbe de bouc*, *piéd de coq*, *patte d'Aléor* de plusieurs provinces), & la Clavaire grise ou cédrée (*Clavaria cinerea*).

Les *HYDNES* comprennent dans une section particulière la section des Hérissons (*Hercynia*), plusieurs espèces comestibles, l'*Hydnum erinaceum*, qui sert d'aliment dans les environs des Volges, l'*Hydnum coralloïdes* & l'*Hydnum caput Medusæ*, que l'on emploie en Italie, l'*Eurchon* (*Hydnum repandum*), les Brouquichons (*Hydnum auriculatum*), sont aussi assez recherchés dans certaines provinces.

Les *MÉRULES* ne nous présentent qu'une espèce comestible, la Chanterelle (*Merulius cantharellus*) : les autres espèces, quoique non vénéneuses, ne sont pas employées, leur parenchyme étant trop coriace & trop membraneux.

Les *BOLETS* exigent bien plus d'attention, relativement à l'hygiène, que les groupes que nous venons d'indiquer. On désigne sous ce nom les champignons dont le chapeau présente à la partie inférieure des pores ou des tubes : plusieurs espèces vénéneuses se trouvent dans ce groupe, & sont remarquables par leur chair coriace, leur pédicule muet de coller, & leur couleur bleue lorsqu'on les coupe.

Les *Bolets* comestibles, dont les propriétés se trouvent d'accord avec les caractères botaniques, forment les trois groupes qu'on a désignés sous les noms de *Polypores*, de *Suillus* & de *Fistulines*.

Les *POLYPORES* ont des tubes adhérents entr'eux & avec le chapeau. Leurs espèces comestibles ont un pédicule central : ce sont les *Boletus tartenierii* & plusieurs bolets de Toscane. (Voyez *POLYPORES*.)

Les *SEILLES* ont des tubes séparables de chapeau, mais adhérents entr'eux. Les espèces comestibles sont ordinairement désignées sous le nom de *Ceps*, *Giradels*. Bulliard en reconnoît cinq espèces, parmi lesquelles on doit distinguer le *Boletus edulis* (cepe franc, tête rousse), le *Boletus aureus* (tête noire), plus rare. Les *suillus* parasites, à pédicule grêle, à chapeau mince, doivent être regardés comme suspects.

Les *FISTULINES* se font distinguer par des tubes libres & non adhérents entr'eux. Une seule espèce est comestible, c'est le *boletus hepaticus* (langue de bouc, hypodris des anciennes matières médicales).

Les *AGARICS* sont des champignons feuilletés en dessous, dont les propriétés vénéneuses ou comestibles s'accordent, à une grande exception près, avec la structure de la plante. Les *Pléiophores*, groupe principal de cette division, ne contiennent que des espèces vénéneuses, ainsi que les *Rotules*, les *Lactaires*, qui ont un suc propre lacteux. Les

Copains, dont les feuillets se transforment en pulpe noireâtre; les Micéens à pédicule ceux à chapeau sans chair, enfin les Cortinaires, dont le coller est filamenteux & mince comme une torie d'araignée.

Un de ces groupes, les Lactaires, renferme quelques espèces comestibles, qu'il est difficile de distinguer, & plus prudent d'abandonner. Une de ces espèces est remarquable par la couleur rouge de son fuc préposé. C'est l'*Agaricus deliciosus*, qu'on a souvent confondu avec l'*Agaricus nectator*, dont le fuc est plus jaune & chargé de éduleux dont qu'il est exposé à l'air. Une autre espèce de lactaire (*Agaricus piperatus*) est mangée en Alsace, & l'on assure qu'elle perd toute propriété vénéneuse par la cuisson. L'*Agaricus violaceo-cinereus*, l'*A. Cortinellus*, sont les seules espèces dans le groupe des Cortinaires qui ne paroissent pas vénéneuses.

Un petit nombre de champignons, de la section des Pécaropes, sont recherchés dans les environs de Montpellier & en Italie, quoiqu'ils soient très-suspects & très-peu comestibles.

Dans la même famille des Amanites, trois autres sections, celles des Pratelles, des Gymnopes & des Lépiotes, ne renferment aucune espèce qui ne soit comestible. Les Pratelles, qui ont un chapeau charnu, varient relativement à leur grandeur & à leur couleur; on les appelle souvent *champignons* par excellence, *champignons*, *potirons*, & dans tous les pays les espèces de ce groupe sont utiles.

Les Gymnopes ou espèces à pédicule & à chapeau charnu, ainsi qu'à feuillets qui ne noircissent pas, renferment environ deux cents espèces, dont aucune ne sont vénéneuses. Les plus employés sont le *Moufferon*, *Moufferon blanc* ou *Champignon muscat* (*Agaricus albicollis*), le *Mugnaio* des Italiens (*Agaricus eburneus*), le *Jozzolu* (*Agaricus ericetorum*), la petite Oreillette (*Agaricus virgineus*), enfin le *Ringoule* ou *Gingoule* (*Agaricus eringi*), qui croît sur les racines du Panicut, le *Fungo marzuolo* des Italiens, l'*Agaricus nivalis*, la *Fringoule* ou *Pivanelle* d'Eoule, l'*Agaricus* de Montpellier (*Agaricus socialis*), le faux *Moufferon* (*Agaricus tortilis*), le *Palmet* du Béarn (*Agaricus palmet*), le *Ferdone* de Toscane (*Agaricus virens*), & plusieurs autres espèces de la même contrée, qui sont employées par le peuple, & sur lesquelles les botanistes se sont assez peu éclairés.

Toutes ces espèces, & plusieurs autres qu'il seroit trop long de comprendre dans cette nomenclature, sont comestibles en tout pays, & leur chair exhale une odeur de farine fraîchement moulue qui est très-remarquable.

Les Lactaires renferment des espèces à coller mobile & des espèces à coller fixe, qui ne sont vénéneuses ni les uns ni les autres. L'*Agaricus*

procus, qui sert d'aliment dans presque toute la France & l'Italie, appartient à cette section des Lépiotes. Il est à coller libre. Plus de quarante espèces de champignons comestibles de Toscane se rapportent à la section des Lépiotes, ainsi que l'*Agaricus cylindricus* & l'*Agaricus attenuatus*, que l'on a confondus avec tout d'autres espèces de champignons, sous la dénomination vulgaire de *phorolade*.

Dans la même famille des *Agarics*, une nouvelle section, celle des *Amanites* ou des *Agarics* à volva, présente à la fois des espèces comestibles & des espèces vénéneuses. Les *Amanites* à volva incomplète & à pédicule sans coller sont toutes regardées comme suspectes ou vénéneuses, en Italie. Quant aux *Amanites* à volva incomplète & à pédicule muni d'un coller, ce sont les plus vénéneuses de tous les champignons: l'*Agaricus asper*, l'*Ag. muscarius* ou fausse Oronge. Une espèce voisine de ces redoutables champignons se mange dans quelques provinces de la France, quoiqu'elle passe dans d'autres pour un poison; ce qui, dans tous les cas, ne pourroit être qu'une exception bien faible. Deux autres *Agarics* non moins vénéneux quo' *Agaricus muscarius*, l'*A. bulbosus* & l'*A. vernus*, ont une volva incomplète & un pédicule muni d'un coller. La section dont ils font partie n'en contient pas moins le plus élimé des champignons, l'*Oronge*, dont le chapeau est fixé sur les bords, & la volva tellement complète, qu'à la naissance de la plante elle l'envieille comme un œuf.

La famille des *Arctozes*, qui appartient, comme celle des *Chamæscissus*, à la classe des acotylédones, embrasse aussi plusieurs plantes qui servent à nourrir dans plusieurs pays, mais principalement différentes espèces du genre des *Urtica*, l'*Urtica hederacea*, les *Urtica umbellata*, *palmaria*, &c.

Des *Monocotylédones*. Il est digne de remarquer, relativement à l'hygiène, que toutes les plantes ou presque toutes les plantes qui appartiennent à la classe des monocotylédones, fournissent des matières nutritives & presque jamais des matières vénéneuses. Il n'importe pas moins d'observer, dans un premier aperçu, que les racines, les tiges des mêmes plantes contiennent en général beaucoup de mucilage, tandis que leurs semences se distinguent de toutes les autres par l'abondance de leur fécule, &c.

Parmi les quatre premières familles qui se rapportent aux monocotylédones, une seule, la famille des *Cyperacées*, est mise à contribution pour en tirer des comestibles. Le *Cyperus*, qui fait partie de cette famille, ne fournit pas à la vérité le fécule, comme quelques auteurs l'avoient avancé, mais les naturels des contrées où il croît, en retirent, pour s'en nourrir, une farine analogue à celle du sagou.

Une autre famille, celle des *Arctozes*, fournit également, dans sa racine, une fécule

à les aboultente, mais qui s'y trouve unie à un principe acide, que l'on en sépare par des lavages répétés & par la torréfaction.

Les Arondes, dont la racine est ainsi préparée, & sert d'aliment dans plusieurs pays, sont l'*Arum macrouratum*, l'*A. esculentum*, le *Calla palustris*.

Les Ouciniées & les Drymariaées fournissent à la fois des assaisonnemens & des nourritures; nous devons aux premières la Vanille, & l'une des meilleures féculs, le Salep ou Salap d'Orient. Presque toutes les racines des Drymariaées ont. aromatiques; telles sont celles du *Gingembre*, du *Galanga*, du *Coffas*, du *Curcuma*, du *Zédaire*, &c. La racine du *Alantia indica*, dans la même famille, n'est pas aussi pénétrée du principe aromatique, & fournit en revanche une fécul très-abondante, que nous employons sous le nom de *fécul d'Arrow-root*, dont l'usage introduit en Europe par les Anglais, s'est beaucoup répandu depuis quelques années.

La petite famille des Musacées ne seroit pas même comprise dans notre rapide nomenclature, si elle n'offroit le Bananier, que l'on estime pour ses fruits charnus & succulents qui résistent d'une culture particulière.

La famille des Iridées, quoique plus étendue, ne nous intéresse que par le Safran, dont les stigmates font un très-bon assaisonnement.

La famille des Hemorhacées ne fournit ni condiments, ni aliments. Celle des Amaranthacées est remarquable par des bulbes, qui sont analogues à celles des Liliacées, & dont plusieurs servent aux mêmes usages dans les lieux où les plantes de cette famille sont indigènes (l'*Hemeranthus coccineus*, au Cap de Bonne-Espérance). Les bolanilles eux-mêmes n'attribuent aucune propriété aux Hémarhacées.

Les Dioscorées ont des racines tubéreuses, qui fournissent, sous le nom de *racines d'Ignames*, une des parties principales de la nourriture dans les régions équatoriales. Ces racines nutritives sont ressemblées, charnues, mucilagineuses, & remarquables par leur saveur sucrée.

Les Smilacées fournissent aussi, dans plusieurs espèces qui leur appartiennent, des racines nutritives, celles du *Smilax china*, qui sont employées comme alimens dans le sud de l'Amérique septentrionale. Une famille beaucoup plus considérable, celle des Liliacées, se partage en plusieurs groupes, qui ne sont pas également importants sous le rapport de l'hygiène. Le premier de ces groupes, celui des *Asparagées*, contient les asperges, dont les jeunes pousses servent dans toutes les espèces du genre, à la nourriture de l'homme, & produisent la même action sur la sécrétion des voies urinaires.

Le groupe des *Trilliées*, dans la même famille, ne fournit point d'alimens. Celui des *Aphodées* contient un grand nombre de plantes

qui servent comme assaisonnement: la *Scille maritime*, les différentes espèces d'*Ail*; le groupe des *Broméliées*, que l'on comprend encore dans la même famille, nous intéresse par l'*Ananas*, dont le fruit est remarquable par sa consistance charnue, son odeur aromatique & un principe astringent. L'*Agave sauvage*, qui appartient au même groupe, & qui se trouve indigène au Mexique, fournit assez abondamment une fécul sucrée, que l'on fait fermenter, pour en retirer une espèce de vin désigné sous le nom de *Pulque*.

Les Cucurbitacées, quoique voisines des Liliacées, ne contiennent que des médicamens ou des poisons: ce qui doit être attribué à un principe très-acide répandu dans toutes les parties de la plante, & combiné avec une quantité assez considérable de fécul dans les racines; la petite famille des *Commelinées* ne présente ni alimens, ni médicamens connus. Celle des *Palmiers* est assez riche en substances alimentaires. Le Dattier, le Cocotier, dont les fruits sont si précieux pour l'homme, appartiennent à cette famille (voyez *Palmiers*). Le tronc, dans toutes les plantes de la même famille, fournit, lorsqu'il est âgé, la fécul douce & nourrissante, que l'on connoit sous le nom de *sago*, que l'on retire le plus ordinairement du *Sagou farinifera* ou du *cycas repolata*. Les sommets de tous les palmiers présentent en outre une substance herbacée, qui, sous le nom de *chou-palmiste*, sert d'aliment dans tous les pays où les palmiers sont indigènes. La sève des mêmes plantes est précieuse pour en former tantôt une boisson fermentée, tantôt une liqueur acide ou une liqueur sucrée.

Les familles qui suivent; c'est-à-dire les *Juncées* & les *Typhacées*, n'ont aucune propriété alimentaire.

La famille des *Cyperacées* nous offre les tubercules du *Cyperus esculentus*, qui, comme tous les véritables tubercules, sont des réservoirs de mucilage & de fécul. La famille suivante, celle des *Graminées*, est la plus riche, la plus abondante en substances alimentaires, soit pour l'homme, soit pour les animaux. En effet, elle seule famille renferme de quatre à cinq cents espèces de plantes, que l'on peut employer comme aliment, & l'abondance de ces végétaux sur tous les points du globe, l'indépendance absolue de leur nature, expliquent naturellement, suivant la remarque de M. de Candolle, comment la naturalisation des animaux herbivores est devenue facile dans tous les lieux de la terre. Les propriétés nutritives des Graminées se trouvent d'ailleurs principalement dans les graines, qui toutes renferment une substance farineuse, unie dans quelques espèces, tantôt avec du gluten, tantôt avec une matière sucrée; aucune espèce de la famille des Graminées ne peut être regardée comme véritablement vénéneuse: l'ivresse lui-même ne fait pas ex-

ception. Il diffère peu du froment qui a souffert de l'humidité, & la propriété sensible qu'on lui a attribuée avec exagération, s'aperçoit à peine dans la bière ou dans le pain préparé avec une farine qui contenoit de l'ivraie. Quotidien à l'ergot du seigle, ou ne peut le regarder que comme l'effet d'une altération accidentelle. La propriété un peu stimulante de l'avoine, qui sembleroit aussi faire une sorte d'exception, n'appartient point au péricarpe, mais à l'enveloppe du grain, & dépend d'un principe aromatique qui paroît avoir quelque analogie avec la vanille.

Dans l'origine des choses, les diverses espèces de Graminées les plus employées à la nourriture de l'homme ne paroissent pas avoir été indifféremment répandues sur les divers points du globe. Le Maïs, qui n'a été introduit en Europe que dans le dix-septième siècle, appartient à l'Amérique, le Riz aux plus belles contrées de l'Asie, le Millet à l'Afrique, &c. ce que nous appelons *plantes céréales*, à l'Europe.

La plus grande des Graminées, la Canne à sucre, dont la découverte fut époque dans l'histoire des nations modernes, est remarquable par le mucilage doux & sucré de sa tige. Du reste, les Graminées les plus employées comme aliments font toutes celles que nous venons d'indiquer. Beaucoup d'autres semences, dans la même famille, pourroient être employées, si elles étoient moins petites, & dans les temps de disette, ou dans les pays peu cultivés : telles sont plusieurs graines que nous négligeons ; celles du *Festuca stultana*, du *Zizania aquatica*, de l'*Avena sativa*, du *Panicum sanguinalis*, de l'*Avena elatior*, du *Bromus secalinus*, de l'*Elymus arenarius*.

L'Orge, le Riz & le Riz parfaitement mondé, le maïs, le gros & le petit millet ; contenoient la fécule presque pure, & ne convenoient pas pour la cuisson du pain levé, si on ne mêle pas leur farine avec une certaine quantité de farine de froment. On prépare avec cette fécule, presque pure, des bouillies, des pains azymes, des gâteaux ; préparations qui rappellent le pain d'orge des Anciens, le *cous-cous* ou bouillie des nègres, la *polenta* des Italiens. Dans l'avoine, la fécule est unie à la matière saccharée, ainsi que dans le seigle. La farine de seigle, que l'on emploie pour faire le pain, ne contient pas ou du moins contient très-peu de gluten. Elle doit les propriétés de former une pâte liée, & de se convertir en un pain grossier, à un mucilage visqueux qui s'y trouve uni à la fécule ; quant au froment, toutes ses différentes espèces sont remarquables par la quantité très-considérable de gluten qui se trouve combinée dans leurs semences avec la fécule ; combinaison plus propre qu'à toute autre à la fermentation panifier ou à la préparation du pain levé dont l'usage a été pendant si long-temps inconnu à plusieurs nations.

Plusieurs semences des Graminées ne sont pas seulement employées comme aliments : on en fait aussi usage pour composer différentes boissons fermentées ; la bière, par exemple, avec l'orge ; plusieurs eaux-de-vie avec le riz & les semences de nos Céréales.

Trois autres familles, qui conduisent des Graminées aux Fongères, ne contiennent aucune plaie nutritive. Les feuilles de ces hermines, que l'on désigne d'une manière un peu trop générale sous le nom de *Capillaires*, se font employer que comme médicaments, quoiqu'elles contiennent un mucilage assez épais.

Des Dicotylédones. Les familles diverses des dicotylédones, qui fournissent plusieurs substances comestibles, sont toutefois moins remarquables sous ce rapport, que par l'abondance & la variété des altérations dont nous les avons trouvées redevables. On peut observer d'une manière générale que c'est parmi ces plantes que se trouvent les produits les plus élaborés, les plus exaltés de la végétation, les huiles fixes & volatiles, les acides, le Camphre, les Gommés-résines, les Résines.

La première famille de cette classe, la famille des *Rosaçées*, n'offre rien à l'hygiène, si on en excepte les semences des *Nigelles*, qui sont employées comme un condiment populaire dans quelques provinces. La famille suivante, celle des *Umbellifères*, n'offre aucune espèce comme comestible en usage. La famille des *Magnoliacées* présente quelques altérations agréables, le péricarpe des *Alisium*, connus sous le nom de *Eadianes* ou d'*Amis d'ore*, & les cônes du *Magnolia acuminata* de la Virginie.

Plusieurs condiments sont empruntés à la famille des *Arboracées*, mais surtout le poivre d'Ethiopie : les fruits de l'*Asimina triloba*, du *Porcella* & de l'*Annona*, paroissent agréables aux indigènes, & très-peu aux Européens, que l'habitude n'a pas familiarisés avec leur saveur.

La famille des *Menthaçées* paroît donner très-peu de substances véritablement comestibles ; mais nous devons remarquer que les baies de deux plantes de cette famille, que l'on désigne sous le nom de *coques du Levant* (1), employées pour prendre le poisson, communiquent leur propriété vénéneuse à la chair, mais surtout à la chair des poissons : il nous importe de dire aussi que l'on mange en Egypte les baies du *Menispermum edule*, quoiqu'elles soient très-acres, & que l'on en retire, par la fermentation, une liqueur très-enivrante. Le nouveau principe immédiat végétal, que M. Boullay a découvert, & qu'il a décrit sous le nom de *Picrotoxine*,

(1) *Menispermum edule* ; *Menispermum edule*.

a été obtenu de la graine du *Menispermum cocculus*, isolée de son principe.

La petite famille des *Cucuracées* ne peut nous arrêter; nous dirons seulement que les fruits d'une plante de cette famille, le *Jurcolana*, pourroient le manger, comme celui du *Uffier*, si leur cavité interne n'étoit pas tapissée par des poils sordes & durs, aussi incommodes que ceux des pois à gratter.

La famille suivante, celle des *Malvacées*, malgré l'abondance du mucilage de toutes les plantes qu'elle comprend, n'a rien de peu de comestibles, mais beaucoup de médicaments émoulliens & adoucissans. L'*Hibiscus esculentus*, qui lui appartient, fait partie de quelques préparations alimentaires chez les Indiens, ainsi que le *Sida cordifolia* & le *Sida rhomboides*. Les graines des malvacées sont, en général, douces; émoullientes & entourées dans plusieurs genres; mais surtout dans le *Coton* & dans le *Bombax*, de filamens, dont l'industrie humaine a tiré un grand usage. La graine d'une autre espèce, celle du *Theobroma*, contient une huile de cire butyreuse, que l'on trouve un peu amère, & qui fait la base du chocolat. (Voy. *TUBORORA CACAO*.)

Presque toutes les plantes de la famille des *Ericacées* ont des graines assez grosses, & dont le péricarpe paroit analogue à celui des noisettes, au moins pour la saveur, qui cependant n'est pas tout-à-fait aussi douce. Les nègres recherchent en particulier la graine du *Sterculia acuminata*, qui est connue sous le nom de *Kola*, & qui fait paroître assez agréable l'eau la plus faumâtre, si on la boit après avoir mangé de cette graine.

Parmi les plantes de la famille des *Tiliacées*, on en trouve quelques-unes qui sont employées comme légumineuses en Egypte; le *Charchorus olitorius*. Les baies de quelques-unes de ces plantes sont également comprises parmi les alimens dans quelques pays. (Les baies des *Grewia* & de l'*Aperiba emarginata*.)

Les fruits de l'*Elaeocarpus*, dans les *Elaeocarpiens*, sont mangeables, mais très-peu en usage. Les familles des *Maroatiacées*, des *Ochnacées*, des *Sinarouacées*, & même des *Rutacées*, ne fournissent aucun aliment, ni même aucun condiment, ainsi que les *Caniortales*, les *Linales*, les *Cistricées* & les *Violacées*. Nous devons excepter toutefois dans les *Caryophyllées* l'*Arenaria peploides*, qui, après avoir été soumise à la fermentation, fait partie d'une préparation alimentaire dont les Islandais se nourrissent.

Les fruits de plusieurs *Passifloracées*, & surtout des *Pussiflora coccinea*, *P. maliformis* & *P. quadrangularis*, sont charnus; pulpeux, & se mangent en Amérique. La famille des *Cactacées* nous offre deux alimentations très-recherchées, les feuilles des *Camelia Japonica* & *Sesbania*, & celles des

nombreuses espèces du genre *Thea*, qui sont indistinctement employées par les Chinois, & dont l'usage n'a été introduit en Europe que vers le milieu du dix-septième siècle (en 1666). (Voyez *Tai*.)

La famille suivante, celle des *Hypericacées*, fournit les plus beaux fruits, les *Orangers*, les *Citrons*, les *Pampelonnades*, tous également remarquables par l'épaisseur, la saveur amère de leur carpe, les propriétés acides & adoucissantes du fruit proprement dit. On n'emploie comme aliment aucune espèce dans la famille des *Mitacées*. L'écorce du *canella alba*, qui appartient à cette famille, sert d'assaisonnement dans les Antilles. Les baies des *Sarmentacées*, développées par la culture, dans la vigne, sont devenues, sous le nom de *raisin*, une des principales richesses de l'homme.

Les véritables *Garaucacées* ne fournissent aucun aliment; mais les feuilles *Garaucées*, que l'on rapporte à la même famille, présentent, dans les nombreuses espèces du genre *Oxalis* (*Spille*), un grand nombre de plantes qui sont recherchées pour leurs propriétés acides & rafraichissantes. Les *Gutturacées*, réservées aux régions équatoriales, renferment plusieurs espèces dont les fruits sont agréables au goût & rafraichissans. Les *Garcinia mangostana*, *G. cambogia*, &c. &c.; les fruits du *Grias*, dans la même famille, sont cueillis avant leur maturité complète pour être conservés dans l'huile ou dans le sel, & forment ainsi une préparation alimentaire. Nous ne citerons les *Hypericacées*, les *Hypocistacées*, les *Malpighiacées*, les *Acéracées*, que pour dire que l'homme ne peut en tirer aucune espèce d'aliment, excepté toutefois quelques *Malpighiacées*, dont les fruits charnus sont bons à manger. Les *Erables*, dans la famille des *Acéracées*, ont été lève sucrée d'où l'on retire du sucre dans l'Amérique septentrionale. Le fruit & les amandes de plusieurs plantes de la famille des *Sapindacées* sont estimés comme alimens (les *Euphorbia*, les *Melococca*, les *Peked*, &c.).

Les trois familles suivantes (1), qui vont nous conduire aux *Caryacées*, ne fournissent ni aliment ni condiment, si l'on en excepte le *Caprier*, qui appartient à l'une de ces familles, & dont les boutons à fleurs sont très-aliments.

Les *Crucifères*, que l'on regarde si judicieusement comme l'une des familles où elles les mieux établies, fournissent à la fois, dans les différentes parties des plantes qui lui appartiennent, des alimens & des condimens. Toutes ces plantes contiennent beaucoup d'azote, tendent par cela même à se putréfier promptement, & sont remarquables par un principe âpre & volatil qui les rend immanquablement stimulantes, surtout si l'on en concentre, comme dans

(1) Les *Desmodiacées*, les *Risotacées*, les *Caryacées*.

les graines de montarde, dans les racines de la *Cochlearia armorica*, ou les feuilles de *Lepidium latifolium*. Les principaux altérifonnemens que l'on retire des Crucifères, sont les différentes espèces de Montardes, le Cresson, le Cochlearia, le Raifort. Parmi les plantes alimentaires de la même famille, on cite principalement les nombreuses espèces de Choux, les Navets, &c. &c.

L'industrie agricole a beaucoup contribué à rendre ces plantes, & plusieurs autres plantes de la même famille, plus agréables : on emploie même quelquefois comme alimens quelques-unes de ces plantes, adoucies par l'étiémeur ; dans d'autres espèces, la racine ou la partie inférieure de la tige est seule employée, tandis que le feuillage est négligé (les Raves, les Navets, les Choux-raves). En faisant avorter les fleurs, en tout ou en partie, on rend les poisses ou les pédoncules de plusieurs autres Crucifères beaucoup plus comestibles, & c'est ainsi que l'on obtient les Brocolis & les Choux-fleurs. La *Crucis maritima*, de la même famille, que l'on réservait chez les Romains pour les pauvres & pour les esclaves, est devenue chez les Anglais un légume très-agréable, en étiolant les tiges de cette plante au moment où elles sortent de terre ; c'est ce que l'on a appelé le *Sea-Keel*, dont il seroit facile de répandre l'usage dans les provinces maritimes de la France.

La famille des PARAVRACÉES, dont le nom paroit éloigner l'idée d'une propriété alimentaire, fournit cependant des comestibles ou des condimens ; leurs graines sont en général de nature oléagineuse, & celles du pavot donnent, par expression, l'huile connue sous le nom d'*huile d'œillet*, qui n'a rien de nuisible. La pâte que forment ces graines, après l'expression de l'huile, sert d'alimens dans plusieurs contrées, sans participer aux qualités narcotiques de la plante.

L'écorce du *lycea lutea*, dans les NÉPHRACÉES, a été employée quelquefois avec l'écorce interne du pin des forêts, dans le temps de disette, pour former un pain grossier & un peu alimentaire. Les baies des Epines-Vinettes, qui appartiennent à la famille des BRANRACÉES, sont rangées parmi les fruits les plus agréables.

La famille des FRANCOULACÉES, à laquelle nous devons divers médicamens, en peut mériter quelque attention relativement à l'hygiène, quoiqu'elle ne fournisse que quelques plantes, qui sont employées à la place du Thé dans quelques contrées (le *Rhamnus tozani*, le *Ceanothus Americanus*, le *Prinos glaber*, enfin le *Cassia peragua*, qui est le véritable thé des Apalaches).

On regarde comme bon à manger le fruit de la plante récemment désignée sous le nom de *Billardiera*, que l'on rapporte à la famille des PIRROACÉES. La petite famille suivante des SARACÉES, ne contient pas de plantes alimentaires. Les noyers, qui forment la famille des JUGLANDÉES, donnent

tous des amans comestibles, d'où l'on retire, par l'expression, une huile grasse, salubre & très-bonnette.

La famille des TETRATRACÉES, très-voisine de celle des JUGLANDÉES, fournit abondamment des graines dont la nature oléagineuse est bien connue dans le Pistachier ; le noyau de ces amandes est enveloppé d'une pulpe très-acide dans quelques espèces, & que l'on emploie aux Indes pour préparer des boissons rafraîchissantes. (Les *Averrhoa acidissima* & *bilimbi*.)

Les amandes de plusieurs espèces de la même famille, sont employées dans divers pays comme alimens. On a supposé une propriété singulière & merveilleuse dans les fruits de deux arbres de la même famille, le *Cassipoum occidentale* & l'*Anacardium orientale*, la propriété d'exciter l'action du cerveau & de donner de la mémoire.

La petite famille des TERNARACÉES & la famille des POLYACÉES ne sont remarquables par aucune substance comestible. La famille des LÉGUMINEUSES, à laquelle nous devons plusieurs médicamens énergiques, & surtout les purgatifs, contient en même temps un grand nombre de substances qui sont alimentaires pour l'homme & pour les animaux. Les semences d'un grand nombre de plantes de cette famille sont très-riches en fécule, comme on le voit dans les Pois, les Lentilles, les Éèves, le Pois chiche, le Haricot de la Chine, &c. en général dans toutes les légumineuses dont les cotylédons sont épais, remplis de fécule, & ne changent point d'état pendant la germination.

On trouve en outre, dans la famille des LÉGUMINEUSES, quelques plantes dont les racines, munies de tubercules, contiennent une substance très-nourrissante : le *Lathyrus tuberosus*, que l'on mange en Hollande ; les *Dolichos tuberosus* & *D. bulbosus*, employés comme alimens par les Indiens.

Les gomme & les baumes, que l'on retire de plusieurs légumineuses ; les baumes de Gopahu, du Pérou, le Cachou, &c., qui pourroient être employés comme altérifonnemens, ne sont guère en usage que pour leurs propriétés médicamenteuses. La gomme, que plusieurs plantes de la même famille fournissent par exsudation, est un des produits immédiats des végétaux les plus nourrissans, & se trouve employée seule quelquefois comme aliment. Les gommages les plus en usage sont celles qui proviennent de l'*Acacia* du Sénégal (*Acacia Senegalensis*), de l'*Acacia* du Nil (*Ac. Nilotica*), qui donne la gomme arabique ; de l'*Astragal* de Crète (*Astragalus Ereticus*), de l'*Astragalus gummifer*, d'où vient la gomme adragante ; enfin, de l'*Eledysium albagi*, qui produit une espèce de manne.

Nous ne pouvons terminer cette énumération des légumineuses qui servent à nourrir, sans y faire entrer le Caroube & le Tamaris, végétaux pour leurs baumes ; le qu'Angals (*Quilajia cajan*),

employé par les nègres; le Lupin (*Lupinus albus*), qui donne une farine amère; le Haricot vulgaire (*Phaseolus vulgaris*), & le Pois-gesse (*Lathyrus sativus*), originaires de l'Inde; la Vette du Canada, la Fève de marais (*Vicia faba*), dont une variété remplace très-bien le Café; enfin, les Orbes, qui fournissent, suivant Hippocrate, la principale nourriture des Thraces.

La famille des ROSACÉES n'est guère moins importante sous le point de vue de l'hygiène que la famille des légumineuses. Nous lui devons la plupart de nos arbres fruitiers, le Néflier, le Cognassier, le Pommier, le Poirier, le Prunier, l'abricotier, le Pêcher, le Fraiser, le Framboisier, le Sorbier, &c. Les fruits que fournissent ces différents arbres sont tous allongés avant leur maturité, propriété qu'ils conservent dans tous les genres où l'ovaire adhère au calice, tels que le néflier, le sorbier, &c. Ces mêmes fruits deviennent en suite plus ou moins acerbés, plus ou moins sucrés, dans le genre où l'ovaire n'est pas adhérent.

La plupart des fruits des Rosacées qui se trouvent aujourd'hui le plus en usage dans les différentes parties de l'Europe; ne sont devenus aussi agréables que par l'industrie de l'homme & les efforts de la culture la plus recherchée; les arbres qui les fournissent sont d'ailleurs originellement étrangers aux parties du monde où ils sont aujourd'hui les plus répandus & les mieux cultivés: ainsi l'un d'eux, le prunier, nous est venu de Syrie, & l'abricot, d'Arménie, le pêcher, de la Perse, l'amanier, de l'Afrique septentrionale, à des époques & dans des circonstances qui, loin de paroître minuscules, devoient être rappelées avec soin dans l'histoire des nations.

La section particulière des DRYACÉES, à laquelle appartiennent tous les fruits à noyaux, est remarquable par la propriété délétaire de l'eau distillée de ces mêmes noyaux, qui contient une certaine quantité d'acide prussique. Nous ne pouvons indiquer aucune substance alimentaire dans la famille suivante, la famille des SATIACÉES. Celle des MUCAGINEUX fournit, dans plusieurs plantes, des baies succulentes & bonnes à manger. Les baies des *Melastoma succosa*, *M. arboreum*, *M. floreum*, *M. crispata*, *M. malabathrica*, *M. elegant*, *M. aggregata*.

Les MYRTIACÉES, que les botanistes ont rapprochées des Melastomées, ont toutes un principe toutes remarquables par le principe astringent & par l'huile essentielle, qui tantôt s'opère & le plus souvent réunie, réside dans l'écorce, depuis la racine jusqu'aux fruits. Nous devons à cette famille plusieurs assaisonnemens. Le girofle, dont ce nous appelons le *clou*, couille dans la fleur entière & dans le calice, cueilli avant leur maturité; le Pineon ou Poivre de la Jamaïque, les Caselles, le Tié de la Nouvelle-Hollande, le Syringa, &c. On recherche aussi quelques plantes de cette famille pour leurs fruits; le

Grenadier, par exemple (*Punica granatum*), les Goyaviers (*Psidium pyrifolium*), le Jambosier (*Eugenia jambolana*), &c. &c.

Plusieurs des substances que nous venons d'indiquer, mais principalement le girofle, font partie du genre d'assaisonnement que l'on a désigné sous le nom d'*épices*, dont l'usage, inconnu aux Anciens, s'est introduit chez les Modernes par les progrès de la navigation & à la suite des grandes expéditions du quinzième & du seizième siècle.

Dans les COMBATAIRES, l'amande de plusieurs espèces de *Terranaba* sert comme aliment dans les îles Moluques, & fournit une huile qui a la propriété remarquable de ne point se rancir. Dans les LABIÉS, toutes les propriétés sont inconnues: dans les ONAGRÉES, sur lesquelles il reste beaucoup aussi à connaître, le *Trapa natans*, qui appartient à cette famille, fournit une graine alimentaire. Suivant quelques voyageurs, le racine de l'*Enothen*, de la même famille, feroit employée en salade.

Parmi les FICOIDES, plusieurs espèces ont des feuilles assez charnues pour servir de nourriture, comme on le voit aux Antilles, pour le *Sesuvium portulacastrum*; au Cap de Bonne-Espérance, pour le *Mosembryanthemum*, & à la Nouvelle-Hollande, pour le *Tetragonia capensis*. Nous nommerons à peine les PORTULACÉES, si elles ne fournissent pas le pourpier, & le *Claytonia perfoliata* qui donne un légume très-agréable. On ne tire aucun aliment des FANONCHÉES ni des TAMARICÉES.

Dans les NOFALÉES, quelques espèces du Cistées (*Cisti*) ont des fruits assez gros pour être mangés, & qui sont recherchés pour la grande quantité d'eau qu'ils contiennent. Ceux du *Cactus opuntia* ont cela de remarquable, qu'ils donnent aux urines une couleur de rouge sanguin; ce qui avoit fait établir l'opinion populaire, que le sang se mêloit avec les urines, pour opérer un semblable phénomène.

Les GROSILLIÈRES se rapprochent beaucoup des *Cacti*, surtout par le girofle d'Amérique (*Cactus Pereskia*); ils fournissent, dans toutes les plantes qui leur appartiennent, des baies aqueuses & assez suaves dans un grand nombre d'espèces, comme dans le girofle des Alpes, mais acides & douces dans le girofle rouge; aromatiques dans le girofle noir; insipides, légèrement astringents dans le calice; dissimulent & dépend, dans cette dernière plante, d'un organe particulier.

Les CRASSULACÉES, remarquables par l'épaisseur de leurs feuilles, fournissent à peine quelques plantes dont les feuilles puissent être employées comme légumes. Le *Sedum telephium*, que l'on fait servir à cet usage, n'est pas entièrement dépourvu de l'astringence propre à la famille, & fait éprouver à ceux qui en mangent, une irritation de l'estomac assez désagréable.

Les **SAXIFRAGÈES** & la famille des **CEROXYACÈES** de Brown, n'intéressent point l'hygiène; celle des **OMBELLIFÈRES** contient au contraire un grand nombre de plantes, qui fournissent des assaisonnemens & des alimens. Les plantes de cette famille qui sont les plus généralement employées sont les Carottes, les Panais, les Panicautes, les Lâfers, les Berles, dont les racines sont nutritives; elles contiennent pour la plupart une quantité assez considérable de sucre, quatorze pour cent, par exemple, dans la Carotte desséchée; douze & demi, dans le Panais hâté, dans le Chervi. La propriété nourrissante est du reste tellement attachée aux racines, dans les **OMBELLIFÈRES**, que l'on peut manger celles de plusieurs espèces qui sont vénéneuses, comme on le voit pour l'*Enanthe pimpinelloïdes*, dont les tubercules radicaux servent d'alimens, sous le nom de *Jouahettes*, dans les environs d'Angers, & sous celui de *Michons* dans les environs de Saumur.

Les assaisonnemens que l'on retire des **OMBELLIFÈRES** appartiennent à leurs graines, qui toutes contiennent une huile volatile dans leurs tunique extérieures. Les semences d'anis, originaire d'Égypte, & celles de Coriandre sont les plus employées. On se sert aussi, comme assaisonnement, des feuilles ou semences du Persil (*Apium petroselinum*), indigène en Sardaigne, du Céleri, du Fenouil, du Cerfeuil, de l'Angélique. La famille des **ARALIACÈES**, dont il n'est qu'une section de la famille précédente, fournit aussi dans les racines une substance alimentaire assez abondante, plus connue dans les *Aralia racemosa* & *A. nudicaulis*; la racine de Ginseng (*Panax quinquefolium*), qui se rapporte à la même famille, passe pour un condiment très-énergique parmi les Chinois.

Parmi les **CAPRICOACÈES** & parmi les **LORANTHÈES**, que l'on en a détachées, nous ne trouvons aucune plante alimentaire. Quant à la famille suivante, celle des **ROSACÈES**, si remarquable par les médicamens énergiques dont nous lui formons redoutables (le Quinquina, l'Épécacanthé), nous n'y trouvons qu'un seul assaisonnement, le Café, dont l'usage est devenu familier, depuis un demi-siècle, dans toutes les parties du Monde civilisé. Les propriétés si remarquables de cette graine résident dans le péricarpe écoré, qui en fait la majeure partie; ce qui explique comment la torréfaction seule développe le parfum qui est propre à cette semence. L'arabique qui donne le café est d'ailleurs originaire d'Arabie; il fut d'abord apporté en Europe, dans le dix-septième siècle, & transporté ensuite d'Europe aux Indes orientales & occidentales, où il a été naturalisé. L'usage du café, adopté aujourd'hui d'une manière si générale, ne commença à s'établir en France que sous le règne de Louis XIII, sous le nom de *Cahouri*. Le premier café public fut établi en

1672. La décoction légère du café, on son infusion convenablement échauffée par un premier degré d'ébullition, forme un breuvage légèrement tonique, & que l'habitude ou certaines dispositions particulières, rendent nécessaire à quelques personnes, pour favoriser leur digestion. Si le café, dans le plus grand nombre des cas, ne perdait pas une partie de son effet par la cuisson, son action seroit beaucoup plus efficace, comme on le voit dans les circonstances où il est administré en lavement, ou donné comme antidote dans les empoisonnemens par les narcotiques. La précaution de faire germer le café, avant sa torréfaction, le rend beaucoup moins stimulant & beaucoup moins capable d'occasionner l'insomnie. (Voyez **ROSACÈES**.)

Trois familles suivantes, celles des **ORFÈVALLÈRES**, des **VALÉRIANÈES**, des **DIAPYCÈES**, fournissent peu ou point d'alimens, si l'on en excepte les Mâches cultivées, dont nous employons les feuilles en salade, & la Valériane rouge, que l'on mange en Sicile.

La famille des **COMPOSITÈES**, beaucoup plus étendue, se sous-divise en plusieurs groupes, dont quelques-uns sont remarquables par les alimens qu'on en retire. Le premier de ces groupes, celui des **CORYMBIFÈRES**, fournit quelques condimens dans l'estragon (*Artemisia drunculus*), employé pour donner une saveur agréable au vinaigre; ce que l'on fait également dans les Alpes, avec l'*Artemisia glacialis*, les *Artemisia nuphris* & *spicata*, l'*Achillea pansa*. On emploie aussi, comme aliment, les tubercules mucilagineux, que porte la racine des plantes du genre *Helianthus*.

Plusieurs espèces d'*Achillea*, de *Bellis*, d'*Arminis*, ont été proposées comme succédanées du Thé, dans plusieurs contrées. Quoique la plupart des feuilles des **CINAROCÉPHALES**, second groupe de la même famille, soient très-amères, lorsque la plante est un peu âgée, on emploie comme légumes les jeunes feuilles & les pousses de plusieurs plantes de la même famille, des Chardons-Maries, des Carthames, des *Clasitrapes*; les réceptacles de plusieurs **CINAROCÉPHALES** sont d'ailleurs beaucoup meilleurs à manger que ces feuilles ou ces tiges, comme nous le voyons tous les jours pour l'artichaut, dont la propriété nutritive se retrouve dans l'*Oxopordon*, les *Cardines*, le *Cardus arvensis*, & probablement dans toutes les **CINAROCÉPHALES** peu ligneuses. Le réceptacle du *Cardus arvensis* doit être cité en particulier. Il est très-gros, très-charnu & d'un usage habituel dans les Pyrénées, les Cevennes & les Alpes méridionales. Les corolles de l'artichaut & des chardons, jouissent d'une autre propriété qui se rapporte à l'hygiène, la propriété de faire sauter le lait, & de remplacer en conséquence la crème dans plusieurs provinces de France. Un autre groupe

de la même famille, celui des *Chicoracées*, comprend le plus grand nombre des plantes qui sont employées en salade, & sous forme de légume, la Chicorée endive, la Chicorée sauvage, la Scariole, la Laitue, les racines de scorfonère, du falfilif, de la dent-de-lion, du *Scylmus hispanicus*, plus connu sous le nom vulgaire de *Cardouilles*. Les tiges & les feuilles des *Chicoracées*, qui sont d'un usage alimentaire, ne peuvent être d'ailleurs agréables que par l'étiolement, ou lorsqu'elles sont encore jeunes.

Les jeunes pousses de plusieurs *CAMPANELACÉES* sont employées, aux mêmes usages que celles de la plupart des *Chicoracées*, mais surtout celles des *Campanula rapunculus* & *Trachelium*; celles du *Phyteuma spicata*, en Europe; & celles du *Canarina campanula*, aux Canaries.

Les *LORÉLACÉES* ne fournissent point d'aliments.

Les *CUCURBITACÉES*, quoique remarquables par l'activité médicamentieuse & vénéneuse de leur fruit, dans un grand nombre d'espèces, donnent aussi dans d'autres espèces, plusieurs fruits très-savoureux comme aliments: les Concombres, la Courbouille, le Melon, &c. &c.

Les fruits de plusieurs *VACCINIÉES*, charnus & doux, sont mangés, surtout dans les espèces *Vaccinium myrtillus*, *V. oxycoccus*, *V. macrocarpum*. Cette dernière espèce, que l'on connoît en Angleterre sous le nom de *Cran-Berry*, est originaire du Canada, & a été introduite par sir Joseph Banks dans la Grande Bretagne.

Le fruit de ce *vaccinium* & celui de la plupart des autres espèces de la même famille, conservent ordinairement un arrière-goût un peu styptique, particularité que les naturalistes attribuent à l'adhérence du calice au péricarpe, comme dans les plantes de la famille des *Myrsinées*.

La famille des *ERICIÉES* se rapproche de la famille précédente, par sa structure & par ses propriétés. On regarde comme comestibles les baies de plusieurs plantes de cette famille; ainsi on se nourrit à Saint-Domingue, du *Bryonia coccinea*; en Laponie, de *P. Arbutus alpina*; dans l'Orient, des *Arbutus andrache* & *integrifolia*; aux terres Magellaniques, de *P. Arbutus mucronata*; dans la Nouvelle-Hollande, de plusieurs *Symphelia*, & notamment du *Symphelia Richei*; dont le fruit fut la seule nourriture du naturaliste qui lui a donné son nom, en traversant un désert où il s'étoit égaré.

On ne peut assigner, d'après l'expérience, aucune propriété alimentaire à la petite famille des *AGROSTIACÉES*, à laquelle le genre des *Houx* appartient, ni à la petite famille des *MYRSINÉES*. La pulpe des fruits, dans plusieurs plantes de la famille des *SAPOTIÉES*, est nutritive. Ainsi, on mange les fruits du *Mimusops elengi*, de l'*Imbricaria*

malabarica, du *Chrysophyllum cainita*, du *C. Jamaicense*; enfin, de plusieurs autres plantes de la même famille, & en particulier de l'*Achras*, connu à Guatimala sous le nom de Nèlier. Les graines de plusieurs plantes de la même famille, contiennent une huile qui se concrète facilement & prend la consistance du beurre, surtout dans le *Bassia butyracea* ou *mahoe* de la côte de Coromandel, dont les graines sont si nombreuses, qu'un seul arbre rapporte jusqu'à trois quintaux d'huile; cette huile est employée dans les préparations alimentaires. L'arbre de la ruche, si célèbre dans l'Amérique méridionale, fournit une espèce de lait qui sert à la nourriture des indigènes.

La famille des *ERINACÉES* est remarquable par ses baies très-acres avant leur maturité; & qui ne sont employées comme aliment que lorsque, par un mode particulier de décomposition, elles sont devenues blêches; ce qui leur est commun avec les *Nelles*, les *Cornes* & plusieurs *Poires*, & en général avec les fruits à ovaire adhérent. Les espèces qui fournissent principalement ces fruits sont plusieurs *Diopisps*, dont les fruits sont mangés, soit dans l'Amérique septentrionale, soit au Japon, à la Cochinchine & à la côte de Coromandel. Le Biojain & le Storax, qui sont fournis par des plantes de la famille des *ERINACÉES*, & qui sont principalement employés comme médicaments, pourroient servir au besoin comme assaisonneurs.

Dans la famille des *TERNSTROMIÉES*, une plante de Java, probablement le *Scapha*, donne un fruit acide, dont les Javanais font usage comme aliment, sous le nom de *Koleho*.

La famille des *OLEACEES*, plus étendue, plus riche en substances alimentaires, nous offre l'Olivier & les frênes. Le fruit du premier est un drape, dont la chair est huileuse; particularité qui existe dans toutes les espèces de ce genre; ce qui est contraire à la disposition générale, d'après laquelle l'huile ne se rencontre ordinairement que dans les graines. Les olives, dont nous retrouvons par expression l'huile la plus estimée, sont employées, avant leur parfaite maturité, comme aliment ou comme condiment, après qu'on les a fait macérer dans l'huile: préparation qui irrite les estomacs faibles ou sensibles, & souvent au point d'occasionner le *ser chaid*.

Plusieurs espèces de frênes fournissent par exsuffation un suc particulier: la *Mauve*, qui sert comme médicament, mais qui pourroit aussi être donnée comme substance alimentaire.

Les *JASMINÉES*, que l'on avoit long-temps comprises dans les *OLEACEES*, ne donnent ni aliment ni condiment. Les propriétés de la petite famille des *PANICULIÉES* de Brown sont inconnues. La famille des *STATICEES*, si redoutable par les poi-

sons qu'elle renferme, ne compense cette propriété sucrée par aucune propriété alimentaire. Nous devons dire cependant que le *Titan-Cotte*, qui appartient à cette famille, est employé pour purifier l'eau & pour lui donner une saveur légèrement amère. La pulpe de quelques-uns des fruits de la même famille, du *Stychnos nux-vomica*, par exemple, devient mangeable par la maturité, mais en occasionnant une saveur astringente, qui indique le danger d'en faire usage.

Les *Asclepias* sont remarquables en général par une propriété acre & stimulante, attachée à plusieurs de leurs parties; elles fournissent cependant quelques aliments à l'homme, soit dans quelques jeunes pousses de plusieurs espèces de cette famille, soit dans le suc lacteux de l'*Asclepias lactiferus* encore jeune, qui sert de lait aux Indiens.

Les *Gentianæ* ne renferment aucune plante alimentaire, quoique la plupart des plantes de cette famille contiennent une certaine quantité de matière sucrée. La gentiane jaune, dans laquelle cette matière paraît plus abondante, sert, dans quelques parties de la Suisse, à faire de l'eau-de-vie.

Les botanistes eux-mêmes n'assignent aucune propriété aux deux petites familles des *Euphorbiacées* & des *Polymoniacées*.

La famille des *Convolvulacées*, à laquelle nous devons un assez grand nombre de médicaments énergiques, fournit aussi quelques plantes alimentaires; le *Convolvulus edulis*, dont les Japonais se nourrissent; le *C. batatas* d'Amérique, remarquable par sa racine farineuse, & le *C. chrysanthus* (Patate douce d'Italie).

Dans la famille des *Borraginées*, le groupe des *Sesbées*, qu'on y rapporte, fournit des fruits assez charnus & assez mucilagineux pour être alimentaires.

La famille des *Solanæ*, qui vient enfin à offrir à nos considérations, à la suite d'un assez grand nombre de familles si peu abondantes en comestibles, nous offre, au milieu des poisons les plus redoutables, une des plantes les plus riches en substances alimentaires: le *Solanum tuberosum*. Les tubercules souterrains de cette plante, qui paraissent appartenir à des organes analogues aux tiges, plutôt qu'à des racines, suivant la remarque de M. de Candolle, contiennent une assez grande quantité de fécul & un mucilage très-nutritif. La pomme de terre appartient à l'Amérique; elle fut d'abord apportée du Pérou par les Espagnols, vers le milieu du seizième siècle. Vers la fin du même siècle, un voyageur célèbre l'introduisit en Angleterre, où elle s'est répandue, au point de former presque seule la nourriture de l'une des

illes britanniques. Nous possédons aujourd'hui un assez grand nombre de variétés de pommes de terre, que l'on peut rapporter à trois espèces; savoir: 1^o. le *Solanum tuberosum*; 2^o. le *Solanum montanum*, & 3^o. le *Solanum* récemment découvert par Valenciennes, qui lui a donné son nom: *Solanum Valenciense*.

La pomme de terre fournit, en général, un aliment très-convenable au plus grand nombre des hommes. Nous devons remarquer toutefois, que la grande quantité d'eau & de mucilage qu'elle contient, la dispose à fermenter, surtout si elle se trouve altérée à des matières sucrées, & que dans ce cas elle pourrait très-bien devenir un aliment peu digestible aux estomacs assez faibles, pour n'opposer qu'une réaction insuffisante à ce mouvement de fermentation, ou assez peu irritables pour n'être pas convenablement stimulés par une nourriture aussi peu tonique (*voies POMME DE TERRE*). Du reste, la pomme de terre n'est pas la seule substance alimentaire que fournissent les *Solanæ*. Ainsi, les enfants mangent quelquefois impunément les fruits du *Physalis alkekengi*, qui appartient à cette famille. On emploie aussi, comme aliments, soit en les mangeant crus, soit en les faisant cuire, les fruits de plusieurs espèces du genre *Solanum* (1), & il importait de savoir, d'après le travail de M. Dunal, que dans plusieurs espèces du même genre, la chair ou le sarcocarpe du fruit est salubre, tandis que la pulpe qui environne la graine est délétère.

Les Tomates, qui servent comme assaisonnement, sont fournies par une des espèces de ce genre *Solanum*, le *Solanum Lycopersicum*. Les feuilles de quelques *Solanæ*, celles de quelques morelles & celles du *Solanum nigrum*, connues dans les colonies sous le nom de *bird*, doivent être ajoutées aux comestibles, que l'on peut retirer de la famille des *Solanæ*. Les Capsiques en général, & le Poivre de Guinée en particulier (*Capsicum annuum*), qui appartiennent à la même famille, fournissent des assaisonnements très-énergiques, soit pour les aliments, soit pour donner plus de force à l'eau-de-vie & au vinaigre. (*voies SOLANÆ*.)

La famille suivante, la famille des *Passifloræ* (les *Scrophulariées* & *Pediculariées* de du Roi), ne contient aucune plante alimentaire.

La famille des *Labiées*, non moins dépourvue de matière nutritive, est très-riche en substances aromatiques & propres à former des condiments. Nous lui devons le plus grand nombre de nos assaisonnements indigènes, la *Marjolaine*, la *Sarriette*, le *Basilic*, la *Sauge*, la *Melisse*, la *La-*

(1) La mirlouque (*Solanum melongena*), dont les baies se mangent en Italie & en Espagne, &c.

rande, le *Thym*, le *Serpole*, la *Menthe*, les *Origans*. Ces plantes doivent leurs propriétés à une huile essentielle, qui s'y trouve combinée avec un principe amer, beaucoup plus abondant dans quelques espèces; telle que la *Germandrée officinale*. On a aussi trouvé du Camphre dans les huiles essentielles de plusieurs Lauriers.

En suivant l'ouvrage qui nous sert de guide, dans cette énumération rapide, nous trouvons un assez grand nombre de familles qui ne fournissent aucune de ces plantes, depuis les Lauriers jusqu'aux Cistacées. Les feuilles de plusieurs plantes, qui appartiennent à cette dernière famille, sont émollientes & alimentaires. Les plus employées en Europe sont celles des *Betes*, des *Epinauds*, des *Arraches*. D'autres (Chénopodées) servent de nourriture en divers lieux, le *Chenopodium quinoa*, au Chili; les *Basselles* (*Bassella rubra*), dans l'Inde; les *Salsicornes*, les *Anahéris* & les *Soudes* dans toutes les contrées maritimes.

Les *Polygonacées*, si abondantes en médicaments efficaces, fournissent aussi quelques aliments. Les jeunes pousses, les pétioles de la plupart des plantes de cette famille sont comestibles, comme on le voit pour le *Rumex alpinus* dans le Dauphiné, & en Islande; pour le *Rumex acetosa*, le *Rumex rhabarbarum* & *undulatum*, les *Rumex acides* (*oxalis*). Les graines des Polygonacées pourroient servir aussi d'aliment; mais on fait seulement usage de celles des *polygonum fagopyrum* & *tataricum*, qui sont plus grosses.

La famille des Lauriers, comme celles des Lauriers, fournit un grand nombre de plantes, qui sont employées comme assaisonnements, savoir, le Laurier (*Laurus nobilis*), le Camphre (*Laurus camphora*), la Canelle (*Laurus cinnamomum*); le bois canelle (*Laurus ceylanica*); & la Féve Pichitum. L'Arocatier (*Laurus Preslea*) donne un fruit butyreux, à chair jaune, & très-agréable dans la maturité. La Féve Pichitum, que nous avons comprise dans notre énumération; est employée pour aromatiser le chocolat de Portugal; elle exhale une odeur analogue à celle du fenouil. Tous les condiments qui appartiennent à la famille des Lauriers, font partie de la classe des stimulans dissolvés. Ils sont indiqués dans les contrées humides, & ont, en général, aucun des inconvénients que l'on pourroit reprocher aux toniques froids & aliénaux.

La famille suivante, celle des Myrtacées, est également très-remarquable par les plantes aromatiques qu'elle contient, & qui peuvent servir d'assaisonnement. Le mûcadié (*Myrsine aromatica*) appartient à cette famille; la noix aromatique contient une huile comestible très-stimulante. Le brou des fruits, dans les plantes de cette famille, est d'une saveur âcre & caustique,

& peut néanmoins servir d'aliment, après avoir subi une élaboration propre à l'adoucir.

Si nous parcourons la série des autres familles de la classe des Dicotylédonées, & toujours en suivant le même guide, nous devons nous borner à indiquer, relativement à l'objet qui nous occupe, la famille des Euphorbiacées, celle des Euphorbiacées, des Urticacées, des Anacardiées & des Conifères.

Les baies de l'*Hippocasté*, qui font légèrement acides, & que l'on emploie dans quelques pays (1) comme assaisonnement, se rapportent aux Euphorbiacées.

L'*Jatropha manihot*, dans la famille des Euphorbiacées, participe aux propriétés détersives de cette famille; mais sa racine, qui est fortement vénéneuse, fournit, lorsqu'elle a été torréfiée, une farine très-riche en féculé, connue sous le nom de manioc ou de cassave, & généralement employée pour la nourriture des nègres. On mange aussi, en Amérique, le lait de quelques Euphorbiacées (2), après l'avoir dépourvu de l'embryon, auquel est extrêmement attachée la propriété irritante de ces fruits.

Le Ricin, qui appartient à la même famille, donne une huile qui n'est point distillée, & qui pourroit être alimentaire, lorsque cette huile n'est préparée qu'avec le persipérme.

La famille des Urticacées se subdivise en plusieurs groupes, qui contiennent pour la plupart des plantes comestibles. Le premier de ces groupes, celui des figuiers, est remarquable pour nous par le Mûrier, le Figuier, mais surtout par l'arbre à pain, dont les fruits sont éminemment alimentaires. Ces fruits, avant la maturité, sont remplis d'un suc acidescent qui est remplacé par un chair douce & comestible, formée tantôt au dépens du réceptacle des fleurs, ou de leur pédoncule, comme dans la figue, ou bien au dépens des enveloppes des fleurs; qui, devenues succulentes, se soudent entr'elles avec le pédicule; particularité que présentent le fruit de l'arbre à pain & celui du murier.

Le mucilage de la figue est en général un peu visqueux, & d'une solution assez difficile pour les personnes qui digèrent assez mal les fruits en général, & toutes les substances végétales que l'on désigne sous le nom de crudités.

L'arbre à pain, que l'on appelle aussi le *Jagvier*, est la principale richesse des naturels dans plusieurs îles de la mer du Sud. Ses fruits, qui contiennent une pulpe farineuse avant leur maturité, deviennent très-pulpeux, & présentent la faveur du pain frais ou de l'arrichaut. Pour les rendre plus alimentaires, on fait avorter les graines par

(1) En Suède & dans quelques pays de la France.

(2) L'*Onopeltis* & l'*Alnus*.

la culture. Suivant le témoignage de quelques voyageurs, il y a de ces fruits qui pèsent jusqu'à cent livres.

Le Nourier présente peu d'importance par ses fruits, d'ailleurs assez agréables : mais il sert à la nourriture des vers à soie. Originaires de la Chine, il a d'abord été transporté en Perse, puis en Syrie, sous l'empereur Justinien plus tard, dans l'Archipel, en Italie (1) & en Provence (2). On peut manger les mûres; mais on en fait surtout des vins, du vinaigre, ou même une espèce de vin.

Une deuxième division de la famille des Urticées, la famille des *Pérsea* de MM. de Humboldt & Bonpland, est remarquable par plusieurs affaiblissements très-faibles; le Poivre noir (*Piper nigrum*), le Poivre long (*Piper longum*), le Cubébe (*Piper cubeba*), le Poivre anisé, l'*Amelanchier* des Espagnols d'Amérique, le Pêcher bétel, &c., dont les baies produisent un excitement très-considérable sur les voies digestives.

Parmi les plantes du troisième groupe de la même famille (les *Oxalées* proprement dites), nous indiquerons seulement le Houblon, le *Daucus* & la Chénopée. Ces deux premières plantes conviennent par leur saveur, pour aromatiser la bière; quant au chénopée, on en tire un extrait narcotique qui fait la base d'une préparation émétrique, connue sous le nom de *Haefisch* par les Orientaux.

Les *Amentacées* portent toutes, en presque toutes, des fruits comestibles; quelques espèces font toutefois peu remarquables sous ce rapport (le Chêne nourricier des Anciens, le Chêne baliste (*Quercus bellota*), le Condrier, le Châtaignier); le fruit de ce dernier, qui contient une grande quantité de sucre & de sucre cristallisable, doit être distingué, par sa propriété alimentaire, des autres fruits de la même famille. Il sert presque seul à la nourriture des hommes dans plusieurs contrées, mais principalement dans les Apennins & dans quelques provinces de France. Un semblable aliment le digère mal par les estomacs faibles. Il est à la vérité très-nutritif, mais peu excitant, & ce n'est pas sans raison qu'on lui attribue une influence sur l'état intellectuel des hommes qui en font exclusivement leur principale nourriture, & dont l'intelligence a par conséquent moins active & beaucoup moins étendue.

Les baies du *Sinapier*, qui peuvent servir comme assaisonnements, nous intéressent seules à la famille des *Conifères*, auxquels nous devons d'ailleurs les différentes espèces de térébinthines. Les baies & les feuilles des *Cypripis*, des *Thuyas*, des *Sapins* & des *Pin*, qui appartiennent à la

même famille, sont employées quelquefois pour rendre la bière plus stimulante, plus capable d'exercer le mode d'action qui soit véritablement antiscorbutique.

Des ANIMAUX. L'espèce humaine, par le mode d'organisation qui constitue sa nature, est ainsi disposée à se nourrir exclusivement de substances animales que de substances végétales; peut-être même une nourriture uniquement animale aurait beaucoup plus d'inconvénients qu'une nourriture végétale, par une influence très-matée sur le caractère de la santé, la nature des maladies & les habitudes morales; du reste, aucune expérience suivie ne peut appuyer notre opinion à ce sujet, parce qu'aucun peuple, aucune nation connue, ne parait être, ou ne parait avoir été uniquement Sarcophage, tandis que plusieurs peuples de l'Asie & plusieurs associations particulières d'hommes, chez les nations civilisées, nous ont permis de reconnaître les effets & l'influence qui peuvent résulter d'une diète purement végétale.

Quoi qu'il en soit, la nécessité d'augmenter, d'étendre le fonds de subsistance propre à l'espèce humaine (1), n'exige pas moins l'emploi des nourritures animales, que les motifs tirés de la nature même de l'homme, qui réclame un mode d'alimentation partie du végétal-animal.

Ces substances animales, qu'il nous importe maintenant d'examiner, sont plus rapprochées par leur composition chimique, de la nature de l'homme & du caractère propre à ses différents organes. Elles varient, dans leurs propriétés alimentaires & leur aptitude à la digestion & à l'assimilation, suivant les différentes espèces d'animaux, suivant la différence des parties de l'animal, & de quelques produits qu'il est possible d'en retirer, tels que le lait, les œufs, &c.

Ces divers objets seront successivement examinés sous les deux titres suivants : 1°. nous d'abord général sur les différents produits & les diverses parties des animaux qui sont employés comme aliments; 2°. indication des principales espèces qui servent à la nourriture de l'homme dans les différentes classes du règne animal.

DES DIFFÉRENTS PRODUITS ET DES DIFFÉRENTES PARTIES DES ANIMAUX QUI SONT EMPLOYÉS COMME ALIMENTS. Les diverses productions animales.

(1) Ce motif n'a pas échappé aux philosophes, qui ont jeté un coup d'œil rapide sur le point d'antropologie qui nous occupe en ce moment. Ils ont remarqué, avec raison, que plusieurs contrées contrairement à d'autres, produisent des aliments pour l'homme, tandis que d'autres contrées produisent avec plus d'abondance de l'instrument dans tous les lieux de la terre; ils ont également remarqué avec beaucoup de raison, combien certains espèces qui se reproduisent avec autant d'abondance que de facilité, pourroient augmenter tous-à-coup les moyens de subsistance de l'homme.

(2) En 1776.

(3) En 1776.

les, ou les différentes parties qui, dans un animal quelconque, peuvent être employées comme aliments, sont le lait, les œufs, le miel, les muscles ou les parties fibreuses, le sang lui-même, & les parties gélatineuses ou celluluses qui sont la base du très grand nombre des visces.

Le Sang est à la fois employé comme boisson & comme aliment, par plusieurs nomades qui vivent de chasse, & qui n'ont aucune espèce de répugnance à se nourrir d'une pareille substance, sans l'avoir soumise à aucune préparation. Chez les nations civilisées, le sang des animaux, mais principalement le sang du porc, sert aussi comme nourriture, tantôt sous la forme de boudin, tantôt à l'état liquide; & après qu'on l'a fait préalablement cuire avec une certaine quantité de graisse.

Le sang, contenant presque tous les principes immédiats des animaux, que l'analyse a fait découvrir dans les différentes espèces de chairs, sans en excepter la bête, doit être nécessairement regardé comme une substance très-nutritive. Cette assertion, nous en convenons, ne peut offrir aucun doute, mais il importe en même temps de remarquer que la digestion du sang est toujours accompagnée d'un sentiment de chaleur, & que ce fluide, qui se trouve combiné avec des matières grasses dans les préparations alimentaires dont il fait la base, ne peut convenir aux personnes chez lesquelles les fonctions du foie ont peu d'activité, & qui, par cela même, sont exposées à la constipation, à des digestions lentes, difficiles, accompagnées assez souvent de pyrosis, d'oppression, d'irritation abdominale indécise, de cauchemar ou d'insomnie.

Le Lait; que nous ne devons pas examiner ici, relativement à la composition chimique, a formé une autre partie principale de la nourriture de l'homme dans l'origine des choses, c'est-à-dire, chez les peuples nomades, & à cette époque de la civilisation, à laquelle on rapporte la vie pastorale (1).

On a désigné sous le nom de *galactophages*, les hommes que l'on supposoit nourrir exclusivement avec du lait; régime qui n'a presque jamais existé d'une manière tout-à-fait exclusive, & qui imprimeroit nécessairement une physionomie particulière aux peuples qu'une circonstance impérieuse forceroit à n'employer que cet aliment, sans le mêler à aucune autre substance comestible. Le lait de vache n'a pas seul été employé

comme aliment; on s'est également servi des laits de chèvre, de jument & de chameau. Toutefois le lait de chèvre & de lait de vache, qui sont beaucoup plus riches que tous les autres laits, en matière calcaireuse, sont aussi beaucoup plus alimentaires.

Chez les nations civilisées, les laits qui sont les plus employés, sont le lait d'âne, de chèvre, de vache & même de jument, dont l'usage est assez répandu dans le nord de l'Europe. Le lait se donne indifféremment comme toute espèce de nourriture, seul ou combiné avec d'autres aliments, aux personnes dont les facultés digestives sont assez développées pour ne chercher à préférer aucune espèce de nourritures, mais il est contre-indiqué dans tous les cas où la sensibilité de l'estomac & celle des voies biliaires ont besoin d'être vivement excitées par les aliments, pour favoriser le travail de la digestion, ainsi qu'on le remarque chez les personnes habituellement constipées, & dont le foie ne remplit pas convenablement ses fonctions.

Du reste, tout symptôme d'embarras gastrique, ou de disposition bilieuse, toute augmentation pénible de la constipation, ou toute apparition subite de diarrhée ou même d'une simple augmentation dans les déjections, annonce que la diète lactée, qui avoit été commencée, ne doit pas être continuée. Il faut également désagréer le lait aux personnes qui ne peuvent en faire usage, sans avoir bientôt la bouche amère, la langue chargée, l'appétit suspendu ou dépravé. Toutes choses égales d'ailleurs, les personnes d'une complexion sèche, irritable, nerveuse, & qui digèrent bien quoiqu'elles soient très-maigres, & qui présentent souvent des symptômes d'irritation générale, caractérisés par la toux, par l'insomnie, par une aptitude marquée à l'hémoptysie, pourroient pendant quelque temps user uniquement du lait, ou du moins en faire la base principale de leur nourriture. Le même aliment se trouve indiqué, pendant la convalescence des maladies inflammatoires, pendant le cours de ces mêmes maladies, quand elles ont un caractère chronique; il peut également servir à combattre plusieurs symptômes très-incommodes de mélancolie ou d'hypochondrie, qui ne peuvent être rationnellement rapportés qu'à une ou plusieurs névralgies internes, & l'auteur de cet article a dans ce moment sous les yeux, l'exemple le plus remarquable de l'heureux effet du régime lacté, dans une pareille circonstance.

Hippocrate, qui n'a considéré le lait dans les Aphorismes, que sous le rapport de la thérapeutique, fixe ainsi qu'il suit les principales indications & les principales contre-indications.

Lac dare capite dolentibus, malum. Malum verò etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt, murruntibus, & fistulosis. Malum autem & quibus dejectiones biliosae, & ut qui in acutis

(1) Les Syriens, sous le nom de *galactophages*, étoient désignés par Hippocrate sous un nom particulier. Plusieurs nations, mais surtout les habitants des montagnes, sont encore aujourd'hui nourris comme au temps de l'âge d'or, soit avec le lait, soit avec ses différentes préparations. Mais il est digne de remarquer que la plupart de ces peuples n'emploient presque jamais le lait comme nourriture, que lorsqu'il a éprouvé au commencement d'altération.

acutis sunt febribus : & quibus copiosi sanguinis succi est egestio. Convenit verò tabidis non admodum valde fabricantibus lac (dare) & in febribus longis & languidis, nullo ex suprà dictis signis presente ; & propter rationem quidem extenuatis. (Aph. 64, sect. 5.)

L'usage du lait, dans toutes les circonstances où l'on desire le faire contribuer au rétablissement de la santé, présente souvent, lors même qu'il parait le mieux convenir, de grandes difficultés. Un espèce de très-détailée, très-minutieuse, pontra lemie être consultée dans une pareille occurrence, soit pour le choix du lait (1), soit pour la dose, son mélange avec d'autres substances, soit pour les précautions qui peuvent favoriser la digestion de cet aliment (2).

On pourra d'ailleurs, dans plusieurs cas, ajouter beaucoup aux propriétés du lait, par le choix des substances avec lesquelles on nourrira l'animal qui le fournit : expériences que l'ingénieux auteur de l'*Hygiène naturelle de l'homme malade*, a souvent répétées avec beaucoup de succès. Le lait donné comme principale nourriture aux enfans, a le plus souvent l'inconvénient d'en être pas digéré, surtout dans les grandes villes : dans ce cas, les excréments se présentent sous la forme de pelotons blanchâtres jusqu'au centre, & que la bile n'a point pénétrés. Il survient ensuite du dévoiement, & l'enfant peut bientôt si on ne lui donne pas une nourriture, ou de moins ou de nourriture plus appropriée à la faiblesse de ses organes digestifs.

Le lait trop fort d'une nourrice, pourroit produire les mêmes effets ; le lait caillé & donné seul, ou mêlé avec d'autres substances, sous différentes formes, se digère beaucoup mieux par les enfans très-jeunes, & l'expérience a suffisamment prouvé à ce sujet, combien les déclamations des esprits forts contre la bouillie, sont vaines & peu motivées. On n'emploie pas seulement le lait dans son ensemble, on fait aussi usage de ses différentes parties, tels que le beurre, la partie caillée & le petit-lait.

Le *beurre*, dont nous avons déjà parlé, présente, relativement aux alimens, tous les inconvénients & tous les avantages des autres corps gras qui peuvent être employés dans les préparations alimentaires. Le *petit-lait* est plutôt une boisson qu'un aliment. Le *fromage* d'Italie, qui forme leur boisson habituelle, n'est autre chose que du petit-lait aigre. Un semblable usage se rencontre chez plusieurs autres peuples. Le *caillé* ou la partie caillée, est acide & sans mélange de crème, lorsqu'on l'a obtenu par une séparation spontanée, & sans le concours d'une sub-

stance coagulante. Certains fromages blancs sont formés avec ce caillé. Leur légère acidité & leur faveur salée, les rendent très-digestibles. Les caillés qui contiennent une certaine portion de partie butyreuse, sont très-doux, très-nutritifs, très-agréables au goût, mais ils se digèrent quelquefois avec difficulté.

Certains fromages très-stimulans, très-composés, ne peuvent être guère regardés que comme des espèces de condimens. D'autres, qui ont moins d'acalescence, qui sont plus coagulés, servent très-bien à l'alimentation, soit qu'on les mange seuls, soit qu'on les combine avec différentes pâtes, pour en former du macaroni.

Quelques préparations du lait, que nous n'avons pas indiquées, sont encore en usage chez les différens peuples : tel est le *koumiss* des Tartares, boisson fermentée que l'on obtient du lait du jument ; telle est aussi la boisson acide des îles de Shetland, appelée *blanc* ou *blethock*, & la crème acide que l'on prépare dans un baïneau de l'Écosse, qui lui a donné son nom : *crème du Cornouailles*.

Une chose digne de remarque, relativement à l'usage du lait, c'est la disposition des peuples nomades & des hommes peu civilisés en général, qui les porte à préférer le lait aigre à celui qui n'a encore éprouvé aucune altération spontanée.

Certains, qui font beaucoup plus nutritifs que le lait & ces différentes préparations, doivent cette propriété à la quantité très-considérable d'albumine qu'ils contiennent, soit dans le blanc, qui s'en trouve uniquement composé, soit dans le jaune, où cette même albumine se trouve combinée avec une huile particulière, l'*huile d'œuf*, & une petite quantité de sucre. L'*œuf frais* est facile à digérer, surtout lorsqu'il est mêlé à aucune autre substance, & que l'on se borne à le faire cuire d'une manière convenable, & sans en coaguler entièrement l'albumine par la chaleur.

Les œufs durs, surtout lorsqu'ils ne sont pas frais, deviennent très-indigestes. Quelques personnes peuvent manger impunément, sans les soumettre à aucune espèce de cuisson, des œufs récemment pondus, & encore pénétrés de la chaleur de la poule ; mais en général, l'albumine, l'état visqueux de l'albumine du blanc d'œuf, & la non-division des membranes qui le contiennent, ce qui est le premier effet de la cuisson ; le rendent assez difficile à digérer : souvent on le sépare du jaune, pour former avec ce dernier une préparation alimentaire plus légère & plus subtile (1).

Le jaune d'œuf joint d'ailleurs d'une propriété particulière qui n'avait point échappé à l'observa-

(1) Certaines personnes que le lait d'œufs ou le lait de vache incommodent, digèrent très-bien le lait de chèvre ou le lait de jument, & vice versa.

(2) L'eau de chaux, le sucre candi, la magnésie pure sont d'un bon usage.

(1) Les œufs à l'eau, les œufs au bouillon, les œufs au camail, les œufs que les laitiens désignent sous le nom de *soléjos* l'émission d'un ou de plusieurs de lait de poule, &c.

vation d'Hippocrate, la propriété d'augmenter de volume dans l'estomac, & d'être très-nourrissant. Les œufs déjà avancés sont une espèce de poison dont il seroit facile de prouver les mauvais effets par de nombreux exemples.

Les œufs de poissons, qui sont aussi employés comme aliment, sont presque tous jaunes. Ceux qui, par la cuisson, ne se coagulent pas tout-à-fait, & paroissent demi-transparens, sent très-suspect, & pourroient occasionner des accidens si l'en en faisoit usage.

La plupart des préparations très-composées, & dans lesquelles les œufs se trouvent combinés avec des corps gras, se digèrent assez difficilement. Quelques personnes ne peuvent, d'ailleurs, digérer les œufs ni aucune espèce d'aliment dans lesquels la plus légère portion d'œuf se rencontre : ce qui ne peut être attribué qu'à ces anomalies ; à ces irrégularités d'organisation, que les médecins désignent sous le nom d'idiosyncrasie.

MIEL. Le miel, quelque nutritif par sa nature, n'est jamais employé seul comme aliment. Les chimistes reconnoissent deux espèces de miel, le miel de première qualité, & le miel de deuxième qualité. Le miel de première qualité contient, avec une certaine quantité d'eau, du sucre incristallisable, du sucre cristallisable, & un principe aromatique très-remarquable : tel est le miel de Mahon, de Cuba, & le miel du Mont-Hymette, &c.

Le miel de seconde qualité est blanc, grenu, & les principes immédiats que nous venons d'indiquer s'y trouvent combinés avec de la cire & un acide : le miel de Narbonne & le miel du Gâtinais appartiennent à cette espèce. On attribue une qualité inférieure au miel de Bretagne & à tous les miels contenant encore le sucquin qui leur donne la propriété de fermenter avec quantité suffisante d'eau, à 15 ou 18 degrés au thermomètre centigrade ; fermentation d'où résulte l'hydromel. Le miel étoit beaucoup plus employé chez les Anciens que chez les Modernes, qui le remplacent par le sucre dans presque tous les usages de la vie.

Quelques philosophes attachèrent sans doute trop d'importance à son usage, comme paroit le prouver du moins, le dit-mémorable de Démocrite, qui, dans du âge très-avancé, lorsqu'on lui demanda comment il avoit pu vivre si long-temps, répondit : *par l'usage de l'huile à l'extérieur, & du miel à l'intérieur.*

Les différentes parties qui servent séparément de nourriture dans les animaux ne sont pas, en général, aussi distinctes que dans les plantes. Parmi ces parties nous trouvons d'abord les muscles formant la partie la plus éminemment alimentaire dans les animaux, par la grande proportion de fibrine & d'osmazome qu'ils contiennent, surtout dans les animaux déjà un peu âgés ; & toutes choses égales d'ailleurs, dans les animaux qui vivent

dans l'état sauvage, & qui sont beaucoup d'exercice, soit pour le procurer leur subsistance, soit pour éviter les poursuites & les embûches de l'homme. Du reste, cette nourriture trop animalisée, doit être combinée avec d'autres substances alimentaires ; & le peuple chez lequel elle formeroit le fonds principal de la subsistance, devroit sans doute aux particularités d'un semblable régime, plusieurs altérations morbides assez graves, ou même une véritable dégénérescence.

LES SUBSTANCES CELLULOSES, ou GELATINEUSES se trouvent en assez grande abondance dans ce que l'on appelle les *basses viandes*. La gélatine peut être rassemblée en outre, dans une assez grande proportion, & de la substance même des os, des tendons, des cartilages, des tégumens, & de toutes les parties blanches, molles ou solides.

Les chairs considérées relativement à la proportion de fibrine & de gélatine, plus ou moins élaborées qu'elles contiennent, ont été partagées en chairs colorées & en chairs blanches, que l'on a ensuite sous-divisées, suivant qu'elles étoient plus ou moins fibreuses, gélatineuses & visqueuses.

Les chairs les plus colorées, que l'on appelle aussi *viandes noires*, sont principalement celles du Chevreuil, surtout celle du Lièvre qui n'a pas été tué au gîte, de plusieurs oiseaux qui volent à une très-grande hauteur, des Macreules, des Pingens, des vieilles Perdrix, &c.

La chair du Mouton, du Bœuf, tient le milieu entre ces viandes noires & les *viandes blanches*, qui présentent d'ailleurs, comme les viandes noires, plusieurs nuances & plusieurs degrés dans leurs propriétés alimentaires.

GRAISSE. La graisse, plus compaite en général que le beurre, s'emploie comme cette dernière substance, moins comme une nourriture particulière que comme la partie constituante des différentes préparations alimentaires : la graisse & le beurre diffèrent d'ailleurs très-peu l'un de l'autre par leur composition chimique (1).

La graisse de mouton & de bœuf est rarement tirée des substances qui la contiennent, & contribue souvent à les rendre plus tendres, plus faciles lorsqu'elle en pénètre les fibres, & paroit les amollir. La graisse de porc, séparée des différentes substances où elle se trouve, peut être employée comme l'huile ou comme le beurre fondu dans la préparation de plusieurs aliments composés : son altération par une chaleur trop forte, & dans les préparations connues sous le nom de *frictions*, y développe, comme dans le beurre & dans l'huile, une matière empyreumatique qui rend les mets dont elle fait alors partie, très-indi-

(1) Le Stéarine & l'Élaïne.

gesses, très-irritans, & très-propres surtout à occasionner le *fer chaud* ou *pyrosis*.

La graisse seule, ou pure, est incolore on jaunâtre, inodore, insipide, quelquefois nauséabonde, plus légère que l'eau, & ne donnant aucun signe d'acidité. D'après les expériences de Spallanzani & de Storch, elle est rangée parmi les substances qui se digèrent avec le plus de difficulté & de lenteur.

La consistance du beurre est en général beaucoup moins forte que celle de la graisse : la saveur & l'odeur qui lui sont propres quand il est frais, & qu'il doit à un acide particulier, son mélange avec une quantité plus ou moins considérable de sel, le rend beaucoup plus facile à digérer que la graisse ou les huiles les plus estimées.

Le beurre qu'on laisse refroidir, après l'avoir fait fondre, se présente sous la forme d'une masse homogène qui peut être conservée pendant longtemps à l'abri du contact de l'air, & servir dans cet état à la préparation des alimens. Lorsque le beurre n'a pas été ainsi fondu, il contient encore une certaine portion de matière caéuse & de sérum qui le rendent susceptible de s'altérer facilement, surtout dans l'été. Cette altération du beurre & des graisses continue ce que l'on appelle leur *rancidité*, que l'on attribue au développement d'un acide particulier, & qui altère d'ailleurs sensiblement leurs propriétés alimentaires. L'opinion que le beurre ne se trouvoit pas tout formé dans le lait, & qu'il se produisoit pendant son *battage*, n'est plus admissible depuis que l'on s'est assuré, par des expériences décisives, que la séparation du Beurre s'effectuait très-bien sans le concours de l'air atmosphérique.

Les Nins d'hirondelle ou d'*Akyons*, que nous devons comprendre parmi les différentes parties ou les diverses productions des animaux qui jouissent d'une propriété alimentaire, paroissent d'une nature gélatineuse & très-analogue à la colle de poisson ou *ichthyocolle*.

On est porté à croire que cette espèce de gélatine, si délicate & si recherchée dans quelques parties de l'Asie, est élaborée dans l'estomac même d'une très-petite espèce d'hirondelle, qui s'en dégage par le vomissement pour en couvrir avec ses pattes tous les points de son nid, qu'elle met toujours avec le plus grand soin à l'abri de la pluie. On fait la récolte de ces nids trois fois par année; chaque nid coûte jusqu'à dix piastres par livre. Leur consommation aux Moluques, dans la Chine & dans l'Inde, est prodigieuse, puisqu'on exporte de Batavia seulement au-delà de quatre millions de cette substance par année (1).

Plusieurs autres produits & plusieurs autres parties des animaux sont employés ou pourroient être employés avec plus ou moins d'avantages pour servir à l'alimentation. Les os, les cartilages, les légumens, tout peut être mis à profit & contribuer à donner plus d'étendue au fonds de subsistance chez les différents peuples. Nous aurons incessamment l'occasion d'indiquer tout le parti que l'on a tiré des os sous ce rapport & d'après l'ingénieur procédant de M. Darcel, pour en extraire la gélatine : les intestins eux-mêmes, que l'on croiroit d'abord réservés exclusivement pour tout ce qui concerne la *boyauderie*, sont mis en usage dans plusieurs parties de l'Espagne ou de l'Italie, pour la conservation plus durable des viandes salées : ce qui forme une branche de commerce entre le Midi & plusieurs grandes villes, telles que Londres, & surtout Paris, dont les fabriques approvisionnent les foires & les marchés de l'Étranger.

Des Mammifères. Tous les genres, toutes les espèces d'animaux, dans tous les ordres & dans toutes les classes, pourroient servir au besoin, de nourriture à l'homme. Un petit nombre d'espèces, presque toutes herbivores ou frugivores, sont plus ordinairement employées à cet usage. Nous allons les indiquer rapidement en suivant, comme pour les nourritures végétales, l'ordre, la série des familles naturelles, sans oublier dans cette rapide énumération, les espèces que l'homme a mises à contribution, par caprice ou par l'effet d'un besoin pressant, dans certaines circonstances difficiles & malheureuses.

L'homme lui-même devroit peut-être se trouver compris dans ce dénombrement des substances animales qui ont servi ou qui servent encore comme alimens, puisqu'il a existé de tout temps, ou qu'il existe encore, des peuplades anthropophages, & puisque dans les grandes disettes, cette anthropophagie s'est presque toujours manifestée, comme on le voit, d'une manière si terrible dans la famine décrite par un auteur arabe du treizième siècle.

Tout en faisant cette remarque, nous ne plaçons ni l'espèce humaine, ni aucune espèce de la grande famille des quadrumanes parmi les créatures vivantes que l'homme a immolées pour s'en nourrir. Il n'en est pas ainsi de plusieurs familles comprises dans le groupe très-étendu des Carnassiers; une de ces familles nous offre les Ours & les Blaireaux, dont la chair n'est pas toujours négligée.

Les chauxes, comme on le sait, se sont souvent nourris de scelle de l'Ours; & Odier paroît avoir élevé judicieusement des doutes sur les accidens qui furent attribués à cet immonde, dans une circonstance particulière pour laquelle il fut consulté (1).

(1) Voyez dans les *Principes d'hygiène* de John Sinclair, traduction de Louis Odier de Genève, la note extraite d'un *Mémoire* manuscrit de Senecier, vol. in-8°, page 324.

(1) Voyez *Principes d'hygiène*, extraits de sir John Sinclair, par Louis Odier, page 312.

Les Anciens élimoient & employoient souvent la chair de l'oursin, dont ils compoient la saueur, à celle du Sanglier, & qu'ils faisoient entrer avec distinction dans leurs seffins. On mange assez souvent le Blaireau en Allemagne, & l'on fait, d'ailleurs, que la Loure macérée dans le vin rouge, a paru souvent sur les tables, surtout dans le carême.

Parmi les Carnivores proprement dits, la chair n'est mangée qu'accidentellement; mais le Chien, qui se trouve dans quelques lieux le compaignon, l'ami de l'homme, & dans quelques autres une bête de somme, un animal de trait, n'est considéré chez plusieurs peuplades que sous le rapport des avantages que l'on peut en retirer pour ajouter à un fonds de subsistance insuffisant & précieus (1).

Les Amphibies, que l'on rapporte encore au groupe des Carnassiers, sont moins recherchés pour leur chair que pour l'huile que l'on en retire.

Dans la famille des *Mammifères*, les *phacochères*, qui ont la taille d'un Blaireau, & qui sont propres à la Nouvelle-Hollande, ont une chair excellente, suivant le récit de plusieurs voyageurs, & servent comme aliment aux peuplades de ces contrées.

En descendant de plus en plus dans cette longue série de familles, dont un de nos savans contemporains (2) a si bien marqué les caractères & la place, les ressources qui se trouvent pour la nourriture de l'homme semblent augmenter. Ces ressources sont déjà très-étendues parmi les *Rongeurs*, auxquels nous devons non-seulement un grand nombre d'espèces qui peuvent accidentellement servir de nourriture, mais aussi plusieurs autres, espèce habituellement employées, tels que les *Cabiais* ou *Cochons d'Inde* (*Hydrochatus*), les *Loirs* (*Myoxus glis*), le *lièvre* (*Lepus timidus*), le *Lapin* (*Lepus cuniculus*), les *Agoutis* (*Chloromys*), dont la chair ressemble beaucoup à celle des lièvres qu'ils représentent aux Antilles. On n'a pas oublié le *rix* que les Anciens attachoient aux loirs, dont ils préparoient la chair avec le miel & la graisse de pavets. (*Apicius*, lib. VIII, cap. 9.)

Le *lièvre* & le *Lapin* font compris dans ce que l'on appelle *gibier*. La chair du premier est noyâtre, très-animale, surtout lorsque l'animal

n'a pas été tué au gîte : elle contient une grande quantité de fibrine, & se fait distinguer par son arôme, que l'on appelle son *fumet*. Le lièvre est d'ailleurs bien plus facile à digérer que le lièvre, surtout lorsque celui-ci a été préparé & mêlé sous forme de pâtés avec des corps gras; ce qui en fait un mets qui ne peut s'adresser qu'aux personnes douées d'un grand appétit & d'un estomac très-robuste.

Les Romains aimoient beaucoup les lièvres, surtout celui des Alpes : ils ne se bernoient pas à les chasser, ils les nourrissoient pour en rendre la chair plus délicate. Il faut vraisemblablement faire remonter jusqu'à ces maîtres du monde ces erreurs & les traditions populaires qui attribuoient tant de vertus singulières à la chair du lièvre, celle de donner de la mémoire, que lui avait accordé l'auteur de la *Médecine de l'esprit*, de faire dormir, de rendre mélancolique, & de donner un grand éclat à la beauté, pendant sept jours.

La chair du lapin est beaucoup moins nourrissante & moins tonique que celle du lièvre, surtout lorsque l'animal a été enlevé à sa situation naturelle pour être nourri dans une basse-cour. Le lapereau tué à la chasse le digère plus facilement peut-être qu'aucune autre viande, & se trouve tout-à-fait indiqué pendant les convalescences un peu difficiles.

La famille des *Pachydermes*, très-rapprochée de celle des *Rongeurs*, ne nous offre moins utile à l'espèce humaine, lors même qu'elle ne lui offrirait que le *Cochon* & le *Sanglier*, qui appartiennent à cette famille.

Il y a très-peu d'animal plus répandu & plus généralement employé pour servir à la nourriture de l'homme que le *Cochon*. On a même pensé, & avec quelque raison, que cette espèce avait été la première, ou une des premières sacrifiées pour assurer ou pour étendre, d'une manière régulière, le fonds de subsistance de l'homme. L'idée d'employer au même usage les animaux qui donnent du lait, ou qui partagent les travaux de l'homme, ayant dû sans doute se présenter beaucoup plus tard & à une époque à laquelle l'espèce qui paroît-foit uniquement destinée, soit pour manger, soit pour être mangée, vint à manquer ou ne suffisoit plus à une population trop nombreuse.

Les Romains conservoient même la tradition de ce passage, & se refusoient, pendant les premiers siècles de la république, à manger les animaux qui servoient à l'agriculture.

En revanche ils n'épargnoient pas le cochon, que Galien appelle un animal créé pour nos festins : *animal propter convivium natum*. A toutes les époques de leur histoire, ils en firent le plus grand usage, soit pour la chair en général, qu'ils regardoient comme nourrissante, & très-propre pour les athlètes, soit pour certaines parties de l'animal,

(1) Plusieurs peuplades sauvages emploient comme aliment; la chair d'une espèce de chien qui paroît avoir digéré chez ces peuplades. Les Anciens mangeoient aussi des chiens, & les foumertoient à la castration pour les engraisser. Suivant Aithénée, il paroît que la chair du renard auroit pas été dégoûtée par les Anciens.

(2) M. le professeur Cuvier dans son *Traité du règne animal*, pour servir de base à l'étude naturelle des animaux, & d'introduction à l'anatomie comparée, ou l'état d'après lequel nos indications ont été rapidement tracées.

qu'ils recherchoient avec toute l'activité d'une gourmandise très-rassinée, surtout la bête, *scintilla* ; les jambons de derrière & de devant, *pernae* & *petasones*; les pieds, les oreilles & plusieurs autres organes, dont ils tâchoient d'augmenter la délicatesse en fomentant le malheureux animal à des tortures, dont l'artifice que nous employons pour obtenir les *foies gras* ou peut même pas donner l'idée.

La chair du cochon très-jeune, cochon de lait, qui est toute gélatineuse, toute visqueuse, ne peut convenir qu'après avoir été bien rôtie, & encore, dans cet état, les personnes dont l'estomac est faible sont-elles exposées à la digérer avec beaucoup de difficulté. La chair du cochon adulte est remarquable par l'abondance & la bonne qualité de la graisse qu'elle contient, & qui s'y trouve heureusement placée entre des fibres très-ferrées qu'elle assouplit par la cuisson, & qui sont alors très-digestibles.

Des motifs qui nous font inconnus ont fait prescrire la chair du cochon comme nourriture chez les Juifs & les Mahométans; des motifs moins incertains ont eu égard souvent à l'austérité, à réclamer l'avis des médecins; sur des points d'hygiène publique ou de médecine légale relatifs à la nourriture humaine par ce même animal, & que nous aurons occasion de rappeler en parlant de la ladrerie & de l'usage d'employer les substances animales pour engraisser les cochons.

Les Saurimons servent bien moins sans doute comme bœufs que comme bêtes de somme ou de trait; cependant la chair du Cheval a été plusieurs fois employée accidentellement comme aliment; & plusieurs nomades en font même habituellement usage. On assure, du reste, que cette chair est filandreuse & fort dure. Un autre sophisme, l'Ane, mais surtout l'Anon, que l'on mange encore en Italie, fut très-estimé des Anciens. C'étoit la nourriture habituelle de Mécène, suivant Plinius. L'Anon sauvage étoit très-recherché, comme on le voit par le témoignage des médecins anciens (1), & même des poètes (2) & des philosophes (3).

La famille des Ruminans contient plusieurs genres dont les différentes espèces fourrissent abondamment à la nourriture de l'homme chez les nations civilisées; savoir: le Bœuf, les Chèvres, les Moutons & quelques grands quadrupèdes que l'on tue à la chasse; le Daim, le Cerf, le Chevreuil, le Chamois & le Rhenne, qui appartiennent à la même famille, doivent aussi être compris parmi les ruminans qui sont parés du fons de subsistance le plus habituel de l'homme.

Le Chamois étoit mangé jeune chez les Anciens, & les gourmands recherchoient, en y attachant un grand prix, les talons *grillés*. Le Rhenne fournit aux peuples voisins du pôle arctique en général, & aux Japonais en particulier, sa chair & son lait, également utiles pour ces peuples. La chair du Chevreuil est beaucoup plus estimée que celle du Cerf, & se trouve rangée parmi les viandes noires les plus toniques & les plus digestibles. La chair du cerf n'est pas sans quelque analogie avec le filet de bœuf lorsqu'elle a été convenablement préparée.

Le Bœuf engraisé dans les riches pâturages de France & d'Angleterre fournit, lorsque sa chair a été attendrie & utilement modifiée par une marche assez pénible, une chair excellente & plus propre à tous les usages, à toutes les préparations alimentaires qu'aucune autre. La chair du Mouton est également très-estimée & paroît, dans plusieurs ras, encore plus facile à digérer que celle du bœuf; l'une & l'autre perdut, du reste, beaucoup de leur digestibilité lorsqu'on les a privées de sue par l'ébullition & qu'elles ont été réduites à os squelette fibreux; aliment qui n'est véritablement alors estimé dans les classes moyennes ou parmi la bourgeoisie de la province, que d'après une de ces erreurs populaires, qu'il importe aux bons esprits de signaler en de combattre, chaque fois qu'ils les rencontrent.

Le bœuf rôti ou grillé est le mets à la fois le plus simple & le plus salubre. Si l'usage des soupes préparées avec la gélatine dont nous avons parlé, pouvoit se répandre & rendre inutile cette quantité prodigieuse de viande que l'on emploie pour faire le bouillon, ce bœuf rôti, dont les tables anglaises les plus modestes sont chargées, servirait également partie, chez les Français, des repas les moins splendides, & serait nécessairement substitué aux viandes bonites dans les hôpitaux des valides ou de convalescens; ce qui ne serait pas moins désirable, ce qui n'indiquerait pas un progrès moins heureux dans l'état social, que la *poêle au pot* si généralement souhaitée par Henri IV. aux plus humble villageois.

Le bœuf salé, mais surtout le bœuf de Hambourg, ne peut avoir aucun des inconvéniens que l'on reproche d'une manière trop générale aux viandes salées, en les regardant comme la seule cause d'un effet très-compensé, & que plusieurs circonstances coexistent à produire (1).

La police, la surveillance des boucheries en général, & ce qui concerne en particulier la manière de saigner les bœufs ou les moutons, & l'insalubrité ou la salubrité de leur chair dans les animaux *surmenés* & pendant les épidémies,

(1) Galien, de Aliment. facultatibus. Orisale.

(2) Martial, lib. 13, cap. 27.

(3) Plin., lib. 8, cap. 43.

(1) L'abstinence végétarienne.

se rattachent sans doute à l'hygiène ; mais on doit renvoyer pour les détails ou pour les développemens qu'ils exigent, à l'hygiène publique & à la médecine légale.

Le Veau, le Chevreau, l'Agneau, fournissent des viandes utilement estimées, lorsque l'animal n'est pas trop jeune & que sa chair n'est ni trop visqueuse, ni trop glutineuse, ce qui la rend tout-à-fait indigeste pour les personnes dont l'estomac est un peu faible.

Les Océanés, que l'on confond avec raison parmi les Mammifères, ne servent guère pour la nourriture de l'homme que dans le cas d'une extrême nécessité, & chez les peuples hyperboréens, dont les moyens d'existence sont très-difficiles ; mais l'huile de ces animaux, comme celle des Phoques ou des Morues, est fort recherchée, & au point d'avoir donné lieu à une branche de commerce & à un genre d'industrie très-étendu chez les nations civilisées (la pêche de la baleine).

Les OISEAUX. Les oiseaux ne contribuent guère moins que les mammifères à la nourriture de l'homme. Leur chair est en général plus tendre, plus digestible, moins riche en fibrine & en osmazome que celle des grands quadrupèdes : c'est principalement à leur chair, au moins dans un grand nombre d'espèces, que l'on rapporte en général les viandes blanches les plus estimées & les plus convenables dans le régime d'un grand nombre de convalescens & de valétudinaires.

Les oiseaux qui se nourrissent de graines ou de fruits, mais surtout les espèces que l'on rencontre dans les basses-cours ou que l'on égraisse artificiellement, sont placés au premier rang dans le service de la table. On attache beaucoup moins de prix aux oiseaux qui se nourrissent de poissons, d'insectes, de substances animales quelconques, & plus particulièrement aux espèces véritablement carnivores, comme toutes celles qui appartiennent aux oiseaux de proie, diurnes ou nocturnes (*Accipitres*).

Dans la division très-étendue des PASSEREAUX, qui comprend plusieurs familles, dont le genre de vie est assez différent ; on préfère, pour s'en nourrir, les espèces qui vivent de grains ou de fruits, & sans doute on n'aurait recours qu'à la dernière extrémité aux espèces qui vivent d'insectes ou de substances animales quelconques, tels que les Pier-grèches (*Lanius*) & les Calaos (*Buceros*), grands oiseaux d'Afrique & des Indes, qui mangent des souris, les petits oiseaux, les reptiles, & qui ne dédaignent pas même les cadavres ; les Merles (*Turdus*), mais surtout les différentes espèces de grives que l'on rapporte à ce genre (1). Les Becs-fins (*Motacilla*), l'Ortolan (*Emberiza hortulana*), qui appartiennent à

l'ordre des passeriaux, doivent sûrement être compris parmi les oiseaux qui sont le plus employés comme aliment. Il faut citer aussi le Coq de roche, le Moineau proprement dit, les Etourneaux, les hirondelles, dont une espèce particulière confroît les nids esculeux dont nous avons parlé.

Les petits oiseaux de l'ordre des passeriaux, & le moineau lui-même, ainsi que les blanvettiers, ont en général la chair un peu noire & sensiblement chargée de graisse ; en automne, dans quelques espèces, tel que les Ortolans & les Bec-fins ; ce qui rend la chair de ces oiseaux fort agréable pour les gourmands, mais ce qui fait en même temps qu'elle ne peut convenir aux estomacs qui sont à la fois faibles & irritables : cette graisse, très-élaboree, ayant une aptitude extrême à rancir, si le travail de la digestion ne s'effectue pas avec un degré suffisant d'énergie.

Les Anciens attachèrent un grand prix à plusieurs de ces oiseaux ; par exemple, ils nourrissaient la litorne dans leurs basses-cours avec du millet, de la farine & des fèves. Les bec-fins étoient encore plus recherchés que les litornes, & Aulus-Gellius nous apprend que c'étoit le seul oiseau qui se mangeât tout entier. Il faut sans doute ranger parmi les erreurs populaires les opinions d'après lesquelles on supposait une propriété vénéneuse aux litornes sauvages qui avoient mangé des grains de jusquiame, & la propriété encore plus douteuse d'empêcher la colique, attribuée à la chair des alouettes. Il parait que quelques gourmands voulaient essayer chez les Anciens de manger la chair de perroquet, qui ne fut introduit du reste en Europe qu'au temps d'Alexandre.

La chair des autres oiseaux de l'ordre des GRANCHES est en général très-dure, très-corneuse, très-pén estimée ; le bœuf en fait employer cependant dans plusieurs parties de l'Europe & de l'Amérique, comme on le voit pour le Pio vert (*Picus viridis*) ; le Choucas des Alpes, le Geai d'Europe (*Corvus glandarius*), le Corbeau (*C. corax*), la Corneille (*C. corone*), le Pio d'Europe (*C. pica*).

L'ordre suivant, l'ordre des GALLINACÉS, fournit la plupart des oiseaux de basse-cour & d'excellens gibiers. Nous devons citer plus particulièrement les genres suivans :

1°. Les PAONS (*Pavo*), introduits en Europe par Alexandre, qui se mangent chez les Anciens, tout en les accusant d'être d'une difficile digestion.

2°. Les DINDONS (*Meleagris*), apportés d'Amérique vers le milieu du seizième siècle, & répandus aujourd'hui dans toute l'Europe.

3°. Les ALECTORS, qui sont les plus grands gallinacés d'Amérique.

4°. Les FAISANS (*Phasianus*), parmi lesquels il faut distinguer les Coqs (*Gallus*), les faisans proprement dits (*Ph. colchicus*), &c.

(1) La Drenne (*Turdus viscivorus*) ; la Litorne (*T. pilaris*), la Grive proprement dite (*T. muscivora*).

50. Les PEINTADES (*Numida meleagris*).

60. Les TETRAES (*Tetrao*), & dans cette famille les Coqs de bruyère, les Gelinottes, &c.; les Poules des marais, les Perdrix, les Cailles, &c.

70. Les TINAMOUS (*Tinamus*), genre propre à l'Amérique, & dont la chair est très-bonne à manger.

80. Les PICTORS (*Columbae*).

Parmi les espèces qui se rapportent à ces différents genres, plusieurs ne sont pas moins intéressantes par les usages excellents qu'elles fournissent, que par les différentes espèces de chairs que l'on peut en obtenir. Quant à ces dernières, elles sont en général fort estimées, & se trouvent, suivant l'âge ou l'espèce de l'animal, dans les viandes blanches ou dans les viandes colorées, en offrant d'ailleurs toutes les nuances qui peuvent se trouver entre ces divisions. Tous les jeunes oiseaux de l'ordre des Gallinacés n'ont point en général une chair aussi vigoureuse ni aussi indigeste que celle des jeunes quadrupèdes domestiques. Cette chair est tendre sans être molle; blanche, gélatineuse, sans viscosité, comme on le voit dans le Poulet, le Dindonneau, le Perdreau, les Faisans très-jeunes.

Les volailles plus âgées, le Chapon, par exemple, les Poules qui n'ont pas été engraisées artificiellement, fournissent encore des viandes blanches, mais beaucoup plus fibreuses, beaucoup plus toniques, & qui sont très-digestibles, très-nutritives, quand on les a fait cuire à l'étuvée. Les mêmes oiseaux de basse-cour, engraisés artificiellement, donnent une chair très-luculente à la vérité, mais qui ne convient pas toujours aux convalescens & aux valétudinaires. La chair du Faisan adulte, du Pigeon, de la Perdrix & de plusieurs autres Gallinacés, appartiennent évidemment aux viandes fibreuses & colorées: ce qui les fait préférer, surtout celle du pigeon, dans la convalescence des maladies pendant lesquelles les organes de la digestion ont été sensiblement affaiblis.

Les Anciens paroissent avoir connu & estimé le plus grand nombre des Gallinacés que nous venons d'indiquer. Ils engraisoient artificiellement, comme nous le faisons, les différentes variétés du Coq (*Phasianus gallus*), & deux citoyens romains attachèrent leurs noms à la découverte d'une *fiscalie* de crêtes de coq & d'une *preparation* de poularde dans le vin de Suverne. Le faisan, dont la connoissance remontoit jusqu'à l'expédition des Argonautes, ne fut très-répandue chez les Romains que sous l'empire d'Héliogabale, qui en nourrissoit les lions & les léopards.

La Peintade (*Numida meleagris*) étoit fort estimée, ainsi que la Gelinotte (*Tetrao bonasia*), que l'on tiroit d'Egypte & de Lydie; la Perdrix rouge ou batavalle (*Tetrao rufus*), la Caille (*T. columba*), &c., n'étoient pas moins re-

cherchées. On accoutoit cette dernière, que l'on immoloit à Hercule, d'occasionner l'épilepsie, en supposant qu'elle avoit acquis une propriété vénéneuse, par l'usage de l'Ellebore blanc.

Parmi les oiseaux de rivage ou ÉCRASSÉS, plusieurs genres contribuent aussi à la nourriture de l'homme: l'Autruche (*Struthio camelus*), par exemple, les Outardes, les Pluviers, les Vanneaux, les Grues, les Cicognes, les Bécasses, les Chevaliers, enfin les Poulques. En général, la chair de la plupart des oiseaux de proie de cette grande famille, est fibreuse, couillante, ou même un peu ferme, & se rapproche sensiblement de la chair des grands quadrupèdes adultes. Les Anciens, qui mangioient la chair d'autruche, convenoient qu'elle étoit un peu dure, & que l'on devoit faire seulement usage de l'aile. (Galen, *De Aliment. facult.*) On recherchoit d'ailleurs beaucoup les œufs d'autruche. La chair de l'autruche d'Amérique, qui est moitié plus petite que l'autruche de l'ancien continent, est assez bonne quand l'animal est encore jeune.

La grande Outarde (*Otis tarda*), un des oiseaux d'Europe les plus gros, est un gibier très-estimé. Galien pensoit que la chair de l'outarde étoit intermédiaire à celle de la Grue & de l'Oie. (*De Aliment. facult.*, lib. III, cap. 19.)

Les PLUVIERS (*Charadrius*) fournissent principalement pour le luxe de la table, les pluviers proprement dits, mais principalement le pluvier doré (*Char. plumalis*), le pluvier à collier (*Ch. hiaticula*). Parmi les Vanneaux (*Tringa*), on ne recherche pas moins les œufs que la chair. Une autre famille, très-voisine des vanneaux, les CARANES (*Microdactylus*), qui se compose d'une seule espèce, appartient à l'Amérique méridionale: on a rendu cette espèce domestique dans plusieurs pays, & sa chair est estimée, quoique l'animal se nourrisse d'insectes & même de serpents. Les AGAMIS (*Pfosphip*), que M. Cuvier comprend dans la famille des Grues, appartiennent aussi à l'Amérique méridionale. Ils égalem. le chapon par leur taille. On mange leur chair après les avoir fait servir comme des animaux domestiques.

Les Anciens employoient la chair des Grues comme aliment; ils engraisoient ces oiseaux dans les volières, ainsi que les Cygnes. On estimoit plus particulièrement les grues de l'île de Melo. On mangea aussi les Cicognes (*Ardea cicognia*), usage qui commença à s'établir sous le règne d'Auguste.

Les BÉCASSES (*Scolopax rusticola*), qu'ils connoissoient aussi, & qui figurent avec distinction sur leurs tables (1), ne font pas moins recherchées parmi les Modernes.

(1) La Bécassine (*Scolopax Gallinago*), la petite Bécassine (*S. gallinula*).

Les bécasses fournissent une chair aussi tonique que nutritive. Ces oiseaux ayant un vol très-élevé, on préfère la gâtelle à l'aile, dont le tissu est trop lâche et trop animalité. Ils sont communs dans les marchés en hiver. La petite bécassine de l'Amérique (*Scolopax pilosula*) a beaucoup d'analogie avec notre bécasse.

Le Bécasseau (*Tringa Ochropus*) & la Guignette font les guirres de la famille des CÉPHALOPES qui paraissent le plus souvent sur les tables. Le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) & le Râle de genêt (*Rallus crex*), dans la famille des RÂLES, forment ou gibier qui n'est pas toujours dédaigné. On estime, parmi les Foulques, la Poule d'eau, la Poule sultane, qui étoit très-connue en Sicile, d'où elle passa à Rome.

La remarque générale que nous avons faite sur la chair des oiseaux de rivage, s'applique d'une manière toute particulière à la famille des oiseaux nageurs ou palmipèdes, mais surtout au Canard, à l'Oie, dont la chair égale, par sa consistance & sa saveur, la chair la plus tonique & la plus nutritive des grands quadrupèdes.

Les MANCOTS, qui se rapportent à cette famille, & qui appartiennent à l'Amérique, sont mangeables, quoique leur chair soit très-noire. On regarde aussi comme bonne à manger l'esclave que sous le nom de *Dromedus exulans* (*rasseau de guerre des Anglais*), qui est propre aux mers australes, & qui appartient à la famille des ALBATROSS.

Les PÉLICANS, les CYGNES, dont les Anciens employaient la chair comme aliment, ne servent plus à cet usage. Il n'en est pas ainsi des Oies, des Canards, des Macreuses, dont la chair, quoiqu'un peu consistante, doit être placée au premier rang parmi les nourritures animales.

REPTILES. Parmi les reptiles, un très-petit nombre d'espèces est employé comme aliment. La chair de ces espèces est regardée en général comme une substance gélatineuse & albumineuse dont la digestion est assez difficile. La Tortue (*Tesludo*) est de tous les reptiles celui qu'on a le plus vanté comme aliment, qu'on attribue d'ailleurs diverses propriétés qu'une observation judicieuse n'a pas confirmées. La chair de la tortue, lors d'avoir ces propriétés, est à la fois visqueuse & grasse, ce qui la rend d'une digestion très-difficile. Les bouillons pour lesquels on l'emploie, peuvent d'ailleurs n'avoir aucun inconvénient quand ils sont bien préparés. Les œufs de tortues sont presque aussi estimés que ceux de nos Gallinacés, lorsqu'ils sont convenablement cuits & assaisonnés avec du sel. La chair de la tortue la plus tendre se trouve dans le voisinage des côtes. On fait cuire les œufs de tortue, lorsqu'ils ont été macérés dans une quantité suffisante d'eau avec le poivre, le sel & le suc de citrouille. Quelques peuplades sauvages, mais principalement les peuplades amé-

ricaines qui se trouvent sur les bords de l'Orénoque, se nourrissent presque uniquement de la chair des tortues. Les Lézards, dans l'ordre des SAURIENS, les Couleuvres, les Vipères dans l'ordre des OPHIDIENS, ont fourni des aliments dans plusieurs circonstances, surtout parmi les peuplades sauvages. Les Anciens faisoient également usage de ces différents reptiles & rejetèrent les GÉOMÈRES, que les Modernes mangent quelquefois, & dont certaines opinions populaires font employer le bouillon, en lui attribuant quelques propriétés avec plus de crédulité que de raison.

POISSONS. Les poissons sont beaucoup plus employés comme aliments que les reptiles. Des peuplades entières, privées d'industrie & placées sur le bord de la mer & dans le voisinage des grands lacs & des grands fleuves, le nourrissent même uniquement de poissons; ce qui les a fait appeler *ichthyophages*; suivant Hérodote, quelques-unes de ces peuplades, arrivées à l'état de nomades, auroient même trouvé dans la pêche un moyen de subsistance pour leur troupeau. Quelques peuples de la haute antiquité (1) n'avoient point de poisson comme nourriture, d'après des motifs qui nous sont inconnus, & que Pythagore, qui avoit visité ces nations, introduisit dans sa doctrine. La plupart des Grecs n'adoptèrent pas cette proscription. Les Romains, dans le siècle du luxe & de la toute-puissance, firent grand cas du poisson en général, & surtout de certaines espèces de poisson, dont quelques-unes se payoient plus cher qu'un esclave. Les Anciens n'ont pas connu d'ailleurs les espèces de poissons qui contribuent davantage à la nourriture des peuples modernes, & dont la pêche, dans les mers du Nord, est devenue une branche si considérable d'industrie & de commerce.

Le poisson ne parait pas avoir les propriétés aphrodisiaques qui lui ont été attribuées. On s'est également trompé dans l'usage, en regardant son usage comme la cause de la lèpre ou de certaines maladies cotées, qui sont en effet assez communes dans le voisinage de la mer, mais qu'il faut rapporter à des causes plus directes d'insalubrité (2).

Quinque le poisson forme une des parties principales de la subsistance, non-seulement chez les naturels de plusieurs contrées, mais chez les nations civilisées, la chair est beaucoup moins nourrissante que celle des quadrupèdes ou des oiseaux, & de telle sorte, qu'il faille, pour faire promptement maigrir un jockey anglais destiné à figurer dans les courses de chevaux de *New-Market*, de remplacer pendant quelque temps, dans son régime, le *rouss-beef* par le poisson.

(1) Les Egyptiens, les Syriens.

(2) Ces causes sont l'humidité, l'excessive chaleur, une insalubrité accidentelle, &c. &c.

D'une autre part, la chair du poisson, très-gélatineuse, & presque toujours pénétrée d'une substance huileuse, se digère assez difficilement, & occasionne parfois des éruptions remarquables chez certaines personnes auxquelles ce genre de nourriture ne convient pas; ajoutons que la chair du poisson, dans les pays très-chauds, subit très-promptement une altération spontanée, qui lui donne, dans ce cas, des propriétés vénéneuses, dont la véritable cause a été souvent méconnue: toutes choses égales d'ailleurs, les poissons de mer paroissent plus nourrissans que les poissons d'eau douce.

Les espèces que l'on pêche dans les eaux stagnantes, dans les étiques & les anes de la mer, dans les étangs mal entretenus, ont en général une chair pesante, glutineuse, & qui occasionne aisément des indigestions.

Les poissons des eaux vives, & que l'on désigne en général sous le nom de *poissons saxatiles*, fournissent au contraire une nourriture très-légère & tout-à-fait convenable pour les valétudinaires & les convalescens. Dans tous les cas, les poissons bouillis ou grillés sont d'une digestion beaucoup plus facile que le poisson frit ou préparé d'une manière quelconque dans le beurre ou dans l'huile. Certains assaisonnemens peuvent convenir pour les poissons dont la chair est trop grasse, trop visqueuse, ou même trop compacte, comme celle des Saumons.

Les poissons conservés par le sel ou par la dessiccation n'ont d'autres inconvéniens que ceux qui sont inséparables des viandes salées ou boucées. Presque tous les poissons connus pourroient servir sans doute de nourriture. Nous allons rapidement indiquer les espèces les plus généralement employées à cet usage, en continuant de rapporter les objets de cette énumération, comme ceux de l'énumération précédente, aux divisions des familles naturelles adoptées par M. Cuvier dans son *Histoire du règne animal*.

La première série des poissons, les Poissons CARTILAGINEUX, beaucoup moins étendue que celle des poissons osseux, ne fournit régulièrement pour la subsistance de l'homme que les genres suivants; l'avoir :

1°. Les LAMPROIES (*Petromyzon*), (dans les lacs).

2°. Quelques SOUALES (*Squalus*), mais surtout le *Marteau* (*Sq. sygna*).

3°. Les RAIES (*Raja*).

4°. Les ESTURGEONS (*Acipenser*), dans les Strégoniens.

La Lamproie d'eau douce est assez estimée. Elle étoit d'un grand prix chez les Romains, qui paroissent l'avoir connue sous le nom de *mustela*; mais en général la chair des lamproies est trop grasse, trop glutineuse pour se digérer avec facilité.

La chair de la raie, convenablement assaisonnée,

MÉMOIRES. Tome X.

est bien préférable à celle des lamproies. Elle étoit cependant abandonnée au petit peuple chez les Romains, qui connoissoient une Raie cendrée ou blanche, la Raie à miroir (*Raja Miraleus*), la Raie bouclée (*R. clavata*).

La chair du Marteau (*Squalus sygna*) est un aliment bien plus grossier que la Raie, & ne paroît avoir été employée que par les malheureux habitans de quelques contrées maritimes.

L'esturgeon est bien moins recherché pour sa chair que pour la gélatine délicate qu'il fournit, & que l'on connoît si généralement sous le nom d'*ichthyocolle*, ou *colle de poisson*. Chez les Grecs, on servoit l'esturgeon ordinaire (*Acipenser furius*), sur les tables les plus splendides. Les œufs d'esturgeons servent à préparer le fameux *caviar* ou *caviar* des Italiens & des Grecs. L'*Acipenser Ruthenus* ou Stérlet, & l'*Acipenser tuka*, qui se pêchent dans le Danube, sont des poissons très-recherchés.

Les œufs de l'Esturgeon, dont la pêche est très-abondante dans le Nord, servent aujourd'hui pour préparer en grand le *caviar*, dont la consommation est très-considérable chez les Russes. Le *caviar* du petit esturgeon ousterlet est le plus délicat; on le réserve pour la cour. L'esturgeon ordinaire, que l'on regarde comme l'un des poissons les plus grands, a une chair dont la faveur a été comparée à celle du veau; il fait la partie principale de la nourriture des cosaques sur les bords du Don. Le grand esturgeon, qui a quelquefois vingt-quatre pieds de longueur & plus de deux cents livres de poids, est beaucoup plus souvent mis à contribution que les autres espèces pour la colle de poisson. (Voyez ESTURGEON, on, au défaut de cet article, STERLET, STERONENS.)

Les poissons osseux ou les poissons proprement dits, comprennent un très-grand nombre de familles, dont plusieurs ne servent pas habituellement à la nourriture de l'homme. Voici une simple nomenclature de ceux des poissons qui sont le plus employés.

1°. Les Saumons (*Salmo*) proprement dits, & les Truites (*Salmo fario*).

2°. Les Ombres (*Coregonus*).

3°. Les Epelains (*Osmerus*) (1).

4°. Les Harangs (*Clupea*) (SALMONTES).

5°. La Sardine (*Cl. sprattus*).

6°. Le Célan de nos matelots (*Cl. pilchardus*).

7°. L'Alose (*Cl. alosa*).

8°. Les Anchois (*Cl. anguillula*) (2).

9°. Les Brochets (*Esox*) (3).

10°. Les Carpes (*Cyprinus*) (ESOCES).

11°. Les Barbanes (*Barbus*).

(1) Dans la famille des SALMONTES.

(2) Dans les CARPES.

(3) Dans les ESOCES.

XXX

- 12°. Les Grunions (*Gobio*) }
 13°. Les Tanches (*Tinca*) } (1).
 14°. Les Brèmes (*Abramis*) }
 15°. Les Morues (*Gadus morhua*) }
 16°. Le Merlan (*G. Merlangus*) } (2).
 17°. Les Merluches (*G. Merluccius*) }
 18°. Les Plies (*Platessa*), la Plie }
 fraoche, ou Carrelet (*Pleur. platessa*) }
 19°. La Lemande (*Pl. lemandi*) }
 20°. Les Flétans (*Pl. hippoglossus*) } (3).
 21°. Les Turbot (*Pl. maximus*) }
 22°. La Barbus (*Pl. rhombus*) }
 23°. Les Soles (*Solea*) }
 24°. Les Anguilles proprement dites }
 (*Anguilla*) } (4).
 25°. Les Congres (*Murena conger*) }
 26°. Les Murènes (*Murena*) }
 27°. Les Mullus (*Mullus*) }
 28°. Les Mugil (*Mugil*) }
 29°. Les Perches (*Perca*) } (5).
 30°. Les Vives (*Trachinus*) }
 31°. Les Baudroies (*Lophius*) }
 32°. Les maquereaux (*Scomber scombrus*) } (6).
 33°. Les Thons (*S. thynnus*) }

Ces divers genres de poissons ne sont pas également estimés, ni d'une digestion également facile; ajoutons que plusieurs ont été connus des Anciens, & que quelques autres leur étoient entièrement étrangers. Les Romains recherchoient le saumon de Gaucogne, & Aulone a décrit le saumon de la Mouselle. Les Romains préféroient la Truite commune des rivières (*Salmo fario*), & l'on fait tout le prix que l'on attache aujourd'hui au *Salmo umbla* du lac de Genève, qui se vend jusqu'à 400 fr., lorsqu'il peut avoir quatre pieds de longueur.

La chair du saumon est trop serrée, trop compacte, trop pesante pour les estomacs délicats; la chair de la truite est plus tendre & plus légère.

Les Arochis ne sont employés que comme assaisonnemens.

Tous les genres de la famille des Cyprins sont estimés; on regarde toutefois comme supérieur la chair des Barbeaux, lorsqu'on s'est servi de la coque du Levant pour les surprendre. Le Carpe, qui appartient à cette famille, étoit beaucoup en usage chez les Grecs & chez les Romains.

Le Merlan & la Morue, dont la consommation est si considérable chez les peuples modernes,

seroient inconnus aux Anciens; il n'en est pas ainsi de la Merluche, dont ils employoient sans doute le foie, en accordant sans doute à Galien que la chair de ce poisson étoit par trop visqueuse.

Tous les poissons plats, si l'on en excepte le Turbot, se digèrent facilement, & sont indiqués dans le régime des convalescens. Les Anciens connoissent & recherchent la plupart des poissons de cette famille, le Carrelet (*Pleur. platessa*), la Barbus (*Pl. rhombus*), la Sole (*Pl. solea*), la Langouette (*Pl. cynoglossus*), le Moiseau de mer (*Pl. passer*). Galien a recommandé l'usage de tous ces poissons plats, en disant que leur chair est légère & facile à digérer; mais de tous ces poissons, le Turbot fut celui que les Anciens estimoient davantage, ce qui nous a été si hautement constaté par l'humiliante proposition de l'empereur Domitien au sénat, de décider comment seroit préparé un de ces poissons qui lui avoit été envoyé d'Anchoe, & dont la grandeur étoit prodigieuse.

Très-pen de poissons se digèrent plus difficilement que les anguilles, qui ont tous les inconvéniens attachés aux aliments huileux ou gras.

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. Les animaux invertébrés ne fournissent à l'homme qu'un petit nombre de substances alimentaires, dans les situations régulières de la vie & chez les nations civilisées.

Parmi les MOLLUSQUES, qui forment la première classe de cette grande division, nous trouvons seulement la Seiche commune (*Sepia officinalis*), le Calmar (*Sepia loligo*), la petite seiche ou sepiole (*Sepia sepiola*), le Poulpe (*S. octopus*) (1), les Colimaçons (*Helix pomatia*), l'Escargot (*Helix*), les Crabs, plusieurs mollusques à coquilles bivalves; les Moules, les Huitres, plusieurs Lepas, & principalement ceux d'Égypte.

Les Grecs & les Romains paroissent avoir employé assez souvent les différentes espèces de Seiches, que nous avons indiquées, comme nourriture. Ils reconnoissoient toutefois que leur chair étoit dure, & ils cherchoient à l'attendrir, & la mortifier par divers procédés avant de s'en servir. On en voit souvent, à ce sujet, Thistoire de Diogène le Cynique, qui, après avoir mangé du poulpe, pour s'habituer à la chair crue, mourut à la suite de son expérience.

On fait encore usage aujourd'hui de plusieurs Colimaçons, dont la chair doit être regardée comme une masse glutineuse & albumineuse. Les Anciens, mais surtout les Romains, recherchoient beaucoup ce genre de nourriture. Ils faisoient les faire engraisser suivant divers procédés. On pensoit alors que les colimaçons pouvoient exciter l'appétit des buveurs dans la joie des festins, & on les servoit grillés sur des

(1) Dans la famille des Cyprins.

(2) Genre des Gades.

(3) Dans le genre très-étendu des PLEUROCENTRES, compris ici même dans la famille des Poissons plats.

(4) Dans la famille des ANGUILLIFORMES.

(5) Dans la famille des PERCHES, 2°. sous-division; ou famille des Passereaux.

(6) Dans la famille des Scombroïdes.

(1) Dans la première classe des Mollusques ou les Céphalopodes.

grils d'argent; il paroît que les Romains faisoient encore usage de plusieurs autres coquillages univalves, du coquillage qui donne la pourpre (*Murex brandaris*), de la trompette (*St. tritonis*), &c.

Les Huîtres, qui furent aussi connues des Anciens, n'ont rien perdu de leur prix chez les Modernes. Ce mollusque appartient à la première famille des Acéphales testacés (1). L'huître la plus commune est l'huître vulgaire (*Ostrea edulis*), dont il existe plusieurs variétés, qui toutes sont également remarquables par leur biondité prodigieuse. Les espèces voisines sont la petite huître de la Méditerranée (*Ostrea cristata*), l'huître parasite (*Ostrea parasitica*), l'huître fœnelle (*Ostrea fœtum*), &c. Les huîtres se digèrent mieux crues que cuites; elles doivent être fraîches & d'une moyenne grandeur; il importe aussi que l'eau dans laquelle on les a fait parquer soit très-pure. Les huîtres vertes sont les plus estimées. Les Romains préféroient les huîtres du lac Lucrin, & les Grecs, celles d'Abydos. Dans le siècle du luxe & de la décadence, on en faisoit venir des lieux les plus éloignés, même des côtes d'Angleterre; on faisoit les faire parquer, suivant Plinius, qui fait honneur à Sergius-Orata de ce moyen de conservation (2).

Les huîtres les plus estimées en France viennent des côtes de Bretagne ou de Normandie, mais surtout de Cancale. Les huîtres ne paroissent devenir vertes que par un changement qui s'est opéré dans leur organisation, pendant leur séjour dans un parc convenablement disposé.

Les huîtres au peu grosses, qui n'ont pas parqué, sont d'une digestion difficile, & ce sont néanmoins des huîtres semblables qui forment le fonds de subsistance, pour quelques peuplades du Sénégal & pour les habitants des environs du canal Chang-Tong à la Chine.

Les huîtres conservées dans un parc malsain & vaseux, deviennent nuisibles & ne fournissent qu'un aliment très-malade. A la fin de 1818, une maladie assez grave fut occasionnée à Vieux-Camp, Bolbec, Rouen, par une semblable cause & par des huîtres qu'un entrepreneur, aussi aride que peu éclairé, avoit fait séjourner dans un parc disposé à la hâte. Les commissaires chargés de prononcer sur cet événement, qui excita la surveillance de l'autorité, donnèrent, d'après les recherches & les expériences les plus exactes, les conclusions suivantes :

« Que les huîtres ont été malsaines, parce qu'elles ont été jettées trop précipitamment sur des terres fraîchement foulées, qu'on auroit dû

laver plusieurs fois avant que d'y mettre des huîtres; »

« Parce qu'il a fait un temps orageux, une chaleur les 17, 18 & 19 septembre, & que ces mollusques ayant manqué d'eau, parce que ce parc ne recevoit l'eau de la mer qu'aux plus hautes marées, n'ont pu éviter les mauvaises influences d'une atmosphère chargée d'électricité, ni l'action délétère des gaz méphytiques qui s'élevaient des talus desséchés. » (Voyez une très-bonne Dissertation de M. Adolphe Piquier, sur les huîtres, Paris, 1818, n. 231.)

Les huîtres laves forment une excellente nourriture, la seule qu'il a été souvent possible de digérer à la suite de maladies longues, dans certaines convalescences difficiles, on pendant toute la durée d'une névrose partielle de l'estomac. Quelques personnes peuvent manger de quinze à vingt douzaines d'huîtres sans en être incommodées; mais la dose la plus ordinaire est de deux à trois douzaines au commencement d'un repas. Les vieillards, quelques personnes éphémères, ont trouvé plusieurs fois dans les huîtres le plus puissant des analeptiques. L'eau des huîtres, qui paroît être une eau de mer élaborée par ce mollusque, est son meilleur aliment. Le suc de citron peut aussi être employé, & avec beaucoup moins d'inconvénients que le poivre, qui occasionne quelquefois des irritations de la vessie.

On range parmi les erreurs populaires, l'opinion que la soupe au lait & le vin blanc favorisent la dissolution des huîtres dans l'estomac. (Voyez Huîtres, & au défaut de cet article, l'article OSTREA, OSTRACES.)

Les Moules (*Mytilus edulis*) ne sont pas aussi faciles à digérer que les huîtres. Elles appartiennent à la deuxième famille des Acéphales testacés, désignée par M. Cuvier sous le nom de *mytilacés*. On connoît l'espèce particulière d'indigestion qu'elles occasionnent à quelques personnes, & dont la guérison s'obtient par une dose considérable d'éther (1).

Le Lepas le plus estimé des Anciens, le *Lepas balanus* (glaid de mer), se servoit au commencement du repas avec les huîtres.

Les insectes ne servent à la nourriture de l'homme que dans un petit nombre de familles de cette grande division du règne animal. Dans la première classe, c'est-à-dire, parmi les Crustacés, nous trouvons les Écrevisses (*Astacus fluviatilis*), le Homard (*Astacus gammarus*), la Langouste (*Pulmonis vulgaris*), quelques Crabs (*Cancer marinus*), l'Étrille (*Portunus pubes*), &c. &c.

Les insectes proprement dits n'ont pas été

(1) Les Ostracés à mannes couvert, & sans tube ni ouverture particulière.

(2) Plinius, lib. XX, cap. 54.

(1) Dans cette indigestion, qui est principalement caractérisée par une éructation et la turgescence du visage, on donne l'éther jusqu'à la dose d'une once & deux grains. (Voyez MOLLUSC.)

désignées, dans quelques circonstances impérieuses; ainsi, plusieurs habitants de l'Égypte, les Arabes, pressés par la faim, mangent quelquefois pulicaires espèces de sauterelles, qu'ils préparent de diverses manières. On a souvent cité le grès des Athéniens pour les cigales (*Cicada plebeia*) à l'état de larves. Les Indiens mangent aujourd'hui, à l'exemple des anciens habitants de l'Asie mineure, la larve du Charançon des Palmiers (*Coccus palmarum*); enfin, les derniers rois du règne animal, les Zoophytes, ont aussi fourni quelques espèces, soit au bétail, soit aux capriots de l'homme.

Les oursins de mer (*Echinus esculentus*), dans la classe des Echinodermes, sont toutefois presque les seuls animaux de cette dernière division que les Modernes, à l'exemple des Anciens, emploient comme aliment. Ce zoophyte a la forme & le volume d'une pomme. On ne mange que ses ovaires, mais ordinairement sans les faire cuire. On mange aussi quelques espèces d'Holothuries & d'Afridees. Ainsi, les Chinois font sécher & combinent avec les nids d'hirondelle, l'*Pholidium tubulose* (*Holothuria tubulosa*), l'*Afridia rusticata*. On mange principalement les *Adinia rassa*, l'*Adi. crassicornis*, l'*Adi. truncata*. Aristote prétend que ces adinies sont beaucoup meilleures en hiver qu'en été.

TROISIÈME PARTIE.

Composition, classification, préparation des aliments.

Les nourritures diverses ont pour but, pour objet final; de réparer les pertes qui résultent du fait même de l'exercice de la vie. Leurs préparations préliminaires, la conversion des aliments dans une substance assimilable ou nutritive, sont propres à l'animal qui a pour caractère de porter au dedans de lui-même un appareil particulier de digestion; dans lequel s'élabore une matière qui doit renouveler la masse du sang, lorsque celle-ci étant épuisée, par le travail de la nutrition, de molécules assimilables & stimulantes, a perdu son caractère de sang artériel.

Les substances minérales ne sont point employées à la nourriture de l'homme, ni même à celle des animaux; mais quelques-unes de ces substances servent comme des assaisonnements, ou comme des condiments; les différentes espèces de sel marin, le nitre, l'acide, quelques eaux minérales, le gaz acide carbonique, &c.

Les plantes & les animaux fournissent à la fois des assaisonnements, des aliments, & contribuent en outre à la préparation de plusieurs espèces de boissons. Leurs différentes parties, que l'on emploie pour servir à l'alimentation, ne contiennent ordinairement qu'une certaine portion de matériaux nutritifs. Les matières colorantes

ou aromatiques ne se retrouvent presque jamais dans le chyle, & sont expulsées par la voie de quelques sécrétions particulières; ce qui paraît toujours si remarquable pour le Camphre, pour les Asperges, la Térébenthine, &c. &c.

D'autres matériaux, véritablement inertes ou étrangers à la nutrition, se trouvent rejoints avec les matières excrémentielles, qui n'étant pas d'ailleurs exclusivement formées de ces matériaux non assimilables, résistent, de leur mélange avec la bile, & les mucosités intestinales, à un mélange qui est préparé & élaboré de manière à former un produit assez uniforme dans l'état de santé, & très-varié dans les circonstances diverses de l'indisposition & de la maladie.

Quels sont les matériaux ou les parties qui, dans la nourriture ou l'aliment, peuvent être employés pour l'assimilation? Les Anciens & quelques Modernes avoient pensé que ces matériaux étoient identiques dans toutes les espèces d'aliment, en s'attachant, pour développer une semblable opinion, à cette idée d'Hippocrate: *Alimentum unum, species alimenti multe*. Des observations moins superficielles, & l'analyse comparative des parties solides ou fluides des animaux & des substances alimentaires, ne permettent plus de regarder aujourd'hui cet aliment unique, cette nourriture par excellence, que comme un être de raison, quoique d'ailleurs l'expérience ait fait reconnaître que, dans quelques circonstances, un seul principe immédiat des végétaux ou des animaux pouvoit servir pendant quelque temps pour la nutrition (le sucre, la gomme, &c.). Quoi qu'il en soit, une des questions qu'il importe le plus d'examiner dans l'étude de la nature & de la composition des aliments, & pour objet les principes immédiats, soit végétaux, soit animaux, qui se trouvent diversément combinés dans ces mêmes aliments, & dont la prédominance peut servir de base pour une classification, d'ailleurs plus scientifique que usuelle des différentes espèces de nourriture.

Les principes immédiats des végétaux qui se trouvent dans les aliments, se rapportent à six titres principaux, dans l'état présent des connaissances; savoir:

- 1°. Les principes immédiats, dans lesquels la proportion de l'oxygène à l'hydrogène est plus considérable que dans l'eau.
- 2°. Les principes immédiats dans lesquels cette proportion est égale.
- 3°. Les principes immédiats, dans lesquels l'hydrogène l'emporte sur l'oxygène.
- 4°. Les matières colorantes, qui se trouvent dans toutes les parties des plantes.
- 5°. Les principes immédiats qui ne contiennent pas d'azote, & dans lesquels les proportions de l'hydrogène à l'oxygène sont inconnues.
- 6°. Les principes immédiats végéto-animaux.
- 1°. CLASSES. Les sucs contenus dans plusieurs

aliments, appartiennent à cette première classe. Ils sont abondamment répandus dans les fruits de plusieurs familles de plantes, surtout avant leur maturité (les *Morvaniques*, les *Rosacées*), & s'y trouvent unis à des mucilages & à des matières fécales, dans un parenchyme plus ou moins alimentaire.

2^e. CLASSE. Les principes immédiats de la deuxième classe, & dans laquelle la proportion de l'oxygène est la même que dans l'eau, se distinguent de tous les autres par des propriétés éminemment alimentaires; tels sont la *fécule*, la *gomme*, le *sucre*, si abondamment répandus dans les racines, les tiges, les semences & le péricarpe d'un grand nombre de plantes qui servent à la nourriture de l'homme & des animaux. Quelquefois au de ces principes, la *fécule*, par exemple, prédomine & se trouve presque seule dans certains aliments, que l'on a appelés par cela même *aliments farineux*; tels que le riz, l'orge, le maïs, la moëlle du fagot, &c., qui sont très-nourrissants, quoique l'on se puisse en faire un véritable pain. Dans d'autres circonstances, le même principe, quoique très-abondant, se trouve combiné avec d'autres principes également nutritifs, comme dans la châtaigne, le blé.

FÉCULE. Seule ou presque seule, la *fécule* ne contient pas d'azote, & nourrit presque sans résidu essentiel, comme on le voit pour le riz, le fagot, la farine d'arrow-root; aliment dont le vulgaire dit, *qu'il se chauffe*, sans connaître la véritable cause de diminution dans les digestions, sous l'influence de ces nourritures. Ce même principe féculeux, dans un assez grand nombre de plantes (dans plusieurs légumineuses), se mucilagine & à la matière sucrée, & paroît se former par un degré de maturation plus avancé, soit dans les semences, soit dans les tiges de différentes plantes.

Les principes immédiats avec lesquels la *fécule* se trouve le plus ordinairement unie, dans les substances alimentaires, sont le *sucre*, la *gomme*, le *gluten*.

L'orge, le riz, le fagot, le maïs, le millet, contiennent la *fécule* presque pure; ce qui est propre d'aillieurs à la *fécule*, c'est de se dissoudre dans l'eau bouillante & d'augmenter de volume, par le développement de chaque grain ou de chaque molécule de sa substance. Ce même principe immédiat des végétaux a encore cela de remarquable, qu'il ne présente un bon aliment que sous cette forme, on a l'état du pain azyne, & qu'il ne peut être propre à faire un véritable pain, que lorsqu'il est mêlé à une certaine quantité de gluten; mélange, combinaison qu'on s'est efforcé d'une manière convenable que dans l'économie d'une seule espèce de plante (le blé ou froment (*tritium montanum*), de la famille des GRAMINÉES).

SUCRE. Le sucre qui, comme la *fécule*, contient l'oxygène & l'hydrogène dans une portion égale à celle de l'eau, est très-abondamment répandu dans les fruits d'un grand nombre de végétaux, dans les racines de quelques-uns & dans les tiges de plusieurs Graminées, avant la maturation, surtout dans les tiges de l'*Arundo juncea* ou *Canne à sucre*.

Le sucre est soluble dans l'eau & dans l'alcool. Il est fermentescible & cristallisable; quoiqu'il ne contienne pas d'azote, il pourroit, au moins pendant quelque temps, servir de nourriture à l'homme. Les résultats des expériences qui ont été faites par M. Magendie, avec cette substance, sur les chiens, ne peuvent guère s'appliquer à l'espèce humaine, sans en exagérer ou en détourner les conséquences (1).

Le sucre, plus ou moins abondamment contenu dans un grand nombre de matières végétales qui servent comme aliments, s'y trouve stérilement combiné avec d'autres substances, & principalement avec la gomme, les mucilages acides, la *fécule*, certains principes aromatiques, une quantité d'eau plus ou moins considérable, un principe inconnu, qui s'oppose à la cristallisation dans plusieurs espèces de sucre, suivant M. Chevreul, & un autre principe particulier dans la manne, la *mannite*.

GOUMME. On donne le nom de *gomme* au produit immédiat ou incristallisable de plusieurs végétaux, qui se présente sous la forme d'un mucilage plus ou moins épais, suivant la quantité d'eau qu'il contient.

Il existe plusieurs espèces de gomme, dont les plus abondantes, connues sous le nom de *gommés arabiques*, sont fournies par des plantes de la grande famille des Légumineuses.

La gomme à l'état de mucilage est très-répandue dans plusieurs substances végétales alimentaires, & principalement dans un très-grand nombre de fruits, où elle se trouve unie à des

(1) M. Magendie a nourri quelques animaux exclusivement avec du sucre. Un jeune chien d'abord, soumis à ces expériences, consommait jusqu'à sept ou huit onces de sucre par vingt quatre heures. Il devint prodigieusement maigre dans la troisième semaine, & l'on vit se manifester une atrophie au centre de la corne transparaçante. Les sécrétions alvines n'étaient ni fréquentes, ni copieuses; mais celles de l'urine furent très-abondantes. L'animal périt la septième semaine. À l'ouverture du corps, on ne trouva aucun vestige de graisse. Les muscles paraissaient réduits de plus des cinq sixièmes; l'estomac, les intestins avaient également perdu beaucoup de leur volume; l'artère azygée fut analysée par M. Chevreul, n'offrit aucune trace d'acide urique, & présentait, ainsi que la bile, tous les caractères propres à ce fluide dans les animaux herbivores. Plusieurs autres expériences, faites dans le même esprit, soit avec le sucre, soit avec la gomme, ont donné des résultats analogues aux précédentes que nous venons d'indiquer.

matières acides on a des matières sucrées, dans les feuilles ou les racines des mauves, dans les racines des panais (*Pastinaca sativa*), des carottes (*Daucus carota*), de la Betterave (*Beta vulgaris*), de la scorzonère (*Scorzonera hispanica*), des Salibis (*Thugopogon pratensis*), des Navets (*Brassica napus*), &c. &c.

Ces racines, ces feuilles, ces tiges, qui doivent leurs propriétés nutritives à la quantité plus ou moins considérable de matière liquide ou de mucilage qu'elles contiennent, sont servies sur nos tables sous le nom de légumes ou de salades. Elles font la base d'une alimentation adoucissante ou relâchante, que l'on recommande dans quelques maladies. La gomme très-pure, quoiqu'elle ne contienne point d'azote, a cependant servi accidentellement de nourriture, dans plusieurs circonstances malheureuses ou difficiles. Aussi, au rapport de Linné, on fait que plus de cent hommes, renfermés dans une place assiégée, ne vécurent que de gomme pendant deux mois. Plusieurs peuples de l'Afrique paroissent même faire usage de la gomme comme aliment, d'une manière moins temporaire, & lorsque les vivres viennent à manquer, cette substance devient la seule ressource des caravanes, qui partent chaque année de l'Abyssinie pour arriver au Caïre.

Quelques principes particuliers associés au mucilage, dans plusieurs des plantes que nous venons d'indiquer, en modifient sensiblement les propriétés. Les plus remarquables sont la matière acre qui se trouve unie à ce mucilage dans le Navet, l'*Asparagus* propre à l'Asperge, la féculé verte, que l'on a rencontrée dans l'Epineard, féculé qui n'est point assimilable, mais qui ne diminue point la digestibilité de cet aliment.

Un principe irritant & fortement purgatif est associé, dans une assez grande proportion, au mucilage, dans les fruits des Cucurbitacées, & même dans le Pouton ou le Melon, qui par cela même sont très-mûrissables, avant une parfaite maturité.

3^e. CLASSE. Les principes immédiats de cette troisième classe contiennent une très-grande quantité de carbone & d'hydrogène, qui s'y trouvent en excès par rapport à l'oxygène. On rapporte à cette même classe plusieurs matières diverses, mais surtout les substances grasses ou huileuses, toutes plus légères que l'eau, très-faciles & absorbant l'oxygène avec force, lorsqu'on élève leur température.

Les substances grasses végétales, comme les substances grasses animales, ne sont plus regardées comme des principes immédiats, d'après les savantes analyses de M. Chevreul. Les huiles ou les substances grasses végétales sont distinguées en huiles fixes ou en huiles volatiles.

Les huiles grasses ou fixes doivent être seules glacées dans la classe des nourritures, bien

qu'elles soient plutôt employées comme assaisonnement que comme aliments. On les retire, par la pression, de l'Olive (*Olea europaea*), de l'Amande douce (*Amygdalus communis*), des Noisettes (fruit du *Corylus avellana*), des noix, des graines de Pavots, enfin, de l'Amande du Cacao (*Theobroma cacao*).

Les huiles grasses végétales paroissent formées, comme la graisse, de deux principes immédiats particuliers, l'*Elaine* ou partie huileuse, & la *Stéarine* ou suif.

Le suif de l'huile, d'après les expériences de M. Braconnot, est inodore, insipide, aussi ferme que celui du bœuf, mais beaucoup plus fusible. On en retire 25 parties sur 100 parties d'huile d'olive.

L'huile d'olive, qui est la plus employée dans l'alimentation, a l'inconvénient attaché à toutes les huiles, de s'altérer promptement par le contact de l'air, & surtout par la chaleur. On l'associe ordinairement aux vinaigres simples, aux vinaigres composés & à différentes substances aromatiques, pour la rendre plus facilement digestible. L'huile concrète ou solide du Cacao, quoiqu'elle contienne un arôme particulier, exige un pareil assaisonnement, pour lequel on emploie la Cannelle, la Vanille, le Gérolle, &c.

4^e. CLASSE. Les matières de cette classe, les matières colorantes que l'analyse chimique fait reconnaître dans les substances végétales, ont peu ou point d'influence dans l'alimentation.

5^e. CLASSE. Parmi les principes contenus dans cette cinquième classe, & qui ont pour caractère de contenir l'oxygène & l'hydrogène dans des proportions inconnues, se trouvent l'*émétine*, la *pirotosine*, la *sarcocolline*, mais surtout la *gélée*, le seul de ces principes immédiats qui ait quelques rapports avec l'hygiène.

La *Gélée*, que l'on ne doit pas confondre avec la gélatine, se présente sous la forme d'une matière tremblante, que les suc de groseilles, de mûres, & de presque tous les fruits acides parvenus à leur maturité laissent déposer.

La *gélée* peut bien se dissoudre dans l'eau bouillante, mais elle dépose bientôt par le refroidissement, & ne perd la propriété de se *gélifier*, que lorsqu'une ébullition prolongée l'a rendue analogue au mucilage.

La *gélée*, inodore par elle-même, retient toujours quelques molécules de la matière colorante qui la fournit. Elle fait, avec le sucre, la base des différentes espèces de confitures.

6^e. CLASSE. PRINCIPES VÉGÉTO-ANIMAUX. Une certaine quantité d'azote se trouve jointe à l'oxygène & à l'hydrogène & au carbone, dans les principes de cette troisième classe. Caux de ces principes qui jouent un rôle principal dans les substances alimentaires, sont le *gluten* & la *fungine*. Un autre principe de la même classe n'a été trouvé, jusqu'à ce jour, que dans le suc d'as-

perges; c'est l'*alparagine*, dont nous devons la découverte à MM. Vanquelin & Robiquet — principe qui parait résister aux forces digestives, tout en modifiant la sécrétion des acides. On rapporte encore à la même classe, une gélatine, une fibrine & une albumine végétales, qui n'ont été trouvées que dans quelques plantes (1).

GLUTEN. Le Gluten, qui se trouve principalement dans la farine du blé ou froment (*triticum montanum*), a été découvert par Beccaria, dans cette farine. M. Proust en a rencontré quelques parcelles dans plusieurs autres substances végétales, même dans les fruits & dans les feuilles (les Coings, les baies de Sureau & de Raisin, les feuilles de Chou, de Cigari & de Bourrache).

Le gluten a beaucoup d'analogie avec les substances animales; ce qui devient évident par la distillation, & par la putréfaction qui répand une odeur si fétide chez les amidonniers. Le gluten est uni pour un tiers à la fécule, dans la farine de froment. Cette farine est la seule, comme nous l'avons déjà dit, qui jouisse complètement de la propriété de fermenter, lorsqu'elle est réduite en pâte, & de faire un pain de bonne qualité. Le gluten, dans son état naturel, est toujours très-humide. Mûlé de la fécule, on de toute autre partie, il est griffâtre, visqueux, insipide & d'une odeur de sperme.

La **FUNGINE**, trônée par M. Braconnot dans le tissu des champignons, a beaucoup d'analogie avec le gluten, relativement aux propriétés alimentaires, & lorsqu'on la soumet à la distillation, elle manifeste également ses rapports avec les substances animales.

La **fungine** manifesterait bien mieux sa propriété nutritive dans les champignons, si elle ne se trouvoit pas jointe à des matières vénéneuses, & si la texture dense & serrée du tissu qui la contient ne résistait pas à l'action des voies digestives.

Le **ferment** ou les **fermens** doivent être rapportés aux principes immédiats des végétaux. On ne conçoit pas exactement le mode de leur développement. On ignore même s'ils se trouvent tout formés dans les végétaux; mais, quoi qu'il en soit, les ferments, qui ne sont pas toujours de la même nature, jouent un très-grand rôle dans l'alimentation. Celui que l'on conçoit sous le nom de *levure de bière*, manifeste une grande analogie avec les substances animales, lorsqu'on le distille. Abandonné à lui-même dans des vaisseaux fermés, il se putréfie dans ces mêmes vaisseaux. Il développe, dans une quantité suffisante de sucre, la fermentation fœtueuse; tandis que la même fermentation ne s'effectue dans les mêmes substances, avec le ferment du raisin, qu'avec

le contact de l'air & l'intervention de l'oxygène. La levure de bière est employée, dans plusieurs pays, pour faire lever le pain, procédé dont l'essai a été dans son temps le sujet d'une discussion très-vive, & aussi peu honorable pour la Faculté de Paris, que son opposition à l'introduction des remèdes chimiques; à l'usage du quinquina & à la pratique de l'inoculation.

La fermentation considérée relativement à la confection des boissons ou des compositions alimentaires, sera examinée lorsque nous aurons à traiter de la préparation des différentes espèces de nourritures, soit végétales, soit animales.

Quelques parties & quelques produits des végétaux forment des principes immédiats composés, que l'on peut rapprocher, du moins relativement à l'hygiène, des principes immédiats simples ou élémentaires. Les gommes-résines se distinguent parmi ces principes composés, & l'une d'elles, l'*assa-fœtida*, placée parmi les médicaments héroïques, étoit employée par les Anciens comme résineux, sous le nom de l'*affer*.

Le **Galbanum**, ou le suc de la racine du *babai galbanum*, la Myrrhe, ont aussi été employés pour diverses préparations alimentaires, ainsi que l'Oliban ou l'encens des Anciens. Plusieurs baumes, qui se rapprochent beaucoup des gommes-résines, pourroient aussi être employés comme condiment (le baume de Tolu, le Beccia, le Storax calamite).

Parmi les principes immédiats composés, qui se présentent sous la forme de sucs, on doit distinguer plusieurs matières sucrées, mais principalement la manne, suc concret du *Fraxinus ornus*, qui croît en Calabre. Cette dernière, que l'on désigne sous le nom de *manne en larmes*, lorsqu'elle est très-pure, contient une grande quantité d'un principe particulier que M. Théoud a désigné sous le nom de *mannite*, & une matière analogue au sucre. La manne ancienne est employée pour purger; mais la manne fraîche est très-peu laxative, & dans cet état les peuples de la Calabre l'emploient comme aliment.

Tels sont les principes immédiats des végétaux, que l'on est parvenu à découvrir dans les substances alimentaires les plus généralement employées pour la nourriture de l'homme & des animaux.

Les chimistes modernes ont rapporté aux quatre titres suivans les principes immédiats des animaux; savoir :

- 1°. Les principes immédiats qui ne sont ni gras ni acides;
- 2°. Les principes acides;
- 3°. Les principes gras;
- 4°. Les matières salines & terreuses.

Parmi les principes immédiats des animaux qui ne sont ni gras ni acides, nous devons distinguer, relativement à leurs propriétés nutritives, la fibrine, l'albumine, la gélatine ou colle forte, la matière caséuse, l'osmazome, & le sucre de

(1) Le papayer (*Carica papaya*), pour la fibrine, & le Phoenix dattier, pour la gélatine.

lait (*Saccharum lactis*). Ces principes immédiats se trouvent, suivant différentes proportions, & avec une quantité plus ou moins grande de liquide, dans les nourritures animales, qui leur doivent leurs propriétés toniques & alimentaires.

FIBRINE. La fibrine, qui forme la base des muscles, se rencontre aussi dans le sang, dans le chyle & dans plusieurs autres parties liquides ou solides des animaux. Analogue au gluten, elle est éminemment nutritive sous un très-petit volume, propriété qu'elle manifeste surtout dans les chairs succulentes du gibier & des grands animaux.

ALBUMINE. L'albumine se rencontre en très-grande quantité dans le blanc d'œuf, dans les bœufs; on le trouve aussi dans le sérum du sang, dans les humeurs séréuses, &c. Elle diffère peu dans la composition de la fibrine; si elle n'est pas affaiblie par une quantité d'eau trop considérable, elle se coagule par la chaleur & à 64 degrés du thermomètre centigrade, état dans lequel la propriété nutritive est beaucoup plus développée. Il parait, d'ailleurs, que l'albumine la plus pure du blanc d'œuf contient toujours un peu de sucre. La digestion des matières qui contiennent une grande quantité d'albumine n'est point accompagnée d'un développement de chaleur aussi considérable que la digestion des aliments qui renferment la fibrine dans une proportion très-forte.

Le jaune d'œuf parait renfermer de l'albumine dans un état particulier; il contient une huile douce; quelques portions de gélatine, de soufre & d'acide phosphorique.

GÉLATINE. La gélatine, que l'on peut extraire des os par différents procédés, ne parait pas toute formée dans les autres substances animales, mais se développe par la transformation ou conversion d'une matière particulière contenue dans ces substances, & qui subit cette espèce de métamorphose lorsque les parties qui la contiennent sont traitées par l'eau bouillante. Cette voie de l'ébullition est efficace le développement de la gélatine dans un grand nombre de préparations alimentaires liquides ou solides, mais principalement dans le bouillon.

Certaines parties des animaux, & presque toute la substance des animaux très-jeunes, contiennent abondamment cette matière propre à se convertir en gélatine par l'ébullition. Cette gélatine, fournie par la chair des animaux très-jeunes, n'est point suffisamment élaborée; elle se digère difficilement, quoique d'ailleurs elle soit beaucoup plus nourrissante que la gomme.

La gélatine connue sous le nom de colle forte, se prépare avec la peau & les cornes de plusieurs animaux. La gelée plus légère, appelée *ichthyocolle*, ou colle de poisson, n'est autre chose que la membrane interne de la vessie natatoire de l'esturgeon, lavée, desséchée en plein air, transparente & presque entièrement formée de gélatine pure.

La gélatine des os, lorsqu'elle est obtenue par le procédé de M. Darcet, n'est-à-dire en la traitant avec l'acide hydrochlorique, peut servir à un grand nombre de préparations alimentaires. On peut l'obtenir par ce procédé dans la proportion de 50 pour 100 : les os qui seroient jetés ou brûlés, pourroient désormais contribuer sensiblement à l'amélioration de l'économie domestique, surtout pour ce qui concerne la confection des bouillons & la préparation des substances animales qui servent le plus à la nourriture. Un grand nombre d'expériences ont déjà été faites à ce sujet : le bouillon préparé comme il convient, avec un quart de viande & trois quarts d'un mélange composé de légumes & d'un peu de gélatine extraite des os, ne diffère point du bouillon ordinaire; & sur cent livres de viande on gagne, dans cette préparation, cinquante livres de rôt; il est beaucoup plus convenable, non-seulement pour les personnes valides qui travaillent, mais aussi pour les malades & les convalescents dans les hôpitaux.

La gélatine des os a été également préparée en tablettes, avec une quantité suffisante de jus de viandes & de racines, & les échantillons de ces préparations alimentaires, obtenus par M. Darcet, nous ont paru ne rien laisser à désirer (1).

La *matière caillée* ne se rencontre ordinairement que dans le lait; elle fait la base de toutes les espèces de fromage dans lequel elle se trouve combinée avec une certaine portion de crème, avec des sels ou d'autres condiments employés pour la préparation de cette substance alimentaire.

Le *casum*, qui forme d'ailleurs une des parties constituantes du lait, est blanc, opaque, solide, sans odeur, sans saveur, & plus pesant que l'eau; il contient une assez grande quantité d'axote. Le casum que l'on obtient, en abandonnant le lait à lui-même, est légèrement acide, agréable au goût, facile à digérer.

OSMAZONE. M. Thénard a désigné sous ce nom la matière extractive du bouillon, qui parait avoir été décrite pour la première fois par Thénard. L'osmazome, que l'on obtient abondamment de la chair du bœuf, & que l'on a retirée aussi du cerveau & de quelques champignons, a une odeur & une saveur très-développées, que l'on retrouve dans le bouillon bien préparé. Cette substance exposée à l'air, en attire l'humidité; elle ne s'agit & ne se putréfie qu'au bout d'un certain temps.

Le bouillon doit sa saveur & son odeur à l'osmazome. M. Thénard, qui l'a analysé avec beaucoup de soin, y a reconnu une partie de ce principe sur sept de gélatine. Il est facile de voir que les différentes espèces de bouillon se rapproche-

(1) *Annales de Chimie*, tome XLII, page 300.

ront plus ou moins de cette composition, suivant la nature des substances qui auront été employées pour la confection.

Sucre de lait. Le sucre de lait, qui n'a été trouvé que dans du fluide, distille du suc de canne sous plusieurs rapports, par son peu de solubilité dans l'eau froide, son insolubilité absolue dans l'alcool, la résistance à la fermentation lorsqu'il a été trituré avec de la levure & de l'eau.

Le sucre de lait fait la base du petit-lait; rarement il est employé seul, soit comme médicament, soit comme substance alimentaire.

Les acides contenus dans les substances animales, ou produits par l'action de divers corps sur ces substances, sont assez nombreux; mais aucun de ces acides n'est employé comme aliment; & on ne les rencontre que rarement dans les substances alimentaires.

Les acides *lactique*, *butyrique*, nous offrent toutefois une exception. Le premier a été découvert par Scheele; dans le petit-lait aigri: il est très-soluble dans l'eau, & forme des sels déiques avec diverses bases salissables, mais surtout avec la chaux, avec la magnésie. L'acide butyrique a été regardé comme la cause de l'odeur particulière du beurre; par M. Chevreul.

L'acide butyrique rougit l'infusum de tournesol, & à la température de 12 degrés il forme, avec l'alcool, un composé éther qui a l'odeur de la pomme de reinette. Les sels qu'on forme ce même acide, avec la chaux, la magnésie, &c., ont une odeur assez forte de beurre frais.

Les matières grasses sont remarquables par l'absence de l'axote & par la quantité considérable de carbone qu'elles contiennent. Depuis la savante analyse de M. Chevreul, elles ne sont plus regardées comme des substances élémentaires.

Les graisses les plus employées, celles du mouton, du bœuf, de l'oin, &c., sont ordinairement très-abondantes sous la peau, près des reins; dans l'épousson, à la base du cœur, & la surface des muscles, &c. Elles sont essentiellement formées de deux principes immédiats, savoir, la stéarine & l'oléine.

La *stéarine* ou le *lait* (*stear*), a été fluide qu'à 56 degrés du thermomètre centigrade: elle paraît jouer un très-grand rôle dans la saponification des graisses.

L'*oléine*, de l'acide, huile, est beaucoup plus pesante que la stéarine. La transformation des graisses en savon dépend entièrement de la décomposition des deux principes immédiats; que nous venons d'indiquer: dans ces principes, la proportion de l'hydrogène à l'oxygène est plus forte que dans l'eau.

Un autre principe immédiat, la *Cétine*, appartient plus particulièrement à la graisse de plusieurs Cétacés. Plusieurs acides, sans être contenus dans les graisses, ne s'y trouvent pas tout formés (l'acide *Margarique*, *Olique*, *Célique*).

MÉDECINE. TOME II.

Les matières grasses sont rarement employées seules comme aliment, & se trouvent mêlées à d'autres substances dans différentes espèces de chaires, mais surtout avec la gélatine & la fibrine: celle de ces substances dont on fait le plus d'usage (le beurre), est essentiellement composée de stéarine, d'oléine & d'acide butyrique qui donne une odeur si agréable au beurre récemment préparé.

Un assez grand nombre de *matières saines ou terreuses*, se rencontre dans les substances animales employées comme aliments (les sous-phosphates de chaux, de magnésie, les sous-carbonates de soude, de potasse, &c.). Il ne paraît pas que ces substances exercent une influence notable sur la nutrition, ni qu'elles passent toutes formées de la pâte alimentaire dans le parenchyme des organes. Un chimiste moderne, M. Berzelius, avoit même que plusieurs de ces sels n'existent pas tout formés dans les substances qui les fournissent, & qu'ils s'y développent par la décomposition de la matière animale.

S. 1^{re}. Classification.

DIVERSITÉ DES ALIMENS. Les principes immédiats des végétaux & des animaux, que nous venons de passer rapidement en revue, se trouvent réunis & combinés en diverses proportions dans les substances alimentaires, soit entières, soit avec d'autres matériaux, qui, sans être directement nutritifs, contribuent plus ou moins à la digestion. Quelle que soit l'apologie de plusieurs de ces principes avec les parties constituantes de l'organisation pendant la vie, il est impossible de supposer, dans l'état présent des connaissances, que ces principes soient tout formés dans la masse sanguine, & qu'ils soient ensuite tirés de cette masse, par le parenchyme des différents organes, pour servir à l'assimilation & aux sécrétions diverses. Beaucoup plus active, beaucoup plus étendue dans le développement de son activité, la nutrition ne se borne pas à une opération aussi simplement mécanique, & dans laquelle, pour nous servir d'une expression de l'usage, toute assimilation, tout remplacement de partie se ferait par une addition aux surfaces. De tout de ces principes est souvent manié & remanié en divers sens par les forces digestives, & il suffit pendant quelque temps à la nutrition, ainsi que nous avons déjà en l'occasion de le remarquer.

Un végétal détaché du sol & nourri exclusivement d'air & d'eau distillée, n'en contient pas moins la plupart des principes immédiats que l'on rencontre dans les autres plantes. Ce fait a été souvent constaté, & des expériences, exécutées avec le plus grand soin, ont prouvé, d'une autre part, que dans un temps donné, les coquilles de l'œuf avaient offert à l'analyse chimique, une quantité de carbonate de chaux beaucoup plus considérable que celle qui étoit contenue dans les

Xyyy

alimens employés pendant toute la durée de cette expérience.

Dans l'état le plus ordinaire, quelle que soit la nature des alimens, le chyle paroît renfermer constamment de l'albumine, & une portion de cette même albumine se trouve dans le chyle, aussi qu'une portion de fibrine, toujours d'autant plus considérable, que ce dernier fluide est plus près d'entrer dans le torrent de la circulation. Le sang, à son tour, contient plusieurs matériaux dont la source directe ne paroît pas exister dans les alimens, tandis qu'il n'a jamais fourni à l'analyse, plusieurs principes que l'on rencontre dans diverses parties solides ou liquides de l'organisation (*l'urée, qui semble appartenir à l'urine; la gélatine, l'asparagone, la matiere cérébrale*). (Voyez NUTRITION.)

Quoi qu'il en soit, l'étude des principes immédiats des végétaux, qui sont plus ou moins abondamment répandus dans les substances alimentaires, jeté beaucoup de lumière sur la nature de ces substances, lorsqu'on la considère sous un point de vue pratique; mais, d'une autre part, la substance alimentaire (l'aliment) est toujours une matière très-compolée, & qui ne contient pas seulement des principes nutritifs ou assimilables, mais encore des parties inertes, souvent résistances aux forces digestives, & plus ou moins toniques ou stimulantes. Nous croyons devoir rapporter ces différentes substances à deux classes principales de nourriture; savoir : les *nourritures végétales* & les *nourritures animales*, trop différentes, au moins dans leurs effets, & malgré l'analogie de quelques-unes de leurs parties constituantes, pour qu'il soit véritablement rationnel & philosophique de les rapprocher & de les confondre.

NOURRITURES VÉGÉTALES. Les nourritures végétales, présentent une grande variété, depuis les fruits les plus alimentaires (le fruit de l'arbre à pain, la châtaigne, le gland nourricier), depuis les semences ou les racines qui contiennent abondamment la fécule, jusqu'aux liges & aux feuilles qui renferment à peine quelques portions de sucre ou de mucilage. Dans aucun climat, ni à aucune époque de la civilisation, les hommes n'ont vécu exclusivement avec ce fonds de subsistance, que lorsqu'ils ont été dirigés par des idées religieuses, ou contraints par la plus impérieuse de toutes les lois, la loi de la nécessité.

Soumis à l'une ou à l'autre de ces deux puissances, différentes réunions d'hommes ont vécu ou continuent de vivre encore, sans faire aucun usage d'alimens tirés des substances animales. Le gland nourricier, le fruit de l'arbre à pain, le riz, le millet, la pomme de terre, la racine de manioc, sont encore aujourd'hui le seul fonds de subsistance de plusieurs hommes, dont la civilisation n'est pas assez avancée pour donner à la na-

ture humaine & à l'industrie que comporte cette nature, tout le développement dont elle est susceptible. Des mœurs plus douces, une santé plus égale, une existence moins agitée par les passions, ont paru attachées à ce régime exclusivement végétal, surtout lorsque les hommes qui lui vivoient, paroissoient l'avoir adopté volontairement, ou même avec les motifs d'une préférence qui avoit sa source dans les mœurs & dans la religion nationale. C'est du moins le ce que l'on a cru apercevoir dans l'histoire de l'âge d'or & dans le tableau des mœurs primitives & patriarcales.

En attachant trop d'importance aux conséquences générales de ces faits, qu'il auroit fallu soumettre à une critique judicieuse, quelques philosophes ont soutenu que l'entraînement de la conviction & le pouvoir de l'éloquence, que l'homme n'étoit pas appelé, par son organisation, à se nourrir de chair, & que le régime végétal, plus conforme à cette nature, n'étoit pas moins favorable à la santé qu'à la perfection morale (1).

Pythagore avança le premier, ou l'un des premiers, il y a plus de vingt siècles, ces opinions exclusives, qui n'ont pas encore perdu tout leur crédit, & qui ont formé, à différentes époques, un principe si puissant de conduite pour tous les hommes qui, voulant se consacrer à la vie ascétique, cherchoient dans un régime moins nourrissant & plus doux, le moyen de rendre l'habitude de la contemplation & l'exercice des vertus qu'il en dépendent, plus agréables & plus faciles.

Un médecin philosophe ne peut guère s'occuper de ces hautes spéculations, que pour en marquer la place parmi les erreurs philosophiques ou populaires les plus opposées aux saines doctrines de l'hygiène & de l'anthropologie.

Il nous importe surtout d'apprécier à leur juste valeur, l'influence générale du régime végétal, & les particularités des différentes espèces de nourritures qui appartiennent à ce régime.

La force primitive de la race, la pureté de l'air, mais surtout l'élévation du sol, l'air des montagnes, & les habitudes d'une vie paisible & laborieuse, se sont presque toujours rencontrés chez les peuples agenciers, avec l'usage de se nourrir exclusivement ou presque exclusivement de substances végétales; & dans ce cas sans doute, & avec de pareils auxiliaires, le régime végétal a pu développer sensiblement les forces organiques & la longévité. Dans toute autre circonstance, & lorsque l'effet d'un semblable régime n'a pas été contre-balancé par le genre de vie ou par les influences atmosphériques, les

(1) Tous les hommes d'un esprit cultivé connoissent le passage dans lequel Plutarque a exposé les idées fondamentales de Pythagore, sur la diète végétale, & que J. J. Rousseau a fait passer dans notre langue, avec une si grande perfection de style. (Voyez *Œuvres complètes de Rousseau*, édition de Lyon, 1796, t. 12, tome VII, page 358.)

mêmes effets n'ont plus été observés, & les hommes fugitifs à cette alimentation trop contraire à leur nature, ont paru beaucoup moins icatarrhes, beaucoup plus faibles, & bien moins propres, suivant la remarque d'Hippocrate, à résister aux entreprises & à la permanence de la tyrannie. C'étoit sans doute d'après des idées précises sur ce genre d'influence des nourritures végétales, que les fondateurs des ordres religieux les plus célèbres, prescrivirent dans leurs règles ces nourritures, dont les propriétés vivifiantes, bien appréciées par eux, ne répondoient pas à leurs intentions, & auroient été en contradiction avec les jeûnes, les abstinences, en un mot, avec tous les moyens employés, suivant les disciples, pour subjuguier l'homme dans l'homme, c'est-à-dire, pour asservir cet être tout intérieur d'ergéne.

Le régime végétal pourrait être plus convenable, à la vérité, dans les climats chauds, en le combinant avec des assaisonnemens à avec des bonbons stimulans. Toutefois, & même dans cette situation particulière, ce même régime végétal est bien inférieur à une alimentation mixte & à l'usage modéré des nourritures animales. Les castes qui vivent presque exclusivement de maïs, d'Inde, sont assaillies bien plutôt par cette nourriture que par l'influence du climat. Les dernières classes dans la Polynésie, ces classes, qui ne font presque point usage de substances animales, sont de beaucoup inférieures, sous le rapport des forces physiques & du volume des organes, à la classe élevée, qui use abondamment de ces substances : & ne fait-on pas aussi, que tous les nègres, & tous les naturels de l'Amérique, qui se trouvoient réduits à se nourrir, les uns de millet, les autres des graines de pois, ne pouvoient durer, & n'étoient en effet, que des hommes effrôlés, dégénérés, si on les compare aux peuplades de la même race, qui ont pu rencontrer des nourritures animales ?

Du reste, l'influence d'un régime exclusivement végétal, varie suivant les genres de nourriture qui le rapportent à ce régime, & qui sont toujours inégalement abondantes. Pour arriver à quelques données exactes & pratiques, il faut examiner ces différents genres de nourritures, & les comparer, soit entre eux, soit avec les nourritures animales qui s'en rapprochent davantage.

Les différens genres de nourritures végétales employées seules ou dans un régime mixte, se rapportent aux quatre titres suivans :

- 1°. Les substances alimentaires farineuses.
- 2°. Les alimens gommeux.
- 3°. Les alimens sucrés.
- 4°. Les substances grasses végétales.

DES NOURRITURES FARINEUSES. Les substances farineuses doivent leurs propriétés à leurs caractères à la féculé qu'elles contiennent abondamment, quelquefois pure ou presque pure, & le

plus souvent combinée avec d'autres principes qui en modifient les effets relativement à la nutrition. Ces substances, qui forment la partie essentiellement assimilable du règne végétal, luccèdent dans plusieurs plantes, au mucilage & à la matière sucrée ; elles semblent résulter d'une maturation plus parfaite, plus avancée, & ne se rencontrent jamais plus abondamment que dans certains fruits, dans un grand nombre de semences, dans plusieurs tiges, dans plusieurs bulbes.

Les racines amères, ou certaines *aristoloches* des tiges, contiennent aussi une assez grande quantité de féculé, à certaines époques de la végétation, comme on le voit pour le Sagu, les farines d'arrow-root, de Manioc, & la féculé de la pomme de terre, &c. &c.

Parmi les substances alimentaires farineuses, les amères, qui sont très-nombreuses, peuvent être employées presque sans préparation, & servent aussi à la nourriture des animaux, tandis que les autres, qui contiennent un principe végétal animal particulier (le gluten), sont propres à faire le pain, dont la faculté assimilable est égale par aucune autre substance de nature végétale.

Parmi les productions végétales propres à faire le pain, ou place au premier rang, le grain du froment (*triticum monaquum*). Le gluten, auquel cette semence doit une pareille avantage, s'y trouve dans une proportion telle que l'on peut combiner une assez grande quantité de farine qui est elle-même dépourvue, avec la farine du blé, pour en former différentes espèces de pain. Ainsi, avec une partie, soit de farine d'orge, soit de farine de maïs ou de seigle & une partie de froment, on obtient un pain très-nourrissant, & même préférable à un pain plus léger, pour les hommes qui sont employés à des travaux pénibles. Le parenchyme de la pomme de terre peut également contribuer à former un pain de bonne qualité, & qui conserve long-temps sa fraîcheur, lorsque l'on combine neuf parties de ce parenchyme & neuf parties de farine de froment, avec dix-huit livres de farine d'orge.

Les autres farines, que l'en emploie seules pour faire un pain d'une qualité inférieure, contiennent un mucilage visqueux qui permet à la farine de former une pâte, & qui rend cette pâte susceptible d'un commencement de fermentation. La séve de mûrais, le grain du seigle, la pomme de terre, fournissent cette farine, qu'il est toujours préférable d'employer avec une certaine quantité de farine de froment, lorsque l'en veut en faire du pain.

Pour préparer le pain, on forme une pâte avec de la farine & de l'eau ; on mêle cette pâte avec une certaine quantité de levain délayé avec de l'eau tiède ; on pétrit ensuite, & le mélange est abandonné à lui-même à une température de 11 à 13 degrés. La fermentation qui s'établit, convertit bientôt ce mélange en pain,

Yyy 2

qui est plus ou moins léger, plus ou moins ferme, plus ou moins nourrissant, suivant que le gluten a disparu d'une manière plus ou moins complète, par la fermentation.

Un pain bien confectionné & nouvellement cuit, ne contient que le cinquième de son poids d'humidité; il peut remplacer, suivant le rapport de M. Vanquelin (1), trois parties de pommes de terre dans l'alimentation.

Les nourritures farineuses qui ne sont pas susceptibles de lever ou de se transformer en pain, nous sont offertes par les semences des légumineuses, par le grain de plusieurs céréales, par quelques fruits, par quelques racines & par quelques tiges, qui contiennent la fécule, tantôt seule ou presque seule, & tantôt combinée, soit avec le sucre, soit avec la gomme, soit avec les principes aromatiques & même les substances vénéreuses.

Les semences de plusieurs légumineuses sont employées comme aliment; on les prépare ordinairement par décoction dans l'eau, qui doit être très-pure, & ne pas contenir de sels à base calcaire. On les assaisonne ensuite avec des corps gras qui en rendent souvent la digestion très-difficile, & qui occasionnent même, par un usage prolongé, des irritations gastriques assez graves, & qui ont été plus particulièrement observées à la fin du carême, dans les pays catholiques.

La proportion de fécule est d'ailleurs plus ou moins forte; dans les différentes semences des Légumineuses. Les semences du haricot, celles des *Phaseolus vulgaris* & *Phaseolus nanus*, par exemple, contiennent sur 3840 parties, 1580 d'amidon. La semence des pois fèves (*Pisum sativum*) contient sur la même quantité 1265 d'amidon; celle des fèves (*Faba major*), 1512 parties d'amidon; sur 3840; enfin les semences de la lentille (*Ervum lens*) en renferment 1265, sur la même quantité.

Dans une de ces semences, celle du pois, la fécule sucrée au sucre, & se trouve évidemment produite par la maturation. L'idée d'une propriété vénéreuse ou gazeuse, dans les semences des légumineuses, appartient à la classe des erreurs populaires qui ont pour origine des faits mal observés: Un dégagement de gaz ou de vents, pendant la digestion des légumineuses, a lieu en effet, au moins dans quelques circonstances, mais seulement chez les personnes qui ont l'estomac faible, & par un effet du peu de digestibilité de ces substances alimentaires.

Des parties aromatiques ou colorantes, qui sont le plus souvent unies à la fécule; dans plusieurs semences des Légumineuses, servent à compenser ce peu de digestibilité, ce qui est évident pour la Lentille, pour le Haricot rouge, mais surtout pour la Fève de marais, qui paroît devoir ses propriétés

toniques à son enveloppe, que l'on cuit avec la semence lorsqu'elle est verte.

Les graines des céréales, qui, sans être propres à faire le pain, sont très-alimentaires, nous offrent la fécule dans divers états & dans différentes proportions. L'orge, le riz parfaitement mondé, le maïs, le gros & le petit millet, la contiennent presque pure. On fait avec leur farine, des pâtes, des bouillies, mais surtout des gâteaux, des pains azymes, qui furent pendant plusieurs siècles la seule nourriture des Romains, sous différents noms, & principalement sous celui de *maza*, que l'on préparait, suivant Galien, avec de la farine d'orge torréfié.

La préparation de ces mêmes farines pour en former de la bouillie, exige un peu de temps & beaucoup de soin; elle n'est achevée qu'au moment où la fécule se combine avec l'eau, augmente de volume; ce qui arrive plus tôt pour la farine, & plus tard pour le grain, dont nous disons qu'il est *cru*, quand il présente cette tumescence: Une bouillie ainsi préparée, celle du millet, forme presque seule, sous le nom de *cous-cous*, la nourriture des peuples occidentaux de l'Afrique. Le pain levé que l'on cherche à préparer avec la farine du grain qui contient la fécule, presque pure, ne forme jamais un bon aliment; tel est le pain d'orge ou celui de riz, que l'on ne doit pas regarder comme un véritable pain, & qui se présente sous la forme de masses friables & gercées; alliant bien indifférent aux bouillies & aux pains azymes que l'on auroit faits avec la même farine.

Dans quelques autres semences, dans les semences de blé farinatif & d'avoine, la fécule se trouve réunie à une substance sucrée assez abondante, qui n'est guère moins propre que la fécule à la fermentation panariaire.

L'avoine prend le nom de *grau* lorsqu'elle est dépouillée de son enveloppe; sous cette forme, elle est souvent employée comme un moyen particulier de traitement ou de régime. La propriété stimulante de l'avoine est étrangère à ce *grau*, & n'appartient pas au péricarpe entièrement farineux, mais à l'enveloppe du grain, dans laquelle on a découvert un principe aromatique analogue à celui de la vanille. La semence d'une autre espèce de la même famille, l'Irriaie, contient la fécule dans un état de mélange, avec un principe pectinique & emusant; principe dont l'opinion vulgaire exagère les effets, qui se manifestent à peine dans la bière ou dans le pain, que l'on a préparés avec la farine qui le contient. Le froment *melle* se rapproche beaucoup de l'Irriaie par ses propriétés nuisibles; ce qui répond à l'opinion populaire, que la semence de froment ou de bon grain se change en irraie. Le blé qui a éprouvé cette altération, qui est assez fréquente dans les temps humides, & que l'on attribue au développement d'un fungus, ne contient plus de gluten.

(1) *Bulletin de la Faculté de Paris*, avril 1818.

Frères. Les fruits qui sans appartenir à la famille des Graminées contiennent abondamment la fécula, & forment des alimens tout préparés à l'homme, se trouvent principalement dans la famille des Arecacées. Le châtaignier est au premier rang; une fécula abondante est associée à ce fruit, à une assez grande portion de sève cristallisable, que l'on y trouve jusqu'à 14 pour 100, dans la variété que l'on cultive en Toscane. Les paysans de plusieurs pays, soit en Italie, soit en France, mais surtout dans les départemens de la Dordogne & de la Corrèze, sont presque exclusivement nourris avec le fruit du châtaignier, & sans faire usage de boissons fermentées ni de boissons aromatiques. Cette alimentation a paru exercer une influence assez remarquable sur l'intelligence de ces hommes, qui sont, en général, beaucoup moins adifs, beaucoup moins industrieux que le peuple des autres provinces, surtout dans le temps où l'on mange la châtaigne verte; époque où les curés de plusieurs villages de ces provinces ont avoué que l'instruction religieuse devenoit presque impossible, la stupidité de ces hommes paroissant alors portée au plus haut degré.

Plusieurs fruits, qui donnent quelques espèces de la même famille, le gland nourricier (*Quercus esculenta*), le gland du chêne baliste, sont aussi très-farineux, & forment, comme la Châtaigne, le fonds de subsistance de plusieurs contrées. La fécula très-abondante dans le fruit du Coudrier, s'y trouve associée à un principe aromatique assez agréable.

Le fruit de l'arbre à pain; que l'on pourroit supposer farineux, d'après ses propriétés si évidemment alimentaires, n'a pas encore été analysé par les chimistes; il est composé d'ailleurs de l'enveloppe des fleurs, qui, devenues succulentes, se soudeit estreintes avec les pédoncules, pour former un fruit agglomé, comme nous le voyons dans le marier. Le fruit de l'arbre à pain est la principale nourriture de plusieurs peuplades de la mer du Sud; & quelquefois aussi gros que la tête, ce fruit contient abondamment une pulpe farineuse, & lorsque les graines ont avorté par l'effet de la culture, la chair, qui devient pulpeuse, appuie, lorsqu'elle est cuite, la faveur d'un pain frais; quo l'on auroit mêlé avec la pulpe du topinambour.

Plusieurs tiges appartiennent aux alimens farineux; telles sont les tiges du Sagoutier & des Palmiers en général, qui donnent presque tous, si l'on en excepte l'*Areca catechu*, une fécula excellente, connue sous le nom de sagou, qui ne paroît pas d'ailleurs mériter la préférence que l'opinion vulgaire lui donne sur les autres féculos.

Des racines farineuses contiennent presque toujours la fécula dans un état de combinaison avec des principes aromatiques, & quelquefois même

avec des principes acres ou vénéneux; telles sont les racines tubéreuses de plusieurs orchis, mais principalement de l'*Orchis mono*, qui donne le salep, les racines tubéreuses du *Marrube indica*, connu sous le nom d'arrow-root, celles de la patate ou *Convolvulus batatas*, du *Convolvulus edulis*, du pied-de-vin & des arômes en général, du manioc (*Jatropha manihot*).

Différens moyens sont employés pour extraire une fécula très-pure de ces différentes racines. La racine du manioc, en particulier est soumise à plusieurs préparations, qui ont pour objet de la rendre tout à la fois salubre & alimentaire. On commence en Amérique par extraire tout le suc de cette racine; on fait ensuite sécher cette dernière au soleil; on la pulvérise, & l'on prépare avec la farine, qui porte le nom de cassave, un pain qui est cuit sur une plaque de fer chaud, & qui forme alors une galette ou pain azyme, avec lequel les nègres sont nourris dans les colonies. La farine connue sous le nom de tapioca, n'est rien autre chose que la fécula de manioc bien purifiée & soumise à une légère torréfaction.

La pomme de terre, que l'on regarde vulgairement comme la racine des *Solanum tuberosum* & *montanum*, paroît appartenir, suivant M. de Caudollé, à un organe absolument analogue aux tiges souterraines. Quoi, qu'il en soit, la pomme de terre est aujourd'hui un des alimens farineux le plus utile & le plus abondamment répandus dans toute l'Europe. Le parenchyme de la pomme de terre est très-humide; la farine contient une grande portion de mucilage épais & une portion moins considérable de fécula, que l'on parvient facilement à extraire. Un extrait mucilagineux & visqueux se trouve dans ce même parenchyme, en très-petite quantité à la vérité, & comme pour rappeler seulement la famille dangereuse à laquelle les *Solanum tuberosum* & *montanum* appartiennent.

Ce principe est beaucoup plus développé, lorsque ces plantes ont été cultivées dans un terrain humide; il paroît se séparer de la matière mucilagineuse & farineuse par la décoction, & de telle sorte, que l'eau qui auroit servi plusieurs fois pour faire cuire les pommes de terre, seroit plus propre à cet usage, ainsi que paroît le prouver une observation de Lemonnier, sur l'empoisonnement d'une famille, avec des pommes de terre ainsi préparées.

La pomme de terre se consomme le plus souvent sans autre préparation que la cuisson dans l'eau, ou sous la cendre. Sa fécula sert aux mêmes usages que les autres féculos. La pomme de terre écrasée & réduite en pâte, peut servir à l'aide du mucilage très-abondant qu'elle contient. On prépare ainsi un pain d'assez bonne qualité, mais bien inférieur à celui que l'on obtient de la fa-

le grain du froment, soit avec la semence de plusieurs autres céréales.

La formation du sucre, dans ces grains, qui ont donné, explique cette formation, & la possibilité d'obtenir deux fois aux-de-vie des mêmes substances, & de la Cane des pommes de terre.

Aliments gommeux & mucilagineux. Les aliments gommeux & mucilagineux, qui sont par la plupart à nous nutritifs que les aliments farineux, peuvent être regardés comme la base d'une alimentation adoucissante, souvent recommandée dans plusieurs états d'indisposition ou de maladie. Le plus grand nombre des fruits appartient à cette classe d'aliments. Les racines, les feuilles, les tiges de plusieurs plantes employées comme nourriture, ou mêlées du moins dans une diète mixte, à beaucoup d'autres substances alimentaires, contiennent aussi beaucoup de mucilage, qui souvent s'y trouve étendu dans une assez grande quantité d'eau pour empêcher la viscosité.

Les fruits proprement dits, c'est-à-dire, le péricarpe d'un grand nombre de fruits, si l'on en excepte le fruit de l'arbre à pain, que nous avons déjà cité, les figues & les dattes seches, ne pourrions jamais servir de fonds de substance à aucun peuple. Dans les figues seches & dans les dattes, le mucilage étant plus cossifiant, & étant uni d'ailleurs à une grande quantité de sucre, fait souvent une portion considérable de la nourriture, & à très-petite dose, des pauvres habitants de l'Égypte & de la Syrie, qui sont une des classes d'hommes les plus mal nourris & les plus misérables (1).

On devroit rapporter aux fruits qui peuvent être regardés comme aliments, le réceptacle de l'artichaut & celui de plusieurs autres Ciarocéphales, qui sont très-bons à manger quand on les emploie avant l'épanouissement des fleurs. Le réceptacle de l'*Onopordon*, des *Carduus*, de la *Cardus acanthifolia*, dont l'usage est habituel dans les Pyrénées, les Cévennes & les Alpes méditerranéennes.

Les autres fruits moins nourrissants, & que l'on mêle par divers motifs à d'autres substances alimentaires, appartiennent à un grand nombre de familles naturelles; aux *HESPERIQUES*, par exemple (les oranges, les citrons, les pampelmonnes), aux *GROSSELLERS*, aux *CACTIENS* (les groseilles blanches & rouges), aux *BRYTERES* (les fruits des canneberges), aux *VIOSES* (les raisins), aux *URTICÉES* (les mûres, la figue, les papayers), aux *CECOTRACIQUES* (les courcubres, les potirons, les melons), enfin, aux *SOLANÉES* (les tomates, la pomme d'amour, la melongène, très-recherchée par les Espagnols), aux *PALMIERS* (les dattes, la

noix du coco); aux *DARYNIZIQUES* (les bananes), aux *BROMELIQUES*, petit groupe de la famille des *LILIACÉES* (les ananas); aux *MERTIQUES* (les goyaves, la geniale), & à quelle à quelle *FAMILLES* (un grand nombre de fruits de la famille des *ROSACEES* & des *ROSACEES*, que la nature a répandus avec profusion dans les plus belles contrées de l'Amérique & de l'Asie).

Un fonds de subsistance exclusivement fourni par les différents fruits dont nous venons de faire l'énumération, ne paroit guère admissible que dans quelques cas de maladie, & il faut regarder comme des exceptions, ce que l'on rapporte à ce sujet des Persans méridionaux, des Indiens & des classes inférieures du peuple de Constantinople.

Les fruits les plus nourrissants sont, tous ceux qui sont très-sucrés & un peu cossifiants, les prunes, les abricots, les poires; du reste, ces fruits & tous les autres fruits contiennent beaucoup d'eau; ce qui est plus remarquable pour quelques-uns, tels que les passifloras ou *melons* d'eau, qui sont très-fraichillants, & dont, suivant Bernier & Chardin, les Persans peuvent manger, dans les jours les plus chauds de l'année, jusqu'à trente-six livres dans un jour, sans aucun autre inconvénient que celui d'une soif abondante, qui sort par tous les points de la peau, comme d'un crible, d'après les expressions de l'un de ces voyageurs.

Cette quantité d'eau rend plusieurs fruits nuisibles pour beaucoup de personnes, ainsi que l'acribité ou l'acidité de quelques autres, leur arôme particulier, la viscosité de leur mucilage, la fermeté de leur chair, & plus encore le principe irritant dont la maturité & la culture ne les ont pas dégagés entièrement (les fruits des *CUCURBITACÉES*).

Le ferment ou la matière propre à fermenter, que plusieurs fruits contiennent lui au sucre, peut aussi donner lieu à des inconvénients assez graves, lorsque des personnes, dont l'estomac est assez foible, mettent ces fruits à d'autres aliments, ou en font usage sous la forme de dessert, à la fin des repas.

Plusieurs fruits restent toujours acides & ne deviennent mangesables que si on les fait cuire (les poires de Calignac, les poires de lèves), ou, lorsqu'abandonnés à eux-mêmes, ils éprouvent spontanément le commencement d'altération qui les rend blêches (les nêles).

Les fers & les liquides tirés de plusieurs fruits sont très-nuisibles lorsqu'ils commencent à tourner à l'aigre, & peuvent produire alors des coliques violentes, la colique du Poitou, celle du Devonshire, qui est comparée à la colique de plomb. Toutes les personnes dont les organes de la digestion sont foibles, ou malades par un état habituel rhumatismal ou gouteux, digèrent assez

(1) Voyage de Ptolemy.

mal les fruits, si on ne les fait pas cuire & si on ne les associe pas à des toniques. Chez quelques-uns de ces personnes, il suffit quelquefois pour perdre, au moins pendant quelque temps, cette malheureuse susceptibilité, de prendre un peu de thériaque vieille avant le repas. Du reste, l'usage de manger beaucoup de fruits à la fin des repas est un des plus mal-entendus, & l'on ne peut en comprendre l'inocuité, pour le plus grand nombre, que par l'effet de cette force, de cette élasticité de l'organisation de l'homme, qui le prête aisément à tous les excès & s'accommodent si facilement à tous les régimes. D'une autre part, l'usage très-abondant des fruits pour le peuple, dans quelques saisons, ne produit pas la dysenterie & n'est point aussi dangereux que certaines opinions populaires l'ont fait supposer.

Les fruits contiennent, avec une quantité plus ou moins considérable d'eau, un mucilage plus ou moins visqueux. Beaucoup de fruits en général, au moment de la maturité, renferment plusieurs acides, dont les plus répandus sont l'acide malique, l'acide citrique, &c., & quelques principes colorans, aromatiques & pichéliers. Quelques-uns renferment aussi de la gomme, du tannin & une substance végétalo-animale analogue à l'albumine & au gluten.

RACINES. Les racines qui sont le plus employées comme alimens appartiennent aux **OMBELLIFÈRES** (1), aux **COMPOSÉES** (2), aux **CHÉNOPODIÈRES** (3), aux **CUCURBITACÉES** (4); elles sont plus ou moins charnues, tantôt filiformes, tantôt tubéreuses. Plusieurs de ces racines contiennent, avec le mucilage ou le principe gommeux, une assez grande quantité de sucre (la racine de betterave, celle de carottes, du navet, du panais, &c.). Ce mélange mucoso-sucré, qui rend les racines très-nourrissantes, est tellement inhérent à celles des **Ombellifères**, qu'on le retrouve dans quelques plantes vénéneuses de cette famille, par exemple dans les racines de l'*Eranthe pinnatifida*, comme nous l'avons déjà remarqué dans l'un des paragraphes précédens.

Dans les racines rangées parmi les alimens mucilagineux, plusieurs contiennent du ferment ou une matière propre à fermenter (le navet, le panais); d'autres un principe très-acide, qui les rend stimulantes, comme on le voit pour le Raifort, le Radis, le Rave, &c., que l'on emploie plutôt comme assaisonnement que comme aliment, & qui paraissent surtout indiqués pour

réprimer, par un usage habituel, une augmentation morbide de sécrétion, que l'on désigne sous le nom vulgaire d'*état glaireux* ou *maigre*.

Les bulbes des **ALLIACIÉS** (1), qui sont également employés plutôt comme assaisonnement que comme nourriture, doivent être aussi rapportés à la classe des alimens gommeux. Leur composition diffère d'ailleurs beaucoup de celle des autres plantes dont nous rangeons les racines sous ce titre.

La plupart des racines que nous venons d'indiquer, ont besoin de l'homme des alimens salubres. Mais il ne faut pas cependant regarder tout-à-fait comme une erreur populaire, l'opinion qui attribue à quelques-unes, la propriété de donner des vents, dont Montaigne accusait le raifort, & qui dépend pour le panais, le navet, ainsi que pour plusieurs autres nourritures végétales, d'un ferment ou d'une matière propre à fermenter, unie à la matière sucrée : matière dont les effets ne sont convenablement arrêtés que par des organes digestifs un peu robustes.

TIGES & FEUILLES. Les tiges & les feuilles qui, dans plusieurs familles, servent à la nourriture de la plupart des animaux domestiques, ne peuvent être employées pour l'homme à un pareil usage. On les combine seulement, dans différentes proportions, sous le nom de *salades* & de *légumes*, avec d'autres substances alimentaires beaucoup plus nutritives.

Les feuilles, les tiges des **MALVACÉES**, dont le mucilage est abondant, mais visqueux, quoique rarement employées, ne sont pas négligées, surtout lorsque la plaie est très-jeuue.

L'*hibiscus esculentus*, en particulier, fait partie, dans l'Inde, d'une composition alimentaire, que l'on prépare avec le riz.

Les autres familles naturelles qui fournissent des légumes, des salades, sont les **COMPOSÉES** (l'endive, la laitue, toutes les espèces du groupe des *chicorées*); les **VALÉRIANÉES** (les mâches); les **CHÉNOPODIÈRES** (l'épinard); les **ASPARAGIÉS** (l'asperge); les **CUCURBITACÉES** (les différentes espèces de choux); les **PALMIÈRES** (les choux palmistes, les pourpiets, les ficoides); enfin les **POLYCONIÉS**, dont toutes les jeunes pousses, remarquables par leur acidité dans l'oseille (*rumex acetosa*), fournissent un aliment sain & agréable dans la plupart des autres espèces, (le *rumex alpinus*) employé en Hongrie, les *rhums rapanum*, *undulatum*, qui se mangent en Sibérie.

Les tiges ou les feuilles de ces plantes, très-jeunes, assouplies ou adoucies par un étiolement

(1) La Carotte (*Daucus carota*), le Panais (*Pastinaca sativa*), l'Angélique (*Angelica archangelica*), le Persil (*Eryngium campense*).

(2) Le Salicé (*Tragopogon portifolium*, *T. pratensis*), le Scrofille (*Scorzonera hispanica*, &c. humide).

(3) La Bête (*Beta vulgaris*), la Bête (*Beta*), l'Epinard (*Spinacia oleracea*).

(4) Le Navet (*Brassica napus*), les Raves (*Brassica Rapa*), le Chou-rave (*Brassica caulorapa*).

(1) On trouve dans l'Oignon (*Allium cepa*), du sucre liquide, du mucilage analogue à celui de la gomme arabe, une matière visqueuse animale, une huile fluide, contenue du soufre. Si l'on abandonne le sucre de ce bulbe à lui-même, à la température de quinze à vingt degrés, il se forme de l'acide nitrique & de la mannose.

artificiel,

artificiel, contiennent un mucilage très-délayé & plus ou moins aromatique. Quelques-unes peuvent être mangées sans être cuites, sous forme de salade, genre d'aliment que les estomacs faibles ne peuvent supporter, mais qui toutefois n'occasionne que rarement des indigestions.

Les feuilles ou les sommets des plantes qui appartiennent à la famille des Composées, des Pourpiers, des Valérianes, & même les feuilles de quelques Crucifères (celles du Cresson), sont principalement employées sous cette forme de salade.

D'autres feuilles & d'autres tiges, également très-mucilagineuses, présentent un aliment très-léger, lorsqu'elles ont été cuites & convenablement assaisonnées; (l'Épinard, la Chicorée, le Cresson lui-même, & le *Phytolacca*, fort en usage à Cayenne.)

La fécula verte qui se trouve réunie à l'un de ces aliments (l'Épinard), n'en diminue pas la digestibilité, comme quelques personnes l'ont pensé; c'est un principe qui, comme plusieurs autres substances aromatiques ou colorantes, résiste aux fonctions nutritives sans en troubler l'exécution. Un autre principe particulier, mais végétal-animal, l'*Asparagine*, appartient aussi à ce genre de principe, mais paraît beaucoup plus astringent que la fécula verte dont nous parlons. Toutes les jeunes tiges des Asparagées, qui répondent aux choux palmiers, contiennent, dans toutes les espèces de ce genre, ce principe, qui paraît agir si puissamment sur la sécrétion urinaire.

Les Choux palmiers dont nous venons de parler consistent dans une substance herbacée, mucilagineuse & nourrissante, qui sert d'aliment dans tous les pays de la terre où croissent les palmiers.

Les tiges & les feuilles des Crucifères, mais principalement celles du Chou, du Chou-fleur, du Chou brocoli, contiennent toutes un principe plus ou moins âcre, sensiblement modéré par l'étiolement; toutes ces substances exigent un certain degré de cuisson & d'assaisonnement.

Les personnes dont l'estomac est faible ne peuvent guère les digérer sans avoir des renvois de cet aliment, ou sans rendre des gaz qui ont l'odeur de l'hydrogène sulfuré.

On prépare, par la fermentation acide des choux, la *sauerkraut*, remarquable par des propriétés stimulantes, qui l'ont fait ranger parmi les antifebrilitiques les plus efficaces. Plusieurs plantes dont les sommets contiennent un mucilage aqueux associé à un principe aromatique très-développé, ne sont en usage que pour des assaisonnements; tels sont, parmi les Umbellifères, le Cerfeuil & le Persil; & dans les Labiées, le Thym, la Sarriette, la Marjolaine.

SUCS GOMMEUX ET MUCQUEUX. Les sucs gommeux & mucqueux qui peuvent servir & qui servent quelquefois au besoin comme aliments, sont les

MÉDICINE. Tome X.

différentes espèces de gomme elles-mêmes, & la manne qui s'écoule par exsudation des écorces de plusieurs frênes, du *Fraxinus rotundifolia* de la Calabre, du *F. ornus* & du *F. excelsior*.

Les GOMMES dont nous avons déjà parlé sont des sucs qui furent par exsudation de l'écorce & des racines de plusieurs plantes de la grande famille des Légumineuses, de l'*Acacia senegalensis*, de l'*A. nilotica*, & de l'*A. arabica*, qui donne la gomme arabique, & enfin de l'*A. cretica*, de l'*A. gummifer*, qui produisent la gomme adragant, & de l'*Hedysarum althagi*, qui produit une espèce de manne.

Les gommes sont intrinsécatissables, insolubles dans l'alcool, non susceptibles de fermentation. Elles forment avec l'eau, qui les dissout si facilement, un mélange plus ou moins épais. Une très-petite portion de gomme très-pure, comme la gomme adragant, dont souvent la propriété de se gonfler si merveilleusement dans l'eau froide, à un principe particulier que M. Bucholz a découvert, & qui entre dans sa composition pour 43 centièmes. Quoique les gommes contiennent pas d'azote; elles sont éminemment nutritives. Les Arabes, dans la traversée du grand désert, n'ont pas souvent d'autre nourriture. La manne est plutôt employée comme médicament que comme aliment; cependant, lorsqu'elle est fraîche, & par cela même moins purgative, les habitants de la Calabre la font servir à la nourriture. La manne contient abondamment un principe immédiat particulier, la *mannite*, insoluble dans l'alcool, composé d'un principe mucqueux d'une nature analogue au sucre, & d'un principe particulier, auquel il doit son odeur & sa saveur. Il n'est pas rare de rencontrer dans la pratique de la médecine, des personnes qui sont peu ou point purgées par la manne, & qui digèrent fort bien ce médicament, dont une erreur, à la fois scientifique & populaire, a fait penser qu'il agissoit par indigestion.

La gomme peut entrer avec avantage dans un grand nombre de préparations alimentaires. Pour en citer un exemple particulier, nous devons dire qu'une très-petite portion de gomme adragant, habilement combinée avec le chocolat, rend ce dernier beaucoup plus agréable, plus léger & plus disposé à donner une écume abondante, lorsque l'on veut le faire mousser au moment d'en faire usage.

SUBSTANCES HUILEUSES. Les substances huileuses végétales diffèrent peu, par leur composition, des graisses ou huiles animales.

Les huiles grasses sont les seules qui servent comme aliment; elles contiennent dans différentes proportions la STÉARINE & L'ELAÏNE, principes communs à toutes les substances grasses. Il faut d'ailleurs rapporter aux aliments végétaux gras, non-seulement les huiles diverses, celles

Z 222

de l'Olivier, de Colza, de Pavots, mais les fruits, les semences qui les fournissent.

L'Olivier, toutes les espèces de ce genre, & plusieurs autres espèces de la famille des *Oliviers* sont au premier rang parmi les fruits, & paraissent être les seuls qui contiennent une huile fixe dans la périsperme.

A la suite de l'olive viennent les semences émoussées, les semences émoussées éminemment grasses & douces (l'amande douce), les semences émoussées peu sèches, mais froides, & les semences émoussées unies à une certaine quantité d'acide prussique.

Les semences émoussées ne sont guère employées pour nourrir, que sous forme d'émulsion, & l'huile s'y trouve tellement unie à la fécule, tellement distribuée dans toutes les parties de la graine, que la décoloration de ces semences présente une extrême difficulté, quand on n'ajoute pas un peu de potasse à l'eau employée pour cette préparation.

Les olives fraîches font d'une amertume insupportable; celles que l'on sert sur nos tables ont été dépourvues de leur âcreté, & attendries, en les faisant macérer dans l'huile: c'est un condiment que l'on doit rejeter, comme étant très-propre à irriter les voies gastriques & à donner le feu chaudi.

On rapporte encore aux aliments végétaux de nature grasse & huileuse, la Noix, les Noisettes, la Noix du coco, & les semences du *Theobroma*. (Voyez ce mot.)

Le noyau & la partie charnue du Cocotier contiennent une grande quantité d'huile grasse qui se lisse facilement, & forme ce que l'on appelle le *beurre végétal*. Cette substance s'y trouve unie avec du sucre liquide (partie mucosifiée) & de l'albumine.

La noix de cacao, comme la noix du cocotier, est très-nourrissante: on prépare le suc gras qu'elle fournit, pour la rendre plus facile à digérer, par la torréfaction, qui lui enlève une partie surabondante de son huile & dispose cette substance à la consistance de diverses espèces de chocolat, qui vaient suivant le degré de cette torréfaction, la division du cacao & les substances aromatiques employées comme assaisonnement.

L'arôme particulier du cacao est très-stimulant pour quelques personnes, auxquelles il donne constamment des palpitations & des insomnies.

SEMANCES VÉGÉTO-ANIMALES. Nous désignons sous ce nom, le parenchyme plus ou moins serré, des champignons comestibles. Ce parenchyme ne contient pas seulement une substance animale qui a quelque analogie avec le gluten (la fongine); il renferme aussi de l'adipocire, de l'albumine, de la matière sucrée, & enfin une substance animale & une matière grasse, beaucoup

plus abondante dans les champignons vénéneux, & qui paroît, suivant M. Vauquelin, la cause principale de leurs propriétés. Nous devons dire en passant que les parenchymes des champignons seraient beaucoup plus nutritifs, sans la consistance de leur tissu, qui les rend assez difficiles à digérer. On ne compte d'ailleurs d'espèces comestibles que dans les genres *helvelle*, *clavaire*, *hydne*, *bolet*, *mérulle*, *agaric*, *morille* & *truffe*.

Les Morilles & les Truffes présentent beaucoup plus d'uniformité, relativement à leurs propriétés comestibles, que les autres genres.

Toutefois, les grandes anomalies ne se rencontrent que pour les champignons à chapeau bien distinct (les Bolets & les Agarics). Aucune des autres espèces des genres que nous venons d'indiquer, les Helvelles, les Hydnes, &c., ne sont vénéneuses, & si un petit nombre seulement est regardé comme comestible, c'est que la plupart présente un tissu trop filandreux ou trop coriace. Toutes les helvelles qui se mangent sont analogues aux morilles. Les Clavaires *conoides* & *cineræ*, qui portent dans plusieurs provinces les noms vulgaires de *Barbe de bouc*, de *Bouquinbantes*, de *Gallinules*, de *Trupettes*, de *Barbe de chèvre*, de *Pattes d'ailleur*, croissent sur la terre, & sont assez considérables pour être recherchées. Dans les hydnes, l'*Hydnum erinaceum*, qui vient sur les vieux chênes, est recherché dans les Vosges, & l'*Hydnum conoides*, dans le Piémont; l'*Hydnum tete de Méduse*, en Italie; l'*Hydnum repandum*, dans quelques provinces, & l'*Hydnum auriscalpium*, sous le nom de *brouquichons*, dans le département du Gers.

Les espèces du genre *Mérules* sont trop coriaces pour servir d'aliment, excepté le *mérulus cantharellus*, connu sous les noms vulgaires de *Girille*, *Escaru*, *Girolle*, suivant les provinces.

Des anomalies assez grandes existent dans les Bolets & les Agarics. l'*hymenium* ou la partie du chapeau qui porte les graines, est la partie la plus suspecte dans les espèces de ces deux genres. Si on l'enlève, on diminue de beaucoup l'arête vénéneuse du champignon; c'est ce que les emuliers appelaient *ôter le fond du champignon*.

M. du Candolle, dont l'ouvrage sur les propriétés médicales des plantes doit être enrichi, pour plus de détail, sur les causes & sur les signes des propriétés vénéneuses des champignons, dans les divers genres de cette nombreuse famille, remarque, avec beaucoup de raison, que la matière qui fait la base du parenchyme dans toutes les espèces, est toujours alimentaire ou comestible par elle-même, & que tout le danger résulte de son mélange avec diverses substances, que l'on peut extraire, même des espèces les plus vénéneuses, ainsi que le prouve l'exemple de plusieurs pays.

Quoi qu'il en soit, on s'accorde, dans l'état

présent des connoissances, à regarder, comme champignons comestibles, les différentes espèces de Morilles & de Truffes. En général, les espèces les plus nuisibles sont ordinairement parasites; ce qui explique l'inocuité des champignons élevés sur couche. Le degré de maturité, une altération ou certaines altérations spontanées, peuvent, ajouter beaucoup aux qualités malsaines des champignons vénéneux, ou en développer dans les champignons comestibles; ce qui a échappé point à l'observation des inspecteurs de ces substances, dans les marchés des grandes villes. La cuisson dans l'eau faible affoiblit beaucoup les propriétés vénéneuses des champignons les plus nuisibles.

NOURRITURES ANIMALES. Les nourritures animales, comme les nourritures végétales, présentent de grandes diversités suivant les différentes espèces, ou même suivant les diverses parties de l'individu d'une même espèce qui les fournissent. On les déligne vulgairement sous le nom générique de *chairs*, qui s'applique également, les & exceptés, à toutes les parties d'un animal qui sont employées comme aliment.

La Chair, suivant les apparences; suivant la nature, l'âge, le régime de l'animal, est plus ou moins dure, plus ou moins consistante, par cela même plus ou moins facile à digérer. Toutes choses égales d'ailleurs, la chair humide & comme visqueuse des très-jeunes animaux, nourrit mal, est laxative, pour nous servir d'une expression d'Hippocrate. La chair des vieux animaux, ou des animaux amaigris par le travail, est coriace, résistante aux voies digestives & trop animalisée.

D'après une expérience journalière & usuelle, on peut rapporter aux titres suivants les différentes espèces de nourritures animales, qui sont placées entre ces deux extrêmes; savoir :

1^{re}. Les nourritures fibrineuses.

2^{es}. Les nourritures gélatineuses.

3^{es}. Les nourritures albumineuses & oléo-albumineuses.

4^{es}. Les matières grasses.

NOURRITURES FIBRINEUSES. Aucun des aliments que nous rapportons à ce titre, ne se compose uniquement de la fibrine; ils la contiennent seulement dans une proportion plus forte que les autres aliments.

Les animaux qui fournissent le plus ordinairement les aliments fibrineux, sont le Mouton, le Bœuf, le Chevreuil, les oiseaux de basse-cour, le Pigeon, le Faisan, la Perdrix, l'Oie, le Canard, enfin, le petit Gibier, plusieurs oiseaux adultes, mais surtout les oiseaux de rivage, sans en excepter la Macreuse; enfin, la plupart des animaux dont on a pu se servir avec succès les chairs moins molles & moins gélatineuses.

Les aliments tirés de ces différentes espèces

d'animaux, & surtout des parties les plus musculaires, des lombes, des membres inférieurs, sous les noms de *filets*, & de *quartiers*; ces aliments sont très-nutritifs, & on observe constamment que leur digestion est accompagnée d'un développement de chaleur assez considérable. L'osmazome, qui se trouve dans ces nourritures & qui se développe par la cuisson, contribue aussi à leur digestibilité, ainsi que la matière colorante & le principe aromatique de plusieurs oiseaux adultes & de certain gibier, plus ou moins noir, plus ou moins fatidique, auquel l'opinion populaire a souvent attribué de singulières propriétés (1).

A volume égal, les aliments fibrineux sont beaucoup plus nourrissants que les autres aliments. Ils soutiennent mieux aussi l'action des voies digestives, & sont préférables en petite quantité, pour les personnes dont les organes de la digestion, sans être atteints d'aucune altération morbide, sont essentiellement, directement faibles, & tout-à-fait incapables du degré suffisant d'énergie, pour l'élaboration des substances végétales.

Les nourritures fibrineuses prises en trop grande quantité, ou intempestivement employées à la suite de grandes maladies, ou après un régime exclusivement végétal, doivent être rangées parmi les causes prédisposantes des maladies inflammatoires, des congestions sanguines, de la diabète gastrique, &c. &c. On a rapporté à ce sujet un exemple assez remarquable, dans le *Journal de médecine*. Un homme, jusqu'à l'âge de trente ans, avoit vécu exclusivement de lait, d'œufs & de légumes. Pressé par ses amis de changer de régime, il prit d'abord du bonbon de bœuf & de mouton; il s'accommoda ensuite & graduellement de la chair elle-même, & finit par se nourrir comme les autres hommes. Cette révolution ne fut pas cependant dans la suite sans un inconvénient assez grave pour ce pythagoricien. Elle changea sensiblement sa complexion, & devint pour lui la cause bien directe de plusieurs indispositions, qui jusque-là lui avoient été inconnues. (*Journal de médecine*, tom. XIII, pag. 157.)

On fait, par plusieurs expériences qui ont été faites sur les animaux carnassiers, que le chyle cesse d'être opaque & devient comme transparent, lorsque, pendant quelque temps, on a substitué des aliments végétaux aux nourritures animales; il est bien probable que quelque chose de semblable arrive pour l'homme. Quoi qu'il en soit, les nourritures fibrineuses sont contre-indiquées dans tous les cas où il y a excès de nutrition, d'embonpoint, d'excitation. Il est même vraisemblable, & d'après les remarques in-

(1) La propriété de donner de la mémoire, par exemple, que l'auteur de la *Médecine de l'Esprit* attribue à la chair du bœuf.

généreuses de M. Magendie sur la gravelle, que, toutes choses égales d'ailleurs, on parviendrait, dans quelques cas, à affaiblir sensiblement les dispositions à cette maladie, & même l'intensité d'une diathèse goutteuse, en diminuant, dans un temps donné, la quantité de substances animales, mais surtout des aliments fibreux, qui contiennent beaucoup plus d'azote que les autres nourritures.

Quant à la propriété stimulante & générale des mêmes aliments, elle devient surtout évidente dans les maladies fébriles ou inflammatoires, pendant la durée desquelles la substitution, par méprise, d'un bouillon de bœuf, à un décoctum de polypes maigres, peut donner un redoublement.

ALIMENS FIBREUX-GÉLATINEUX. Dans les aliments désignés sous ce titre, ce qui comprend les différentes espèces de viandes blanches, la gélatine n'est pas seulement plus ou moins abondante; elle se trouve en outre plus ou moins élaborée, plus ou moins mélangée avec d'autres substances, qui en modifient les propriétés. Les ligaments, les tendons, la peau, plusieurs viscères, & ce qu'on appelle, en général, les *basses viandes*, appartiennent à cette classe. On comprend également, parmi des aliments gélatineux, les chairs imparfaites, visqueuses & toujours humides des très-jeunes animaux; les chairs blanchâtres & huileuses du plus grand nombre des poissons; la chair un peu plus fibreuse du Veau, de l'Agneau, des oiseaux très-jeunes, des Grenouilles; enfin, les chairs blanches, molles des jeunes volailles de basse-cour, des jeunes gibiers, des poissons saxatiles, tels que le Merlan, la Limande & les chairs élaborées & pénétrées de graisse, des volailles que l'on a engraisées par le repos & par un régime particulier. Ces deux dernières espèces de viande sont bien préférables aux autres, surtout les viandes blanches & molles des jeunes volailles, des perdreaux, qui conviennent aux personnes faibles ou convalescentes.

Les viandes plus gélatineuses, plus humides, en même temps plus grasses, celles du cochon de lait, par exemple, & d'un grand nombre de poissons, se digèrent en général assez mal, & provoquent, par l'effet d'une forte indigestion, des garde-robes très-abondantes.

Lorsque l'on remarque que les os, traités suivant le procédé de M. Darcel, par l'acide hydrochlorique, donnent jusqu'à 50 pour 100 de gélatine, on pourroit les comprendre, ainsi que les végétaux, parmi les substances gélatineuses. Quoi qu'il en soit, la gélatine, dont nous avons déjà parlé, la gélatine extraite des os & des autres substances animales, est souvent employée seule, avec des assaisonnemens, sous le nom de *gelée*, qui nourrit sous un petit volume, & qui se trouve quelquefois le seul aliment que l'on puisse supporter dans certaines névroses gastriques, on pendant la durée des maladies assez graves de l'intes-

tin. La gelée de corne de cerf, & la gelée préparée avec la colle de poisson, sont préférées toutefois dans ces circonstances; elles paraissent beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à digérer, beaucoup moins irritantes, que la gelée que l'on obtient de la chair du bœuf, du veau, de la volaille, qui n'est jamais bien dégréagée d'osmazome ou de matière fibrineuse (1).

MATIÈRES ESSENTIELLEMENT GRASSES. Les différentes espèces de graisses animales sont employées dans un grand nombre de préparations alimentaires, & quoiqu'elles ne contiennent pas d'azote, elles peuvent servir puissamment à la nutrition, comme on le voit chez les animaux à sommeil hibernant. Dans l'état le plus ordinaire, la graisse se trouve mêlée dans une certaine proportion; avec les différentes espèces de chair, & c'est là ce que nous appelons les *aliments gras*, dont nous devons nous occuper dans ce paragraphe. Nous rapporterons à ce titre, les chairs abreuverées de graisse, plusieurs volailles que l'on engraisse à dessein & par un régime particulier. Certaines parties de ces animaux, mais surtout les foies gras, les chairs huileuses d'un grand nombre de poissons, de l'Anguille, par exemple, de l'Alose, du Saumon, du Turbot; il faut rapporter aussi aux aliments gras, la chair visqueuse de la Tortue, & les viandes plus fermes, plus fibreuses, du Sanglier & du Cochon domestique.

De toutes les viandes grasses, celles que fournissent ces grands quadrupèdes, ont moins d'inconvénients: elle est très-rarement saturée par la graisse, qui se trouve placée sous la peau, sous la forme de lard, & qui se digère d'ailleurs beaucoup plus facilement que les autres graisses; du reste, les aliments gras fourrés par les poissons ou par les mammifères, ont tous, à un degré plus ou moins fort, l'inconvénient de se digérer avec lenteur, de ne pas exciter convenablement la surface gastrique & les voies biliaires, & d'occasionner par cela même des indigestions, ou du moins des digestions très-laborieuses, & le plus souvent accompagnées de rapports nauséux.

Plusieurs substances alimentaires rangées parmi les nourritures grasses, mais principalement toutes les chairs boncancées, fumées, salées, qui sont répandues dans le commerce sous le nom de *jambon*, se digèrent très-bien lorsqu'on les prend en petite quantité; elles sont toniques, & peuvent, au besoin, devenir la base d'une alimentation médicamenteuse, comme on le voit dans le traitement du diabète & du dévoiement blanc des enfans.

Les substances employées comme nourritures grasses, présentent d'ailleurs de grandes différences, comme il sera facile de le voir par la variété des articles que comprend la charcuterie, dont

(1) Confondre ce passage avec ce qui a été dit en parlant de la gélatine.

plusieurs parties n'ont pas été sans raison, fournies à plusieurs ordonnances de police.

Le sang des animaux & les différentes préparations dont il est la base, se trouvent au premier rang parmi ces articles, sous la forme de *boudins*, de *saucissons*, de *saucisses*, &c. Ces compositions alimentaires ne doivent guère être indiquées ici que pour être proscrites. Leur usage a tous les inconvénients des nourritures trop grasses, trop animalisées. Il est rare qu'il ne donne pas lieu, chez les personnes dont l'estomac est tout à la fois irritable & foible, à une digestion laborieuse, à des flatulences, & au symptôme si pénible, que l'on connoît sous le nom de *pyrosis* ou *fer chaud*.

Parmi les graisses animales que l'on emploie seules, mais en les associant à diverses nourritures, on comprend principalement les différentes espèces de beurre. Cette substance, comme toutes les autres huiles grasses & fixes, est composée de stéarine & d'oléine : elle contient en outre un acide particulier, l'acide butyrique, auquel elle doit l'odeur qui lui est propre, & qui paroît si remarquable dans le beurre frais. Le beurre se rancit plus facilement que les autres graisses animales; la nature solide que M. Braconnot en a tirée, & dont il n'a pu déconvenir qu'une très-petite quantité dans le beurre préparé avec le lait de femme, d'ânesse & de jument, ne peut être que la stéarine de M. Chevreul.

Le beurre très-frais est bien plus facile à digérer que toutes les autres graisses, & mérite bien d'être préféré aux huiles. Pour le faire entrer dans les préparations alimentaires les plus usuelles, & le conserver très-pur, on le prive de sa fermeté laiteuse. Dans beaucoup de circonstances, & pour les personnes convalescentes & valétudinaires, on est souvent obligé de remplacer les graisses dans les compositions alimentaires, par les œufs ou le bouillon; dans tous les cas, on ne peut apporter trop de soins pour exiger que ces substances grasses soient employées avec réserve dans les cuisines, & altérées le moins possible par le feu. Leur mélange avec différentes espèces de pâtes, dans les pâtisseries, n'offre sans doute aucun inconvénient aux estomacs robustes, mais ne convient jamais aux estomacs foibles & incapables d'une puissante réaction dans la digestion.

On sument les diverses espèces de chairs que nous venons d'indiquer, à différens modes de préparation, qui ou rendent la digestion plus ou moins facile. L'ébullition prolongée pendant un certain temps, est une de leurs préparations les plus en usage : elle a pour objet de cuire la viande, & de former, avec une quantité suffisante d'eau, le liquide nourrissant que l'on connoît sous le nom de *bouillon*.

Un bouillon bien préparé ne peut s'obtenir que de substances animales dans lesquelles il entre une quantité suffisante de bœuf & de légumes propres à des assaisonnemens.

Une quantité suffisante d'eau froide, versée sur ces substances, dissout d'abord l'albumine, l'osmazome & les sels solubles. A l'aide d'une douce chaleur, que l'on augmente progressivement, la graisse se fond, la gélatine est dissoute, & l'albumine ne tarde pas à être coagulée sous la forme d'écume : le bouillon alors est formé, & on le laisse refroidir, la graisse, qui se fige, peut être facilement enlevée. Le bouilli qui reste n'est que la libre, privée des sucs qui la rendent soluble, & réduite à une espèce de liqueur fibreuse. Cette préparation alimentaire est bien loin d'avoir toutes les qualités que le vulgaire lui suppose, surtout lorsqu'elle se présente sous un petit volume : elle ne donne alors qu'un aliment très-peu nourrissant, & que l'estomac des personnes foibles, ou des convalescens, ne digère qu'avec beaucoup de difficulté. C'est rendre un véritable service que d'insister sur cette vérité, dont la connoissance bien appréciée, mieux répandue, conduirait nécessairement à faire adopter l'usage de la gélatine dans la préparation des bouillons, soit dans les hôpitaux, soit dans l'intérieur des familles un peu nombreuses, qui se procureroient ainsi, sans augmentation de frais, une nourriture plus saine & plus agréable.

Les viandes cuites à l'étude, qu'il ne faut pas confondre avec les viandes bouillies, ne sont pas privées de leur suc; elles sont fortement pénétrées par des vapeurs chaudes qui les cuisent parfaitement sans les dessécher.

Les chairs trop fermes des animaux un peu âgés exigent ce mode de préparation, qui, toutes choses égales d'ailleurs, ne peut être trop recommandé aux convalescens & aux personnes dont l'appareil digestif a peu d'énergie; les viandes rôties & convenablement grillées seroient également indiquées pour ces personnes : elles sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus réassurantes que toutes les autres préparations alimentaires. Les chairs des jeunes animaux, de l'agneau, par exemple, du chevreau, exigent plus particulièrement cette préparation, qui semble les rendre plus fermes & moins visqueuses.

Les différentes espèces de fritures ou de fances, & les préparations variées auxquelles l'art culinaire soumet les diverses substances animales, nous offrieroient un sujet inépuisable de remarques, si nous voulions nous attacher à signaler toutes les sources de maladies, toutes les causes d'insalubrité qui remontent à ces préparations; nous nous bornerons, en conséquence, à indiquer, d'une manière générale, que les personnes qui desireroient conserver leur santé, ne peuvent s'imposer avec trop de soin la loi de préférer les préparations les plus simples, les plus naturelles, aux compositions irritantes ou compliquées que l'art multiplie sous toutes les formes pour exciter ou satisfaire les appétits, les penchans les plus contraires à la dignité humaine, & que l'instinct bien entendu de

la conservation devoit réprimer, lors même qu'une morale gênante ou sévère voudroit leur accorder que qu'indulgence. Du reste, parmi les composés véritablement dangereux, dont nous parlons, on doit distinguer le mélange des chairs fibreuses ou gélatineuses, avec une grande quantité de graisse, sous le nom de *hachis*, de *poudings*, de *boulettes*, &c. &c.; les foies gras, les chairs par trop saissonnées ou excessivement aromatisées, soit avec des condiments, soit avec le vin de Madère; les préparations trop compliquées de poissons, les viandes macérées ou conservées dans l'huile, les chairs fumées ou boucanées, qui ne devoient entrer que pour une certaine portion dans la nourriture des matelots; enfin, les *fruturs* & les *saus*, qui manquent rarement d'irriter l'estomac & d'exciter avili le suc chymal, même chez les personnes dont l'estomac est assez robuste.

NOURRITURES ALBUMINEUSES ET OLEO-ALBUMINEUSES. Nous rapportons à ce titre les œufs, la chair de plusieurs mollusques, le lait & les différentes préparations que l'on obtient de ce dernier, & dont la substance caéuse est la base.

Œufs. Les œufs sont presque entièrement composés d'albumine; le blanc est même regardé comme de l'albumine pure, se montrant sous la forme d'un liquide dont la viscosité disparaît pour faire place à une apparence huileuse ou à une coagulation entière, suivant le degré de cuisson. Le jaune d'œuf contient aussi une grande quantité d'albumine qui se trouve unie à une huile grasse (*huile d'œuf*); à un principe colorant, & à une petite quantité de suifre. Le jaune d'œuf a cela de remarquable, qu'il augmente sensiblement de volume lorsqu'il est introduit dans l'estomac, ce qui le rend très-propre à donner une prompte respiration.

Les œufs servent à un grand nombre de préparations alimentaires, dans lesquelles on les substitue souvent avec avantage au beurre & à l'huile: ils sont employés eux-mêmes comme aliments sous un grand nombre de formes. Les œufs très-frais, & que quelques personnes mangent crus & encore pénétrés de la chaleur de la poule, sont beaucoup moins faciles à digérer que les œufs frais & suffisamment cuits dans leur coque. Le blanc de ces œufs crus, lorsqu'il est avalé sans être brisé, occasionne un peu de poids pendant la digestion, ce qui doit être attribué à ses membranes, qui tendent un peu à se diviser. La cuisson ayant détaché ces membranes, le blanc d'œuf est beaucoup plus léger & prend un aspect laiteux qui ne se reconnoît que dans les œufs très-frais: cet œuf, ruit à point, se digère aisément, du moins dans le plus grand nombre des cas. Les œufs non frais ont une saveur d'agréable qui annonce tous leurs inconvénients. Un œuf altéré pourroit être regardé comme une espèce de poison. Les préparations des œufs les moins convenables à toutes les personnes qui n'ont point assez de forces

gastriques pour accepter tous les régimes & braver toutes les règles diététiques, sont les œufs durs, les omelettes très-compactes, les œufs au beurre roux, en un mot, les œufs mêlés avec des graisses altérées par le feu. Le *sait de poule*, les œufs au bouillon, les œufs à l'eau, sont peut-être encore plus convenables pour les convalescents & pour les valétudinaires que les œufs frais & bouillis dans leur coque. La préparation connue sous le nom de *subuion*, & très-recherchée des Italiens, est également une nourriture aussi saine qu'agréable. Moscati, dans les dernières années de sa vie, n'en prenoit presque plus d'autres, & en suivant ce régime, il paroissoit avoir quelque plaisir à rendre son existence aussi peu matérielle qu'il étoit possible.

Parmi les œufs de poissons, qui se coagulent comme ceux des oiseaux, plusieurs paroissent manquer de ce que nous appelons le blanc. Ces œufs, dans certaines saisons & dans certaines espèces de poissons, ont des propriétés vénéneuses; ce que l'un croit propre aux œufs, qui, par la cuisson, se coagulent mal, demeurent demi transparents & comme mêlés avec une substance visqueuse. On a surtout attribué une semblable disposition, aux œufs de barbeau, qui sont purgatifs, d'une manière plus ou moins forte, dans le temps du frai.

Les chairs de plusieurs animaux invertébrés; qui sont employées comme aliments, doivent être rapportées aux matières albumineuses; telles sont les nourritures fournies par plusieurs espèces du genre *héler*, parmi les mollusques à coquilles univalves; & les huîtres, les moules, parmi les mollusques à coquilles bivalves.

Les huîtres en particulier montrent évidemment leur nature albumineuse par leur extrême coagulabilité sous l'influence de la chaleur. Crues & mêlées à l'eau de la mer, qui leur sert d'assaisonnement, elles se digèrent bien plus facilement que lorsqu'elles ont été durcies par la cuisson, ou même par une macération dans une saumure. Leur altération, à une certaine époque de l'année, en fait un assez mauvais aliment: cette altération peut être portée très-loin & occasionner des accidens graves; ce qui arrive surtout pour les huîtres que l'on a fait parquer dans un réservoir dont les eaux n'ont pas été convenablement renouvelées. (Voyez Huîtres.)

On connoît l'effet particulier que produisent les moules, chez quelques personnes qui ne peuvent en faire usage, sans éprouver au genre particulier d'indigestion caractéristique par une forte éruption & une congestion sanguine, que l'on ne sait cesser que par des doses considérables d'éther.

L'escargot, le limaçon, le colimaçon, pourroient, au besoin, servir d'aliments. La chair des Crustacés, & principalement celle des Écrevisses, des Homards, est beaucoup plus difficile à digérer que les chairs gélatineuses albumineuses des mollus-

ques, dont nous croyons devoir les rapprocher dans cet article.

Lait. Le lait & ses différentes espèces, malgré la presque identité de leur nature, pour le chimiste, diffèrent beaucoup pour le médecin, qui leur voit produire chez des malades des effets très-différens, & que le plus souvent il n'auroit pu prévoir, quelle que soit d'ailleurs son expérience & sa sagacité. Ainsi, il existe des laits qui paroissent mieux convenir à certaines personnes, sans qu'il soit possible d'assigner la cause de cette disposition.

En général, les différentes espèces de lait & les diverses préparations du lait, ne peuvent jamais convenir aux personnes dont l'appareil biliaire paroît avoir assez peu d'énergie pour n'être pas suffisamment stimulé par ce genre d'alimens : chacun doit prendre conseil à ce sujet de sa propre expérience, & sans qu'il soit possible de rien décider *a priori*. Dit-on, pour les personnes qui le digèrent avec facilité, le lait peut être employé seul, ou avec d'autres substances, comme une très-bonne nourriture. Lorsque le lait est donné seul, ce qui constitue la *diète lactée*, on le propose d'opérer une nutrition plus prompte, une réparation plus facile, chez des personnes que des maladies antérieures ont amaigries & affaiblies, & dont les organes de la digestion ne supporteroient pas des médicamens plus forts & plus toniques. On a combattu aussi, par ce régime, des névroses ou des névralgies invétérées, ou même des affections chroniques indéterminées, & sans aucun autre motif dans les indications, que le desir de changer lentement & progressivement un mode général d'action morbide qui paroît être indépendant de la lésion évidente d'un organe quelconque.

Le lait employé comme seul moyen d'alimentation, peut être donné à la dose de deux, & même de trois pintes dans les vingt-quatre heures. On le prend par verre de deux heures en deux heures. Je n'ai jamais observé l'effet que Cabanis attribuoit à ce régime, & dont il a dit, d'une manière un peu spéculative, qu'il ne tardoit pas à calmer, à modérer tous les penchans, à rendre les idées plus nettes, & à faire que l'on pense peu, que l'on desiré peu, que l'on agit le peu.

Les personnes soumises assez brusquement à ce régime lactéux sont d'abord assez faibles : elles prennent ensuite de la force, & leur état moral éprouve peu ou point de changement si le lait est bien digéré. La diète lactéuse se compose d'un mélange de lait, de pain, de farineux en général & de sucre : elle est moins efficace que la diète lactéuse exclusive, quand celle-ci peut se concilier avec l'état des organes de la digestion.

L'hydrolait, bouillon composé de deux tiers

d'eau & d'un tiers de lait, étoit souvent employé par Sydenham dans le traitement des maladies aiguës, & principalement des plégmies exanthématiques.

Quant aux personnes qui ne digèrent pas, ou qui digèrent mal le lait, l'état de leurs organes de la digestion n'est pas toujours semblable. Chez les uns, une disposition bilieuse, ou une augmentation de sécrétion gallique se manifeste ; ce qui devient plus évident, si l'incommodité à la suite de fièvres intermittentes. Chez d'autres, le lait produit immédiatement des aigreurs & une forte indigestion, les forces de l'estomac n'étant pas suffisantes pour empêcher le développement d'une sorte de fermentation dans les premières voies. Il n'est pas rare de voir quelque chose de semblable chez les enfans que l'on veut nourrir avec le lait de vache, ou avec un lait trop fort ou trop ancien.

Ces enfans souffrent, maigrissent, & rendent des excréments qui sont blanchâtres jusqu'au centre. Si l'on ne change pas leur régime, ils périssent bientôt de consomption ; & il est évident que la partie calculeuse du lait, trop forte, trop abondante pour les organes débiles de ces enfans, n'est pas digérée, & que la mort arrive par l'effet d'une maladie de la nutrition. (Voyez Nourriture.)

La plupart des préparations alimentaires dont le lait fait la base, offrent en général peu d'inconvéniens, & conviennent aux personnes pour lesquelles le lait pur & seul est un bon aliment ; telles sont les crèmes, les bouillies, toutes les formes de sorbition & de potage, &c. Le mélange du lait avec le café & avec le chocolat offriroit peut-être plus d'un inconvénient ; & ce n'est pas sans raison que les médecins l'accusent souvent des langueurs gastriques, des embarras muqueux intestinaux, & de ces opiniâtres écoulemens connus sous le nom de *fluxus blanches* : effets que l'on prévient, ou l'on évite, par un mode d'alimentation mieux entendu & plus unique.

Le *caillé*, c'est-à-dire la partie calculeuse du lait, séparée naturellement ou artificiellement de la crème, est un aliment léger & très-raffraichissant. S'il est *égnuté*, c'est-à-dire un peu coagulé, on lui donne le nom de *fromage blanc*.

§. II. Préparations & conservations des alimens.

Je touche ici aux élémens, à l'origine des choses ; dit Haller en commençant le paragraphe qu'il a consacré, dans la grande physiologie, à la préparation des alimens. *Prima tantum elementa hic tango* (1). Dans les temps éloi-

(1) *Elementa physiologia*, tome VI, page 22.

gnés & privilégiés auxquels Haller fait allusion, les hommes ne connoissent point sans doute les préparations des alimens, ont dû employer, dans l'état où la nature les offroit à leurs besoins, les fruits horaires, plusieurs plantes comestibles & la chair d'un grand nombre d'animaux. Les Hotentots, les Esquimaux nous donnent l'idée de ce genre de vie. Les Palaïngus, les Samois des boivent le sang des animaux qu'ils ont pris à la chasse, & mangent leur chair entièrement crüe.

Les individus que quelques circonstances extraordinaires ont jetés parfois dans l'isolement de la vie sauvage, au milieu des peuples civilisés, ont été invariablement portés à des habitudes semblables, comme on peut le voir en parcourant l'histoire de ces personnages curieux & singuliers.

L'industrie, pour conserver les alimens & pour prévenir, par cette conservation, les famines si fréquentes & si redoutables parmi les sauvages, cette industrie est également étrangère à ces peuples, qui consomment dans un seul jour, & avec autant d'avidité que d'imprévoyance, le produit très-abondant d'une pêche ou d'une chasse, qui auroit pu les nourrir pendant une semaine.

Avec les progrès du luxe & de la civilisation, on s'est beaucoup éloigné de cette simplicité grossière de l'existence sociale, & la préparation des alimens est devenue incessamment l'objet d'un genre d'industrie très-étendu, souvent plus nuisible qu'utile, du moins dans un grand nombre de ses ramifications.

Cette préparation, considérée sous le point de vue le plus général, a deux objets bien distincts : 1°. la conservation des alimens ; 2°. leurs modifications, pour les rendre plus agréables au goût & plus favorables à la nutrition.

Divers procédés ont été employés pour conserver les divers subsistances alimentaires, soit végétales, soit animales. Le grain lui-même, les farines, ne tardent pas à s'altérer, si on néglige de les renfermer dans des lieux bien froids, en prenant toutes les précautions pour les empêcher de s'échauffer. Le même soin est encore plus indispensable pour les légumes & pour les fruits. Parmi les moyens d'une conservation plus efficace & plus durable, la dessiccation dans les pays chauds, & l'emploi de la glace dans les contrées les plus froides, doivent être indiqués les premiers, suivant leur ordre d'ancienneté. Leur usage en effet remonte à un temps immémorial.

La dessiccation s'emploie au soleil ou à l'aide de la fumée, & prend le nom de *boucanage* dans cette dernière circonstance. La dessiccation au soleil est encore employée dans le Chili & au Pérou pour les subsistances animales. On désigne sous un nom particulier, la chair ainsi préparée, & dont une livre répond à quatre livres de chair fraîche. Les Turcs font dessécher des viandes pour l'approvisionnement de

leurs armées, & réduisent ces viandes desséchées en une espèce de poudre, pour en rendre le transport plus facile.

Le procédé proposé par M. de Bech paroîtroit bien préférable à ce mode de préparation employé par les Turcs. Il consiste à faire cuire les viandes que l'on veut garder, aux trois quarts, avec la vapeur de l'eau bouillante ; à les râper ensuite, à les faire sécher, & à les conserver dans des tonneaux ou dans des boîtes de fer-blanc. En Espagne, en Portugal, en Italie, on conserve les chairs salées ou épicées, en les renfermant dans les intestins desséchés des gros quadrupèdes, que l'on tire, par la voie du commerce, des fabriques qui se trouvent établies près des portes des plus grandes villes de l'Europe, mais principalement de la fabrique de la *Pelito-Filetta* à Paris. Ces intestins, lorsqu'on les a préparés convenablement, s'effaillent, lorsqu'ils ont été lavés, retournés, frottés & ensuite lavés à l'eau, sont presque inodores. On les ramollit, lorsqu'on veut en faire usage, avec une eau tiède & légèrement alcaline. On y introduit ensuite les subsistances que l'on veut conserver, & qui s'y trouvent d'autant plus inaltérables, qu'on a eu soin de tremper l'intestin dans l'huile.

L'auteur de l'article *COMESTIBLES*, dans le *Dictionnaire des sciences médicales*, M. Marc, observe avec raison, qu'on n'a point pu tirer tout le parti possible de ce procédé, pour les années de mer & de terre. Les viandes & les graisses épicées, contenues dans des intestins bien préparés & placés ensuite dans des tonneaux garnis de subsistances pulvérisées & sèches, comme la cendre ou le charbon pilé, se conserveroient beaucoup mieux dans les approvisionnements de siège, & à bord des bâtimens pour les voyages de longue cours, que la plupart des salaisons ordinaires, qui absorbent presque toujours l'humidité, & se décomposent par l'action des chaleurs de la zone torride.

Les tablettes de bouillon & l'extraction de la gélatine en grand, peuvent être regardés aussi comme des modes de conservation des subsistances animales. Nous avons déjà parlé, relativement à la gélatine, du procédé de M. Darcey, & des avantages que les conséquences & les applications de ce procédé doivent nécessairement introduire dans l'économie domestique. On extrait cette même gélatine en grand dans plusieurs pays. Il existe, par exemple, près de Copenhague, un moulin pour broyer les os, & favoriser ainsi cette extraction.

Un autre appareil, dont l'auteur, le professeur Rawert, a été couronné par l'Académie de Stockholm, sert même temps pour broyer les os, pour les laver & pour en tirer la partie nutritive. Les tablettes de bouillon que l'on prépare avec la gélatine, ne pourroient guère d'ailleurs être employées qu'avec une certaine quantité de subsistances

tances animales. Les tablettes de bouillon de Buenos-Ayres se préparent avec différentes espèces de viande, mais sont peu estimées; ce qui s'explique sans doute par la négligence que l'on apporte dans leur confection. Les tablettes de bouillon, que l'on pourroit prendre pour terme de comparaison, présentent une pâte sèche, flexible, élastique, tenace, s'humectant rapidement par la contact de l'air, & contenant moitié de leur poids de gélatine & moitié d'un principe savonneux & coloré.

Les jambons, & quelques autres articles de charcuterie, sont conservés par la fumée, & lui doivent d'être un peu trop stimulans pour les estomacs foibles, qui ne supportent guère mieux ce genre de nourriture que les roux & les fritures.

Les viandes boucanées ne se trouvent pas en usage chez les Européens, & l'on donne au général ce nom à la chair des bœufs sauvages & des sangliers, que les chasseurs, qui portent le nom de *boucaniers*, font sécher à la fumée, à l'exemple des Caraïbes, après l'avoir salé.

Les chairs ainsi préparées se vendent par ballots de soixante livres. On en fait une assez grande consommation à Saint-Domingue, aux Antilles & sur plusieurs équipages.

Les salaisons, qui sont aussi fort anciennes, & que l'on combine le plus souvent avec le boucanage, paroissent avoir été familières aux Egyptiens. Elles sont plus particulièrement en usage pour le poisson & pour les chairs très-grasses. On les applique du reste à toutes les substances animales, & même à quelques substances végétales, tels que les choux en Allemagne, les champignons en Russie.

Les salaisons, que l'on a regardées, d'une manière trop générale, comme la cause du scorbut, sont des alimens qui se digèrent très-bien & qui n'ont rien de nuisible, lorsqu'ils n'entrent point pour une trop grande proportion dans le fouds de l'alimentation. Il faut seulement faire en sorte qu'elles soient bien exécutées, & que les viandes destinées à cette opération y soient soumises immédiatement après la mort de l'animal : précaution sur laquelle les Hollandais insistent le plus pour empêcher les harengs, d'après le procédé de Bukel, à qui Charles V fit élever une statue.

La conservation de plusieurs alimens dans le vinaigre n'est pas moins bonne que la salaison, comme on le voit par la saumure.

La conservation dans la glace & dans la neige n'est employée que très-rarement. On y a eu recours en Angleterre pour la saumure, qui dans ce cas perd toute sa consistance, si on n'a pas le soin de la faire fondre graduellement la glace dans laquelle il a été enfoncé.

Certaines substances conservées dans le sucre ou dans la graisse, forment d'assez bons alimens, & dans cette classe de préparations, on doit placer au premier rang, les confitures, dont la gelée, qui

en est la base, se conserve très-bien, si les sucres des fruits que l'on a employés n'ont pas été soumis à une ébullition trop prolongée. Il existe un autre mode de conservation des substances alimentaires. Le plus simple, le plus parait-il pour ceux qui ont été employés jusqu'à ce jour, c'est le procédé auquel M. Appert a donné son nom : procédé qui consiste à arrêter tout mouvement de fermentation ou de putréfaction dans des substances, soit végétales, soit animales, en les tenant renfermées dans des bouteilles bouchées d'abord avec soin, & exposées ensuite à la température de l'eau bouillante, pendant un temps plus ou moins long. Quelles que soient d'ailleurs les idées que l'on adopte sur la théorie de la fermentation & de la putréfaction, les alimens ainsi conservés, par le procédé de M. Appert, lors même qu'il auroient la plus grande aptitude à s'altérer très-promptement, n'ont rien perdu de leur saveur & conservent leurs propriétés nutritives, après plusieurs mois, ainsi que des expériences multipliées l'ont prouvé & continuent de le prouver, pour tous les genres de nourriture animale ou végétale les plus en usage, chez les nations civilisées (1).

Dans l'emploi des divers procédés que nous venons d'indiquer, on a essentiellement pour but de conserver les différentes substances alimentaires, & d'assurer, par cette voie, des moyens de subsistance pour des peuples ou pour des temps auxquels la nature ne paroît pas les avoir destinés.

D'autres procédés, qui se rattachent au raffinement du luxe & aux besoins d'une civilisation très-avancée, ont pour but de modifier diversément un grand nombre de matériaux alimentaires, tantôt dans le dessein d'ajouter à leur digestibilité on à leurs propriétés nutritives & toniques, tantôt, & trop souvent, avec l'intention de satisfaire les desirs, les goûts dépravés d'une gourmandise qui n'est même pas toujours ainsi éclairée qu'elle pourroit l'être, dans ses caprices & dans ses excès.

Ces procédés, qui ne se bornent pas à l'art du cuisinier, embrassent tout ce qui concerne les arts du boucher, du charcutier, du pâtissier, du confiseur, du distillateur, &c. : professions qui toutes ont leur domaine particulier, leurs abus, leurs usages, & qui ne peuvent être surveillées avec trop de sévérité, dans les grandes villes, par les agens d'une police sanitaire.

Une partie de ces raffinemens, qu'il ne nous appartient pas d'examiner même d'une manière

(1) Voyez, pour l'exposition de ce procédé, & les divers modes d'application dont il est susceptible, le *Livre de tous les ménages*, ou *l'Art de conserver pendant plusieurs années les substances animales ou végétales*, &c., par M. Appert, vol. 10-8^e, 3^e édition, Paris, 1813.

générale, ne fut pas entièrement étrangère aux Anciens, mais surtout aux Romains, à l'époque de leur luxe effréné, & de la décadence qui en fut la suite inévitable.

Il suffit d'avoir parcouru Athénée & d'avoir donné un coup d'œil aux descriptions d'Apicius, pour se convaincre jusqu'à quel point le peuple-roi fut exagéré & hizarre dans sa gourmandise, lorsque la tonne-puissance des nœs, l'esclavage des autres & l'oisiveté du plus grand nombre, eurent éteint dans les âmes tous les sentimens généreux.

Les arts culinaires, beaucoup mieux entendus & beaucoup plus valés dans l'Europe & chez les nations modernes que chez les Anciens, ne remontent pas beaucoup au-delà du seizième siècle. Les grands événemens de cette époque donnèrent à la fois de nouveaux besoins à toutes les nations civilisées, & aussi de nouveaux moyens de les satisfaire & de répondre à tous les goûts, à tous les desirs d'une sensualité exquise & raffinée.

Ces arts paroissent avoir commencé en Italie, & vinrent avec les Médicis prendre racine dans notre belle France, qui a contribué ensuite à les répandre dans toutes les autres contrées de l'Europe.

Il existe deux parties distinctes dans ces arts; savoir : une partie toute usuelle, & qui a pour objet de rendre les substances alimentaires plus digestibles, plus nutritives; 2°. une partie entièrement du luxe, rarement utile, souvent nuisible ou même dangereuse, & justifiant, dans ses effets directs ou éloignés, le dit judicieux de Boerhaave, sur les causes principales & journalières des maladies chez les nations policées.

Cette première partie mérite seule de nous occuper dans cet article. Les opérations qu'elle comprend se rapportent aux substances animales & aux substances végétales.

La force de certaines circonstances, ou les rigueurs de la vie la plus sauvage, ont pu seules porter les hommes à manger la chair des animaux, sans la soumettre à aucune préparation, ce qui est véritablement contraire à leur nature, ce n'est la considérant même que sous un point de vue entièrement physiologique. Laisser mortifier la chair des animaux pris à la chasse ou à la pêche, la livrer à un commencement de putréfaction ou la rôtir grossièrement sur un brasier, suivant l'usage des temps héroïques, & comme le font aujourd'hui quelques sauvages qui vivent du produit de leur chasse, vuici à la vérité à quoi se réduisent les préparations dont nous parlons, à l'origine des choses; mais dans un état plus avancé de civilisation, on a été beaucoup plus loin; on ne s'est pas borné même à modifier utilement les substances animales par la cuisson ou par les assaisonnemens, on a préparé, on a façonné pendant la vie, l'animal qui doit fournir ces substances; on l'a nourri, on l'a engraisé

d'une manière particulière, on l'a mutilé même pour rendre sa chair plus délicate.

La manière de tuer les animaux fait également partie des préparations alimentaires. On connoit toute l'importance qui se trouve justement attachée à la manière de tuer les grands quadrupèdes chez plusieurs peuples, & à la surveillance des arts du boucher & du charcutier. On fait aussi combien est grande la différence qui existe entre la viande de boucherie ou la viande de basse-cour qui a toujours été saignée, & la chair du gibier, qui ne l'a jamais été. Les Romains surpassèrent les peuples modernes dans ces préparations préliminaires, qu'ils portèrent véritablement jusqu'à la plus dégoûtante barbarie, dans leur manière de tuer le cochon & la truie pleine, pour en obtenir un mets plus recherché & un chair plus agréable (1).

Les préparations plus directes des substances animales ont dû commencer, & commencèrent en effet, par un grillage ou un rôtissage grossier sur des charbons ardens, ce qui ne suppose aucune espèce de vases ou d'ustensiles de cuisine, qui sont inconnus chez la plupart des sauvages, & même chez la plupart des peuples nomades. Les héros d'Homère & ceux de Virgile n'osoient du ce procédé dans leurs festins. Cette même préparation, dirigée avec soin, & d'après l'attention que l'on peut y apporter, chez les nations civilisées, est une des plus utiles & des plus naturelles. Les viandes rôties, protégées d'abord par une espèce de croûte qui résulte du premier effet de la chaleur rayonnante, conservent toutes leurs parties solubles & deviennent à la fois très-nourrissantes, très-toniques, & plus faciles à digérer, même pour les animaux, ainsi que l'ont prouvé plusieurs expériences de Rameur & de Spallanzani.

La chair visqueuse & trop gélatineuse des animaux très-jeunes, du cochon de lait, par exemple, de l'agneau, du chevreau, ne se digérerait pas si facilement, sans une pareille préparation. Du reste, la manière de rôtir les viandes demande beaucoup de soin, présente par cela même beaucoup de différences, & ce n'est pas sans raison que l'on attribue à la chaleur vive & rayonnante du charbon de trefre, la supériorité des Anglais, dans cette partie de l'industrie culinaire; ce qui explique, suivant John Sinclair, la prédilection de ses compatriotes pour cette espèce d'aliment.

(1) Pour rendre leur chair plus agréable, on tuoit les porcs avec des broches rougies au feu, avec l'idée que par ce procédé, le sang se mêloit plus facilement avec la chair. Le soppice que l'on faisoit subir à la truie pleine étoit encore plus horrible; on la tiroit en la foulant aux pieds, afin que broyant ensemble, & mêlant sous sa portée, on pût en former un mets très-recherché. (Voyez PLUTARQUE, de esu carnis.)

Les préparations des substances animales par l'ébullition, suppose un assez grand nombre de progrès, dans la série des inventions humaines : pour l'exécuter, on a employé d'abord des vases d'écorce qui ne pouvoient servir qu'une seule fois ; ce qui exille encore chez quelques peuples de l'Amérique. Les vases d'argile font venus ensuite, & leur découverte remonte à un temps immémorial. Depuis une époque moins éloignée, on s'en va succéder les vases de métal, les poteries avec les couvertes métalliques, la porcelaine, les vases émaillés ; plusieurs de ces vases font eux-mêmes très-importants à considérer sous le rapport de l'hygiène : la substance dont ils font formés pouvant s'altérer & rendre vénéneuses, ou du moins très-nuisibles, les substances alimentaires qui ont été préparées ou conservées dans ces vases : ce qui ne laisse malheureusement aucun doute pour les vases de cuivre, d'étain, & pour certaines poteries d'une qualité inférieure.

Deux sortes d'alimens font retirés par l'ébullition des substances animales ; savoir : 1°. le bouillon & les consommés ; 2°. la viande bouillie. Le bouillon & les consommés, que l'on doit ranger parmi les bouillons alimentaires, font abondamment chargés des parties solubles de la chair qui a été employée pour leur préparation. Ils font très-nutritifs si on les fait servir concurremment, comme dans l'usage habituel de la vie, avec une certaine quantité de nourriture solide. Leur usage exclusif ne pourroit être prolongé pendant longtemps, sans altérer profondément l'organisme, ainsi que quelques physiologistes ont pris le soin de s'en assurer, par des expériences sur les animaux.

Les substances bouillies font d'autant moins nourissantes, d'autant plus difficiles à digérer, qu'elles ont été plus complètement dépouillées de leurs parties solubles par l'ébullition : ce qui est tout-à-fait contraire à l'opinion généralement établie sur cette espèce d'aliment. Les convalescens, mais surtout les valétudinaires, dont l'appareil digestif manque de force, supportent mal une pareille nourriture. En soumettant certaines viandes (celles de la poule, du poulet, du mouton) à une ébullition très-forte & très-soutenue, ces viandes font aussi agréables, aussi toniques que les viandes grillées ou rôties, & peut être plus faciles à digérer. U se forme, suivant ce procédé, un resserrement de toutes les surfaces de la chair, qui s'oppose à l'évaporation, & de telle sorte, que l'eau qui se trouve employée pour cette ébullition, est à peine chargée de quelques molécules animales. On regarde aussi comme très-sain & très-convenable, la cuisson des viandes à l'étuvée ; procédé suivant lequel la cuisson des chairs s'opère par la vapeur qui les pénètre, en leur laissant tout leur jus. Les viandes très-fortes, très-fibreuses, font préparées avec un grand avantage de cette manière.

Un assez grand nombre d'assaissonnemens est employé, en général, pour ajouter aux propriétés toniques des viandes rôties ou bouillies ; pour les rendre capables d'opérer plus promptement l'effet excitant & immédiat de l'alimentation.

Ces assaisonnemens font principalement le sel, le vinaigre, certains vins, l'eau-de-vie, le sucre, divers condimens indigènes & exotiques, l'huile empyreumatique des viandes fumées, qui se développe par le fait même du *boucanage*.

Les Anciens & les Modernes, sous le rapport de ces divers assaisonnemens que l'on mêle aux substances animales, présentent de grandes diversités. Les premiers employoient plusieurs substances qui nous paroissent aujourd'hui bien éloignées d'un pareil usage, & que nous avons relevées dans la matière médicale, la Rhue, par exemple, & l'asa-fetida qui se trouve désigné sous le nom de *laser*, par Pline. En revanche, chez les Modernes, on fait usage, sous le nom d'*épices*, d'un grand nombre de substances stimulantes entièrement inconnues aux Anciens ; du Gérofle, par exemple, de la Muscade, du Macis, du Gingembre, du Piment, &c. &c.

D'autres préparations s'exécutent dans le dessein d'opérer divers mélanges des substances animales, non-seulement avec divers condimens, mais avec d'autres substances animales, avec les graisses ; le beurre, le lait, les huiles, le sucre, le vin : ce qui produit une foule de mets plus ou moins composés, liquides ou solides, de jus, de bouillons, de consommés, de sauces, de ragouts divers, &c. &c.

Une certaine habitude & la modération dans l'usage de ces diverses préparations alimentaires, peuvent les rendre beaucoup moins nuisibles, surtout pour les personnes auxquelles des observations de détail n'ont point appris, que la conservation de leur santé se trouve attachée au genre de nourriture le plus simple, & à une sobriété exellente.

Les plus nuisibles de toutes ces préparations, font d'ailleurs toutes celles où la substance fibreuse ou charnue se trouve combinée avec des matières grasses & sucrées, sous la forme de hachis, de boulettes, de gibier, de pondings de toutes espèces, &c. &c.

Ajoutons que l'élévation de la température dans les matières grasses, avec conversion d'une partie de cette matière en une huile oxygénée ou empyreumatique, est employée pour former des préparations alimentaires encore plus dangereuses que les mets composés & recherchés que nous venons d'indiquer (les rous, les fritures, & certaines pâtisseries très-communes).

Les contrées équatoriales produisent seules, ou presque seules, des plantes qui donnent abondamment & sans culture, des substances alimentaires.

A a a a a

Dans toutes les autres parties de la terre, la préparation de ces substances, embrasse à la fois leur culture & les modifications diverses que l'on opère dans leur tissu, pour le rendre plus propre à l'alimentation. Ces préparations directes & immédiates appartiennent seules à l'hygiène. Un assez grand nombre peuvent d'ailleurs être employées, & se mangent le plus ordinairement sans avoir subi ces préparations. Parmi les fruits qui n'offrent par cet avantage, quelques-uns ne sont mangeables que lorsque la cuisson en a ramolli le parenchyme pour en développer la matière sucrée (les coings, certaines espèces de poires). D'autres ne doivent pas être cuits, mais ne peuvent se manger qu'au moment où un commencement d'altération spontanée les a rendus *blêches*, ce que nous avons vu être propre à une famille entière de plantes.

Les diverses préparations qui sont employées d'ailleurs pour ces fruits, consistent à les faire cuire, soit au feu nu, soit au four ou à l'étuvée, soit dans l'eau. Quelques préparations des fruits, plus recherchées, & qui embrassent tous les détails de l'office & des arts du confiseur & des glaciers limonadiers, ont pour objet de former avec leur pulpe ou leurs sucs, des compoies, des marmelades, des gelées, des confitures de toute espèce, des pâtes sucrées, des boissons acides & rafraîchissantes, des sorbets, des glaces, &c. &c.

Plusieurs feuilles, plusieurs fommities de diverses plantes, se mangent comme les fruits, presque sans apprêt, sans cuisson, du moins comme on le voit, pour les diverses espèces de salades, qui d'ailleurs ne peuvent jamais être considérées comme un véritable aliment. Ces mêmes parties des végétaux sont aussi le plus souvent amollies ou même réduites en pulpes, pour en former diverses préparations & compositions alimentaires qui paraissent sur nos tables sous le nom de *legumes*, & que l'on regarde, en général, comme la base d'un régime émollient & adoucissant; la digestion de ces substances, difficile, à la vérité, pour quelques personnes dont les voies gastriques ont besoin d'être excitées, n'est pas accompagnée d'un développement du chaleur, & d'aucun symptôme d'irritation.

Le procédé particulier d'après lequel on obtient la *saumure*, par la fermentation du chou, & en détruisant ainsi la matière sucrée, appartient moins à l'art culinaire qu'à des opérations qui ont pour objet de conserver les substances alimentaires. La découverte en a été, du reste, placée avec raison parmi les inventions qui devraient obtenir le plus de gloire à leurs auteurs, si, pour être célèbre, il suffisait d'être utile.

Les préparations les plus variées des substances végétales ont eu pour objet, & consistent d'abord pour objet, les semences mêmes qui servent comme aliment, & que l'on rapporte à deux titres princi-

paux; savoir : 1°. les semences farineuses propres aux plantes céréales; 2°. les semences émolives.

Les semences des céréales sont d'abord broyées, moulues, réduites en farine, blutées, ou plus ou moins séparées du son. On en forme ensuite, en les mêlant avec de l'eau, & par la cuisson, des bouillies, des pains azymes, des gâteaux, &c. Une préparation beaucoup plus compliquée, la panification, dont nous avons déjà parlé, ne s'emploie que pour un petit nombre de farines qui contiennent une certaine quantité de gluten, & que l'on fait fermenter avec une certaine quantité de levure, après en avoir formé une pâte plus ou moins liée. Le pain qui résulte de cette préparation peut occasionner les accidents les plus graves, si on le mange chaud & en sortant du four. Pour être digéré convenablement, il ne doit pas être trop frais, mais un peu sec, léger, poreux, d'une saveur agréable : il y a d'ailleurs plusieurs pains, les uns communs, grossiers, propres à soutenir l'action de l'estomac chez les ouvriers; les autres, plus légers, d'une blancheur remarquable, & qui conviennent plus particulièrement aux personnes efféminées & sédentaires. Le pain sale, le pain très-sec & deux fois cuit, ou *dicuit*, sont indiqués dans quelques cas particuliers de maladies qui paraissent dépendre d'une névrose ou d'une névralgie temporaire des organes épigastriques. Le pain préparé avec des farines avares, dont l'altération dépend de l'ergot ou de la nielle, ont occasionné plusieurs fois, dans les temps de disette, des symptômes assez graves de maladies.

La préparation des semences émolives est peut-être encore plus nécessaire que celle des graines farineuses. Il est, en général, assez difficile d'en opérer la décoction, sous l'addition d'une certaine quantité de potasse, dans l'eau que l'on emploie pour cette préparation. Les émollients sont d'ailleurs les formes sous lesquelles on emploie le plus ordinairement les semences émolives, comme on le voit pour les amandes & pour la semence des pistaches. L'amande du cacao est ordinairement torréfiée, avant de servir pour la composition du chocolat, sans doute pour la dépouiller d'une partie surabondante de l'huile qu'elle contient.

La décoction dans l'eau est à peu près la seule préparation que l'on fait subir aux semences des légumineuses; opération toujours beaucoup plus difficile que la cuisson des graines des céréales, & qui ne peut s'exécuter convenablement avec des eaux féculentes.

La préparation des graines des céréales, pour en obtenir différentes espèces de liqueurs fermentées, sera indiquée en parlant des boissons, dans la troisième partie de cet article.

La préparation des racines nutritives, soit par la décoction, pour en amollir le tissu, soit par pression ou par tout autre moyen, pour en obte-

nir les matériaux alimentaires, n'a pas toujours pour objet unique de rendre ces substances plus digestibles ou plus nutritives. Elle tend aussi, au moins pour plusieurs racines, telles que celles de plusieurs pieds-de-veau & du *manioc*, à séparer l'élément nutritif ou comestible, de la partie âcre & vénéneuse, que la nature a rapprochée & combinée dans ces racines.

Boissons. Les boissons que nous croyons devoir comprendre dans l'article NOUVEAUX n'ont pas seulement pour objet de faire cesser la soif; elles servent en même temps, & par un effet plus éloigné, à réparer la perte des fluides que le mouvement de la vie entraîne continuellement à toutes les parties de l'organisation.

Les boissons contribuent aussi à l'alimentation, en se mêlant avec les aliments solides, pendant le travail de la première digestion.

Pour embrasser avec méthode tous les objets qui appartiennent à l'histoire des boissons, suit fois le point de vue de l'anthropologie, soit sous le point de vue de l'hygiène, nous rapporterons à deux points de vue principaux, ce qui est commun ou général aux différentes boissons, & ce qui concerne, soit dans leur effet, soit dans leur nature, chaque espèce de boissons en particulier.

1^o. EXPOSITION GÉNÉRALE.

Le besoin, la sensation qui exprime & qui fait désirer les boissons : la manière d'agir des liquides pour désaltérer, leur dose, leur influence dans l'alimentation : tels sont les objets qui se présentent dans une exposition générale des boissons.

La soif est un sentiment intérieur plus ou moins vif qui fait désirer les boissons, que plusieurs causes locales ou générales peuvent exciter, & que l'on rapporte aux parties les plus exposées à une évaporation continuelle, par leur exposition à l'air (la bouche, l'arrière-bouche & le larynx).

La soif a sans doute pour objet final, la réparation des liquides, & n'est jamais plus vive, plus pressante que dans les circonstances où cette réparation est plus nécessaire, c'est-à-dire, dans tous les cas où des sécrétions morbides très-considérables existent, comme dans le diabète, dans certaines hydropisies, ou même chez les nourrices dont le nourrisson est trop avide, & que rien ne peut désaltérer : symptôme qui, pour le dire en passant, avertisse que l'allaitement ne pourra pas être impunément continué pendant long-temps chez ces nourrices.

La soif est plus régulièrement & plus habituellement excitée par la chaleur sèche, surtout par le séjour dans des appartements très-chauffés, par l'exercice, l'action de parler, la privation de boissons ou d'aliments liquides, par l'usage des nourritures épicées, en un mot, par tout ce qui, dans un temps donné, irrite directement ou sympathique-

ment les voies galliques, augmente l'évaporation dans l'arrière-bouche, & enlève à l'organisation une trop grande quantité de parties liquides ou fluides. Les affections inflammatoires, certaines irritations nerveuses, peuvent occasionner, dans certains cas, une soif morbide que rien ne peut désaltérer. Les exemples les plus remarquables d'une soif portée au plus haut degré ont été décrits par plusieurs voyageurs, dans l'histoire des plus célèbres naufrages. Il faut aussi ranger parmi ces exemples, ceux d'une soif qui seroit excitée par des blessures très-doulorentes : ce qui doit rappeler que le tourment de la soif étoit souvent une des souffrances qui paroissent les plus insupportables pour les criminels qui étoient livrés au supplice de la roue, & pour les infortunés auxquels on faisoit subir les horribles épreuves de la torture.

La soif, qui au premier aperçu paroîtroit devoir être constante & presque uniforme chez tous les animaux, présente de grandes variétés, & dans l'état de santé, & dans l'état de maladie.

En général, les animaux carnassiers hoivent beaucoup moins que les herbivores, surtout les oiseaux de proie (1).

Les herbivores eux-mêmes présentent, relativement à la nécessité de boire, de grandes variétés, sans parler des chameaux ou des dromadaires, qui doivent à une particularité de leur organisation, la faculté de pouvoir demeurer pendant plusieurs jours sans boire, dans les contrées les plus chaudes & les plus arides de l'Univers (2).

Les individus d'une même espèce, de l'espèce humaine, par exemple, ont aussi beaucoup d'anomalies relativement aux boissons. Haller remarque à ce sujet, que l'homme auroit beaucoup moins besoin de boissons, s'il se nourrissoit exclusivement de substances végétales, ou s'il faisoit usage au moins, d'un régime moins âcre, moins irritant, & plus conforme à sa nature. Quel qu'il en soit, & malgré l'influence de ce régime, un assez grand nombre de personnes éprouvent rarement le besoin de boire d'autres ont été impunément privées de boissons, pendant six jours, 15; 40, 60, 70 jours, & même six mois. Haller cite l'exemple d'une Suédoise appelée Elber, qui fut sans boire pendant six ans, & chez laquelle la sécrétion de l'urine ne fut pas interrompue pendant tout ce temps. Dans l'état ordinaire, lorsque la soif existe, elle devient bientôt, si elle n'est pas satisfaite, une sensation impérieuse, un besoin

(1) On a cru pouvoir affirmer, d'après des observations qui se trouvent consignées dans les *Transactions philosophiques*, que le *Felis Libanica* ne boit que une fois dans un mois.

(2) Cette particularité existoit dans des espèces de rétrovers qui se trouvent sur les côtes, & à la surface interne de la même rétrovers qui contiennent une certaine quantité de liquide, que l'animal respire en s'élevant, pour l'empêcher de se dessécher, & calmer la soif, dont il seroit insupportablement oppressé, dans cette heureuse disposition de ses organes.

qu'aucune espèce de courage ou de force morale ne peut faire supporter. Haller, qui fait cette remarque, n'oublie pas de citer, pour la justifier, ce qui arriva au malheureux Charles V, dans son expédition d'Afrique, & l'exemple encore plus mémorable peut-être du Lyfimaque, un des successeurs les plus braves d'Alexandre; qui fut obligé de se rendre, le trouvant entièrement privé de boisson pour son armée. A mesure que la soif augmente, la chaleur, l'aridité des parties qui en paraissent le siège, deviennent plus intolérables : la sécrétion perspiratoire de la bouche est presque supprimée; celle des glandes salivaires & des follicules de la déglutition; on éprouve un sentiment de constriction dans l'œsophage; la respiration est accélérée; une chaleur intérieure paraît se répandre dans tous les organes, & la mort survient ordinairement du troisième au quatrième jour, au milieu des plus horribles souffrances.

Les traces de tension que l'ouverture des corps fait découvrir, répondent à la violence de ces symptômes : ce sont des signes d'inflammation de l'estomac, l'épaississement, la diminution de la bile, de l'urine & des tumeurs en général, dans leurs réservoirs particuliers, la fièvre, l'aridité de tous les tissus, la consistance du sang & son accumulation dans le cœur & à l'origine des gros vaisseaux.

La sensation de la soif, que l'on rapporte à l'arrière-bouche, ne peut guère être regardée, dans le plus grand nombre des cas, que comme un phénomène sympathique, dépendant, soit de l'irritation des voies gastriques, soit de l'irritation générale qui résulte de la privation des liquides nécessaires pour étendre & envelopper convenablement, les matières acrimonieuses & stimulantes, que l'absorption interstitielle verse continuellement dans le torrent de la circulation.

En considérant ainsi la soif, il est facile de voir, que pour la faire cesser, les boissons doivent agir en humectant, en modifiant d'une manière quelconque, les parties auxquelles cette sensation est rapportée, & en fournissant une certaine quantité de fluide à l'absorption.

L'humectation, la modification locale, s'est par elle-même toujours indispensable, & plusieurs fois, M. le professeur Dupuytren a fait cesser la soif, chez des animaux soumis à des recherches physiologiques, en injectant de l'eau dans leurs veines : expériences que M. Orfila a souvent répétées avec le même résultat, & en s'assurant d'ailleurs que chez les animaux qui meurent de soif, la diminution de la partie séreuse du sang étoit toujours proportionnelle à l'absence des liquides.

On sait d'ailleurs, & par des observations nombreuses, que la soif peut être calmée ou même apaisée par un bain, & qu'elle est bien plus supportable dans une atmosphère froide & humide. On peut prendre, dans un temps donné, beau-

coup plus de liquides que d'aliments solides, comme on le voit par ce qui arrive journellement aux eaux minérales.

Le rapport des boissons aux aliments, dans l'alimentation, varie, du reste, beaucoup, suivant les divers auteurs. Sanctorius veut qu'il soit de dix ou de onze à trois, d'autres de cinq à deux ou de sept à six, &c. Rien ne peut être fixe, à ce sujet : l'habitude, le caprice, les dispositions constitutionnelles, étendent ou resserrent continuellement les limites que l'on voudroit prescrire. On peut toutefois établir en thèse générale, que les personnes faibles, lymphatiques, dont les digestions sont habituellement lentes & laborieuses, doivent boire beaucoup moins que les autres, & s'abstenir d'aliments volumineux & liquides.

Les boissons, lorsqu'elles sont employées pour contribuer à l'alimentation, agissent, sous ce rapport, de deux manières bien différentes; savoir : en le mêlant aux aliments solides, dont elles favorisent la dissolution, & en stimulant, d'une manière plus ou moins vive & plus ou moins durable, les voies gastriques.

Dans le plus grand nombre des cas, les boissons ont pour objet de faire cesser la soif, de contribuer à la dissolution des aliments & à la coction de la pâte chyminale. Dans quelques circonstances particulières, cet effet est seul indiqué, & les digestions deviennent pénibles & laborieuses, si la boisson produit le plus léger excès; ce qui arrive surtout pour quelques personnes qui ne digèrent bien qu'en buvant, à leurs repas, de l'eau simple, de l'eau d'orge, de l'eau mêlée à une certaine quantité de lait ou de sirop d'orgeat. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, quand les boissons toniques paraissent nécessaires, il faut éviter autant que possible, surtout à la fin du repas, la bière, les vins acides & les vins sucrés, en un mot, tout ce qui peut jeter au milieu de la masse alimentaire, une substance fermentescible & propre à faire naître une fermentation dont l'appareil de la digestion ne triompherait qu'à une manière douloureuse & incomplète.

La température, la pesanteur spécifique des boissons, leurs qualités particulières, en faisant même abstraction de tout effet stimulant, ne sont pas indifférentes dans l'usage que l'on peut en faire.

Les boissons tièdes, aromatiques ou non aromatiques, les liquides sucrés ou mucilo-sucrés, savonneux, gélamineux, ne sont pas propres, en général, à désaltérer. Les boissons acides, surtout quand elles sont très-froides, calment plus sûrement & plus promptement la soif qu'aucun autre liquide. En général, les boissons sont d'autant moins propres à désaltérer, qu'elles sont moins pures, moins limpides, plus chargées de parties solides & alimentaires; ce qui est évident pour les différentes espèces de lait, ou de

bouillon, & pour toutes les infusions ou les décoctions végétales, qui contiennent une certaine quantité de gomme, de sucre ou de fécule.

Les Anciens recherchoient avec une forte prédilection passionnée, les boissons chaudes, & développoient, pour les les procurer, un grand luxe dans leurs *thermopolis*, si bien décrits par Baccius. Les Modernes ont un goût différent, & attachent un grand prix aux boissons froides & glacées. Ces extrêmes ont souvent des inconvénients; les boissons très-froides, surroient l'eau glacée, ont même produit des acides graves, lorsqu'elles ont été prises sans faire aucun exercice, & an aninant sans que le corps se trouvoit en sueur, à la suite d'une grande fatigue. Dans le cas où l'eau froide est convenablement prise, & lorsque son impression sur la surface intérieure de l'estomac, est suivie d'un excès, d'une augmentation d'énergie, on peut alors doit être attribué, comme celui du bain froid, à une véritable réaction, & non pas à une stimulation directe; ce qui rend l'indication d'un semblable moyen fort difficile à déterminer, lorsqu'elle ne peut pas être rapportée à une anomalie, à une irrégularité dans la toxicité gastrique; qu'il soit fait cesser en changeant le mode d'action, sans exciter récllement & directement l'organe, sans en veut favoriser les fonctions.

L'eau très-froide, & même glacée, a d'ailleurs très-peu d'inconvénients, même dans le cas d'une soif & d'une chaleur extrême, si elle est bien tenue, en marchant & par petites portions, que l'on avale d'une manière successive, avec une certaine quantité d'air atmosphérique.

Ces considérations s'appliquent à l'usage des glaces, que le luxe, bien plus que le besoin, a introduit dans toutes les grandes capitales de l'Europe. La nature des liquides, tantôt aqueux & acides, avec lesquels ces glaces sont préparées, doit aussi être prise en considération. L'époque, du reste, la plus favorable pour employer impunément ou utilement les glaces, est le moment où la seconde digestion est sensiblement commencée, surtout chez les personnes qui ont pu remarquer d'ailleurs, que loin de supérior ou d'engorger l'estomac, l'impression immédiate des boissons froides en provoquoit la réaction d'une manière douce & facile.

Les boissons qui, indépendamment de leur température, paroissent les plus propres à faire cesser la soif par leurs qualités particulières, sont les boissons acides très-peu sucrées ou point sucrées, mais surtout les boissons réduites acides par le gaz acide carbonique, telles que les eaux de Seltz, de Châtelain, de Bussang, de Pyrmont.

On apaise très-bien aussi la soif, en tenant dans la bouche un morceau de glace, une petite quantité d'eau-de-vie, ou une portion quelconque d'une substance qui augmente la sécrétion de la salive.

EXPOSITION PARTICULIÈRE.

Les différentes espèces de liquides que l'on emploie comme boissons, & qui toutes ou presque toutes, sans en excepter l'eau, servent en même temps à nourrir & à délasser, peuvent être rangées sous les titres suivants : 1°. les boissons émoussantes & alimentaires; 2°. les boissons aqueuses & moqueuses; 3°. les boissons acides; 4°. les boissons fermentées; 5°. les liqueurs alcooliques; 6°. les boissons aromatiques.

1°. Des boissons émoussantes & alimentaires. Presque toutes les boissons, sans en excepter l'eau, contiennent sans doute des molécules nutritives, & contribuent, par leur composition, à l'alimentation. Toutefois, nous croyons pouvoir désigner sous la titre de *boissons alimentaires*, tous les liquides qui ne délassent point, ou qui délassent très-peu, & qui, dans tous les cas, servent comme aliment & comme boissons.

Nous comprenons parmi ces boissons, le lait, le petit-lait, différentes émulsions, les divers bouillons préparés avec les substances animales, l'eau d'orge, l'eau d'avoine, en un mot, tous les *decoctum* & les *infusum* gelatineux & gommeux. Ces derniers ne font guère mis en usage que pendant la durée des maladies aiguës : on les dégoûte sous le nom de *tisanes* (voyez ce mot). Les émulsions des légumes de l'amaranth, de la Pistache, ne s'emploient guère dans l'usage habituel de la vie; les bouillons de rissole, le lait, le petit-lait, servent bien plutôt comme aliments que comme boissons. Ce dernier, le petit-lait, forme en particulier la partie principale de la nourriture des pâtres des Pyrénées, dans le voisinage de Cantet & de Barèges : usage qui rappelle celui des Scythes hippomolques dont parle Hippocrate.

2°. Boissons aqueuses & moqueuses. L'eau simple se trouve au premier rang, dans cette classe de boissons; la plus pure est celle que l'on puisa ordinairement dans les rivières qui ont une certaine étendue; & qui coulent sur un sol pierreux ou sablonneux : cette eau est également propre pour délasser & pour contribuer à l'alimentation; ce que désigne la qualification d'*eau potable*, qui lui a été donnée. Elle doit renfermer une certaine quantité d'air atmosphérique, enro convenablement les légumes, & dissoudre le sucre, ce qui indique qu'elle ne contient pas de sels à base alcaline. Les eaux de puits, les eaux de source, n'ont pas toujours ces propriétés, & sont alors souvent salines. Les eaux de neige, les eaux que donne la glace fondue, deviennent potables en les agitant, c'est-à-dire, en y faisant pénétrer une certaine quantité d'air atmosphérique, ce que l'Hippocrate parait avoir entrevu, en disant qu'il ne manqueroit qu'un élément ou un certain principe à ces eaux, pour servir utilement à la nourriture de l'homme ou des animaux. L'eau

de pluie est très-bonne, si elle n'est pas recueillie immédiatement après une première averse : les eaux les plus malfaisantes, sont les eaux dormantes, dont parle Hippocrate, qui sont froides en hiver & chaudes en été ; que l'on puise dans les étangs, dans les marécages, dans les citernes mal entretenues, ou dans une source étroite, placée dans le voisinage d'un roissage de charbon ou d'une manufacture insalubre. Ces eaux méritent, en grande partie, le reproche qui leur a été fait, d'occasionner des fièvres quartes, des dysenteries, des hydopies, des affections scorbutiques, des varices. On ne doit pas les confondre avec les eaux quelquefois heureuses des grands fleuves, que l'on épure facilement au moyen d'un filtre de sable ou de charbon. On assure que quelques peuplades sauvages boivent l'eau de la mer ; mais, en général, cette eau ne devient ordinairement potable que par la distillation ou par la congélation. L'eau, à-bord des vaisseaux, auroit souvent tous les inconvénients de l'eau la plus malfaisante, si l'on n'employoit pas les plus grands soins pour la conservation, mais principalement le charbonnage de la surface interne des tonneaux, que les Anglais connoissent depuis long-temps, & sur lequel M. Berthollet attira vivement l'attention de ses compatriotes, vers la fin du siècle dernier (1).

Les eaux non potables peuvent le devenir par différents procédés qui les assainissent, ou qui en changent même la nature. Les eaux de source ou de puits, qui contiennent si souvent des sels à base calcaire, & qui incommode vivement les personnes dont les entrailles sont faibles & irritables, deviennent très-douces, très-molles, en y versant une petite quantité de carbonate de potasse, & en les séparant ensuite par la filtration.

Les eaux de neige deviennent très-bonnes, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, en les agitant vivement, pour les mêler avec une certaine quantité d'air atmosphérique. Les eaux malfaisantes qui tiennent des substances animales ou végétales en putréfaction, perdent une grande partie de leurs propriétés nuisibles, si après les avoir fait bouillir, on les filtre avec le charbon. On parvient encore à une épuraison plus complète, en combinant avec trois pintes & demie de cette eau, vingt-quatre gouttes d'acide sulfurique, & une once & demie de charbon. On assure du moins que la ville de Payley en Ecosse, qui étoit fort malfaisante, ce que l'on attribuoit à ses eaux, a trouvé un grand avantage dans l'emploi annuel de ce procédé, qui porte le nom de *Louis*, son inventeur.

Les eaux malfaisantes dont nous parlons, le deviennent encore bien davantage, lorsqu'elles contiennent, comme en Egypte, de petites sangsues qui sont avalées ; accident que les Anciens ont

bien connu, & dont les Modernes ont cité plusieurs exemples. Quoique les boissons fermentées de toute espèce soient très-répandues, on évalue au septième des hommes, le nombre de personnes qui se servent habituellement d'eau pour boisson. Les contre-indications qui pourroient s'opposer à l'usage de cette boisson, ne peuvent le tirer que d'une certaine faiblesse, que d'une certaine débilité des organes de la digestion, qui ne supportent, dans un temps donné, qu'une très-petite quantité de nourriture, & qui demandent à être excités, soit par les boissons fermentées les plus toniques, ou par des eaux minérales ou pur stimulantes, telles que les eaux de Selin, de Bussang, de Pyrmont, de Châtelain, &c.

On devroit peut-être rapporter aux boissons aqueuses, les sucs très-frais & légèrement mucilagineux, sans être sucrés ni acidulés, mais principalement les sucs que nourrit la chair pulpeuse du melon, & la chair encore plus humide & plus douce du melon d'eau, dont les Orientaux font un si grand usage.

3°. *Boissons acides.* Les boissons acides se préparent sans le secours de la fermentation ; avec les sucs des fruits d'un grand nombre de plantes, tels que les groseilles, les cerises, les citrons, les oranges, le raisin. On doit rapporter aussi à cette classe, l'eau rendue acide par son mélange avec quelques acides, mais surtout avec le vinaigre. Les boissons acides, mais surtout les eaux acidulées gazeuses, produisent défilâtér, non-seulement en humectant les parties qui sont le plus irritées dans la soif, mais en changeant le mode d'action de ces parties, par un effet qui leur est propre. Ces boissons défilâtèrent d'autant mieux, qu'elles sont plus franchement acides, qu'elles le trouvent plus froides, & sans aucun mélange avec des corps sucrés. L'eau, mêlée avec une petite quantité de vinaigre, doit être placée au premier rang parmi les boissons défilâtérantes, & les Anciens auxquels cette remarque n'avoit point échappé, attachoient une grande importance à munir chaque soldat d'une petite provision de vinaigre.

Les boissons acides dont on feroit un trop grand usage, surtout pendant les grandes chaleurs, assouffiroient sensiblement les voies digestives ; elles sont plus particulièrement contre-indiquées pour les personnes qui ont une gastrite ou une entérite chronique & latente, ou dont l'estomac est habituellement modifié par l'effet d'une disposition quelquefois au rhumatisme.

4°. *Boissons fermentées.* Ces boissons, que l'on prépare avec diverses substances végétales, & même quelquefois avec des substances animales, sont toutes plus ou moins stimulantes, par la quantité très-variable d'alcool qu'elles contiennent, & qui s'y développe par la fermentation d'une matière sucrée ou mucoso-sucrée. Le goût de ces boissons

font

(1) *Annales de Chimie*, tome LIX, page 68.

sons; qui est en général très-répandu, & qui semble le rattacher dans l'homme à une appétence instinctuelle, est beaucoup plus vif dans les pays froids & à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. La loi de Mahomet, qui le condamnait en Arabie, est nos lois de climat, suivant la remarque ingénieuse de Montesquieu, & on pourroit dire que Pyrrhogreus, parmi les nations, correspond aux différents degrés de latitude.

Les boissons fermentées les plus estimées se préparent avec le fruit de la vigne, & dans les beaux climats qui sont favorables à la culture de cette plante; c'est-à-dire, entre le 50°. & le 55°. degré de latitude. On prépare aussi des boissons fermentées avec un grand nombre de fruits ou de bulbes de plusieurs espèces de végétaux; le sucre lui-même, le suc de plusieurs palmiers, les semences de toutes les plantes céréales. Les tristes hivers & l'âpre climat des nations hyperboréennes, dont Virgile a si bien décrit la malheureuse position, s'en consolent, ajoute-t-il; avec leur vin de forbisier.

*Hic videntur adeo decipi, & populi les,
Perminuendo acido, immutatio vinis forbis.
Georg. III. 360.*

Les Kamifchadales, qui appartiennent à ces peuplades si défavorablement traitées par la nature, le procurent d'une autre manière des boissons fermentées. Les Tartares en obtiennent avec le lait de leurs juments, qu'ils font fermenter avec des substances aromatiques; ce qui fait leur *kamsus*, qui leur suffit pour leur donner le bonheur de l'ivresse & répandre une joie bruyante dans leurs festins. Les Russes préparent leurs boissons fermentées avec le pain, & plusieurs sauvages de l'Amérique, avec un mélange de différentes substances végétales; qu'ils font macérer dans l'eau, en y mêlant autant de salive qu'il leur est possible de s'en procurer.

Parmi toutes ces boissons fermentées, que l'industrie humaine s'est procurées avec tant de richesses, les différentes espèces de vins, la bière, le cidre, le poiré, &c., sont les seules boissons dont l'usage soit généralement répandu parmi les nations civilisées.

Le vin, considéré sous ce point de vue hygiénique, présente de grandes différences & de nombreuses variétés, depuis les vins acides & peu liquoreux des pays froids ou mal exposés, jusqu'aux vins alcooliques & généreux du midi de la France, & des plus heureuses contrées de l'Espagne & de l'Italie.

Tous ces vins ont pour caractère, si on les compare au plus grand nombre des boissons fermentées, de contenir ou arôme ou bouquet, propre à chaque espèce de vin, & de l'acide tartarique, qui se trouve en plus ou moins grande quantité dans toutes les espèces & que l'on ne rencontre jamais dans les cidres, dans les

poirés, ni dans aucune autre boisson préparée avec les Sorbes, les Cornes, &c.

Tous les vins se préparent en faisant fermenter, avec le concours de l'air & à une température de 10 à 12 degrés, une certaine quantité de suc de raisin ou *mout*, qui contient beaucoup d'eau, une certaine quantité de sucre & une matière particulière qui paroit se transformer ou fermenter; par la combinaison avec l'oxygène. La fermentation est très-lente pendant les quatre ou cinq premiers jours; on la prolonge jusqu'au dixième & même jusqu'au treizième, époque où la liqueur a déjà acquis une certaine force, qui augmente dans les tonneaux, où cette même fermentation continue pendant plusieurs mois. La durée de cette fermentation secondaire est indéfinie: ses effets, réunis à ceux de l'évaporation des parties aqueuses, améliorent beaucoup les vins, surtout les vins *généreux*, qui sont d'autant plus estimés qu'ils sont plus anciens. (Voyez Vin.)

Les meilleurs vins sont ceux qui sont remarquables par leur bouquet, & qui contiennent le plus d'alcool, & le moins d'acide. Les vins d'un ordre inférieur ont des qualités opposées; ils contiennent beaucoup d'acide, beaucoup de tartre, & l'ivresse qu'ils occasionnent est souvent compliquée d'indigestion. Brandy, qui s'est occupé d'une manière particulière de l'analyse des vins, les a reconnus plus ou moins riches en alcool, & dans l'ordre suivant:

Vin de Madère, 24,42 par 100 parties.

Vin d'Espagne, en général, 19.

Vin de Roussillon, 19,00.

Vin de Bordeaux, première qualité, 17,15.

Vin de Bourgogne, *ibid.*, 16,60.

Vin du Rhin, vieux, 14,37.

On peut adopter, sous le point de vue de l'hygiène, la division admise par Sinclair, qui rapporte les différentes espèces de vins aux titres suivants: 1°. vins acides; 2°. vins sucrés & édulcorés; 3°. vins généraux; 4°. vins affaiblis.

Parmi les vins acides se trouvent tous les vins froids & moins chargés d'alcool, très-différents de qualité, depuis les vins acerbes jusqu'aux vins de Champagne & de Bourgogne, qu'on comprend dans cette classe (1).

Les vins acides, même ceux qui sont d'une qualité supérieure, se trouvent encore indiqués, d'une manière particulière, pour toutes les personnes dont les organes digestifs sont faibles ou sensiblement modifiés par une disposition goutteuse ou rhumatismale, qui est facilement des aigreurs, des renvois de pain, pendant le travail de la première digestion, le soda ou pyrosis, ou l'usage des corps gras.

(1) On range parmi les vins acides, les vins du Rhin, de la Moselle, de Sauternes, d'Alsace, de Champagne, & même les vins de Bourgogne de qualité inférieure.

Bbbbb

M. Sendamore a peut-être un peu trop exagéré, d'après des vus purement théoriques, les inconvénients attachés à l'usage de ces vins, pour les gouteux, qui siferaient du reste avec plus de sécurité & d'avantage, des vins non acides & plus alcooliques de Rouffillon ou de Madère.

Ces vins seront également indiqués pour toutes les personnes dont les organes digestifs sont foibles & sans cesse abreuvés par les produits d'une sécrétion muqueuse & trop abondante. L'usage de ces vins à petite dose, au commencement & à la fin du repas, rendront leur digestion moins lente, moins imparfaite. Quant au choix de ces vins, parmi lesquels on range les vins de première qualité, de Rouffillon, de l'Hermitage, de Janguedoc, de Madère, d'Espagne non sucrés, l'expérience de chaque individu pourra seule les diriger d'une manière convenable.

Les vins *sacrés*, parmi lesquels on place les vins de Hongrie, plusieurs vins d'Espagne, d'Italie; de Grèce, du Cap, conviennent, en général, assez peu, quand on en fait usage au milieu ou à la fin d'une alimentation très-abondante. Ils peuvent alors agir, chez les personnes dont l'estomac est foible, comme tous les corps sucrés, & contribuer à provoquer dans la masse alimentaire une tendance à la fermentation, qui rend la digestion laborieuse & moins parfaite.

Ces mêmes vins, quand ils ont un bouquet très-développé, lorsqu'ils sont riches en alcool, conviennent aux personnes très-sobres. Sydenham, auquel nous empruntons cette remarque, l'avait fait, d'après son expérience personnelle, qui l'avait porté à reconnaître de grands avantages dans l'usage du vin de Canarie.

Les vins que Sieclair appelle assez improprement *vins astringés*, sont les vins de Portugal en général, lorsqu'ils ne sont pas frelatés par l'addition de l'eau-de-vie. Ces vins, qui diminuent les sécrétions muqueuses de l'intestin, & qui par cela même favorisent la constipation, conviennent dans les pays froids & humides, où leur consommation est très-considérable.

On a fixé à une pinte & demie, la dose de bon vin dont un homme bien portant & familiarisé avec l'usage des boissons fermentées, pouvait faire aisément ou impunément usage. Plusieurs personnes dépassent souvent cette limite sans en être incommodées, mais sans en retirer d'autre avantage, que celui de satisfaire un penchant honteux & condamnable, à l'ivrognerie.

Du reste, la manière la plus généralement adoptée pour l'emploi du vin, consiste à le mêler avec une certaine portion d'eau naturelle ou d'eau minérale potable & tonique, & d'en boire de petites quantités à la fin & au commencement du repas.

Quelques personnes, qui apportent beaucoup de sollicitude dans leur diététique, boivent toujours le vin & l'eau sans mélange; ce qui pour-

rait être universellement adopté avec avantage, excepté par quelques personnes, dont les organes de la digestion, trop foibles, ont besoin d'être stimulés pendant l'alimentation, soit par du vin très-généreux, soit par des eaux minérales gazeuses, mêlées avec le vin à une très-petite dose, ce que l'expérience individuelle peut seule faire reconnaître. D'autres ne peuvent boire impunément du vin, même étendu dans beaucoup d'eau. On a vu des indispositions assez graves, disparaître en n'employant d'autre boisson que l'eau bien pure & très-peu froide. Voyez, pour plus de détail, Vins (Boissons spiritueuses).

L'usage immodéré du vin amène, avec le temps, toutes les infirmités qui sont la suite inévitable de l'abus des boissons spiritueuses.

Les vins *suffisés* & *mêlés*, lors même qu'ils ne contiennent aucune substance vénéneuse, sont très-unifères pour toutes les personnes dont les voies gastriques sont tout à la fois très-foibles, très-irritables, & le système nerveux très-mou. L'eau-de-vie, que l'on ajoute à certains vins, pour les rendre en apparence plus généreux, est capable d'altérer les organes délicats & sensibles de ces personnes, qui manquent rarement de se trouver incommodés quand elles ont fait usage de ces vins.

La manière de faire usage des vins, contribue d'ailleurs, autant que leurs qualités, à leur être nuisible ou utile. Une quantité de ces boissons, un peu considérable, ne convient en général qu'à un très-petit nombre de personnes, & l'abus des vins de qualité inférieure, des vins frelatés, dans les classes indigentes, doit être regardé comme l'une des causes principales de cette foule d'affections chroniques des organes de la digestion, que les médecins rencontrent bien plus souvent dans les hôpitaux que dans leur pratique particulière. Il faut ranger en outre, parmi les coutumes les plus dangereuses, l'usage si généralement répandu de boire plusieurs espèces de vins pendant un seul repas; usage qui ne peut convenir aux vieillards, & auquel les personnes robustes recourent, quand leur expérience ou leur raison les a éclairés.

Les *cidres* bien préparés, même les *cidres* de qualité inférieure, que l'on appelle *petits cidres*, forment une boisson fermentée très-saine, & moins surquue l'habitude a familiarisé avec son usage. On a même vu des *cidres doux*, fort bien faits & un peu anciens, produire les plus heureux effets dans le régime de plusieurs personnes, qui étoient tourmentées, depuis longtemps, par des affections catarrhales chroniques des voies pulmonaires & des voies gastriques, avec complication inflammatoire. Les mêmes boissons ont également paru indiquées pour dissiper des symptômes de nerfisme ou de névralgie abdominales, & le médecin Paulmier assure qu'il ne

parvint à se guérir d'une cruelle hypochondrie ; qu'avec cette boisson fermentée.

Les cidres frelats, les feuls peut-être que l'on boive dans les grandes villes, les cidres troubles & mal préparés, sont loin de produire d'aussi bons effets, & méritent tous les reproches que l'on a faits d'une manière trop générale aux cidres. Du reste, cette boisson, qui est l'objet d'un commerce & d'une industrie assez étendue en France, en Angleterre & en Amérique, a été introduite en Europe par les Normans, lorsqu'ils étoient les maîtres de l'Espagne. On en distingue un grand nombre d'espèces, qui sont susceptibles d'une foule d'altérations spontanées, lorsque l'on n'apporte pas autant de soin à leur conservation qu'à leur préparation. (Voyez Pomme, Pomme.)

Ces différentes espèces de cidre, comme toutes les boissons fermentées qui ne sont point préparées avec la raisin, en contiennent point d'acide tartareux. La première fermentation du suc de pomme destiné à leur préparation, & qui s'obtient par la pression, se fait dans des tonneaux, que l'on ferme au bout de très-peu de jours, & lorsqu'une certaine écume a été rejetée. Une fermentation secondaire s'établit alors, & après une durée aussi indéfinie que celle du vin, surtout lorsque dans la suite la liqueur est renfermée dans des bouteilles bien bouchées. On trouve dans les cidres une assez grande quantité de sucre, d'alcool, surtout dans l'espèce dite *gros cidre pur*; du mucilage, qui diminue à mesure que le cidre s'améliore; un principe amer, une matière colorante, de l'acide malique & plusieurs substances salines.

Les précipités que l'on obtient avec les réactifs, n'indiquent pas toujours une sophistication & peuvent avoir en leur source dans les eaux dont on s'est servi, dans les vases ou les instrumens dont on a fait usage : vérité importante, & que les commissaires de l'Académie firent connaître à la fin du siècle dernier (1).

Les cidres nouveaux & très-doux sont d'une digestion difficile; ils agissent même le plus souvent d'une manière purgative.

Les cidres s'altèrent d'autant plus d'aillieurs, qu'ils sont moins privés du contact de l'air, & qu'ils sont tenus davantage en vidange. Lorsque, par suite, d'une pareille négligence, ils sont devenus nuisibles, ils peuvent occasionner, surtout par un usage habituel, la colique dite du *Poitou*, que l'on a comparée à la colique de plomb, d'après la gravité de ses symptômes.

La boisson fermentée que l'on obtient des poires, & que l'on nomme *poiré*, se rapproche beaucoup des différentes espèces de cidre, par

sa composition & ses différentes propriétés. Cependant, cette boisson contient, en général, plus d'alcool que de cidre, & se trouve plus souvent employée pour contribuer à la falsification des différentes espèces de vins. Le vin du Sorbier ou de Sorbier, que l'on obtient non-seulement des sorbiers, mais de tous les fruits qui ne sont mangés que lorsqu'ils sont blets, cette boisson, très-sûrte dans le Nord, est beaucoup plus acide que le cidre & le poiré.

Les boissons fermentées que l'on prépare avec le miel, & dont l'usage est assez répandu dans les provinces méridionales, mais surtout en Pologne & en Russie, en manquent par d'eux certaines force, lorsqu'elles sont convenablement préparées. Celle que Sinclair désigne sous le nom de *mead*, s'obtient en faisant fermenter l'hydromel, convenablement aromatisé, avec une quantité suffisante de levure de bière. Cette boisson est claire, agréable au goût, assez nourrissante & sensiblement tonique, par les substances aromatiques qu'elle contient. La boisson appelée *methelin* par le même auteur, ne diffère du *mead* que parce qu'elle est plus fortement assaisonnée (2).

Les vins de miel les plus estimés sont connus en Pologne sous le nom de *lipets*, & se préparent surtout avec le miel de Lithuanie.

Ces vins de miel, comme le miel lui-même, ne peuvent jamais convenir aux personnes dont l'estomac supporte mal les fruits acides & sucrés, soit par faiblesse, soit par un développement de sensibilité qui dépend d'une phlegmie chronique & latente ou d'un des voies gastriques; disposition que les détails de la pratique nous ont fait reconnaître quelquefois, d'après une indication en apparence très-légère & très-peu importante. On devroit peut-être rapporter aux vins de miel la *pulque* que l'on prépare au Mexique avec la sève sucrée d'une espèce d'agave sauvage. (Voyez Polype.)

La bière, dont l'usage n'est guère moins répandu que celui du cidre, se prépare, soit avec l'orge, soit avec les semences de toute autre plante céréale. (Voyez Orge.) Son usage est très-ancien, & paroit avoir été connu des Égyptiens, qui préparaient une mauvaise bière avec l'épeautre (*Triticum spelta*).

Les reproches que Galien, ainsi que Dioscoride, ont faits à la bière, ne pourrions avoir aucune autorité aujourd'hui, quel que soit notre respect pour les Anciens; ils doivent seulement nous rappeler que la bière, à laquelle ils s'appliquent, étoit mal préparée.

On s'occupe de bonne heure en Europe, mais

(1) Ces commissaires étoient Lavoisier, Berthollet, M. Berthollet, &c. (Voyez les Mémoires de l'Académie des sciences, année 1786.)

(2) Voyez John Sinclair, *Principes d'hygiène*, traduction française, page 228.

surtout en France, de cette préparation, comme nous le voyons par une ordonnance de 1268. Le choix de l'orge, les procédés pour la faire germer, sa torréfaction & la formation de la drèche, les détails de la fermentation, sont autant de points d'hygiène publique dont l'autorité administrative a été souvent occupée.

La bière préparée avec intelligence & probité, est en général une des boissons fermentées les plus saines : elle ne convient pas cependant aux personnes dont les voies digestives ont peu d'énergie, ou qui ont une tendance particulière à la gravelle & au catarrhe de l'urètre. L'usage insensé de la bière suffit souvent pour exciter ces catarrhes chez quelques personnes ; ce que l'on prévient en ajoutant à la bière un peu de vin ou de teinture alcoolique de houblon.

Sydenham faisoit un cas particulier de la petite bière ; mais tous les médecins de sa nation & les médecins en général, s'accordent pour ranger la *bière forte*, l'*aide*, le *porter*, parmi les boissons fermentées, dont l'abus est le plus funeste. M. Scudamore accuse en particulier le *porter* d'avoir contribué, par son usage dans les classes inférieures, à rendre la goutte beaucoup plus commune en Angleterre. L'ivresse occasionnée par la bière forte se trouve presque toujours compliquée d'indigestion, comme l'ivresse que produisent les cidres ou les mauvais vins. On assure, en outre, que l'ivresse du *porter*, qui manque rarement de contenir des substances narcotiques, est beaucoup plus dangereuse que toutes les autres ivresses.

L'emploi du houblon rend la bière beaucoup meilleure & plus susceptible de conservation. Il paroîtroit aussi, d'après l'expérience de Cook, que l'infusion prolongée des horgesons de sapin dans la bière, avec ou sans le concours d'une fermentation secondaire & prolongée, augmenteroit beaucoup les propriétés excitantes de cette boisson. Nous ne croyons pas devoir ajouter ici aucune remarque à nos considérations particulières sur la préparation & la falsification de la bière, considérée sous le rapport de la médecine légale, dans l'article que nous avons consacré à cette matière. (Voyez cet article.)

LIQUEURS SPIRITUEUSES. Les liqueurs spiritueuses, dont l'usage fut inconnu aux Anciens, & que les Modernes ont remonter aux Arabes, vers la fin du moyen âge ; ces liqueurs sont bien moins employées comme des boissons que comme des excitans, dans l'effet desquels ceux qui en font usage, recherchent des sensations plus fortes, un sentiment plus vif de l'existence, & une ivresse qui fait oublier les peines ou les travaux d'une vie malheureuse ou pénible.

On abuse des liqueurs spiritueuses par la distillation, non-seulement de toutes les espèces de vins, mais encore de toutes les boissons fermentées : les plus employées sont les eaux-de-vie,

dont la distillation est une branche principale de l'industrie & du commerce du midi de la France, depuis Arnauld de Villeneuve ; le *rhum*, qui est encore une eau-de-vie tirée du sucre, l'*anack* ou *rack*, le *kirschchen-wasser*, l'*eau-de-vie de grain*, &c.

L'eau-de-vie, même à petite dose, ne peut guère convenir qu'à des personnes humides & froides, & aux personnes à la fois robustes & peu irritables. La plus légère indisposition inflammatoire, surtout dans les voies gastriques ou pulmonaires, doit la faire proscrire comme un véritable poison. L'usage habituel de l'eau-de-vie à dose immodérée, produit d'autres effets également nuisibles, & que l'on peut rapporter aux trois titres suivans, savoir : 1°. l'irritation immédiate des voies gastriques ; 2°. l'altération de la nutrition ; 3°. une modification vicieuse du cerveau qui se manifeste d'abord par l'ivresse, & ensuite par la débilité physique & morale des malheureux ivrognes.

Les galestes aiguës ou chroniques, les hépatites, diverses hydrophes, la consomption, le tremblement fébril primaires, & souvent une sorte de délire & de délire particulier (le *délirium tremens*), &c., sont les infirmités que l'on attribue justement à l'abus & même à l'usage des liqueurs alcooliques.

Les nations civilisées doivent ces boissons funestes à une dégradation réelle de l'espèce humaine, surtout dans les grandes villes & parmi les classes inférieures de la société. Les peuples sauvages, que leurs rapports avec l'Europe ont plutôt corrompus que civilisés, peuvent reprocher aussi à la même cause leur dépopulation & l'apparition de plusieurs infirmités qui leur étoient inconnues. Tous les hommes éclairés connoissent ces vérités ; les médecins ne cessent de les proclamer depuis un demi-siècle ; les gouvernemens en sont frappés ; & l'abus subsiste, parce qu'il se rattache à plusieurs autres abus, & qu'il trouve un principe de force & de durée dans cette affluence.

Les altérations & les sophisticationes assez fréquentes de l'eau-de-vie ont été rapidement indiquées dans un autre article auquel elles appartiennent. (Voyez ALIÉNÉS & BOISSONS, sous le rapport de la médecine légale & de l'hygiène publique.)

Le mélange de ces mêmes liqueurs avec diverses substances, faisoit le raffinement & l'industrie propres à l'art du couvreur & du distillateur, ne fait souvent qu'ajouter à leur action funeste, lorsque ces substances sont elles-mêmes très-nuisibles ou narcotiques. Voyez SPIRITUEUX (liqueurs spiritueuses).

Les boissons aromatiques, comme les boissons spiritueuses, sont bien moins employées pour débiter & pour contribuer à l'alimentation, que

pour produire un sentiment quelquefois utile ou agréable.

Celles de ces boissons dont l'usage est le plus répandu, sont le thé & le café, qui forment l'un & l'autre, inconnus aux Anciens.

Parmi les richesses que les progrès de la navigation ont procurées aux peuples modernes, on place en premier rang le thé, que l'on rapporte à deux titres principaux ; savoir, le thé vert & le thé noir (*thé boui*). Ce que l'on appelle les *feuilles de thé*, sont les feuilles les plus blanches, & non les fleurs de cet arbuste.

Le thé, dont nous avons déjà parlé dans notre vue générale des productions de la nature qui servent comme boissons ou comme alimens, le thé n'a commencé à être employé, au moins dans la partie méridionale & dans la nord de l'Europe, qu'en 1660, sous le règne de Charles II. Son usage s'est fortifié & s'est accru par les Hollandais, qui trouvoient un grand avantage à cette préparation.

Le temps, la coutume, l'imitation, & sans doute les sensations agréables, qui se trouvent attachées à l'usage du thé & aux habitudes qui tiennent à cet usage, ont contribué à le répandre de plus en plus malgré les efforts d'une opposition, qui ne sont guère connus aujourd'hui que par les bibliophiles.

Le meilleur thé est une odeur de violette & une saveur âpre & un peu astringent.

Le café, dont l'usage est aujourd'hui presque universel, ne commença à s'établir en France, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que sous Louis XIII. On l'appelloit alors *cahouet*. Les déclamations prétendues diététiques dont il a été l'objet, n'ont guère eu plus de succès que celles qui furent dirigées contre l'usage du thé.

Le café, qui appartient à la famille des Rubiacées, ne parut pas étranger, dans ses effets généraux, aux propriétés médicales du plus grand nombre des plantes de cette famille : la femence ne devient propre à donner le boisson parfumée, que nous devons à la préparation, que lorsque la tige, résidu et développé dans la perspiration, une huile aromatique & pyrogénée à laquelle on n'e peut-être pas donné assez d'attention.

Le meilleur café se prépare avec des grains torréfiés, sans les faire bouillir, & en provoquant, au moment de s'en servir, un premier degré d'ébullition qui en développe le parfum.

Le café est un mode d'action qui lui est propre : l'un de produire, comme le thé, un effet analogue à celui de l'opium, il est le meilleur contre-poison du narcotisme & de l'ivresse.

Son action par le, du reste, modifier moins évidemment la sensibilité générale & la tonicité, que l'action du cerveau sur les muscles, & la participation de cet organe dans les fonctions motrices, à l'embryon de la graine, par le d'ailleurs beaucoup plus fluide que le pers-purpur, & il suffit

de l'en extraire, pour rendre l'effet du café sans inconvénient, même pour les personnes dont cet effet dérange le sommeil, lorsque cette séparation n'a pas été opérée.

Le café à la crème ou eu lait ne peut convenir aux personnes dont le sein a peu d'énergie, ou qui ont en général les organes de la digestion un peu faibles & incapables de supporter l'action des corps gras. Le développement de l'huile pyrogénée, dont nous avons parlé, & son mélange avec le lait, doivent d'ailleurs être pris en considération dans les motifs qui portent souvent à défendre la préparation du café, sous forme de boisson laiteuse & alimentaire, à un grand nombre de personnes, & surtout à certaines femmes qui l'urge sensiblement ; & chez lesquelles il provoque un chéirpiment des fleurs blanches.

(L. J. MOREAU DE LA SARTRE.)

NOUVEAUX (*My. des publiques*). (*Médecine légale*). Les questions concernant les alimens par lesquels les médecins peuvent être consultés par les autorités judiciaires ou administratives, sont d'une importance que nous ne pouvons nous dispenser, par exemple, pourrions dire appelés à fixer la nature ou la quantité des nourritures que doivent être accordées dans quelques circonstances particulières. Une autre question plus grave & en quelque sorte plus délicate, de décider si les effets physiques de la faim pourroient être reconnus après la mort, & dans un cas où l'on suppose qu'ils l'avaient occasionnée. Dans plusieurs autres circonstances, il ne faut rien moins qu'éclaircir & diriger l'autorité administrative sur le régime des prisons, des divers genres d'hospices ou d'hôpitaux, ou sur l'approvisionnement des armées, sur l'alimentation particulière des marins ou des colons, & de toutes les réunions d'hommes auxquels une position difficile ou de grands dangers donnent un droit particulier à la protection du Gouvernement ; chez les nations civilisées.

Ces objets, considérés dans leur ensemble, appartiennent à une jurisprudence & à une législation particulière & plus ou moins avancée dans les différens temps & chez les différens peuples, suivant le degré de civilisation & l'état des connaissances, qui ont nécessairement exercé une très-grande influence, sur cette partie de l'administration & des institutions.

Plusieurs nations très-anciennes ne paroissent pas avoir été entièrement étrangères à ces dispositions législatives relatives aux alimens. Les Hébreux, les Egyptiens se sont même rendus célèbres sous ce rapport, par des prescriptions, par des observations dans lesquelles d'habiles commentateurs ont cru découvrir des intentions à un esprit véritablement diététique (1). Les Athéniens

(1) On cite notamment les préceptes commandés aux Juifs de ne pas manger de la viande avec du lait.

avoient leurs agoronomes, les Romains leurs édiles, & les gouvernemens, chez les peuples modernes, ne tardèrent pas à porter leur sollicitude au même objet, en profitant souvent avec beaucoup d'utilité, de la distribution des métiers ou professions, par communautés ou confréries, si favorable à une surveillance sanitaire.

Les bouchers, les bûlangers, les charcutiers, les chaudronniers, les cabaretiers, & plus tard les restaurateurs, les marchands de comestibles, les enfumeurs & les limonadiers, furent successivement en France, l'objet de cette surveillance & d'un grand nombre de mesures administratives plus ou moins propres à défendre la faiblesse ou l'impérvoyance contre les atteintes de la cupidité. Des le quatorzième siècle, nous trouvons une ordonnance très-sage du roi Jean relativement aux bouchers. Une ordonnance plus ancienne, donnée au nom du prévôt de Paris, sous la date de 1258, prescrit des réglemens aux brasseurs. Des actes du même genre parurent sous les dates de 1351-1509-1665-1670-1735.

Ce qui concerne le *language* des cochons prétendus sains, remonte presque à un temps immémorial.

Un arrêt de 1716 condamne un fleur Dabapt, directeur des boucheries de l'armée, à neuf années de bannissement & à 50 mille liv. d'amende, pour avoir laissé vendre, ou fait vendre & distribuer la chair d'animaux sains ou d'animaux qui avoient succombé à des maladies. Nous admirons encore aujourd'hui la sagesse des ordonnances qui ont été rendues depuis 1744 sur les *nourisseurs* de bœufs. De grands progrès furent faits, du reste, dans cette partie de la législation sous l'administration du célèbre lieutenant de police Lenoir, mais des progrès beaucoup plus grands, des mesures plus précises, une surveillance plus éclairée, plus étendue, doivent être rapportés, à un ministre de justice que de reconnaissance, au ministère de l'intérieur, depuis la fondation des nouvelles Ecoles de médecine de Paris (1); & à la préfecture de police de Paris, depuis l'établissement du conseil de salubrité. Il seroit sans doute trop long de traiter ici toutes les questions qui concernent la législation dont nous venons de parler, & qui peuvent se rapporter à l'hygiène publique, ou à la médecine légale, dans l'examen des nourritures :

(1) Depuis leur fondation, l'Ecole de médecine de Paris a constamment envoyé les doubles fonctions de corps enseignant & de Conseil du gouvernement, pour tout ce qui concerne la salubrité publique. Les leçons qui regardent le plus combien être dans une compagnie s'est rendre recommandable également à ces hautes fonctions; doivent constituer les *Aliments de la Famille*, &c. de la Société de médecine de Paris, 7 vol. in-8°. ouvrages qui nous ont souvent fourni occasion de citer dans cet article, en regrettant que le dernier auteur de l'art. *Conservateurs*, du *Dictionnaire des sciences médicales*, ne l'ait pas mis davantage à contribution.

questions qui ont été ou qui seront examinées dans divers articles de ce Dictionnaire.

Nous nous bornons à jeter un coup d'œil sur les objets de surveillance qui, dans ces importantes considérations, doivent attirer journellement l'attention de l'autorité. Ces objets seront rangés sous cinq principaux titres : 1°. les *aliments*; 2°. les *vases employés* pour la préparation des *aliments*; 3°. l'altération & la sophistication des *substances alimentaires végétales*; 4°. l'altération des *substances alimentaires animales*; 5°. les *boissons*; 5°. les propriétés nutritives, comparativement examinées dans plusieurs substances alimentaires.

S. 1^{re}. *Ustensiles & vases employés pour les préparations alimentaires.*

Plusieurs vases ne peuvent être long-temps en contact avec certaines substances alimentaires sans qu'il se forme une matière plus ou moins nuisible, & quelquefois vénéneuse : tels sont les vases ou les réservoirs de plomb; les vases de cuivre mal émaillés, les vases d'argent même qui contiennent toujours une certaine portion de cuivre, & diverses sortes de *poteries*, dont le vernis, de nature métallique, n'auroit pas été convenablement cuit.

Un grand nombre d'arrêts, d'ordonnances, de recherches savantes, d'expériences, de rapports d'experts, & de considérations médico-légales se rapportent à ces intéressans objets de l'hygiène publique. Voici, en les traçant de la manière la plus rapide, l'état & les résultats des connaissances qui peuvent diriger les administrateurs ou les médecins dans l'examen de ces matières. Les vases ou les réservoirs de plomb peuvent donner lieu à des accidens plus ou moins graves par leur contact avec des matières solides & liquides qui servent comme boissons ou comme alimens.

Le sel qui se forme dans cette circonstance est une substance vénéneuse; & l'on cite plusieurs exemples de personnes vivement incommodées, soit pour avoir bu de l'eau qui avoit communiqué avec des surfaces de plomb, sur les toits ou dans les aqueducs; soit pour avoir fait usage d'alimens solides ou liquides qui avoient séjourné dans des vases de plomb. L'une autre part, il est prouvé que l'on peut se servir sans danger, d'ustensiles faits avec un alliage composé avec une partie égale de plomb & d'étain, préparation que le vinaigre même & le suc de citron ne sauroient attaquer.

L'eau de puits, puisée dans des vases de plomb, & l'eau conservée long-temps dans des vases du même métal exposés à l'air, sont très-dangereuses.

Les sirops & les eaux de fleurs clarifiés avec l'acétate de plomb, retiennent une partie de ce sel & on les a négligemment purifiés; & les infusions de drogues, des distillations, des confitures, des

pharmaciens, considérées sous ce rapport, ne peuvent exciter trop de sollicitude ou de surveillance.

Les vases de cuivre pur, ou les vases de cuivre mal étamés, sont encore plus dangereux que les vases de plomb, & des empoisonnements assez fréquents ont lieu à la suite du séjour de diverses préparations alimentaires dans de semblables vases, même au milieu des ressources d'une haute civilisation, & sous la surveillance de l'administration la plus éclairée. Le vert-de-gris artificiel qui produit cet empoisonnement, est soluble & par cela même bien plus dangereux que le vert-de-gris naturel (*Sous-carbonate de cuivre*), qui se trouve sur les carènes de monnaie, dans les robinets de fontaines, &c. &c.

La quantité de ce poison est assez considérable pour agir avec toute l'intensité qui lui est propre, si on laisse refroidir dans les vases dont nous parlons, certaines préparations alimentaires, seules ou grasses. Il faut également regarder comme fort suspect, les vinaigres que vendent dans les villages, les marchands forains, & qui sont contenus dans de petits tonneaux de cuivre : la salade préparée avec ce vinaigre a souvent été la cause d'un véritable empoisonnement.

L'étamage qui a pour objet de donner une innocuité parfaite à tous les instruments de cuivre employés pour la cuisine, & comprenant les nombreux articles de la chaudronnerie, cet étamage doit être préparé avec l'étain pur ou le moins pur. Il a pour objet de prévenir l'oxydation du fer ou de cuivre sur lequel on l'applique ; procédé dont l'usage parait du reste fort ancien. Celui que l'on emploie pour l'étamage, se combine avec la surface du fer ou du cuivre, bien décapé, & sur laquelle on l'applique après l'avoir échauffé. Cet enduit résiste à une chaleur au-dessus de l'eau bouillante, mais il ne pourrait supporter sans se fondre, la chaleur nécessaire pour plusieurs préparations qui s'exécutent par le cuisinier & par le pharmacien, ou par les chimistes.

On a renoncé entièrement à l'idée de remplacer dans l'étamage, l'étain pur au zinc, qui est beaucoup plus altérable que l'étain, & beaucoup plus nuisible après cette altération.

Les accidents attribués, soit à la vaisselle d'étain, soit à l'étamage composé de ce métal, ont été beaucoup exagérés, & rapportés le plus souvent à des causes qui lui étoient étrangères, à l'arsenic, par exemple, à l'antimoine, au plomb dont il pourrait exister quelques parties dans un étain non purifié.

Sans entrer ici dans des détails qui n'appartiennent pas à notre sujet, nous pouvons assurer d'une manière générale, & d'après une longue suite d'expériences & de recherches, que dans le petit nombre de circonstances où le contact de certaines substances alimentaires avec le plomb a donné lieu à quelques symptômes d'indisposition, l'oxyde de ce métal a été le seul regardé comme la cause de

cet accident : vérité que MM. Proust & Deyreux ont mise hors de doute, & qui s'est montrée avec un nouveau caractère d'évidence, par les expériences des commissaires, que le gouvernement espagnol avait chargés d'examiner de nouveau cette belle question d'hygiène publique.

D'après ces considérations, la sagesse, la conservation de l'étamage, son renouvellement en temps opportun, sont évidemment les principaux objets de la surveillance administrative, & l'on ne doit pas être étonné, si plusieurs dispositions réglementaires concernant la police de la chaudronnerie se rapportent à cette matière. (L'article XI de la déclaration royale du 4 octobre 1755; l'article XIII du même acte; les articles XVII & XVIII.)

Dans l'état de perfection où elle est parvenue aujourd'hui, la poterie n'exige pas autant de surveillance que fait du chaudronnier.

Les poteries de première qualité, ou les porcelaines, ne peuvent faire courir aucun danger. Les poteries de seconde sorte, que l'on désigne aussi sous le nom de *faïence*, ne pourroient devenir nuisibles que dans les cas où les préparations métalliques qui sont employées pour recouvrir plusieurs espèces de cette poterie ne seroient pas bien disposées, ni suffisamment cuites. Le vernis de la poterie jaune, que l'on prépare dans plusieurs pays avec l'oxyde gris de plomb, ou avec la litharge, est regardé comme l'un de ceux qui pourroient devenir les plus nuisibles, s'il n'étoit pas convenablement préparé, ainsi qu'on l'a vu souvent pour des poteries d'une qualité inférieure dans les campagnes.

La terre de pipe, qui se trouve très-généralement employée, n'a offre aucun inconvénient dans son vernis composé de sulfure de plomb, de silice, & d'un alcali fixe. Les poteries rouges, qui ne servent pas ordinairement à la préparation des substances alimentaires, sont recouvertes à l'intérieur avec du verre de plomb, lorsqu'on les destine à contenir de l'eau.

Les gris ou les faïences à pâte compacte, ont l'avantage de pouvoir être employées sans le secours d'une couverture métallique. Notre mémoire ne nous fournit point en ce moment d'exemples d'accidents occasionnés par les vernis de la poterie, dont il parait que l'on a souvent exagéré le danger d'après des vues théoriques. M. le Dr. Mirat, qui s'est attaché à rassembler toutes les indications relatives aux inconvénients du plomb, ne cite lui-même aucun effet dangereux opéré par les couvertures de ce métal. Il rappelle seulement, & d'après Combalotier & Vandermonde, que la colique de plomb s'est manifestée chez plusieurs personnes, pour avoir mangé du pain qui avoit été cuit dans un four que l'on avoit fait chauffer avec des vieux feuillets enduits d'une peinture verte & composée d'un mélange de céruse & de vert-de-gris.

M. Remer, qui s'est occupé de ces mêmes peintures & des couvertes de la poterie, d'une manière plus spéculative que pratique, conviecoit lui-même que le vernis de la poterie ne pourroit être nuisible que s'il n'étoit pas suffisamment éuit. Quoi qu'il en soit, il est probable que, dans la suite, la poterie de grès & la porcelaine d'une qualité inférieure deviendront si communes & d'un prix si modéré, qu'il sera possible de les substituer, dans presque tous les usages de la vie, aux différentes poteries, que l'on est obligé de seconvenir avec un vernis métallique (*).

§. II. Substances alimentaires végétales.

Dans les grandes villes, telles que Londres & Paris, plusieurs substances alimentaires végétales sont rarement livrées au public dans leur état d'intégrité; ou les aliène, ou les mélange, ou les dissile, ou les sophistique de mille manières, tantôt pour en augmenter le poids ou en rendre la saveur plus agréable, tantôt pour substituer des matières de qualité inférieure & souvent malfaisantes, à des substances plus chères ou mieux conservées.

Un auteur anglais, qui a récemment écrit dans le dessein de déviler ce genre de fraudes, assure qu'il y a peu d'alimens à Londres, qui ne soient décolorés & sophistiqués par la cupidité mercantile, qui brave tous les réglemens & se débrouille pour soustraire à toutes les poursuites (**).

Les substances alimentaires végétales, sur la qualité & les différentes altérations desquelles les médecins pourroient être appelés à prononcer, sont principalement les différentes espèces de farines, le pain lui-même, le chocolat, le café, les champignons, &c.

Les différentes espèces de farines qui sont le plus en usage, peuvent, sans être gâtées ni sophistiquées, présenter, relativement à leurs propriétés nutritives, des différences, pour lesquelles les médecins sont consultés. Des recherches de ce genre ont occupé récemment MM. Henri, de la Pharmacie centrale, & Vauquelin, de l'Académie des sciences.

D'après les analyses de M. Henri, le pain préparé avec la farine française, a paru bien préférable à celui qui avoit été fait avec des farines étrangères venant d'Odessa; différence qui a été attribuée à la commencement d'altération dans ces farines, qui ont exigé beaucoup plus d'eau pour en former une pâte consistante. Les farines que M. Vauquelin a soumises à ces analyses

étoient de plusieurs sortes; savoir: 1°. Graine brute de froment; 2°. F. de méteil; 3°. F. de blé dor d'Odessa; 4°. & 5°. F. de blé tendre d'Odessa (première & deuxième qualité); 6°. F. du service (dite de deuxième qualité); 7°. F. de boulangers de Paris; 8°. & 9°. F. des hospices (deuxième & troisième qualité).

Ces différentes espèces de farine, dans l'examen détaillé desquelles nous ne suivrons pas ici notre avant confire, lui ont offert d'assez grandes différences dans les proportions d'eau, d'amidon, de gluten qu'elles contiennent. L'eau qui se trouve dans les farines se trouve pulvé en général dans l'atmosphère. Le minimum pour l'eau a été de 6 pour 100, & le maximum, de 12; différences qui s'expliquent par de grandes variétés dans les propriétés hygrométriques des diverses espèces de farines.

La proportion d'eau est plus forte nécessairement si l'atmosphère est très-humide; la farine alors se pelotonne, le gâte, & son poids augmente de 12 à 15 pour 100; ce que les méuniers ont très-bien observé.

Le maximum d'amidon, dans les farines dont nous avons donné la liste, est de 35 centièmes, & le minimum, de 36, dans le blé d'Odessa, qui donne d'ailleurs le plus de gluten.

Le résultat des mêmes analyses a fait découvrir de grandes variétés entre les quantités de gluten, dans les farines de blé d'Odessa & dans les farines françaises.

Les premières sont sensiblement plus riches en gluten, & en contiennent plus d'un tiers de plus que les autres farines. Cependant, lorsqu'on en fait une pâte, elle n'absorboit pas plus d'eau que les autres; ce que M. Vauquelin explique par l'état de l'amidon, qui se trouve par petits grains durs & comme des fragments de gomme, lesquels exigent moins d'eau pour être mouillés que l'amidon mouleux & comme impalpable des autres farines.

M. Vauquelin avoit entrepris le travail dont nous avons tiré ces aperçus généraux, à la demande de M. Mégillier, qui se propose de publier, d'après une longue suite d'observations, un *Traité sur la panification pour les troupes*, & dont il est probable qu'on aura mis l'expérience & les lumières à contribution, pour les nouvelles dispositions qui viennent d'être établies par une ordonnance royale, sur cette partie importante de l'hygiène publique (†).

Les altérations les plus fréquentes de la farine ont lieu par l'effet de l'humidité, des in-

(*) *Poyet Réass, Police judiciaire pharmaco-chimique*, Rec., page 1061. — voyez aussi *Vacher, Actes des académies des sciences de l'art*; — *Stora, Diss. diss.* — *Beaumont de la Harpe, Sur le pain, &c.* — *Beaumont de la Harpe, Sur le pain, &c.* — *Beaumont de la Harpe, Sur le pain, &c.*

(†) M. Accum, *A Treatise on the alterations of food*, &c., 1820, 10 5.

(1) *Poyet le Moniteur* du 3 octobre 1823. Cette ordonnance royale porte, que le pain de munition sera fabriqué avec ces les pailles du royaume, avec des farines de pur froment, blanches & 14 pour 100; d'ailleurs qui ne s'étend pas à la garnison de Paris.

les (1), par leur mélange avec la sable, provenant d'une meule, trop tendre, ou avec le plâtre, la craie, la céruse, l'alun, ou des sables de qualité inférieure.

La farine humide, pelotonnée, contient sensiblement moins de gluten. Celle qui est mêlée avec du sable, abandonnée ce dernier, qui se précipite, si on la délaie dans l'eau froide. Le plâtre se précipite également, si, pendant quelques minutes, l'on fait bouillir dans une livre d'eau distillée deux onces de farine qui en contiennent. Toutefois il faudroit user d'un procédé un peu plus compliqué, si la quantité de plâtre étoit trop petite; ce qui exigeroit une calcination de la farine dans un creuset.

Le carbonate de chaux se reconnoît en délayant la farine dans l'eau bouillante : procédé qui seroit également mis en usage pour la céruse (*sous-carbonate de plomb*), pour le blanc de tard (*sous-nitrate de bismuth*).

L'alun, qui a été employé quelquefois pour rendre le pain plus blanc, est découvert par des recherches plus compliquées. On mêle une partie de la farine suspecte avec six parties d'eau distillée; on agit de temps à autre; au bout de vingt-cinq heures, on filtre; et on reconnoît alors une liqueur astringente à la liqueur, qui précipite en blanc, par l'ammoniaque, le sous-carbonate de potasse & l'hydrochlorate de baryte. Si l'on fait ensuite évaporer cette même liqueur, on obtient l'alun cristallisé. Le mélange du jalap à l'alun, dont les fraudeurs usent quelquefois, demanderoit d'autres recherches, pour lesquelles nous renvoyons à l'excellent ouvrage dans lequel nous puisons ces notions chimiques-légales (les *Leçons de médecine légale*, de M. Orfila).

La farine de bariot ou de vesce, qui est souvent mêlée à la farine de froment, ne détruit pas le gluten; mais, si elle se trouve pour un tiers dans la pâte, le pain est mat, lourd, difficile à digérer, sans être nuisible, surtout lorsque le mélange a lieu avec la farine de seigle de première tamisaison, qui ne devroit être admise, même pour le pain de munition, que dans les momens les plus difficiles, & lorsque la force des circonstances ne permet plus de choisir ce qui est le moins incommode & le plus salubre.

La température à laquelle il faut soumettre la pâte pour cuire le pain, n'est pas assez élevée pour décomposer les différentes substances étrangères qui, par la cupidité ou la négligence, ont été parfois mêlées à la farine. Des procédés analogues à ceux que nous venons d'indiquer, devront en conséquence être mis en usage pour découvrir ces substances, en agissant plutôt sur la mie du pain que sur la croûte.

Le pain qui contendroit du leigte ergoté pa-

roit être taché en violet, & les personnes qui en auroient mangé, auroient nécessairement éprouvé plusieurs symptômes, qui pourroient être difficilement rapportés à une autre cause de lésion. (*Voyez Sureau sacchar.*)

On pourroit aussi avoir à prononcer sur du pain qui devroit ses propriétés nuisibles, soit à l'évraie; soit à la nielle, à la touille, ou à d'autres maladies des grains; si fréquentes, & si redoutables dans les années humides, & qui donnerent lieu à plusieurs accidens bien graves, pendant les famines de 1770 & 1771. (*Voyez PAIN.*)

Le choix du levain (1), les caractères du meilleur pain, ses qualités, les différentes espèces de pain appropriées aux divers besoins & aux différentes situations des hommes, peuvent offrir aussi plusieurs sujets de recherches & de consultation, qui rentrent dans l'hygiène publique, & que l'on rattache à l'ensemble des détails que comprend l'art du boulanger (2), considéré sous le rapport de la surveillance administrative & de l'édilité médicale. (*Voyez PAIN, en général, PANIFICATION, Pain de munition, Pain recuit, ou cuit deux fois, Bistour.*)

La pâtisserie n'exige guère moins de surveillance que le pain, soit pour la nature des substances qui servent à la colorer, & qui devroient être de nature végétale, d'après l'ordonnance de 1742; soit pour l'état d'altération, dans lequel on voit si souvent quelle est livrée aux enfans & aux gens du peuple, non moins faciles à tromper que les enfans.

Il n'est pas malheureusement sans exemple, d'avoir vu les cornichons du plus bon vert, devoir cette couleur à leur séjour dans des vases de cuivre. Les champignons, qui pourroient être si dangereux, donnent rarement lieu à des accidens dans les grandes villes, où l'on ne vend guère que des champignons de couche, on se conformant d'ailleurs aux ordonnances de police, pour cette vente.

Certains fruits, tels que les melons, ne doivent être vendus que dans la saison où l'on peut

(1) Le levain ou la levure pourroit être trop aigre, trop vieux; il pourroit aussi être altéré pour avoir été conservé dans un vase de cuivre, & pour avoir été mêlé avec différentes substances, d'après des erreurs populaires. Les précautions relatives au levain froment se dévoient être beaucoup plus strictes à Paris lorsqu'on se faisoit venir de Flandre.

(2) L'art du boulanger, exercé par une communauté, qui est une des plus anciennes, n'a guère varié depuis longtemps qu'à des mesures relatives au poids & au prix du pain. Nous aurons occasion de rappeler plusieurs de ces actes de l'autorité, ainsi que les actes qui seroient pris, & par la Faculté de médecine, & par le Parlement, dans la grande question de savoir, si l'usage du levain de bière pouvoit être autorisé dans la préparation du pain.

manger impunément ceux de ces fruits qui sont d'une qualité inférieure, & qui sont liés au peuple, soit dans les villes, soit dans les campagnes. Plusieurs ordonnances sont très-sévères à ce sujet, & celui qui trace rapidement ces considérations, le rappelle, avoir vu, plusieurs fois, dans la jennelle, le magistrat chargé de la police des marchés, arrêter de son autorité, le vente de ces fruits, du même les défaire dans les moins ou sous les yeux du vendeur pris en flagrant délit. Dans le temps de disette, plusieurs maladies graves ont été occasionnées parce qu'on s'étoit nourri presque exclusivement avec des débris avariés de substances végétales, de sommets de ligames ou de plantes herbacées, que l'on réduisoit en pulpe ou en coulis, pour les mêler avec une très-petite portion de farine gâlière. Des dysenteries, des hydropisies & des congestions, fréquentes, sous toutes les formes, furent justement attribuées, il y a quelques années, à un semblable régime, dans le département du Cher.

Le vinaigre, les huiles, le chocolat, & plusieurs autres substances végétales, peuvent devenir aussi la cause de plusieurs indispositions, par les changements & les mélanges que la cupidité leur fait éprouver.

Le vinaigre peut être nuisible par la nature des substances très-acres qui ont servi pour l'aromatiser, ou par les acides minéraux qui ont été employés pour le sophistiquer, en contradiction avec le décret impérial du 20 novembre 1809.

La conservation de l'huile dans des vases, soit de plomb, soit de cuivre, & son mélange avec une certaine portion d'oxyde de plomb, ont pour augmenter le poids, soit des sels qui peuvent contribuer à la rendre nuisible. (*Ordonnance du 27 mars an 13.*)

Le chocolat du commerce est rarement pur. Les substances avec lesquelles on le sophistique, sont la farine de froment, le cacao de qualité inférieure, diverses huiles végétales ou animales: substances d'ailleurs incapables de produire aucun effet nuisible. Si l'on vouloit cependant reconnaître cette altération, d'après des confessions, ou pour répondre à l'autorité dans un cas de poursuite judiciaire, les moyens de recherches seroient faciles. On feroit d'abord bouillir le chocolat suspect, pendant dix minutes, on mêleroit ensuite le décollum avec quantité suffisante de chlore concentré. La liqueur qui appareroit alors, après avoir été clarifiée, deviendroit d'un beau bleu, par l'addition d'une ou de deux gouttes de teinture alcoolique d'iode, si le chocolat contenoit de l'amidon ou de la fécule.

Ces mêmes procédés seroient mis en usage, si l'on avoit à examiner un chocolat regardé comme

vénéneux, par son mélange avec des substances minérales. Mais après l'avoir employé, on examineroit ensuite avec des réactifs convenables, le précipité qui se formeroit après la distillation du décollum décoloré par le chlore.

Le thé, les épices exotiques sont aussi l'objet de diverses falsifications; ainsi, les épices exotiques se fabriquent en grand à Francfort, comme les vins à Londres. La plus dangereuse de ces falsifications que l'on découvre, est celle du poivre avec une pâte, qui contient de l'oxyde de plomb.

La falsification du thé a principalement lieu en Angleterre avec la feuille du premier sauvage. On évalue jusqu'à quatre millions cette contre-façon, qui paroit d'ailleurs n'occasionner aucun effet nuisible; heureuse circonstance où la cupidité, si souvent aux prises avec la crédulité ou l'imprévoyance, se borne à tromper les goûts raffines des riches & à les rendre les tributaires.

S. III. Substances alimentaires animales.

Les substances alimentaires animales ne donnent pas lieu, comme les substances végétales, à des falsifications, mais elles peuvent également éprouver une altération qui les rend dangereuses. Quelques-unes de ces substances ne font pas même à l'abri de toutes falsifications. Ainsi, dans les grandes villes, telles que Londres & Paris, on dénature le beurre, le lait, le fromage par divers mélanges, pour en augmenter le volume ou le poids. La plupart de ces altérations sont à la vérité sans danger; mais quelques-unes peuvent occasionner les accidents les plus graves, celle du lait, par exemple, avec lequel on a mêlé de l'oxyde de zinc, ou la falsification encore plus coupable du beurre, qui l'on auroit augmenté le poids avec l'oxyde de plomb, ainsi que Gaubius dit l'avoir vu faire en Hollande, pendant une épidémie.

Le fromage pourroit se trouver altéré par son séjour dans un vase de cuivre ou de plomb. On a souvent aussi essayé d'en augmenter le volume par son mélange avec de la farine ou avec des pommes de terre crues. Le fromage pur & sans addition de fécule acquiert une couleur de tabac d'Espagne, si on le traite avec de l'iode & de l'eau pendant quelque temps.

Le lait ou le beurre, le fromage, les œufs, agissent le plus souvent, quand ils sont nuisibles, par l'effet des différentes altérations spontanées, que la sollicitude de l'admission à l'exportation prévient en France, & contre lesquelles elle a cherché à protéger les consommateurs (1).

(1) Ces altérations, pour le lait, pourroient être l'effet

Cette même administration a porté également la surveillance, sur les altérations que plusieurs de ces substances pourroient éprouver par leur contact avec certaines substances métalliques, & il se fit bien à désirer que les ordonnances mémorables (1) qui défendent aux laitiers de faire usage de vases de cuivre, même de ceux étamés, s'étendissent à tous les ustensiles dont on se sert pour la conservation ou la préparation du beurre & des fromages.

Des altérations spontanées bien dangereuses, se manifestent dans la chair des différents animaux, dont nous faisons un continuel usage, & nous ne devons pas être surpris si nul autre point de l'hygiène publique n'a excité aussi vivement la surveillance des gouvernemens. L'âge des animaux, l'état de gestation pour des femelles, l'état de fatigue à la suite des marches forcées, les maladies en général, dans les épidémies, les maladies propres à quelques espèces; enfin, le régime des bestiaux lui-même & la manière dont ils sont nourris, doivent être également pris en considération relativement à cet objet. Il est certain que les animaux tout jeunes, les vœux, par exemple, avant six semaines (2), les bestiaux surmenés par de longues marches, le gibier forcé, fournissent une chair assez altérée pour devenir nuisible. Les présides ou l'état conquis d'une maladie, surtout pendant la durée d'une épidémie, doivent exciter encore davantage la surveillance. On a été dans ces cas, jusqu'à donner, dans une instruction officielle, le signalement des bestiaux qui étoit permis d'abattre & de consumer.

Vici le signalement, avant & après la mort de l'animal (3) :

1°. Les bestiaux destinés à être abattus doivent avoir le regard vif, gai, & marcher avec facilité.

2°. Ils doivent rominer.

3°. Les cornes, les oreilles, la gueule, les narines, la queue, ne doivent pas être froides.

4°. L'animal ne doit pas baver; il ne doit lui sortir aucune mucoité ou autre matière par le nez, les oreilles ou les yeux.

5°. La peau ne doit être ni squameuse ni fissurée.

6°. Il ne doit se rendre ni pusille ni émise sur le corps, surtout sur la tête, ou cou, dans la gueule & sur la langue.

7°. Le cou, le derrière des épaules, le défaut de l'épaule, les aines, ne doivent offrir aucun engorgement ou tumeur; les testicules surtout ne doivent être ni échauffés ni tuméfiés.

Après que les bestiaux auront été abattus, on observera ce qui suit :

1°. La peau ôcée, on n'ouvrira les animaux qui étoient malades, qu'après leur avoir refroidi lement; on examinera bien, si sur la chair ou dans la chair, le trouvant des pusilles, des tumeurs, du gonflement, des ulcères ou des excroissances; dont la couleur seroit livide ou même noire.

2°. On recherchera exactement, si auxilia des adhérences entre la peau & les pousins, & si ces adhérences offrent des traces de suppuration; si ces diverses parties commencent des taches d'un rouge foncé & blanches ou jaunes, des tubercules ou des ulcères; si le sang est dur, beaucoup plus volumineux qu'à l'ordinaire, & si la couleur est naturelle; si la vessie du fiel n'est pas très-dilatée & chargée de fiel (circouissance importante & très-ordinaire chez les bestiaux atteints de l'épidémie); enfin, si la rate est dure, trop volumineuse ou couverte de pusilles.

3°. Si les veinchères, surtout le millet & le caillou, ne sont pas très-volumineux, s'ils ne sont pas rouges, livides ou durs; si on n'y trouve pas quelque substance étrangère en général; si la chair ne présente pas dans quelques endroits des vergetures bleues.

4°. Comme, chez les bestiaux atteints de maladies épidémiques, on rencontre, surtout dans les vœux de la déglutition & de la respiration, des pusilles remplies d'air ou d'une humeur aqueuse, & qui se distinguent par une odeur fétide, on aura grand soin de constater ces circonstances.

Les maladies ou les lésions organiques qui altèrent le plus souvent la chair des animaux pour en faire profiter la vente, sont la gale récente des moutons, l'épilepsie, le tonneau, les adhérences, la présence même des hydatides, &c. &c.

La maladie connue sous le nom de *tuberculose* des pores, pourroit le trouver comprise dans cette classe, si elle étoit peu avancée; on fait cependant d'hui qu'elle paroit se rapprocher beaucoup de l'état tuberculeux, & que des principaux symptômes consistent dans les pusilles de la langue & dans le développement d'un grand nombre d'hydatides. Des ordonnances très-anciennes, pour empêcher pendant très-long-temps, comme nous l'avons dit, une semblable maladie, &c.

Cccc 2

de certaines maladies des vaches, d'un peu trop récent, & d'une nourriture malsaine. Le beurre, les fromages deviendront nécessairement nuisibles, par cela même qu'ils seront couverts depuis, très-long-temps.

(1) L'ordonnance de police rendue par Lenoir, & celle du 7 pluviose an 12.

(2) Cet âge est exigé par une ordonnance du préfet de police, du 10^e mai 1809.

(3) Ce signalement se trouve dans une instruction rédigée par les inspecteurs juries de Brestol, à laquelle Frank s'est conformé. Voyez l'article *Conservation des Distributions des Soins médicaux*, par notre collègue M. M. M.

fut pour en surveiller l'exécution, que l'on créa les charges de *jurés langueyeurs des porcs*, dont l'objet étoit de prononcer, d'après l'inspection de la bafe inférieure de la langue, sur la *laderie* ou la *non-laderie* des cochons qui étoient mis en vente.

Il y a quelques années, on mémoira à consulter, adressé par la ville de Marseille, attira de nouveau l'attention des médecins & de l'autorité, sur cette ancienne question de la laderie des porcs. M. le professeur Chaussier, qui fut chargé de répondre, déclara dans son rapport, que la laderie altère la chair des animaux, mais sans la rendre assez nuisible pour en empêcher la vente, après en avoir prévenu les acheteurs. La morve des chevaux & l'hydrophobie, surtout chez les herbivores, ne paroissent pas devoir être comprises parmi les maladies qui altèrent assez profondément la nutrition, pour rendre la chair des animaux atteints de ces maladies, nuisible ou non alimentaire. Persuadé de cette vérité, M. le professeur Chaussier ne prescrivit point la chair des chevaux morveux, dans l'alimentation des cochons que l'on nourrit avec les substances animales. Les maladies propres à certaines espèces d'animaux, qui ne pourroient pas être traitées avec la même indifférence, sont la dysenterie, l'hydrophobie des moutons, quelques maladies de la volaille en général, la pustule des pigeons en particulier, l'état du poisson dans l'état du frai; enfin, plusieurs maladies des huîtres dans les parcs mal entretenus, mal disposés, ou dans les très-grandes chaleurs, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre; période pendant toute la durée de laquelle leur consommation est prohibée.

Il est certain, d'une autre part, que les bestiaux qui ne seroient pas convenablement nourris, pourroient donner une chair malsaine, & les ordonnances de police de Paris n'ont rien laissé de négliger, relativement à cet objet de surveillance sanitaire. Une autre question particulière s'est élevée, relativement à la nourriture des cochons avec les substances animales, relativement à un écartier des environs de Paris, qui nourrissoit des cochons avec de la chair de cheval, & qui demandoit à être autorisé ou même enjoint dans cette branche d'industrie. M. le professeur Chaussier fut chargé de répondre au nom de la Faculté de médecine de Paris, qui avoit été consultée par l'autorité supérieure; il établit, dans son rapport, que cette coutume n'avoit rien de préjudiciable; & que le cochon, qui est un animal onnivore, pouvoit utilement s'engraisser avec la chair des animaux abattus dans les environs; usage que l'on trouve établi d'ailleurs dans un pays voisin de la France, d'où l'on voit sortir tous les ans un grand nombre de cochons très-gras & très-bons, après avoir été nourris avec des débris fournis par des ateliers où l'on rassem-

ble, pour les employer à différents usages, les cadavres des animaux que, partout ailleurs, on laisse se détruire en plain air, par la putréfaction. M. Chaussier n'oublie point de rappeler que Lavoisier avoit proposé, avec toute l'autorité de son nom & de ses connaissances, quelque chose d'analogue à cette nourriture des cochons avec les substances animales. Il concluoit, en déclarant que l'autorisation demandée devoit être accordée, *quo* les restrictions convenables; & que la chair des chevaux morveux pourroit même être donnée, & que celle des animaux abattus, en général, deviendrait un aliment bien plus sain, si l'on en formoit, par la presse & par la cuisson, ce que l'on appelloit le *croton*, qui pourroit être associé à des substances végétales. (Voyez *Décad. philosoph.* an 10, 2^e trimestre, pag. 16.)

Plusieurs autres animaux domestiques pourroient également se trouver nourris, & d'une manière très-utile, avec des viandes de qualité inférieure ou avec les débris des cuisines. Les poules, qui semblent exclusivement granivores, s'arrangent très-bien de se régimer. M. le professeur Dupuytren m'a dit avoir vu, chez les écartiers & les rôtisseurs des environs de Paris, à l'époque où il s'occupoit de son important travail sur les foyers d'aisance, plusieurs poules fort grosses, que l'on nourrissoit exclusivement avec la chair de cheval, & dont les œufs, que l'on auroit pu regarder comme des œufs d'oie, avoient le plus souvent deux jaunes.

Les chairs des animaux, que l'on a convenablement préparées pour être livrées aux consommateurs, peuvent le dénaturer sensiblement par le fait même de leur conservation, & devenir alors très-nuisibles, ce qui fait alors un objet de surveillance très-minutieuse & très-détailée. Les viandes falsifiées, que certains goûts dépravés font rechercher, sont, en général, malsaines, & au moins pour les personnes dont les organes de la digestion sont un peu faibles. La viande de boucherie ou de basse-cour, qui auroit subi un premier degré de putréfaction, auroit peut-être des inconvénients. Celle du veau, du mouton, du pigeon, s'altère beaucoup plus vite que celle du bœuf, du cerf, du coq de bruyère, du dindon, de l'oie, &c. Il importe surtout que les viandes destinées à être salées ou boucées en grand, soient bien fraîches lorsqu'on les livre à cette opération, & les mesures de police à ce sujet ne peuvent être ni trop sévères, ni trop détaillées.

On apporte aussi, & l'on doit apporter un grand soin à la surveillance des pêches & à la vente du poisson en gros, au moins dans les grandes villes, quoique la vente en détail offre encore des abus qui ne sont pas sans danger. Cette sollicitude devroit sans doute aller jusqu'à défendre la vente des herings *jaurs* ou *secs* qui ont plus de deux ans, & à punir, comme ont eu égard de fraude, la sophistication

tion, par laquelle on donne une apparence de fraîcheur à la morue avariée, en la faisant détrempier dans l'eau de chaux.

La police de la pêche, dont nous venons de parler, devrait s'appliquer, du moins dans quelques pays, aux moules comme aux huîtres. Elle devient de la plus haute importance dans les contrées équatoriales, & n'a rien moins alors pour objet, que de prévenir les empoisonnements par les poissons vénéneux, dont nous avons cité des exemples, & qui sont si fréquents dans ces contrées.

§. IV. Des boissons.

Les boissons alimentaires & les boissons proprement dites, l'eau elle-même, ne sont pas toujours livrées aux consommateurs dans leur état de pureté. Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer qu'un article du Code pénal, portoit des peines contre les débitans de boissons falsifiées ou mal préparées.

Les boissons qui peuvent être le plus souvent falsifiées ou sophistiquées, sont le vinaigre, le lait, dont nous avons déjà parlé, le vin, l'eau-de-vie, le cidre, le poiré, la bière, les différentes boissons froides ou chaudes qui se vendent chez les limonadiers.

La surveillance sanitaire doit s'appliquer en même temps à ce qui concerne la préparation du vin, & à la surveillance de ces diverses falsifications.

La culture de la vigne, l'époque des vendanges, le débit du *moût*, dans les villages, la vente & l'emploi des *rubans soufres*, ne peuvent être entièrement abandonnés aux caprices ou à la cupidité des particuliers. Ils ont donné lieu à plusieurs réglemens fort sages, & la falsification des vins est toutefois un objet de sollicitude beaucoup plus important, & qui intéresse bien plus vivement la salubrité publique. Elle ne parait pas avoir été inconnue aux Anciens, & l'on ne voit point de son temps, les vins du Languedoc, que l'on estime beaucoup, étoient souvent altérés par un mélange avec l'alcool & les substances parfumées. Cet art à lait, au reste, de grands progrès chez les Modernes.

Les procédés, soit pour dénaturer un vin très-commun, soit pour imiter les vins recherchés, sont très-nombreux, & ordinairement fort cachés & très-difficiles à reconnaître, par des recherches médico-légales. La plupart de ces procédés sont, pour plusieurs pays, fortus dans le Nord, l'objet d'une branche d'industrie très-florissante; & tout ce que l'on peut exiger, relativement à la salubrité, c'est que les vins falsifiés ou composés de toute pièce, ne contiennent aucune substance vénéneuse.

Les falsifications de ces vins paraissent s'opé-

rer, tantôt en ajoutant de l'eau-de-vie à des vins de qualité inférieure, tantôt en mêlant des vins de nature différente, tantôt en combinant différentes espèces de vins avec des matières colorantes, avec des substances alcalines, des terres absorbantes, de l'alun, ou même des matières métalliques. Les hommes qui se livrent à ces opérations, en Angleterre, y prennent le nom de *brasseurs de vins*.

Les vins les plus dangereux sont ceux qui contiennent de l'oxyde de plomb, ou toute autre préparation de ce métal, & que l'on appelle *vins manganistes*; on est souvent appelé à prononcer sur ces vins, qui sont un véritable poison, & qui pourroient contenir jusqu'à vingt-quatre grains de métal vénéneux par pinte. Pour reconnaître la fraude, on mettrait en usage le procédé suivant, qui se trouve conseillé par M. Orfila.

« Si le vin est rouge, on le mêle avec une suffisante quantité de *chlorure* liquide, pour le décolorer; on laisse déposer un précipité jaune-rougeâtre, qui se forme, puis on filtre; la liqueur filtrée est évaporée & concentrée dans une capsule de porcelaine ou de platine; lorsqu'elle est réduite au tiers de son volume, on la filtre de nouveau, pour la débarrasser d'un précipité rougeâtre qui s'est formé pendant l'évaporation, & on la traite par les réactifs propres à déceler les dissolutions aqueuses d'alun, de plomb, de cuivre & d'arsenic. Elle contiendra de l'alun, si elle offre une saveur astringente, & si elle précipite, 1°. en blanc, par l'ammoniaque & par la potasse; 2°. en acahi, doit redissoudre le précipité; 3°. en blanc, par le sous-carbonate de potasse ou de soude; 4°. en blanc, par le nitrate ou l'hydrochlorate de baryte; le précipité est du sulfate de baryte insoluble dans l'eau & dans l'acide nitrique. (Voyez les paragraphes 80 bis, 83 & 85, de l'ouvrage de M. Orfila, pour les réactifs qu'il faut mettre en usage pour découvrir, dans le vin traité par le chlorure, les sels de plomb & de cuivre, ainsi que l'oxyde d'arsenic.)

« Le vin blanc falsifié par l'acide ou par l'entre de ces substances, sera analysé comme le vin rouge décoloré par le chlorure. »

Les falsifications si fréquentes pour les vins, s'étendent quelquefois aux eaux-de-vie, que l'on falsifie tantôt avec le poivre long ou avec d'autres substances irritantes, tantôt avec des substances vénéneuses, la stramonie, l'ivraie.

L'usage n'est pas toujours exempt de ces falsifications, & on assure que celui qui se trouve livré aux Hollandais par les Chinois, est souvent altéré par un mélange avec une espèce très-âcre d'holiburie très-abondante dans les mers de l'Inde. L'altération par le mélange avec les feuilles de laurier-cerise, ayant donné lieu, en Angleterre, à des accidens assez graves, ce genre de falsification a été sévèrement prescrit.

Du reste, la plupart de ces sophistications seraient faciles à reconnaître par la simple évaporation de la liqueur suspecte.

La sophistication du cidre par le plomb, par la litharge, est comme celle du vin, par la même substance, une des plus dangereuses & des plus coupables.

La colique si désastreuse du Devonshire, a été attribuée à l'altération du cidre qui avoit séjourné dans des vases de plomb; mais il est malheureusement prouvé, par un grand nombre d'expériences, que cette colique, ou une colique analogue (la colique du Poirou, la colique vésicale), a pour causes occasionnelles, les cidres avariés & préparés avec des fruits qui n'étoient pas arrivés à leur maturité; circonstance qui ne peut attirer trop vivement l'attention des autorités locales.

Du reste, les cidres, si souvent frelatés dans les grandes villes, se reconnoîtroient aisément par l'épreuve de l'hydrochlorate de platine, qui occasionne à peine un léger trouble dans le cidre de bonne qualité, parce qu'il doit contenir très-peu de sel à base de potasse.

Ce qui concerne la bière, relativement à l'hygiène publique & à la médecine légale, ne se borne pas à la falsification; la propriété de l'usine où elle se prépare, la qualité de l'eau & du grain qui servent à cette préparation, se trouvent sous la surveillance de la police sanitaire, & ont donné lieu à plusieurs ordonnances, tant pour indiquer les conditions les plus favorables de cette fabrication, soit pour reponsser ou pour détruire les érements populaires les plus courantes à ces conditions (1).

La bière deviendroit nécessairement très-malsaine, si elle n'avoit point assez fermenté, ou si elle se trouvoit falsifiée avec de l'ivraie ou de l'opium, que l'on auroit ajouté ou substitué au houblon, pour rendre la bière plus coivrante; genre de fraude auquel doit s'appliquer l'article du Code pénal, relatif aux boissons frelatées.

Les usures sanitaires, ou les instructions médico-légales relatives à l'eau, ont principalement pour objet, la pureté, les moyens de s'épurer ou de la filtrer en grand, la manière des vases employés pour la puiser, les réservoirs, les canaux qui servent à la conduire ou à la transmettre.

Les canaux & les réservoirs de plomb ne paroissent avoir aucun inconvénient dans les pays suffisamment froids, & dans lesquels l'eau est assez pure. Il n'en seroit pas ainsi, si la qualité de cer-

taines eaux en la nature du sol, contribuoit à rendre cet usage très-malsain. Deux fameux médecins n'ont pas même hésité, pour attribuer les coliques nerveuses si fréquentes dans les environs d'Amsterdam, aux tuyaux de plomb qui servent pour la conduite des eaux.

Les tuyaux de fonte seroient, de reste, bien préférables aux conduits de plomb, que l'on continue d'employer plutôt par routine, peut-être, que par économie.

L'usage de puiser l'eau dans les puits, les étangs, les citernes, a donné lieu à plusieurs réglemens particuliers, parmi lesquels on doit distinguer la défense si bien entendue, de placer des ulmes insalubres ou au rouissage de chanvre, dans le voisinage des eaux destinées à fournir de l'eau potable.

Les ordres du jour pour les armées, pendant les marches & les campagnes longues & difficiles, surtout pendant les grandes chaleurs, commencent souvent des prohibitions analogues; soit pour empêcher les soldats de boire des eaux trop froides, des eaux bourbeuses, ou même des eaux qui contiendroient de petites sangues, ainsi qu'on a souvent eu l'occasion de l'observer, pendant la mémorable expédition d'Egypte.

On ne doit jamais oublier, dans les cas de contestation & d'incertitude, relativement à la pureté de l'eau, que celle qui peut être bue impunément, cuit bien les légumes, qu'elle dissout convenablement le sucre, & qu'elle est à peine troublée par la dissolution de nitrate d'argent.

Les boissons spiritueuses, acides, aromatiques, sucrées, chaudes ou glacées, sont l'objet d'un genre de commerce & d'impûrité qui ne pourroit pas être impunément abandonné par l'autorité, aux personnes qui l'exercent, bien qu'elles s'adonnent, en général, à une classe d'hommes assez attentive & assez éclairée.

Nous avons déjà parlé des principales sophistications qui sont mises en usage pour en des principaux articles de ce commerce, pour les différentes espèces d'eaux-de-vie, sans en excepter l'arak, que la bonne foi chimie ne laisse pas toujours dans son état naturel.

Les boissons acides, les limonades, les oranges, les différentes espèces de punch, sont peut-être encore plus souvent falsifiées, & l'usage, pour ce genre de fraude, est commun pour la sophistication des vinaigres, les acides minéraux, mais surtout l'acide sulfurique. L'article 318 du Code pénal, & plusieurs autres dispositions législatives ou réglementaires (2), s'appliquent sans doute à ce genre de fraude, que l'on pourroit reconnaître, ou du moins

(1) Une de ces ordonnances est de 1668. L'étili royal de 1668 est beaucoup plus important, & beaucoup plus détaillé. Il est facile de voir combien il est opposé aux abus & aux erreurs populaires. D'après lesquels on croiroit qu'il étoit nécessaire de faire séjourner la substance sucrée dans les réservoirs de l'eau destinée aux breuvages.

(2) La loi du 22 juillet 1791, & le décret impérial du 25 novembre 1806.

apercevoir, au moyen d'une dissolution d'hydrochlorate de baryte, au p^rès le procédé plus exact, que propose M. Orfila.

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit sur le chocolat & sur le thé; il ne parait pas que ce dernier contienne jamais, ainsi que quelques personnes l'avaient pensé, des parcelles d'oxyde de cuivre, fournies par les plaques de ce métal, sur lequel on le fait sécher.

La sophistication du café, quelque condamnable que l'on puisse la supplier, ne se rattache, sous aucun des aspects de rapports, à l'hygiène publique ou à la médecine légale. De reste, la chimie en poudre, avec laquelle on falsifie le plus ordinairement le café, est beaucoup moins dure que ce dernier.

L'eau de javelle, & quelques poisons minéraux, que l'on a même quelquefois avec le café à la crème, ne pourroient être reconnus que par des épreuves chimiques assez compliquées, & dont l'exposition n'appartient pas à cet article. (Voyez ENFOUMENEMENT & POISONS. Consultez aussi les *Leçons de médecine légale*, de M. Orfila, & le nouveau *Journal de médecine*, cahier de juillet 1820.)

S. V. Quantités, qualités des nourritures.

La quantité & la qualité des nourritures sont fixées, d'après une moyenne proportionnelle, dans plusieurs situations ou conditions déterminées de la vie : pour les soldats, par exemple, pour les matelots, les prisonniers, les malades dans les hôpitaux ; on a même été jusqu'à vouloir indiquer d'une manière générale ce que pouvoit coûter, dans une grande société, la nourriture de chaque individu valide, en faisant abstraction de son genre de vie ou de travail, de la complexion, de ses forces physiques, &c. &c.

Les médecins souvent consultés par l'autorité, relativement à de semblables évaluations, ne peuvent apporter trop de réserve dans leurs réponses. Organes de la vérité, interprètes de la nature, défenseurs du malade & de la faiblesse, il importe surtout qu'ils ne manquent jamais de rappeler, que dans l'alimentation il ne s'agit pas d'empêcher de mourir de faim, on nourrit, avec une rigueur mathématique, une somme déterminée de matériaux nutritifs ; mais qu'il faut en même temps conserver la santé & les forces, soutenir comme il convient l'action des organes digestifs par des condiments, & par une certaine quantité d'aliments solides ; condition de l'existence qui n'est pas moins indispensable que la nutrition proprement dite, & dont le besoin varie d'ailleurs suivant l'âge, le sexe, le tempérament, le climat, le genre de vie, la différence des travaux qui le font en plein air, comme ceux des malheureux gélériens, ou qui s'exécutent dans

un lieu renfermé, comme les opérations monotones des enfans que l'on emploie dans les filatures.

Dans le cas où l'on seroit appelé à prononcer sur la qualité nutritive de plusieurs comestibles différens, il seroit bien difficile d'approuver d'une manière positive, & de ne pas joindre les réflexions générales qui viennent de nous occuper, aux résultats des expériences ou des recherches les plus régulières.

Une de ces questions médico-légales fut soumise, il y a quelques années, à la Faculté de médecine de Paris ; & nous ne croyons pouvoir mieux terminer cet article, qu'en rappelant d'une manière rapide, & sous forme d'extrait, la réponse qui fut faite à cette importante question.

La Faculté de médecine avoit à prononcer sur les différentes propriétés nutritives des comestibles qui sont employés pour les prisonniers, & en prenant les pommes de terre pour terme de comparaison.

Ces comestibles sont les pommes de terre, plusieurs autres farineux qui les remplacent dans la mauvaise saison, le grain d'orge, le pois, la fève, plusieurs autres substances végétales, les légumes verts, les rhoux surtout, les oaves, les épiards, enfin le pain, & quelques substances animales.

Les questions proposées relativement à ces comestibles étoient énoncées ainsi qu'il suit :

1°. Quelle quantité de pain, de viande, de fèves, de haricots, de pois, de riz ou de gruau d'orge peut remplacer 45 kilogrammes de pommes de terre, non d'après le prix, mais d'après la quantité nutritive de ces différentes substances ?

2°. Par quelle quantité de légumes verts, tels que choux, navets, épinards, fèves & pois, peut-on remplacer 45 kilogrammes de pommes de terre ?

3°. Quelle quantité de viande & de pain peut remplacer 45 kilogrammes de pommes de terre, & le beurre & la graisse qui deviennent inutiles dans une soupe à la viande ?

M. Vauquelin, chargé de répondre au nom de la compagnie, se livra à nos suite de réflexions & de recherches qu'il fit connaître dans un rapport communiqué le 9 avril 1818. Quoique persuadé de l'insuffisance de toutes les épreuves chimiques pour répondre à de pareilles questions, notre savant confrère essaya cependant de donner, d'après ses expériences, quelques évaluations approximatives, que nous croyons pouvoir rapporter aux titres suivans, sous forme de propositions générales.

1°. La pomme de terre contient vingt-deux parties & demie de farine amyliacée ; deux portions & demie de matière extractive & ligneuse, une petite portion d'albumine animale, & un ex-

trait nauséux d'odeur virule & nauséabonde : la matière sèche ne s'y trouve que dans la proportion de vingt-cinq parties.

2°. Le navet, les choux, sont beaucoup plus aqueux, non-seulement que la pomme de terre, mais que les autres végétaux verts ; de telle sorte que cent parties de ces légumes ne contiennent que huit livres de matière sèche : cette matière sèche ne contient qu'une assez petite quantité de matière nutritive, & de telle sorte qu'il faudroit cinq fois autant de navets que de pommes de terre, pour servir à l'alimentation.

3°. Cent livres de choux n'ont donné que quatre livres de matière extractive, laquelle se trouve combinée avec une assez grande quantité de matière animale.

En supposant, dit M. Vauquelin, que dans les végétaux comparés à la pomme de terre (les carottes, les navets, les choux, les épinards), les parties insolubles soient nourrissantes à un degré quelconque, nous pensons que trois parties de navets, deux de carottes, deux d'épinards, quatre de choux, peuvent chacune remplacer une partie de pommes de terre, en ayant toutefois

qu'il faudroit donner la préférence à cette dernière.

Le pain de bonne qualité, qui ne contient que la cinquième de son poids d'eau, peut remplacer deux & même trois parties de pommes de terre. Soixante-quinze livres de pain, & vingt livres de viande telle qu'on la donne aux déteus, répondent à peu près à trois cents livres de pommes de terre : ce qui établit la proportion de douze onces de pain, & de cinq onces de viande pour trois livres de pommes de terre.

Les fèves, les haricots, les pois, les lentilles, contenant beaucoup plus de matière solide & de principes animaux, une livre de l'une ou de l'autre de ces substances de bonne qualité & bien sèche, pourroit nourrir autant que trois livres de pommes de terre. Il faudroit au moins une quantité double des mêmes substances à l'état vert, dans lequel elle perdrait au moins la moitié de son poids.

Le tableau ci-contre présente, d'une manière synoptique, le résultat & les conclusions du travail de M. le professeur Vauquelin.

(MOREAU DE LA SARTHE.)

NOMS DES VÉGÉTAUX.	EAU sur 500 gram.	MATIÈRE desséchée sur 500 gram.	MATIÈRE extractive sur 500 gram.	CENDRES et substances corticales.	OBSERVATIONS.
PAIN de 4 liv. ordinaire. . . .	125	375	"	très-peu.	Donne un produit acide à la distillation.
VIANDE mai- gre de bœuf. .	350	170	"	très-peu.	Donne un produit essen- tiellement alcalin à la distil- lation.
POMMES DE TERRE.	375	125	8	"	Produit acide à la distilla- tion.
NAVETS.	460	40	23	$\frac{1}{100}$	Donnent un produit acide à la distillation.
CAROTTES. . . .	428 $\frac{1}{2}$	71 $\frac{1}{2}$	36	$\frac{1}{100}$	Produit acide à la distilla- tion.
CHOUX.	460 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	19,8	$\frac{1}{100}$	Produit alcalin à la distil- lation.
ÉPINARDS. . . .	428	72	28 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{100}$	Produit acide -alcalin à la distillation.
HARICOTS SECS.	"	500	"	Substance corticale. 40	Produit alcalin à la distil- lation.
FÈVES SÈCHES..	"	500	"	55	Produit ammoniacal à la distillation.
POIS SECS. . . .	"	500	"	35	<i>Ibid.</i>
RIZ.	"	"	"	"	Produit acide à la distil- lation.
LENTILLES. . . .	"	500	"	27,5	Produit alcalin à la distil- lation.

NOUZET (Eaux minérales). Hameau situé rale, qui est froide, se trouve près de ce ha-
à une demi-lieue d'Arzac. La source miné- | meau. (A. J. T.)

FIN du Tome dixième.

ERRATA.

- Page 11, colonne 1, ligne 4, du magnétisme, lisez : du magnétiseur.
 Ibidem, col. 1, lig. 13, ils en exigèrent, lisez : ils en exagérèrent.
 Page 12, col. 1, lig. 23, qui le dérangent, lisez : qu'ils le dérangent.
 Page 26, col. 2, lig. 37, des phylléines, lisez : des phyllènes. ●
 Page 68, col. 2, lig. 4, leur poitrine est étroite, lisez : leur poitrine étroite.
 Page 85, col. 1, lig. 4, à des concrèssions, lisez : à des concrétions.
 Page 103, col. 1, lig. 25, en tant que le sommeil, ajoutez : ne sera pas très-prolongé.
 Page 173, col. 2, lig. 52, parmi ces derniers, lisez : parmi ces différentes momies.
 Page 200, col. 1, lig. 1, d'après Colombo, lisez : d'après Colombo. ●
 Page 206, col. 2, lig. 1, ou distendus, lisez : ou défendus.
 Ibidem, col. 1, lig. 19 (*Androgynum neutrum*, &c.), lisez : (*Androgynum inter utrum, nee utrumque & utrumque renouit*).
 Page 207, col. 1, lig. 15, & se furchargent, lisez : & le furchargent.
 Page 234, col. 2, lig. 53, diminuera, lisez : déterminera.
 Page 259, col. 2, lig. 56, est des plus étendue, lisez : est des plus étendus.
 Page 280, col. 2, lig. 13, Simon Frère, lisez : Simon Pietre.
 Page 289, col. 1, lig. 18, Cinq Mare, lisez : Cinq-Mars.
 Page 297, col. 2, lig. 24, tels qu'une, lisez : telles qu'une.
 Page 317, col. 1, lig. 6, cadavres d'homme, lisez : cadavres d'hommes.
 Page 363, col. 1, lig. 3, de mulieribus affectibus, lisez : de mulier. affectionib.
 Page 386, col. 2, lig. 1, de beaucoup antérieur, lisez : de beaucoup antérieures.
 Page 400, col. 1, lig. 43, moins inébranlable, lisez : plus inébranlable.
 Page 422, col. 2, lig. 14, des contradictions, lisez : des contractions.
 Page 427, col. 2, lig. 30, tremblement fénil, lisez : tremblement fénil.
 Page 429, col. 1, lig. 22-21, carpologie, lisez : carpologie.
 Page 433, col. 1, lig. 48, *ranunculus anthori*, lisez : *ranunculus thora*.
 Page 437, col. 1, lig. 40, on la rencontre, lisez : on rencontre cette maladie.
 Page 459, col. 2, lig. 53, enthousiasmes, lisez : enthousiasmes.
 Page 504, col. 1, lig. 22, avoit tous les avantages, lisez : avec tous les avantages.
 Page 510, col. 1, lig. 54, *renunculus*, lisez : *ranunculus*.
 Ibidem, col. 1, lig. 59, *magniola*, lisez : *magnolia*.
 Page 531, col. 2, lig. 28, Code pénale, lisez : Code pénal.
 Page 538, col. 2, lig. 1, dont il romperoit, lisez : dont il rompt.
 Page 543, col. 2, lig. 27, des impressions, ajoutez : de l'air.
 Page 547, col. 2, lig. 46, au pemphigus, lisez : au pemphigus.
 Page 551, col. 2, lig. 7, Perceval Pott, lisez : Percival Pott.
 Page 556, col. 2, lig. 42, *qajuxat*, lisez : *qajuxat*.
 Page 557, col. 2, lig. 19, *guilandina inoringua*, lisez : *guilandina moringa*.
 Page 563, col. 1, lig. 23, à la paralysie, ajoutez : du rein.
 Page 568, col. 2, lig. 51, ce mouvement par le nerf, lisez : principalement le nerf.
 Page 614, col. 2, lig. 46, de deux minutes en deux minutes, lisez : de dix minutes en dix.
 Page 630, col. 1, lig. 3, sub. maf., lisez : sub. fém.
 Page 633, col. 2, (ligne 6^e. de la note), les fractures des membranes muqueuses, lisez : la structure des membranes muqueuses.
 Page 640, col. 1, lig. 40, effluves marécageuses, lisez : effluves marécageux.
 Page 692, col. 2, lig. 56, les pleubopes, lisez : les Pleuropes.
 Page 701, col. 2, lig. 34, font fournis, lisez : sont fournis.
 Page 711, col. 1, lig. 30, du pigeon, lisez : celle du pigeon.
 Page 715, col. 2, lig. 49, parmi les Crustacés, lisez : parmi les Crustacés.
 Page 719, col. 2, lig. 22, de lafer, lisez : de lafer.
 Page 727, col. 2, lig. 3, aux Myrthes, lisez : aux Myrtinées.
 Page 732, col. 2, lig. 23, par un régime particulier. Certaines, lisez : par un régime particulier ; certaines.
 Page 739, col. 2, ligne 56, très-commoes, lisez : très-communes.
 Page 740, col. 2, lig. 8, un préparation, lisez : une préparation.

C4C4-2





